葵齋要方

火

-241

F
カ-91

凡奎医附方分量引仲景方出金匮医部
不引仲景方出某氏者皆后人所加
方名同者有某无某
名异实同者有某无某
其方
凡加减而方名变者原方分两下加某某若干两
与原方分两同者加某某若干两
小注分两异

5冊 / 490.9
K2-15
No 2883
K 241
慶應義塾大学医学図書館蔵書之印
昭和47年7月
富士川文庫
1502

中風

中風

侯氏黒散　治大風四肢煩重心中悪寒不足者　金匱

菊花四十分　白朮十分　細辛三分　茯苓三分
牡蠣三分　桔梗八分　防風十分　人參
礬石各三分　黄芩五分　當歸
芎藭　桂枝各三分　干薑

右十㠯味杵為散酒服方寸匕日一服初服二十日漸
酒調服禁一切魚肉大蒜常宜冷食六十日止即菜精
在腹中不下也熟食即下矣冷食自能助藥力

○巢源寒食散發候仲景經有侯氏黒散外臺風癇

門載本方引古今錄驗无桔梗有鐘乳礬石方後云
張仲景北方更有桔梗八分无鐘乳礬石一

風引湯金匱除熱癲癇

大黄　干姜　龍骨各二兩　桂枝
甘草　牡蠣各三兩
赤石脂　白石脂
右十二味杵麤篩以韋囊盛之取三指撮井花水三升
煮三沸温服一升治大人風引少小驚癇癡癎日數十
發醫所不療除熱方巢氏云卿氣宜
凡引湯

續命湯金匱附方引古今錄驗治中風痱身體不能自收口不能言
冒昧不知痛處或拘急不得轉側

麻黄　桂枝　當歸　人參
石膏　乾薑　甘草各三兩　芎藭
杏仁四十枚

右九味以水一斗煮取四升温服一升當小汗薄覆養
憑几坐汗出則愈不汗更服無所禁忌當風并治但伏
不得卧欬逆上氣面目浮腫

○千金名大續命湯外臺引古今錄驗西州續命湯
无人參有黄芩主治文全同千金小續命湯无當歸

石膏乾薑有黄芩无桂枝防己防風附子

大防風湯千金治中風發熱無汗肢節煩腹急痛大小便不利方

防風　當歸　麻黄　白朮
甘草八各十銖　黄芩三十銖　乾地黄　山茱萸
茯苓　附子各一兩

右十味㕮咀以水九升煮取二升半一服七合大小便不利内大黄人參各十八銖大枣三十枚生薑三兩煮芎藭湯千金治卒中風四肢不仁善笑不息方

西州續命湯加秦艽防風獨活

石膏一斤注云一用黄連

治遊風行走無定腫或如盤大或如甌或著腹脅或著臂或著脚悉主之方千金

海藻　茯苓　防風　獨活
附子各三兩　大黄五兩　當歸一本作當陸　鬼箭各二兩

右九味㕮咀以酒二斗漬五日初服二合漸加以知為度

治中風口噤不知人者方千金

芥子一升　酢三升

右二味以水七升煮取三升漸飲之肘後不能語

中暑

白虎加人參湯 金匱太陽中熱者曰暍是也汗出惡寒身熱而渴此湯主之

中濕

麻黄加朮湯 金匱濕家身煩疼可与此湯

即傷寒論麻黄湯加朮四両

麻黄杏仁薏苡甘草湯 金匱病者一身盡疼發熱日晡所劇者名風濕此病傷於汗出當風或久傷取冷所致也可與此方

麻黄去節半両 杏仁十箇去皮尖炒 薏苡仁半両 甘草一両炙

右剉麻豆大每服四錢七水盞半煮八分去滓温服微汗避風

○外臺脚氣門引古今録驗云濕家始得病時可

薏苡麻黃湯即本方但分兩少異方後云濕家煩疼
可以甘草麻黃湯發汗不差更合飲家加白朮茯苓
名白朮麻黃湯

防己黃蓍湯金匱風濕脉浮身重汗出惡風主之

防己一兩　甘草半兩炙　白朮七錢半　黃蓍一兩一分去蘆

右㕮咀每抄五錢匕生薑四片大棗一枚水盞半煎八分去滓溫服良久再服喘者加麻黃半兩胃氣上衝者加桂桂三分下

中不和者加芍藥三分

有陳寒者加細辛三分

如水法後坐被上又以一被統腰下溫令微汗差服後當如虫行皮中從腰下

桂枝附子湯金匱風濕相搏身體疼煩不能自轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者此湯主之

甘草附子湯金匱風濕相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出小便不利惡風不欲去衣或身微腫者此湯主之

○脉經作防己湯活人書名漢防己湯

脾胃

大承氣湯 金匱 脉數而滑者實也此有宿食下之愈下之不欲食者有宿食也當下之並宜此方 方出傷寒門

瓜蒂散 金匱 宿食在上脘當吐之宜此方 方出傷寒門

治凡所食不消方 千金

取其餘類燒作末酒服方寸匕便吐其宿食即瘥

○俗間亦傳此法

脾胃

欝證

發熱

竹葉湯千金治五心熱手足煩疼口乾唇燥胸中熱方

竹葉　小麥各一升　黃芩　知母　石膏各三兩
茯苓　生薑五兩　桔蔞根　麥門冬各二兩　人參一兩半　甘草各一兩
半夏

右十二味㕮咀以水一斗二升煮竹葉小麥取八升去滓內藥煮取三升分三服老小分五服

治積熱方千金

金匱瀉心湯方見吐血門　枳實芒消各二兩

右五味為末蜜丸如梧子大空心酒服三十丸加至四

發熱

十丸日一服

治骨蒸方千金

天靈蓋如栝大炙令黃碎以水五升煮取二升分三服起死人神方

茯苓桂枝白朮甘草湯金匱心下有痰飲胸脇支滿目眩者此方主之

茯苓四兩　桂枝　白朮各三兩　甘草二兩

右四味以水六升煮取三升分温三服小便則利

○千金名甘草湯

腎氣丸金匱短氣有微飲當從小便去之前方主之此方亦主之方見虛勞門

甘遂半夏湯金匱病者脉伏其人欲自利利反快雖利心下續堅滿此為留飲欲去故也此方主之

甘遂大者三枚　半夏十二枚　芍藥五枚　甘草如指大一枚炙

右四味以水二升煮取半升去滓以蜜半升和藥盡取八合頓服

十棗湯金匱　脉沈而弦者懸飲內痛病懸飲者此方主之

方見傷寒門

大青龍湯金匱　病溢飲者當發其汗此方主之　方見傷寒門

小青龍湯金匱　前症此方亦主之　方見傷寒門

厚朴大黃湯金匱　支飲胸滿者此方主之

厚朴一尺　大黃六兩　枳實四枚

右三味以水五升煮取二升分温再服

○此方与小承氣厚朴三物二湯藥味同但以分兩異其名六各異

葶藶大棗瀉肺湯金匱　支飲不得息此方主之　方見肺癰門

木防己湯金匱　膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脉沉緊得之數十日醫吐下之不愈此方主之

木防己三兩　石膏十二枚雞子大　桂枝二兩人參四兩

右四味以水六升煮取二升分温再服　虛者即愈實者去石膏加芒硝三合茯苓四兩名木防己加茯苓芒硝湯

小半夏湯金匱　心下有支飲者此方主之

痰飲

千金有橘皮方見下

半夏一升　生薑半斤

右二味以水七升煮取一升半分温再服　卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者加茯苓三兩名小半夏加茯苓湯

千金用干薑主干

○楊氏名水玉湯治嘔吐逆涎沫出者

巳椒　藶黄圓　金匱腹滿口舌乾燥此腸間有水氣此方主之

防巳　椒目　葶藶熬　大黄各一兩

右四味末之蜜丸梧子大（如）先食飲服一丸日三服稍增口中有津液渴者加芒消半兩

○千金名椒目圓

五苓散　金匱假令瘦人臍下有悸吐涎沫而癲眩此水也

青龍湯下已多唾口燥寸脉沉尺脉微手足厥逆氣從小腹上衝胸咽手足痺其面翕熱如醉狀因復下流陰股小便難時復冒与此方治其氣衝

桂苓五味甘草湯　金匱欬逆倚息不得臥小青龍湯主之

桂枝　茯苓四兩　甘草三兩　五味子半斤

右四味以水八升煮取三升去滓分温三服　衝氣即低而反更欬胸滿者去桂加乾薑細辛名苓甘五味薑

痰飲

辛湯 欬滿即止而更復渴衝氣復發者以細辛乾薑
為熱藥也服之當遂渴而渴反止者為支飲也支飲者
法當冒冒者必嘔嘔者復內半夏名桂苓五味甘草去
桂加乾薑細辛半夏湯 水去吐止其人形腫者加
杏仁半升名茯甘五味加薑辛半夏杏仁湯 若面熱如
醉此為胃熱上衝熏其面加大黃三兩名苓甘五味加
薑辛半杏大黃湯
茯苓飲 治心胸中有停痰宿水自吐出水後心
胸間虛氣滿不能食消痰氣令能食
茯苓 人參 白朮各三兩 枳實二兩
橘皮二兩半 生薑四兩
右六味水六升煮取一升八合分溫三服如人行八九
里進之
治腹中冷癖水穀癥結心下停痰宿脇痞滿按之鳴轉逆
害飲食肘後
大黃八兩 葶藶四兩並熬 芒消四兩令汁盡
熟搗蜜和丸如梧子大食後服三丸稍增五丸
小半夏湯 千金 治心腹虛冷遊痰氣上胃脇滿不下食噫
逆者
金匱小半夏湯有橘皮四兩

爽飲

右三味咬咀以水一斗煮取三升分三服若心中急痛
心痛內桂四兩若腹痛內當歸三兩羸弱及老人尤宜
服之一方用人參二兩
○宜与金匱所載併考
又方千金

半夏　生薑各一斤　桂心三兩　甘草一兩

右四味咬咀以水七升煮取二升半分三服
茯苓湯千金治胃膈痰滿方

茯苓甘草湯分兩不同無甘草有半夏

冷極者加大附子氣滿者加檳榔

○与嘔吐門千金半夏湯同但加減頗異
大半夏湯千金治痰冷澼飲胃膈中不理方

半夏茯苓湯分兩不同有白朮半夏人參附子

半夏湯千金治痰飲澼氣吞酸方

金匱小半夏湯分兩不同有吳茱萸附子

乾棗湯千金治腫及支滿澼飲方

十棗湯粉兩有大黃黃芩甘草莞花

咬咀水煎

治胃中痰飲腸中水鳴食不消嘔吐水方

金匱附方茯苓飲分兩不同無人參枳實有檳榔杏仁

夏

治胷膈心腹中痰水冷氣心下汪洋嘈煩或水鳴多唾口中清水自出脇肋急脹痛不欲食此皆胃氣弱受冷故也其脉喜沉弦細遲悉主之

半夏　生薑各五兩　芍藥三兩　茯苓四兩
旋復花　細辛　橘皮　桂心
人參　甘草　桔梗各二兩

右十一味咬咀以水一斗煮取三升分三服病先有時喜水下者用白朮三兩去旋復花若欲得利者加大黃二兩須微調者用乾地黃

○外臺引小品名半夏茯苓湯

千金注引胡洽風水化外台痰飲化治痰

水氣

越脾湯 金匱 風水惡水一身惡瞤脉浮不渴續自汗出無大熱此方主之

麻黃六兩　石膏半斤

甘草二兩　生薑三兩　大棗十五枚

右五味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升分溫三服惡風者加附子一枚炮風水加朮四兩

越婢加朮湯 金匱 裏水者一身面目黃瞤其脉沉小便不利故令病水假如小便自利此已津液故令渴也此方

水氣

水氣

屋之方即前条

防已黃耆湯 金匱 風水脉浮身重汗出惡風者此方主之
方見中風門 腹痛者加芍藥
防已茯苓湯 金匱 皮水為病四肢腫水氣在皮膚中四肢聶〻動者此方主之
防已 三兩 黃耆 三兩 桂枝 各三兩 茯苓 六兩
甘草 二兩
右五味以水六升煮取二升分温三服
枳朮湯 金匱 心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作此方主之
枳實 七枚 白朮 二兩
右二味以水五升煮取三升分温三服腹中耎即當散也
防已黃耆湯 金匱 附方 引外臺
治風水脉浮為在表其人或頭汗出無他病病者但下重從腰以上為和腰以下當腫及陰難以屈伸
方出中風門
治卒腫滿身面皆洪大方 肘後
大鯉一頭 醇酒三升
煮之令酒盡乾乃食之勿用醋及塩豉他物雜也不過三兩服差
治腫入腹苦滿急害飲食方 肘後
水氣

鯉魚一頭重五斤者 澤瀉五兩 茯苓三兩 桑根白皮切三升

以水二斗先煮魚取斗半去魚納諸藥煮取四升分四服之小便當利漸消也腫從脚起稍上進者入腹則殺人治之方肘後

小豆一斛煮令極爛得四五斗汁溫以漬膝已下日二為之數日消盡若已入腹者不復漬但煮小豆食之莫雜食飯及魚鹽又專飲小豆汁無小豆大豆亦可用如此之病十死一生急救之

○近日京醫和田某治水腫法不問虛實必禁啖飯及魚塩蓋原於此

治水病方肘後

白茅根一把大 小豆三升

水三升煮取乾去茅根食豆水隨小便下

○往歲縣川侯患水病遍身洪腫將至危篤或人進此方不數日而腫消病痊

烏頭湯 金匱 治脚氣疼痛不可屈伸 方出歷節風門

八味丸 金匱附方 引崔氏 治脚氣上入少腹不仁 方出虛勞門

越婢加朮湯 金匱 引千金方 治肉極熱則身體津脫腠理開汗大泄風氣下焦脚弱 方出氣門

脚氣腫已滿捏之沒指者 水

取牽牛子搗蜜丸如小豆大五丸取令小便利亦可

乃尒吞之

婢越湯 千金 治風痺脚弱方

即金匱越婢湯加朮附

小鼈甲湯千金治身體虛脹如微腫胷心痞滿有氣壯熱
小腹脅重兩脚弱方
鼈甲　黃芩
羚羊角　桂心
烏梅二十枚　薤白二十枚
右十味㕮咀以水一斗煮取二升七合分三服此常用
若體強壯欲須利者大黃二兩
犀角旋復花湯千金脚氣之痛先起嶺南稍来江東得之
無漸或微覺疼痺或兩脛腫滿或起澁弱或上入腹不
仁或時冷熱小便秘澁喘息氣衝喉氣急欲死食嘔不
下十氣上逆者皆其候也若覺此證先与此湯
犀角　旋復花兩各三
生薑各三兩　大棗七枚
香豉一升　紫蘇葉一握
右八味㕮咀以水八升煮取二升七合分三服相去十
里久服之以氣下小便利為度崔氏名小犀角湯加其
大犀角湯千金療脚氣毒衝心變成水身體遍腫悶絕欲
死方
犀角　旋復花
防己　黃芩
茯苓兩各二　香豉一升
脚氣

白朮　桂心
生薑　橘皮
桑白皮　柴胡兩各四

紫蘇莖葉一握 大棗十枚
右十四味㕮咀以水九升煮取二升七合分三服相去十里久取下氣為度若得氣不小便利腳腫即消飲食若服湯竟不食氣急不定仍服後犀角麻黃湯千金

犀角湯 代白朮無防己黃芩桑白皮名旋復花湯

犀角麻黃湯千金

犀角　麻黃
防己　芎藭
子　當歸
生薑　甘草

防風　獨活崔氏用茯苓
白朮　羚羊角崔氏用附
黃芩兩各二　石膏四兩
杏仁崔氏用細辛　桂心各三兩

右十五味㕮咀以水二斗煮麻黃去沫取八升下藁煎取三升分三服相去十里久服訖覆取汗若不瘥五日後更服一劑取汗同前

藁葍湯千金治脚氣入腹困悶欲死腹脹方蘇長史方

吳藁葍六升　木瓜一枚切
右二味以水一斗三升煮取三升分三服相去如人行十里久進一服或吐或汗或利或大熱悶即瘥此起死回生方

四物附子湯千金

即傷寒論甘草附子湯

方後云體腫者加防己四兩悸氣小便不利加茯苓三

帝既有附子令加生薑三兩
紫蘇子湯千金治脚弱上氣昔宋湘東王在南州患脚氣
困篤服此湯大得力方
紫蘇子　半夏各一升　前胡　厚朴
甘草　當歸各一兩　橘皮三兩　大棗
生薑二斤　桂心四兩
右十味㕮咀以水一斗三升煮取三升半分為五服日
三夜二
附子湯千金治濕痺緩風身體疼痛如欲折肉如錐刀刺割者
方

即傷寒論附子湯加桂心甘草各三兩
下氣湯千金方出胸痺心痛門
檳榔湯千金同上

○右二方出千金胸痺門後人治脚氣衝心用之立效
故揭目於此

滞下

治下雜血方 千金

乾藍　犀角　地榆各一兩　蜜二合

右四味㕮咀以水五升煮取一升半去滓下蜜煎取五合分三服此治熱毒蠱蝕

治熱毒下黑血五內絞切痛日夜百行氣絶欲死方 千金

黃連一升　龍骨　當歸　白朮各二　阿膠　乾薑　赤石脂各三　附子

右八味㕮咀以水一斗煮取五升分五服

治熱痢水穀方 千金

滞下

黄連　阿膠各二両
梔子三十枚　黄蘗一両　烏梅四十枚
右五味咬咀以水五升煮取二升半分三服亦治蟲神良

○外臺集驗名黄連阿膠湯　本書黄連湯治赤白痢方本方去烏梅梔子加當歸石榴皮甘草

温脾湯千金治下久赤白連年不止及霍亂脾胃冷實不消方

大黄四両　人參
附子一枚大者　甘草
乾薑各二両

右五味咬咀以水八升煮取二升半分三服臨熟下大黄與後温脾湯小異須大轉瀉者當用此方神效千金

温脾湯治積久冷熱赤白痢者方

大黄　桂心各三両
人參各二両　附子
乾薑

右五味咬咀以水七升煮取二升半分三服夕前温脾湯小異

駐車圓千金治大冷洞痢膿滑下赤白如魚腦日夜無慶節

慶腹痛不可堪忍者方

黄連六両　當歸
乾薑二両　阿膠各三両

右四味為末以八酢八合烊膠和之丸如大豆許
候乾大人飲服三十丸小兒百日以還三丸暮年者五
丸餘以意加減日三服
厚朴湯千金治參拾年久痢不止方

厚朴　乾薑
石榴皮　艾葉酌各三
右陸味㕮咀以水七升煮取二升分再服

椒艾圓千金治三拾年下痢所食之物皆不消化或青或
黃白腹沈重起即眩倒骨肉消盡兩足逆冷腹中熱苦
筋轉起止須拔陰冷無子方

蜀椒三百粒　烏梅二百枚　乾薑　熟艾一升
赤石脂二兩　乾薑三兩

右五味椒薑艾下篩梅著一斗米下蒸令飯熟去核內
薑椒末合擣三千杵蜜和丸梧子服十丸日三服不
瘥加至二十丸加黃連一升
烏梅圓千金治久痢諸藥不瘥數十年者消穀下氣補
虛方

烏梅肉　黃連
桂心二兩　當歸三兩　乾薑
右七味為末蜜丸如梧子食後服十丸日三　蜀椒　兩

呉茱萸各四兩

滯下

○三因無茱萸名川椒丸

又方治冷痢久下方 千金

即傷寒論烏梅圓

○傷寒論本方主久利三字玉函無因則此主治千金為始故標出

治大下後腹中空竭胸中虛滿不下食方 千金

芍藥　甘草　半夏各一兩　厚朴

當歸　桂心各三兩　生薑五兩

右七味㕮咀以水八升煮取三升分三服、三劑最佳

溫心湯 千金 治卒大下痢熱唇乾口燥嘔逆引飲方

半夏瀉心湯 方用無有同 去大棗加栝蔞根橘皮

右八味㕮咀以水六升煮取二升分三服 胡洽云治老小利水穀不化腹中雷鳴心下痞滿乾嘔不安無橘皮栝蔞苦寒加附子一枚渴加栝蔞根橘皮痛加當歸一兩嘔加生薑一兩仲景用大棗十三枚

虛勞

桂枝加龍骨牡蠣湯 金匱

髮落脉極虛芤遲清穀亡血失精 脉得諸芤動微緊
男子失精女子夢交此皆家火腹弦急陰頭寒目眩

即傷寒論桂枝湯加龍骨牡蠣各三兩

小建中湯 金匱虛勞裏急諸不足此湯主之

手足煩熱咽乾口燥此湯主之

黃耆建中湯 金匱虛勞裏急悸衄腹中痛夢失精四肢痠疼
即傷寒論小建中湯加黃耆一兩半 千金作三兩

氣短胸滿者加生薑腹滿者去棗加茯苓一兩半及瘡

肺虛損不足補加半夏三兩
○肘後小建中湯方後云加黃耆二兩人參一兩為佳深師加半夏一升人參二兩名黃耆湯治虛勞羸急寒拘引臍氣上衝短氣古今錄驗有乾薑三兩

黃耆湯

八味腎氣圓金匱虛勞腰痛少腹拘急小便不利者此圓主之

乾地黃八兩　薯蕷　山茱萸各四兩　澤瀉　茯苓　牡丹皮各三兩　桂枝　附子炮各一兩

右八味末之煉蜜和丸梧子大酒下十五丸加至廿五丸日再服

○肘後云長服即去附子加五味子千金元茱萸附子有半夏

酸棗湯金匱虛勞虛煩不得眠此湯主之

酸棗仁二升　甘草一兩　知母　茯苓　芎藭各二兩

右五味以水八升煮酸棗仁得六升內諸藥煮取三升分溫三服

酸棗湯千金治虛勞煩擾奔氣在胷中不得眠方

前方分兩異去芎藭加人參桂心生薑石膏

堅中湯千金治虛勞內傷寒熱嘔逆吐血方

糖三斤　芍藥　半夏　生薑

桂心二兩　大棗五十枚

右七味㕮咀以水二斗煮取七升分七服日五夜二千金

翼无甘草桂心有生地黃

○是傷寒論小建中湯加半夏者分兩大異故全抄之

半夏湯千金治肺勞虛寒心腹冷氣逆遊氣胸脇氣滿從胞達背痛憂氣往來嘔逆飲食即吐虛乏不足方

半夏一升　生薑一升　桂心四兩　厚朴　甘草各二兩　人參　橘皮　麥門冬各三兩

右八味㕮咀以水一斗煮取四升分四服腹痛加當歸二兩

竹葉黃芩湯千金治精極實熱眼視無明齒焦髮落形衰體痛通身虛熱方

竹葉切二升　黃芩　麥門冬　大黃各二兩　茯苓各三兩　甘草　生薑六兩　芍藥四兩

右九味㕮咀以水九升煮取三升去滓分三服

治五勞六極虛羸心驚胆弱多厭忘湯千金

桂枝湯方兩同　無生薑有干薑茯苓遠志人參

治虛勞少精方 千金

鹿角為末白蜜和丸如梧子大每服七丸日三服十日大效

三黃湯 千金 治骨極主腎熱病則勝脫不通大小便閉塞顏色枯黑耳鳴虛熱手足逆冷謂智承氣湯 分兩不同有黃芩梔子

○宜与秘結門千金三黃湯小腹急痛勝脫虛滿手足逆冷建中湯 千金 治五勞七傷食飲苦吐酸痰嘔逆泄下少氣目眩耳聾口焦小便自利方

膠飴半斤　黃蘗　乾薑　當歸各三兩

人參　半夏　橘皮　芍藥

甘草各二兩　附子一枚　大棗十五枚

右十一味咬咀以水一斗煮取三升半湯成下膠飴烊沸分四服 深師有桂心六兩生薑一斤無橘皮千薑

大建中湯 千金 治虛勞寒澼飲在脇下決ニ有聲飲已如從一邊下決ニ然也有頭並衝皮起引臍內痛裏急善夢失精氣短目眩ニ惚ニ多忘方

蜀椒二合　半夏一升　生薑一斤　甘草二兩

人參三兩　飴糖八兩

右六味㕮咀以水一斗煮取三升去滓内糖消服七合
裹急拘引加芍藥桂心三兩手足厥腰背冷加附子一
枚勞者加黃蘗一兩

諸氣

貝母湯千金治上氣咽喉窒塞短氣不得卧腰背痛胸滿
不得食面色萎方黃

貝母一兩　生薑五兩　桂心　麻黃
石膏　甘草各二兩　杏仁三十枚　半夏五合
右八味㕮咀以水一斗煮取三升分為三服日三

奔氣湯千金治大氣上奔胸腸中諸病發時迫滿短氣不
得卧劇者便悁欲死腹中冷濕氣腸鳴相逐成結氣方

生薑一斤　半夏　人參　甘草各二
吳茱萸各一斤　桂心五兩

右六味咬咀以水一斗煮取三升分四服

積聚

治心下有物大如杯不得食者肘後

葶藶熬　大黄各二兩　澤漆四兩

搗篩蜜丸和搗千杵服如梧子大二丸稍加至三丸

甘遂湯千金治羸堅久痞腹有堅者方

甘遂　黄芩　芒消　桂心

細辛各一兩　大黄三兩

右六味咬咀以水八升煮取二升半分三服

蟲病

甘草粉蜜湯 金匱 蚘蟲之為病令人吐涎心痛發作有時毒藥不止者此方主之

甘草二兩 粉一兩 蜜四兩

右三味以水三升先煮甘草取二升去滓內粉蜜攪令和煎如薄粥溫服一升差即止

烏梅圓 金匱 蚘厥者此方主之

治蟲心痛方 千金

鶴虱為末蜜和丸如梧子大服四十丸蜜湯下日一服可加至五十丸慎酒肉

咳嗽喘急

射干麻黄湯 金匱 效而上氣喉中水雞聲此湯主之

射干三兩　麻黄　生薑各四兩　細辛

紫菀　款冬花各三兩　五味子半升　大棗七枚

半夏半升

右九味以水一斗二升先煮麻黄兩沸去上沫內諸藥

煮取三升分温三服

厚朴麻黄湯 金匱 效而脉浮者此湯主之

厚朴五兩　麻黄四兩　石膏如雞子大　杏仁

細辛各二兩　小麥一升

半夏各半升　乾薑

五味子 半升

右九味以水一斗二升先煮小麥熟去滓內諸藥煮取三升溫服一升日三服

○千金治欬而大逆上氣胸滿喉中不利如水雞聲其脉浮者

麥門冬湯 金匱 大逆上氣咽喉不利止逆下氣者此湯主之

麥門冬七升 半夏一升 人參 甘草各二兩 粳米三合 大棗十二枚

右六味以水一斗二升煮取六升溫服一升日三夜一服

越脾加半夏湯 金匱 欬而上氣此為肺脹其人喘目如脫狀脉浮大者此湯主之

即金匱越婢湯 方出水腫門

小青龍加石膏湯 金匱 肺脹欬而上氣煩躁而喘脉浮者心下有水此湯主之

即傷寒論小青龍湯加石膏二兩

治卒乏氣不復報肩息方 肘後

即傷寒論麻黃湯是也

多冷者加乾薑三兩多痰者加半夏三兩

千金麻黃湯 千金用千金名麻黃

千金麻黃散治上氣欬喘為用

治卒得咳嗽方 肘後

以粉糖雜生薑屑蒸三斗米下食如彈子丸日夜十度服 千金用干薑末

甘草湯 千金 治虛羸悸衄氣欲絶方

甘草　五味子　生薑各二兩　人參一兩

吳茱萸一升

右五味咬咀以水四升煮茱萸令小沸去滓內藥煮取一升六合分二服、數劑佳

○此方千金載痼冷門余用治虛喘有效故收於此

海藻湯 千金 治數為下利胃中痞悶氣心中時悸四肢不欲動手足煩不欲食肩背痛時悪寒者即金匱茯甘五味加薑辛半夏杏仁湯方見痰飲門無甘草有海藻

一方無五味子生薑

治数嗽上氣方 千金

罌椒　桂心

海藻　乾薑

右八味為末蜜丸如梧子大飲服十丸加至五十丸日三服有人風虛中冷胸中滿上氣喉中如吹管聲吸氣上欲死服此方得瘥

海蛤分各四　昆布

細辛各六分　麥門冬十分

治欬嗽胸脇支滿多唾上氣方千金

薑汁一升半　砂糖五合

右二味煎薑汁減半內糖更煎服之

二味煎薑汁治欬嗽上氣方千金

生射干　款冬花各二兩　紫菀　細辛

甘草各二兩　白蜜

桑白皮　附子

竹瀝　飴糖五兩

生薑汁各一升一云薑五兩

右十一味以射干先內白蜜並竹瀝中煎五六沸去之

咬咀六物以水一升四合浸一宿煎七上七下去滓乃

合飴薑汁煎如餳服如醯棗一丸日三劑若夜二不知

加之以知為度

杏人煎千金治冷嗽上氣鼻中不利方

杏仁五合　五味子

乾薑各二兩　桂心三兩

右八味以水一斗煮麻黃取四升治諸藥為末又內膠

飴半斤白蜜一斤合內汁中攪令相得煎如飴先食服

如半棗許日三服不知加之以知為度

又方治忽暴嗽失聲語不出方千金

杏仁　薑汁

五味子　紫菀各二兩

砂糖　蜜各一

通草　貝母各四兩

桑根白皮五兩
右九味㕮咀以水九升煮取三升去滓內杏仁膠薑汁
蜜糖相攪微火煎取四升初服三合日再夜小後稍加

瘧疾

白虎加桂枝湯 金匱 溫瘧者其脉如平身無寒但熱骨節
疼煩時嘔此湯主之

即傷寒論白虎湯加桂枝三兩

柴胡桂枝乾薑湯 金匱附方 治瘧寒多微有熱或但寒不
熱

○外臺瘧門無見

夫瘧之且發也陰陽之且移也必從四肢始陽已傷
陰從之故氣未并先其時一食頃用左索緊其手
足十指令邪氣不得入陰氣不得出過時乃解 千金

千金

柴胡栝蔞湯 千金 治瘧而發渴者

柴胡四兩 栝蔞根三兩 去半夏加栝蔞根 分兩異

即傷寒論小柴胡湯 千金

治瘧或間日發者或夜發者方

恒山 竹葉各三兩 秫米一百粒 石膏

右四味咬咀以水八升銅器中漬藥露置星月下高淨處橫刀其上明日取藥於病人房中以銅器緩火煎取三升分三服清旦一服未發前一食頃一服臨發一服三服訖靜室中卧莫共人語當一日勿洗手面及嗽口勿進食取過時不發乃澡洗進食并日二升涂五忌

曾前頭面藥滓置頭邊當神驗 梅二七枚 甘

○外臺引崔氏名會稽賴公常山湯 圓甘竹葉糯米

按凡治瘧方露星月下者蓋此方為祖

嘔吐胃反

吳茱萸湯 金匱 嘔而胸滿者此方主之

半夏瀉心湯 金匱 嘔而腸鳴心下痞者此方主之

黄芩加半夏生薑湯 金匱 乾嘔而利者此方主之

小半夏湯 金匱 諸嘔吐穀不得下者此方主之 方見痰飲門

四逆湯 金匱 嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者難治此方主之

小柴胡湯 金匱 嘔而發熱者此方主之

大半夏湯 金匱 胃反嘔吐者此方主之

半夏二升 洗完用 人參三兩

白蜜一升

右三味以水一斗二升和蜜揚之二百四十遍煮葉取二升半温服一升餘分再服

〇千金有白朮一升生薑三兩大黄甘草湯金匱食已即吐者此方主之

大黄四兩　甘草一兩

右二味以水三升煮取一升分温再服

茯苓澤瀉湯金匱胃反吐而渴欲飲水此方主之

茯苓半斤　澤瀉四兩

白朮三兩　生薑四兩

右六味以水一斗煮取二升半温服八合日三服

〇千金无白朮有半夏茯苓澤瀉再半升半温

文蛤湯金匱吐後渴欲得水而貪飲者此方主之

文蛤五兩　麻黄

石膏五兩　杏仁五十箇

甘草　生薑各三兩

大枣十一枚

右七味以水六升煮取二升温服一升汗出即愈或信佉以

生薑半夏湯金匱胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦徹心中憒憒然無奈者此方主之

半夏半升　生薑汁一升

滑石代文蛤

嘔吐胃反

右二味以水三升煮半夏取二升內生薑汁煮取一升
小冷分四服日三夜一服止停後服

黃芩湯 金匱附方 引外臺 治乾嘔下利

黃芩 人參 乾薑各三兩 桂枝二兩

即傷寒論黃芩加半夏生薑湯去芍藥甘草生薑加
人參乾薑各三兩桂枝二兩

治胃虛反食下喉便吐方 千金

人參一兩 澤瀉 甘草 桂心各二兩
乾薑各三兩 茯苓四兩 大黃六兩 青竹茹五兩

右九味㕮咀以水八升煮取三升一服之合日三夜一
服利者去大黃

治胃反食即吐食上氣方 千金

蘆根 茅根各二斤 細切

右二味以水四升煮取二升頓服之

凡服湯嘔逆不入腹者 千金

先以甘草三兩水三升煮取二升服之得吐但服之
不吐益佳消息定然後服餘湯即流利便不吐也

半夏湯 千金 治逆氣心中煩悶氣滿嘔吐氣上方 一名小茯苓湯

茯苓甘草湯 分兩不同 無甘草有半夏

若少氣加甘草

小麥湯 千金 治嘔吐止方

嘔吐胃反

小麥一升　人參　茅朮各四兩　甘草一兩
青竹茹二兩半　生薑汁三合　茯苓三兩
右七味㕮咀以水八升煮取三升去滓分三服
治傷寒後噦乾嘔不下食方千金

生蘆根切一升　青竹茹一升　粳米三合　生薑二兩
右四味㕮咀以水四五升煮取二升半分三服不止服三劑

又方

前方無生薑竹茹有通草橘皮

乾嘔不止粥食湯藥皆吐不停灸手間使三十壯差小厭

脈沈絕不至者灸之通通

噦

橘皮湯 金匱 乾嘔噦手足厥者此方主之

橘皮 四兩　生薑 半斤

右二味以水七升煮取三升温服一升下咽即愈

橘皮竹茹湯 金匱 噦逆者此方主之

橘皮二斤　竹茹二升　大棗三十枚　生薑半斤

甘草五兩　人參一兩

右六味以水一斗煮取三升温服一升日三服 信怙或以竹瀝代竹茹奏効頗捷

治春夏時行傷寒傷於胃冷變噦方 千金

橘皮　桂心　葛根各二　白茅根一升

右四味㕮咀以水六升煮取三升分三服数進服盡更
合有熱去桂

噫氣吞酸饋雜吐酸

治人食畢噫醋及醋心方肘後
即傷寒論吳茱萸湯是也

霍亂

五苓散　霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者此湯主之

理中湯　霍亂頭痛發熱身疼痛寒多不用水者此湯主之

治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下方肘後

塩二升

以水五升煮取二升頓服得吐愈

又方

取蓼若葉細切二升水五升煮三沸頓服煮乾蘇菜若

葉藇汁即六佳

四順湯肘後治吐下腹痛嘔手足冷不止

乾薑　甘草　人參　附子各二兩

水六升煮取三升半分為三服若下不止加龍骨一兩

腹痛甚加當歸二兩

厚朴湯肘後治煩嘔腹脹

厚朴四兩炙　桂二兩　枳實五枚炙　生薑三兩

以水六升煮取二升分為三服

黃疸

茵蔯蒿湯金匱穀疸之為病寒熱不食食即頭眩心胸不安久久發黃為穀疸此方主之

茵蔯蒿六兩　梔子十四枚　大黃二兩

右三味以水一斗先煮茵蔯減六升內二味煮取三升去滓分溫三服小便當利尿如皂角汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去也

梔子大黃湯金匱酒黃疸心中懊憹或熱痛此方主之

梔子十四枚　大黃一兩　枳實五枚　豉一升

右四味以水六升煮取二升分溫三服

茵蔯五苓散 金匱 黄疸病此方主之

茵蔯蒿末十分 五苓散五分

右二味和先食飲方寸匕日三服

大黄消石湯 金匱 黄疸腹滿小便不利而赤自汗出此為表和裏實當下之宜此方

大黄 黄蘗 消石 各四兩 梔子十五枚

右四味以水六升煮取二升去滓内消更煮取一升頓服

小柴胡湯 金匱 諸黄腹痛而嘔者宜此方

○程雲来云是當大柴胡湯

小建中湯 金匱 男子黄小便自利當与此湯

桂枝加黄耆湯 金匱 諸病黄家但利其小便假令脉浮當以汗解方

即傷寒論桂枝湯加黄耆五兩

大黄圓 千金 治黄疸方

大黄 葶藶子 各二兩

右二味為末蜜和丸如梧子大未食服十丸日三病瘥止

茵蔯湯 千金 治黄疸身體面目盡黄方

茵蔯 黄連 各三兩 黄芩二兩 大黄

甘草　人參各一兩　梔子二十七枚

右七味㕮咀以水一斗煮取三升分三服日三亦治酒疸酒癖

三黃散千金治同前

大黃　黃連　黃芩各四兩

右三味治下篩先食服方寸匕日三亦可為丸

五苓散千金治黃疸利小便方

治發黃身面悉黃如金色小便如濃煮藥汁衆醫不能療者方千金

茵蔯　梔子各四兩　黃芩　大黃

紫胡　升麻各三兩　龍膽二兩

右七味㕮咀以水八升煮取二升七合分三服若身體羸去大黃加梔子人五六兩生地黃一升

子四兩栝蔞三兩芒消二兩近効方加枳實二兩

注疽手秘錄无茵蔯有梔

治發黃方千金

茵陳　黃蘗

黃連二兩　梔子　大黃各三兩

右五味㕮咀以水九升煮取三升分三服先服湯後服丸方

大黃五兩　茵蔯　梔子各三兩　黃芩

黄蘗　黄連各二兩

右六味為末以蜜丸如梧子大白飲服二十丸令微利治急黄熱氣骨蒸目赤脉方千金

芒消一兩　大黄一兩半末　生地黄汁八合

右三味合和一服五合日二以利為度不須二服

茯苓圓千金　治心下縱横堅而小便赤是酒疸者方

茯苓　菌蕈　乾薑各一兩　白朮熬

枳實各三十銖　半夏

蜀椒　當歸各十二銖

右十味為末蜜和丸如梧子大空腹飲之漸加以小便利為度千金　日三稍三

黄疸之為病日晡所發熱惡寒小腹急身體黄煩黑大便溏黑足下熱此為女勞腹滿者難治三之方千金

滑石　石膏各等分

右二味治下篩以大麥粥汁服方寸匕七日三小便極利則瘥