芟婦齋要方


木

-241

F 2
カ-91

T505

東京帝国大学



490.9
K2-15
3

No.2885
旧K241

慶應義塾大学医学情報センター
昭和47年7月4日

富士川文庫

1504

傷寒

桂枝湯　太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者
汗自出嗇〻悪寒淅〻悪風翕〻發熱鼻鳴乾嘔者此
湯主之

桂枝三両　芍藥三両
大棗十二枚　甘草二両炙　生薑三両

右五味咬咀以水七升微火煮取三升去滓適寒温服
一升服已須臾歠熱稀粥一升餘以助藥力温覆令一
時許遍身漐〻微似有汗者益佳不可令如水流漓病
不必除若一服汗出病瘥停後服不必盡劑若不汗更

服依前法又不汗後服小促其間半日許令三服盡若
病重者一日一夜服周時觀之服一劑盡病證猶在者
更作服若汗不出乃服至二三劑禁生冷粘滑肉麪五
辛酒酪及臭惡等物

桂枝加附子湯　太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便
難四肢微急難以屈伸此湯主之

桂枝湯原方加附子一枚炮去皮破八片右六味以水七升煮
取三升去滓温服一升

桂枝加桂湯　燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發
奔豚氣從小腹上衝心者灸其核上各一壯与此湯

桂枝湯原方加桂二兩右五味以水七升煮取三升
去滓温服一升

桂枝去芍藥湯　太陽病下之後脉促胸滿者此湯主之

若微惡寒者去芍藥方中加附子湯主之

桂枝湯原方去芍藥右四味以水七升煮取三升温
服一升

桂枝去芍藥加附子湯

即前方加附子一枚炮去皮破八片餘依前方法

桂枝加厚朴杏子湯　太陽病下之微喘者表未解也故也
此湯主之

桂枝湯原方加厚朴二兩去皮炙杏子五十枚去皮炙右七味以水七升微火煮取三升溫服一升覆取微似汗

小建中湯　傷寒陽脉濇陰脉弦法當腹中急痛先与此湯不差者与小柴胡湯主之

桂枝湯原方加膠飴一升右六味以水七升煮取三升去滓納飴更上微火消解溫服一升日三服嘔家不可用建中湯以甜故也

桂枝加芍藥生薑人參新加湯　發汗後身疼痛脉沉遲此湯主之

桂枝湯原方芍藥生薑各增一兩加人參三兩右六味以水一斗二升煮取三升去滓溫服一升

桂枝甘草湯　發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者此湯主之

桂枝四兩去皮　甘草二兩炙

右二味以水三升煮取一升頓服

茯苓桂枝甘草大棗湯　發汗後其人臍下悸者欲作奔豚此湯主之

茯苓半斤　桂枝四兩　甘草二兩炙　大棗十二枚

右四味以甘爛水一斗先煮茯苓減二升內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

桂枝麻黄各半湯　太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便欲自可一日二三度發脉微緩者為欲愈也脉微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解也以其不小汗出身必痒宜服此湯

桂枝一兩十六銖　芍藥　生薑　甘草炙
麻黄去節各一兩　杏仁二十四枚去皮及雙仁者　大棗四枚

右七味以水五升先煮麻黄一二沸去上沫內諸藥煮取一升八合去滓溫服六合一云桂枝湯三合麻黄湯三合頓服將息如上法

桂枝二麻黄一湯　服桂枝湯大汗出脉洪大者与桂枝湯如前方若形如瘧日再發者汗出必解此湯主之

桂枝一兩十六銖　芍藥一兩六銖　甘草一兩二銖　杏仁十六枚去皮尖
麻黄十六銖去節　生薑一兩六銖　大棗五枚

右七味以水五升先煮麻黄一二沸去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服一升日再服一本云桂枝湯二升麻黄湯一升合為三升分再服

桂枝二越婢一湯　太陽病發熱惡寒熱多寒少脉微弱者此無陽也不可更汗

桂枝　芍藥　甘草　麻黄去節各十八銖

大棗四枚　生薑一兩二銖　石膏二十四銖碎綿裹

右七味以水五升煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服一升、

桂枝去桂加茯苓白朮湯　服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者此湯主之

芍藥三兩　甘草二兩炙　生薑　茯苓

白朮各三兩　大棗十二枚

右六味以水八升煮取三升去滓溫服一升小便利則愈

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯　傷寒脉浮鬱以

火迫劫之亡陽必驚狂起臥不安者此湯主之

桂枝湯原方去芍藥加蜀漆三兩洗去腥　牡蠣五兩熬　龍骨四兩

右七味以水一斗先煮蜀漆減二升內諸藥煮取三升去滓溫服一升、

桂枝甘草龍骨牡蠣湯　火逆下之因燒針煩躁者此湯主之

桂枝一兩　甘草二兩炙　牡蠣二兩熬　龍骨二兩

右四味以水五升煮取二升半去滓溫服八合日三服

桂枝加葛根湯　太陽病項背几〻反汗出惡風者此湯

桂枝湯原方加葛根四兩桂枝芍藥各減一兩餘同
右六味以水一斗先煮葛根減二升去上沫內諸藥
煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜粥
桂枝加芍藥湯　本太陽病醫反下之因而腹滿時痛屬太
陰也此湯主之大實痛者桂枝加大黃湯主之
桂枝湯原方加芍藥加倍右五味以水七升煮取三
升溫服一升日三服
桂枝加大黃湯
桂枝湯原方加大黃一兩芍藥一倍右六味以水七
升煮取三升去滓溫服一升日三服

傷寒
麻黃湯　太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛風寒無
汗而喘者
麻黃三兩去節　桂枝二兩　甘草一兩炙　杏仁七十個去皮尖
右四味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮
取二升半去滓溫服八合覆取微似汗不須啜粥餘如
桂枝將息法
麻黃杏仁甘草石膏湯　汗下後並不可更行桂枝湯汗
出而喘無大熱者可与此湯
麻黃四兩去節　杏仁五十個去皮尖　甘草二兩炙　石膏半斤碎綿裹

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮
取二升去滓溫服一升
大青龍湯　太陽中風脉浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出
而煩燥者此湯主之若脉微弱汗出惡風者不可服：
之則厥逆筋惕肉瞤此為逆也

麻黃六兩去節　桂枝二兩　杏仁四十枚去皮尖
生薑三兩切　大棗十二枚　甘草二兩炙　石膏碎如雞子大一塊

右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮
取三升去滓溫服一升取微似汗：出多者溫粉撲之
一服汗者停後服汗多亡陽遂虛惡風煩燥不得眠也

小青龍湯　傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而咳或
渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘者此湯主之

麻黃去節　芍藥　甘草　桂枝去皮各三兩　五味子半升　半夏半升洗
細辛　乾薑

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮
取三升去滓溫服若渴者去半夏加栝蔞根三兩若噎者
熬令赤色　若渴者去半夏加栝蔞根三兩若噎者
去麻黃加附子一枚炮若小便不利少腹滿去麻黃加
茯苓四兩若喘者去麻黃加杏仁半升去皮尖

麻黃附子細辛湯　少陰病始得之反發熱脉沉者此湯

主之

麻黄去節二兩　細辛二兩　附子一枚炮

右三味先煮麻黄減二升去上沫内諸藥煮取三升去
滓温服一升日三服

麻黄附子甘草湯　少陰病得之二三日此湯微發汗以
二三日無裡症故微發汗也

麻黄去節甘草炙各二兩　附子一枚炮

右三味以水七升先煮麻黄一兩沸去上沫内諸藥煮
取三升去滓温服一升日三服

傷寒

葛根湯　太陽病項背強几二無汗惡風
必自下利並此湯主之

葛根四兩　麻黄三兩去節　芍藥二兩　生薑三兩切
甘草炙　桂枝去皮各二兩　大棗十二枚

右七味以水一斗先煮麻黄葛根減二升去上沫内諸
藥煮取三升去滓温服一升覆取微似汗不須啜粥餘
如桂枝法將息及禁忌

葛根黄芩黄連湯　太陽病桂枝證醫反下之利遂不止
脉促者表未解也喘而汗出者此湯主之

葛根半斤　甘草二両炙
黄芩　黄連各三両
右四味以水八升先煮葛根減二升内諸藥煮取二升
去滓分温再服

葛根加半夏湯　太陽与陽明合病不下利但嘔者此湯
主之

葛根湯原方加半夏半升洗煎服法同

小柴胡湯　傷寒五六日中風往来寒熱胸脇苦滿默ミ
不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛
或脇下痞鞕或心下悸小便不利或不渴身有微熱或
欬者此湯主之

柴胡半斤　黄芩　人参　甘草炙
生薑各三両　半夏半斤
大棗十二枚

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升温
服一升日三服　若胸中煩而不嘔者去半夏人参加
栝蔞實一枚若渴者去半夏加人参合前成四両半栝

婁根四兩若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩若脇下痞
鞕去大棗加牡蠣四兩若心下悸小便不利者去黃芩
加茯苓四兩若不渴外有微熱者去人參加桂枝三兩
温覆取微似汗愈若欬者去人參大棗生薑加五味半
升乾薑二兩

大柴胡湯　傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱与此湯
傷寒發熱汗出不解心中痞鞕嘔吐而下痢者此湯主
之　傷寒後脉沉ニ者内實也下解之宜此湯

柴胡　半夏各半　芍藥各三兩
生薑五兩　黃芩　大棗十二枚
枳實四枚

右七味以水一斗二升煮取六升再煎取三升温服一
升日三服　此方本有大黃二兩王叔和云若不加大
黃恐不為大柴胡也

柴胡桂枝湯　傷寒六七日發熱微悪寒支節疼煩微嘔
心下支結外證未去者此湯主之　發汗多亡陽譫語
者不可下与此湯和其營衛以通津液自愈

柴胡四兩　黃芩　人參　桂枝
芍藥　生薑各一兩半　半夏二合半　甘草一兩炙
大棗六枚

右九味水七升煮取三升去滓温服一升

柴胡加龍骨牡蠣湯　傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語一身盡重不能轉側者此湯主之

柴胡　龍骨　生薑　人參　茯苓　黃芩　鉛丹　牡蠣　桂枝兩各一半　半夏二合　大棗六枚　大黃二兩

右十二味以水八升煮取四升內大黃更煮一二沸去滓溫服一升

柴胡桂枝乾薑湯　傷寒五六日下之胸滿復下之胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心下煩者此未解也此湯主之

柴胡半斤　桂枝　黃芩各三兩　乾薑　牡蠣熬　甘草各二兩　括蔞根四兩

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服初服微煩復服汗出便愈

柴胡加芒硝湯　傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡所發潮熱已者實也先宜小柴胡湯以解外後以此湯主之

柴胡二兩十六銖　黃芩　人參　甘草各一兩　生薑各一兩　半夏二十錄　大棗四枚　芒消二兩

右八味以水四升煮取去滓內芒硝更煮微沸分溫再

温再服不解更作

傷寒

梔子豉湯　發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹此湯吐之

梔子十四枚　香豉四合綿裹

右二味以水四升先煮梔子得二升半內豉煮取升半去滓分為二服溫進一服得吐止後服

○張志聰云一服得吐止後服七字此因从蒂散中有香豉而誤傳於此也蓋梔子苦能下洩以清在內之欝熱香豉甘能發散以發陰液為微汗以散在外之身熱

梔子甘草豉湯　凡用梔子湯病人舊微溏者可与服之若小氣者此湯主之若嘔者梔子生薑豉湯主之

梔子湯原方加甘草二兩炙右三味以水四升先煮梔子甘草取二升半內豉煮取升半分二服溫一服得吐便止

梔子生薑豉湯

梔子湯原方加生薑五兩先煮梔子生薑餘俱如前法得吐止後服

梔子乾薑湯　傷寒醫以丸藥下之身熱不去微煩此湯主之

梔子十四枚　乾薑二兩

右二味以水三升半煮取一升半去滓分二服溫進一服得吐止後服

梔子厚朴枳實湯　傷寒下後心煩腹滿臥起不安者此湯主之

梔子十四枚　厚朴四兩薑炙　枳實四枚水浸去穰

煮服法同前

梔子蘗皮湯　傷寒身黃發熱者此湯主之

梔子十五枚　甘草一兩　黃蘗二兩

右三味以水四升煮取升半去滓分温再服

枳實梔子頭湯　大病差後勞復者此湯主之

枳實三枚　梔子十四枚

右三味以清漿水七升空煮取四升內枳實梔子煮取二升下豉更煮五六沸去滓分温再服覆令微似汗若有宿食者加大黃如博棋子大五六枚

傷寒

大承氣湯　陽明病讝語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎五六枚若能食者但鞕尒宜大承下之　少陰病自利清水色純青心下必痛口乾燥者急下之宜此湯

大黃四兩酒洗　厚朴半斤去皮　枳實五枚炙　芒硝三合

右四味以水一斗先煮厚朴枳實取五升去滓內大黃煮取二升去滓內硝更上微火一兩沸分温再服得下餘分服

小承氣湯　太陽病若吐若下若發汗後微煩小便數大便因鞕者此湯和之愈　陽明病其人多汗以津液外

出胃中燥大便必鞕〻則譫語此湯主之若一服譫語止更莫復服

枳實三枚
大黄四両 厚朴二両

右三味以水四升煮取一升二合去渣分温二服初服湯當更衣不尓者盡飲之若更衣勿服

調胃承氣湯　太陽病三日發汗不解蒸〻發熱者属胃也此湯主之　太陽病過経十餘日心下温〻欲吐而胸中痛大便反溏腹滿鬱〻微煩先其時自極吐下者与調胃承氣湯

大黄四両去皮
甘草二両炙
芒硝半升

右三味以水三升先煮大黄甘草取一升去渣内芒硝更上火微煮令沸少〻温服之

桃核承氣湯　太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外不解者尚未可攻當先解外宜桂枝湯外解已但小腹急結者乃可攻之宜此湯

桃仁五十個去皮尖
大黄四両
甘草二両
芒硝半升
桂枝一

右五味以水七升煮取二升半去滓内芒硝更上火微沸下火先令温服五合日三服當微利

抵當湯　太陽病身黄脉沈結少腹鞕小便不利者為無

血也小便自利其人如狂者血證諦也此湯主之　陽明證其人喜忘者必有蓄血所以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖鞕大便反易其色必黑宜抵當湯下之

水蛭 熬　蝱蟲去翅足熬各三十六個　桃仁去皮尖二十個　大黃三兩酒浸

右四味以水五升煮取三升去渣溫服一升不下再服

抵當丸　傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也當下之不可餘藥宜此丸

水蛭 熬　蝱蟲去翅足熬各二十個　桃仁去皮尖三十五個　大黃三兩酒洗

右四味搗分為四丸以水一升煮一丸取七合服瞑時當下血不下更服

十棗湯　太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人漐漐汗出發作有時頭痛心下痞鞕滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裡未和也此湯主之

芫花 熬　甘遂　大戟 等分　大棗十枚

右三味各別搗為散以水一升半先煮大棗肥者取八合去滓內藥末強人服一錢羸人服半錢得快下利後糜粥自養平旦溫服若下少病不除者明日更服

大陷胸湯　傷寒六七日結胸熱實脉沈而緊心下痛按

之石鞭者此湯主之

大黄去皮 芒硝一升 甘遂一錢七

右三味以水六升先煮大黄取二升去滓内芒硝煮一
兩沸内甘遂末温服一升得快利止後服

大陷胸丸 結胸者項亦強如柔痙狀下之則和宜此丸

大黄半斤 葶藶子熬 芒硝 杏仁各半升去皮尖
熬黑

右四味擣篩二味内杏仁芒硝合研如脂和散取如彈
丸一枚別擣甘遂末一錢七白蜜二合水二升煮取一
升温頓服之一宿乃下如不下更服取下為效

小陷胸湯 小結胸病正在心下按之則痛脉浮滑者此
湯主之

黄連一兩 半夏半升洗 括蔞實大者一枚

右三味以水六升先煮括蔞取三升去滓内諸藥煮二
二升去滓分温三服一服未和再服微絲下黄涎便安
也

白散 寒實結胸無熱證者与三物小陷胸湯白散六可
用

桔梗 貝母 錢各三分古法二
黒研如膏 五分為一分

巴豆一分去皮心熬

右三味為散內巴豆更於臼中杵之以白飲和服強人服半錢七贏者減之病在膈上必吐膈下必利不利進熱粥一杯利過不止進冷粥一盃身熱皮粟不解欲引衣自覆者若以水潠之洗之益令熱却不得出當汗而不汗則煩假令汗出已腹中痛与芍藥三兩如上法

○徐大椿曰按活人書云与三物白散无小陷胸湯六可用七字蓋小陷胸寒劑非無熱之所宜也

麻仁丸　跌陽脉浮而濇浮則胃氣強濇則小便數浮濇相搏大便則難其脾為約此丸主之

麻子仁二升芍藥　枳實各半升　大黃

厚朴　杏仁各一升別研作泔皮尖脂

右六味為末煉蜜和丸如梧桐子大飲服十丸漸加以知為度

傷寒

生薑瀉心湯　傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞕乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利此湯主之

生薑四兩　甘草炙　人參　黃芩各三兩　乾薑各一兩　大棗十二枚　半夏半升　黃連

右八味以水一斗煮取六升去滓煎取三升溫服一升日三服

甘草瀉心湯　傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞕而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非熱結但以

胃中虛客氣上逆故使鞕也此湯主之

甘草四兩炙　黃芩　乾薑各三兩　半夏半升

黃連一兩　大棗十二枚

右六味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

半夏瀉心湯　傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復与柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心滿而不痛者此為痞柴胡不中与之宜此湯

半夏半升　黃芩　乾薑　甘草炙

人參　乾薑各三兩　黃連一兩　大棗十二枚

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

大黃黃連瀉心湯　脉浮而緊而復下之緊反入裡則作痞按之自濡但氣痞耳心下痞按之濡其關上浮者此湯主之

大黃二兩　黃連一兩

右二味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分溫再服

附子瀉心湯　心下痞而復惡寒汗出者此湯主之

大黃二兩酒浸　黃連炒　黃芩炒各一兩　附子一枚去皮別煮

取頭汁

右四味切三味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓內附子汁分温再服

黃連湯　傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者

黃連　甘草炙　乾薑　桂枝去皮各三兩　人參二兩　半夏半升　大棗十二枚

右七味以水一斗煮取六升去滓温服一升日三夜二服

黃芩湯　太陽与少陽合病自下利者与此湯若嘔者黃芩加半夏生薑湯主之

黃芩三兩　甘草炙　芍藥各二兩　大棗十二枚

右四味以水一斗煮取三升去滓温服一升日再夜一服

黃芩加半夏生薑湯

即前方加半升生薑三兩　餘依前法

乾薑黃連黃芩人參湯　傷寒本自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口即吐此湯主之

乾薑　黃連　黃芩　人參各三兩

右四味以水六升煮取二升去滓分温再服

旋復花代赭石湯　傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞕
噫氣不除此湯主之
旋覆花三兩　人參二兩　生薑五兩　甘草三兩炙
半夏半升代赭石一兩　大棗十二枚
右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一
升日三服
厚朴生薑甘草半夏人參湯　發汗後腹脹滿者此湯主之
厚朴半斤炙去皮　生薑半斤炙　甘草二兩
人參一兩　半夏半升洗
右五味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三服

傷寒

白虎湯　傷寒脉滑而厥者裏有熱也此湯主之

知母六両　石膏一斤　甘草二両炙　粳米六合

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓温服一升日三服

白虎加人參湯　服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脉洪大者　傷寒若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者

此湯主之

白虎湯原方加人參三両　煮服同前法

竹葉石膏湯　傷寒解後虚羸少氣氣逆欲吐者此湯主

之

竹葉二把　石膏一斤　半夏半升　人參三兩
麥門冬一斤　甘草二兩　粳米半升
右七味以水一斗煮取六升去滓內粳米煮米熟湯成
去米溫服一升日三服

傷寒

五苓散　中風發熱六七日不解而煩有表裡證渴欲水
水入則吐者名曰水逆此湯主之多飲暖水汗出愈
未以下之故心下痞与瀉心湯痞不解其人渴而口燥
煩小便不利者此湯主之
猪苓十八銖去皮　澤瀉一兩六銖　白朮十八銖　茯苓十八銖
桂枝半兩去皮
右五味為末以白飲和服方寸匕日三服多飲暖水汗
出愈

猪苓湯　陽明病若脉浮發熱渴欲飲水小便不利者

火陰病下利六七日咳而嘔渴心煩不得眠者並此湯主之

猪苓去皮　茯苓　阿膠各一兩　澤瀉　滑石碎

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內阿膠烊消温服七合日三

文蛤散　病在陽應以汗解之反以冷水潠之若潅之其熱被却不得去弥更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服此湯若不差者与五苓散

文蛤五兩

右一味為散以沸湯和一方寸匕服湯用五合

茯苓甘草湯　傷寒厥而心下悸者宜先治水當服此湯却治其厥不尓水漬入胃必作利也

茯苓二兩　桂枝去皮二兩　甘草炙一兩　生薑三兩

右四味以水四升煮取二升分温三服

傷寒

四逆湯　吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者此湯主之

既吐且利小便復利而大汗出下利清穀內寒外熱脉微欲絶者並此湯主之

甘草二兩炙　乾薑一兩半　附子一枚生用去皮破八片

右三味以水三升煮取一升二合分温再服強人可大之

四逆加人參湯　悪寒脉微而復利利止亡血也此湯主之

四逆湯原方加人參一兩煎服法同

通脉四逆湯　少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脉微欲絶身反不惡寒其人面色赤或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脉不出者此湯主之其脉即出者愈

甘草二兩炙　乾薑三兩強人四兩　附子一枚生用

右三味以水三升煮取一升二合去滓温再服其脉即出者愈　面色赤者加葱九莖　腹中痛者去葱加芍藥二兩　嘔者加生薑二兩　咽痛者去芍藥加桔梗一兩　利止脉不出者去桔梗加人參二兩

通脉四逆加猪膽汁湯　吐已下斷汁出而厥四肢拘急不解脉微欲絶者此湯主之

通脉四逆原方加猪膽汁半合煎如前法煎成內猪膽汁温服其脉即出

乾薑附子湯　下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脉沈微身無大熱者此湯主之

乾薑一兩　附子一枚生用去皮切八片

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

白通湯　少陰病下利此湯主之

乾薑附子湯原方加葱白四莖煎服法照前

白通加猪膽汁湯　少陰下利脉微者与白通湯利不止厥逆無脉乾嘔煩者此湯主之服湯脉暴出者死微續

者生

白通湯原方加人尿五合猪膝汁一合

右三味以水三升煮取一升去滓内膝汁人尿和令相得分温再服無膝汁亦可

茯苓四逆湯　發汗若吐之病仍不解煩躁者此湯主之

茯苓四兩　人參一兩　附子一枚生用　甘草二兩炙　乾薑一兩半

右五味以水五升煮取三升去滓温服七合日三服

四逆散　少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者此散主之

甘草炙　枳實　柴胡　芍藥

右四味各十分搗篩白飲和服方寸匕七日三服　欬者加五味子乾薑各五分并主下利　悸者加桂枝五分小便不利者加茯苓　腹中痛者加附子一枚炮令拆泄利下重者先以水五升煮薤白取三升去滓以散方寸匕内湯中煮取一升半分温再服　五分

當歸四逆湯　手足厥寒脉細欲絶者此湯主之若其人内有久寒者宜當歸四逆加吳茱萸生薑湯主之

當歸　芍藥　桂枝　細辛各三兩　甘草　通草各二兩　大棗二十五枚

右七味以水八升煮取三升温服一升日三服

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

當歸　甘草　通草各二兩　芍藥
桂枝　細辛各三兩　大棗二十五枚　吳茱萸二升
生薑半斤

右九味以水六升清酒六升和煮取五升去渣分温五服

傷寒

理中丸　大病差後喜唾久不了胃上有寒當以丸藥
理之宜此丸

人參　甘草
白朮　乾薑各三兩

右四味搗篩為末蜜和為丸如雞子大黃以沸湯數合
和一丸研碎温服之日三四服夜二服腹中未熱益至
三四丸然不及湯方法以四物依兩數切用水八升煮
取三升去渣温服一升日三服　若臍上築者腎氣動
也去朮加桂四兩　吐多者去朮加生薑三兩　下多
者還用朮　悸者加茯苓二兩　渴欲飲水者加朮足

前成四兩半　腹中痛者加人參足前成四兩半　寒者加乾薑足前成四兩半　腹滿者去朮加附子一枚服湯後如食頃飲熱粥一升許微自温勿揭衣被

真武湯　太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地者　少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沈重疼痛自下利者此為有水氣其人或咳或小便利或下利或嘔者並此湯主之

茯苓　芍藥　生薑各三兩　白朮二兩　附子一枚炮

右五味以水五升煮取三升去滓温服七合日三服

若嘿者加五味子半升細辛乾薑各一兩若小便利者去茯苓若下利者去芍藥加乾薑二兩若嘔者去附子加生薑足前成半斤

附子湯　少陰病身體疼手足寒骨節痛脉沈者此湯主之

附子二枚炮　茯苓三兩　人參二兩　白朮四兩　芍藥三兩

右五味以水八升煮取三升去滓温服一升日三服

甘草附子湯　風濕相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫

者此湯主之

甘草二兩炙　白朮二兩　桂枝四兩　附子二枚炮

右四味以水六升煮取三升去滓溫服一升日三服初服得微汗則解能食汗出復煩者服五合恐一升多者服六七合為始

桂枝附子湯　傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉側不嘔不渴脉虛浮而濇者此湯主之若其人大便鞕小便自利者去桂加白朮湯主之

桂枝四兩　附子三枚炮去皮切八片　甘草二兩　生薑　大棗十二枚

右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服

桂枝附子去桂加白朮湯

白朮四兩　甘草二兩　大棗十二枚　附子三枚炮　生薑三枚

右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服初服其人身如痺半日許復服之三服盡其人如冒狀勿怪此以附朮併走皮內逐水氣未得除故使之耳法當加桂四兩此本一方二法以大便鞕小便自利去桂也以大便鞕小便不利當加桂附子三枚恐多也虛弱家及產婦宜減服之

茯苓桂枝白朮甘草湯　傷寒若吐若下後心下逆滿氣
上衝胸起則頭眩脉沉緊發汗則動經身為振〻搖者
此湯主之
茯苓四兩　桂枝三兩去皮　白朮　甘草各二兩
右四味以水六升煮取三升去滓分温三服

芍藥甘草附子湯　發汗病不解反惡寒者虛故也此湯
主之
芍藥　甘草各三兩　附子一枚炮去皮破八片
右三味以水五升煮取一升五合去滓分温三服

桂枝人參湯　太陽病外證未除而數下之遂協熱而利
利下不止心下痞鞕表裏不解此湯主之
桂枝　甘草各四兩炙　白朮　人參各三兩　乾薑三兩
右五味以水九升先煮四味取五升内桂更煮取三升
去滓温服一升日再夜一服

傷寒

赤石脂禹餘糧湯　傷寒服湯藥下利不止心下痞鞕服瀉心湯已復以他藥下之利不止醫以理中与之利益甚理中者理中焦也此利在下焦此湯主之復利不止當利其小便

赤石脂　禹餘糧　各一斤

右二味以水六升煮取二升去滓分温三服

炙甘草湯　傷寒脉結代心動悸此湯主之

甘草四兩炙　生薑三兩　人參二兩　生地黃一斤
桂枝三兩　麥門冬半斤　阿膠二兩　麻仁半斤

大棗三十枚

右九味以清酒七升水八升先煮八味取三升去滓内膠烊盡温服一升日三服一名復脉湯

甘草乾薑湯　傷寒脉浮自汗出小便数心煩微悪寒脚攣急反与桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者作此湯与之以復其陽若厥愈足温者更芍藥甘草湯与之其脚即伸

甘草四兩炙　乾薑二兩炮

右二味以水三升煮取一升五合去滓分温再服

芍藥甘草湯

芍藥四兩　甘草四兩

右二味以水三升煮取一升五合去滓分温再服

茵陳蒿湯　傷寒七八日身黄如橘子色小便不利腹微滿者此湯主之

茵陳蒿六兩　梔子十四枚　大黄二兩

右三味以水一斗先煮茵陳減六升内二味煮取三升去滓分温三服小便當利尿如皂角汁狀色正赤一宿腹減病從小便去也

麻黄連軺赤小豆湯　傷寒瘀熱在裏身必發黄此湯主之

麻黄去節二兩　連軺二兩　赤小豆一升　生梓白皮一升
杏仁四十枚　甘草二兩　生薑三兩　大棗十二枚
右八味以潦水一斗先煮麻黄再沸去上沫内諸藥煮
取三升去滓分温三服半日服盡
麻黄升麻湯　傷寒六七日大下後寸脉沈而遲手足厥
逆下部脉不至咽喉不利唾膿血泄利不止者為難治
此湯主之
麻黄二兩半　升麻一兩一分　當歸一兩一分　知母
黄芩　萎蕤八各十銖　白朮　石膏
乾薑　芍藥　天門冬　桂枝
茯苓　甘草銖各六
右十四味以水一斗先煮麻黄一兩沸去上沫内諸藥
煮取三升去滓分温三服相去如炊三斗米頃令盡汗
出愈
瓜蒂散　病如桂枝證頭不痛項不強寸脉微浮胸中痞
鞕氣上冲咽喉不得息者此為胸中有寒也當吐之
病人手足厥冷脉乍緊者邪結在胸中心中滿而煩饑
不能食者病在胸中當須吐之並宜此散
瓜蒂熬黄　赤小豆各一分
右二味各別擣篩為散已合治之取一錢七香香豉一

合用熱湯七合煮作稀糜去渣和散温頓服不吐者少
少加得快吐乃止諸亡血虚家不可与之
吳茱萸湯　乾嘔吐涎味頭痛者　少陰病吐利手足逆
冷煩躁欲死者並此湯主之
吳茱萸一升洗　人參三兩　生薑六兩　大棗十二枚
右四味以水七升煮取二升去渣温服七合日三服
黄連阿膠湯　少陰病得之二三日以上心中煩不得臥
此湯主之
黄連四兩　黄芩一兩　芍藥二兩　阿膠三兩
雞子黄二枚
右五味以水六升煮三物取二升去渣内膠烊盡小冷
内雞子黄攪令相得温服七合日三服
桃花湯　少陰二三日至四五日腹痛小便不利下痢不
止便膿血者此湯主之
赤石脂一斤一半全用一半篩末　乾薑一兩　粳米一升
右三味以水七升煮米令熟去滓内赤石脂末方寸七
温服七合日三服若一服愈餘勿服
半夏散及湯　少陰病咽中痛此散及湯主之
半夏洗　桂枝去皮　甘草炙
右三味等分各別擣篩已合治之白飲和服方寸匕日

三服若不能散服者以水一升煎七沸内散㕮方寸七
更煎三沸下火令小冷少少咽嚥之
猪膚湯 少陰病下利咽痛胸滿心煩者此湯主之
猪膚一斤
右一味以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升白粉五
五熬香和令相得溫分六服
甘草湯 少陰病二三日咽痛者可与此湯差不差与桔梗
湯
甘草二兩
右一味以水三升煮取一升五合去滓溫服七合日二
服
桔梗湯
桔梗一兩 甘草二兩
右二味以水三升煮取一升去滓分溫再服
苦酒湯 少陰病咽中傷生瘡不能言語聲不出者此湯
主之
半夏十四枚 雞子一枚去黃
右二味内半夏着苦酒中以雞子殼置刀鐶中安火上
令三沸去滓少少含嚥之不差更作三劑
烏梅丸 蚘厥者其人當吐蚘今病者靜而復時煩此為

藏寒蚘上入其膈故煩須臾復止復食而嘔又煩者蚘
聞食臭出其人當自吐蚘蚘厥者此丸主之
烏梅三百枚　細辛六兩　乾薑十兩　當歸四兩
黃連一斤　附子六兩去皮炮　蜀椒四兩去汗　桂枝六兩去皮
人參　黃蘗各六兩

右十味異擣篩合治之以苦酒浸烏梅一宿去核蒸之
五升米下飯熟搗成泥和藥令相得內臼中与蜜杵二
千下圓如梧桐子大先食飲服十丸日三服稍加至二
十丸禁生冷滑物臭食等

白頭翁湯　熱利下重者此湯主之

白頭翁二兩　黃連　黃蘗　秦皮各三兩

右四味以水七升煮取二升去滓溫服一升不愈更服
一升

牡蠣澤瀉散　大病差後從腰以下有水氣者此散主之

牡蠣　澤瀉　蜀漆洗去腥　栝婁根

葶藶子　商陸根熬　海藻洗去鹽以上各等分

右七味異擣下篩為散更入臼中杵之白飲和服方寸
七小便利止後服

蜜煎導方　陽明病自汗出若發汗小便自利者此乃津
液內竭雖鞕不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導而通

之若土瓜根及大猪膃汁皆可為導

蜜七合

右一味於銅器內微火煎凝如飴狀攪之勿令焦灼俟可丸併手捻作鋌令頭銳大如指長二寸許當熱時急作冷則鞕以內穀道中以手急抱欲大便時乃去之

猪膃汁方

大膃猪一枚瀉汁和少許法醋以漬穀道內如一食頃當大便出宿食惡物甚效

燒裩散 傷寒陰陽易之為病其人身體重少氣少腹裏急或引陰中拘攣熱上衝胸頭重欲舉眼中生花膝

脛拘急者此散主之

右取婦人中裩近陰處剪燒灰以水和服方寸七日三服小便即利陰頭微腫則愈婦人病取男子裩當燒灰

傷寒諸家方

傷寒六七日熱極心下煩悶狂言見鬼欲起走 肘後

黃連三兩　黃檗　黃芩各二兩　梔子十四枚

水升升煎取二升分再服治煩嘔不得眠

○外臺引崔氏名黃連解毒湯一名黃連除熱湯

天行十餘日不大便者服承氣丸 肘後

大黃　杏人各二兩　枳實一兩　芒硝一合

搗蜜和丸如彈丸和湯六七合服之未通更服

蔥豉湯 肘後

傷寒有數種人不能別令一藥盡治之者若初覺頭痛肉熱脉洪起一二日便作此湯

葱白一虎口 豉一升
以水三升煮取一升頓服取汗不汗復更作
葱豉粥肘後治同前 原書无方名今據外臺秘要方後語而標出
葱白一握切 米二合
豉一升
水一升煮之米少時下鹽豉後內葱白令大熟取三升分
温三服則出汗
○今人患外邪者有食葱雜炊蓋此遺法
五苓散千金主時行熱病但狂言煩躁不安精彩言語不
分人相主當者方
陰旦湯千金治傷寒肢節疼痛內寒外熱虛煩方
即傷寒論桂枝湯加黃芩三兩
解肌湯千金治傷寒温病方
即傷寒論葛根湯去桂枝生薑加黃芩二兩注云並秘錄
有桂心一兩
生地黃湯千金治傷寒有熱虛羸少氣心下滿胃中有宿
食大便不利方
即傷寒論調胃承氣湯加生地黃三斤大棗廿枚
右五味合擣令相得蒸五升米下熟絞取汁分再服
竹葉湯千金治發汗後表裏虛煩不可攻者但當与此方
即傷寒竹葉石膏湯是也

治傷寒後不了了朝夕有熱如瘧狀方千金

知母二兩　麻黃　甘草　芍藥
黃芩　桂心各一兩

右六味㕮咀以水七升煮取二升半服五合日三溫覆令微汗若心煩不得眠其人欲飲水當稍稍飲之令胃和則愈

○活人書名知母桂心湯

栝蔞湯千金治傷寒中風五六日已上但胸中煩乾嘔方

即傷寒論小柴胡湯去人參半夏加栝蔞實一兩

治傷寒後下利膿血方千金

阿膠一兩　黃蘗二兩
黃連四兩　梔子人十四枚

右四味㕮咀以水六升煮取二升去滓內阿膠更煎令消分為三服甲乙方無黃蘗有黃芩

○外臺引集驗名蘗皮湯活人書名黃連阿膠湯

黃龍湯千金治傷寒瘥後更頭痛壯熱煩悶方

即傷寒論小柴胡湯是也

麥門冬湯千金治勞復氣欲絕起死人方

即金匱麥門冬湯去人參半夏加竹葉