

菱女齋要方


水



-241

F⁴
カ-91

490.9
K2-15
2
No. 2884
12K 241



富士川文庫
1503

婦人產前

桂枝茯苓丸 金匱 婦人病有癥病經斷未及三月而得漏

下不止者為癥瘕害妊娠六月動者前三月經水利時

胎也下血者後斷三月血也所以血不止者其癥不去

故也當下其癥此方主之

桂枝

茯苓

牡丹 去心

桃仁 去皮

芍藥 各等分

右五味末之煉蜜和丸如兔屎大每日食前服一九不
知加至三丸

芎歸膠艾湯 金匱 有妊娠下血者假令妊娠腹中痛為胞

婦人產前

阻此方主之

芎藭

阿膠

甘草各二

艾葉

當歸各三

芍藥四兩

乾地黄各四

右七味以水五升清酒三升合煮取三升去滓內膠令

消盡溫服一升日三服不差更作

當歸芍藥散金匱婦人懷妊腹中疝痛此方主之

當歸三兩

芍藥一斤

茯苓四

白朮各四兩

澤瀉半斤

芎藭半斤

右六味杵為散取方寸匕酒和日三服

乾姜人參半夏丸金匱治妊娠嘔吐不止此方主之

乾姜

人參各一

半夏二兩

右三味末之以生薑汁糊為丸如梧子大飲服十丸日

三服

當歸貝母苦參丸金匱妊娠小便難飲食如故此方主之

當歸

貝母

苦參各四

右三味末之煉蜜丸如小豆大飲服三丸加至十丸註

云男子加滑石半兩

葵子茯苓散金匱妊娠有水氣身重小便不利洒淅要寒

起即頭眩此方主之

葵子一斤

茯苓三兩

婦人產前

右二味杵為散飲服方寸匕日三服小便利則愈
當歸散 金匱 婦人妊娠宜常服此方主之

當歸

黃芩

芍藥

芍藥 各一斤

白朮

右五味杵為散酒飲服方寸匕日再服 妊 娠常服即易
產無苦疾產後百病悉主之

治妊阻病心中憤悶空煩吐逆惡閉食氣頭眩體重四肢百節疼痛沈重多卧少起惡寒汗出瘦極黃瘦方
千金

半夏

生薑 各三

乾地黄 十銖

茯苓 各十

鰾皮

旋復花

細辛

人參

芍藥

芍藥

桔梗

甘草 各十

右十二味咬咀以水一斗煮取三升分三服若病阻積

月日不得治及服藥冷熱失候病變客熱煩渴口生瘡

者鰾皮細辛加前胡知母各十二銖若變冷下痢者

去乾地黄入桂心十二銖若食少胃中虛生熱大便閉

塞小便赤少者宜加大黃十八銖去地黄加黃芩六銖

餘依方服一劑得下後消息看氣力冷熱增損方調定

更服一劑湯便急服茯苓丸令能食便強健也

○外臺崔氏茯苓湯是也

治妊娠惡阻嘔吐不下食方千金

青竹茹

橘皮各十銖

茯苓

生薑各一兩

半夏

三十銖

右五味㕮咀以水六升煮取二升半分三服不瘥頻作

○產經名竹茹湯千金又有橘皮湯本方去半夏加人

參白朮厚朴主治同

旋覆花湯

千金

治妊娠六七月胎不安常服之方

旋復花

一兩 半夏

芍藥

生薑

各二兩

枳實

厚朴

白朮

黃芩

茯苓

右九味㕮咀以水一斗煮取二升半分五服日三夜二

先食服

竹瀝湯

千金

治妊娠常苦煩悶此子是煩

竹瀝

一升

麥門冬

防風

黃芩

各三兩

茯苓

四兩

右五味以水四升合竹瀝煮取二升分三服不瘥再作

又方千金

時服竹瀝隨多少取瘥止

治妊娠腹中滿痛又必不得飲食方千金

黃芩

三兩

芍藥

四兩

白朮

六兩

婦人產前

右三味咬咀以水六升煮取三升分三服半日令藥盡
微下水令易生月飲一劑為善

治妊娘傷胎結血心腹痛方千金

取小兒尿二頃服之立瘥

治妊娘遭時疾令子不落方千金

取甕中黃土水和塗臍乾復塗之千金

○痘瘡麻疹妊婦熱壯者俱用此法俗傳取田間久

用鋤鐮以布裹尉臍熱即易之六此遺法

治妊娘熱病方千金

葱白五兩 豆豉一升

右二味以水六升煮取二升分三服取汗

○是即時後方蔥豉湯說見傷寒門

膠艾湯千金治妊娘二三月上至七八月其人頓仆失踞

胎動不下傷損腰腹痛欲死若有所見及胎奔上搶心

短氣方

即金匱芎歸膠艾湯上方見

治妊娘小便不利方千金

葵子一升 榆白皮一把

右二味以水五升煮五沸每服一升日三

治妊娘及產已寒熱下痢方千金

婦人產前

黃連一升

黃蘗一斤

梔子三十枚

右三味咬咀以水五升漬一宿煮三沸服一升一日一夜令盡嘔者加橘皮一兩生薑二兩亦丈夫常痢治妊娠體腫有水氣心腹急滿湯方千金

茯苓

白朮各四兩

黃芩

杏仁各三兩

旋復花一兩

右五味咬咀以水六升煮取二升半分作三服

產育

滑胎令易產方千金

阿膠八兩

滑石三兩

車前子一升

右三味治下篩飲服方寸七日再至生月乃服藥利九

治難產方千金

槐枝切二升

榆白皮切

大麻仁各一升 瞿麥

通草各三兩

牛膝五兩

右六味咬咀以水一斗二升煮取三升半分五服

治產難累日氣力乏盡不得生此是宿有病者方千金

產育

生薑汁

生地黄汁各半升

右二味合煎熟頓服之

治產乳運絕方千金

含醯醋嚙面即愈凡悶即嚙之

慈悶方千金

產後心悶眼不得開即當頂上取髮如兩指大強以

人牽之眼即開

治子死腹中不出方千金

取竈下黃土三指撮以酒服之立出土當著兒頭上

六治逆生及橫生不出手足先見者

又方千金

服水銀三兩立出

○此方不可妄施用而余今抄出別有詳說

治胎死腹中乾燥著背方千金

麥子一升 阿膠五兩

右二味以水五升煮取二升頓服之未出再煮服

牛膝湯千金治產兒胞衣不出令胞爛方

牛膝 瞿麥各一兩 當歸 通草各一兩半

滑石二兩一方用桂心二兩 葵子半升

右六味咬咀以水九升煮取三升分三服

治胎死腹中若母病欲下之方 千金

牛膝 三兩 葵子 一升

右二味以水七升煮取三升分三服

治胞衣不出方 千金

取小麥合小豆煮令濃飲其汁立出六治橫逆生者

又方 金

取瓜瓣二七枚服之立出良

婦人產後

小柴胡湯金匱產婦鬱冒汗出後陰陽乃復大便堅嘔不

能食此方主之

大承氣湯金匱病解能食七八日更發熱者此為胃實此

方主之

竹葉湯金匱產後中風發熱面正赤喘而頭痛竹葉湯之

竹葉 一把 葛根 三兩 防風 桔梗

桂枝 人參 甘草 各一兩 附子 一枚

大棗 十五枚 生薑 五兩

右十味以水一斗煮取二升半分溫三服溫覆使汗出

頸項強用大附子一枚破之如豆大前藥揚去沫嘔者
加半夏半升洗

○活人書不用附子

白頭翁加甘草阿膠湯金匱產後下利虛極此方主之

白頭翁湯中加甘草阿膠各二兩

單行石膏湯千金治婦人乳無汁方

石膏四兩研以水二升煮三沸稍沸服一日令盡

又方千金

括蕒根切一升酒四升煮三沸去滓分三服

○八木宗菴方為末米飲服有效余據上文漏蘆散法

先食糖水服尤妙

又方千金

土瓜根治下篩服半錢七日三乃乳如流水

又方千金

燒鯉魚頭為末酒服三指撮

四順理中圓千金已產訖可服此方

即傷寒論理中丸是也

新生藏虛此所以養藏氣也

當歸為藥湯千金治產後虛損逆害飲食方

當歸一兩

芍藥

人參

桂心

婦人產後

桂薑

乾地黄

甘草

各一兩

大棗

二十枚

右八味咬咀以水七升煮取三升去滓分三服日三

桂枝附子湯千金治產後風虛汗出不止小便難四肢微

急難以屈伸者方

即傷寒論桂枝加附子湯是也

薤白湯千金治產後胸中煩熱逆氣方

薤白

半夏

甘草

人參

知母

石膏

括萎根

各二兩 四兩 三兩 麥門冬半升

右八味咬咀以水一斗三升煮取四升去滓分五服日

三夜二熱甚即加石膏知母各一兩

甘竹茹湯千金治產後內虛煩熱短氣方

甘竹茹

人參

茯苓

甘草

各二兩

黃芩

右五味咬咀以水六升煮取二升去滓分三服日三

知母湯千金治產後乍寒乍熱通身溫壯胸心煩悶方

知母

芍藥

黃芩

各二兩

桂心

甘草

右五味咬咀以水五升煮取二升半分三服一方不用

桂心加生地黃

竹葉湯千金治產後心中煩悶不解方

婦人產後

生淡竹葉

麥門冬

各一升

甘草

二兩

生薑

茯苓

各三兩

大棗

十四枚

小麥

右七味咀咀以水一斗先煮竹葉小麥取八升內諸藥煮取三升去滓分三服若心中虛悸者加人參二兩其

鮮方

前方葉代茹去茯苓餘依前法

註云產寶不用生

薑大棗加乾葛石膏各三兩

大豆紫湯千金治產後百病及中風痲痺或背強口噤或

但煩熱苦渴或頭身皆重或身癢劇者嘔逆直視此皆因風虛冷濕及勞傷所為方

大豆

五升

清酒

一斗

右二味以鐵鑊猛火熬豆令極熟焦煙出以酒沃之去滓服一升日夜數服服盡更合小汗則愈一以去風二則消血結如妊娘傷折胎死在腹中三日服此酒即瘳小柴胡湯千金治婦人在蓐得風蓋四肢苦煩熱皆自發露所為若頭不痛但煩熱与三物黃芩湯頭痛与此湯方

即傷寒論小柴胡湯是也

婦人產後

三物黃芩湯

黃芩

苦參

各二

乾地黄

四兩

右三味咬咀以水八升煮取二升去滓適寒溫服一升日二多吐下蟲

蜀椒湯千金治產後心痛此大寒冷所為方

蜀椒

二合

芍藥

當歸

半夏

甘草

桂心

人參

茯苓

各二

蜜一升

生薑汁五合

桃仁芍藥湯千金治產後腹中痛疾方

桃仁半升

芍藥

芎藭

當歸

乾漆

桂心

甘草

各二

右七味咬咀以水八升煮取三升分三服

內補當歸建中湯千金治產後虛羸不足腹中疼痛不止

吸少氣或苦小腹拘急痛引腰背不能飲食產後一

月日得四五劑為善令人力壯方

當歸

四兩

芍藥

五兩

生薑

六兩

甘草

桂心

三兩

大棗

十八枚

右六味咬咀以水一斗煮取三升去滓分三服一日令

盡若大虛內飴糖六兩湯成內之於火上飴消若無生

薑則以乾薑代之若其人去血過多崩傷內竭不止加

婦人產後

地黄六兩阿膠二兩合八種作湯成去滓內阿膠若無
當歸以芎藭代之

止
○金匱附方載此方然其為仲景方无一確据故收於

甘草湯千金治產後餘血不盡逆搶心胃手足逆冷唇乾
腹脹短氣方

甘草

芍藥

桂心

阿膠各三

大黃四兩

右五味咬咀以東流水一斗煮取三升去滓內阿膠令
烊分三服一服入腹中面有顏色一日一夜盡此三升

即下服中惡血一二升立瘥當養之如新產者

大黃湯千金治產後惡露不盡方

大黃

當歸

甘草

生薑

牡丹

芍藥各三

吳茱萸一升

右七味咬咀以水一斗煮取四升去滓分四服一日令

盡加人參二兩名人參大黃湯

大黃乾漆湯千金治新產後有血腹中切痛方

大黃

乾漆

乾地黄

桂心

乾薑各二

右五味咬咀以水三升清酒五升煮取三升去滓溫服

婦人產後

一升血當下若不瘥明旦服一升滿三服病無不瘥
治產後惡血不盡腹中絞痛刺不可忍方千金

大黃

黃芩

桃仁各三兩

桂心

甘草

當歸各二兩

芍藥四兩

生地黄六兩

右八味以水九升煮取二升半去滓食前分三服

治產後下利赤白腹中絞痛湯方千金

金匱芍藥歸膠艾湯

方見產前門

去芍

當歸湯千金治產後早起中風冷泄痢及帶下方

鼈甲

如手大

當歸

黃連

乾薑

各二兩

黃蘗

長一尺廣二寸

右五味以水七升煮取三升去滓分三服日三

服

翼加白頭翁一兩

滑石散千金治產後淋方

滑石

五兩

通草

車前子

葵子

各四兩

右四味治下節酢漿水服方寸匕稍加至七

治產後陰下脫方千金

蛇牀子一升布裹炙熨之亦治陰中痛

婦人衆疾

甘草小麥大棗湯金匱婦人藏躁喜悲傷欲哭象如神靈所作數欠伸此方主之

甘草 三兩

小麥 一升

大棗 十枚

右三味以水六升煮取三升溫分三服大補脾氣

溫經湯金匱婦人年五十所病下利數十日不止暮即發

熱少腹裏急腹滿手掌煩熱唇口乾燥此病屬帶下當

以此方主之

吳茱萸 三兩 當歸

芍藥

芍藥

人參

桂枝

阿膠

牡丹皮 去心

生薑

甘草

各二兩

半夏

半升

麥門冬一升 去心

右十二味以水一斗煮取三升分溫三服六主婦人少腹寒久不受胎兼取崩中去血或月水來過多及至期不來

大黃甘遂湯

金匱婦人少腹滿如敦狀小便微難而渴渴

生後者此為水与血俱結在血室也此方主之

大黃

四兩

甘遂

阿膠

各二兩

右三味以水三升煮取一升頓服之其血當下

抵當湯金匱婦人經水不利下此方主之

礬石丸

金匱婦人經水閉不利藏堅癖不止中有乾血下

白物此方主之

礬石

燒三分

杏仁

一分

右二味末之煉蜜和丸枣核大內藏中劇者再內之

紅藍花酒方

金匱婦人六十二種風及腹中血氣刺痛此

方主之

紅藍花

一兩

右一味以酒一大升煎減半頓服一半未止再服

婦建中湯金匱婦人腹中痛此方主之

腎氣丸

金匱婦人病飲食如故煩熱不能臥而反倚息者

此名轉胞不得溺也以胞系了戾故致此病但利小便

則愈此方主之方見虛勞門

半夏厚朴湯金匱婦人咽中如有炙轆此湯主之

半夏一升 厚朴三兩 茯苓四兩 生薑五兩

乾蘇葉二兩

右五味以水七升煮取四升分溫四服日三夜一服

○千金治婦人胃滿心下堅咽中帖如有炙肉轆吐之不出咽之不下一方無蘇葉生薑

治婦人臍下結物大如杯升月經不通發作往來下痢羸

瘦此為氣瘕按之若牢強肉瘕者不可治未者可治肘後

末乾漆一升 生地黄三十斤

搗絞取汁火煎乾漆令可丸食後服如梧子大三九日

三服即差

大黃圓千金治帶下百病無子服藥十天下血二十日下

長蟲及青黃汁三十日病除五十日肥白方

大黃破如米豆

乾薑各一

芎藭五兩

蜀椒二兩

茯苓如雞子大一枚

右七味為末蜜和丸如梧桐子大先食服七丸米飲下加至十九以知為度五日微下

治月經不通甚極閉塞方千金

牛膝一斤

麻子蒸三升

土瓜根三兩 桃仁二升

婦人無疾

右四味咬咀以好酒一斗五升浸五宿一服五合漸加至一升日三能多益佳

白石脂圓千金治婦人三十六疾胞中痛漏下赤白方

白石脂

烏賊骨

禹餘糧

牡蠣各十銖

赤石脂

乾地黄

乾薑

龍骨

桂心

石韋

白欬

細辛

芍藥

黃連

附子

當歸

黃芩

蜀椒

鍾乳

白芷

芎藭

甘草各半

右二十二味為末蜜和丸如梧子大每日空心酒下十

五丸日再一方有黃蘗半兩

○此方品味雜糅似難信用然家大人屢用頗效余六經驗數四因鈔出之

伏龍肝湯千金治崩中去赤白或如豆汁方

伏龍肝

如彈子七枚

生薑

五兩

生地黄

四升

五兩

甘草

艾葉

赤石脂

桂心

各二兩

右七味咬咀以水一斗煮取三升分四服日三夜一

乾漆湯千金治月水不通小腹堅痛不得近方

乾漆

萎蕤

芍藥

細辛

婦人衆疾

甘草

附子各一兩

當歸

桂心

芒硝

黃芩各二兩

大黃三兩

吳茱萸

右十二味咬咀以清酒一斗浸一宿煮取三升去滓內硝烱盡分為三服相去如一炊頃

治崩中漏下赤白不止氣虛竭方千金

龜甲

牡蠣各三兩

右二味治下篩酒服方寸匕日三

又方千金

燒亂髮酒和服方寸匕日三

又方千金

桑耳

二兩

鹿茸

十八銖

右二味以醋五升漬炙燥漬盡為度治下篩服方寸匕日三

又方燒麋

燒鹿角為末酒服方寸匕日三

治女人漏下或瘕或劇常漏不止身體羸瘦飲減或赤或白或黃使人無子者方千金

牡蠣

伏龍肝

赤石脂

白龍骨

桂心

烏賊骨

禹餘糧各等分

右七味治下篩空心酒服方寸匕日二白多者加牡蠣

婦人衆疾

龍骨烏賊骨赤多者加赤石脂禹餘糧黃多黃者加牡

龍肝桂心隨病加之張文仲同亦療崩中肘後無白龍骨以粥飲服

治婦人漏下不止散千金

廣鹿茸

阿膠各三

烏賊骨

當歸各二

蒲黃一兩

後有去阿膠烏賊方

右五味治下篩空心酒服方寸匕日三夜再服

芎藭湯治帶下漏血不止方千金

芎藭

乾地黄

黃耆

芍藥

吳茱萸

甘草各二

當歸

乾薑各三

右八味咬咀以水一斗煮取三升分三服若月經後因

有赤白不止者除地黄吳茱萸加杜仲人參各二兩

婦人血氣疾

小兒初生

龍騰湯千金小兒初出腹骨肉未斂肌肉猶是血也血凝
乃堅成肌肉耳其血沮敗不成肌肉則使面目繞鼻口
左右悉黃而啼閉目聚口撮面口中乾燥四肢不能伸
縮者皆是血脉不斂也喜不育若有如此者皆宜與此
湯也

方見諸
痛門

諸癇驚風

龍腦湯千金治嬰兒出腹血脉盛實寒熱溫壯四肢驚掣發熱大吐哕者若已能進哺中食實不消壯熱及變蒸不鮮中客人鬼氣并諸驚癇方悉主之

龍腦

釣藤皮

柴胡

黃芩

桔梗

芍藥

茯苓

甘草各六銖

蜣螂二枚

大黃一兩

右十味咬咀以水一升煮取五合為劑也服之如後節

慶葉有虛實虛葉如足數合水也得下即止勿再服

增損續命湯千金治小兒卒中風惡毒及久風四肢角弓

諸癇驚風

反張不隨并躄瘦僻不能行步方

麻黃

甘草

桂心各一兩

芎藭

葛根

升麻

當歸

獨活各十銖

人參

黃芩

石膏

各半

杏仁

二十枚

右十二味

咬咀

以水六升煮麻黃去上沫乃納諸藥煮

取一升二合三歲兒分為四服一日令盡少取汗得汗以

粉之

諸疳

諸疳

小兒諸證

紫圓千金治小兒變蒸發熱不解并挾傷寒溫壯汗後熱方歇及腹有痰癖哺乳不進乳則吐乳食癰先寒執後

赤石脂

代赭各一

巴豆三十枚

杏仁五十枚

右四味為末巴豆杏仁別研為膏相和更搗二千杵當

自相得若硬入少蜜同搗之密器中收三十日兒服如

麻子一丸与少乳汁令下食頃後与少乳勿令多至日

中當小下熱除若未全除明旦更与一丸百日兒服如

小豆一丸以此準量增減夏月多熱善令發疹二十

日輒一服佳紫圓無所不療雖下不虛人

○幼、新書此方引葛氏肘後萬安方門瀉藥同

芍藥四物鮮肌湯千金治少小傷寒方

芍藥 黃芩 升麻 葛根各半

右四味以水三升煮取九合去滓分四服暮歲已上分

三服

麻黃湯千金治少小傷寒發熱欬頭面熱者方

麻黃 生薑 黃芩各一 甘草

桂心 石膏 芍藥各半 杏仁十枚

右八味咬咀以水四升煮取一升半分二服兒若小以

意減之

竹葉湯千金治小兒夏月患腹中伏熱溫壯來往或患下

痢色或白或黃主焦不利方

竹葉切 小麥各五 柴胡 麥門冬

人參 甘草各半 茯苓十八 黃芩陸銖

右八味咬咀以水四升煮竹葉小麥取三升去竹葉小

麥下諸藥煮取一升半分三服若小兒夏月忽壯熱燒

人手洞下黃溲氣力惺然脉極洪數用此方加大黃二

兩再服得下即瘥

治八歲已上兒熱結痰實不能食自下方千金

芍藥 梔子 知母 大黃各二

紫胡六二銖

升麻

黃連

黃芩各二銖

竹葉升切半

桔梗半

細辛十五銖

右十一味咬咀以水六升煮取一升八合去滓分四服
十歲兒為三服一本有枳實杏仁各一兩半無桔梗黃

連

治小兒羸瘦憊宜常服不妨乳方千金

甘草五兩為末蜜丸一歲兒服如小豆十九日三服

盡即更合

地黃圓千金治少小胃氣不調不嗜食生肌肉方

乾地黃

大黃各一銖

茯苓十八銖

當歸

柴胡

杏仁各半

右六味為末以蜜丸如麻子大服五丸日三

治小兒霍亂吐痢方千金

人參一兩

厚朴

甘草各半

白朮

右四味咬咀以水一升二合煮取半升六十日兒服

合百日兒分三服晷歲分二服中間隔乳服之乳以

生冷油膩等一方加乾薑二分或加生薑三分

藿香湯千金治毒氣吐下腹脹逆害乳哺方

藿香一兩

生薑二兩

青竹茹

甘草各半

右四味咬咀以水二升煮取八合每服一合日三有熱

加升麻半兩

五香連翹湯千金治小兒風熱毒腫、色白或有惡核瘰癧附骨癰疽節解不舉白丹走竟身中白軫瘡不已方

青木香

薰陸香

雞舌香

沈香

麻黃

黃芩

各六銖

水黃

二兩

麝香

三銖

連翹

海藻

射干

升麻

枳實

各半兩

竹瀝

三合

右十四味咬咀以水四升煮藥減半內竹瀝煮取一升二合兒生百日至二百日一服三合二百日至晷歲一服五合一方不用麻黃

治小兒臍疔瘡方身盡

蟻露蜂房所為末傅之

治小兒口瘡不得吮乳方千金

大青

銖十八

黃連

銖十二

右二味咬咀以水三升煮取一升二合一服一合日再夜一

○大青代藍葉頗效

治小兒燕口兩吻生瘡方千金

燒髮灰和猪脂傅之

治小兒卒毒腫著喉頭壯熱妨乳方千金

小兒諸證

升麻

射干

大黃

各一兩

右三味咬咀以水一升五合煮取八合一歲兒分三服以滓薄腫上冷更暖以薄大兒以竟加之

五等圓千金治小兒陰偏大又卵核堅癰方

黃蘗

香豉

牡丹

防風

桂心各二兩

右五味為末蜜丸如大豆兒三歲飲服五丸加至十丸兒小以意酌量著乳頭上服之

地膚子湯千金治小兒熱毒入膀胱中忽患小便不通欲

小便則澁痛不出出少如血須臾復出方

地膚子

瞿麥

知母

黃芩

枳實

升麻

葵子

猪苓

各六銖

通草

海藻

橘皮各三銖

大黃

十八銖

右十二咬咀以水三升煮取一升一日至七日服下

為三服八日至十五日兒一合半為三服十六日至二

十日兒二合為三服四十日兒以此為準五十日已上

七歲已下以意加藥益水

蒲黃湯千金治小兒落床墮地如有瘀血腹中陰寒熱

不肯乳哺但啼哭叫喚方

蒲黃

麥門冬

大黃

黃芩

各十兩

甘草 八銖

芒消 七銖

黃連 十二銖

右七味咬咀以水二升煮取一升去滓內芒消分三服

消息視兒羸瘦半之大小便血即愈忌冷食

溫中湯千金治小兒夏月積冷洗浴過度及乳母六將冷
洗浴以冷乳飲兒壯熱忽值暴雨涼加之兒下如水
胃虛弱則面青肉冷眼陷乾嘔者宜先與此調其胃氣
下即止

乾薑

厚朴 各一分

當歸

桂心

甘草 各三分

人參

茯苓

白朮

桔梗 各二分

右九味咬咀以水二升煮取九合六十日至百日兒一
服二合半餘皆隨兒大小

速書

痘瘡

治熱病後發豌豆瘡方千金

黃連三兩以水二升煮取八合頓服之

又方。千金。

真波斯青黛大如枣水服之瘥

治豌豆瘡初發覺壯熱原作欲作今據外臺改者方千金

煮大黃五兩服之愈

痘瘡

蘇大黃二兩入酒

治痘疹發熱身熱口渴者

真武湯清熱解毒

又方

黃連二兩以水二升煮取八合服之

治痘疹發熱身熱口渴者

麻疹

麻疹





卷二十六 齊

二
一

