松
科別

k 62-1

F 2
カ-96

觀聚方要補巻三目録

諸氣

七氣湯　枳實湯
桑白皮散　半夏散
匀氣散　烏沈湯
沈香降氣湯　分心氣飲
木香流氣飲　四七湯
三和散　化氣湯
賺氣散　趁痛湯

490.9
Ka-2 2 D
No.2564
R K62-1
慶應義塾大学医学情報センター
昭和 47.年7.月4日
富士川文庫
1512

河間正氣天香湯　退熱清氣湯
指迷七氣湯　沈香四磨湯
木香破氣散　萬和散
解肝煎　通膈散
黃鶴丹　抑氣散
辰香散　麝香丸

積聚

陷胸湯　延年半夏湯
三稜散　人參煮散
大黃散　散聚湯
大七氣湯　蓬莪朮散
柴平湯　稜朮湯
附朮湯　平肝消瘕湯
平肝飲　硝石大圓
治食不消方　必效練中丸
范汪四物丸　硇砂煎丸
鼈甲丸　硇砂圓
三稜煎圓　沈香散

通仙散　　陰陽攻積丸
七轉靈應丹　　治痞塊血塊方
金液丹　　沈香消痞丸
治諸積脾癖方　　滕紅丸

蟲病

甘草粉蜜湯　　椒梅湯
掃蟲煎　　治腹內蟲方
清中安蚘湯　　安蟲飲
理中安蚘散　　治蟯蟲方
安蟲散　　魏香散
集效圓　　木香檳榔圓
追蟲丸　　治惡心吐蟲方

欬嗽喘急

茯苓甘草五味薑辛湯　　射干麻黃湯
麥門冬湯　　小青龍加石膏湯
杏仁飲子　　小品生薑五味子湯
深師蘇子湯　　五味子散
乾薑散　　欵冬花湯

柴胡散　澤漆散
九寶湯　人參清肺湯
華蓋散　麻黃散
人參定喘湯　五味子湯
南星飲　眞武湯
加味理中湯　人參芎歸湯
黃耆建中湯　千緡湯
紫蘇散　治十六般哮嗽方
貝母湯　細辛湯

息賁湯　四磨湯
杏子湯　沈附湯
人參胡桃湯　滌痰湯
紫菀茸湯　麻黃蒼朮湯
加減瀉白散　觀音救苦散
降氣化痰湯　均氣八仙散
沈香散　清火寧嗽湯
三子養親湯　滋陰降火湯
二母寧嗽湯　九味理中湯

阿膠散　橘蘇散
射干兜鈴湯　獨參湯
生脈散　治哮喘方
六安煎　八味地黃加鐵落
治哮喘方　竹茹湯
人參湯　阿膠湯
涼血湯　定喘飲
百部湯　治頓嗆方
治冬夏哮喘方　治内熱欬嗽方

治欬逆口焦方　治頓欬方
療欬上氣方　清肺飲
麥花散　石夏圓
黃牛散　胡椒理中丸
鱉甲散　治寒嗽方
百花膏　石膏散
九仙散　人參清鎮丸
當歸飲　諸欬丸
治欬嗽氣虛方　治遠年痰喘方

治老人欬嗽方　治欬嗽遺矢方
止嗽散

瘧疾

白虎加桂枝湯　柴胡桂枝乾薑湯
柴胡去半夏加栝蔞湯　延年知母鱉甲湯
清脾湯　四獸飲
大正氣散　養胃湯
清脾湯　萬安散
菓附湯　當歸鱉甲散
鱉甲白朮散　柴苓湯
四將軍飲　藿香散
柴平湯　參薑湯
截瘧如神散　柴胡芎歸湯
截瘧飲　芎歸鱉甲散
一方　補中益氣湯
治瘧母方　清中驅瘧飲
治痎瘧方　河氏理脾散
治經年瘧方　延年療瘧丸

嘔吐胃反

呉茱萸湯　半夏瀉心湯
四逆湯　小柴胡湯
大半夏湯　五苓散
大黄甘草湯　茯苓澤瀉湯
生薑半夏湯　單甘草湯
麥門冬飲　麥門冬散
麥粟湯　張渙養中湯
竹茹湯　丁香温中湯
增損白朮散　翻胃湯
治胃虚嘔吐方　旋覆花散
温中益氣湯　三乙承氣湯
歸脾湯加呉茱萸　六君子加呉茱萸
治翻胃方　理中湯加童便猪膽
治反胃方　半夏藿香湯
半夏生薑大黄湯　六君子加赤石脂
比和飲　一方
治上熱下寒方　治吐食大便秘方。

治嘔泄諸證方

半夏乾薑散
猪苓散　華佗治胃反方
赤石脂散　古今録驗一方
紫粉丸　治冷痰翻胃方
養正丹　古阿魏散
紅豆丸　治悲傷吐食方
代赭石散　塞鼻用藥
八味丸

噦

橘皮湯　橘皮竹茹湯
柿蔕湯　八物湯加竹茹
竹茹黄連柿蔕湯　丁附人參柿蔕湯
平胃二陳湯加柿蔕　三黄瀉心湯
小承氣湯　調胃承氣湯
桃仁承氣湯　參附湯
黄連解毒湯　白虎湯
刀豆治噦方　木香調氣散
呉茱萸丸

噫氣呑酸鏪雜吐酸

旋覆代赭湯　小品半夏茯苓湯
白朮湯　呉茱萸湯
枳殼散　和中湯
清鬱二陳湯　蒼連湯
當歸補血湯　加味小陷胸湯
加減安胃湯　加味平胃散
檳榔散　增損承氣丸
乾薑丸　蒼朮丸
麴朮丸　回令丸
咽醋丸　軟石膏丸
茱萸圓　交泰丸
破鬱丹　匀氣丸

霍亂

四逆加人參湯　通脈四逆加猪膽汁湯
乾薑茱萸湯　附子粳米湯
理中散　治霍亂蠱毒方
治中湯　甘草瀉心湯

小品人參湯　治妊娠霍亂方
蘆根飲子　良薑散
麥門冬湯　黄瓜湯
藿香正氣散　治傷寒併熱霍亂方
五苓蘇木湯　厚朴湯
白朮散　五苓散
理中丸　四神丸
許仁則三味丸　糯米薑水
勻氣散　神效絞腸痧散

黄疸（黄胖）

茵蔯蒿湯　梔子大黄湯
大黄消石湯　小柴胡湯
小建中湯　必效大黄湯
許仁則麻黄等五味湯　又梔子等五味湯
龍膽散　小半夏散
人參養榮湯　加減五苓散
張渙蘆根湯　四君子湯
茵蔯附子乾薑湯　茵蔯四逆湯

理中加茯苓湯　朮附湯
加減胃苓湯　治傷食黄疸方
消石礬石散　茵蔯五苓散
延年瓜蒂散　删繁苦參丸
鹿茸散　紫金丸
八味丸　治黄腫方
五疸神丹　大温中丸
小温中丸　摘玄針砂平胃散
治黄胖方

觀聚方要補卷三

東都　丹波元簡廉夫　輯

諸氣

七氣湯（千金）治虚冷。上氣。勞氣等。

半夏（二升）　人參　生姜　桂心　甘草（各一兩）

右水煎。

枳實湯（千金）下氣。治胸中滿悶。

枳實（三枚）　附子（二枚）　大棗（十四枚）　半夏（五兩）　人參

甘草　白朮　乾姜　厚朴（各二兩）

右水煎服。

桑白皮散（聖惠）治上氣。心胸滿塞。不下食。

桑白皮　大腹皮　橘皮　茯苓

木通　甘草　桂心（各一兩）　紫蘇子（二兩）

右生姜水煎。

半夏散（聖惠）治七氣。藏府虛冷。心胸氣上。勞乏不能飲食。

半夏　人參　白朮　桂心　附子

沉香（各一兩）　厚朴（二兩）　橘皮（三分）

右生姜水煎。

勻氣散（局方）治氣滯不勻。胸膈虛痞。宿冷不消。心腹刺痛嘔吐。

白蔻　丁香　檀香　木香（各二十兩）　藿香

甘草（各五斤）　縮砂（二斤半）

右細末。每一匁入鹽末一字。沸湯點服。○直指。名調氣散。心法附餘。名木香調氣散。○寶鑑合四味異功散（方見脾胃門）加青皮。山藥。蓽澄茄。名育氣湯。治挾鬱不食。

烏沉湯（局方）治一切氣。

烏藥（百兩）　人參（五兩）　沉香（五十兩）　甘草（四兩半）

右爲末。每半錢。姜三片。鹽少許。沸湯點服。○同上去人參沉香。加香附。名小烏沉湯。○入門去人參甘草加香附砂仁。名四味烏沉湯。治心脾刺痛。

沉香降氣湯局方治陰陽壅滯。氣不升降。胸膈痞塞。喘促嗜臥。又治脚氣上衝。心腹堅滿。

香附（二十五斤）　沉香（一斤二兩半）　縮砂（三斤）　甘草（七斤）

右細末。每一錢。鹽少許。沸湯點服。○同上去沉香。名快氣湯。○葉氏沉香降氣湯。去沉香。加烏藥莪朮。（案方中不用沉香。與方名相乖。三因五噎沉香散。亦不用沉香。）衛生家寶。更去莪朮。名養氣湯。

分心氣飲局方治一切氣不和。或事不隨意。使抑欝之氣留滯不散。停於胸膈。爲諸証。

大腹　芍藥　木通　半夏　茯苓

桑白　甘草　橘皮　青皮　羗活（各一兩）

紫蘇（四兩）

右姜棗水煎。○永類方有桂。

木香流氣飲局方治諸氣痞滯。胸膈膨脹。肩背腹脇走注刺痛。及面目虛浮。四肢腫滿。大便祕結。水道赤澁。

陳皮（二斤）　甘草　厚朴　紫蘇　青皮

香附（各一斤） 木通 大腹 丁香 檳榔
肉挂 草菓 莪朮 藿香 木香（各六兩）
木瓜 人參 白朮 麥門 石菖
茯苓 白芷（各四兩） 半夏（二兩）

右姜棗水煎

四七湯局方治七情氣結成痰涎狀如破絮或如梅核

即半夏厚朴湯（方見咽喉門）

右姜棗水煎○壽世加桔梗枳殼○百一去紫蘇加人參名大七氣湯

三和散局方治三焦不和心腹痞悶大便祕難及脚氣上攻腹脹

檳榔 甘草 木香 陳皮 芎藭
白朮（各三分） 大腹 羌活 紫蘇 木瓜
沉香（各一兩）

右水煎○活人名大三脘散

化氣湯局方治一切氣逆胸膈噎悶心腹疼痛嘔吐酸水

沉香 胡椒（各一兩） 木香 宿砂 挂心（各二兩）
丁皮 乾姜 莪朮 茴香 青皮

陳皮　甘草（各四兩）

右姜蘇水煎。（原作散鹽湯點服。）

賺氣散得効治心胸痞悶。腹脇虛脹。兩肋刺痛。

三稜　莪朮（各五兩）　白朮（三兩）　木香（半兩）　枳殼（一兩）

右生姜水煎服。用砂糖少許壓下。

趁痛湯（葉氏）治氣滯不散。攻刺脇肋疞痛。及走注氣痛。

當歸　芍藥　吳茱萸　桂枝　人參

大黃　甘草　枳殼（各四兩）　茯苓　乾姜（各二兩）

附子（四兩）

右生姜水煎。

河間正氣天香湯醫綱治婦人一切氣作痛。或上湊心胸。或攻脇肋。

香附（六分）　烏藥（一分半）　陳皮　紫蘇　乾姜（各六分半）

右水煎。○入門。引紺珠。並無所攷。丹溪纂要有甘草。

退熱清氣湯（入門）治諸氣逆戾身熱痞悶。

陳皮　茯苓　柴胡（各一錢）　半夏　枳殼（各八分）

香附（七分）　砂仁（七粒）　川芎（五分）　木香　甘草（各三分）

右生姜水煎。

指迷七氣湯（直指）治七情相干陰陽不得升降氣道壅滞攻衝作疼

青皮　陳皮　桔梗　莪朮　辣桂

藿香　益智（各一兩）　香附（一兩半）　甘草（炙三兩）　加半夏（三分）

右姜棗水煎○濟生有三稜無姜棗

沉香四磨湯（家寶）治氣滯攻衝心腹疞痛

沉香　木香　檳榔　烏藥

右濃磨水煎服○同上加附子甘草白朮人參名八磨湯治一切氣挾虛○濟生有人參無木香○得効加枳殻大黄名六磨湯治氣滯腹急大便閉結○方考加枳實名五磨飲子暴怒暴死曰氣厥此方主之

木香破氣散（袖珍）名不老湯

木香　甘草（各半兩）　香附（四兩）　烏藥　姜黄（各二兩）

右為末每服二錢鹽湯調下

萬和散（奇効）治一切氣刺氣悶氣脹心腹痞塞諸証

茴香　蘿蔔子　蓬朮　桂心（各一兩）　陳皮（一兩）

麥芽（一分）　乾姜（三分）　甘草（一兩三分）　白朮　牽牛（炒熟取頭末各半兩）

三稜（三兩半）

右水煎服。（原方有桔梗。白芷。今不用。）

解肝煎（景岳）治暴怒傷肝。氣逆脹滿。陰滯等証。

陳皮　半夏　厚朴　茯苓　紫蘇

芍藥（各一匁）　砂仁（七分）

右生姜水煎。○脇肋脹痛。加白芥子。

通膈散（御藥）治胸中氣痞不通。水飲停滯。

檳榔（二兩）　枳實（麩炒四兩）

右為細末。食後濃煎生姜湯。調下二匁。

黃鶴丹（韓氏醫通）治一切病屬氣滯者。

香附（一斤）　黃連（半斤）

右為末。水糊丸梧子大。白湯下。

抑氣散（醫級）治氣道壅滯。不得升降。胸膈痰飲窒碍。

烏藥（二兩）　紫蘇　廣皮　檳榔　枳殼

砂仁（各一兩）　沈香（五分）　香附（半斤）

右為末。每服一錢。白湯下。（今水煎用亦可。）

辰香散（藍溪公定）治一切氣滯上逆。寒熱頭痛等証。

香附子（十匁）　辰砂（三匁）

右為細末。白湯攪服。

麝香丸（藍溪公定）散氣欝。化痰結。解酒毒。

麝香（四分）　龍腦（四分）　肉桂（二分）　丁香（二分）　甘草（一分）

阿僊藥（四分）

右為末。陳米飲丸梧子大。每服十五丸。至三十丸。

積聚

陷胸湯（千金）治胸中心下結積。飲食不消。

栝蔞實　大黃　黃連（各二兩）　甘草（一兩）

右水煎。○翼有甘遂一兩。

延年半夏湯（外臺）主腹內左肋痃癖硬急。氣滿不能食。胸背痛。

半夏　前胡　鼈甲（各三兩）　桔梗　吳茱萸

枳實（各二兩）　檳榔（十四枚）　人參（一兩）　生姜（四兩）

右水煎服。

三稜散（局方）治食積氣塊。攻刺腹脇。不思飲食。脹滿。嘔吐酸水。

莪朮　益知　三稜　青皮（各二兩）　白茯（四兩）

甘草（三兩）

右棗一枚。鹽少許。水煎服。○御藥院去白茯。加木香神麯。名木香三稜湯。治腹痛霍亂。

人參煮散（局方）治脾胃不和。宿寒留飲。停積不消。嘔吐痰逆。

人參（四兩）　青皮（十二兩）　甘草（十兩）　干姜（六兩）　三稜（十二兩）

芍藥（一斤）　丁皮（六兩）　茯苓　蒼朮（各半斤）

右姜棗水煎。

大黄散（聖惠）治痃癖氣連心肋。相引痛堅急。

大黄　當歸　白朮　枳殼　鼈甲（各一兩）

柴胡（一兩半）

生姜水煎。

散聚湯（三因）治久氣積聚。心腹絞痛。二便不利。或復泄瀉。

半夏　檳榔　當歸（各三分）　橘皮　杏仁

桂心（各二兩）　茯苓　炙甘　附子　川芎

枳殼　厚朴　吳茱萸（各一兩）

右水煎。○大便不利。加大黃。

大七氣湯（濟生）治六聚狀如癥瘕。隨氣上下。疞痛攻刺。（方見諸氣門）

蓬莪朮散奇効治久積不消。腹下如杯。多吐酸水。面痿黃腹痛。

蓬莪朮　肉桂　枳殼　三稜　大黃

當歸　檳榔　木香（各一兩）　柴胡（一兩半）　干姜（半兩）

鼈甲（二兩）　芍藥（半兩）

右生姜水煎。

柴平湯（回春）積塊屬熱者。宜清化也。

柴胡　黃芩　半夏　蒼朮　厚朴

青皮　枳殼　神麴　山查　三稜

莪朮（各等分）　甘草（減半）

右姜棗水煎。

稜朮湯（[illegible]腹王衛）治食積。

山稜　蔔子　蓬朮　青皮　烏藥

檳榔　枳實（各一分）

右水煎服。

附朮湯（得効） 治脾積氣。婦人諸癥氣痛。

香附（炒五錢）。 莪朮（醋煮） 甘草（各二兩）

右爲末每服二錢。入鹽少許。百沸湯空心點服。

平肝消瘕湯（惠直堂方） 治左脇有痞。動則痛。靜則止。日漸壯大。面黃吐痰。

白芍（五錢） 歸身（二錢五分） 白朮（五錢） 柴胡（五分） 鼈甲（一錢五分）

神麯 山查 枳殼 半夏（各壹分）

右水煎服。十劑塊小。二十劑全消。

平肝飲（橡窓自製） 治左脇下痞滿。宗筋努張不快。

柴胡 芍藥 香附（各一錢三分） 青皮 鼈甲

檳榔（各一錢） 莪朮（八分） 呉茱萸（五分） 甘草（少許）

右水煎服。或加黃連。木香。或去呉茱加龍膽。若積熱者。加胡黃連。腹滿。加枳實。厚朴。大便祕。加大黃。

硝石大圓（千金） 治十二癥瘕。婦人帶下。

硝石（六兩。朴硝亦得） 大黃（八兩） 人參 甘草（各三兩）

右熬。苦酒丸鷄子黃大。欲下用二丸。若不能者。分作四丸。（喬氏本。有當歸。誤。）

治凡所食不消方。（千金）

取其餘類燒作末。酒服方寸匕。便吐去宿食。

必効練中丸。（外臺）主癖虛熱。兩脇下癖痛。惡不能食。頭時時痛。並氣衝背膊。虛腫。大小便澁。小腹痛。熱衝頭耳鳴。彌至健忘。

大黃（一斤） 朴消（十兩） 芍藥（八兩） 桂心（四兩）

右擣篩。蜜和爲丸。如梧子大。平旦酒服二十丸。日再。稍加至三十丸。以利爲度。能積服。彌佳。縱利不虛人。神良。

芫汪四物丸。（外臺）療心腹積聚。食苦不消。胸脇滿。除去五藏邪氣。

大戟（五分熬） 芫花（四分熬） 杏人（一分） 巴豆（一百枚熬）

右末。蜜和丸。如小豆大。日三。日增一丸。覺勿復益。欲下頓服七丸。下如清漆陳宿水。

硇砂煎丸。（聖惠）治伏梁久積在心下。橫大如臂。蕟歇疼痛。

硇砂（二兩細研以酒醋各半升熬如膏） 桂心 漢椒 附子

檳榔 乾漆（炒令煙出各一兩） 乾姜（半兩） 大黃（二兩微炒）

右爲末。入硇砂煎中。更入蒸餅少許。和溲爲丸。如梧桐子大。每日空心溫酒下十五丸至二十丸。

鼈甲丸（聖惠）治痃氣當胃脘。結聚如杯。積久不散。腹脇疼痛。

鼈甲（三兩以米醋一小盞化硇砂一兩。塗炙鼈甲。令醋盡爲度） 附子（炮） 三稜 乾漆

木香（各一兩） 呉茱萸（半兩） 大黄（二兩。醋炒）

右細末。醋煮糊爲丸梧子大。每二十丸。空心温酒下。〇入門。無三稜木香呉茱萸。有良姜。名保安丸。治癥積心腹内結如拳。上搶心痛。及臍腹痛。

硇砂圓（本事）治一切積聚。有飲心痛。

硇砂 荊三稜（別末） 干姜 白芷 巴豆（各半兩）

大黄（別末） 乾漆（各一兩剉。炒令烟盡） 木香 青皮 胡椒（各一分）

檳榔 肉豆蔻（各一箇）

右爲細末。釅醋二升。煎巴豆五七沸。後下三稜大黄末。同煎五七沸。入硇砂同煎成稀膏。攪稀得所。便入諸藥。和匀杵圓。如菉豆大。年深氣塊。生姜湯下四五圓。

三稜煎圓（局方）治中脘氣痞。心腹堅脹。脇下緊硬。喘滿短氣。

杏仁 青皮 蘿蔔子（微炒） 乾漆（炒。各二兩） 硇砂（各一兩）

神麴 麥蘖（各三兩） 三稜（生細剉。搗爲末。八兩。以酒三升。熬成膏）

右為末。以三稜膏搜圓梧子大。每十五丸米飲下。

沉香散聖惠治積聚。心腹脹滿。四肢逆冷。

沉香（一兩）　呉茱萸（半兩）　檳榔（一兩）　青橘皮（一兩）

附子（一兩）　懐香（半兩）

右為散。食前熱酒調下一錢。

通仙散（居家必用）男子取積。婦人取敗血。不動真氣。

蕎麥麪（二錢半）　大黄末（一錢半）

右二味。酒調。臨卧服。

陰陽攻積丸（必讀）治積聚。癥瘕。痃癖。蟲血。痰食。不問陰陽。

普効。

呉茱萸　乾姜　官桂　川烏（炮各二兩）　黄連

半夏　橘紅　茯苓　檳榔　厚朴

枳實　菖蒲　玄胡索　人參　沈香

琥珀　桔梗（各八分）　巴霜（五分）

右為細末。皂角六兩煎汁泛為丸。如菉豆大。每服八分。漸加一錢五分。生姜湯送下。○醫通無橘紅。檳榔。厚朴。枳實。菖蒲。桔梗。六味。云士材向寓郭園。以此方授之。郭嫗云。是喬三餘所定。其方酒麪糊丸。較之皂角。汁稍平。

七轉靈應丹（醫方大全）治新舊諸積諸氣。婦人血瘕。小兒癖積。一切心痛。諸般蟲積。

白蕪荑（五錢取淨末四錢）　牽牛（五兩取頭末三兩）　檳榔（五兩取淨末三兩）　大黃（五兩取淨末三兩）

木香（五錢取淨末四錢）　雷丸（四兩取淨末三兩）　錫灰（一兩煨取淨末三錢）

共取各淨末一處拌勻。蔥白一觔煮沸湯露一宿。為丸如黍米大。每服三四錢。老人幼弱減半。俱用蔥白湯露一宿。早晨空心冷下。取出病根。如欲大便須在內房。不可見風日。晚用溫粥補之。忌生冷硬物葷腥一月。後用四君加減補胃氣。一方有史君子一兩。鶴虱五錢。

男子痃塊。婦女血塊。極妙。藥性不猛而効速。（醫方大全）

阿魏（一兩）　生漆（濾去渣淨）　木耳（為末各四兩）　黃蜜（六兩）

錫罐一箇盛藥封固。放鍋內水煮三炷香。取起冷定。每服二茶匙。燒酒送下。日進三服。忌油膩發氣物。右二方（未詳出典。）

金液丹（局方）治腰腎久冷。心腹積聚。脇下冷癖。又治陰証傷寒。身冷脉微。手足厥冷。或吐或利。

硫黃（淨揀去沙石拾兩研細飛過用甆合子盛以水和赤石脂封口。以鹽泥固濟。曬乾地內先埋一小罐子盛水令滿。安合子在上。用泥固濟訖。慢火養七日七夜。候足加頂火一斤。煅候冷取出。研為細末。）

右藥末一兩用蒸餅一兩湯浸握去水脈為圓如梧桐子大每服三十圓多至百圓温米飲空心服之

沈香消痞丸（經驗秘方）胃肺積熱在中胸腹脹滿噫聲不絕飲食後氣閉不通必須吐去所啗之物候腹脹空虛氣方稍通

沈香　蘆薈　枳殼　硇砂　廣术（各三錢）

木香（二分）　胡黄連（五分）　麝香（一分）　黑牽牛（頭末一兩）

右為細末好醋熬肥皂角子膏和藥為丸如梧子大每服四五十丸加至八九十丸臨卧時嚼胡桃仁二箇極

爛嚼温水與藥一處送下

治諸積脾癖（經驗秘方）

錦紋大黄去麄皮削淨一斤切為方寸薄片存碎者四兩餘上十二兩用緊炭火甘鍋盛燒微存性取出於砂土内培過入好木香壹兩與生者同碾為極細末每服三錢用沸湯調下酒調亦妙心氣痛者熱醋調燒者存性生者微炙

勝紅丸（醫方大成）治脾積酒積及婦人脾血積氣

陳皮　青皮　莪术　三稜（各一兩）　香附子（二兩）

良姜　干姜（各一兩）

右為細末糊丸。

蟲病

甘草粉蜜湯（金匱）蚘蟲之為病。令人吐涎。心痛。發作有時。毒藥不止。

甘草（二兩）　粉（一兩）　蜜（四兩）

右以水三升。先煮甘草。取二升。去滓。内粉蜜。攪令和。煎如薄粥。温服一升。（千金用粱米粉。外臺用白粱粉。）

烏梅湯（回春）治腹痛時止時發。面白唇紅者。蟲痛也。

烏梅　花椒　檳榔　枳實　木香

香附　砂仁　肉桂　厚朴　乾姜

甘草　練子（各等分）

右生姜水煎。

掃蟲煎（景岳）治諸蟲上攻。胸腹作痛。

青皮　小茴　吳茱（各一分）　檳榔　烏藥（各一分半）

細榧肉（三分敲碎）　烏梅（二箇）　甘草（八分）　硃砂　雄黃（各五分爲細末）

前八味水煎。入後二味。攪勻服之。

治腹内蟲方。（集驗良方）

烏梅（一箇）　老姜（三片）　榧子（一箇）　花椒（古箇）

黑糖少許。煎服。蟲盡出矣。

清中安蚘湯（傷寒辨註）治胃實熱。嘔吐長蟲。

黃連（姜汁炒。三分）　黃栢（酒炒。分半）　枳實（麩炒。二分）　烏梅（三箇）

川椒（去目。炒去汗。三十粒）

右生姜水煎。如胃中虛熱而嘔者。去枳實。加人參一分五分。

安蟲飲（幼科百効）治蛔蟲動。口吐清涎。

黃連　烏梅　乾姜　山查　厚朴

芍藥　史君子　枳實　陳皮　苦楝子

右水煎。

理中安蚘散（統旨）治吐蚘。

白朮　乾姜（各一分炒）　人參（三分）　白茯苓（一分半）

水二鍾。烏梅三箇。煎七分。服未止。加黄連黄栢各五分。川椒十四粒。若足冷甚者。加附子二分。大便秘者加大黄。蜂蜜。利之可也。

治腎熱勞。四肢腫急。蟯蟲如菜蟲。生腹中方。（千金）

貫衆（三枚熬）。　乾漆（二兩熬）。　吳茱萸（五十枚）　杏仁（四十枚）

蕪荑　胡粉　槐皮（各一兩）

右件為散。平旦以井花水服方寸匕。加至一匕半。瘥止。

安蟲散（直訣）治蟲動心痛。

胡粉（炒黄）　檳榔　川楝子　鶴虱（炒黄。各二兩。○醫通云。即天名精子。）

枯礬（一分）

右為細末。每服一字。大者半錢。温米飲調下。痛時空服。

⊙局方。用苦楝根。為丸。名化蟲丸。治蟲積諸痛。不的知病之處。

魏香散（直訣附方）

蓬莪茂（半兩）　真阿魏（一分）

右先用温水化阿魏。浸蓬莪茂一晝夜。焙乾。為細末。每

服一字。或半錢。煎紫蘇米飲。空心調下。

集効圓（局方）治蛔蟲動作。心腹攪痛。往來上下。口吐涎沫。

木香　鶴蝨（炒）　附子　訶子　蕪荑（炒）

檳榔　乾姜（各七兩半）　大黄（炮十五兩）

右爲末。蜜丸梧子大。食後橘皮湯下。

木香檳榔圓直指殺下諸蟲。

檳榔（一兩）　木香　鶴蝨　貫衆　錫灰

乾漆（燒）　史君子肉（各半兩）　輕粉（二錢）　雷丸

巴豆（各二錢半）

右細末。飛白麪糊圓麻子大。每服二十丸。五更粥飲下

追蟲丸（醫門祕旨）治諸蟲積塊。

大黄（八兩）　檳榔（五兩）　黑丑（四兩各爲末）　皂角（七箇）

苦楝根皮（一斤）

右先以皂角楝皮二味。用水一大梡。熬成膏子。和前三味。丸如梧子大。後用雷丸沉香木香各一兩。碾細爲衣。先用沉香衣。後用雷丸木香衣。每服三丸。四更時分用砂糖水下。

孫尚方醫綱治惡心則吐蟲數條。每用殺蟲藥。則吐蟲愈

多此藏寒而蟲不安。失居上膈。

硫黃　附子（各一兩）

右為末。粳米糊為丸。每三十丸。米飲下。㊀活幼全書名二聖散。治小兒腹脹水瀉。面足俱冷。脈沉微。菉豆大。每服十丸。空心乳汁下。秘傳屢驗。

欬嗽喘急

茯苓甘草五味姜辛湯金匱治欬胸滿。

茯苓（四兩）　甘草　乾姜　細辛（各三兩）　五味子（半斤）

右水煎。

射干麻黃湯金匱治欬而上氣。喉中水鷄聲。

射干（十二枚）　麻黃　生姜（各四兩）　細辛　紫苑

欵冬花（各二兩）　五味子（半升）　大棗（七枚）　半夏（大者八枚）

右水煎。

麥門冬湯金匱治大逆上氣。咽喉不利。止逆下氣。

麥門冬（七升）　半夏（一升）　人參（三兩）　甘草（二兩）　粳米（三合）

大棗（十二枚）

右水煎。○勞嗽。加阿膠。粟殼。五味子。或加柴胡。鱉甲。效。

小青龍加石膏湯（金匱）治肺脹。欬而上氣。煩躁而喘。脉浮者。

本方。加石膏二兩。

杏仁飲子（千金）治暴熱嗽。

杏仁（四十粒）　紫蘇子（一升）　橘皮（一兩）　柴胡（四兩）

右水煎服

小品生姜五味子湯（外臺）治欬。

五味（五合）　生姜（八兩）　紫菀（一兩）　半夏（二兩）　吳茱萸（一兩）

欵冬（半兩）　細辛（一兩）　附子（一枚）　茯苓（四兩）　甘草（二兩）

桂心（一兩）

右水煎。

深師蘇子湯（外臺）治氣上迫滿。或氣不通。煩悶喘嘔。

蘇子（一升）　乾姜（三兩）　半夏（四兩）　桂心　人參（各二兩）

橘皮　茯苓（各三兩）　甘草（一兩）

右水煎。若虛熱。去乾姜。用生姜。加黄芩二兩。

五味子散聖惠治卒上氣奔喘。

五味子（一兩） 麻黄（二兩） 甘草（一兩） 細辛（一兩） 貝母（一兩）

生姜（半分）

右水煎服。

乾姜散聖惠治氣嗽短氣。

乾姜 桂心 款冬（各半兩） 細辛 白术

甘草 木香 五味子（各三分） 附子（一兩） 大棗（二枚）

水煎服。

款冬花湯聖惠治暴嗽。

款冬花（二兩） 桑白皮 貝母 五味子

甘草（各半兩） 知母 杏仁（各三分）

右水煎。入門名貝母散。

柴胡散聖惠治肺氣暴熱。大便不通。時時欬嗽。喘息促急。

柴胡 桑白 鼈甲 檳榔 桔梗（各一兩）

甘草 旋覆花（各二兩） 大黄（二兩）

右生姜水煎。

澤漆散聖惠治欬嗽喘急。坐卧不得。面目浮腫。

澤漆 甘草（各半兩） 桑白 茯苓（各一兩半） 木通（一兩）

紫蘇莖葉（一兩） 陳皮 大腹皮（各三分）

右生姜水煎。

九寶湯蘇沉治積年肺氣

大腹 肉桂 甘草 紫蘇 杏仁

桑白皮（各一兩） 麻黄 陳皮 薄荷（各三兩）

右童便半錢。烏梅二箇。姜五片同煎。

人參清肺湯（局方）治肺胃虛寒。欬嗽喘急。及勞嗽。

地骨皮 人參 阿膠 杏仁 桑白

知母 烏梅 甘草 罌粟殼（各等分）

右入棗子一枚。水煎服。

華蓋散（局方）治肺感寒邪。欬嗽上氣。聲重鼻塞。呀呷有聲。

蘇子 茯苓 桑白 陳皮 杏仁

麻黄（各一兩） 甘草（二錢）

右水煎服。

麻黄散（局方）治久近肺氣欬嗽。喘急上衝。坐卧不安。痰涎壅塞。咳唾稠粘。脚手冷痺。心脇疼脹。

訶子皮（去核） 欵冬花 甘草（各五兩） 麻黄（十兩）

肉桂（六兩） 杏仁（三兩）

右入好茶一匁。煎服。

人參定喘湯（局方）治肺氣欬嗽。上喘氣急。喉中涎聲。胸滿氣逆。坐卧不安。飲食不下。

人參　麻黃　甘草　阿膠　半夏

桑白皮　五味子（各一兩半）　罌粟殻（二兩）

右生姜水煎。

五味子湯（活人）治喘促。脉伏而數者。

五味子（五匁）　人參　麥門冬　杏仁　陳皮（各一匁）

右姜棗水煎。（入門。名加味生脉散。）

南星飲（吳氏集驗）治痰涎咽喉不利。

半夏（七枚、每箇作四片）　大皂角（一寸去黑皮）　南星（半箇）　生姜（母指大一塊）

甘草（三寸）

右水煎冷服。

真武湯（直指）治少陰腎証。水飲與裏寒、合。而作嗽。腹痛下利。

本方。加生乾姜。細辛。五味子。各半匁。姜三片。凡年高年弱久嗽通用。仍間服養正丹。

加味理中湯（直指）治肺胃俱寒、咳嗽。

本方合二陳湯。加細辛。五味子。（各等分）

人參芎歸湯直指 治虛勞少血。津液內耗。心火自炎。燥熱乘肺。咳嗽咯血。及血不榮肌。

當歸 川芎 芍藥 人參 半夏

橘皮 茯苓 阿膠 細辛 五味子

甘草（各等分）

右姜棗水煎。

黃耆建中湯直指 治欬嗽痰唾。面色黧黑。小腹動氣作痛。

本方。加半夏。乾姜。五味子。

千緡湯直指 治痰喘不能卧。人扶而坐。一服即安。

半夏（七箇） 甘草（一寸） 生姜（一指） 皂角（一寸）

右水煎。

紫蘇散本事 治肺感風寒作嗽。

紫蘇 桑白 青皮 五味子 杏仁

麻黃 甘草（各等分）

右水煎

治十六般哮嗽。本事

黃明膠（二兩炙）。 馬兜鈴 甘草 半夏

杏人（各一兩） 人參（半兩）

右水煎服。

貝母湯（本事）治諸嗽久不差。

貝母　黄芩　乾姜　陳皮　五味子（各一兩）

桑白　半夏　柴胡　桂枝（各半兩）　木香（一分）

甘草（一分）　杏仁（七箇）

生姜七片。水煎。

細辛湯（本事）治肺虚實不調。鼻塞多涕。咽中有涎而喘。項强急或痛。

細辛　半夏　茯苓　桔梗（各四分）　桂枝（三分）

甘草（二分）

右姜四片。蜜半匙。水煎。

息賁湯（三因）治肺之積在右脇下。大如覆杯。久久不愈。病洒洒寒熱。氣逆喘咳。發為肺癰。

半夏　呉茱萸　桂心（各二兩半）　人參　甘草

桑白　葶藶（各一兩半）

右姜七片。棗二枚。水煎服。

四磨湯（濟生）治七情傷感。上氣喘急。妨悶不食。（方見氣門）

杏子湯（易簡）治一切咳嗽。不問外感風寒。内傷生冷。皆治

療。

人參　半夏　茯苓　細辛　乾姜

芍藥　甘草　官桂　五味（各等分）　杏仁（去皮）

右姜五片。水煎。○局方去人參茯苓加陳皮名温肺湯

沉附湯（易簡）治氣虛喘急。或發欬嗽。

生附（四分）　生姜（四分）

水二盞。煎六分。臨熟磨沉香少許。調鍾乳粉點下。

人參胡桃湯（百一）治痰喘。出夷堅已志第三卷

人參（壹寸許）　胡桃肉（二箇去殼。不剝皮）

右煎湯服。蓋人參定喘。帶皮胡桃斂肺故也。○經驗祕方。治氣壅滯。喉下結作成塊。大都李娘娘經驗。以二味煎湯服之。月餘大効。

滌痰湯（外科正宗）治心乾肺金。久而不愈。傳為肺痿。咽嗌嘶啞。胸膈痞悶。嘔吐痰涎。喘急難臥者。

陳皮　半夏　茯苓　甘草　麥門

胆南星　枳實　黄連　人參　桔梗（各壹分）

竹茹（一分）

右水煎服。

紫菀茸湯（正宗）治膏粱厚味。飲食過度。咳嗽咽乾。吐痰唾血。喘急脇痛。不得安卧。

紫菀茸　犀角　炙甘　人參（各五分）　桑葉（用經霜者）

款冬花　百合　杏仁　阿膠　貝母

蒲黃（各七分）

右姜三片。水煎。入犀角末服之。

麻黃蒼朮湯（蘭室）治秋冬夜嗽不絶。至曉方緩。口苦胸痞脇痛。痰唾涎沫。不進飲食。

麻黃（八分）　蒼朮（五分）　黃芪（一分半）　草豆蔻（六分）　柴胡

羌活（各五分）　防風　當歸　甘草（各四分）　黃芩（三分）

五味（十五粒）

右水煎服。

加減瀉白散（寶鑑）治胸膈不利。煩熱口乾。時時欬嗽。

知母　陳皮（各五分）　桑白皮（一兩）　桔梗　地骨（各五分）

青皮　甘草　黃芩（各三分）

右水煎。

觀音救苦散（修月魯般經後錄）

人參　當歸　滑石　甘草　罌粟殼（蜜炙）

右爲㕮咀。用烏梅一枚。白水二鍾。臨睡煎服。

降氣化痰湯 統旨 治喘因于痰者。喘則便有痰聲。

紫蘇子（炒擂碎。一分半） 前胡 半夏 茯苓 橘紅

桑白皮 杏仁炒 瓜蔞仁（炒。各一分） 甘草（五分）

姜三片水煎。

均氣八仙散 壽世 治哮喘氣急。而不得息。

麻黃（二分） 杏仁 桔梗 黃芩（各三分） 知母（二分）

貝母（一分） 石膏（三分） 甘草（一分）

右水煎。

沉香散 壽世 治腹脹氣喘。坐卧不得者。

沈香 木香（各二分半） 枳殼 蘿菔子（各三分）

右生姜水煎。

清火寧嗽湯 濟世 治欬嗽吐痰。有熱。胸中痞悶。

桔梗 枳實 前胡 貝母 赤茯

黃芩 麥門 桑皮 甘草

右生姜水煎。○統旨。無枳實。茯苓。麥門。有山梔。知母。名

清咽寧肺湯。

三子養親湯 濟世 治老人痰嗽氣喘。

白芥（研八分）　蘿蔔（研七分）　蘇子（研）　南星（各八分）　半夏（九分）
黃芩　茯苓（各八分）　陳皮　枳實（各六分）　甘草（二分）
右生姜水煎。○韓氏醫通原方用三子各等分。

滋陰降火湯（濟世）治陰火動發熱欬嗽吐痰喘急。
百部（三錢）　生芐　熟芐　天門　麥門
知母　貝母　白朮　芍藥　茯苓
黃芪　地骨皮（各一錢五分）
右水煎服。夜熱加鼈甲。痰中帶血加阿膠。

二母寧嗽湯（醫鑑）治傷飲食。胃火上炎。衝逼肺氣。痰嗽不愈。
石膏（一錢）　貝母　知母（各一錢半）　梔子　黃芩（各一錢二分）
桑白皮　茯苓　瓜蔞仁　陳皮（各一錢）　枳實（七分）
甘草（二分）　五味子（十粒）
右生姜三片水煎。

九味理中湯（回春）治寒喘。手足冷。脈沉細。
縮砂　乾姜　蘇子　厚朴　桂枝
陳皮　甘草（各一錢）　沉香　木香（各五分）
右水煎。入二香磨汁調服。

阿膠散（識病捷法）治肺破嗽。嗽出聲音覺破鑼聲。唾血（方見血証門）

橘蘇散（正傳）治傷寒、咳嗽。身熱有汗。惡風脈浮者。

陳皮　木香　半夏　桑白皮　貝母

五味子（各一錢）紫蘇　杏仁　甘草（各五分）

右生姜水煎。

射干兜苓湯（玉衡）治痧似傷風欬嗽。

射干　桑皮　兜苓　桔梗　薄荷

玄參　花粉　貝母　枳殼　甘菊

金銀花（各等分）

右水煎。嗽甚。加童便飲。

獨參湯（入門）治氣虛喘急。服之喘定者生。不定者死。

生脈散　治大喘痰出如泉。身汗如油。脈浮而洪。似命將絕。

哮喘久不止。不拘老小。一服即止。並治小兒奶哮。（幼幼集成）

石膏　半夏　瓜蔞仁　陳皮　麻黃（各錢五分）

枳實　杏仁（各一錢）甘草（七分）生姜（五片）

右水煎服。

六安煎（景岳）治風寒欬嗽。及非風初感。痰滯氣逆等。

陳皮（一錢半） 半夏（三錢） 茯苓（二錢） 甘草（一錢） 杏仁（二錢）

白芥子（五七分）

生姜水煎。

八味地黄加鉄落湯（藥性纂要）治一少年哮喘者。其性善怒。病發寒天。毎用桂附八味地黄湯及黒錫丹而平。一次用之未効。加生鉄落於八味湯中。一劑而愈。又治一頻嗽痰甚者。即於桑杏枳桔前蘇陳半湯劑中加而用之。一服遂定。○張飛疇醫案。喘難休息。脈細數而面赤戴陽。用大劑六味地黄作湯。加青鉛兩許。（方出虚勞門）

治哮喘一方（播生）金陵一鋪家以此方治哮喘。無不效者。因以起家。

白菓（炒二十箇） 麻黄（三錢） 蘇子 半夏 欵冬花

桑白皮（各二錢） 炒芩（一錢五分） 杏仁 甘草（各一錢）

右水煎分服。

竹茹湯（會解）治支飲欬嗽涎湧氣逆。胸滿膈痛。

蘿蔔子 蘇子 白芥子 桔梗 竹茹

枳實 青皮 杏仁 竹瀝 桑白皮

姜汁

右水煎服。

人參湯（會解）治肺虛欬嗽。

生南星　人參　陳皮　烏藥　枳殼

真蘇子

右生姜五片。水煎。磨木香刺服。

阿膠湯（會解）治肺欬唾。

麥門冬　黃栢　知母　生地黃　阿膠

歸尾　桑白皮

右水煎。有痰。加貝母。

凉血湯（會解）治胃欬嘔血。

梔子（炒）　黃芩　白茅　知母　桔梗

甘草　赤芍　側栢葉

右生姜水煎。

定喘飲（大還）

蘇子（二戔）　麻黃　欵冬　桑皮　半夏（各三戔）

杏仁　甘草（各半戔）　白菓（二十一枚。炒）

右水三鍾。煎至二鍾。徐徐服。

百部湯（彙言）治久嗽不已。咳吐痰涎。重亡津液。漸成癆。

卧則偏左。其嗽少止。偏右嗽必連發。甚則喘急。痰多氣[illegible]

姉。

百部　薏苡　百合　麥門（各三匁）　桑白皮

茯苓　沙參　黄芪　地骨皮（各一匁五分）

右水煎服。

治肺氣拂逆。痰滯成咳。欬聲連發。努氣不轉。痰逆不出。俗

名頓嗆。（彙言）

枇杷葉（十片）　前胡　防風　薄荷　杏仁

桑白皮　蔞仁　桔梗（各一匁五分）　甘草　升麻（各七分）

右水煎服。

治冬夏冷哮痰喘。（彙言）

麻黄　半夏　蘇子　皂角　白芥子

右配二陳湯。立驗。

治内熱欬嗽多痰。（彙言）

天花粉（一兩）　杏仁　桑白　貝母（各三匁）　桔梗

甘草（各一匁）

右水煎服。

巽雲子方。治欬逆。氣急而喉卿（今之頓嗆也）曰焦。欒湯也（彙言）

茯苓（二分）　半夏（一分）　陳皮（八分）　甘草（五分）　麥門冬（[illegible]）

知母　　黃芩（各一分二分）

水煎服。

治大人小兒頻欬不止（本草彙言）

用白蘿蔔汁一碗。飴糖五錢。蒸化。乘熱緩緩呷之。○

紫蘿蔔切厚三分許。一片。置碗中。盛飴糖於其上。二三時。蘿蔔浮飴糖上。枯萎如曝乾者。取飴糖。時時呷之。太驗。此方閣老泉侯嘗語予云。

療欬上氣。喘息便欲絶方。（肘後）

末人參。服之方寸匕。日五六。

清肺散蘇沉治肺喘氣短。

蒲頽葉

右一味。擣羅爲細末。每服二錢匕。温水調下。發時服。有人患喘三十年者。服之皆愈。疾甚者。服藥後胸上生小癮疹痒者。其疾則差。一方。用人參等分。

麥花散（朱氏集驗）治肺氣脹實。喘急胸滿。

大麥麪　芫花（醋浸一宿。煮乾炒。）

右等分爲末。每服一錢。柳枝煎湯。調服食後。

石夏圓（朱氏集驗）治痰嗽。

半夏（包）（二兩）。　滑石（一兩火煅去火毒）。

右生姜糊爲丸。如梧桐子大。不拘多少白湯調下。

黃牛散（朱氏集驗）治肺熱脈滑大。氣急喘滿。

大黃（一兩）　白牽牛（二兩）

右爲末。蜜水調二錢立止。又用皂角膏爲圓亦可。

胡椒理中丸（聖濟）治三焦欬。肺胃虛寒。欬逆嘔吐。腹脇脹滿。不能飲食。

胡椒　蓽撥　乾姜　欵冬花　甘草

陳皮　良姜　細辛（各二兩）　白朮（二兩半）

右爲末。鍊蜜丸。如梧桐子大。每服十五丸。温水下。日再服。

鱉甲散（本事）治勞嗽。及鼻流清涕。耳作蟬鳴。眼見黑花。

北五味（二兩）　鱉甲（三兩）　地骨皮（三兩）

右爲末。煉蜜圓如梧桐子大。空心食前。温酒或鹽湯服三十五十圓。婦人醋湯下。此方曲江人家祕方。妙甚。

治寒嗽如神。（衛生十全）

川薑（一兩）　人參（半兩）

右爲末。溶軟餳爲丸。如彈子大。每用一丸。含化嚥津。

百花膏（濟生續方）治喘嗽不已。或痰中有血。

欵冬花　百合（蒸焙）

右等分。爲細末。煉蜜爲圓。龍眼大。每服一圓。食後臨臥。細嚼。姜湯嚥下。噙化尤佳。

石膏散（宣明）治熱嗽喘甚者。

石膏（二兩）　甘草（半兩炙）

右爲末。每服三錢。新汲水調下。又生姜汁蜜調下。○景岳用石膏六兩。甘草一兩。亦名六一甘露散。又名玉泉散。或人參湯下。此方。加朱砂三分亦妙。

九仙散（寶鑑）治一切欬嗽。太醫王子昭傳。甚效。

人參　欵冬　桑白　桔梗　五味子

阿膠　烏梅（各一兩）　貝母（半兩）　御米殼（八兩）

右爲末。每服三分。白湯點服。

人參清鎭丸（寶鑑）治熱止嗽。消痰止喘。

人參　柴胡（各一兩）　黃芩　半夏　甘草（各七分）

麥門冬　青黛（各三分）　陳皮（二分）　五味子（十三粒）

右爲末。麵糊丸。桐子大。

當歸飲（得効）治因打撲損傷。肺氣欬嗽。吐黑血。

大黃　蘇木　生芐　當歸　芍藥（各等分）

右爲末。每三錢。溫酒調服。

諸欬丸（入門）諸欬通用。傷風欬甚。發表後。以此斷根尤妙。

陳皮　百藥煎　枳殼　半夏麴　訶子

知母（各等分）

右姜汁爲丸。白湯下。

趙府濟急方。治咳嗽。氣虛散不止者。（本綱）

訶黎勒（三箇）　五味子　貝母（各三錢）　杏仁（一錢）（醫鑑）。

阿膠（五分）

共爲細末。每早晚各服二錢。白湯調下。

經驗方。治遠年痰喘。（醫學六要）

桑木內蠹蟲（炒一斤）。蘿蔔子（炒半斤）。杏仁（炒半升）。甘草（二兩）

右共爲末。湯浸。蒸餅爲丸。桐子大。每服五七十丸。淡姜湯下。

又方（醫學六要）

猫兒頭骨。燒灰。酒調二三錢。即止。

方脈正宗。治老人痰火。咳嗽。頻發。胸脇滿悶。百節攻痛。形

羸氣弱。飲食少進。（彙言）

大豆黃卷（一觔）

晒乾炒燥。為細末。每晩服一錢。黑棗泡湯調下。

案古方。欬嗽則大腸遺矢者。用禹餘糧。赤石脂。各等分。總和以黑豆煮過。為極細末。每服二錢。白湯調服。（彙言出典未詳）

止嗽散（心悟）治諸般咳嗽。

桔梗　荊芥　紫苑　百部　白前（各二斤）

甘草（炒二兩）　橘紅（一斤）

共為末。每服三錢。開水調下。服者多効。

瘧疾

白虎加桂枝湯（金匱）治溫瘧。身無寒但熱。骨節疼煩。時嘔。

白虎湯本方。加桂枝三兩。

柴胡桂枝干姜湯（金匱附方）治瘧寒多微有熱。

柴胡去半夏加栝蔞湯（外臺）治瘧病發渴。

又知母鱉甲湯（外臺）治溫瘧。壯熱不能食。

知母　鱉甲　地骨皮（各三兩）　常山（一兩）　竹葉（一升）

石膏（四兩）

右水煎服。

清脾湯 局方 治胃瘧或痰聚胸中煩滿欲嘔

厚朴（四兩） 烏梅 半夏 青皮 良姜（各二兩）

草菓（一兩） 甘草（半兩）

右姜棗水煎（得効名小清脾湯）

四獸飲 三因 治五藏氣虛結聚涎飲與衛氣相搏發為瘧疾

半夏 茯苓 人參 甘草 陳皮

烏梅 白朮

右棗姜水煎㊀易簡有草菓等分

大正氣散 三因 治山嵐瘴氣發作寒熱遂成瘧疾

附子 厚朴 桂心 甘草 乾姜

陳皮（各一兩） 茱萸（半兩微炒）

右姜棗水煎○兼治霍亂吐瀉一切氣疾

養胃湯 三因 治胃虛寒寒熱如瘧面目浮腫嘔噦吐瀉

厚朴 藿香 半夏 茯苓（各一兩） 人參

甘草 附子 橘皮（各三分） 草菓 白朮（各半兩）

右姜棗烏梅水煎

清脾湯 濟生 治瘅瘧但熱不寒或熱多寒少

青皮　厚朴　白朮　草菓　柴胡

茯苓　半夏　黄芩　甘草（各等分）

右生姜水煎。

萬安散（濟生）治一切瘧疾。得病之初。以其氣壯。進此藥以取効。氣虚胃弱。及妊婦不宜服。

蒼朮（炒）　厚朴（炒）　甘草（炙）　檳榔　常山（酒浸）

陳皮（各一戔半）

右水煎服。

菓附湯（濟生）治脾寒。瘧疾不愈。振寒、少熱。面青不食。或大便溏泄。小便反多。

草菓　附子（炮各等分）

右姜棗水煎。

當歸鱉甲散直指治勞瘧寒、熱。

當歸　川芎　芍藥　青皮　陳皮

茯苓　半夏（各一兩）　鱉甲（醋炙半兩）

右姜棗水煎。

鱉甲白朮散楊氏治久瘧寒、熱相等。汗多。腰脊重痛。

鱉甲　常山　芍藥　柴胡（各一兩）　白朮（二兩）

牡蠣（半兩）

右生姜水煎。

茈苓湯（得効）治瘧在半表半裏。陰陽不分。

即小柴胡湯。合五苓散。

右水煎服。

四將軍飲（得効）治瘧作時仆厥。撼掖不醒。是中心抑鬱。陰陽交戰所致。先依灸法。仍服此藥。

附子（一兩）　訶子（四箇）　陳皮（四箇）　甘草（四寸）

生姜七片。棗七枚。水煎。

藿香散（御藥）治諸瘧。胸中痞悶。痰逆嘔吐。

厚朴　半夏　生姜（各一兩）　藿香　甘草

草菓　橘皮（各一錢）

右水煎。

柴平湯（醫考）治瘧發時。一身盡痛。手足沉重。

即小柴胡湯。合平胃散。○醫林撮要云。治瘧累有効驗。空心五更時服。

參姜湯（薛氏）治虛瘧久不愈。○奇効醫述。人參。貝母。二味等分。水煎服。

截瘧如神散（濟世）治瘧壯盛者宜之。

柴胡　半夏　檳榔　黒丑（各一錢）　常山（一錢二分）

甘草（二分）

右水煎臨服入黄酒。未發前一時服。

柴胡芎歸湯（回春）治夜間陰瘧。引出陽分則散。

柴胡　桔梗　當歸　川芎　芍藥

人參　白朮　乾葛　茯苓　陳皮

厚朴（各一錢）　紅花　甘草（各三分）

右姜棗烏梅水煎。

截瘧飲（必讀）虛人久瘧不止。此極効。

黄芪（二錢）　人參　白朮　茯苓（各一錢五分）　砂仁

草菓　橘紅（各一錢）　五味子（八分）　甘草（六分）　烏梅（三箇）

右生姜大棗水煎。

芎歸鼈甲散（入門）治勞瘧寒熱。

鼈甲（一錢）　川芎　當歸　茯苓　芍藥

半夏　陳皮　青皮（各五分）　烏梅（一箇）

右姜棗水煎服。

治瘧（經驗祕方）撒好德搃管累治人瘥。

右用馬鞭草根。不以多少洗淨。水一茶盞半。煎至七分。臨熟著酒半盞。滚數沸。連滓露一宿。次日未發時温服。

補中益氣湯。醫通有瘧痢齊發者。嘗遍攷昔人治例。惟此方爲合劑。○薛氏治患瘧寒熱。用止截之劑。反發熱惡寒。飲食少思。神思甚倦。加炮姜。附子。

瘧母者。頑痰挾血食。而結爲癥瘕。此方主之。（張氏醫通）

小柴胡湯加鱉甲。蓬朮。桃仁。（俱醋製）

清中驅瘧飲（六要）治瘧疾初起。胸膈飽悶。

半夏　橘紅　柴胡　黄芩　檳榔　草菓　山查　青皮　厚朴　蒼朮

右姜棗煎。口乾加花粉。黄連。

治瘧疾久不愈。（本草彙言）

用三白草。連葉莖根。一總搗爛絞汁。熱湯頓温飲一二碗。胸中痰涎盡出也。

河氏理脾散（撮要）治瘧後不忌酸物茄菓。復發者。累效。

白朮　草菓　乾姜　甘草（各五分）　桔梗

青皮　半夏（各七分）　烏梅　呉茱萸（各二分半）

右切。分作十服云。（不見方書。河中攝宗海述）

治瘧經年不瘥方。（千金）

恒山為末。以鷄子白。丸梧子大。置銅撓中。於湯中煮。令熟。殺腥氣。以竹葉飲服二十丸。欲吐但吐。至發令得三服。時早可斷食。時晩不可斷食。可竹葉汁煮糜。少食之。

延年療瘧丸（外臺）

常山（三兩）　甘草（二分）　知母（四分）

右為末。蜜丸如梧子。未發前飲服十五丸。臨發服十五丸。得快吐則愈。○千金加鼈甲。名常山丸。治脾瘧。

嘔吐胃反

呉茱萸湯（金匱）治嘔而胸滿。又治乾嘔吐涎沫。頭痛。

半夏瀉心湯（金匱）治嘔而腸鳴。心下痞者。

四逆湯（金匱）治嘔而脈弱。小便復利。身有微熱。見厥者。

小柴胡湯（金匱）治嘔而發熱者。

大半夏湯（金匱）治胃反嘔吐者。

半夏（二升）　人參（三兩）　白蜜（一升）

右三味。以水一斗二升。和蜜揚之二百四十遍。煮取二升半。温服一升。

五苓散（金匱）治水逆。水入則吐。

大黃甘草湯（金匱）治食已即吐者。

大黃（四兩）　甘草（一兩）

右水煎。

茯苓澤瀉湯（金匱）治胃反。吐而渴欲飲水。

即五苓散去猪苓。加甘草生姜。水煎。○千金。無白朮。

有半夏外臺。名小澤瀉湯。

生姜半夏湯（金匱）治胸中似喘不喘。似嘔不嘔。似噦不噦。徹心中憒憒然無奈者。

半夏（半斤）　生姜汁（一升）

右以水三升。煮取二升。内生姜汁。煮取一升半。小冷服。

單甘草湯（千金）凡服湯嘔逆不入腹者。先以甘草三兩。水三升。煮取二升。服之得吐。但服之不吐益佳。消息定後。服餘湯。即流利更不吐也。

麥門冬飲（外臺）主風邪熱氣衝心。心悶短氣。吐不下食。

麥門冬（二兩）　人參（一兩）　橘皮（一兩）　生姜（三兩）

羚羊角（一兩屑）

右水煎服。

麥門冬散聖惠治反胃嘔吐食煩熱。

麥門冬　半夏（半兩）　陳皮（三分）　茯苓（三分）　甘草（一分）

枇杷葉（一分）　人參（三分）

姜半分。棗三枚。水煎。

參粟湯聖濟治乾嘔不下食。

人參（一兩）　陳粟米（一兩半）　生姜（五兩）　半夏（四兩）

生姜三片。大棗二枚。水煎。

張渙養中湯（幼幼）養脾胃嘔吐不止。

附子（一枚）　沉香　木香（各半兩）　人參（一兩）　官桂

半夏（各兩）

生姜三片。水煎。

竹茹湯（本事）治胃熱嘔吐。

乾葛（三兩）　炙甘　半夏（各三分）　竹茹（一彈丸大）

右姜三片。棗一箇。水煎。

丁香温中湯（易簡）治嘔逆惡心者。

人參　乾姜　白朮　甘草（各二兩）　橘紅（三兩）

半夏（一兩）　丁香（半兩）

右生姜十片。水煎。○案此局方治中湯。加丁子半夏者。

又方考。理中湯。加丁香。治嘔吐腹痛。

增損白朮散（易簡）治嘔吐。

即理中湯。加半夏。茯苓。姜棗。

翻胃湯（葉氏）治胃反嘔吐。胸膈不利。食即經宿吐出酸臭。

茯苓（二兩）　厚朴（二兩）　陳皮（一兩）　白朮（一兩）　人參（一兩）

吳茱萸（一兩）

右姜棗水煎。

孟詵治凡患胃虛并嘔吐。食及水者。以米汁二合。薑汁一合。和一服之佳。（証類）

旋覆花湯（濟生）治中脘伏痰。吐逆眩暈。

旋覆花　半夏　橘紅　乾姜（各一兩）　檳榔

人參　甘草　白朮（各半兩）

右生姜水煎。

溫中益氣湯（寶鑑）治中氣不足。四肢困倦。躁熱惡寒。時作疼痛。不欲食。食即嘔吐。氣弱短促。怠惰嗜臥。

附子　乾姜（炮各五分）　草豆蔻　甘草（炙各三錢）　益智仁

白芍藥　丁香　藿香　白朮（各二分）　人參

陳皮　吳茱萸（各一分）　當歸（一分）

右十三味。水煎服。

三乙承氣湯（經驗良方）治嘔吐。水漿不入。或食已即吐。大便祕。或利而不鬆快。時覺腹滿者。或下利赤白。而嘔吐食不下者。或大腸小腸膀胱。結而不通。上為嘔吐隔食。

川大黃　厚朴　枳殼　芒硝（各半兩）

甘草（一兩）

右水一盞。生姜三片。煎至六分。入硝細細嚥服。

歸脾湯加吳茱萸（薛氏醫案）治一婦年三十餘。忽不進飲食。日飲清茶三五椀。少用水菓。經三年矣。經水過期而少。此

思慮傷脾。脾氣鬱結所致。用此不數劑。而飲食如故。

六君子加吳茱萸（薛氏醫案）治一婦肝脾鬱滯。而不飲食。二年面色微黃浮腫。仍能步履。但肢體倦怠。用此下痰積甚多。飲食頓進。

若人飜胃病。乾柹兩三枚。擣勻和酒服。效驗不須疑。（海上仙方）

理中湯加童便猪膽（醫學研悅）嘔久。而諸藥不納者。此胃口壯火關格之病也。煎服此藥。妙不可言。

凡反胃證。不可強進飲食。或強進羹湯。是速其吐。令得其法。不強以食。絕其湯水。飢則以飯炒香乾啖之。一些湯

水不可進。兩三日後。竟不復吐。飲食如初。然後用甘蔗湯汁七升。姜汁一升。和匀服。（經驗祕方）○反胃證。得藥而愈者。切不可便與粥飯。惟以人參五錢。陳皮二錢。老黃米一兩。作湯。細啜。旬日之後。方可食粥。倉廩未固。不宜便進米穀。常致不救。（準繩）每日與獨參湯。少加炒陳米。煎服之（醫通）○惟食乾餅餌。盡去羹飲水漿。藥亦用丸。自不反動。調理旬日。奇效。有人三世死於反胃。至孫得此方。如神。（得效方）

半夏藿香湯（瘟疫論）治胃氣虛寒。下後反嘔。

半夏（錢半）　藿香（一錢）　乾姜　茯苓　陳皮

白朮（各一錢）　甘草（五分）

右水煎服。

半夏生姜大黃湯（必讀）治朝食夕吐。此下焦病。

半夏　大黃（各二兩）　生姜（一兩半）

右水煎服。

六君子加赤石脂（必讀）治嘔清水者。多氣虛。○喻嘉言更加旋覆花。治膈證。飲粒全不入口。（方出脾胃門）

比和飲（壽世）治久病胃虛。嘔吐。不納水穀。藥亦嘔者。

人參　白朮　茯苓　神麯（各一錢）　藿香（五分）

陳皮（五分）　砂仁（五分）　甘草（三分）

用陳倉米水煎。伏龍肝末攪渾澄。取姜棗同煎。稍冷服。

有人病嘔吐。服玉壺諸丸不効。用藍汁入口即定。蓋亦取其殺蟲降火爾。（本綱發明）

一方（傷寒本義）治上熱下寒嘔吐。

人參　呉茱萸　乾姜　黃連（各等分）

右水煎。

周愼齋。治一人飲食如常。每遇子時即吐。大便祕。詢其人必有苦慮憂思。脾氣鬱結。故幽門不通。宜扶脾開竅爲主用。（醫通）

人參　白朮（以蒼朮拌炒）　茯苓（各一錢）　炙甘草（五分）

附子煮烏藥（三分）

右水煎服愈。

嘔泄諸証者。沙糖與烏梅。煎湯飲之立安。（寒言）

半夏乾姜散（金匱）治乾嘔吐逆。吐涎沫。

乾姜　半夏（等分）

右爲散。取方寸匕。漿水煎服。

猪苓散（金匱）嘔吐而病在膈上。後思水者主之。

猪苓　茯苓　白朮（各等分）

右為散。服方寸匕。

華佗治胃反方（千金）胃反為病。朝食夕吐。心下堅如杯升。往来寒熱。吐逆不下。此為關上寒澼所為。

真珠　雄黄　丹砂（各三兩）　朴消（五兩）　乾姜（十累）

右為末。蜜丸如梧桐子大。先食服三丸。若小煩者。飲水即解。

赤石脂散（千金翼）治痰飲盛吐水不停者。

赤石脂末服方寸匕。日三。酒飲並可。稍稍加至三匕。

古今錄驗一方（外臺）治胸膈痰飲食噉經日則併吐出食皆不消。出如初。空腹一兩日。聚食還復吐之。極不便。此由痰飲聚下。絶不通。服此丸宣通下氣

呉茱萸　澤瀉　芍藥　白朮　防己

茯苓（各二兩）　大黄（二兩）

右蜜丸。如桐子大。飲服二十丸。（今為湯服）

紫粉丸（蘇沈）治大人小兒吐。

鍼砂醋浸一宿。碎去醋。便帯醋炒。直候并銚子紅色

無烟。乃止。候冷細研。更用醋圍。火燒洞赤。取起候冷。再研極細。麪糊丸。如梧桐子大。每服四十丸。粥飲下。服訖便喫一琖許粥。已不吐。如未定。再服決定。小兒小丸之。隨兒大小。與此藥極神異。

治男女久患冷痃翻胃。口吐清水。遍身虛腫。胸腹脹滿。上氣喘急。及冷氣築心。面色萎黃。不進飲食。（衛生十全方）

眞針砂（一斤。先淘去赤水。令清了。却以米醋煮炒紅色。）　蒼朮（半斤。炒赤）　陳皮（去白）

乾姜（炮。各五兩）

右為末。以蒸餅糊丸。如梧子大。空心溫酒送下三十丸。

婦人醋下。忌生冷毒物。

養正丹（易簡）翻胃之患。皆因中脘停痰。涎飲凝滯。食入即吐。當用此藥。以生姜熟附各四分。丁香十粒。同煎嚥下。恐丁附性熱。則於二陳湯中。選藥用之。（方出中風門）

古阿魏散（入門）治反胃。能起死回生。

阿魏（五分）　大路邊乾人糞（炒存性。五分半。）

共為末。五更初。以姜片蘸食。

紅豆丸（必讀）治嘔逆膈氣。反胃吐食。

丁香　胡椒　砂仁　紅豆（各二十一粒）

右爲末。姜汁糊丸皂角子大。每服一丸。以大棗一枚去核。塡藥。紙裹煨熟。去紙細嚼。白湯下日三服。

治悲傷過度。隨食隨吐。二便閉澁。脈按有力。（必讀）

酒蒸大黃　桃仁　當歸　砂仁　陳皮

右蜜丸。

代赭石散（集驗良方）治一切嘔吐不止。

用旋覆花。不拘多少。入代赭石細末一錢。調服即嘔止。

塞鼻用藥（幼幼集成）大凡嘔吐不納藥食者。最難治療。蓋藥入即吐。愈吐愈翻。萬不能止。予之治此頗多。先將姜湯和土作二泥丸。塞其兩鼻。使之不聞藥氣。然後用對症之藥煎。好斟出澄清。冷熱得中。止服一口即停之。半時之久。再服一口。又停之。良久服二口。停之少頃。則任服不吐矣。斯時胃口已安。焉能得吐。

頃治一人年及三旬。患嘔吐經年。每食後半日許。吐出原物。全不穢腐。大便二三日一行。不燥結。小便時白時黃。諸藥罔効。此腎藏眞陽大虧。不能温養脾土之故。遂以崔氏八味丸與之。服之不終劑而愈。（醫通）

噦

橘皮湯（金匱）治乾嘔若手足厥者。

橘皮（四兩）　生姜（半斤）

右水煎。○外臺廣濟橘皮湯本方有甘草。枇杷葉。

橘皮竹茹湯（金匱）治噦逆。

橘皮（二升）　竹茹（二升）　大棗（卅枚）　生姜（半斤）　甘草（五兩）

人参（一兩）

右水煎。○三因有茯苓。枇杷葉。麥冬。半夏。治胃熱多渴。

嘔噦不食。○壽世加柿蒂。丁香。又去大棗。加白朮。茯苓。

半夏。五味子。麥門冬。名人參復脈湯。治呃逆而無脈者。

柿蒂湯（濟生）治咳逆。

丁香　柿蒂（各一兩）　姜（五片）

右水煎○家寶方。名順氣湯○三因方。加良姜甘草○易簡方。加半夏生姜○潔古。不用姜。加人參。名柿錢散○寶鑑。有陳皮。青皮。無生姜。

八物湯加竹茹（寶鑑補遺）治身熱脈雖數而虛而吃逆。

竹茹黃連柿蒂湯（丹溪）治熱呃。

丁附人參柿蒂湯　治寒呃。

平胃二陳湯加柿蒂（準繩）治飲食痰氣作呃。

三黃瀉心湯　小承氣湯　調胃承氣湯　桃仁承氣湯（準繩）並治實熱發呃者。

參附湯（薛氏）治陽氣虛寒。自汗惡寒。或手足逆冷。大便自利。或臍腹疼痛。呃逆不食。或汗多發痙等証。

黃連解毒湯　白虎湯（回春）傷寒熱症。醫者誤用姜桂等藥。助起火邪。相搏而呃逆者。

刀豆煅存性。服勝于柿蒂。（本草備要）

木香調氣散（醫方考）治中焦水谷留滯。發呃者。

木香　擅香　白蔻仁　丁香（各三兩）　砂仁（四兩）
藿香　甘草（各半兩）

生姜。鹽一撮。水煎。或為末。鹽湯下。

吳茱萸丸（御藥院）治氣自腹中起。上築於咽喉。逆氣連屬。而不能出。或至數十聲。上下不得喘息。此由寒傷胃脘。腎氣先虛。逆氣上乘於胃。與氣相併不止者。難治。俗謂之噦。宜此丸。

橘皮（一兩）　吳茱萸（醋炒）　附子（炮各一兩）

右為末。白麪糊丸。如梧桐子大。每服七十丸至八十丸。温生姜湯下。食前。灸中脘。關元。百壯。未止。灸腎俞。（資生經）（必用方）

噫氣呑酸嘈雜吐酸

旋覆代赭石湯（傷寒論）治心下痞。噫氣不除。

小品半夏茯苓湯（外臺）療心腹痰水。心下汪洋嘈煩。或水鳴。多唾口吐清水自出。脇肋急脹痛。

半夏（五箇）　生姜（五兩）　茯苓（三兩）　旋覆花　桂心（各一兩）

橘皮　人參　桔梗　芍藥　甘草（各一兩）

右水煎服。○本事方。加細辛。名旋覆花湯。

白朮散（外臺）療嘔吐酸水。結氣築心。

白朮　茯苓　厚朴（各八分）　橘皮　人參（各六分）

蓽撥（四分）　呉茱萸（四分）　檳榔（十分）　大黄（十分）

右水煎服。（原為散用）

呉茱萸湯（外臺）療食訖醋咽多噫。（即傷寒論本方）

枳殼散（本事）治心下痞悶。多噫敗卵氣。（方出痞満）

和中湯（醫統）治虛火嘈雜。

即六君子湯。（方出脾胃門）加黄連。（姜炒）大棗。粳米。

清鬱二陳湯（回春）治酸水刺心。及吞酸嘈雜。

陳皮　半夏　茯苓　香附　黄連

梔子（各一分）　蒼术　川芎　枳實（各八分）　神麯（五分）

芍藥（七分）　甘草（三分）

右生姜水煎。

蒼連湯（回春）治吐酸。

蒼术　黄連　陳皮　半夏　茯苓

神麯（各一分）　呉茱萸　砂仁（各一分）　甘草（三分）

右生姜水煎。

當歸補血湯（回春）治心中血少而嘈。

當歸　芍藥　生芐（各一分）　人參（五分）　白术

茯苓　麥冬　梔子　陳皮（各八分）　甘草

辰砂（研末臨服入各三分。）

烏梅一箇。粉米百粒。棗二枚。水煎服。

加味小陷胸湯（大還）治火動其痰嘈雜。

黄連（炒。二分）　半夏（二分）　瓜蔞（半箇）　枳實（一分）　梔子（一分）

右水煎。

加減安胃湯（統旨）治脾胃虚寒嘔吐酸水。

藿香　呉茱萸（各一錢半）　人參（二分）　陳皮（三分）　蒼朮（二分）

水二鍾。姜三片。煎服。

加味平胃散（附餘）治呑酸。或宿食不化。

本方。加神麯。麥芽。

檳榔散（外臺）療吐酸水。每食則變作醋水吐出。

檳榔（十六分）　人參（六分）　茯苓（八分）　橘皮（六分）　蓽撥（四分）

右為末。平晨空腹。姜湯攪調服之。

增損承氣丸（外臺）療胸脇支滿。背上時有一答熱則痛。腹脹多噫醋咽。氣逆兩脇滿。

前胡　枳實　大黄（各七分）　桂心　乾姜

呉茱萸（各五分）　茯苓（四分）　芍藥（十分）　厚朴　橘皮（各十分）

杏仁（七十枚）

右為末。蜜丸。初服七丸。如梧桐子。以氣宣下洩為度。

乾姜丸聖惠治酒癖停飲。吐酸水。

乾姜　葛根　枳殼　橘紅　前胡（各五分）

白朮　半夏（各一兩）　吳茱萸　甘草（各一分）

右煉蜜丸。如桐子大。每服三十丸。米飲下。

蒼朮丸（本事）治停飲已成癖囊。脇痛。飲食殊減。飲酒止從左邊下。漉漉有聲。十數日必嘔數升酸苦水。其法蒼朮一斤。去皮切末之。用生油麻半兩。水二盞。研濾取汁。大棗十五枚。爛煮去皮核。研以麻汁。匀研成稀膏。搜和入臼熟杵。圓梧子大。乾之。每日空腹。用温湯吞下五十圓。增至一百圓。二百圓。服時心膈微燥。以朮製之。覺燥甚用梔子末。沸湯點服。

麯朮丸（三因）治中脘有宿食留飲。酸螫心痛。口吐清水噯宿腐氣者。

神麯（炒三兩）　蒼朮（炒一兩半）　陳皮（一兩）

右為末。生姜汁。別煮神麯末糊為丸。如梧桐子大。每服三五十丸。姜湯下無時。

回令丸（丹溪）治濕熱鬱積於肝。而出伏肺胃之間。吞酸者。

即左金丸。（方出脇痛）加茯苓。名導飲丸。治嘈雜。

咽醋丸（丹溪）

吳茱萸（半兩） 陳皮（五錢） 黄芩（五錢） 蒼朮（七錢半） 黄連（一兩）

右爲末。麯糊丸桐子大。

軟石膏丸（丹溪）治嘈雜噯氣。

石膏 半夏 南星 香附 山梔子（各等分）

右爲末。粥丸梧子大。每服五十丸。姜湯下。○回春本方

姜三片。水煎服。名星半湯。

茱萸圓（丹溪）治吞酸自利。

吳茱萸（一兩爲末） 六一散（一兩）

右糊丸梧子大。每服五六十丸。白湯下。

交泰丸（回春）治胸中痞悶。嘈雜。大便稀。則胸中頗快。大便

堅則胸中痞悶難當。不思飲食。

黄連 白朮 吳茱萸（各二兩） 枳實（一兩） 當歸（一兩三錢）

大黄（四兩）

右爲細末。姜汁打神麯糊爲丸。如菉豆大。每七八十丸。

不拘時。白滚水送下。

破鬱丹（回春）治婦人噯氣。胸緊連十餘聲不盡。噯出氣心

頭畧寛。不噯即緊。

香附（四兩）　梔子（四兩）　黄連　枳實　檳榔

莪朮　青皮　瓜蔞仁　蘇子（各一兩）

右為末。水丸如梧子大。每服三十丸。滾水送下。

匀氣丸（入門）　治氣虚濁升多噯。

草豆蔻　橘皮　沉香　人參（各五分）　益智

檀香　大腹皮（各一兩）

右為末。飯丸梧子大。每八十丸。淡姜湯下。

霍亂

四逆加人參湯（傷寒）　治惡寒脈微而復利。利止亡血。○千金。名四順湯。○范汪云。利甚。加龍骨。

通脈四逆加猪膽湯（傷寒）　吐已下斷。汗出而厥。四肢拘急不解。脈微欲絶者。

乾姜茱萸湯（肘後）　治霍亂乾嘔。

乾姜　茱萸（各三兩）

右水煎。○手足逆冷。加椒百粒。附子一枚。

附子粳米湯（千金）　治霍亂四逆。吐少嘔多者。

即本方。加乾姜。（方出六氣門）

理中散（千金）○治老年羸劣。冷氣惡心。飲食不化。心腹虛滿。拘急短氣。霍亂嘔逆。四肢厥冷。心煩氣悶。流汗。扶老方。

即附子理中湯。加麥門冬。茯苓。○外臺。引小品。名扶老理中散。

治霍亂蠱毒。宿食不消。積冷。心腹煩滿方。（千金）

用極鹹鹽湯三升。熱飲一升。刺口令吐。宿食使盡。不吐更服。吐訖復飲。三吐乃住。靜止。此法大勝諸治。俗人以為田舍淺近。鄙而不用。守死而已。凡有此病。即須先用之。

治中湯（千金）治霍亂吐下。脹滿。食不消化。心腹痛。

即理中湯本方

甘草瀉心湯（千金）治霍亂嘔吐。涎沫。醫反下之。心下即痞。

小品人參湯（外臺）治霍亂。卒吐下不禁。脈暴數者。

人參（二兩）　茯苓（二兩）　葛根（二兩）　橘皮（二兩）　麥冬（二兩）

甘草（二兩）

右水煎。○聖惠有白朮一兩。

治妊娠霍亂吐瀉。脚轉筋。（聖惠）

生姜　呉茱萸（各一分）　木瓜（一兩半）

右水煎。○聖濟名木瓜湯。

芦根飲子（聖惠）治妊娠霍亂吐瀉心煩。

蘆根（二兩）　人參（一兩）　藿香（三分）　枇杷葉（十片）　甘草（半兩）

薤白七寸。生姜三分。水煎。

良姜散（直指）治霍亂神効。

良姜　藿香　陳皮（各一兩）　甘草（五分）

右水煎。

麥門冬湯（濟生）治霍亂已愈。煩熱不解。多渴小便不利。

麥冬　橘皮　半夏　茯苓　白朮（各一兩）

人參（半兩）　甘草（半兩）　小麥（半合）　烏梅（少許）

右生姜五片。水煎。○入門名九君子湯。

萸瓜湯（家寶）治霍亂上吐下利。心下懊憹。其症因形寒飲冷。飢飽失宜。乘舟車露走。動傷胃氣。頭旋。手足轉筋。須臾不救傷命。

呉茱萸（半兩）　木瓜（半兩）　食鹽（半兩）

右三味同炒焦。水煎。每服隨意冷熱與服。藥入喉即止。

（原名四片金。今改。）

藿香正氣散（施氏續易簡）治霍亂吐瀉。

半夏　厚朴　白朮（各三兩）　藿香　陳皮（各一兩）

甘草（七匁）

姜棗水煎。

急喘悶絕不能語言。涎流吐逆。牙齒動搖。氣出轉大。絕而復蘇。名傷寒併熱霍亂。（經驗良方）

大黃　人參（各半兩）

右水二盞。煎一盞。熱服可安。

五苓蘇木湯（類萃）治霍亂吐瀉。外感寒邪。

五苓散。加紫蘇。木瓜。

厚朴湯（奇効）治乾霍亂。

厚朴　枳殼　良姜　檳榔　朴消（各七匁半）

大黃（炒二兩）

右每服三錢。水煎服。

白朮散（醫家類選）治傷寒雜症。一切吐瀉煩渴。霍亂虛損氣弱。保養衰老。積滯嘔噦。

蒼朮（二匁）　藿香（一匁）　乾葛（一匁）　茯苓（二匁）　人參（二匁半）

甘草（五分）　木香（五分）　厚朴（一匁半）

右生姜水煎。

五苓散（傷寒論）治霍亂。頭痛發熱身疼。熱多欲飲水者。

理中丸（傷寒論）治霍亂。寒多不用水者。

四神丸（外臺）主霍亂。冷實不除。及痰飲百病。

乾姜　桂心　附子（各一兩）　巴豆（六十枚熬）

右末之。蜜和丸如小豆大。飲服二丸。取快下。不下又服一丸。

許仁則三味丸（外臺）治乾霍亂。大小便不通。煩寃欲死

即仲景三物備急丸

初服三丸如梧子大。服訖數搖。用令轉動。速下利。良久不覺。則以熱飲投之。又良久不利。更服一丸。

糯米姜水（奇效）治上吐下瀉。心腹疞痛。水食不下。

糯米（一百二十粒）　生姜（一塊）

右作一處搗細。用新汲水解服。

匀氣散（廣嗣全書）治霍亂吐瀉。

藿香　白匾豆　人參（各半兩）　木香　丁香

乾姜　炙甘　厚朴（各一分）

右末。姜棗鹽湯。或紫蘇木瓜湯點。

神效絞腸痧散（大還）

硃砂　雄黄　明礬　鎗硝（各三分）　射香（二分）

氷片（二分）　革撥（三厘）

金箔十二張。為細末。盛磁餅内。點睛明穴眼潭内。男左女右。立愈。不可開口合藥。要誠心。五月五日午時。不許婦人鷄犬見。又名諸葛散。可治山嵐瘴毒。中惡等症○案張氏醫通。點眼沙。一名人馬平安散。治時疫毒氣。臭毒痧脹腹痛。即本方。無明礬。革撥。金箔。凡五味。鎗銷作硝。云。用此入時疫病家。則不沾染。並治六畜瘟。亦點

眼大眥。出臭毒門。分量不同。又古今祕苑與大還同。不用氷片。名人馬平安散。兼治目疾。

黄疸（黄胖）

茵蔯蒿湯（金匱）穀疸之為病。寒熱不食。食即頭眩。心胸不安。久久發黄為穀疸。此湯主之。

茵陳蒿（六両）　梔子（十四枚）　大黄（二両）

右水煎。○千金茵陳湯本方。加黄芩。人參。黄連。甘草。主黄疸。酒疸。酒癖。大醫校尉史脱方。○小品用石膏一斤。○回春。茵陳大黄湯本方。加枳實。厚朴。滑石。甘草。燈草。治黄疸。大便結實。

梔子大黄湯（金匱）酒黄疸。心中懊憹。或熱痛。（此湯主之）

梔子（十四枚）　大黄（一兩）　枳實（五枚）　豉（一升）

右水煎。

大黄消石湯（金匱）黄疸腹滿。小便不利而赤。自汗出。此爲表和裏實。宜此湯。

大黄○十　黄蘗　消石（各四兩）　梔子（十五枚）

右水煎。○宋本。消石。作滑石。

小柴胡湯（金匱）諸黄腹痛而嘔者。宜此湯。○程雲來云。是當大柴胡湯。

小建中湯（金匱）男子黄。小便自利。當與此湯。

必效大黄湯（外臺）療急黄疸。

大黄（三兩）　芒硝（二兩）

右以水二升。生漬大黄一宿。平旦絞汁一升半。内芒硝攪服。須臾當快利。○千金。爲末和生地黄汁。治急黄骨蒸目赤。

許仁則麻黄等五味湯（外臺）療急黄。始得大類天行。

麻黄（三兩）　葛根（五兩）　石膏（八兩）　生姜（六兩）　茵蔯（二兩）

右水煎服。覆被微取汗。

又梔子等五味湯（外臺）汗出後未歇。經三五日者。

梔子（二十枚）　柴胡（三兩）　黃芩（三兩）　茵蔯（三兩）　芒硝（六兩）

右水煎服。

龍膽散（聖惠）治勞黃。額上汗出。手足中熱。四肢煩疼。薄暮寒熱。小便自利。

龍膽　甘草　麥門冬　柴胡　升麻

犀角（各三分）　牡蠣（一兩）

右水煎。入生地黃汁半合。

小半夏散（聖惠）治陰黃。小便色不變。欲自利而不利。腹滿而喘者。必噦。

半夏（一兩）　人參　葛根（各二兩）　生姜（半分）

右水煎服。

人參養榮湯（三因）治五疸。脚弱。心忪。口淡。耳響。微寒。熱氣急。小便白濁。當作虛勞治之。（方見虛勞門。）

加減五苓湯（濟生）治伏暑鬱發黃。煩渴。小便不利。

茯苓　猪苓　澤瀉　白朮　茵陳（各等分）

右水煎。

瓊液蘆根湯（幼幼新書）治傷寒時氣。熱入於胃。與穀氣相薰蒸。發肌肉。使面目皮膚悉黃。謂之黃病。亦名發黃。

蘆根（二兩）　茵陳　梔子　黃芩　甘草（各半兩）

右薄荷五片。水煎服。

四君子湯直指治色疸。

即本方。（出脾胃門）加黃芪芍藥。白扁豆。

右姜棗水煎。

茵蔯附子乾姜湯寶鑑治陰黃。

附子（三匁）　乾姜（二匁）　茵蔯（一匁二分）　白朮（四分）　草蔻（一匁）

茯苓（三分）　枳實　半夏　澤瀉（各半匁）　橘紅（三分）

右生姜水煎。

茵蔯四逆湯（元戎）發黃。脈沉而遲。肢體冷逆。腰以上自汗者。此方冷服。

茵蔯（二兩）　附子（一枚）　乾姜（一兩半）　炙甘（一兩）

右水煎服。

理中加茯苓湯醫綱此証。雖小便黃赤。亦作寒治者。蓋以餘症。乃脈別之也。

朮附湯醫綱前症若不愈。當以此湯與之。

加減胃苓湯壽世治黃胖。飲食無味。四肢無力。腹有積塊脹滿。

蒼朮　青皮　厚朴　猪苓　澤瀉

藿香　大腹皮　山查　蘿蔔子　三稜

莪朮　甘草

右姜棗水煎。

治傷食成濕熱黄疸。張曉川方。効。（醫家類選）

陳皮（一分）　半夏（一分）　茯苓（一分）　甘草（一分）　白朮（二分）

黄連（四分）　山查（一分）　紫蘇（一分）　瓜蔞仁（一分）　天花粉（一分）

蘿蔔子（一分）

右生姜水煎服。

消石礬石散（金匱）　女勞疸。少腹滿。身盡黄。額上黑。足下熱。因作黑疸。其腹脹如水狀。大便必黑。時溏。此女勞之病。非水也。腹滿者難治。用此湯主之。

消石　礬石（燒等分）

右二味為散。以大麥粥汁和服方寸匕。日三服。病隨大小便去。小便正黄。大便正黑。是其候也。

茵陳五苓散（金匱）　黄疸病。小便不利者。此湯主之。

茵蔯蒿（末十分）　五苓散（五分）

右二物和。先食飲方寸匕。

延年瓜蔕散（外臺）療急黃。心下堅硬。渴欲得水。喫氣息喘粗。眼黃。但有一候相當。即須宜服之。吐則差。

瓜蔕（二小合）　赤小豆（二合）

右為末。㸐漿水五小合和散。一服一方寸匕。一炊久當吐。不吐更服五分匕。水亦減之。若輕病。直吹鼻中兩黑豆粒大。亦得。當鼻中黃水出。

删繁苦參丸（外臺）療勞疸。穀疸。

苦參（三兩）　龍胆草（二兩）　梔子人（三七枚）

右為散。若病甚。取豬胆和為丸。如梧子大。一服五丸。日三。

鹿茸散（聖惠）治房黃。體虛無力。夜多夢泄。神思不安。腰脚痠疼。

鹿茸（去毛塗酥微炙）　熟乾地黃　山茱萸　五味子

黃芪　牡蠣（各一兩）

右為細末。以溫酒調下二錢。

紫金丸（修月魯般經）治黃袪積。

荊三稜（二兩）　蓬朮　蒼朮　乾漆（醋炒烟盡）

砂仁（二兩）　枳殼（各兩半）　黑牽（頭末一兩）　青皮（二兩半）

針砂（三兩酒炒）　陳皮（二兩半）　白礬（飛）　皂礬（各五分炒）

右為細末。蒸餅為丸。如桐子大。每服五六十丸。白湯任下。

八味丸必讀脾寒虛寒。脈沉而細。身冷自汗。瀉利溺白。此名陰黃。亦金匱原方。

治黃疸發腫。及血症黃腫。（彙聚）（單方）

百草霜（一斤）　麪（半斤）　綠礬（末四兩）

右糖丸桐子大。每服三四十丸。食遠薑湯米湯任下。

五疸神丹（正傳）治五疸。俱能取效。

綠礬。不拘多少炒至白色為度。礶中火煆尤佳。右為末煮棗肉為丸。如梧桐子大。每服五十丸。冷黃酒送下。忌生冷醋發物。有蟲者。服之吐出。神效。○本綱附方引救急方。用此丸。治食勞黃病。又引趙原陽濟急方。治酒黃。水腫。青礬半斤。醋一大盞。和匀瓦盆內煨乾為度。平胃散。烏藥順氣散。各半兩。為末。醋煮糊丸梧子大。每酒或薑湯下二三十丸。

大溫中丸（新効方）治食積黃腫。

針砂（十兩。醋炒紅。醋淬七次再炒。）　陳皮　蒼朮　青皮

厚朴　三稜　蓬莪朮（各五兩）　甘草（二兩）　香附（一斤）

右末之。醋糊爲丸梧子大。每服五七十丸。空心姜鹽湯下。脾虛者。以白朮人參作湯使下。

小温中丸（新方）劾治五疸去積。

針砂（十兩如前炒淬）　蒼朮　神麹　川芎　梔子（各半斤）

香附（一斤）

修治如上。

摘玄方鍼砂平胃散本綱治脾勞黃病。

鍼砂（四兩醋炒七次）　乾漆（燒存性二錢）　香附（三錢）　平胃散（五錢）

右爲末。蒸餅丸梧子大。任湯使下。

治黃胖（本朝經驗）用摘玄方平胃加味。下利者宜此。

小麥粉　葛粉（各二十匁）　鐵砂（五分）　硫黃（五分）

右爲細末。日服一錢。（福大輔傳）

觀聚方要補卷三