觀聚方

四

松
科別
k 62-1

F 3
カ-96

490.9
Ka-2D
3
No.12565
旧 K 62-1
慶應義塾大学医学情報センター
昭和47.年7.月4日
富士川文庫
1513

觀聚方要補卷四目録

腹痛

小建中湯　温脾湯
張文仲當歸大黃湯　集驗療痰澼痛方
安中散　蟠葱散
錢氏宣風散　黃連湯
厚朴温中湯　四順清原飲
黃芩芍藥湯　二陳湯加香附蒼朮
桃仁承氣湯　四逆湯

真武湯　附子湯
桂枝加芍藥湯　桂枝加大黃湯
瓜蒂散　薑鹽湯
散火湯　接眞湯
二中湯　芍藥甘草湯加生薑
治血滯腹痛方　阿魏丸
燒脾散　神仙沈麝丸
來復丹　沈香大圓
沒藥散　蘇感圓
牽牛大黃丸

腸痛

大黃附子湯　治冷氣方
大正氣散　枳殼煮散
芎葛湯　加味小柴胡湯
香橘湯　三脘散
木通散　復元活血湯
治婦人腸痛方　補肝湯
柴胡疎肝湯　治痰飲腸痛方

平肝流氣飲　小柴胡湯加青皮山梔
大柴胡湯　小柴胡合四物湯
桃仁承氣湯　建脾散
調肝散　和肝飲
治血瘀氣滯方　和肝飲
當歸龍薈丸　左金丸
芍藥散　莞花莪朮丸
腎氣丸

頭痛

治厥頭痛方　加減三五七散
鈎藤散　附子細辛湯
朮附湯加川芎　十全湯加附子
四柱散　清震湯
半夏白朮天麻湯　羌活附子湯
順氣和中湯　乳香琖落湯
加味四物湯　祛風清上散
芎辛導痰湯　川芎散
愈毒湯　蘇子導痰降氣湯

頭風神方　三祛湯
小建中湯加當歸童便　加減越脾湯
六味丸料去山茱加沈香　治酒毒頭痛方
羌活散　川芎茶調散
消風散　治沐頭腦痛方
玉真圓　治偏頭痛
透頂散　靈砂丹
點頭散　大川芎丸
清定膏　川芎散
防風散　神芎圓
濟生茸珠丹　黑錫丹
蘆薈散　碧雲散

眩運

芎歸湯　近效白朮附子湯
苓桂朮甘湯　理中湯
香橘飲　五苓散
鈎藤散　羚羊角散
香薷飲　玉液湯

旋覆花湯　星附湯
辛夷湯　荆黄湯
半夏白朮天麻湯　加味二陳湯
天麻半夏湯　八味丸料
温膽湯加天麻　加味四物湯
參附湯　薑附湯
神白散　蘇沈沈麝丸
順元散　茸珠丹
治濕痰上攻方

痞滿

枳實湯　瀉脾湯
柴胡湯　檳榔湯
調胃散　消痞湯
破氣湯　解鬱和中湯
養胃湯　開懷散
加味陷胸湯　瀉心湯
枳殼散　枳實消痞丸
三脘痞氣丸　枳實理中丸

黑錫丹　內消丸
開結枳實丸　括蔞實丸

脹滿

厚朴七物湯　厚朴三物湯
大承氣湯　走馬湯
大半夏湯　柴胡厚朴湯
前胡散　大黃散
人參湯　平肝飲子
大正氣散　朴附湯
强中湯　人參芎歸湯
沈香飲　治氣鼓方
吳茱萸湯　厚朴湯
七氣消聚散　治諸臟脹方
鱉甲丸　木香圓
乾漆丸　雞屎醴散
又方　治脹圓
牽牛妙酒　金陵酒丸
栁靈丹　琥珀人參丸

治冷脹方　治一切脹方
腹脹方

噎膈

訶梨勒散　丁香散
治食物不消成膈方　五噎散
五膈散　通氣湯
滋血潤腸湯　韭汁飲
七聖湯　紫蘇子飲
啟膈散　一方
利膈豁痰湯　五噎圓
五膈圓　硇砂圓
桃花散　大黄丸
硇砂丸　寛膈圓
人參利膈丸　桂香散
參茯膏　桃仁承氣湯
神仙奪命丹　治噎膈反胃方
治噎膈將成方　五子散

腰痛

腎著湯　獨活寄生湯
獨活散　熟大黄湯
甘豆湯　調肝散
獨活湯　羗活桃仁湯
七味蒼柏散　濟腰湯
桃核承氣湯　治腰脊痛方
陶氏腎氣丸　復元通氣散
如神湯　趁痛散
牽牛圓　鹿角圓
青娥圓　趁痛圓
速効散

臂痛肩背痛身體痛

五香連翹湯　羚羊角散
加減當歸飲子　補骨脂散
生附除濕湯　當歸建中湯
舒經湯　烏藥順氣散
防風通聖散　活絡湯
芎活湯　通氣防風湯

提肩散　消痰茯苓圓
補髓丹　白芥子散
麒麟竭散　控涎丹
三聖散　神保丸
孤拐痛方

歷節風

桂枝芍藥知母湯　烏頭湯
防己湯　石膏湯
赤芍藥散　附子八物湯
大防風湯　活血通經湯
羚羊角湯　牛膝木瓜湯
治飲酒濕痰痛風方　治痛風方
治痢後風方　治痛風方
加味四物湯　活絡流氣飲
通治痛風方　續斷圓
中行圓　擒虎散
追命再造散　治諸風疼痛方

觀聚方要補卷四

東都　丹波元簡廉夫　輯

腹痛

小建中湯（金匱）治虛勞裏急腹中痛

易簡加附子名附子建中湯治或吐或瀉狀如霍亂及冒涉濕寒賊風入腹拘急切痛

温脾湯（千金）治腹痛臍下絞結繞臍不止

甘草　附子　人參　芒硝（各二兩）　當歸

乾姜（各三兩）　大黄（五兩）

右水煎服。

張文仲當歸大黄湯（外臺）療冷氣牽引腰背脇下腹內痛。

當歸（三兩） 芍藥（八分） 桂心（三分） 乾姜（六分） 呉茱萸（三分）

人參 大黄（各一兩） 甘草（二兩）

右水煎服。

集驗療痃癖心腹痛方。（外臺）

鼈甲 柴胡 芍藥（各八分） 甘草 枳實

生姜 白朮（各六分） 檳榔（七箇）

右水煎。臨服內檳榔末。

安中散（局方）治遠年日近。脾疼翻胃。口吐酸水。寒邪之氣

留滯於內。停積不消。胸滿攻刺腹脇。及婦人血氣刺痛。

玄胡索 良姜 乾姜 茴香 肉桂（各五兩）

牡蠣（四兩） 甘草（拾兩）

右水煎服。（本為散服。今改為湯）

蟠葱散（局方）治脾胃虛冷。攻築心腹。連脇肋刺痛。胸膈痞

悶。背膊連項。拘急疼痛。不思飲食。時或嘔逆。

延胡索（三兩） 蒼朮 甘草（各半斤） 茯苓 蓬朮

三稜 青皮（各六兩） 丁皮 縮砂 檳榔（各四兩）

肉桂　乾姜（各二兩）

右連根葱白一莖。水煎服。○得効方加呉茱萸。

錢氏宣風散（直指）肚皮痛。腎虛不能行水。加之酒麪無度。醉後輙睡。酒與水交聚於腹中。而麪毒復壅滞其氣。是以水滲於肚皮。而作痛矣。治法。錢氏宣風散。（方見小兒門）用蜜水煎。嚥下神保圓。俟其大便流利。然後以青木香圓一分。安腎圓倍之。用二陳湯。入少鹽幷生姜同煎。空心嚥下。脾腎氣復。自然向安。

黄連湯（河間）腹痛欲嘔吐者。上熱下寒也。以陽不得降。而胸熱欲嘔。陰不得升而下。寒腹痛。是升降失常也。

即傷寒論原方

厚朴温中湯（東垣）治胃虛冷。脹滿疼痛。

厚朴　陳皮（各一兩）　茯苓　草豆蔻　甘草

木香（各半兩）　乾姜（三兩半）

加姜水煎服。

四順清凉飲（得効）治腹痛。大便秘。小便赤。喜飲冷。以手按之。轉甚不可近。痛者。或兩手熱。痛處亦熱。

案即局方四順清凉飲。（方見熱門）

黄芩芍藥湯（丹溪）治腹痛。脉洪大

黄芩　芍藥　甘草（各等分）

右生姜。水煎。

二陳湯加香附蒼朮（丹溪）腹中窄狹。乃濕痰濁氣。攻於心脾二臟。升降失常。以自覺腹中窄狹。須多用蒼朮

桃仁承氣湯（丹溪）治因跌撲損傷。瘀血作腹痛。内加當歸。蘇木。紅花。入酒童便煎服下之。

四逆湯　眞武湯　附子湯（醫綱）並治臍腹痛。屬少陰。

桂枝加芍藥湯　桂枝加大黄湯（醫綱）並治太陰腹痛。

瓜蔕散　薑鹽湯（入門）食物塡塞。心胸作痛。亟吐之。

散火湯（回春）作痛乍止。脉數者。火痛也

黄連　芍藥　梔子　枳殼　厚朴

香附　撫芎（各一匁）　木香　砂仁　茴香（各五分）

甘草（三分）

右生姜三片。水煎。痛甚。加玄胡索。

接眞湯（百代醫宗）治陰病手足厥冷。臍腹疼。眞氣不足。虛憊欲絶者。

沉香　丁香（各二匁）　麝香（一匁）　附子（四匁炮去皮臍）

右切一劑。姜棗煎。或為末。每服二錢。溫酒調下。

二中湯會解　治內虛腹痛。

理中湯。合建中湯。○原出陰証畧例　治寒証不能食。

芍藥甘草湯加生姜（大還）　治四時腹痛。

方脈粹言。治肚腹攻疼因血滯者。（彙言）

鬱金　木香　莪朮　玄胡索

白湯磨服。○又治心胃作痛因寒。方無胡索。又治婦人脇肋脹滿因氣逆者。無胡索。有牡丹皮。

阿魏丸聖惠　治冷氣攻心腹痛。久不差。面色青黃。四肢多冷。

阿魏（一兩。以醋一挑煎成膏）　桂心　乾姜　附子

當歸（各一兩）　吳茱萸（半兩）

右為末。用阿魏膏和擣百餘杵。丸如梧桐子大。不計時候。以溫酒下二十丸。

撓脾散局方　治脾胃虛冷。心氣脾痛。及婦人血氣攻刺腹脇撮痛。

芍藥　乾姜（各六錢半）　良姜（炒十兩）　甘草（四兩）

右為細末。二大錢。白湯點下。

神仙沉麝丸局方　治一切氣痛不可忍者。（原出蘇沈良方）

沒藥　血竭　沉香　麝香　辰砂（各一兩）

木香（半兩）　甘草（二兩）

右爲末。熬甘草爲膏搜和。每服壹圓。姜鹽湯嚼下。

來復丹（局方）治上實下虛。氣閉痰厥。心腹冷痛。藏府虛滑。不問男女老幼。危急之證。但有胃氣。無不獲安。

消石（同硫黃並爲細末。入定椺內。以微火漫炒。用柳篦子。不住手攪。令陰陽氣相入。不可大太過。恐傷藥力。再研極細。名二炁末。）　太陰玄精石（各一兩）　舶上硫黃

五靈脂　陳皮　青橘皮（各二兩）

右用五靈脂二橘皮爲細末。次入玄精石末及前二炁

末。拌匀。以好滴醋打糊爲圓如豌豆大。每服三拾粒。空心粥飲呑下。甚者五拾粒。

沉香大圓（楊氏）治男子婦人脾氣虛弱。腹脹滿悶。臍下刺痛。

沉香（一分）　木香　川楝肉（炒）　茴香（炒）　肉桂

附子（炮）　青皮　硇砂（別研）　雄黃（別研各半兩）

右爲細末。酒煮麪糊爲圓。每一兩作十圓。朱砂爲衣。每服一圓。細嚼。熱酒或鹽湯下。

沒藥散（河間）治一切心腹疼痛。不可忍者。

沒藥　乳香（各一錢）　穿山甲（五分）　木鼈子（四分）

右細末。每服半錢或一錢。酒大半盞煎三五沸服。

蘇感圓得効。腹痛作嘔。欲利大便。諸藥皆吐。惟此圓。用姜汁泡湯吞服。最妙。

即蘇合香圓。合感應圓。

牽牛大黃丸醫述。治內熱腹痛。熱氣上衝而嘔。

黑牽牛（四兩半炒半生取頭末一兩二分）。　大黃（酒拌炒一兩五分）　檳榔（六分）

枳實（炒六分）　厚朴（六分）　三稜　莪朮（各六分）

右為末。米飲為丸。如桐子大。飢服三錢。

脇痛

大黃附子湯金匱。治脇下偏痛。（方見疝氣）

治冷氣脇下往來。衝胸膈痛。引脇背痛方。千金

當歸　桂心　人參　甘草　吳茱萸

芍藥　大黃（各三兩）　茯苓　枳實（各一兩）　干姜（三兩）

右水煎服。

大正氣散（朱氏集驗）補虛快氣。散腹脇疼痛。

香附　當歸　陳皮（各半兩）　木香（二分）　甘草（四分）

白姜　白朮　桂心　縮砂（各三分）　附子（一枚）

姜棗水煎

枳殻煮散（本事）治悲哀煩惱傷肝氣至兩脇骨疼筋脈緊腰脚重滯兩股筋急兩脇牽痛四肢不能擧漸至脊膂攣急

枳殻（四兩先煎）　細辛　川芎　桔梗　防風（各二兩）
葛根（一兩半）　甘草（一兩）

右爲麁末每服四錢水一盞半姜棗煎至七分空心服

芎葛湯（本事）治脇下痛不可忍者

川芎　乾葛　桂枝　枳殻　細辛
芍藥　麻黄　人參　防風（各半兩）　甘草（二分）
生姜（三片）

右水煎服

加味小柴胡湯（良方）治傷寒脇痛

本方加牡蛎枳殻

香橘湯（良方）治七情所傷中脘不快腹脇脹滿

香附　橘紅　半夏（各三分）　甘草（一分）

右姜棗水煎

三脘散（良方）治中氣虛痞兩脇氣痛大便祕澁

即三和散。（方出諸氣門）

木通散（良方）治脇肋苦痛。并小腹牽引痛者。皆主之。

木通　青皮　川楝子（去皮核。各一兩。已上三味。用巴豆半兩。炒黃。去巴豆不用）　蘿蔔子（炒一兩）　舶上茴香（炒三兩）　莪朮　木香

滑石（各半兩）

右為細末。煎葱白酒調三錢。一服愈。甚者不過再服。

復元活血湯（發明）治從高墜下。惡血流於脇下。及疼痛不可忍者。

柴胡（半兩）　瓜蔞根　當歸（各三分）　紅花　甘草

穿山甲（各三分）　大黃（一兩）　桃仁（五十枚）

右水。酒。各半盞。同煎。

丹溪。治婦人胸背脇走痛。

芍藥　香附　黃柏（各一分）　桂枝　蒼朮（各半分）

威靈仙（七分）　甘草（五分五分）

右水煎服。

補肝湯（滑氏）治肝虛脇痛。筋急不能大息。

山茱萸　甘草　桂心（各三兩）　桃仁　細辛

栢子仁　茯苓　防風（各三兩）　大棗（二拾四枚）

右水煎服。○原出千金翼。有烏頭四枚。桃仁作梨仁。

柴胡疏肝湯統旨治怒火傷肝。脇痛。血菀於上。

柴胡　橘皮（各二分）　川芎　芍藥　枳殼（各錢半）

甘草（五分）　香附（錢半）

水煎。食前温服。吐血加童子小便半盞。○醫通有山梔。煨姜。

治痰飲兩脇痛。挾熱。飲食不進。赤水

瓜蔞仁（六分）　枳殼　姜連　半夏（各一錢半）

白芥子（一錢）　牡蠣（二錢）　甘草（五分）　柴胡（一錢半）

右水煎。與當歸龍會丸。使行之。

平肝流氣飲回春治脇痛。及小腹至臍。併疝氣。内外痰者。

當歸　茯苓（各一分）　半夏　川芎　青皮（各六分）

黄連　香附　芍藥　山梔（各八分）　柴胡

厚朴（各七分）　呉茱萸（四分）　甘草（四分）

右水煎。生姜三片。

小柴胡湯加青皮山梔回春治脇肋脹痛。喘咳吐痰。肝火侮肺也。

大柴胡湯（醫統）治脇痛。口燥渴飲水。痛不可忍。

小柴胡合四物湯加桃仁紅花乳香沒藥（簡明）治死血脇痛。

桃仁承氣湯加鼈甲青皮柴胡芎歸之屬（準繩）治死血脇痛。日輕夜重。或午後熱。脈短濇。

建脾散（示兒）治脾積脇痛。

即建中湯加縮砂。

調肝散（心醫集）治季脇痛。連小腹。

當歸　川芎　烏藥　青皮　玄胡（各錢半）

柴胡　檳榔　木香　桃仁（各一匁）

右水煎服。

和肝飲（心醫集）治脇下扛便起一條作疼。

當歸　白芍　三稜　青皮（各一匁五分）　木香

枳殼　柴胡　大茴香　砂仁（各八分）

右水煎服。

錢君暘治兩脇痛。有血瘀氣滯者方。（集言）

姜黃　柴胡　紅花　蘆薈　白芥子（各等分）

右水煎服。

和肝飲（粲言）治脇痛。

鼈甲　柴胡　當歸　川芎　半夏

芍藥　枳殼（各二匁）

右水煎服。○左脇痛者。怒傷血滯也。加青皮。桃仁。右脇痛者。氣逆挾痰也。加桔梗。白芥子。左右脇俱痛者。肝火盛而痰氣結也。加龍胆。香附。貝母。白芥子。

當歸龍薈丸（直訣）治肝實脇痛。其人氣收者。善怒是也。

當歸　龍膽　山梔　黃連　黃栢

黃芩（各一兩）　大黃　蘆薈　青黛（各半兩）　木香（二匁半）

麝香（半匁。另研）

右爲細末。煉蜜丸如小豆大。生姜湯下。

左金丸（丹溪）肝火脇痛。用反佐。

黃連（六匁）　吳茱萸（一匁）

右爲細末。蒸餅爲丸。每服三五十丸。姜湯下。○朱氏集驗。黃連丸。治腸風下血。二味。等分。炒黑。去茱萸。黃連一味。飯丸如梧子大。胃風湯煎。如法呑下三五十丸。○又聖惠。治產後下利。白多赤少。腹痛不止。黃連二兩。微炒。吳茱萸。一兩。右蜜丸。

芍藥散（準繩）治婦人脇痛。

白芍藥　玄胡索　肉桂（各一兩）　香附（二兩）

右為細末每服二匁白湯調下。

芫花莪朮丸（示）兒脾疼脇痛。用建脾散併進此丸。

芫花　半夏　南星　莪朮（各一兩）

右剉碎和合。以苦油竹一截留節。以藥置竹內。用好醋一挑。入竹內。侵濕紙粹塞。却入文武火中煨一日夜。不可着猛火。待醋乾取出藥。焙乾為末。糊丸梧子大。空心熟水呑五十丸。其病如失去。妙哉

腎氣丸（醫通）季脇痛。按季脇痛者。因腎虛。此方主之。

頭痛

卒頭痛如破。非中冷。又非中風。其病是胸膈中痰厥。氣上衝所致。名為厥頭痛。吐之則差。（千金）

但單煮茗。作飲二三升許。適冷煖飲三升。須臾適吐。適吐畢。又飲。能如此數過。劇者須吐膽汁乃止。不損人。渴則差。○備急以鹽湯吐。不吐撩出。○又常山（四分）甘草（半兩）右水煎服。不吐更服。亦可內蜜半升。

加減三五七散（局方）治陽虛頭痛。風寒入腦。目旋運轉。

山茱萸　茯苓　干姜（各三斤）　防風（四斤）　附子（三十五箇）

細辛（一斤八兩）

右水煎服。（舊為散用）○千金大三五七散。有天雄。薯蕷。無附子。茯苓。

鈎藤散（本事）治肝厥頭痛。

鈎藤　陳皮　半夏　麥門　茯苓

人參　菊花　防風（各半兩）　甘草（一分）　石膏（一兩）

右生姜七片。水煎服。

附子細辛湯（十便）頭痛連腦戶。或額間與肩相引。如風所吹。其脈沉細而緊。謂之風冷頭痛。

即麻黃附子細辛湯。加川芎。生姜。

朮附湯加川芎。十全湯加附子。（朱氏集驗）治婦人頭痛。發熱多汗。六脈虛細。尺脈或絕。

四柱散（易簡）治大病後。氣虛頭痛。

本方煎熟。入臘茶一錢服之。（方見泄瀉門）

清震湯（保命）治頭面疙瘩。增寒拘急。發熱。狀如傷寒。為雷頭風。

升麻　蒼朮（各四錢）　荷葉（一箇）

右水煎服。

半夏白朮天麻湯（東垣）治脾胃虛弱・痰厥頭痛・

半夏　陳皮　麥芽（各一錢半）　白朮　神麯（各一錢）

蒼朮　人參　黃芪　天麻　茯苓

澤瀉（各五分）　乾姜（三分）　黃柏（二分）

右姜五片・水煎服・

羗活附子湯（東垣）治冬月大寒犯腦・令人腦痛・齒亦痛・名

曰腦風・

防風（二分）　黃芪（一錢）　麻黃（一錢）　蒼朮（半錢）　升麻（二分）

甘草（二分）　附子（一分）　羗活（半錢）　白芷　姜蚕

黃柏（各三分）

右水煎服・

順氣和中湯（寶鑑）治氣虛頭痛・惡風寒・不喜飲食・氣短弱・

即補中益氣湯・加芍藥・蔓荊子・川芎・細辛・○醫學心

悟云・眞頭痛・手足青至節・勢難爲矣・速用補中益氣

湯加蔓荊子・川芎・附子・並進八味丸・間有得生者・不

可忽也・

乳香琖落湯（寶鑑）治男子婦人・偏正頭痛・不可忍・大有神

妙・

粟殼（四兩） 柴胡 桔梗 甘草 陳皮（各一兩）

右燈草十莖水煎

加味四物湯（回春） 治血虛陰火沖上頭痛

本方加知母黃栢黃芩黃連梔子蔓荊去芍藥

祛風清上散（統旨） 治風熱上攻眉稜骨痛

黃芩（二錢） 白芷（一錢半） 羌活 防風 柴胡（各一錢）

川芎（一錢二分） 荊芥（八分） 甘草（三分）

右水煎食後服

芎辛導痰湯（奇效） 治痰厥頭痛

川芎 細辛 南星 陳皮 茯苓（已上各一錢半）

半夏（二錢） 枳實 甘草（各一錢）

右生姜水煎

川芎散（袖珍） 治風盛隔鼻塞清淨熱氣攻眼下淚多眵齒

間緊急作偏頭疼

川芎 柴胡（各一兩） 半夏 甘草 菊花

細辛 人參 前胡 防風（各半兩）

生姜三片薄荷少許水煎

愈毒湯（六要） 治曾病梅瘡而頭痛不止或咽中痛或臂膊

有堀痛。

土茯苓（四兩）　白鮮皮　苦參　金銀花（各三匁）

黄栢（一匁）　皂角子（二十粒）　薏苡　木通

防風（各二匁）

右水煎服。氣虛。加參芪。血虛。加四物。大獲奇驗。身痛亦効。

蘇子導痰降氣湯（醫家類選）治痰厥頭痛。

卽蘇子降氣湯去肉桂。加枳實。天麻。南星。茯苓

頭風神方（筆記）

土茯苓（四兩）　金銀花（三匁）　蔓荊子（一匁）　玄參（八分）

防風（一匁）　天麻（一匁）　辛夷花（五分）　川芎（五分）

黑豆（四十九粒）　燈心（二十根）

芽茶（五匁）。河水。井水。各一鍾半。煎一鍾服。

三祛湯（百代醫宗）治風濕熱頭痛。神効。

片芩（一兩）　蒼朮　羗活　防風（各五匁）　蒼耳子（三匁）

右切一劑煎。或作末。清茶調服亦可。

小建中湯加當歸童便（醫通）治因發散太過頭痛轉劇。

加減越婢湯（醫通）偏風頭風。亦先風一日卽發。濕痰與大

伏頭中。雖夏月。常欲包裹。

本方。濕。加蒼朮。川烏。火。加山梔。左。加黄芩。右。加石膏。濕熱甚連目腫者。加酒大黄。有邪風。加細辛。川芎防風之類。

六味丸料去山茱加沉香必讀治頭痛如破。昏重不寧。風藥血藥痰藥無效。腎虚水泛為痰者。

韋谷溪子集。治好飲之人。酒毒發作。頭痛目眩。或咽喉閉悶。或下利。清水。日數十行。形神委頓。庸工假作陰寒。自利。妄用温燥熱藥者。多有之。（彙言）

松花（焙）一兩。陳皮（五錢） 黄連（三錢） 甘草（二錢）

俱微炒。磨為末。與松花和勻。每早晚各服二錢。白湯調服。二日即愈。

羌活散（局方）治風邪寒壅。頭目昏痛。肢節煩疼。天陰風雨預覺不安。

茯苓　羌活　菊花　川芎　前胡

黄芩　細辛　枳殼　蔓荊　麻黄

防風　石膏（末）　甘草

右為末。入石膏令勻。每二匁。水一大盞。姜四片。薄荷三

兩。煎七分。稍熱服。

川芎茶調散（局）方治諸風上攻。頭目昏重。偏正頭痛。

白芷　甘草　羌活（各二兩）　荊芥　芎藭（各四兩）

細辛（一兩）　防風（一兩半）　薄荷（八兩）

右為細末。茶清下。〇直指有香附子。

消風散（局方）治諸風上攻。頭目昏痛。目眩旋運。耳嘯蟬鳴。

皮膚頑麻瘙痒癮疹

茯苓　川芎　羌活　人參　荊芥

防風　藿香　蟬退　姜蚕　甘草（各二兩）

厚朴　陳皮（各半兩）

右為細末。茶酒調下。

沐頭洗項。水濕而入腦。致痛。如掣如鑽。（活人）

风蒂為細末。患人口先含水。以风蒂末搐入鼻中。涎

出惡水。其痛即愈。

玉真圓本事治氣逆上行。頭痛不可忍。謂之腎厥。

硫黃（二兩）　石膏　半夏（各一兩）　硝石（一分）

右為細末。研勻。生姜汁。圓如梧子大。每服三十丸。姜湯

下。更灸關元。

治偏頭風（本事）

猪牙皂角（去皮筋） 香白芷 白附子（各等分）

右為末每服一錢臘茶調下右疼右邊臥左疼左邊臥皆疼仰臥食後服

透頂散（續簡易） 治偏頭風痛不可忍

細辛（一兩） 雄黃（半兩）

右為細末每用一字如左邊痛搐右鼻右邊痛搐左鼻

○御藥院方名至靈散

靈砂丹（朱氏集驗） 有婦人頭痛惡風發熱六脈沉取無根浮取却有醫者謂之虛証靈砂丹以人參一二兩銀銚煎空心下十粒五更又下十粒天明則愈矣

點頭散（百一） 治偏正頭痛

川芎（二兩） 香附子（四兩）

右細末每一大戋好茶清調下○中藏經治一切頭風加甘草石膏名香芎散醫通有頭風纔發則衂不止二味童便製炙甘草共為末每服三錢間用搐鼻

大川芎丸（河間） 治頭風旋暈弦急外合陽氣風寒相搏胃膈痰飲偏（正）頭疼身體拘倦

川芎（一斤）　天麻（四兩）

右爲末。煉蜜丸。每兩作十丸。每服一丸。細嚼。茶酒下。食後服。

清空膏東垣治偏正頭痛。年深不愈者。及療風濕熱頭痛。上壅損目。及腦痛。年深不止。

羗活　防風（各一兩）　柴胡（七分）　川芎（五分）　甘草（一兩半）　黃連（炒一兩）　黃芩（三兩一半酒製一半炒）

右爲細末。每服二錢。熱盞內入茶少許。湯調如膏。抹在口內。少用白湯送下。

川芎散拔萃治偏頭痛。頭風神效。

甘菊花　石膏　川芎（各三分）

右爲末。每服一分。茶清調下。○實鑑有殭蠶六分。

防風散得効治積熱上衝。頭熱如火。痛入頂中。

防風　羗活　薄荷　當歸　大黃　梔子　川芎（各一兩）　蟬退（二十箇）　粉草（五分）

右爲散。灯心十莖。竹葉十皮。水煎服。

神芎圓得効治一切頭痛昏眩。利咽膈。通結滯。

大黃　黃芩（各二兩）　黑牽牛（炒）　白滑石（各四兩）

黃連　川芎　薄荷（各半兩）

右為末。水圓小豆大。溫水下拾圓。至拾伍圓。日三服。（原出子和）

濟生茸珠丹（要訣）因虛頭痛。服諸藥不効。其痛愈甚。

辰砂（半兩）　鹿茸（去毛酒浸一兩）

右為細末。煮棗肉丸。如梧桐子大。每服四十丸。炒酸棗仁煎湯送下。午前臨臥服。

黑錫丹（奇效）治真頭痛。（方見中風門）

蘆薈散（奇効）治頭風頭痛。

蘆薈　防風　丹砂　龍腦（各半兩）　天麻

白附子（炮）　白朮　白芷（各一兩）

右為細末。每服半錢。食後葱白薄荷茶清調下。

碧雲散（正宗）治結毒入於巓頂。以致頭疼脹痛如破者。吹之。

鵝不食草（一兩）　川芎（一兩）　青黛（一分）

共為細末。患者口噙冷水。以蘆管吹藥疼之左右鼻內。取嚏為効。

眩運

芎歸湯（千金）治去血多。心中懸虛。心悶眩冒。頭重目暗耳聾。

當歸　芎藭（各三兩）

右以水四升。煑取二升。去滓。分二服即定。（千金原無方名。今据局方錄之。）

近効白朮附子湯（外臺）治風虛頭重眩。苦極不知食味。即仲景朮附子湯。○三因加川芎。名芎朮湯。易簡名芎朮除眩湯。主治並同。

伏苓桂枝白朮甘草湯（直指）　治氣上衝胸。戰搖眩運。

理中湯（直指）　治寒濕眩暈。甚者養正丹。

香橘飲（直指）　治氣滯眩運。

木香　白朮　半夏　橘皮　茯苓

縮砂（各半兩）　丁香　甘草（各一分）

右生姜水煎。仍呑蘇合圓。

五苓散（直指）　治停飲眩冐。心下悸氣。

鈎藤散（本事）　治肝厥頭暈。（方出頭痛門）

羚羊角散（本事）　治風邪乘於陽經。上注頭目。遂入於腦。又

或痰水結聚胸膈。上衝頭目。一切眩暈。

羚羊角　伏神（各一兩）　芎藭　防風　半夏

白芷　甘草（各半兩）　枳殼　附子（各三分）

右生姜半分。水煎。

香薷飲（濟生）　治中暑眩運。煩悶不甦。（方出暑門）

玉液湯（濟生）　治七情傷感。氣鬱生涎。隨氣上逆。頭目眩運。

心嘈忪悸。眉稜骨痛。

大半夏（洗淨。湯泡七次。切作片子）

右件。每服四錢。水二盞。生姜十片。煎至七分。去滓。入沉

香水一呷溫服。不拘時候。

旋覆花湯（濟生）治中脘伏痰。嘔逆眩運。

旋覆花　半夏　橘紅　乾姜（各一兩）　檳榔

人參　甘草　白朮（各半兩）

右生姜。水煎。○壽世加茯苓。名清陽除眩湯。

星附湯（葉氏）治風虛痰作。頭目旋運。神昏語蹇。及痰厥頭痛。

天南星（一箇重一兩者炮）　附子（一箇重九錢者）　人參（一兩）

右生姜十片。水煎服。

辛夷湯（御藥院方）治肺氣不利。頭目昏眩。鼻塞聲重咯嚀。

辛夷　菊花　白芷　前胡　川芎

薄荷　石膏　白朮　茯苓　生芐

陳皮（各一兩）　甘草（二兩）

右水煎服。

荊黃湯（子和）治頭目眩。

大黃　荊芥　防風（各等分）

右水煎服。以利為度。○丹溪曰。眩暈不可當者。大黃三次酒炒乾為末。茶調下。每服一錢至二錢。

半夏白朮天麻湯（東垣）治頭旋眼黑。如在風雲中者。（方出頭痛門）

加味二陳湯（得効）治痰運。或因冷食所傷。

即二陳加丁香。胡椒。

天麻半夏湯（寶鑑）治風痰內作。胸膈不利。頭旋眼黑。兀兀欲吐。上熱下寒。不得安臥。

天麻　半夏（各一分）　橘皮　柴胡（各七分）　黃芩

甘草　茯苓　前胡（各五分）　黃連（三分）

右生薑。水煎。◯（醫家類選）無前胡。

八味丸料（薛己）治氣短痰暈。腎家不能納氣歸源。

溫膽湯加天麻（赤水醫案）治痰火眩暈嘔吐。（方出虛勞門）

加味四物湯（回春）治血虛痰火頭眩。

即本方加人參。陳皮。黃芩。山梔。茯苓。天麻。甘草。

右姜。棗。水煎。

參附湯（回春）治真陽不足。上氣喘急。氣短自汗。眩暈。（方出中風）

薑附湯（壽世）治體虛之人。一時為寒所中。口不能言。眩暈欲倒。

神白散（神巧萬全）治頭風。

石膏　白附子（炮）　天南星（炮）　白芷

甘菊花　京芎　天麻（各等分）

右件搗羅爲末。每服一錢。先嚼薄荷三五葉。溫酒調下。

蘇沉沉麝丸直指治一切血運。（方出腹痛門）

順元散得効治痰運。體虛甚者。（方出癨痰門）

茸珠丹要訣治因虛眩運。（方見頭痛門）

治風濕痰飲。上攻頭目。眩脹眵䁾。（彙言）

旋覆花　天麻　甘菊花

各等分爲末。每晩服二錢。白湯下。

痞滿

枳實湯（千金）下氣。治胸中滿悶。

枳實（三枚）　附子（二枚）　大棗（十二枚）　半夏（五兩）　人參

甘草　白朮　乾姜　厚朴（各二兩）

右水煎服。

瀉脾湯（千金翼）主脾藏氣實。胸中滿。不能食。

茯苓　厚朴（各四兩）　桂心（五兩）　生姜（八兩）　半夏（一升）

人參　黄芩　甘草（各三兩）

右水煎。亦逐水氣。

柴胡湯（外臺）療胸膈滿塞。心背撮痛。走注氣悶。

柴胡　當歸　木香　犀角屑（各六分）　檳榔（十箇）

甘草（二分）

右水煎服。（原方用麝香末。今除之。）

檳榔湯（外臺）療心頭冷硬結痛。下氣。

檳榔（十顆）　生姜　木香（各三兩）　橘皮　枳實

甘草　大黃（各三兩）

右水煎服。○同去生姜橘皮。加芍藥人參桂心。蜜丸名檳榔丸。療一切氣。妨悶不能食。

調胃散（宣明）治胸膈痞悶。不思飲食。脇肋硬痛。補水脹。

半夏　甘草　厚朴　陳皮　藿香（各等分）

右姜棗水煎。

消痞湯（東垣）治因憂氣鬱結。中脘腹皮裏微痛。心下痞滿。不思飲食。

枳實　當歸（各二分）　陳皮　木香（各三分）　柴胡（四分）

草豆蔻　炙甘（各五分）　半夏（一分）　紅花（少許）

右生姜水煎。○一名木香化滯湯。○試效方有益智無木香。

破氣湯（醫統）治婦人氣上逆。胸膈作痛滿悶。

烏藥　香附子（各一戔）　紫蘇　陳皮　檀香

姜黃　砂仁　甘草（各戔半）

右姜。葱。水煎。入沉香。木香末。各五分。調服。

解鬱和中湯（回春）治胸膈痞滿。內熱。夜不安卧。卧則愈悶。

陳皮（一戔二分）　茯苓　香附　枳殼　梔子（各一戔）

半夏　前胡（各八分）　黃連　神麯　厚朴

蘇子（各七分）　青皮（五分）　甘草（四分）

右生姜。水煎。

養胃湯（回春）治痞滿而不能食。

即局方人參養胃湯。去人參。草菓。加香附。砂仁。木香。

枳實。白豆蔻。（原方見于傷寒門）

開懷散（百代醫宗）治心下積塊。痞悶發熱。

陳皮　青皮　半夏　白茯苓　三稜

莪朮　香附　檳榔　草豆蔻（倍用）　紅花

柴胡（倍用）　枳實　甘草

右切一劑煎服。

加味陷胸湯（醫林集要）治熱壅痞滿。胸膈痛或兩脇痛。

枳殼　桔梗（各四分）　半夏　黃芩　瓜蔞子

黃連（各二分）　麥門（二分）

右生姜。水煎。一法只用小陷胸湯加枳。桔。甚効。

瀉心湯（直訣）治熱痞。

黃連一兩。去鬚。為極細末。每服一字。至一錢。臨卧溫水調下。

枳殼散（本事）治心下蓄積痞悶。或作痛。多噫敗卵之氣。

枳殼　白朮（各半兩）　香附（一兩）　檳榔（三分）

右為細末。每服二分。米飲調下。日三服。不拘時候。麗老方。

枳實消痞丸（東垣）治心下濕痞。惡食懶倦。開胃進食。

枳實　黃連（各五分）　白朮　人參　半夏（各三分）

甘草　乾姜　茯苓　麥芽（各二分）

右蒸餅為丸。桐子大。每服五七十丸。白湯下。○一名失笑丸。劉宗厚云。此半夏瀉心加減方。

三脘痞氣丸（寶鑑）治三焦痞滯。水飲停積。脇下虛滿。或時刺痛。

木香　白豆蔻　青皮　三稜（各一兩）　半夏（二兩）

檳榔　砂仁　沈香　大腹皮（各五分）

右神麯糊丸梧子大每服五六十丸陳皮湯下（原方用陳皮今去之大腹皮原用大腹子）

枳實理中丸（寶鑑）治中脘痞滿滯氣不消積寒停冷飲食不化

即理中丸加枳實茯苓（原出活人書）

墨錫丹（要訣）治氣虛上逆遂成痞塞而疼

六磨飲呑下此丸子（六磨飲方見氣門）

內消丸（壽世）治痞悶氣積食積

青皮　陳皮　三稜　莪朮　神麯

麥芽　香附（各等分）

右爲末醋糊爲丸梧子大每服三五十丸茶清送下

開結枳實丸（醫林集要）治濕痰痰飲胸膈痞悶時作鳴聲

枳實　白朮　半夏　南星　枯礬

大黃（各半兩）　牽牛（頭末二兩）　皂角　旋覆花（各一兩）　青皮

木香（各五分）

右爲末麪糊丸梧桐子大每服三十丸米飲下

栝樓實丸（醫林集要）治胸痞証胸中痛徹背喘急妨悶

栝樓實　枳殼　半夏　桔梗（各等分）

右為末。姜汁糊丸。如桐子大。每五十丸。食後姜湯下。煎服亦可。

脹滿

厚朴七物湯（金匱）治病腹滿。發熱十日。脉浮而數。飲食如故。

厚朴（半斤）　甘草　大黃（各三兩）　大棗（十枚）　枳實（五枚）

桂枝（二兩）　生姜（五兩）

右七味。以水一斗。煮取四升。温服八合。日三服。○壽世枳實分消湯治熱脹。即本方。

厚朴三物湯（金匱）治痛而閉者。

厚朴（八兩）　大黃（四兩）　枳實（五枚）

右三味。以水一斗二升。先煮二味。取五升。內大黃。煮取三升。溫服一升。以利為度。

大承氣湯（金匱）腹滿不減。減不足言。當下之。宜此湯。

走馬湯（金匱）治中惡心痛。腹脹。大便不通。

巴豆（二枚去皮熬） 杏仁（二枚）

右二味。以綿纏搥令碎。熱湯二合。捻取白汁。飲之。當下。老小量之。通治飛尸鬼擊病。

大半夏湯（千金）治胃中虛冷。腹滿塞。下氣方。

半夏（一升） 大棗（二十枚） 甘草 附子 當歸

人參 厚朴 茯苓 枳實（各三兩） 桂心（五兩）

生姜（八兩） 蜀椒（二百粒）

右水煎服。

柴胡厚朴湯（外臺）療心腹脹滿。

柴胡 厚朴（各十分） 茯苓 陳皮 紫蘇（各八分）

生姜（十二分） 檳榔（末。五分）

右水煎服。

前胡散（聖惠）治腹虛脹滿。不欲飲食。

前胡 厚朴 茯苓 紫蘇子 檳榔

草豆蔻（各一兩）　橘皮　木香（各三分）

生姜半分。水煎。

大黃散聖惠治心腹卒脹滿。脇肋疼痛。不欲飲食。

大黃（炒二兩）　當歸　桂心　桃人（各半兩）　鼈甲

橘皮（各一兩）

生姜。水煎。

人參湯聖濟治脾胃不和。中寒虛脹。

人參　茯苓　肉豆蔻　檳榔　木香（各一分）

白朮　訶子皮　橘皮（各半兩）　莪朮　三稜（各一兩）

生姜三片。木瓜一片。水煎。

平肝飲子濟生治喜怒不節。肝氣不平。邪乘脾胃。心腹脹滿。連兩脇。妨悶。頭暈嘔逆。脉來浮弦。

防風　桂枝　枳殼　芍藥　桔梗（各一兩）

木香　人參　檳榔　當歸　川芎

橘紅　甘草（各半兩）

右生姜五片。水煎服。

大正氣散濟生治脾胃怯弱。風寒濕氣傷動。冲和。心腹脹滿。有妨飲食。

厚朴　藿香　半夏　橘紅　白朮（各一兩）

甘草　檳榔　桂枝　枳殼　乾姜（各半兩）

右生姜五片。棗二枚。水煎服。

朴附湯（濟生）治老人虛人中寒下虛。心腹膨脹。不喜飲食。脉來浮弱而遲。此名寒脹。

○附子（炮）　厚朴（各等分）

右姜七片。棗二枚。水煎。加少木香尤佳。○得效朴附圓。治脾虛脾泄。即本方。有神麴五分。干姜炮三兩。為末酒煮糊圓如梧子大。每服三十圓。空心米飲或鹽湯下。

强中湯（濟生）治脾胃不和。食啖生冷。過飲寒漿。多致腹脹。心下痞滿。有妨飲食。甚則腹痛。

乾姜　白朮（各一兩）　青皮　橘紅　人參

○附子　厚朴　甘草（各半兩）　草菓　丁香（各三兩）

右生姜五片。大棗二枚。水煎。嘔者。加半夏。或食麪致脹滿。加蘿蔔子半兩。

人參芎歸湯（直指）治血脹。

當歸　半夏（各三分）　川芎（一兩）　蓬朮　木香

縮砂　烏藥　甘草（各半兩）　人參　辣桂

五靈脂（各一分）
右姜棗水煎（原方用紫蘇四葉）○入門去烏藥加芍藥名散血
消脹湯
沉香飲得効治腹脹氣喘坐卧不得
沉香　木香　枳殻（各半兩）　蘿蔔子（一兩）
右生姜三片水煎
治氣鼓脇下痛引及背（濟衆方）
青皮　川練子　三稜　莪朮　木通
陳皮　甘草　檳榔（各等分）
右橘皮橘葉同煎温服
呉茱萸湯（宣明）治䐜脹陰盛生寒腹滿䐜脹且常常如飽
不欲飲食進之無味
呉茱萸　厚朴　官桂　乾姜（各二兩）　白朮
陳皮　蜀椒（各半兩）
右生姜三片水煎
厚朴湯（入門）治脹滿
大承氣湯加檳榔良姜
七氣消聚散（準繩）

香附米（一匁半）　青皮　蓬朮　三稜　枳殼

木香　砂仁（各一匁）　厚朴　陳皮（各一匁二分）　甘草（四分）

生姜。水煎服。

臌脹經年而不死者。必非水臌。水臌之証。不能越於兩年。未有皮毛不流水而死者。今二三年不死。非水臌。乃氣臌。血臌。食臌。蟲臌也。但得小便利。而胃口開者。俱可治方。（石室）

茯苓（五兩）　人參（一兩）　雷丸（三匁）　甘草（二匁）　蘿蔔子（一兩）

白朮（五匁）　大黃（一兩）　附子（一匁）

水十椀。煎湯一碗。早服一椀。必然腹内雷鳴。少頃必下惡物滿桶。急拿出傾去。再換桶。即以第二椀繼之。又大瀉大下。至黃昏而止。淡淡米飲湯飲之。不再瀉。然人弱極矣方。

人參（一匁）　茯苓（五匁）　薏仁（一兩）　山藥（四匁）　陳皮（五分）

白芥子（一匁）

水煎服。一劑即愈。忌食鹽者一月。犯則無生機矣。先須斷明。然後用治之。

鱉甲丸（外臺）　療鼓脹氣急。衝心硬痛。

鼈甲（炙） 芍藥 枳實 人參 檳榔（各八分）

訶梨勒 大黃（各六分） 桂心（四分） 橘皮（四分）

右蜜丸如梧子大。酒服二十丸。漸加至三十丸。

木香圓（聖惠）治水氣。心腹鼓脹。

木香（半兩） 檳榔（半兩） 硇砂（三分） 青橘皮（二分）

吳茱萸（半兩） 巴豆（三十枚去皮心研紙裹壓去油）

右為末。以釅醋一大盞。熬硇砂。巴豆為膏。入末相和圓如菉豆大。每服五圓。煎青橘湯下。

乾漆丸（聖惠）治腹內諸氣脹滿。脇下堅硬。四肢羸瘦。面色萎黃。不欲飲食。

乾漆（炒令烟出） 橘皮（各一兩） 木香 當歸 乾姜（各半兩）

巴豆（一分去皮心研紙裹壓去油）

右為末。入巴豆。研令勻。鍊蜜和擣百餘杵。丸如菉豆大。每於食前。以生姜橘皮湯下五丸。

雞屎醴散（宣明）治心腹脹滿。旦食不能暮食。致成嘔逆鼓脹。

雞屎醴（炒乾者） 大黃 桃仁（各等分）

右為末。每服二錢。水盞半。姜三片。煎七分。食前服。

雞屎醴（正傳）

鷄雞屎

右一味。研細炒焦色。地上出火毒。再研極細。百沸湯三升淋汁。每服一大盞。調木香檳榔末各一錢。日三服。空腹服。以平為度。

祕方治脹圓（袖珍）

木香　茯苓　厚朴（各一兩）　大黃　澤瀉（一兩半）

滑石　黑牽牛（末各六兩）

右為末。水為圓如梧子大。每服九十圓。姜湯下。

牽牛妙酒（摘要）治一切肚痛。四肢浮腫。不拘鼓脹。氣脹脹。水脹等。

用乾鷄矢二升。鍋內炒黃。以好酒三椀淬下。煮作一椀。絹濾去渣。令病人飲之。少頃腹中氣大轉動作鳴。從大便利下。即自腳膝及臍上下。先作皺起。漸漸消復。如利未盡。再服一劑。以田贏二枚。滾酒內淖熟食之。即止。以溫粥調理。安好如常。此方。峨眉有僧以此方治一人。一二日即愈。自能牽牛來謝。因名。

金陵酒丸（回春）治鼓腫。

眞沉香　牙皂　檳榔（各一兩）　木香（二兩半）

右為末。用南京燒酒為丸。每服三錢。重者四錢。五更燒酒下。水腫水自小便而出。氣鼓放屁。水鼓加苦葶藶五錢。煎酒送下。再服。

神靈丹（壽世仙丹）治十種蠱脹。屢驗。

黑牽（三分炒三分生）。　大黄（六分）　木香　阿魏（焙）　丁香

檳榔（各二分四分）　香附（生用四分）

共為細末。用神餅七箇。每箇開孔入藥末三分半。仍以神餅合口。放老米飯上蒸過。慢火瓦上焙乾。每服一餅。早午晚各嚼食一枚。能飲火酒送下。不能飲白滾湯下。數日即消。起死回生。但忌鹽百日。永不發也。

琥珀人參丸（醫通）治血蠱。

人參　五靈脂（各一兩）　琥珀　肉桂　附子（各五分）

茯苓　川芎　沉香　穿山甲（煅各三分）

右為末。濃煎蘇方汁為丸。每服二錢。早暮溫酒各一服。

此方人參。與五靈脂並用。最能潛血。血蠱之的方也。

陸氏御院方。治心腹冷氣。氣逆脹滿。（本草彙言）

訶黎勒（三箇）　砂仁（五分）　白芥子（四分）　白豆仁（三分）

共研末。水糊為丸。黍米大。每早晚各服二錢。灯心湯下。

方脈正宗。治一切臓脹蠱脹方。（本草彙言）

蜒蚰（五十條）　萆麻子肉（四兩）　巴豆肉（一兩。俱研生油）　生半夏（一兩。研細）

蟾酥（三分）　真牛黄（二分）

右用酒半鍾浸化。和入萆麻。巴豆。半夏末内拌勻。隨將蜒蚰。蟾酥。牛黄和勻。總研成膏。為丸如麻子大。每早午晚。各服十丸。以津唾嚥下。

臓脹方。（大還）

蒼朮（四兩。泔水浸）　大戟（二兩。陰陽水各二鍾。煮乾。去戟。取朮炒脆）　半夏　枳實

白芥子（各三錢）　絲瓜筋（炒）　車前子　沉香

木香（各四錢）

共為末。酒下一錢。日三服。

噎膈

訶黎勒散　聖惠　治膈氣妨悶。不能下食。吐逆煩喘。

訶黎勒皮（一兩）　木香（三分）　橘皮（一兩）　五味子

半夏　人參　桂心　茯苓

枳殼（各三分）　蘆根（一兩）

右生姜。水煎。

丁香散　聖惠　治膈氣嘔逆。不能下食。脾胃氣弱。四肢乏力。

丁香　枇杷葉（各半兩）　青皮　茯苓　人參

桂心　半夏（各一兩）

右姜。棗。水煎。

治食物過飽不消。遂成痞膈。將死方。神巧

馬牙消（一大兩。碎之。如無以芒消代之） 呉茱萸（半斤。陳者）

右煎茱萸。取濃汁投滓承熱服之。久未轉。更進一服立愈。唐竇群。嘗話在常州時。食膾不消。痞結悶甚。諸藥悉不轉。腹堅氣絶。醫徐彦莊處得此方服乃瘥。竇云微此殆絶。

五噎散（濟生）治五噎食不下。嘔噦痰多。咽喉噎塞。胸背滿痛。

人參 半夏 桔梗 白豆蔻 木香

杵頭糠 白朮 蓽澄茄 沉香

枇杷葉 乾姜（各一兩） 炙甘草（半兩）

右生姜七片水煎。

五膈散（濟生）治五膈胸膈痞悶。脇肋脹滿。痰逆惡心。不進飲食。

枳殻 木香 青皮 大腹子 白朮

半夏 丁香 南星 干姜 麥蘖

草菓（各一兩） 甘草（半兩）

右生姜五片。水煎。

通氣湯（御藥）主胸滿氣噎。

即千金奔氣湯。去人參。（方見奔豚門）

滋血潤腸湯（統旨）治血枯。及死血在膈。飲食不下。大便燥結。

當歸（三分）　芍藥　生芐（各一分半）　紅花　桃仁

大黃　枳殼（各一分）

水一鍾半。煎七分。入韭菜汁半酒盞。食前服。

韭汁飲方（考）治血噎膈。

生韭汁　醇酒（等分）

右每服二合。日二。

七聖湯（彙補）治噎膈。

半夏　黃連　白荳蔻　人參　茯苓

竹茹（各等分）

右生姜。水煎服。

紫蘇子飲（醫統）治膈噎。上氣欬逆。因怒未定。便夾氣飲食。或食飲畢便怒。以致食與氣相逆。遂成噎膈之候。

真蘇子　訶子　蘿蔔子　杏仁　木香（五分）

人參（各一戔） 青皮 甘草（各二戔）

右生姜。水煎。

啓膈散（心悟）通噎膈。開關之劑。屢効。

沙參 丹參（各三戔） 茯苓（一戔） 貝母（一戔五分） 欝金（五分）

砂仁殼（四分） 荷蒂鼻（二个） 杵頭糠（五分）

右水煎服。虛加人參。

治膈噎一方。（本草備要）

鄭方升曰。蒲公英。一莖兩花。高尺許者。掘下數尺。根大如拳。旁有人形拱抱。擣汁酒服。治膈噎如神。

利膈豁痰湯（大還）治氣結痰壅。膈噎飲食不下。

半夏 橘紅 枳實 檳榔 沉香

桔梗 瓜蔞 黃連 梔子 香附

細茶 白芥子 石膏

右水煎服。初服二三貼。加蘇葉。麻黃。

五噎圓（千金）治胸中久寒。嘔逆逆氣。食飲不下。結氣不消。

乾姜 蜀椒 食茱萸 桂心 人參（各五分）

橘皮（六分） 細辛 白朮 茯苓 附子（各四分）

右為末。蜜和丸如梧子大。酒服三丸。日三。不知稍加至

十丸。

五膈圓（千金）治五膈。苦心滿不得氣息。引背痛。食即心下堅大如粉絮。大痛欲吐。吐即差。飲食不得下。甚者手足冷。喘息短氣。

麥門　甘草（各五兩）　蜀椒　遠志　桂心

細辛（各三兩）　附子（一兩半）　人參（四兩）　乾姜（二兩）

右為末。蜜丸。微使淖。先食含如彈丸一枚。細細咽之。喉胸中當熱。藥力稍盡。復含一丸。日三夜二。○肘後五膈要丸。本事治噎薰膈圓。即是。

硇砂圓（聖惠）治五種膈氣。壅滯氣逆。心腹脹痛。宿食不消

硇砂　沉香　木香　訶黎勒皮　附子

乾姜（各一兩）　檳榔（一兩半）　桃仁（一百二十枚）

右為末。煉蜜和擣三二百杵。圓如梧子大。姜湯下二十圓。

桃花散（聖惠）治五膈氣。食飲不下。漸將羸瘦。

桃仁（二兩。當年者）　檳榔（三兩）　縮砂（二兩）　馬牙消（二兩）

呉茱（二兩。微炒）

右為散。每日不計時候。以熱酒調下一錢。

大黃丸（聖惠）治五膈氣。

川大黃（微炒）　訶黎勒（煨各半兩）

右為末。煉蜜丸如梧桐子大。每服以溫水下二十丸。以微利為度。

硇砂丸（神巧）治五膈氣噎悶。或吐逆不下食。

大附子（一箇。剜去中心內別和後藥杵）　硇砂（水飛過）　丁香（各半兩）　青橘皮（去白焙）

木香　肉豆蔻（各一分）　檳榔（三分。生用）

右以淨硇砂。內入剜了附子中。和不盡。都將熟麪如餛頭。裹入灰中煨令焦。却和丁香等。都杵為末。滴水和再杵丸如梧桐子大。每服二十丸。生姜湯下。

寬膈圓（三因）治氣不升降。胸膈結痞。

木香　京三稜　青皮（各二兩）　半夏（三兩）

大腹子（一分）

右為末。姜汁糊為丸梧子大。食後米湯下二三十圓。

人參利膈丸（寶鑑）治胸中不利。痰嗽喘滿。利脾胃壅滯使祕。推陳致新。治膈氣之聖藥也。

木香　檳榔（二錢半）　人參　當歸（各三錢）　藿香（一錢半）

甘草　枳實（各五錢）　大黃（一錢）　厚朴（一兩）

右為末滴水為丸桐子大如難丸少加宿蒸餅和丸每
服三五十丸食後諸飲下
挂香散寶鑑治膈氣反胃諸藥難差朝食暮吐暮食朝吐
甚者食已輙出其効如神
水銀　黑錫（各三分）　硫黄（一分）
右三味銚內用柳木搥研煞微火上細研為灰取出後
入丁香末二錢挂末二錢生姜末三錢一處研勻每服三
匁黃米粥飲調下一服取効病甚者再服
參茯膏醫統治五膈五噎嘔逆食不下
人參　陳皮　茯苓　生地　麥冬
右以水一斗煎成膏入丁香沉香末各二錢蜜半碗姜
汁一杯和勻每服二匙粟米飲下有痰加竹瀝
桃仁承氣湯（識病捷法）噎膈有積血者為丸酒送下五十丸隔
一日服一次十次為止其藥韮汁糊丸
神仙奪命丹（附餘）專治噎食
烏梅（十三箇水浸去核）　硇砂　雄黄（各二分）　乳香（一分）　菉豆
黑豆（各四十九粒）　百草霜（五分）
右將烏梅杵爛前藥並豆為末入梅再擣和勻丸如彈

子大。以乳香。少加朱砂為衣。陰乾。每服一丸。空心。嚼化。待藥盡。烙熟餅一箇。擘碎。入熟茶泡食之。無礙為驗。過三五日。依法再服一丸。即愈。極有神効。○統旨。玄珠。名雄黃二豆丸。普濟良方。不用硇砂。而用硼砂。曰此古今第一回春。名二豆回生丹。

鄧才雜興方（本綱）治噎膈反胃。

硇砂二錢。水和蕎麥麪包之。煆焦。待冷。取中間濕者。焙乾一錢。入檳榔二錢。丁香二箇。研勻。每服七釐。燒酒送下。日三服。愈即止。後喫白粥半月。仍服助胃丸藥。又方。平胃散各一錢。入硇砂。生姜。各五分。為末。沸湯點服二錢。當吐出黑物如石。屢驗。

張三丰。治噎膈將成。能下氣開鬱方。（彙言）

蘭草葉　白豆蔻　鬱金　蘇子　蘆根

共煮汁。磨沉香數分。每日飲之。愈。

五子散（彙言）治氣膈臌脹。

白芥子　山查子　香附子　紫蘇子

蘿蔔子（各五分微炒）

共研為細末。每早晚各食前。服三錢。白湯調下。

腰痛

腎著湯（千金）治腰以下冷痛。重如帶五千錢。

甘草（二兩）　乾姜（三兩）　茯苓　白朮（各四兩）

右水煎◯外臺。經心錄加杜仲。桂心。澤瀉。牛膝。名腎著散。

獨活寄生湯（千金）治腰痛攣脚。重痺緩弱。

獨活（三兩）　寄生（錄驗用續斷）　杜仲　牛膝　細辛

秦艽　茯苓　桂心　防風　芎藭

乾地　人參　甘草　當歸　芍藥（各二兩）

右水煎。○諸症辨疑。以羌活。續斷。代獨活。寄生。名羌活續斷湯。

獨活散　聖惠　治冷滯風氣攻刺。腰胯疼痛。

獨活　附子（各一兩）　牛膝（二兩）　川芎　桂心

芍藥　當歸（各三分）　桃仁（半兩）

右生姜半分。水煎。

熟大黃湯　三因　治墜墮閃肭。腰痛不能屈伸。

大黃（切如豆大）　生姜（各半兩切）

右同炒令焦黃。以水一大盞。浸一宿。五更去滓頓服。天明所下如雞肝者。即惡物出。

甘豆湯　直指　治內蓄風熱入腎。腰痛大小便不通。

黑豆（二合）　甘草（二寸）

右加生姜七片。引水煎服。加續斷。天麻。間服敗毒散。

調肝散　直指　治鬱怒傷肝。發為腰痛。

半夏（三分）　辣桂　木瓜　當歸　川芎

牛膝　細辛（各二分）　石菖蒲　酸棗仁　甘草（各一分）

右姜。棗。水煎。

獨活湯　東垣　治因勞役。濕熱自甚。腰痛如折。沉重如山。

獨活　防風　羌活　肉桂　大黃

澤瀉（各二分）　甘草（一分）　當歸　連翹（各半兩）　黃栢（一兩）

防已（一兩）　桃仁（三十粒）

右水酒各半盞煎服。

羌活桃仁湯（經驗）治墜墮閃挫。氣血凝滯。攻刺腰痛神效。

羌活　桃仁　紅花　牛膝　玄胡索

大黃（各等分）

右水二盞。葱一根。煎服。

七味蒼栢散（入門）治濕熱腰痛。動止滯重。不能轉動。

蒼朮　黃栢　杜仲　故紙　川芎

當歸　白朮（各一分）

右水煎服。

滲腰湯（傅氏醫學集要）治一切腰痛。不可忍者。

破故紙　小茴　玄胡索　牛膝　當歸

杜仲　黃栢　知母

右水姜煎服。

桃核承氣湯（醫通）治兩腰僂廢。乃熱邪深入。血脈久閉之故。

本方多用肉桂。少加熟附行經。但痛者可治。僂廢而不

痛者。不可治也。

治腰脊苦痛不遂方。（千金）

鹿角。去上皮。取白者。熬令黃。爲末。酒服方寸匕。日三。特禁生魚。餘不禁。新者良。陳者不佳。服角。心中黃處亦不中服。大神良。○文仲云。鹿茸尤良。

陶氏腎氣丸（外臺）主短氣腰痛身重。調中補筋脈。

乾地黃（五分）　續斷（五分）　人參（五分）　萆薢（三分）　阿膠（三分）

右擣篩。蜜和丸。如梧子大。以酒下十丸。加至二十丸。

復元通氣散（局方）治氣。不宣流。或成瘡癤。並閃挫腰脇氣

滯疼痛。

舶茴（炒）　穿山甲（炒各二兩）　玄胡索　白牽牛（炒）

甘草（炒）　陳皮（各一兩）　木香（一兩半）

右爲末。每服一錢。熱酒調下。不飮酒者。煎木香湯調下。

如神湯（婦人良方）治男子婦人腰痛。

延胡索　當歸　桂心

各等分爲末。温酒調下二匁。○幼幼新書。治小兒驚癇。或寒濕手足不擧。筋骨不舒。經絡諸疾得効。名舒筋散。

治血滯腰痛。亦治閃挫。○經驗良方。名三聖散。

趁痛散（楊氏） 治寒濕相搏。攻注腰脚疼痛。行步少力。筋脈拘急。

沒藥　杜仲（炒斷絲）　延胡索　當歸　肉桂

萆解（各一兩）

右為細末。每服三錢。溫酒調下。

牽牛圓（楊氏） 治冷氣流注。腰疼不能俛仰。

延胡索（二兩）　破故紙（炒二兩）　黑牽牛子（炒三兩）

右為細末。煨大蒜研搜圓如梧子大。每服三十圓。煎葱鹽湯送下食前。○又去延胡索。名補骨脂散。治寒濕氣滯腰疼脚膝腫滿。為細末。每服三錢。橘皮湯調下。以利為度。

鹿角圓（三因） 治腎虛傷冷。冷氣入腎。其痛如掣。

鹿角（一兩炙黃）　附子（炮一兩）　桂心（三分）

右為末。酒糊圓如梧子大。鹽酒服三五十圓。空心服。

青娥圓（三因） 治肝腎虛腰腿重痛

杜仲（炒一斤）　生姜（炒十兩）　破故紙（炒一斤）

右為末。用胡桃肉一百二十箇。湯浸去皮。研成膏。入少熟蜜圓如梧子大。每服五十圓。鹽湯任下。食前服

趁痛圓（得効） 治腰痛極効。亦治閃肭。

附子（炮半兩） 黑牽牛（一兩）

右為末。酒糊圓如梧子大。每服五十圓。鹽湯食前服○經驗良方。名附牛圓。溫酒下。如半邊痛各半生半熟（並）去皮。

遠効散（附）餘治腰疼不可忍。

川楝子（用肉以巴豆去殼五箇同炒赤去巴豆） 茴香（鹽炒） 破故紙（炒各一兩）

右同為末。每服一錢。食前熱酒調服。

背痛肩背痛身體痛

五香連翹湯（千金）身中忽有痛處。如遭打撲之狀。名曰氣痛。痛不可忍。遊走不住。發作有時。痛則小熱。痛定則寒。此皆由冬時受溫氣。至春暴寒風來折之。宜服之。（方見癰疽門）

延年羚羊角散（外臺）治肺熱。胸背痛。時時乾欬。不能食。

羚羊角屑（二兩） 貝母 茯苓 生姜（各三兩）

橘皮 人參 芍藥（各三兩）

右水煎服。

加減當歸飲子（聖惠）治肩忽痛。

防風　當歸　柴胡（各一兩半）　生地黃（一兩半）　芍藥

黃芩　人參（各一兩）　黃連（半兩）　甘草（一兩三分）　滑石（六兩）

大黃（一兩半）

右水煎服。

補骨脂散（簡要濟衆）治肝藏風冷氣攻。手足拘急。及轉筋。一切筋寒之病。

補骨脂　茴草葉　官桂　附子（炮）

乾姜（各一兩）　乾蝎（一分微炒）。

右葱白二寸。鹽少許。酒水各半。煎服。如是急轉筋甚者。

為末。用熱酒調下。

生附除濕湯（方見中濕門）　五苓散（直指）　治傷濕身痛。

黃芪建中湯加芎歸（直指）治血刺身痛。

舒經湯（婦人良方）治血氣滯留。經絡不行。臂痛不可忍者。

姜黃（四兩。如無用嫩莪朮代。不可用染物者）　白朮（二兩）　羌活　甘草（各一兩）

當歸（二兩）　海桐皮（二兩）　芍藥（一兩）

右水煎服。○回春蠲痺湯。無白朮。海桐。有防風。黃芪。

烏藥順氣散得効治風証臂痛身疼。（方見中風）

防風通聖散得効治熱証臂痛。

活絡湯得効治風濕臂痛。諸藥不效。

白朮（一兩）　當歸　獨活　羌活　甘草

川芎（各半兩）

右生姜五片。水煎。一方用蒼朮。白芷各二兩。

茯苓湯得効治水飲停蓄注於經絡。發為臂痛。

川芎　半夏　茯苓　獨活　陳皮

枳殼（各半兩）　白朮　甘草（各一分）

右生姜五片。水煎。

通氣防風湯拔萃肩背痛。不可迴顧。此太陽氣欝而不行。

以散之。

即羌活勝濕湯。（方見濕門）

提肩散壽世治風熱乘肺。肩背強直作痛。

一防風　羌活　藁本　川芎　芍藥（各七分）

黃連　黃芩（各五分）　甘草（四分）

右生姜水煎。

消痰茯苓圓百一治臂痛不能擧手。或左右轉移。或兩臂

如人抽拽。

圓白半夏（一兩半） 茯苓（一兩） 風化朴消（一分） 枳殼（半兩）

右末。姜汁煮稀麪糊。圓桐子大。每三十圓。食後姜湯下。

○經驗良方云。如婦人產後喘。四肢浮腫。遂用此藥治而愈。

補髓丹（百一） 補益眞元。治臂痛腰痛。

杜仲（炒十兩） 破故紙（十兩用芝麻五兩同炒候芝麻黑色篩去之） 鹿茸（二兩）
沒藥（一兩別研）

右細末。用胡桃肉三十箇。湯浸去皮。杵為膏。入麪少許。酒煮糊。圓桐子大。每百粒。空心鹽湯下。

白芥子散（婦人良方） 治臂痛外連肌肉。牽引背胛。時發時止。此由榮衛之循行失度。留滯經絡。與正氣相搏。有似癱瘓。

眞白芥子 木鱉子（去殼各二兩） 沒藥 桂心
木香（各半兩）

右為末。入研藥令勻。每服壹錢。溫酒調下。

麒麟血散（拔萃） 治寒濕搏於經絡。以致氣血凝泣。疼痛不可忍。

血竭 乳香 沒藥 芍藥 當歸
水蛭（炒） 麝香（各二分） 虎脛骨（酥炙黃半兩）

右爲末每三錢温酒調下

控涎丹（得効）凡人忽患胸背手脚腰胯隱隱痛不可忍連筋骨牽引釣痛坐卧不安乃是痰涎伏在心膈上下此藥（方見痰飲門）

三聖散（濟衆）大治手脚拘攣口眼喎斜左癱右换骨節痠疼脚弱無力行步不正（一名舒筋散）即婦人良方如神湯（方見腰痛門）

右等分爲細末每服二錢温酒調下空心臨卧日進三服除孕婦外老幼皆可服一方秖㕮咀以少水内爲湯使酒浸温過服專治筋脈拘攣

神保丸（簡明）有人病項筋痛諸醫皆以爲風治之數月不瘥乃流入背膂久之又注之脇攣痛甚苦乃合服之一投而瘥後嘗再發又一投瘥（方見積聚門）

拔揺痛（壽域神方）用甘遂爲末不拘多少水調傅腫處再煎甘草湯一盞空心服之

歷節風

桂枝芍藥知母湯（金匱）諸肢節疼痛。身體尫羸。脚腫如脱。頭眩短氣。温温欲吐。此湯主之。

桂枝（四兩）　芍藥（三兩）　甘草（二兩）　麻黄（二兩）　生姜（五兩）

朮（五兩）　知母（四兩）　防風（四兩）　附子（二枚炮）。

右九味。以水七升。煮取二升。温服七合。日三服。

烏頭湯（金匱）病歷節疼痛。不可屈伸。

麻黄　芍藥　黄芪（各三兩）　甘草（三兩）

川烏（五枚。㕮咀。以蜜二升。煎取一升。即出烏頭）

右五味㕮咀四味以水三升煮取一升去滓内醫煎中更煎之服七合不知盡服之○千金川烏代附子去芍藥加大棗生姜名大棗湯治歷節疼痛

防已湯千金治風歷節四肢疼痛如槌鍛不可忍者

防已　茯苓　白朮　桂心　生姜（各四兩）

甘草（三兩）　人參（二兩）　烏頭（七枚）

右水煎服

石膏湯千金逐風毒方

石膏（鷄子大三枚）　鷄子（二枚）　甘草（一尺）　麻黄（三兩）

杏仁（四十枚）

右以水三升破雞子内水中烊令相得内藥煮取一升服之覆取汗汗不出燒石熨令汗出為佳

赤芍藥散聖惠治歷節風骨節疼痛四肢微腫行立無力

赤芍藥（二兩）　附子　芎藭　當歸　防已

海桐皮　萆解（各一兩）　桂心（二兩）　桃仁（半兩）

右生姜半分水煎

附子八物湯三因治風歷節四肢疼痛如搥鍛不可忍

即楊氏滲濕湯（方出中濕門）

大防風湯（百一）治鶴膝風。兩膝腫大而痛。髀脛枯腊。

防風　白朮　杜仲　當歸　熟芐

芍藥　黃芪（各二兩）　羌活　牛膝　甘草

人參（各一兩）　附子　川芎（各一兩半）

右姜七片。棗一枚。水煎。

活血通經湯（東垣）治風氣暴仆。筋搐急而攣拳。

升麻（一分）　葛根　當歸　人參　甘草（各一分）

桂枝　黃栢（各二分）　芍藥（五分）

右水煎服。

羚羊角湯（得効）治筋痺肢節束痛。

羚羊角　薄桂　附子　獨活（各一兩三分半）　芍藥

防風　芎藭（各一兩）

右生姜三片。水煎。

牛膝木瓜湯（經驗良方）治肝虛。遇歲氣燥濕更勝。脇連小腹拘急疼痛。耳聾目赤。肩背連尻陰股膝髀皆痛。

牛膝　木瓜（各一兩）　芍藥　杜仲　枸杞子

天麻　黃松節　兎絲子（各七錢半）　甘草（半兩）

姜。棗。水煎。

丹溪一方　治飲酒濕痰痛風。

黃栢　威靈仙（各五戔）　蒼朮　羌活（各三戔）　甘草（三戔）

陳皮　芍藥（各一戔）

右生姜水煎。

又治痛風神効。

芍藥　青皮　威靈仙　木鼈子（各一戔半）

紫葳　台芎（各七分）　防風（七分半）　甘草（五分）

右酒煎服之。

又一方　治痢後風係血入臟府。下未盡。復還經絡不得

行。

松明節　蒼朮　紫葳　黃栢　桃仁（各一兩）

乳香（一戔）　甘草（半兩）

右生姜水煎。

又一方　治痛風疼痛如鍛晝輕夜劇。與風藥則愈。痛與

血藥則不效。

蒼朮　黃栢（各一戔半）　生附（一片）　甘草（三分）　麻黃（五分）

杏仁（九箇）

水煎。入姜汁些少。

加味四物湯（正傳）治白虎歷節証。

本方。加桃仁。牛膝。黃栢。草龍胆。

右水煎服。

活絡流氣飲（會元）治流注塊。或痛或不痛者。或兼作寒作熱。亦曰流注風。

紅花　連翹　當歸　羌活　柴胡

木鼈肉（研細各一分）　通草　白芷　桔梗

薄荷　川芎　猪牙皂角（燒去皮各七分）　葳靈仙（八分）

升麻（五分）　甘草（四分）

水煎服。食遠加酒半盞。塊上加黑虎膏。（方另錄）

活人錄。通治痛風主方。（瘍醫大全）

當歸（三錢）　秦艽（二錢）　防風（一錢五分）　川芎　羌活（各一錢）

車前子　黃芩　枳殼（各五分）

水煎。午後臨睡服。（加減諸法今省之）

續斷圓（本事）治風濕四肢浮腫。肌肉麻痺。甚則手足無力。筋脈緩急。

續斷　萆薢　當歸　附子　防風

天麻（各一兩）　乳香　沒藥（各半兩）　川芎（三分）

右為細末。蜜圓桐子大。酒或飲下食前。

中行圓（楊氏）治風濕毒氣客伏經絡。流注作痛。

芍藥（五兩）　甘草（三兩）　犀角（屑三兩）　威靈仙（一兩）

右為細末。煉蜜為圓。如梧子大。每服五十丸。溫水下。

擒虎散（御藥）風寒暑濕毒氣。攻注經脈。凝滯畜於筋骨痛乍歇乍作。或藏府稍實。宜疎導鬱積毒氣。

沒藥　當歸　黑牽牛　大黃（各一兩）　甘草（錢）

右為麁散。每服五錢匕。熱酒或煎皂角刺湯下。

追命再造散（醫統）治歷節風痛。並屬風多有蟲也。

錦紋大黃（一兩）　獨生皂角刺（一兩半）

右為末。每服二錢。臨夜冷酒調下。以淨桶伺候。泄蟲。蟲嘴黑色。乃是多年蟲。嘴不黑。是近日所成。越三日。又進一服。值候無蟲。則絕根也。

治諸風。一身筋骨。肢節不利。或頸項强痛。或臂脇攻痛。或足膝痺痛。（秉言）

穿山甲（二兩炒焦）　當歸　川芎（俱酒炒）　乳香　沒藥（焙）

川烏（童便製）　黃栢（鹽水炒）　薑黃（炒各一兩）　蘄蛇（一條焙燥）

俱為極細末。每早晚各服三錢。白湯下。

觀聚方要補卷四