觀聚方

五

松
科別

k 62-1

F 4
カー96

觀聚方要補卷五目錄

吐衄二便血

栢葉湯　黃土湯
瀉心湯　堅中湯
犀角地黃湯　竹茹湯
麥門冬湯　治下雜血方
生地黃湯　治勞熱吐下血方
黃芩湯　茜根散
苦參湯　理中湯

490.9
Ka-20
4

慶應義塾大学医学情報センター
昭和47年7月4日

2566
12 K6^{2}-1

富士川文庫

1514

乾薑甘草湯　阿膠散
人參湯　小柴胡湯
加味理中湯　柔脾湯
人參平胃散　犀角散
人參飲子　止紅散
當歸承氣湯　桃仁承氣湯
黑神散合小烏沈湯　蘇子降氣湯
理物湯　小建中湯加黃連
黃連芎歸湯　五苓散合四物湯
涼血地黃湯　治便血方
鬱金四物湯　涼榮湯
諸血後虛怯方　附子理中湯倍炮薑加酒
黃連　治吐血方
治諸血危極方　治熱極失血方
斷紅飲　赤小豆當歸散
三奇散　龍骨散
牡蠣散　六一散
血餘散　補肺散

治暴吐血方
治陽毒下血方
㫁紅散
地黃煎
九竅出血方
黑散子
四生圓
治內損吐下血方
麝香散
牛黃散
青金散
花蘂石散
阿膠丸
芍藥蘗皮丸
還元水
葛花丸
寸金散
鹿茸散

治傷力失血方
六味丸加烏鰂茜根
玉屑膏
滚痰丸
吐血方
治肺痿肺癰欬吐血方

疝氣

附子粳米湯
大建中湯
大黃附子湯
烏頭桂枝湯
柴胡桂枝湯
椒附湯
蘹香散
倉卒散

聚香飲子　玄附湯
吳茱萸湯　當歸四逆湯
濟生葵子湯　附子建中湯
五苓散加茴香川楝子　治諸疝方
十味蒼柏散　烏苓通氣湯
立效散　桃仁當歸湯
治疝神方　煖肝煎
通治五疝　綿實湯
八味疝氣劑　九味消疝散

木香丸　奪命丹
念珠丸　茴香散
治小腸氣方　禹功散
治疝氣方　蕩疝丹
治外腎腫方　大無雄黃散
八味丸　治疝神方
回春丸　借牲丸
沈香桂附丸　應痛丸
灸穿疝氣方

奔豚

桂枝加桂湯　茯苓甘草大棗湯
奔豚湯　奔氣湯
治奔豚氣方　治食下胸痛方
治上下衝走方　二物湯
養正丹　代赭石湯
大七氣湯　苦楝丸
治奔豚疝氣方　一方
定悸飲　治奔豚氣上下衝走方
沈香散　備急壓氣散
治寒疝冲心方

癲癇狂

三黃湯　瓜蒂散
沈香天麻湯　清心湯
大承氣湯　正心湯
清心溫膽湯　加味逍遙散
二陳湯　返魂湯
二陰煎　清心豁痰湯

鈎藤湯
獨參湯
柴胡加龍蠣湯
雄雌圓
鐵粉圓
半夏圓
雄黄圓
牛黄清心丸
辰砂散
驚氣圓
茯苓圓
鎮心丹
指迷鐵落飲
控涎丹
朱砂安神圓
牛黄瀉心湯
白金丸
仙傳神效方

通泄散

驚悸怔忡健忘虛煩不眠

桂枝救逆湯
温膽湯
酸棗湯
茯苓補心湯
黄芩散
茯神散
淡竹茹湯
加味四七湯
歸脾湯
茯苓飲子
益榮湯
加味茯苓湯
麥門冬湯
怔忡湯

補心虛健忘方　治不睡驚悸方
朱砂散　妙香散
金液丹　朱雀丸
遠志圓　朱砂丸
推肝丸　仙乳丸
胸痺心痛
栝蔞薤白白酒方　栝蔞薤白半夏湯
枳實薤白桂枝湯　人參湯
茯苓杏仁甘草湯　橘枳薑湯
桂枝枳實湯　桂枝三物湯
高良薑湯　通氣湯
柴胡湯　治胸痺短氣方
加味四七湯　平胃散加吳茱萸
扶陽助胃湯　沈香降氣湯加乳香
桃仁承氣湯　清中湯
正氣天香湯　黃連六一湯
小建中湯加香附　大承氣湯
盞落湯　和中蠲痛湯

清中蠲痛湯　歸脾湯
治久心胃痛方　薑附湯
薏苡附子散　赤石脂丸
療蛕心痛方　蜀椒丸
鶴蝨丸　雞舌香散
氣針圓　愈痛散
香附散　蕪荑散
一方　莎芎散
梔黄丸　神仙珍珠散

治厥心痛方　治心氣疞痛方

觀聚方要補卷五

東都　丹波元簡廉夫　輯

吐衂二便血

柏葉湯（金匱）治吐血不止。

柏葉　乾姜（各三兩）　艾（三把）

右三味。以水五升。取馬通汁一升。合煮取一升。分温再服。○千金。加阿膠二兩。治吐血内崩上氣面色如土。

黃土湯（金匱）下血先便後血。此遠血也。此湯主之。亦主吐衂血。

甘草　乾地黃　白朮　附子（炮）　阿膠
黃芩（各三兩）　竈中黃土（半斤）

右以水八升。煮取三升。分溫二服。○千金。無附子。地黃。有干姜。

瀉心湯（金匱）　心氣不足。吐血衄血。此湯主之。

大黃（二兩）　黃連（一兩）　黃芩（一兩）

右以水三升。煮取一升。頓服之。○拔萃。加犀角。生苄。名犀角地黃湯。治熱甚血積胸中。

堅中湯（千金）　治虛勞內傷。寒熱嘔逆吐血。

即小建中湯。加半夏。如芍藥數。○翼方。無甘草桂枝。有生地黃。

犀角地黃湯（千金）　治傷寒溫病。應發汗而不汗之。內畜血者。及鼻衄吐血不盡。內餘瘀血。大便黑面黃。

即小品芍藥地黃湯。（方見傷寒門）喜忘如狂者。加大黃二兩。黃芩三兩。

竹茹湯（千金）　治吐血汗血。大小便下血。

竹茹（一升）　甘草　芎藭　黃芩　當歸（各六分）
芍藥　白朮　人參　桂心（各二兩）

右水煎。

麥門冬湯（千金）治凡下血虚極。

麥門冬　白朮（各四兩）　甘草（一兩）　牡蛎　芍藥

阿膠（三兩）　大棗（二十枚）

右水煎。

治下雜血方。（千金）

乾藍　犀角　地楡（各二兩）　蜜（一合）

右水煎。

生地黄湯（千金）治鼻衂。

生地黄（八兩）　黄芩（一兩）　阿膠　甘草（各二兩）　栢葉（一把）

右水煎。

治大便出血及口鼻皆出血。血上胸心氣急。此是勞熱所致。（千金）

生地黄（八兩）　蒲黄（一升）　地骨皮（五兩）　黄芩　芍藥

竹茹（各一兩）

右水煎。

黄芩散（聖惠）治大腸積熱。下血不止。日夜度數無常。

黄芩　黄連　黄栢　生芐　地楡

犀角屑（各一兩） 竹茹（雞子大）

右水煎。

茜根散聖惠治小兒吐血。心躁煩悶。

茜根（半兩） 犀角屑 升麻 大黃（炒） 黃芩

甘草（各一分）

右黑豆三十粒。竹茹半分。水煎服。

苦參湯聖濟治大衄口耳皆血出不止。

苦參 黃連 大黃（各一兩） 梔子（七枚）

右水一盞。入生地黃汁一合。煎至七八分。去滓溫服。

理中湯 乾姜甘草湯（三因）止傷胃吐血。以其功最理中脘分利陰陽。安定血脈。

阿膠散直指治肺破嗽血唾血。

人參 茯苓 生芐

天門冬 五味子 阿膠

白芨

右各二分。白芨別為末。餘藥剉散。每服三錢。水大盞入蜜二大匙。秫米百粒。姜五片。同煎。臨熟入白芨少許。食後服。

人參湯（直指） 治吐血咯血。

新羅人參。慢火煎服。○丹溪方。右一味。爲末。雞子清投新汲水。調下一錢。服之。○醫通。加童便。藕汁。

小柴胡湯（直指） 男女諸熱出血。血熱蘊隆。

加味理中湯（濟生） 治飮酒過多。及啖炙煿熱物。動血發爲

鼻衄。

理中湯本方。加葛根。三因。更加川芎。○直指。本方加木香。飮食傷胃失血諸証。主之。

養生必用方柔脾湯（婦人良方） 治虛勞吐血。衄血。下白汗出。

甘草　芍藥　黄蓍（各一兩）　熟芐（三兩）

右水酒各半服。

人參平胃散（淸波雜志） 周輝。患大便下血。百藥俱嘗。暫止而復作。因循十五年不愈。或教以服此藥。逐日進一服。至月餘。而十五年之病瘳矣。

犀角散（三法六門）

黄連　大黄　芍藥　犀角　甘草（各等分）

水煎服。

人參飮子（試効） 治脾胃虛弱。氣促氣弱。精神短少。衄血吐

血。

人參（三分） 黃芪（一匁） 五味子（五箇） 芍藥（一匁） 甘草（一匁）

當歸（三分） 麥門冬（二分）

右水煎。○寶鑑有紫菀一匁。

止紅散（經驗良方） 治心肺客熱。欬嗽吐血。

柴胡（一兩） 胡黃連 黃連（各半兩）

右為末。入生朱砂少許研勻。每服三錢。水一盞煎半盞服。

當歸承氣湯（丹溪） 治尿血實者。

即調胃承氣。加當歸。

桃仁承氣湯（醫史攖寧生傳） 治積鬱火甚。迫血上行。為衄數升餘。面赤脈躁疾。神恍恍如癡。

黑神散合小烏沉湯（要訣） 有時或吐血兩口。隨即無事。數日又發。經年累月不愈者。宐此。腸風下血。亦可用。

蘇子降氣湯（要訣） 治血溢入濁道。留聚膈間。滿則吐血。名曰內衄。

本方。（方見咳嗽門） 加阿膠人參。兼養正丹。

理物湯（要訣） 瀉血色瘀為寒。宐此湯。

即理中湯合四物湯。

右水煎用。若不効者。至黒神散。米飲調下。中用附子者佳。

小建中湯加黄連（權度）治虚及傷胃吐血。

黄連芎歸湯（權度）治大便下血。腹中不痛。謂之溼毒下血。腹中痛。謂之熱毒下血。

黄連　當歸（各五分）　大黄（二錢五分。熱毒甚加之）

芍藥（熱毒加之）　桂（腹痛加之）

右水煎。

五苓散合四物湯（準繩）治溲血。其人素病於色者。此屬虚証。更加膠艾。

凉血地黄湯（正宗）治血箭。血瘀内熱甚。而逼血妄行出血如飛。（血箭心火逼血從毛竅出也。血瘀肝經怒火鬱結其初起色紅如瘀漸大如豆揩之血流）

黄連　當歸　生地　山梔　玄参

甘草（各等分）

右水煎服。

余便血諸藥不効。此方一服効。二服永不發。濟人無不効者。（嬰童類萃）

當歸　淮地　阿膠（各五分）　川芎　茅根（搗）

側栢葉（醬水浸一宿炒黃各三錢）。祁艾（醋炒）芍藥（各二錢）白芷（一錢）

右水煎。

鬱金四物湯醫滙治吐血衄血唾血。血大便下血。及一切失血神効。如鬱金不眞則不効。

當歸（酒洗一錢）。生芐（一錢三分）白芍（炒八分）。川芎（六分）韭汁（一酒盃）

鬱金（二枚磨水）。姜汁（一酒盃）童便（一酒盃。以上四味並臨服時入）

右將前四味。用水二鍾。煎一鍾。入四味溫服。

涼榮湯（百代）治吐衄血諸血。

知母　黃栢　芍藥　麥冬　蒲黃

甘草　生芐　當歸　側栢葉（各一錢二分炒）

右水煎服。

諸血後虛怯主方（痰火點雪）治吐衄咳唾等証。血失既多。虛羸昏倦。精神怯弱未盡。

人參（一錢）　黃芪（蜜炒一錢）。炙甘草（五分）　白芨

百合（各一錢）　熟地　生地（各二錢）　當歸（一錢五分）

牡丹皮（一錢）阿膠（蛤粉炒成珠一錢）　鹿角（一錢）

右十一味。作一劑。用藕節五個。水煎。臨卧時。入童便一盞。藕汁二盃。候溫。徐徐緩服。

附子理中湯倍炮姜加酒黄連醫通治因冷飲中寒（雜食）

生冷。血為寒凝而下。必腹痛色晦淡。

治吐血逆涌盈盆。（彙言）

炒姜灰（一兩）　熟地　芍藥（各五錢）　茯苓

羚羊角屑（各二錢）　甘草（一錢）

水煎服。如四肢厥冷。脈細欲脱者。加附子。人參各五錢。

治嘔血吐血。或血崩脱血。盈盆盈桶。面色青慘。六脈欲脱。

四肢厥冷。或自汗出。危極者。（彙言）

製附子（五錢）　人參（一兩）　姜灰（八錢）

水二大碗煎八分。温和服。

熱極失血。吐衄不止。（彙言）

烏犀角（磨汁半盞）　童便（半盞）　生地　丹皮　黄連

芍藥　炮姜灰（各二錢）　甘草（七分）　水煎和服

斷紅飲（攖寧自製）　治吐下血。

當歸（八分）　川芎（五分）　蒲黄（一錢）　阿膠（八分）　栢葉（一錢五分）

炒姜灰（七分）

右水煎。百草霜末點服。

赤小豆當歸散（金匱）下血先血後便。此近血也。宜此湯。

赤小豆（三升浸令芽出曬干） 當歸（三兩） 右爲散漿水服方寸匕

三奇散（聖惠）鼻血不止

亂髮灰（一匁） 人中白（五分） 麝香（少許）

爲末畜鼻

龍骨散（聖惠）鼻血不止眩冒欲死

龍骨（半兩） 亂髮（一雞子大燒爲灰）

右研如粉以少許吹鼻中立止

牡蠣散（聖濟）治大衄口耳鼻俱出血

牡蠣（一分） 石膏（一兩一分）

右爲散每服一匁匕温酒下亦可蜜丸

六一散（朱氏集驗）治咯血發寒熱

黄芪（六兩炙） 甘草（一兩炙）

右細末如常服乾喫亦得

血餘散（葉氏）治瀉血藏毒下血一服効

血餘（半兩燒灰） 雞冠花根葉（皆用一兩） 栢葉（焙干一兩）

右爲細末每服二匁温酒調下臨卧服来晨飲酒一盞投之立愈

補肺散（楊氏）治暴吐損肺吐血不止

成煉鍾乳粉

右每服二錢。煎糯米湯調下。立止。如無糯米。只用粳米。不拘時候。

治暴吐血（百一）

桂末二錢。水湯各半。濃調。約半盞許。猛喫。甚者二服。其效如神。

又方（百一）

蚌粉。研細。入辰砂少許。米飲調下二錢。（出孫兆）方。

陽毒下血。熱氣入胃。痛不可忍。（本綱引孫氏秘寶方）

鬱金（五大箇）　牛黃（一皂子大）

右為散。每服用醋漿水一盞同煎三服溫服。○易簡用鬱金一味。為末。井水服二錢。治衄血吐血。經驗方用鬱金末一兩。葱白一握。水一盞。煎至三合。溫服。日三服。治尿血不定。

斷紅散（濟生）　治陽虛臟府。久而腸風痔疾。下血不止。或所下太多。面色痿黃。日漸羸瘦。

側栢葉（炒）　川續斷　鹿茸（醋煮）　附子（炮）

黃蓍　阿膠　當歸（酒浸各一兩）　白礬（枯半兩）

右為細末。醋煮米糊為圓。如梧子大。每服七十圓。米飲
下。

地黃煎 直指 治肺損吐血欬血。

生地黃（四兩取汁）。 鹿角膠（一兩搗碎炒黃）。

右為末。拌和。每服三錢。童子小便一盞煖。熱入姜汁少
許調下。（無鹿膠則以透明阿膠代用）

九竅出血方 直指 暴驚風九竅出血。其脈虛者。

靈砂百粒。分三次。人參煎湯下。此盖不可錯認。血得
熱則宣流。妄用凉藥誤矣。

黑散子 直指 諸竅出血並主之。

隔年蓮蓬 敗棕櫚 頭髮（並燒存性等分）

右為末。每服二錢。煎南木香湯調下。

四生圓 （婦人良方） 療吐血衂血。血熱妄行。

生荷葉 生艾葉 生栢葉 生地黃

右等分爛研。圓如鷄子大。每服一圓。水三盞。煎至一盞。
去滓温服。

吐血下血。其症皆因內損。或酒色勞傷。或心肺脈破。血氣
妄行。血如湧泉。口鼻俱出。須臾不救。（衛生家寶）

側栢葉華　人參（各一兩）

右爲末。每服二匁。入飛羅麪二匁。新水調和。稀則如糊。服如前藥。用荊芥一握。燒過。蓋地上出火毒。研碎。陳米飲調下三匁。不過二服愈。如無荊芥。用鍋底墨。研爲末。每服三匁。米飲送下。連進三服。◯中藏經。飛羅麪微炒。以濃磨墨一茶脚。二錢許服。治內損吐血。

麝香散（御藥院方）治鼻衄不止。

白礬（枯過。另研）　白龍骨（粘舌者。另研。各半兩）　麝香（另研。半字）

右三味杵和勻。每用一字。先將冷水洗淨鼻內血滌。然後吹藥於鼻中。或以濕紙蘸藥。塞鼻尤妙。

牛黃散（施圓端效方）治一切熱毒。黃疸。衄血。發斑。口咽瘡爛。吐血。便血。時氣發狂。神昏不省。

川大黃　鬱金（各一兩）

右爲細末。每服二錢。鷄子清汁調下。加減服之。

青金散（施圓端效方）治吐血不止。

青黛（二錢）

右以新水調下。立効。

花蘂石散（十藥）治五內崩損。噴血出升斗。

花蘂石（煆存性。研如粉）

右以童子小便一鍾。男入酒一半。女入醋一半。煎溫食後調服三錢。甚者五錢。能使瘀血化爲黃水。後以獨參湯補之。○按此方。原出于百一選方。云治暴吐血。發寒熱。欲作勞氣而未成者。

阿膠丸（醫林方）治便血。先便而後血。謂之濕毒。

阿膠（一兩）　黃連（三兩）　白茯苓（二兩）　白芍藥（四兩）

右爲細末。水和爲丸。如桐子大。每服五十丸。加至一百丸。溫水送下。日進四五服。

芍藥蘗皮丸（醫林方）治先血而後便。謂之臟毒。

白芍藥　黃蘗　當歸（已上各等分）

右爲細末。滴水爲丸。如桐子大。每服五七十丸。煎甘草湯送下。（案此即遠血近血。別立濕毒臟毒之目者。誤）

還元水（辨疑）治咳血吐血。及產後血運。陰虛久嗽。火蒸如燎。

童便

右取十一二歲無病童子。不茹葷辛。清徹如水者。去頭尾。熱飮。冬則用湯溫之。或加藕汁。阿膠。和服。有痰加姜

汁一名輪廻酒

葛花丸（商便）治飲酒過度多酒蘊積胸中不散忽然吐血或鼻血上焦熱極者神効

葛花（四兩無花用干葛粉代之） 黃連（四兩） 梔子 山查（各二兩）

右為末用大黃熬成膏作丸梧桐子大每服六十丸白湯下

寸金散（準繩）治心經煩熱血妄行舌上血出不止

新蒲黃（三錢匕） 新白麪（三錢匕） 牛黃（研） 龍胆（研各半錢匕）

右研勻每服一錢生藕汁調服食後

鹿茸散（準繩）治小便尿血日夜不止

鹿茸（酒洗炙） 生芐 當歸（各二兩） 蒲黃（一合） 冬葵子（各四兩半）

右為細末每服三錢匕空心用溫酒調服日二

有負重為物所壓或持重遠行忽心口痛口鼻出血俗名傷力乃內膜及肺胃係傷損挣破也世人槩用涼藥食止愈出卒至胃損欬嗽而死良可嘆息考古方中急宜人參末飛羅麪童便調下最佳或以白芨末童便調下亦可但不可涼藥爾褚澄曰飲涼藥則百不一生服溺溲則百不一死信哉（醫學六要）

六味丸加烏鰂骨茜根醫通治肝腎陰虛。而痰中有血者。

玉屑膏醫通治氣虛不能攝血。而尿血者。

人參　黃芪

右等分為末。以白萊菔切片。蜜炙。不時蘸末食之。

滾痰丸（大還）肥盛或酒客輩。痰中有血。此方佳。（方見痰飲門）

吐血方。（石室）

生地汁（一碗。無鮮生地處用乾者。一兩煎湯半碗）調三七根末。三錢炮姜炭末五分。服一劑。即止血神効。衄血亦可治妙。

治肺痿肺癰咳嗽吐血。（彙言）

茯苓　百合　米仁（各一兩）　白芨（五錢）　貝母（八）

共為末。每服三錢。不拘時。白湯調下。

疝氣

附子粳米湯（金匱）腹中寒氣。雷鳴切痛。胸脇逆滿嘔吐。此湯主之。

附子（一枚炮）。半夏（半升） 甘草（一兩） 大棗（十枚） 粳米（半升）

右水煎。○小品。加乾姜。蜀椒。名解急蜀椒湯。主寒疝氣。心痛如刺。繞臍腹中盡痛。白汗出欲死

大建中湯金匱心胸中大寒痛。嘔不能飲食。腹中寒上衝皮起。出見有頭足。上下痛而不可觸近。此湯主之。

蜀椒（二合去汗）。乾姜（四兩） 人參（二兩）

右三味以水四升煑取二升去滓内膠飴一升微火煎取一升半分温再服

大黄附子湯（金匱）脇下偏痛發熱其脈緊弦此寒也以温藥下之

大黄（三両） 附子（三枚炮） 細辛（二両）

右水煎服

烏頭桂枝湯（金匱）寒疝腹中痛逆冷手足不仁若身疼痛灸刺諸藥不能治抵當湯主之

烏頭（實中者五枚）

右一味以蜜二斤煎減半去滓以桂枝湯五合解之得一升後初服二合不知即服三合

柴胡桂枝湯（外臺）治寒疝腹中痛

椒附散（聖惠）治寒疝心腹痛如刺不下飲食白汗出氣欲絶

川椒（半両） 附子 檳榔 白朮 青皮（各一両）

干姜（半両）

右生姜水煎

蘹香散（聖惠）治膀胱氣小腹連陰疼痛

蘹香 苦楝子（炒各一兩） 木香（半兩） 檳榔（一兩） 青皮（半兩）

右生姜水煎。○楊氏去苦楝加三稜名香橘散治小腸氣。

倉卒散 蘇沈 治小腸氣。

山梔子（四十九枚燒半過） 附子（一枚炮）

右每服二錢酒一小琖煎至七分入鹽一捻溫服脾腎氣攣急極痛不可屈伸腹中冷重如石痛不可忍自汗如瀉手足冰冷久不瘥欲死者服此藥一劑如失去甚者兩服瘥○丹溪治疝劫藥以烏頭代附子。

聚香飲子 濟生 治七情所傷遂成七疝心腹脹痛引腰胯連背不可俛仰。

檀香 木香 乳香 沉香 丁香

藿香（各一兩） 玄胡 姜黃 川烏 桔梗

桂心 甘草（各半兩）

右姜棗水煎。

玄附湯 濟生 治七疝心腹冷痛腸鳴氣走身寒自汗大府滑泄。

玄胡 附子（各一兩） 木香（半兩）

右姜七片水煎

吳茱萸湯（東垣）治厥疝腹中冷痛積氣上逆致陰冷囊寒

吳茱萸（半分）　川烏頭　細辛（各七分半）　良姜　當歸

乾姜　官桂（各三分半）

右水煎

當歸四逆湯（寶鑑）治臍腹冷痛相引腰胯而疼

當歸（七分）　附子（[illegible]）　官桂　茴香　柴胡（各五分）

芍藥（四分）　玄胡　川練　茯苓（各三分）　澤瀉（二分）

右水煎服先灸中庭穴後用此方

濟生葵子湯（寶鑑）治膀胱實熱腹脹小便不通口舌乾燥

小腹痛

茯苓　猪苓　葵子　枳實　瞿麥

木通　黃芩　車錢子　滑石（各半分）　甘草（二分半）

右生姜水煎

附子建中湯（元戎）治疝

右加蜜煎服

五苓散加茴香川練子（得効）治撮聚疝氣

右葱白二寸燈心十莖水煎○急救仙方五苓加黑丑

呉茱萸。

治諸疝。定痛速効。（丹溪心法）

枳實（十五片）　山梔（炒）　山查（炒）　呉茱萸（炒各等分）

右生姜。水煎。或酒糊丸服。

十味蒼栢散（入門）　治疝作痛。

蒼朮　黄栢　香附　青皮　玄胡

益智　桃人　茴香　附子　甘草

水煎服。○案此原出于丹溪。無方名。醫門秘旨名止痛附子湯。百代醫宗。名君臣全備湯。

烏苓通氣湯（回春）　治一切疝氣。無問遠近寒熱。

烏藥　當歸　芍藥　香附　山查

陳皮（各一錢）　茯苓　白朮　檳榔　玄胡

澤瀉（各五分）　木香　甘草（各三分）

生姜。水煎。有寒加呉茱萸。○入門。有猪苓。無檳榔玄胡。名烏附通氣湯。

立效散（準繩）　治疝因食積作痛。

山查（壹錢五分醋炒）　青皮（一錢二分）　小茴　枳實

蒼朮　香附　呉茱萸　山梔

川練肉（各一分）

右姜三片。水煎。

桃仁當歸湯（準繩）治疝因瘀血作痛。

桃仁（二分）　當歸　玄胡（各分半）　川芎　生芐

芍藥　吳茱萸　青皮（各一分）　牡丹皮（八分）

右姜三片。水煎。

治疝神方（類萃）治疝氣偏墜大小並効。

川練肉　吳茱萸　蒼朮　紫蘇

陳皮（各一分）　甘草　半夏（各六分）

姜三片。葱三莖。水酒煎。

煖肝煎（景岳）治肝腎陰寒。小腹疼痛。疝氣等証。

當歸（二三分）　枸杞（三分）　茯苓（二分）　小茴（二分）　肉桂（一二分）

烏藥（二分）　沉香（一分或木香亦可）

右姜三五片。水煎。○如寒甚。加吳茱萸。干姜。再甚。加附子。

活人錄。通治五疝主方。（瘍醫大全）

半夏（三分）　陳皮（二分）　延胡索（一分五分）　川練子

紫蘇葉　豬苓（各一分）

生姜三片。水煎。空心午後服。

綿實湯（本朝經驗）療疝積。發動筋絡攣急。一身踡束。難以轉側。

草綿實（二匁）甘草（五分）

右以水二合。煮取一合。或腰痛者。加茴香。

八味疝氣劑（福井氏方）

桂枝　桃仁　延胡　木通　大黃（各一匁）

烏藥　丹皮　牽牛子（另末各八分）

右水煎。臨用點牽牛子末。

九味消疝散（櫟窻自製）治疝氣交攻陰腫。

香附（一匁）烏藥　山查　玄胡索（各八分）吳茱萸

茴香　木香　苦楝（各五分）甘草（一分）

右水煎服。

木香丸（聖濟）治寒疝繞臍痛。結鞕不消。

木香　附子　硇砂（各一兩）

右為末。酒煮麪糊和。丸如梧桐子大。每服三十丸。溫酒

食前。

奪命丹（局方）治小腸疝氣。偏墜搐疼。臍下撮痛。及外腎腫

硬。

吳茱萸（壹斤。四兩用酒浸。四兩用醋浸。四兩用湯浸。四兩用童便各浸一宿焙乾） 澤瀉（二兩）

右為末。酒煮麪糊圓梧子大。每伍拾圓。鹽湯或酒呑下。

念珠丸（本事）治膀胱疝氣。外腎腫脹。不可忍。

乳香（乳鉢坐水盆中研） 硇砂（各三錢） 黃蠟（一兩）

右同研勻。鎔蠟和圓。分作一百單八。以線穿之。露一夕。次日用蛤粉為衣。旋取一粒。用乳香湯呑下。

茴香散（本事）治膀胱氣痛。

茴香（炒） 金鈴子肉 莪朮 三稜（各二兩） 甘草（半兩炙）。

右細末。每服二錢。熱酒調下。

治小腸氣不可忍者。（本事）

良姜 烏藥 茴香（各一兩） 青皮（二兩）

右為末。每服二錢。遇發時熱酒調下。

兩功散（治病百法）

黑牽牛（頭末。四兩） 茴香（炒一兩） 或加木香（一兩）

右為末。以生姜自然汁調一二錢。臨睡服。○揚氏（加延）胡索。枳殼。名香殼散。加橘皮。木香。名氣實圓。

治疝氣方。

蕎麥仁（炒去尖）　胡盧巴（酒浸晒乾各四兩）　小茴香（炒一兩）

右為末。酒糊丸梧子大。每空心鹽酒下五十丸。兩月大便出白膿。去根。

蕩疝丹（神効名方）

川練子（炒）　茴香（炒）　破故紙（炒各半兩）　黑丑（二匁）

青皮（三匁）　莪朮　木香（各四匁）

右為細末。用好酒打麪糊丸如桐子大。空心酒下三十丸。

川練散（經驗良方）治小腸膀胱腎大。外腎腫大。下閉塞不通。

川練子（十箇每箇作四片）　舶上茴香（炒與川練木香各等分）

巴豆（五粒連殼打破同川練子微火炒川練子紫色去巴豆不用）　木香

右為細末。每服二錢。用好酒一盞。連根葱一寸。同煎令葱熟。去葱。調藥末。頓服。空心下。三服見效。下泄過立安。

○神効名方。不用木香。名抽刀散。治小腸氣。

大無雄黃散（醫綱）治陰腫大如斗。核痛人所不能治。

雄黃（研一兩）　礬（二兩）　甘草（半兩）

右剉散。以水五升煎洗。○又荊芥二兩。朴硝二兩。葱同煎湯淋洗。

八味丸（醫經會元） 治勞疝。房勞傷精。損氣氣陷。但天寒時舉作多而且甚。天暖舉作少而且輕。

本方。加川楝肉。巴戟肉。

右以鹿角膠爲丸。

治疝氣神方（正傳） 其病甚。至氣上衝。如有物築塞心臟。

硫黃（不拘多少。火中熔化。即投水中出毒研細） 荔枝核（炒焦黃色） 陳皮

右等分爲末。飯丸如桐子大。每服十四五丸。酒下。其痛立止。自己覺爽。甚不能支持。畧用五六丸。再不可多也。

（此方。原出于醫學集成。）醫門秘旨。名玉鑰匙散。

回春丸（摘要） 治疝如神。

茯苓 白朮 山查（炒） 大茴香 吳茱萸（各一兩） 枳實（八分） 荔枝核（炒一兩） 橘皮（炒三兩）

右爲末。煉蜜丸。每丸壹匁五分重。空心每細嚼一丸。薑湯下。

信性丸（示兒仙方） 治小腸疝氣。

金鈴子（四十九箇） 巴豆（四十九箇）

右以金鈴子內巴豆。去殼心。九十八片。和合。二味同炒。以赤色爲度。盡去巴豆。只用金鈴子末爲丸。每服十丸。

服以得利下不妨。○本事金蓮丸。用楚同炒。○濟生金鈴子散。治七疝寒注下焦。小腹引外腎疼痛。大便多閉。為末。熱鹽酒服。

沉香桂附丸（六要）治中氣虛弱。真火不足。藏府積冷。腹臍痛。手足厥冷。便利無度。七疝引痛。喜熱物熨。

沉香　附子　川芎　乾姜　良姜

官桂　吳茱　茴香

右為末。醋糊丸。桐子大。每服五十丸。或七十丸。空心米飲下。

疝痛丸（醫學集要）治敗精惡物不出。結成疝痛。不可忍。

阿魏（二兩。醋和蕎麥麪煨熟。）　檳榔（大者。刳空。乳香滿盛。將刳下衣末。用蕎麥麪拌作餅。漫火煨）

右末。入硇砂一分。赤茯苓一分。麪糊丸。如梧子大。鹽酒下。

奔豚

桂枝加桂湯（傷寒論）治發汗後燒針。令其汗。針處被寒。核起而赤者。必發賁豚。

桂苓甘草大棗湯（傷寒論）治發汗後。臍下悸者。欲作賁豚。

奔豚湯（金匱）奔豚氣上。衝胸腹痛。往來寒、熱。此湯主之。

甘草　芎藭　當歸（各二兩）　半夏（四兩）　黃芩（二兩）

生葛（五兩）　芍藥（二兩）　生姜（四兩）　甘李根白皮（五兩）

右九味。以水二斗。煮取五升。温服一升。日三夜二。○小品無黃芩。芎藭。有人參。桂心。

奔氣湯（千金）治大氣上奔。胸膈中諸病。發時迫滿。短氣不得卧。劇者便悁欲死○肘後。療卒厥逆上氣。淹淹欲死。此謂奔豚病。

生姜（一斤）　半夏　吳茱萸（各一升）　桂心（五兩）　人參

甘草（各三兩）

右水煎。○寶鑑。去人參。甘草。加大棗。名通氣湯。治胸膈氣逆。

廣濟。奔㹠氣。吸吸短氣。不欲聞人語聲。心下煩亂。手足逆冷。（外臺）

李根皮（八兩）　半夏（七兩）　乾姜（四兩）　茯苓（三兩）　人參（二兩）

甘草（二兩）　附子（一兩）　桂心（四兩）

右水煎服。○案金匱奔豚湯。主奔豚。有熱候者。此湯。乃主屬虛寒者。

小品。療傷損。食下則覺胸中偏痛。慄慄然。水漿下亦爾。（外臺）

生李根（一斤）　麥門冬（一升）　人參（二兩）　桂心（二兩）

甘草（一兩）

右水煎。○又無麥門。人參。有牡蠣。名牡蠣奔豚湯。

治奔㹠氣。上下衝走。悶亂面青。（聖惠）

李根皮（三兩）　生姜（炒二兩）　呉茱萸（二兩）

右水煎。

二物湯直指　治奔㹠疝氣攻刺走痛。

辣桂（一兩半）　牽牛（炒二兩）

右每服二錢。姜棗水煎。㊀本綱引普濟。檳榔。牽牛。為丸。名牛郎丸。紫蘇湯下。亦治奔㹠氣築。

養正丹直指　治奔㹠氣痛。嘔吐身冷。

右調氣湯下。（即局方勻氣散。）

代赭石湯（御藥）　治逆氣上衝。奔逼息道。滯塞不通。

代赭石（三兩打碎。）　陳皮（二兩）　桃仁　桂枝

呉茱萸（各半兩）

右生姜。水煎服。

大七氣湯加懷香炒楝子肉（証治要訣）　治腎積奔豚。（方見于諸氣門）

苦楝丸準繩　治奔豚小腹痛。神效。

川苦楝子　茴香（各二兩）　附子（壹兩。炮去皮臍）

右酒糊為丸。温酒下五十丸。（原方用玄胡索。全蝎。丁香。今除之。）

治奔豚疝氣疼痛。梟言

丁香（一錢五分）　呉茱萸　乾姜　甘草（各二錢）　青皮（六分）

花椒（一匁二分）

右水煎服。

醫方心鏡。治奔豚氣方。（集要）

砂仁　茴香　呉茱萸　黄連

右水煎。

定悸飲（橡窓自製）治奔豚。

李根皮（一匁一分）　茯苓（一匁）　桂枝（一匁）　白朮（一匁）　呉萸（五分）

甘草（少許）　牡蠣（一匁）

生姜水煎。

治奔豚氣上下衝走。悶亂面青。（聖惠）

檳榔（三枚末）　生姜汁（半合）

右以童子小便一大盞。微暖過。入前藥二味。攪令勻。分為三服。如人行五六里進一服。須臾下利為效。○（案此外臺。治脚氣冲心方。）

沉香散（經驗祕方）治沉寒痼冷。奔豚小腹疼痛。陰核偏大。久不瘥。服此大效。

蓬朮　烏藥　茴香（叁兩）　肉桂（一兩半）　益智仁（半兩）

沉香（一兩半）　玄胡索（一兩半）　華澄茄（一兩半）

右細末。每服一錢。空心食前。温酒鹽湯任調。○聖惠一方。有檳榔。

備急壓氣散醫林（方）

大檳榔（四箇）　紫蘇穗（二兩半）　生姜（一斤取自然汁）

右為細末。分作二服。水煎。和滓温服。迴再服。其効如神。

李氏治寒疝冲心。及奔豚瘕癖。腹中𢵧痛方。（彙言）

胡盧巴　吳茱萸　川椒　萆薢

蒼朮（各三兩）

右為末。每服三錢。早晨白湯調下。

癲癇狂

三黃湯（得効）治心受積熱。譫言發狂。逾牆上屋。

卽三黃瀉心湯。

瓜蒂散（奇効）治風癲。宜服此藥吐之。

沉香天麻湯（綱目）治癇瘈瘲筋攣。（方見小兒門）

清神湯（統旨）治心熱痰迷胞絡。

茯神　黃連（各二分）　酸棗仁　石菖蒲

柏子仁　遠志（各一分）　甘草（五分）

右水煎。痰壅。加南星。竹瀝。姜汁。

大承氣湯（醫統）治癲狂熱壅。大便秘結。

正心湯（醫統）治七情五志久逆。心風妄言妄笑。不知所苦。

人參　茯神　當歸　生芐　羚羊角

甘草　酸棗仁　遠志（各八分）

蓮子七枚。水煎去查。入羚羊角末。射香一分。和勻服。

清心温膽湯（醫鑑）平肝解鬱。清火化痰。除眩暈諸癇之疾。

麥冬　川芎　人參　遠志（各六分）　當歸

白朮（炒）　白芍（炒）　茯苓　陳皮　半夏

枳實　竹茹　菖蒲　香附　黃連（各一戋）

甘草（四分）

右水煎。○回春名清心抑膽湯

加味逍遙散（壽世）婦人癲疾。謌唱無時。踰垣上屋。乃血迷心包也。

本方。加生地黃。遠志。桃仁。蘇木。紅花。

二陳湯（回春）治一切癇病。

茯苓　南星　陳皮　瓜蔞仁　枳實

桔梗　梔子　半夏　黃芩（各一戋）　甘草（三分）

木香（五分）　辰砂（五分）

右姜煎服臨入竹瀝姜汁。磨木香。調辰砂末同服。

返魂湯（壽世仙丹）治痰積日久。口鼻聞燒酒之香。乃神氣散化。魂魄離亂。急服此湯。

蓮肉（一匁五分）　當歸　麥門　熟苄（各一匁）　杜仲

遠志（各八分）　芍藥（四分）　甘草（二分）

右用水一鍾。入男胎乳汁半鍾。煎一鍾。空心温服。

三陰煎（景岳）治心經有熱。水不制火。驚狂失志。多言多笑。或瘍疹煩熱。失血等証。

生地（二三匁）　麥冬（二三匁）　棗仁（二匁）　甘草（一匁）　玄參（一匁半）

黄連（一二匁）　茯苓（一匁半）　木通（一匁半）

右灯心甘根。或竹葉亦可煎服。○如痰勝熱甚者。加胆星一匁。或花粉一匁半。

清心豁痰湯（玉案）治五種癇症。並癲狂驚恐。痰迷心竅等症。

石菖蒲　麥門冬　茯苓　枳實（各一匁二分）

遠志　花粉　貝母　酸棗仁

玄參　黄連　橘紅（各一匁）　甘草（四分）

竹茹（八分）

姜五片。水煎服。

鈎藤湯（錦囊）治諸癇。

橘紅　鈎藤　膽星　天麻　姜蚕

人參　遠志　犀角　石菖蒲

加燈心。水煎。臨服加牛黃。珍珠。

獨參湯（醫通）治癲狂神不守舍之虛証。

柴胡加龍骨牡蠣湯（傷寒類方）此方。能下肝胆之驚痰。以之治癲癇必效。（按加鉄粉一味。其功尤著。）

雄雌圓（千金）治風癲失性。顛倒欲死。

雄黃　雌黃　真珠（各一兩）　鉛（二兩熬成屑）　丹砂（一分）

水銀（八分）

右為末蜜丸。如胡豆。先食服二丸。日二。稍加。以知為度。

○三因名六珍丹。

鐵粉圓（聖惠）治產後體虛血邪攻心狂語。或見鬼神。

鐵粉（一兩）　天竹黃　真珠　地黃　琥珀（各半兩）

牛黃　朱砂　麝香（各一分）　金薄（二十片）　銀薄（二十片）

右粟米飯和圓。如梧子大。竹葉湯下五圓。

半夏圓（聖惠）治積痰不散。上衝心藏。變為風癇。

半夏（五兩） 白礬（三兩燒令汁盡） 朱砂（二兩） 黃丹（二兩）

右為末。以粟米飯和。圓如梧子大。以人參湯下二十圓。

雄黃圓（聖惠）治風癇發作不定。

雄黃 龍齒（各一兩） 鐵粉 黃丹（各半兩與雄黃同炒轉色）

右同研如粉。以粳米飾和圓如菉豆大。以牛乳下五圓。

牛黃清心丸（局方）治心氣不足。神志不定。驚恐怕怖。悲憂慘感。虛煩少睡。喜怒無時。或發狂癲。神情昏亂

黃芩 蒲黃 羚羊角 麝香 龍腦（各一兩）

犀角（二兩） 牛黃（一兩二分） 雄黃（八分） 金箔（一百張內五十張為衣）

右為末。煉蜜為丸。每兩作一拾丸。用金箔為衣。每服一丸。溫水化下。小兒驚癇。酌量多少。竹瀝湯下。（局方原方二十九味）

（而其二十一味。乃補虛門山芋丸。誤作一方。今据周密癸辛雜志改正。）

辰砂散（蘇沈）治諸癇狂言妄走。精神恍惚。思慮迷亂。仆地吐沫。

辰砂（一兩） 酸棗仁（微炒） 乳香（各半兩）

右量所患人飲酒幾何。先令恣飲沉醉。但勿令至吐。靜室中服藥訖。便安床枕令睡。以前藥都為一服。溫酒一錢調之。頻服令盡。如素飲酒少人。但隨量取醉。病淺人

一兩日。深者。三五日睡不覺。令家人潛伺之。覺即神魂定矣。愼不可驚觸。

驚氣圓（本事）治驚憂積氣。心疾風邪。發則牙關緊急。涎潮昏塞。醒則精神若癡。

附子　木香　姜蚕　花蛇（酒浸去皮骨炙）　橘紅

天麻　麻黃（各五分）　乾蝎（二分半）　紫蘇子（一兩）　南星（五分）

辰砂（二分）

右為末。入研腦麝少許。同研。煉蜜拵圓。如龍眼大。朱砂為衣。每服一粒。金銀薄荷湯化下。溫酒亦得。多恚怒去附子。加鐵粉。

茯苓圓（本事）療心疾良驗。

辰砂　石菖蒲　人參　遠志　茯苓

真鐵粉　南星　半夏麯（各等分）

右為末。生姜汁和水煮糊。圓梧子大。別用朱砂為衣。乾之。每服十粒。加至三十粒。夜卧生姜湯下。

鎮心丹（三因）治心氣不足。驚悸自汗。心煩悶短氣。喜怒悲憂。悉不知。亾魂失魄。狀若神靈所憑。及男子遺泄。女子帶下。

光明辰砂（研） 枯礬（等分）

右爲末。水丸如鷄頭大。每服一丸。煎人參湯下。食後服。

指迷鐵落飲（十便） 若人多怒一發。則莫知所爲。其後欲閉戶而處。惡聞人聲。由心所欲。因暴折而難決。陽氣當動令氣鬱。即而爲怒。謂之陽厥。

生鐵落。火煅。一拾斤。（是鉄爐打鉄落墜下者。碎屑。燒赤）

右作散。日飲一盞。空心服。仍無多肉食。

控涎丹（濟生） 治諸癎久不愈者。頑涎結聚。變生諸症。並宜治之

生川烏 半夏 姜蚕（三味不炒。剉碎。生姜汁浸一夕。各半兩） 全蝎（二个）

鐵粉（二錢） 甘遂（二錢半）

右爲末。姜汁打糊圓如菉豆大。硃砂爲衣。每服十五圓。食後用姜湯下。忌甘草。

朱砂安神圓（拔萃） 治心煩懊憹。心亂怔忡。胸中氣亂。心下痞悶。食入反吐出。

朱砂（四錢） 黃連（五錢） 甘草（二錢半）

右爲蒸餅圓如黃米大。每服十圓。唾津下。

牛黃瀉心湯（御藥） 治心經邪熱。狂語。精神不爽。

腦子 牛黃 朱砂（各二錢半）

大黃（一兩）

右研為末。每服三錢。凉生姜蜜水調下。○袖珍名牛黃洗心湯。治人心。名南極延生湯。

白金丸（永類）治失心顛狂。

真鬱金（七兩） 明礬（三兩）

為末。薄糊丸梧子大。每服五十丸。白湯下。有婦人顛狂數年。初服心胸間。有物脫去。神氣洒然。

仙傳神効方（良明彙集）治大人氣癎風。羊癎風。中風中痰。小兒急驚風。

生石膏（十兩） 硃砂（五錢）

右為細末。每服大人三分。小兒一分。一歲至三歲。四歲。至七歲。一錢五分。八歲以後。俱用二分五分。○按滋德堂方云。此方價不貴。而功極速。累試累驗。

通泄散（心法附餘）治風涎暴作。氣塞倒仆。

苦丁香（為末。三錢。）

右加輕粉一字。水半合。調勻灌之。良久涎自出。如未出。含砂糖一塊。下咽涎出。

驚悸怔忡健忘虛煩不眠

桂枝救逆湯（金匱）驚悸因火邪者。此湯主之。

溫膽湯（千金）治大病後。虛煩不得眠。

半夏　竹茹　枳實（各二兩）　橘皮（三兩）　生姜（四兩）

甘草（一兩）

右水煎。◎三因。有茯苓大棗。治心胆虛怯。

酸棗湯（千金）治虛勞煩擾。奔氣在胸中。不得眠。

酸棗人（五升）　人參　桂心　生姜（各二兩）　石膏（四兩）

茯苓　知母（各三兩）　甘草（一兩半）

右水煎。

茯苓補心湯（千金）治心氣不足。善悲愁恚怒。衄血面黄。煩悶五心熱。或獨語不覺。咽喉痛。舌本强。冷涎出。善忘恐走不定。婦人崩中。面色赤方。

茯苓（四兩） 桂心 甘草（各二兩） 紫石英 人參（各一兩）
大棗（二十枚） 麥冬（三兩） 赤小豆（二十四粒）

右水煎。

黄芩散（聖惠）治虚勞煩熱。不得睡卧。

黄芩（三分） 知母 羚羊角 茯苓
酸棗仁（各一兩） 甘草（半兩）

棗三枚。水煎。

茯神散（聖惠）治膽虚不得睡。神志不足。

茯神 栢子仁 酸棗 黄芪 人參（各一兩）
熟芐 遠志 五味子（各半兩）

右水煎。

淡竹茹湯（三因）治心虚煩悶。頭疼短氣。内熱。及產後驚悸煩悶。

麥冬（二兩） 小麥（各二兩半） 甘草（一兩） 人參 茯苓（各一兩半）

半夏（二兩）　竹茹（一塊）

右生姜七片。大棗三箇。水煎。虛勞湏悶。不寐服之。

加味四七湯（直指）治心氣鬱滯。豁痰散驚。

半夏（二兩半）　茯苓　厚朴（各一兩半）　紫蘇（一兩）　遠志

甘草（各半兩）　石菖（半寸）

右姜七片。棗二枚。水煎。

歸脾湯（濟生）治思慮過制。勞傷心脾。健忘怔忡。

白朮　茯神　黃芪　龍眼肉　酸棗（炒各一兩）

人參　木香（各半兩）　甘草（二戔半）

右姜五片。棗一枚。水煎。○薛氏加當歸。遠志。

茯苓飲子（濟生）治痰飲蓄于心胃。怔忡不已。

茯苓　半夏　橘皮　麥冬（各一兩）　沉香

檳榔　甘草（各一兩）

右生姜。水煎。

益榮湯（濟生）治思慮過制。怔忡恍惚。善悲憂。夜多不寐。小便或濁。

當歸　黃芪　遠志　酸棗　栢子人

麥冬　茯神　芍藥　紫石英（細研各一兩）

木香　人參　甘草（各半兩）

右姜五片。棗一枚。水煎。○惠濟方。無麥冬芍藥。

加味茯苓湯（得効）治痰迷心包。健忘失事。言語如癡。

即二陳湯。加人參。益智。香附子。

右生姜三片。烏梅半箇。水煎。

麥門冬湯（丹溪）治大病後虚煩。則熱不解。不得臥。

半夏　竹茹　陳皮　茯苓　麥門冬

人參

右水煎服。

怔忡湯（百代醫宗）

當歸　川芎　芍藥　地黄（各一分）　茯神（一錢半）

黄連（八分）　硃砂（六分）　甘草（三分）

右水煎服。

孔子大聖智補心虚健忘助神。枕中方。聖惠（元出千金）

龜甲　龍骨　遠志　菖蒲（各一兩）

右為散。每服食前。以温酒下一錢。

治膽虚睡臥不安。心多驚悸。聖惠

人參　茯苓（各一兩）　朱砂（半兩）

右為散。入朱砂。同研令勻。清粥飲調下一匁。

朱砂散（簡要濟衆）治心藏不安。驚悸善忘。上膈風熱。化痰安神。

朱砂　白石英（各研一兩）

右同細研為散。每服半錢。食後臨臥。煎金銀湯調下。○神巧萬全方。有馬牙消一分。

妙香散（局方）治男婦心氣不足。志意不定。驚悸悲憂慘戚。虛煩少睡。喜怒不常。夜多盜汗。頭目昏眩。

茯苓　茯神　薯蕷　遠志　黃芪（各一兩）

人參　桔梗　甘草（各半兩）　辰砂（三匁另研）　麝香（一匁）

木香（二匁）

右二錢。為末。溫酒調下。○又王荊公去薯蕷。黃芪。桔梗麝香。木香。加益智。龍骨。名妙香散。

金液丹醫說人病傷寒。陽證。或患熱疾。服涼藥而得愈。飲食未充。夜間輒睡不著。是膽冷也。若脈細身涼。下此藥一服。大冷者。下百粒。及五六十粒。不甚冷者。三二十粒睡著。

硫黃（搗飛過）

右為末。壹兩。用蒸餅一兩。湯浸握去水。搜為圓如梧子

大溫米飲下。

朱雀丸 百一 治心神不定。恍惚健忘不樂。火不下降。水不上升。時復振跳。

伏神（二兩） 沈香（半兩）

右為末。煉蜜為丸。小豆大。每服三十丸。人參湯下。

遠志圓 濟生 治因事有所大驚。夢寐不祥。登高陟險。驚悸恐怯。

遠志 石菖蒲（各二兩） 茯神 人參 龍齒（各一兩）

右為末。煉蜜為圓。如桐子大。辰砂為衣。每服七十圓。熟水下。○心法。無龍齒。名定心丸。治心氣不定。恍惚多忘。

朱砂丸 丹溪 治勞役心跳。

朱砂 當歸 芍藥 側栢葉（各三分） 川芎

陳皮 甘草 黃連（各一分半）

右用豬心血為丸。粟米大。每服百丸。龍眼湯下。

摧肝丸 醫統 鎮火平肝。消痰定顫。

膽星 鈎藤 黃連（酒炒） 滑石 鉄華粉（各一兩）

青黛（三兩） 姜蚕（五分） 天麻（二兩） 辰砂（五分）

右末。以竹瀝一碗。姜汁少許。打糊。菉豆大。食後及夜茶

下一錢五分。

普濟仙乳丸（本綱） 治上焦熱。晝常好瞑。

伏翼（五兩重一枚連腸胃炙燥） 雲實（炒五兩） 威靈仙（三兩） 牽牛（炒）

莧實（各二兩） 丹砂 鉛丹（各一兩） 膩粉（半兩）

右為末。蜜丸綠豆大。每服七丸。木通湯下。以知為度。

胸痺心痛

栝蔞薤白白酒湯（金匱） 胸痺之病。喘息咳唾。胸背痛短氣。寸口脈沉遲。關上小緊數。此湯主之。

栝蔞實（一枚搗） 薤白（半斤） 白酒（七升）

右同煮取二升。分温再服。

栝蔞薤白半夏湯（金匱） 胸痺不得臥。心痛徹背者。此湯主之。

栝蔞實（一枚） 薤白（三兩） 半夏（半升） 白酒（一斗）

右同煮取四升。温服一升。日三服。

枳實薤白桂枝湯（金匱）胸痺心中痞。留氣結在胸。胸滿脇下逆搶心。此湯主之。人參湯亦主之。

枳實（四枚） 厚朴（四兩） 薤白（半斤） 桂枝（一兩） 栝蔞（一枚）

右以水五升。先煮枳實厚朴。取二升。內諸藥。煮數沸。分三服。

人參湯（金匱）

即理中湯。

茯苓杏仁甘草湯（金匱）胸痺。胸中氣塞短氣。此方。橘枳姜湯亦可。

茯苓（三兩） 杏仁（五十箇） 甘草（一兩）

右以水一斗。煮取五升。温服一升。日再。

橘枳姜湯（金匱）

橘皮（一斤） 枳實（三兩） 生姜（半斤）

右以水五升。煮取二升。分温再服。

桂枝枳實湯（金匱）心中痞。諸逆心懸痛主之。

桂枝 生姜（各三兩） 枳實（五枚）

右以水六升。煮取三升。分温服。

桂枝三物湯（千金）治心下痞。諸逆懸痛。

桂心　生姜（各三兩）　膠飴（半斤）

右水煎。

高良姜湯（千金）治心腹絞痛如刺。兩脇支滿。煩悶不可忍。

高良姜（五兩）　厚朴（二兩）　當歸　桂心（各三兩）

右水煎。

通氣湯（千金）治胸滿短氣噎塞。

半夏（八兩）　生姜（六兩）　橘皮（三兩）　吳茱萸（四十枚）

右水煎。

廣濟柴胡湯（外臺）療胸膈滿塞。心背撮痛。走注氣悶。

柴胡　當歸　木香　犀角（各六分）　檳榔（十分）

甘草（二分）

右水煎。入麝香末服。

治胸痺短氣方。（聖濟）

括樓　橘皮　半夏（各一兩）　枳實（二兩）　生姜（半分）

薤白（五莖）

右水煎。

加味四七湯（濟生）治七氣為病。發則心腹刺痛不可忍。時發時止。發則欲死。及外感作痛。亦宜服之。

半夏（三兩） 桂心 玄胡索（各一兩） 人參 甘草（各半兩）

乳香（三分）

右姜七片。棗一枚。水煎服。婦人血痛。加當歸。○呂尚清方。有枳殼。芍藥。香附子。

平胃散加吳茱萸（張世南游官紀聞） 治心腹痛。

扶陽助胃湯（寶鑑） 治胃脘當心而痛。腹痛腸鳴。手足稍冷。面色青黃而不澤。飲食減少。微飽則心下痞悶。嘔吐酸水。發作疼痛。脉絃細而微。

乾姜（一兩半） 揀參 草豆蔻仁 甘草 官桂 芍藥（各三分） 陳皮 白朮 吳茱萸（各五分） 附子（三） 益智仁（五分）

右生姜三片。大棗二箇。水煎。兼灸中脘三七壯。氣海百餘壯。

沉香降氣湯。加乳香。（得效） 治七氣鬱結心痛。○心悟沉香降氣湯。有玄胡索。苦楝子。治氣滯心痛。

桃仁承氣湯（丹溪） 治心痛脈澁。有死血。

清中湯（統旨） 治火痛。

黃連 山梔（各二錢） 陳皮 半夏 茯苓（各一錢半）

草豆蔻　甘草（各七分）

右姜三片。水煎。○心悟去茯苓半夏草菓。加香附金鈴子。玄胡索。治熱厥心痛。

正氣天香湯（醫綱）治心氣。但怒氣則發者。

黄連六一湯（正傳）治多食煎炒。或燒餅米胖等物。致熱鬱胃口而痛者。甚効。

黄連（六錢）　甘草（一錢）

右水煎。又附子。代甘草。加姜棗。名連附六一湯。治胃脘痛甚。不効者。

小建中湯加香附（赤水醫案）治胃脘當心而痛。六脉弦數。

大承氣湯（入門）治積熱攻心甚者。

盞落湯（摘要）治急心疼。

陳皮　香附　良姜　呉茱萸

石菖蒲（各等分）

右作一劑。水一碗。煎七分。先用碗一箇。香油三五點。在内。小盞蓋之。將藥淋下。熱服。

和中蠲痛湯（六要）治一切胃脘暴痛。

草豆蔻　山查　香附　川芎　半夏

蒼朮　厚朴　縮砂　枳實　炮姜

右生姜煎服。

清中蠲痛湯（六要）治痛久脈數有火。

炒黑梔子　炒黑姜　川芎　黃連

橘紅　香附　蒼朮　神麴

右白水煎服。

歸脾湯（心讀）胸中痛甚。夜不成寐。此虛而濁陰不降（中氣）失守也。（古方出健忘門）

一人久患心胃痛。經年不愈。吳醫沉心田用澤蘭。人參附子各一錢五分。黃連五分。烏梅一個。一服即止。（橐言）

姜附湯（心悟）治寒厥心痛。又真心痛。手足青至節。宜用本方。大劑飲之。或救十中之一二。若痛時喜手緊按。加人參。

薏苡附子散（金匱）胸痺緩急者主之。

薏苡（十五兩）　大附子（炮十枚）

右杵為散。服方寸匕。日三。

赤石脂丸（金匱）心痛徹背。背痛徹心主之。

蜀椒（一兩）　烏頭（炮一分）　附子（炮半兩）　干姜　赤石脂（各一兩）

右五味末之。蜜丸梧子大。先食服一丸日三服。

必効療蛔心痛方。（外臺）

熊膽。如大豆。和水服大効。

張文仲蜀椒丸（外臺）療胸中氣滿。心痛引背。

蜀椒（一升出汗）。半夏（一升洗）。附子（一兩炮）。

右蜜和丸如梧子大。一服五丸日三。

鶴虱丸聖濟治久心痛。經年不止。

鶴虱（炒）　木香　檳榔　橘皮　蕪荑（炒）

附子（炮）　乾姜（炮各一兩）

右為末。蜜丸如豆大。每三十丸食前橘皮湯下。

鷄舌香散（三因）治心腹卒痛。安胃進食。調冷熱定泄瀉。

丁香（百枚）　甘草（半兩）　高良姜（一兩）　芍藥（二兩）

右為末。每服一錢。米飲調下。（方出王啓玄子）○局方鷄舌香散。

無丁香。有香附。烏藥。肉桂。凡六味。

氣針圓（大全良方）治久積風壅。疎利滯氣。空胸膈止刺痛。

木香　青皮　大黄　檳榔（各一兩）　黑丑（二兩半生半炒）。

右為末。蜜圓梧子大。溫水下。

愈痛散（濟生）治急心痛胃痛。

五靈脂　玄胡（炒）　蓬朮　良姜（炒）　當歸

右等分為末。每一錢。熱醋湯調服。○魏氏去玄胡。加木香。名靈脂圓。直指靈脂酒。五靈脂一味。溫酒下。云加延胡。沒藥。尤妙。治卒血氣心痛。

香附散得効治心脾疼。不可忍者。

高良姜（炒）　香附（炒各一兩）

右為末。每服二錢。入鹽米飲調下。○一名獨步散。一名神授一七散。醫貫說引類編。名一服散。

蕪荑散得効治蛕咬心痛。不可忍。或吐青汁。出涎沫。發有休止。

乾漆（炒令烟盡。一兩）　雷丸　蕪荑（各半兩）

右為末。每服三錢。溫水調和服。

一方醫綱治心痛。

辰砂　白礬

右糊丸。好醋吞下。神效。○又方。二味為末。每半錢。人參湯調下。○又方。辰砂一味。研。好醋調服。

莎芎散入門治曾服熱藥物。致胃脘痛。久成癰疹。

香附　川芎（各五分）　黃連　梔子（各二分半）　木香

乾姜（各分半）　檳榔　酒苓　芒硝（各一分）

右為末。每二錢。熱姜湯調。痛時服。

梔萸丸（入門）治氣實心痛。按之尤痛。

山梔（炒一兩半）　吳茱萸　香附子（各二分半）

右為末。蒸餅和丸。如川椒大。以生姜湯下二三十丸。

神仙珍珠散（簡奇）治心脾氣疼。

生朱砂（一分）　麝香（半分）　白礬（半兩）　真珠（七粒未穿者尤好）

右為細末。每服一分。百沸湯白壹口許。調勻服之。大有神効。不可亂傳。

厥心氣痛。不可忍。（奇効）

鬱金　附子　乾姜（等分。）

為末。醋糊丸梧子大。硃砂為衣。每服三十丸。男酒女醋下。

治心氣疼痛。用水葒花。為末。白湯調服二錢。又法。男病用酒水各半煎服。女用醋水各半煎服。（彙言）

觀聚方要補卷五