觀聚方　六

松
科別
k62-1
F 5
カ-96

490.9
Ka-20
5
No.2567
IR K62-1
慶應義塾大学医学情報センター
昭和47年7月4日
富士川文庫
1515

觀聚方要補卷六目録

麻痺

黄耆桂枝五物湯　五痺湯
附子湯　増損建中湯
小防風湯　蠲痺湯
防風湯　茯苓湯
茯苓川芎湯　升麻湯
人參益氣湯　黄耆建中湯
理中湯　涼膈散加南星香附台芎

理中湯加附子當歸　治腹皮麻痺方
薏苡仁湯　雙合湯
開結舒經湯　止麻消痰湯
四物湯加黃連　改定三痺湯

汗證

麥煎散　牡蠣散
桂枝湯　黃耆建中湯
耆附湯　救汗湯
黃耆湯　延年斷汗湯
安胃湯　當歸六黃湯
大建中湯　正氣湯
柴胡桂枝湯　柴胡桂薑湯
涼膈散　清脾散
養榮湯　八物湯加白附川烏
白龍湯　茯苓補心湯
防風湯　治脾虛盜汗方
龍膽湯　白术散
牡蠣散　當歸龍薈丸

珍珠散
治脚汗方

消渴

白虎加人參湯
治消渴方
治熱病後虛渴方
枸杞湯
黃連散
治熱極渴不止方
五味子湯
天花散
錢氏白朮散
麥門冬飲子
大黃甘草飲
調胃承氣湯
蘭香飲子
甘露湯

三和甘露飲
腎氣丸
五苓散
文蛤散
治消渴方
治消中方
胡桃圓
生地黃膏
玉壺丸
加減腎氣圓
鹿茸圓
硃砂黃連丸
玄參散

淋癃溺多遺尿轉胞

猪苓湯
治遺尿小便澁方

治小便血方
治胞轉方
治熱淋方
蘆根飲子
治轉胞方
葵子散
鬱金散
犀角散
治小便難
當歸湯
阿膠湯
八正散
五淋散
生附散
木香湯
清心蓮子飲
分清飲
木通散
犀角地黃湯
導氣除濕湯
參苓琥珀湯
通神散
黃耆束氣湯
桃仁承氣湯
三白散
萬全木通散
治淋濁方
龍膽瀉肝湯
薰法
桃仁湯
腎氣丸
栝蔞瞿麥丸
治小便不利方
治小便大利
治卒淋方
治胞轉方

治尿血方　鹿茸散
又方　琥珀散
治砂石淋方　續隨子丸
玄菟丹　治婦人諸般淋
砂石淋方　硼砂散
桑螵蛸散　妙香散
遠志圓　椒附圓
透格散　地黄圓
縮泉圓　雙白圓

滋腎丸　玉屑膏
秘元丹　治血淋方
車前子散　朴硝散
神效方　六味湯
琥珀散　木香燈草丸
葛粉丸　琥珀散
六味地黄丸　澤瀉散
八味丸　通淋方

關格

芒硝湯　大承氣湯
雲岐子人參散　雲岐子旣濟丸
理中湯加童便猪膽　枳縮二陳湯
皂角散

遺精

桂枝加龍蠣湯　治夢遺方
人參湯　加味小柴胡湯
清心湯　十味溫膽湯
香柴湯　妙香散

清心丸　猪苓丸
三白圓　大鳳髓丹
桑螵蛸圓　沈香和中丸
端本丸　徐氏琥苓丸

秘結

三黃湯　治大便不通方
寬快湯　玉燭湯
通幽湯　蘇子降氣湯
補中益氣湯加蘇桔杏仁

麻子仁丸　麻子蘇子粥
神効丸　半硫丸
蘇感圓　南木香丸
大黄牽牛散　芎黄丸
皂角圓　顛倒散
治大小便不通方　百順丸
硝角一滑法

痙病破傷風

栝蔞桂枝湯　葛根湯
大承氣湯　紫湯
倉公當歸湯　附子散
歸荊湯　理氣平肝散
十全大補湯　人參建中湯
當歸補血湯　桂枝附子湯
芍藥甘草附子湯　治破傷風方
治破傷風瘡口作白痂方
治破傷風牙關緊禁方　防風散
玉真散　治破傷風方

破傷風秘方

瘻瘡

大防風湯　藿香養胃湯
加味四物湯　龍膽瀉肝湯
大承氣湯　十全大補湯加秦艽熟附
子　五瘻湯
麋角丸　虎脛骨丸
治筋軟方

肺癰　腸癰　胃脘癰

葶藶大棗瀉肺湯　桔梗湯
大黃牡丹湯　薏苡附子敗醬散
葦莖湯　黃耆湯
腸癰湯　桔梗白散
犀角湯　四聖散
究原排膿內補散　排膿湯
射干湯　保安散
梅仁湯　八寶散
四順散　玄參清肺飲

排膿散　活血散瘀湯
七賢散　加味桔梗湯
治腹内癰腫方　肺癰丹方
又方　復元通氣散
排膿散　梅氏如聖丸
神仙蠟礬丸　會膿散

五痔脱肛

崔氏療大便急去血方　當歸湯
加味四君子湯　地榆散

乾葛湯　橘皮湯
二妙散　黄連湯
縮砂湯　參朮實脾湯
四物湯　訶子人參湯
内托黄耆湯　提肛散
凉血清腸散　參朮芎歸湯
祛風辟痔湯　槐花散
治腸風痔漏方　鶴虱圓
黑聖散　血竭散

蓮花蕊散　黄連散
龍骨散　胡連追毒丸
黄連閉管丸

觀聚方要補卷六

東都　丹波元簡廉夫　輯

麻痺

黄茋桂枝五物湯（金匱）治血痺陰陽俱微。身體不仁。如風痺狀。

黄茋（三兩）　桂枝　芍藥（各三兩）　生姜（六兩）　大棗（十二枚）

右五味。以水六升。煮取二升。温服七合。日三服。

五痺湯（局方）治風寒濕之氣。客留肌體。手足緩弱。麻頑不仁。

羌活　白朮　防已（各一兩）　姜黃（一兩）　甘草（半兩）

右生姜七片。水煎。

附子湯（三因）治風濕寒痺。骨節疼痛。皮膚不仁。肌肉重著。

即附子八物湯無乾姜。（出中濕門）

增損建中湯（葉氏）治口燥咽乾。舌上麻木。不知甜苦。不喜飲食。

即黃芪建中加五味子。五加皮。乾葛。烏梅。不用膠飴。

小防風湯（葉氏）治手足麻木不仁。

防風　秦艽　羌活　附子（各一兩）

右姜錢三片。入生地黃汁兩合。煎服。

蠲痺湯（濟生）治身體煩疼。項背拘急。或痛或重。舉動艱難。及手足冷痺。腰腿沉重。筋脉無力。

當歸　芍藥　黃芪　姜黃　羌活（各半兩）

甘草（半兩）

右姜棗水煎。

防風湯（濟生）治血痺。皮膚不仁。

防風　獨活　當歸　茯苓　秦艽

芍藥　黃芩（各一兩）　桂枝　杏仁　甘草（各半兩）

右生姜五片。水煎。

茯苓湯（濟生）　治支飲手足麻痺。多睡眩冒。

半夏　茯苓　橘皮（各一兩）　枳實　桔梗

甘草（各半兩）

右生姜七片。水煎。

茯苓川芎湯（宣明）　治著痺留注不去。四肢麻木拘攣浮腫。

茯苓　桑白　防風　官桂　川芎

麻黄　芍藥　當歸　甘草（各五分）

右棗三枚。水煎服。

升麻湯（宣明）　治熱痺。肌肉熱極。體上如鼠走。唇口反縱。色變。

升麻（三兩）　茯神　人參　防風　羚羊角

犀角　羗活（各一兩）　官桂（半兩）

右生姜一塊。竹瀝少許。水煎。

人參益氣湯（東垣）　治夏月麻木。倦怠嗜臥。

黄芪（八錢）　人參　甘草（各五錢）　五味子（百二十粒）　升麻（二錢）

柴胡（二錢半）　芍藥（三錢）

右水煎服。原方有炙（甘草二錢）

黃芪建中湯加白朮（寶鑑）治風証半身麻木。滋養脾胃。生發榮衛之氣。（方見虛勞門）

理中湯（得効）治寒濕痺。

即本方。加附子。天麻。

涼膈散加南星香附台芎（丹溪）治因氣鬱舌麻眩暈。手足亦痺。氣塞有痰便結。

理中湯加熟附半錢當歸一錢半（要訣）有舌無故常自痺者。不可作風治。由心血不足。宜此藥。

腹皮麻痺不仁。多煮葱白喫之自愈。（醫綱）

薏苡仁湯（醫統）治手足流注疼痛。麻木不仁。難以屈伸。

薏苡仁　當歸　芍藥　桂心　麻黃（各一分）

甘草（五分）　蒼朮（二分）

右生姜五片。水煎。有汗去麻黃。有熱去桂。

雙合湯（回春）治麻木屬濕痰死血。

四物湯。合二陳湯。加桃仁。紅花。白芥子。入竹瀝。姜汁。

開結舒經湯（回春）治婦人手足麻痺。因七情鬱滯經絡也。

紫蘇　陳皮　香附　烏藥　川芎

蒼朮　羌活　南星　半夏　當歸（各八分）

桂枝　甘草（各四分）

右生姜。水煎。

止麻消痰湯（壽世）治口舌麻木。延及嘴角。頭面亦麻。

黃連　半夏　瓜蔞仁　黃芩　茯苓

桔梗　枳殼　陳皮　天麻　細辛

南星　甘草

右生姜三片。水煎。○百代醫宗無黃芩天麻。細辛。南星。有貝母。香附。名順氣豁痰湯。亦治舌痺。

四物湯加黃連（百代醫宗）治血虛舌麻。

改定三痺湯（醫通）治風寒濕氣合病。氣血凝滯。手足拘攣。

人參　黃芪　白朮　當歸　川芎

芍藥　茯苓（各一分）　甘草　桂心　防已

防風　烏頭（炮各五分）　細辛（三分）

右姜三片。棗二枚。水煎。

汗症

麥煎散（蘇沈）治肌熱盗汗。（方出虚勞門）

案麥煎散有三方。三因用烏頭乾漆。袖珍用葶歷麻黃根。不若蘇沈為至當。然宜臨証撰擇。

牡蠣散（三因）治諸虚不足。及新病暴虚。津液不固。體常自汗。夜卧即甚。久而不止。羸瘠枯瘦。心忪驚惕。

牡蠣　麻黃根　黃芪（各一兩）

右小麥百粒。水煎服。○得効有知母一兩。

桂枝湯（三因）治傷風自汗。

黃芪建中湯直指　治表虛自汗。（方見虛勞門）

耆附湯濟生　治氣弱陽虛虛汗不止肢體倦怠。

黃芪　附子（各等分）

右每服四錢。水二鍾。煎至一鍾。臨臥通口。○醫述加人參。甘草。名參芪附子湯。立止虛汗。

救汗湯葉氏　治陽虛自汗。

卽桂枝加附子湯。

黃芪散葉氏　治虛勞盜汗。噓吸少氣。

黃芪　茯苓　熟芐　天門冬（各一兩）　白朮

牡蠣（各一兩半）　五味子　甘草（各半兩）

右棗三枚。水煎。

延年斷汗湯魏氏

黃芪　○人參　茯苓　芍藥　肉桂

甘草　牡蠣

右等分。姜棗。水煎。

安胃湯東垣　治因飲食汗出日久。心中虛。令人不遂。先用此方。

黃連　五味子　烏梅　甘草（各五分）

熟甘草（三分）升麻（二分）

右水煎服。忌濕麪五辛大料物之類。

當歸六黃湯（東垣）治盜汗之聖藥也。

當歸　生地　熟地　黃栢　黃芩

黃芪　黃連（各等分）

右水煎服。○蒼生司命加棗仁。牡蠣。麥冬。五味。名加味當歸六黃湯。治陰虛盜汗。

大建中湯（得効）治虛熱盜汗。

黃芪　遠志　當歸　澤瀉（各三兩）芍藥

龍骨　人參（各三兩）甘草（一兩）

右生姜水煎。氣弱加附子二兩。腰痛筋急加官桂一兩。

正氣湯（醫綱）治盜汗。

黃栢（一錢）知母（一錢半）甘草（炙五分）

右水煎服。

柴胡桂枝湯（醫統）治發熱自汗。或寒熱自汗。

柴胡桂姜湯（醫統）治頭汗出。脇滿往来寒熱。心煩而嘔。

凉膈散（醫統）治胃中濕熱。上蒸自汗。（方見口舌門）

清脾散（醫統）治手足心出汗。

白朮　蒼朮　茯苓　半夏　黄連（各一分）

滑石　柴胡　升麻　甘草　羌活（各一分）

右燈心水煎服。

養營湯（示兒仙方）治汗過多不語。滋補營衛。收斂心氣。

人參　茯苓　甘草　當歸　芍藥

酸棗　附子　栢子仁　紫石英　川芎

黄芪　官桂　木香　遠志

右等分。每服三錢。姜。棗。煎成。取雄鷄冠滴血。旋入竹瀝。及童便。同妙香散服。

八物湯加白附川烏（摘要）男子手足汗。醫用苓栢連。并補劑。皆不効。又足汗常多。後用此方。其汗即無。

白龍湯（回春）治男子失精。女子夢交。自汗盜汗等症。

即桂枝加龍骨牡蛎湯。

茯苓補心湯（回春）治心汗者。心孔有汗。別處無也。因憂思鬱結。

茯苓　人參　白朮　當歸　生芐

酸棗　芍藥　麥冬　陳皮　黄連（各等分）

辰砂（研末。臨服調入五分。）　甘草（二分）

右棗二枚。烏梅一箇。浮麥一撮。水煎服。

防風湯（本事）治風虛多汗惡風。

防風（五分） 澤瀉 牡蠣 桂枝（各等分）

右細末。每服二錢。食後酒調下。

一方（百一）治脾虛盜汗。

人參 當歸（各等分）

右每服秤五錢。先用猪心一枚。破作數片。並心血煎湯澄清汁煎藥服。

龍胆散（直指）治盜汗有熱。

龍胆 防風（等分）

右為末。每服一錢。溫米飲調下。臨卧服。

白朮散（河間）治飲酒中風。汗多。不可單衣。食則汗出如洗。久不治。必為消渴症。

牡蠣（三分） 白朮（一兩二分） 防風（二兩半）

右為末。每服一盞。溫水調下。

牡蠣散（御藥）治虛汗不止。玄府不閉。

牡蠣（一兩。鉗鍋內盛鹽。泥固濟煅一晝夜） 定粉（五分）

右一處同研令勻。及細用綿裹之。擦於患處。

當歸龍薈丸（丹溪）治肝火盜汗。（方見脇痛門）

珍珠散（醫統）治陰汗。

蛤粉　牡蠣粉（等分）

右為細末。絹袋盛撲。

治脚汗方（回春）

白礬　乾葛（各五錢）

右為末。水煎。逐日洗。連五日自然無汗。

消渇

白虎加人參湯（金匱）治渇欲飲水。口乾舌燥。○東垣。治膈消。上焦燥渇。不欲飲食。

治消渇方（千金）

黄芪　茯神　栝蔞根　甘草　麥門（各三兩）

乾芐（五兩）

右水煎服。○外臺名黄芪湯。

治熱病後虛熱渇。四肢煩疼。（千金）

葛根（一斤）　人參　甘草（各一兩）　竹葉（一把）

右水煎服。

枸杞湯（千金）治渴而利。

枸杞枝葉（一斤） 黄連 栝蔞根 甘草

石羔（各三兩）

右水煎服。

黄連散（聖惠）治消渴。口舌乾燥。煩熱不能飲食。

黄連 葛根 枇杷葉（各三兩） 麥門（一兩）

右生姜半分。竹葉二七片。水煎。

治熱極渴不止。（聖惠）

麥門 蘆根（各一兩） 石膏（二兩）

右水煎服。

五味子湯（外科精要）大治口燥舌乾。此是腎水竭也。

五味子 黄芪 人參 麥門冬（各一匁五分）

甘草（五分）

右水煎服。○案此方生脈散之權輿。保元。名參芪救元湯。入朱砂少許服。治腎水枯燥。不能運上作消渴。恐生癰疽。

天花散（直指）治消渴。

天花粉　生乾地黄（各一兩）　乾葛　麥門冬

五味子（各半兩）　甘草（一分）

右粳米百粒。水煎服。○百代醫宗用糯米一撮名玉泉散。亦治消渴之聖藥也。

錢氏白朮散　直指　治消中消穀善飢。

本方。加五味子。柴胡。枳殼。

麥門冬飲子　宣明　治心移熱於肺。名曰膈消。心膈有熱則為消渴。

麥門（二兩）　栝蔞仁　知母　甘草

生芐　人參　葛根　茯苓（各一兩）　竹葉（數片）

右水煎服。○醫綱。羅氏加五味子。

大黄甘草飲子　宣明　治男子婦人。一切消渴不能止者。

大豆（先煮三沸。出淘苦水。再煮）　大黄（一兩半）　甘草（大麁者。四兩。長四指。打碎）

右三味。用井水一桶。將前藥同煮三五時。如稠粥。水少更添。豆軟盛於盆中。放冷令病人食豆。渴食湯汁無時。候食盡。如渴止罷。不止再煮前藥。不三次病悉愈。

調胃承氣湯　三黄丸　東垣　並治中消者。

蘭香飲子　東垣　治渴飲水。極善食而瘦。自汗二便秘結。

石羔（三匁）　知母　甘草　人參　蘭香葉

白荳蔲　升麻（各五分半）　半夏（二分）

右水煎服。（原方有防風。桔梗。連翹今去不用。）

甘露湯（附餘）治煩渴口乾。

百藥煎　白乾葛（各三匁）　烏梅　五味子

花粉（各二匁）　甘草（半匁）

右㕮咀水煎。

三和甘露飲（醫統）治消渴。小便短澁者。

滑石　石羔　人參　知母　白朮

茯苓　猪苓　澤瀉　甘草（各等分）

右每服五錢。煎服。

腎氣丸（金匱）治男子消渴。小便反多。以飲一斗。小便一斗。

（方出虛勞門）

五苓散（金匱）治脈浮。小便不利。微熱消渴。

文蛤散（金匱）治渴欲飲水不止者。

治消渴方。（千金）

栝蔞根　麥門冬　鉛丹（各八分）　茯神

甘草（各六分）

右為末。以漿水服方寸匕。日三。○外臺名栝蔞散。

治消中。日夜尿七八升者。（千金）

鹿角。炙令焦。末。以酒服五分匕。日三。

胡桃圓（三因）治消腎。唇口乾焦。精溢自出。大便燥實。小便大利。而不甚渴。多因快情縱慾。

茯苓　胡桃肉（湯去薄皮。別研）　附子（大者一枚。去皮臍。切作片。生姜汁一盞。蛤粉一分。同煮乾。焙）

右等分為末。蜜丸如梧子大。米飲下三五十丸。或為散。以米飲調。下食前服。

生地黃膏（直指）治渴症通用。

生地黃（束如常椀大一把）　冬蜜（一椀）　人參（半兩）　茯苓（一兩）

右將地黃。洗切研細。以新水一椀調開。同蜜煎。至半次。入參苓末拌和。磁器密收。匙挑服。○醫統名瓊玉膏。云治三消最妙。

玉壺丸（直指）治消渴。引飲無度。

人參　栝蔞根（等分）

右末。煉蜜丸桐子大。每三十丸。麥門冬煎湯下。

加減腎氣圓（濟生）治勞傷腎水不足。心火自用。口舌焦乾。多渴而利。精神恍惚。面赤心煩。腰痛脚弱。

本方去附子。加五味子。鹿角。鎊沈香。

鹿茸圓（朱氏集驗）治渴疾。

鹿茸（二兩）　兎絲子（一兩浸。酒蒸）　天花粉（半兩）

右煉蜜為圓。每服五十圓。空心北五味子湯服。

硃砂黃連丸（大成）治心虛蘊熱。或因飲酒過多。發為消渴。

硃砂（二兩）　宣連（三兩）　生苄（二兩）

右為末。煉蜜丸如梧桐子大。每服五十丸。灯心棗子湯送下。

玄參散（奇効）治渴利煩熱。生癰疽發背。焮腫疼痛。

玄參　芒硝　大黃　犀角　羚羊角

沉香　木香　黃芪（各一兩）　甘草（三分）

右為細末。每服二錢。温水調下。○醫統無芒。羚。木香。有藍葉。升麻。麥冬。葛根。芍藥。名藍葉飲。治同。

淋癃溺多遺尿轉胞

猪苓湯（金匱）治脈浮發熱渴欲飲水小便不利。○葉氏治血淋方。加車前子。

治遺尿小便澁方。千金

牡蛎　鹿茸（各四兩）　阿膠（二兩）

右水煎（舊有桑耳。今從錄驗去之）○外臺有桑螵蛸二兩。三因名阿膠散。

治小便血方　千金

生地黃（八兩）　栢葉（一把）　黃芩（二兩）　阿膠（炙二兩）。

右水煎服。一方有甘草二兩。○聖惠有竹葉車前。名栢葉湯。

治胞轉小便不得方。千金

蔥白（四七莖） 阿膠（一兩）○ 琥珀（三兩） 車前子（一升）

右水煎服。

廣濟療熱淋方。外臺

車前子 冬葵子（各一升） 通草（三兩） 芒硝（六分湯成下）

右水煎。原用車前草。葵根。今代子。

茅根飲子。外臺 療胞絡中虛熱。時小便如血色。

茅根（一升） 茯苓（三兩） 人參 乾地黄（各二兩）

右水煎。

范汪療轉胞小便不利。外臺

雀矢（半合） 車前子 滑石（各四兩） 通草 芍藥（各三兩）

右水煎服。

療胞轉不得小便方。外臺

吸茶真琥珀（一兩） 蔥白（十四莖）

右以水四升。煮取三升。去蔥白。末琥珀。細篩下湯中。温服一升。日三服。佳。

葵子散聖惠治冷淋小便數。恆不利。

葵子　茯苓　白朮　當歸　澤瀉（各一兩）

木香（半兩）

右水煎服。

鬱金散聖惠治血淋及尿血。水道澁痛。

鬱金　滑石　芒硝　乾地黃　車前子

蘧麥（各一兩）

右水煎服。

犀角散聖惠治膀胱積熱。小便澁難。

犀角屑　燈心（一兩）　榆白皮　茯苓　黃芩

車前子　芒硝　木通（各一兩）　滑石（二兩）

右水煎服。

治小便難。腹滿悶。不急療之殺人。聖惠

葱白（三斤）　鹽（一斤）

右相和。研爛。炒令熱。以帛子裹。分作二苞。更互熨臍下。

小便立出。

當歸湯聖濟治氣牽腰背。及脇內痛。小腹堅。小便不禁。

當歸　大黃　桂（各三兩）　人參　乾姜（各一兩）

甘草　芍藥（各二兩）　呉茱萸（二兩半）

右水煎服。

阿膠湯（聖濟）治腎虚小便多。

阿膠　人參（各一兩）　干姜（二兩）　遠志（四兩）　附子（一枚）

甘草（三兩）　麻仁（一升）

右水煎服。

八正散（局方）治心經邪熱。一切藴毒。小便赤澁。或癃閉不通。

車前　瞿麥　滑石　大黄　梔子

萹蓄　木通　甘草（炙各一斤）

右入燈心水煎。

五淋散（局方）治膀胱有熱。水道不通。淋瀝不宣。出少起多。

茯苓（六兩）　當歸　甘草（各五兩）　芍藥　梔子（各二兩）

右水煎服。○又方。本方。無當歸。有木通。滑石。竹葉。茵蔯。治証同前。

生附散（三因）治冷淋小便祕澁。數起不通。竅中疼痛。增寒凜凜。

附子　滑石（各半兩）　瞿麥　木通（各三兩）　半夏（三分）

右姜七片。燈心二十莖。蜜半匕。水煎服。

木香湯（直指）治冷氣凝滯。小便淋澁作痛。身體冷清。

木香　木通　檳榔　舶茴　當歸

芍藥　青皮　澤瀉　辣桂　橘紅

甘草

右生姜。水煎。

清心蓮子飲（直指）治心中客熱煩躁。赤濁肥脂。

蓮肉　茯苓（各一兩）　益智　遠志　麥冬

人參（各半兩）　石菖　車前　白朮　澤瀉

甘草（各三分）

右灯心一握。水煎。○局方有黄芩。地骨。甘草。無益智。遠志。石菖。白朮。澤瀉。

分清飲（直指）治思慮過度。清濁相干。小便白濁。

益智（一兩）　萆薢　石菖　烏藥　茯苓（各一兩）

甘草（四兩）

右鹽少許。水煎。○楊氏無茯苓。甘草。名萆薢分清飲。

木通散（濟生）治小便不通。小腹痛不可忍。

木通　滑石（各一兩）　黑牽子（頭末半兩）。

右灯心十莖。葱白一莖。水煎服。

犀角地黃湯（朱氏集驗）治小腸淋瀝出血。疼痛難忍（余癸　廿夏）

嘗苦淋瀝之疾。出血不已。得黃應明。授此方。數服而愈。

（方出傷寒門）

導氣除濕湯（東垣）治小便不通。乃血澀致氣不通。而竅澀。

知母（三分酒洗）。黃柏（四匁）　滑石（二匁炒黃）。澤瀉（三分）　茯苓（二匁）

右水煎服。

參苓琥珀湯（寶鑑）治小便淋澀。莖中痛不可忍。相引脇下痛。

川楝子　甘草（各一匁）　人參（五分）　玄胡索（七分）

茯苓（四分）　琥珀　澤瀉　歸梢

柴胡（各三分）

右水煎服。

通神散（烟霞）治小便擁閉。臍下結硬。小便所壯如撒火。或

變沙石淋。膿血淋。疼痛不可忍。

即五苓散。加滑石。甘草。

黃芪束氣湯（方要）治氣虛遺溺。

黃芪（一匁二分）　白芍（一匁）　人參　破故紙（各七分）　升麻

益智（各五分）　五味子（三分）　薄桂（二分）

右生姜水煎

桃仁承氣湯（傳信尤易方）治血淋

三白散（本綱）治小便不利頭運引飲

澤瀉　白朮　白茯苓（各三分）

右水一盞姜五片燈心十莖煎八分溫服

萬全木通散（入門）治膀胱有熱小便難而黃

滑石（二分）　木通　茯苓　車前子　瞿麥（各一分）

右水煎服

一方（濟世）治淋濁之妙方

牙皂　滑石　竹葉　灯心　皮硝

右水煎露一宿次早溫服立効

龍膽瀉肝湯（回春）治小便澁滯或莖中作痛屬肝熱濕熱者

車前子　木通　生苄　歸尾　山梔

黃芩　甘草（各五分）　澤瀉　龍膽（各一錢半）

右水煎服○物理小識云一等腎不虛而肝熱濕熱者莖中痛或痒或腫或挺白物隨溺此筋疝也宜本方

薰法（必讀）治小便閉垂死者神効

桃枝　柳枝　木通　川椒　白礬（枯各一兩）

葱白（七箇）

右灯心一握。水五十碗。煎至十五碗。用磁瓶熱盛一半藥汁。薰外腎周迴。以被圍繞。不令外風得入。良久便通。如赤豆汁。若冷即易之。其效大奇。

桃仁湯（溫疫論）治邪干下焦血分。瀦血畜血。

桃仁（三匁）　阿膠（二匁）　丹皮　當歸　滑石（各一匁）

右水煎服。如小腹痛。按之硬痛。小便自調。有畜血也。加大黃。三錢。

腎氣丸（金匱）治轉胞。（方見虛勞門）

栝蔞瞿麥丸（金匱）治小便不利者。有水氣。其人若渴。

栝蔞根（二兩）　茯苓（三兩）　薯蕷（三兩）　附子（一枚。炮）　瞿麥（一兩）

右末之。煉蜜丸梧桐子大。飲服三丸。日三。不知增至七八丸。以小便利。腹中虛為知。

治小便不利。莖中疼痛。小腹急痛。（千金）

蒲黃　滑石（各等分）

右為末。酒服方寸匕。日三。

治小便大利。遂至於死。（千金）

牡蛎。五兩。以恵人屎三升。煎取二升。分再服。神驗。

治卒淋方（千金）

取石首魚頭石末。水服方寸匕。日三。○録驗。治石淋

及諸淋方。有當歸。正傳加滑石等分。

蘐苗說。士程妻。有容忍小便。令胞轉。大小便不得四五日。

困篤欲死無脈。服此差。（外臺）

滑石（二兩）　亂髮（三兩。燒灰）

右擣下篩。取生桃白皮一斤。熟舂。以水合絞得汁二升。

以汁服散方寸匕。日三。

崔氏療卒傷熱。行來尿血。（外臺）

大黃（末）　芒硝（末。各半匕）

右二味。冷水和頓服之。立止。

鹿茸散（外臺）療尿血。

鹿茸　當歸　乾地黃（各四兩）　葵子（五合）　蒲黃（五合）

右為散。酒服方寸匕。日三。

又方（外臺）

水服亂髮灰。方寸匕。日三服。

琥珀散（聖惠）治石淋。水道澁痛。頻下砂石。宜服神効。

琥珀　慈石（燒酒淬七遍。細研水飛過。）　桂心　滑石

葵子　大黄　膩粉　木通　木香（各半兩）

右為散。每食前。葱白燈心湯調下二錢。

治膀胱虛熱。下砂石淋痛。聖惠

鷄糞白（一兩。微炒）　雄雞膽（半兩。乾者）

右同研令細。每食前。温酒調下一錢。以利為度。

續隨子丸　聖濟　治小便不通。臍腹脹痛不可忍。諸藥不効者。

續隨子（去皮。一兩）　鉛丹（半兩）

右先研續隨子細。次入鉛丹。同研勻。用少蜜和作團。盛瓷罐內。密封。於陰處。掘地坑埋之。上堆冰雪。惟多是妙。臘月合。至春末取出。研勻。別鍊蜜丸。如梧桐子大。每服十五丸。至二十丸。煎木通湯下。不拘時。甚者。不過再服。要効速。即化破服。病急。即旋合亦得。

玄菟丹　局方　治思慮太過。心腎虛損。真元不固。便溺餘瀝。白物夢遺。

茯苓（三兩）　兎絲子（五兩）　蓮肉（二兩）　五味子（二兩）

右酒糊丸。如梧子大。每服三十丸。温酒下。鹽湯亦可。

治婦人諸般淋及沙石淋。每發痛不可忍。小便下沙石剤剤有聲。方（本事）

苦杖根俗呼為杜牛膝。多取淨洗碎之。以一合。用水五盞煎一盞。去滓。用麝香乳香少許研調下。○直指用牛膝。○按本綱此方收入于虎杖發明中曰或云一名杜牛膝者非也。

沙石淋方。直指

黑豆（一百二十粒）　粉草（一寸）剉

右以新水煎乘熱入滑石末一錢。調和空腹服。

鵬砂散　直指　治砂石淋急痛。

鵬砂（細研）　虎珀　茯苓　蜀葵子　陳皮（等分）

右末。每服二手半。用葱頭二片。去心麥門冬二十一粒。竇二匙。新水煎取清汁。調下。或菉豆水浸和皮研清汁調下。

桑螵蛸散　直指　治心腎不和。小便白濁。或如米泔。或為夢泄。

桑螵蛸（塩水炙）　遠志　石菖　人參　茯神

當歸　龍骨（別研）　龜甲（炙黄各半両）　甘草（二手）

右為末。每服二錢。人參茯苓煎湯調下。夜卧服。

妙香散（直指）治小便赤濁。

每服一錢。用灯心。麥門冬。煎湯調下。（方出驚悸門）

遠志圓（濟生）治因事有驚。心神不定。夜夢驚。隨小便白濁。

遠志　石菖（各二兩）　茯神　人參　茯苓

龍齒（各一兩）

右為末。煉蜜丸梧子大。以辰砂為衣。每服七十丸。熟湯下。

椒附圓（濟生）小腸虛冷。小便頻多。

椒紅（炒）　山茱萸　桑螵蛸（酒炙）　龍骨

附子（炮）　鹿茸（酒蒸焙）。

右等分。細末。酒糊為圓。如梧桐子大。每服七十圓。空心鹽湯送下。

透格散（朱氏集驗）治五淋。勞淋。血淋。氣淋。石淋。熱淋。困危。

淨白硝石（一兩）

右為細末。每服三五錢。勞淋。葵子煎湯下。血淋。冷水下。熱淋。瞿麥煎湯下。氣淋。滑石湯下。沙淋。桑白皮煎湯下。

地黃圓（朱氏集驗）治心腎水火不濟。小便白濁。

熟地（十兩） 兎絲子（洗酒浸蒸） 鹿角霜（各五兩） 茯苓

栢子仁（各三兩） 附子（一兩）

右為末。鹿角膠煮糊圓。如梧子大。每服百丸。鹽酒下。

縮泉圓（朱氏集驗） 治丈夫小便頻數。史越王方。

烏藥 益智（炒） 川椒 吳茱萸

右等分。酒糊圓梧桐子大。每服五十圓。臨卧鹽湯下。

雙白圓（朱氏集驗）

白茯苓 鹿角霜

右等分。細末。酒糊圓梧桐子大。每服二十圓。空心鹽湯下。此二方孫氏總要本。

滋腎丸（東垣） 治下焦陰虛。脚膝軟無力。陰汗陰痿。足熱不能履地。不渴而小便閉者。邪熱在血分也。

黄栢（二兩酒洗焙） 知母（二兩酒洗焙） 肉桂（二錢）

右為細末。熟水為丸。如雞頭大。每服百丸。加至二百丸。百沸湯下。空心服。

玉屑膏（濟衆） 治尿血并五淋。沙石。疼痛不可忍。

黄芪 人參（各等分）

右為末。用蘿蔔大者。切一指厚。三指大。四五片。蜜漬少

時。蘸蜜炙乾。復蘸盡蜜二兩為度。勿令焦。炙熟黑黃芪

人參末喫。不以時。仍以鹽湯送下。

秘元丹　得效　治內虛裏寒。自汗時出。小便不禁。

白龍骨（三兩）　訶子（十箇去核）　縮砂（一兩）

右為末。糯米粥圓梧子大。每服五十圓。空心鹽湯下。○河間加朱砂一兩。名秘眞丸。治白淫白濁隨溲而下。

治血淋（經驗良方）因虛損得之。若用生料平胃散。每服五錢重。加龍骨一錢重。同煎。空心服之。數服而愈。○瑣碎錄治夢泄白濁者。平胃散煎熟。入少龍骨末。空心服。

車前子散（經驗良方）諸淋。以一方主之。

車前子　滑石（各等分）

右為末。米飲調下半錢。食前日三服。

朴硝散（經驗良方）治五淋。

朴硝　海金砂　皂角（燒存性）

右各等分。為細末。沙糖井花水調下。

神効方。治血淋。（經驗良方）

海螵蛸　生乾地黃　茯苓（各等分）

右為末。每服一錢。煎柏葉。車前草湯調下。

六味湯（經驗良方）治男子驚滯疼痛。砂淋或小便出血。

破故紙（四兩焙）。　川練子（四兩）　舶上茴香（四兩）　木香（一兩）

沈香（一分）　麝香（二字）

右為末。每服三錢。青鹽沸湯調。空心服。其砂即下。

琥珀散（御藥）治五淋澁痛。小便有膿血。

琥珀　海金砂　没藥　蒲黃（各一兩）

右研為末。每服三錢。食前濃煎萱草根湯調下。

木香燈草丸（御藥）治陰形中痛。小便澁滯或濃濁不通。

木香　紅花　燈草（各三兩）

右為細末。糯米粉酒打糊丸。如桐子大。每服七十丸。温酒送下。食前日三。

葛粉丸（醫綱引世）治男女淋病疼痛。効速。勿輕忽之。

沙糖　葛粉

和丸如桐子大。井花水化開一二丸。

琥珀散（附餘）治老人虛人小便不通。

用琥珀末。每服一錢。以人參茯苓煎湯調。空心服。或蜜丸如梧子大。每服十丸。茯苓湯下。

六味地黃丸（附餘）治內虛熱者。小便頻數不禁。

本方。加牡蛎五味子。

澤瀉散（青効）治遺尿小便澁。

澤瀉　牡丹　牡蛎　鹿茸　茯苓

桑螵蛸　阿膠

右各等分。為細末。每服二錢。食前酒調服。

八味丸（必讀）治患淋數年。痛如刀錐。諸藥不應。

本方。加車前。沉香。人參。◯本方。加益知。補骨脂。如桂附之數。治下元不足。溺多失禁。本朝應本傳。

蒲公英。為通淋之妙品。諸家不言治淋。試之甚驗。（本草備要）

關格

芒硝湯（聖濟）治關格不通。

芒硝（二兩半）　滑石（三兩）　冬葵子（炒三合）

右以滑石葵子為麁末。取五錢。水煎至半。入芒硝一錢再沸。空心服。

孫兆大承氣湯（醫綱）治關者不得小便。格者吐逆。死在旦夕。但治下焦。

雲岐子人參散（醫綱）治胃虛津枯。關格吐逆。

人參（五分至一兩）　麝香（半分至一分）　氷腦（三厘至半分）

右為散。水煎和滓。分二三次溫服。○醫通云。若有瘦人津枯。不能出納。而大便秘結者。即以此方去腦麝。加蘆根汁。竹茹。未嘗不為合轍也。

雲岐子既濟丸（醫綱）治關格脈沉細。手足厥冷。

熟附子（一兩）　人參（三兩）　麝香（少許為衣）

為細末。陳米飲糊丸梧子大。每服十丸至三十丸。米飲下。

理中湯加童便猪膽煎服（醫學研悅）嘔久而諸藥不納者。此冒口壯火。關格之病也。此藥妙不可言。

枳縮二陳湯（回春）治關格上下不通。

枳實（二分）　茯苓　貝母　陳皮　香附
蘇子　瓜蔞　厚朴　砂仁（各七分）　川芎（八分）
甘草（三分）　沉香　木香（各五分）

生姜水煎。入竹瀝。磨沉香服。

皂角散（會編）治大小便關格不通。經三五日者。

大皂角（燒存性）

右為末。米湯調下。

遺精

桂枝加龍骨牡蛎湯（金匱）治脈得諸芤動微緊。男子失精。

女子夢交。

即桂枝湯。加龍骨。牡蛎。各二兩。

試問何方療夢遺。濃煎平胃最為奇。旋加牡蛎或龍骨。晨起空心服正宜。（澹軒方）

人參湯（奇効）治虚勞失精。便溺白濁。形體枯瘦。腰脚疼。

人參　官桂　芍藥（各三分）　茯苓　龍骨

牡蠣　黃芪　甘草（各半兩）　酸棗　澤瀉（各一分）

半夏（二兩）

右生姜水煎。

加味小柴胡湯（壽世）治莖中痛出白津。小便閉時作痒。

本方。加山梔。澤瀉。炒連。木通。膽草。茯苓。

清心飲（入門）治心有所慕。而遺者。

黄連　生地　當歸（二兩）　甘草　茯神

酸棗　遠志　人參　川楝　蓮肉

水煎服。

十味温膽湯（入門）治夢遺驚惕。

陳皮　半夏　枳實（各九分）　人參　茯苓（各五分）

遠志　熟地　酸棗　甘草（各三分半）　五味子（九箇）

姜煎温服。

香柴湯（本朝經驗）治夢遺。屬鬱滯者。

即小柴胡湯合香蘇散。加蒼朮。厚朴。木香。

王荊公妙香散（局方）安神祕精。定心氣。（方見驚悸門）

清心丸（本事）治經絡熱夢遺。心忪恍惚膈熱。

右黄蘗皮一兩。研為細末。生腦子一錢。同研勻。煉蜜為丸。如桐子大。每服拾丸。加至拾五丸。濃煎麥門冬湯下。

猪苓丸本事　治年壯氣盛。情慾動中。所願不得意。以致夢遺。

半夏（一兩破如豆）　猪苓末（二兩）

先將猪苓一半。炒半夏令色黄。不令焦。出火毒。只取半夏爲末。糊丸梧子大。候乾。更用前猪苓末一半同炒。微裂。入砂瓶内養之。空心溫酒或鹽湯下三五十丸。盖半夏有利性。而猪苓導水。即腎閉。氣使通之意。一名半苓丸。

三白圓（濟生續方）　治遺精白濁。滑泄盜汗等証。

鹿角霜（二兩）　龍骨　牡蠣（各一兩）

右爲末。酒煮麪糊丸梧子大。每鹽湯下四十丸。（本綱引普濟無方名。）

大鳳髓丹（元戎）　治心火狂陽太盛。補腎水真陰虛損。心有所欲。速于感動。應之于腎。疾于施泄。此方固真元。降心火。益腎水。大有神効。

黄栢（炒）　縮砂（一兩）　甘草（半兩）　半夏（炒）　猪苓

茯苓　紅蓮蘂　益智仁（各二匁五分）

右爲丸。每服五七十丸。○只用黄栢。甘草。縮砂。三味爲

正鳳髓丹。只用黃栢。甘草。二味。為小鳳髓丹。

桑螵蛸圓 得効 治下焦虛冷。精滑不固。遺瀝不斷。

附子　五味子　龍骨（各半兩）　桑螵蛸（七箇。切炒）

右為末。純糯米糊圓。每服三十圓。空心鹽酒呑下。○得効去附子。五味子。加茯苓。名鎖陽丹。治遺精。

沉香和中丸 醫綱 治夢遺。屬鬱滯者。庸醫不知其鬱。但用濇劑。愈濇愈鬱。其病反甚。先用此丸大下之。次用加減八物湯。呑滋腎丸。或用導赤散。漸止。（按此方太雜。宜用滾痰丸。故不錄于茲。）

端本丸 赤水 治白濁。精滛滛下。

白螺螄殼（火煆四兩）。牡蠣（二兩）　半夏　葛根　柴胡

苦參（各一兩）　黃栢（一兩）

右麪糊為丸。早晚服。

徐氏硫苓丸 入門 治上熱下冷。夢遺神効。

礬製硫黃（一兩）　茯苓（二兩）　知母　黃栢（各童便浸五日）

右為末。用黃蠟一兩半。溶化。和丸梧子大。每服五十丸。鹽湯下。

祕結

三黃湯（千金）治下焦熱結。不得大便。

大黃（三兩）　黃芩（二兩）　梔子（二十枚）　甘草（一兩）

右水煎服。若大閉。加芒硝二兩。

大便不通方。（千金翼）

生地黃汁（五合）　大黃　甘草（各半兩）

右以水三升。煮取一升。下地黃汁。又煮三沸。分作二服。

寛快湯直指治氣不下降。大府澁滯。

香附（二兩）　烏藥　枳殼（一兩半）　縮砂（七分半）　蘇子（半兩）

木香（三分）　甘草（七分半）

右水煎服。（原爲末服）

玉燭散（三法六門）

以四物湯。承氣湯。朴消。各等分。水煎。去滓。食前服。

通幽湯（蘭室）治幽門不通。上攻吸門。壹塞不開。氣不得下。大便艱難。名曰下脘不通。治在幽門。

當歸　升麻　桃仁　紅花　甘草（各一分）

生芐　熟芐（各五分）

右水煎。或加檳榔末。五分〇本方。加大黃。麻仁。名當歸

潤腸湯。

蘇子降氣湯（必讀）治氣滯妨悶。痰盛便祕。

本方。去桂。加沉香。

補中益氣湯加蘇梗杏仁（入）還治便難。用下藥不下。或芎歸湯。加上二味。或六味地黃丸料煎飲。

麻子仁丸（金匱）趺陽脈浮而澁。浮則胃氣強。澁則小便數。浮澁相薄。大便則堅。其脾爲約。此方主之。

麻子蘇子粥（本事）治老人虛人。風祕。產後便祕。

紫蘇子。大麻子。二味各半合。淨洗。研極細。用水再研。

取汁一盞分三次煮粥啜之。

神効丸（三因）治氣壅風盛大便秘澁後重疼痛煩悶此藥當量虛實加減。

大黃（四兩麪煨蒸焙）　人參（二兩）　訶子皮（四兩）　麻仁（二兩另研）

右為細末。煉蜜丸梧子大。每服二十丸。温湯温酒米飲皆可服。食後臨臥服。○入門去訶子。加當歸。名參仁丸。治同。

半硫丸（三因）治年高風秘冷秘。心腹一切痃癖冷氣。

硫黃（研細）　半夏（湯洗七次焙乾為末）

右等分。以生姜汁同熬。炊餅末攪勻。杵數百下。丸如梧子大。空心温酒姜湯下三十丸。

蘇感圓（直指）大凡腹痛而嘔。欲利其大便。諸藥皆吐。惟此藥用姜汁泡湯下。最妙。

蘇合香圓。合感應圓。

南木香丸（朱氏集驗）治大便秘結。

南木香　檳榔　麻仁　枳殼

右等分。先將枳殼去穰。每箇切作四片。用不蛀皂角三寸。生姜五片。巴豆三粒。畧搥碎。不去殼。用水一盞。將枳

殼同煮和滚濾去生姜巴豆皂角不用只將枳殼剉細焙乾為末入前木香檳榔麻仁同為末煉蜜丸如梧子大蜜湯下五十丸

大黃牽牛散（保命）治相火之氣遊走臟腑大便祕結

　大黃（一兩）　牽牛子（頭末半兩）

右為細末每服三錢蜜湯調下○醫綱云凡用大黃半兩至一兩而大便不通利者加麝少許調于藥中則大便必大走也許兆禎方紀云水腫通行二味各二兩陳米飯焦一兩丸服三錢名牛黃丸摘要牛黃丸治上焦熱藏府祕結經驗良方蜜丸名墜痰丸得效用大黃五錢黑丑半炒半生牙皂各一兩蜜丸名皂角膏瀉腎氣治腎經有熱陰囊赤腫痛大府祕澁衛生寶鑑皂莢熬膏和丸名全眞丸金宣宗服之驗賜名保安丸醫方捷徑二味等分糊丸治陽水婦人良方加木香青皮檳榔名氣針圓疎利滯氣止刺痛

芎黃丸（經驗祕方）治風熱壅盛頭昏目赤大便澁

　川芎　　大黃（以無灰酒一碗淬漫火炙令酒乾盡却焙乾各二兩）

右為細末煉蜜丸如梧子大每服三十丸食後溫熟水

送下。

皂角圓（得効）治大腸有風大便秘結尊年之人宜服。

皂角子（炙去子）　枳殼（去瓤炒）

右等分為末。煉蜜圓如梧子大。每服七十圓。食前米飲下。

顛倒散（壽世）治藏府實熱或小便不通。或大便不通。或二便不通。

大黃（六分）　滑石（二分）　皂角（三分）

右為細末溫酒送下。如大便不通。依前分兩。如小便不通。黃三石六皂如前。如大小便俱不通。黃石均分。角亦如前。

治大小便不通。西方不效。肚腹脹痛。咽喉飽塞。或痰壅盛氣喘。傷寒結胸臥不倒床。水米不下。死在須臾。此幽門氣閉不通。（壽世）

甘遂（五分。麪裹火煨熟。取出為末）　麝香（三厘）

右用飯搗為丸。淡姜湯下。立通。或小便不通。或大便不通。或大小便俱不通者皆効。

百順丸（景岳）治一切陽邪積滯。凡氣積血積蟲積食積傷

寒、實熱秘結等。

大黃（一斤） 牙皂角（炒一兩六分）。

右為末。用湯浸蒸餅為丸菉豆大。每用五分或一夂或二三夂。酌宜用引送下。○百代醫宗麪糊丸。名二聖丹。

治傷寒、瘟疫。不問傳經過經。並可服。攖寗新製。加檳榔三兩。名新法氣針丸。治氣秘便閉太効。

硝角一滑法（百代） 治大便不通神效。

皮硝（一撮水化） 香油（一小盞） 皂角（少許）

右用竹管一頭套。入谷道二寸許。將前藥二味。入猪尿泡內。竹管投之。用手盡力。送入其大腸。受藥以開之。其秘如湧決之水。其壅又何如。不通法。須如微。功取極大。患此者。宜斯霸道藥當之。

痙病（破傷風）

栝蔞桂枝湯（金匱）太陽病。其証備。身體強几几然。脉反沈遲。此為痓。此湯主之。

桂枝湯加栝蔞根三兩。

葛根湯（金匱）太陽病。無汗而小便反少。氣上衝胸。口噤不得語。欲作剛痙。此湯主之。

大承氣湯（金匱）痙為病。胸滿口噤。臥不著席。脚攣急。必齘齒。可與此湯。

蒸湯肘後治中風。無問男子婦人。中風脊急。身痙如弓。

雞屎（二升）　大豆（一升）　防風（三兩）

右三味。以水三升。先煮防風。取三合汁。豆雞屎二味。鎗中熬之。令黃赤色。用酒二升。淋之。去滓。然後用防風汁和。分為再服。相去如人行六七里。衣覆取汗。忌風。○葉氏無防風。用雞屎白。

倉公當歸湯（千金）治賊風口噤。角弓反張痓者。

當歸　防風（各十八銖）　獨活（一兩半）　附子（一枚）　細辛（半兩）

麻黃（三十銖）

右以酒五升。水三升。煮取三升。服一升。口不開者。格口內湯。一服。當蘇。二服小汗。三服大汗。

附子散（活人）治傷寒。手足逆冷。筋脈拘急。汗出不止。項強搖頭口噤。

附子　白朮（各一兩）　川芎（五分）　獨活（半兩）　桂心（二分）

右棗二枚。水煎。○醫通云。三陰諸痓。多汗。去川芎獨活。加黃耆當歸。

歸荊湯直指治風痓昏迷。吐沫抽掣。背脊強直。產後痓通用。

當歸　荊芥

右等分末之。每二錢。水一盞。酒少許。煎七分下。或童便調下。

理氣平肝散（統旨）治七情所傷發痙。

烏藥　香附（各一錢半）　青皮　枳殼　芍藥

川芎　柴胡　木香（各一錢）　甘草（缺兩數）

右生姜水煎。〇今用此方。治肝實氣滯。胸膈痞滿。憂鬱爲諸証。試之屢効。

十全大補湯（方考）發汗過多。因而致痙者。此方主之

人參建中湯（景岳）治痙証多汗。

小建中湯。加人參二兩。

當歸補血湯（百代）治一切去血大多。因無血養筋。令人四肢攣急。口噤如痙。（方見發熱門）

桂枝附子湯（方考）芍藥甘草附子湯（醫通）治發汗後痙病。及金瘡痙。

破傷風。鰾。不以多少。於一仰一合瓦內。炭火燒。煙盡。研細。熱酒調下。汗出即愈。（葉氏錄驗）〇危氏。加麝香少許。名香膠散。每服二錢。蘇木煎酒下。仍煮一錢。封瘡口。

破傷風。瘡口作白痂。無血者。殺人最急治之。（葉氏錄驗）

右以雄鼠糞（直者是）研細。熱酒調半錢服。

破傷風。牙關緊噤。（葉氏錄驗）

草烏頭　防風　雄黃（各等分）

右為末。每服一字。熱酒調灌之。更用天南星二兩。防風一兩。為末。先以熱小便洗瘡。貼之。有紫汁出。是效。

防風散（三因）治風自諸瘡口入。為破傷風。項强牙關緊欲死。

防風　天南星（各等分）

右為末。每服三錢。童子小便一大盞。煎至七分。熱服。○

本事方。名玉真散。

玉真散（正宗）治破傷風牙關緊急。角弓反張。甚則咬牙縮舌。

南星　防風　白芷　天麻　羌活

白附子（各等分）

用法與本事同。至昏死。心腹尚溫者。連進二服。亦可保全。若治風犬咬傷。更用漱口水洗淨。搽咬傷處。亦效。

破傷風（本綱）用蟾二兩半。切剁加泥。入花椒一兩。同酒炒熟。再入酒一盞半。溫熱服之。少頃通身汗出。神效。

破傷風秘方。（槐西雜志）

黃蠟　荊芥　魚鰾（炒黃色。各五匁）　艾葉（三片）

入無灰酒一椀。重湯煮一炷香。熱飲之。汗出立愈。呂太常含璞常用此方。

痿証

大防風湯（局方）治一切麻痺痿軟。風濕挾虛者。（方見歷節門）

藿香養胃湯（三因）治胃虛不食。四肢痿弱。行立不能。

藿香　白朮　茯苓　神麹　烏藥

縮砂　薏苡　半夏　人參（各半両）　蓽澄茄

甘草（各三分半）

右姜棗水煎。

加味四物湯（正傳）治諸痿。四肢軟弱。不能舉動。

當歸　麥冬　黃栢　蒼朮（各一匁）　熟地（三匁）

芍藥　川芎（各七分）　五味子（九粒）　人參（五分）　黃連（五分）
知母　牛膝（各三分）　杜仲（七分半）
右水煎服。酒糊為丸服亦可。

龍膽瀉肝湯（方考）肝氣熱。色青爪枯口苦。筋膜乾而攣急者。名曰筋痿。宜此方主之。
柴胡（一匁）　人參　知母　麥冬　天冬
龍膽　梔子　甘草　黃連（各五分）　黃芩（七分）
五味子（七粒）
右水煎服。

大承氣湯（必讀）治實熱內蒸。心陽獨亢。六脈有力。飲食若常。名脈痿。

十全大補湯加秦艽熟附子（必讀）治痿証。其脈大而無力。此營衛交虛。朝服之。夕用八味丸。加牛膝。杜仲。虎骨。龜板。萆解。黃柏。溫酒送下。

五痿湯（心悟）治五藏痿。
人參　白朮　茯苓（各一匁）　炙甘（四分）　當歸（一匁五分）
苡仁（三匁）　麥冬（二匁）　黃柏　知母（各三分）
右水煎服。

麋角丸（三因）治五痿疲憊。心不能支持。

麋角鎊。（一斤。酒浸一宿） 熟地黃（四兩） 大附子（一兩半）

右用大麥米二升。以一半藉底。一半在上。以二布巾隔覆炊一日。取出藥。與麥別焙乾為末。以浸藥酒。添清酒煮麥粉為糊。搜和得所。杵三千下。丸如梧子大。每服五十丸。溫米湯任下。食前服。○案麋角。此間難得。以鹿角代之。

虎脛骨丸（正傳）治兩足痿弱耎痛。或如火焙。從足踝下上冲腿膝等証。因濕熱所成者。

蒼朮 黃柏（各四兩） 牛膝（二兩） 龜板 虎骨

防己（各一兩） 當歸（二兩）

右麪糊為丸。梧子大。每服七十丸。或一百丸。空心鹽湯送下。神効。

一士兩足不痿不痛。每行動絶。不聽其所用。或扭於左而又墜於右。或扭於右。而又墜於右。互而行。不能一步步正走。此由筋軟不能束骨所致。（赤水醫案）

人參 黃芪 白芍 苡仁 虎骨

龜板 杜仲 鐵華粉

煉蜜為丸。早晩服之竟愈。

肺癰　腸癰　胃脘癰

葶藶大棗瀉肺湯（金匱）肺癰。喘不得臥。此湯主之。

葶藶（熬令黄色。搗丸如彈丸大）　大棗（十二枚）

右先以水三升。煮棗取二升。去棗内葶藶煮取一升。頓服。

桔梗湯（金匱）欬而胸滿振寒。脉數咽乾不渴。時出濁唾腥臭。久久吐膿如米粥者。為肺癰。此湯主之。（方與少陰篇同）○三因名如聖湯。

大黄牡丹湯（金匱）腸癰者。少腹腫痞。按之即痛如淋。時時

發熱自汗出復惡寒其脉遲緊者膿未成可下之當有血脉洪數者膿已成不可下也此湯主之

大黄（四兩） 牡丹（一兩） 桃仁（五十箇） 瓜子（半升） 芒硝（三合）

右五味以水六升煮取一升去滓內芒硝再煎沸頓服之有膿當下如無膿當下血○正宗無瓜子用白芥子

張氏醫通云無論已成未成俱用本方加犀角急服之

薏苡附子敗醬散（金匱） 腸癰之爲病其身甲錯腹皮急按之濡如腫狀腹無積聚身無熱脉數此爲腹內有癰膿此散主之

薏苡仁（十分） 附子（二分） 敗醬（五分）

右三味杵爲末取方寸匕以水二升煎減半頓服小便當下

葦莖湯（千金） 治欬有微熱煩滿胸心甲錯是爲肺癰

葦莖（二升） 薏苡仁 瓜瓣（各半升） 桃仁（五十枚）

右以水一斗先煮葦莖得五升去滓內諸藥煮取二升服一升再服當吐如膿○張氏醫通云氣口脉盛加犀角竹茹

黄昏湯（千金） 治証同前

黃昏（手掌大一枚 卽合歡木皮）

右一味切以水三升煑取一升分再服

腸癰湯（千金）

薏苡仁（一升） 牡丹皮 桃仁（各三兩） 瓜瓣仁（二升）

右水煎崔氏有芒硝二兩○正宗瓜瓣代瓜蔞仁加芍藥名薏苡仁湯治腸癰腹中疼痛或脹滿不食小便澁滯婦人産後多有此病縱非癰服之尤效

桔梗白散（外臺）証治與桔梗湯同（方與太陽下篇同）

犀角湯（聖濟）治胃脘癰脈沈細者

犀角（鎊） 梔子 芍藥 茯苓 黃芩

射干 大黃

右水煎服

四聖散（直指）治腸癰癰疽便毒神効

生黃瓜蔞（一枚去皮） 粉草末（四兩） 沒藥末（三兩） 乳香末（一兩）

右件用好紅酒二大椀慢火煎至一椀分作四服兩日服盡大便順導惡物妙若乾瓜蔞則用兩枚

皃京排膿內補散（直指）治腸癰冷証及癰疽等患

即局方十宣散有茯苓（方見癰疽門）

排膿湯（濟生）治肺癰得吐膿後。以此排膿補肺。

生綿黃芪（二兩）

細末。每二錢。水一盞煎五分。

射干湯（河間）治胃脘癰。人迎脈逆而盛。吐膿血。榮衛不流。熱聚胃口成癰。

射干　梔仁　茯苓　升麻（各一兩）　芍藥（一兩半）

白朮（半兩）

右水煎。入地黃汁一合。蜜半合。再煎服。

保安散（經驗良方）治腸癰。

甜瓜子（一合）　蛇蛻皮（一尺）　當歸（一兩）

右剉微炒。以大盞水煎七分。去滓。食前分作二服。前後溫服。以利下惡物效。

梅仁湯（奇効）治腸癰裏急隱痛。大便閉澁。

梅核仁（四十九箇。去皮尖）　大黃（二兩）　牡丹皮（一兩三分）　芒硝（二兩半）

冬瓜仁（四兩）　犀角（鎊。一兩半）

右水煎服。以利下膿血三兩行為度。

八寶散（玉案）治肺癰欬嗽日久。痰帶腥臭。身熱虛羸。

茯苓　桔梗　貝母　人參　五味子

天門冬　胡黃連　熟半（各壹分）

右水煎服。

四順散　正宗　治肺癰吐膿。五心煩熱壅悶。欬嗽氣急。不能安。

貝母　紫菀　桔梗（各一分五分）　甘草　杏仁（各七分）

右水煎服。

玄參清肺飲　正宗　治肺癰咳吐膿痰。胸膈脹滿。上氣喘急發熱者。

玄參（八分）　柴胡　陳皮　桔梗　茯苓

地骨皮　麥門（各一分）　薏苡（二分）　人參　甘草（各一分）

檳榔（三分）

水二鍾。姜一片。煎八分。臨入童便一杯。食後服。

排膿散　正宗　治腸癰小腹脹痛。脈滑數。裏急後重。時時下膿。

黃芪　當歸　金銀花　白芷　川山甲

防風　川芎　瓜蔞仁（各一錢）

右水煎服。

活血散瘀湯　正宗　治產後惡露不盡。或經後瘀血作痛或

暴急奔走。或男子被役。瘀血流注。漸成內癰。

川芎　當歸　芍藥　蘇木　牡丹

枳殼　瓜蔞仁　桃仁（各一分）　檳榔（六分）　大黃（二分）

右水煎服。

七賢散（正宗）治腸癰潰後。疼痛淋瀝不已。或精神減少。飲食無味。面色痿黃。自汗盜汗。睡卧不安。

茯苓　山藥　牡丹皮　山茱萸

熟芐　人參（各一分）　黃芪（二分）

右姜棗水煎。

加味桔梗湯（心悟）治肺癰。

桔梗　白芨　橘紅　甜葶藶（微炒各八分）

甘草　貝母（各一分五分）　苡仁　金銀花（各五分）

右水煎服。

治腹內癰腫一方。（直指附遺）

大黃（一兩。取末四分半）　破故紙（一兩。取末二分）　牛蒡子（一兩。取末一分）

牽牛（一兩取末三分半）

右和作二服。蜜水調空心服。以利為度。

肺癰丹方（醫通）肺癰初起。唾臭痰沫。用陳年芥虀汁溫服。

灌吐最妙。

又方（醫通）用荷葉濃煎。稍入白蜜。不時服之。不問已潰未潰。皆効

又方（醫通）肺癰潰後排膿。用薏苡根搗汁。頓熱服之。其効最捷。下咽其臭即解。有蟲者。蟲即死出。薏苡爲肺癰專藥。然性燥氣滯。服之未免上壅。不及根汁之立能下奪。已潰未潰皆可挽回。諸方皆不及也。

復元通氣散（精要）治諸氣澁耳聾。腹癰。便癰。瘡疽無頭。止痛消腫。

金銀花　連翹（各一兩）　穿山甲　瓜蔞根（各二兩）

甘草（三寸）　陳皮　青皮（各二兩）

右爲細末。熱酒調下。

排膿散（得効）理肺癰吐膿後。宜排膿補肺。

嫩黃芪（二兩）　川白芷　北五味子　人參（各一兩）

右爲末。煉蜜圓如小指頭大。偃仰入口噙化。旋旋嚥下。

食後服。臨卧服。

梅氏如聖丸（醫綱）治肺癰。

樟腦（另研）　牛黃（另研）　桔梗　甘草（生用各一戔）

右為細末煉蜜丸每兩作二十丸每用一丸噙化

神仙蠟礬丸（准繩）治腸癰內托神妙不問老幼皆可服之無不効最止疼痛不動藏府

黃蠟（半兩要黃色者一方用七分）　白礬（一兩要通明者細研）

右熔化黃蠟和礬為丸如梧桐子大每服二拾丸漸加至三十丸食遠用溫白湯送下○回春名錍肺丹用蜜水送下云凡治肺癰必以此藥間而服之以護膈膜不致潰透心肺最為切當

會膿散（廣筆記）治腹中腫毒

川山甲（炙）　白殭蚕（炒去絲嘴）　白芷（各一錢）　大黃（三兩）

乳香　沒藥　五靈脂（各五分）

右為末每服五錢酒服膿從大便出幼者用三錢

五痔脫肛

崔氏療大便急去血或至一升數合而少血色此是內傷風冷積年多變作痔方（外臺）

大黃（五分） 甘遂（五分） 乾姜 附子（各四分） 葱白（七莖）

桃仁（三七枚） 黃芩（三分）

右水煎溫服

當歸湯（聖濟）治痔漏消腫疼

芍藥 當歸 甘草 大黃（各等分）

右水煎服○即局方積熱清凉飲子幼幼新書引葛氏

肘後載此方云。治多溫壯熱實。及治諸百病。元和紀用

經名四味飲。療小兒面疾。聖惠同。

加味四君子湯（三因）治五痔下血。面色萎黃。心忪耳鳴脚

弱。氣乏。口淡食不知味。

即四君子。加黃芪。白扁豆。

右爲末。每服二錢。七湯點服。此方人未之信。服者頗效。

所謂脊不上于面。自有奇効。

地楡散（直指）治腸風熱証下血。

地楡　黃連　茜根　黃芩　茯苓（各半兩）

梔子（一分）

右薤白五寸。水煎服。

乾葛湯（直指）治酒痔。

白乾葛　枳殼　半夏　茯苓　生芐

杏仁（各半兩）　黃芩　甘草（各一分）

黑豆百粒。姜五片。白梅一箇。水煎服。

橘皮湯（直指）治氣痔。

橘皮　枳殼　川芎　槐花（各半兩）　檳榔

木香　桃仁　紫蘇　香附　甘草（各二錢半）

右姜棗水煎。

二妙散（朱氏集驗）治痔。

四君子湯　黃芪建中湯

右各一帖。加白藊豆。縮砂仁。同煎。

黃連湯（王氏集驗）治熱毒下黑血。五內絞痛。日夜百行。氣絶欲死。

黃連（一升）　龍骨　白朮（各三兩）　阿膠　乾姜

當歸　赤石脂（各三兩）　附子（一兩）

右水煎服。入口即定。

縮砂湯（奇效）治大腸虛而挾熱。脫肛紅腫。

梔子（一分）　縮砂　黃連　木賊（各等分）

右為細末。每服二錢空心米飲調下。

參朮實脾湯（統旨）治脫肛。

白朮（二匁）　人参（二匁）　茯苓　陳皮（各一匁）　肉菓（一匁半）

附子（八分）　炙甘（七分）

右水煎服。

四物湯方考治內熱痔漏下血者。

本方。加黃芩。黃栢（並酒製）炒槐花。

訶子人參湯（準繩）治瀉痢產育氣虛脱肛脈濡而弦者。

訶子　人參　茯苓　白朮　炙甘

蓮肉　升麻　柴胡（各等分）

右水煎服。

內托黃芪湯（正宗）治臟毒已成紅色光亮已欲作膿不必

內消。

川芎　當歸　陳皮　白朮　黃芪

白芍　山甲　角針（各一分）　檳榔（三分）

右水煎服。

提肛散（正宗）治氣虛肛門下墜及脫肛便血脾胃虛弱等

証。

川芎　當歸　白朮　人参　黃芪

陳皮　甘草（各一分）　升麻　柴胡　條芩

黃連　白芷（各五分）

右水煎服。○壽世無川芎陳皮芩連白芷有乾姜羌活

名提氣散。治脫肛虛寒。

凉血清腸散（六要）

生地　當歸　芍藥（各一錢三分）　防風　升麻

荊芥（各一分）　黄芩　黄連　香附　川芎（各八分）

甘草（五分）

水煎服。

參朮芎歸湯（六要）治瀉痢後。及産後氣虚脱肛。脈濡而弦者。

即補中益氣湯。去柴胡。加白芍。川芎。白茯。

袪風辟痔湯（壽世）痔疾腫痛。初起立効。

黄連　黄芩　芍藥　枳殻　黄栢

槐花（各一分）　連翹　大黄　苦參（各半分）

右水煎服。為末水丸。用温水下亦可。

槐花散（本事）治腸風藏毒。

槐花　栢葉（爛杵焙）。荊芥穂　枳殻（炒）

右等分為末。米飲調下二錢。食前。

治腸風痔漏。（續本事）

大黄　當歸　苦參　牙皂

右等分。為末。醋糊員如梧子大。毎服二十員。空心温酒下。

蝟皮圓（楊氏）治痔漏殺蟲。

鶴虱　雷丸　枯礬（各一兩）　皂角子（燒灰半兩）

硫黃（另研各半兩）

右為細末醋煮麪糊為圓如梧子大雄黃為衣每服二十圓麝香溫酒送下食前

黑聖散直指　治腸風臟毒痔瘻及諸下血

當歸　川芎　茯苓　地榆　槐花（焙）

敗棕（燒存性）　艾葉　百草霜

右等分每服二錢食前陳米飲調下

血竭散（朱氏集驗）治痔漏痛不可忍

真血竭細末用自津唾調塗

蓮花蕊散丹溪　二三十年痔不愈者三服止

蓮花蕊　黑牽牛頭末（各一兩）　當歸（半兩）　礬紅（少許）

右為末先忌食肉五七日空心令食肉一頓就取溫酒下三錢約兩時辰取下膿血或蟲是効

黃連散丹溪　元有痔漏又於肛門邊生一塊皮厚腫痛作膿就在痔孔出作食積注下治

黃連　阿魏　神麴　山查　桃仁

連翹　槐角　犀角（各等分）

右爲末。以少許置掌心。時時舐之。津液嚥下。如消三分之二。止後服。

龍骨散（準繩）治大腸虛。肛門脫出。

龍骨　訶子（一錢半）　没石子（二枚）　粟殼

赤石脂（一錢炙）

右末之。每服一錢。米飲調下。○無粟殼。没食子。臘茶少許和藥。摻腸頭上。絹帛揉入。

胡連追毒丸（正宗）治痔漏。不拘遠年近日。有漏通腸。汚從孔出。先用此丸。追盡臟毒。每服後。丸藥自然取效。最穩。

胡黃連（一兩切 薑汁炒）　刺蝟皮（一兩炙切 再炒脆）　麝香（三分）

爲末。陳米爛飯爲丸。麻子大。每服一錢。食前溫酒下。服後如膿水反多。是藥力到也。勿懼之。候膿水將盡。服黃連閉管丸。

黃連閉管丸

胡黃連（淨末 五錢）　穿山甲（麻油內 煮黃色）　石決明　槐花（炒各 五錢）

爲末。煉白蜜丸。麻子大。每服一錢。晨昏各一服。米飲下。至重者。四十日愈。如漏之四邊有硬肉突起者。加蠶繭二十枚。炒末。和入藥中。治遍身諸漏皆效。

截腸病　其症大腸頭出痛苦。乾又落。落又出。腸盡則死初出寸餘。時治之。以芝麻油一盞。以臀坐之。飲火麻子汁數升愈。（得効方）

觀聚方要補卷六