觀聚方　八

松
特別
K 62-1
F 7
カー96

490.9
K2-2
7

No.2569
IR K62-1

慶應義塾大学医学情報センター
昭和47年7月4日

富士川文庫

1517

觀聚方要補卷八目録

癰疽

内疎黄連湯　内消散
托裏消毒飲　乳香黄耆散
神功内托散　透膿散
竹葉黄耆湯　十全大補湯
八珍湯　補中益氣湯
人參養營湯　托裏清中湯
托裏建中湯　黄連苦救湯

解毒天漿散　內托黃耆湯
內托酒煎湯　大防風湯
固本養營湯　五香連翹湯
五利湯　乳香消毒散
托裏温經湯　托裏温中湯
黃耆建中加附子湯　止痛當歸散
當歸連翹散　仙方活命散
營衛返魂湯　犀角湯
神效解毒散　托裏黃耆湯

玉蘂托裏湯　治大小便不利方
當歸和血散　犀角消毒散
內托黃耆散　五聖散
連翹托裏散　內托羌活湯
托裏回陽湯　護心散
加味八味丸　化毒排膿內補十宣散
廻毒銀花散　內補散
內消散

疔瘡脫疽

黃連解毒湯　疔毒復生湯
人參清肺湯　內托安神散
解毒濟生湯　追疔奪命湯
內托連翹散　太乙紫金丹

瘰癧 鬢疽 癭瘤 發頤

防風解毒湯　連翹消毒飲
益氣養榮湯　芩連二陳湯
夏枯草湯　逍遙散
柴胡清肝散　梔子清肝散
鼠粘子湯　加味逍遙散
參苓內托散　海藻玉壺湯
十全流氣飲　柴胡葛根湯
牛蒡甘桔湯　消瘇湯
七賢散　治瘰癧方
九味柴胡湯　柴胡通經湯
內消散　玉燭散
犀角丸　四海舒鬱丸
妙靈散　治瘰癧方

必效散

流注（附痞癖）

調和營衛湯　附子八物湯
通經導滞湯　調中大成湯
黄耆六一湯　散血葛根湯
阿魏化痞散

乳癰

牛蒡子湯　橘葉散
消癰散毒湯　治未潰方
治已潰方　治乳房腫痛方
鹿角散　神效瓜蔞散
治乳巖方　露蜂房散

囊癰　懸癰　臀癰　鸛口疽

清肝滲濕湯　滋陰內托散
滋陰八物湯　還元保真湯
滋陰九寶飲　活血散瘀湯
黄耆內托散　滋陰除濕湯
和氣養榮湯　滋腎保命湯

解毒排膿散　炙粉草膏
下疳便毒黴瘡結毒
龍膽瀉肝湯　山甲內消散
紅花散瘀湯　黃耆內托散
升麻解毒湯　歸靈湯
十全大補加附子湯　消疳敗毒散
茯苓湯　萆薢湯
搜風解毒湯　蠲痺消毒散
紫草飲　治便毒
二連湯　治楊梅瘡
龍膽瀉毒湯　治楊梅瘡未發者
雙解散　十服神效湯
治骨節疼痛方　小柴胡湯加龍膽胡連
九龍丹　五寶散
結毒紫金丹　鉛回散
硫黃不二散　治廣瘡潰爛
解毒至寶丹
疥癬　丹毒　天泡

當歸飲子
消風散
化斑解毒湯
解毒瀉心湯
羚羊角散
胃脾湯
升麻和氣飲
升麻牛旁子散
浮萍散
平血飲
治斑疹及痱癔
頑癬浮萍丸
烏龍丸
跌撲 金瘡
太成湯
獨參湯

膠艾湯
當歸鬚散
治筋骨損
治亂打血攻心
花蘂石散
內托黃耆圓
順血散
治打撲金瘡悶絕
治墮下崩下
治破血在心腹
治內傷瘀血
沒藥散
湯潑 火焼
四順清涼飲
玄妙飲
逐火丹
蜀漆湯

清涼散　治湯火傷

觀聚方要補卷八

東都　丹波元簡廉夫　輯

癰疽

內疎黃連湯（保命）治癰疽腫硬。發熱作嘔。大便秘澁。煩躁飲冷。舌乾口苦。六脈沉實有力。

木香　黃連　山梔　當歸　黃芩
白芍　薄荷　檳榔　桔梗　連翹（各一戔）
甘草（五分）　大黃（二戔）

右水煎臨服加蜜二匙。

内消散（正宗）治癰疽發背。對口疔瘡乳花百種無名腫毒。一切惡瘡。此藥能令內消。化毒為黑水。從小便而出。

金銀花　知母　貝母　天花粉

白芨　半夏　穿山甲　皂角刺

乳香（各一匁）

右水酒各半煎。○醫家類選。名化毒為水內托散。○外科纂要。名活命飲。又疔瘡門。名還魂湯。

托裏消毒飲（正宗）治癰疽已成。不得內消者。

人參　川芎　白芍藥　黃芪　當歸

白朮　茯苓　金銀花（各一匁）　白芷

甘草　皂角針　桔梗（各五分）

右水煎服。○脾弱者去白芷倍人參。○樞要無皂角針桔梗。有連翹。又加乳没。名加味托裏消毒散。

乳香黃芪散（正宗）治癰疽發背。諸毒疔瘡。疼痛不可忍者。或未成者速散。已成者速潰。

乳香　沒藥（各五分）　黃芪　粟殼（蜜炒）

人參　甘草　川芎　當歸

芍藥　陳皮　熟地黃（各一匁）

右水煎服。○去參芪。甘草。陳皮。加桂名托裏定痛散○
樞要。無參芪及四物湯。有丁香。白芷。名乳香止痛湯○
經驗祕方。有麻黃。無地黃。

神功內托散（正宗）治癰疽腦項諸發。至十四日後。當腐潰流膿。其時不作腐潰。更兼瘡不高腫。脈細身凉者。

當歸（二錢）　白朮　黃芪　人參（各一錢五分）　芍藥
茯苓　陳皮　附子（各一錢）　木香　甘草（各五分）
川芎（一錢）　山甲（八分）

姜三片。棗二枚。水煎服。

透膿散（正宗）治癰疽諸毒。內膿已成。不穿破者。宜服之立破。

黃芪（四錢）　山甲（炒末。一錢）　川芎（三錢）　當歸（二錢）
皀角針（一錢五分）

右水煎。隨病前後服。臨入酒一杯亦好。

竹葉黃芪湯（正宗）治癰疽發背。諸般疔腫。表裏熱甚。大渴者。

黃芪　甘草　黃芩　川芎　當歸
芍藥　人參　半夏　石膏　竹葉（一片）

麥冬（各八分）○生地黃（一匁）
姜三片。燈心二十根。水煎。（原出千金。不用燈心。用大棗。）

十全大補湯（正宗）治諸瘡久不作膿。或膿成不潰。潰而不歛。（方出虛勞門）○精要加五味子。烏藥。橘紅。名加味十全湯

八珍湯　補中益氣湯　人參養榮湯（正宗）治潰瘍。宜隨症撰用。

托裏清中湯（正宗）治癰疽脾胃虛弱。欬嗽痰氣不清。飲食少思者。
人參　白朮　桔梗　陳皮　半夏

茯苓（各一匁）　麥冬　五味　甘草（各五分）
姜三片。棗二枚。水煎。○樞要無麥冬。五味子。

托裏建中湯（正宗）治癰疽元氣素虛。脾胃虛損。飲食少思泄瀉等。
人參　白朮　茯苓（各二匁）　半夏　炮姜（各一匁）
甘草（五分）　熟附（八分）
生姜三片。棗二枚。水煎。○千金翼無參朮茯苓半夏有蜀椒。治癰腫取冷過多。寒中下利。食完出。名溫中湯。○樞要無熟附。有黃芪肉桂。

黃連苦救湯（正宗）治腦疽發鬢發頤及天行時毒初起增寒壯熱頭面耳項俱腫

黃連　升麻　葛根　柴胡　芍藥

川芎　當歸　連翹　桔梗　黃芩

羌活　防風　銀花　甘草（各一錢）

右水煎服

解毒天漿散（正宗）治腦疽積毒日深堅腫木硬口燥舌乾惡心煩渴六脈沈實有力大便閉結

石決明（生研）　姜蚕　山甲　防風　連翹

羌活　乳香　甘草　金銀花　黃連

當歸（各一錢）　大黃（三錢）　天花粉（新鮮者四兩石臼內搗爛投水一碗攪勻）（絞去渣用）

右花粉淨汁一碗半同藥煎至八分入酒一杯服

內托黃芪湯（正宗）治濕熱腿內近膝股患癰或附骨癰初起腫痛此太陰厥陰之分也脈細而弦

黃芪　當歸　柴胡　木瓜　連翹（各一錢）

羌活　肉桂　黃柏（各五分）

水酒各半煎◯東垣無木瓜羌活有大力子升麻甘草

白芷。名托裏黃芪湯。治骨疽。

內托酒煎湯（東垣）治寒、濕發於腿外側患癰。或附骨癰。堅硬漫腫作痛。

黃芪　當歸（各二戔）　柴胡（一戔五分）　連翹　肉桂

大力子（各一戔）　升麻　黃栢　甘草（各五分）　白芷（一戔）

右水酒各半煎。

大防風湯（樞要）治附骨疽。皮色不變。大腿通腫。疼痛無奈。

（方見歷節門）

固本養榮湯（正宗）治骨疽已成。骨不吐出。或既出不收斂。由氣血之虛。脾胃弱也。宜服之。骨不出者自出。不收斂者自斂。

十全大補湯。加山藥。山茱萸。丹皮。五味子。

五香連翹湯（千金）治一切惡核。瘰癧。癰疽。惡腫。發背。

木香　沈香　丁香　乳香　麝香

連翹　射干　升麻　獨活　寄生

通草（各二兩）　大黃（三兩）

右水煎服。

五利湯（千金）治常大患熱。發癰疽。無定處。大小便不通。

芒硝（一兩） 升麻 黄芩（各二兩） 大黄（三兩） 梔子（五兩）

右水煎、下芒硝服、○劉涓子名大黄湯、正宗、治時毒焮

腫赤腫、煩渴便祕、

乳香消毒散（寶鑑）專治惡瘡、

大黄 黄芪 牛蒡子 牡蠣

金銀花（各五兩） 甘草（三兩） 沒藥 乳香

懸蔞（各半兩）

右水煎服、

托裏温經湯（寶鑑）治寒覆毛皮、鬱遏經絡、不得伸越、熱伏榮

中、而為赤腫、痛不可忍、惡寒發熱、肢體疼痛、

人參 蒼朮（各一分） 芍藥 甘草（各一分半） 白芷

當歸 麻黄（各二分） 防風 葛根（各三分） 升麻（四分）

右水煎服、

托裏温中湯（寶鑑）治瘡為寒變、而内陷者、膿出清解、皮膚

涼、心下痞滿、腸鳴切痛、大便微溏、食則嘔逆、氣短促、吃

逆不絶、不得安臥、時發昏憒、

沈香 丁香 益智仁 茴香 陳皮（各一分）

木香（一分半） 甘草 羌活 乾姜（各二分） 附子（四分）

右生姜水煎。

黃芪建中加附子湯（袖珍）治氣體虛弱之人患背瘡頸疽不知痛癢。瘡勢不作。急宜服此。以生血潰膿有熱者不可服。

止痛當歸散（精義）治腦疽發背穿潰疼痛。

當歸　黃芪　人參　官桂　芍藥
甘草　生地黃（各等分）

右水煎服。

當歸連翹散（袖珍）治一切風熱。癰腫瘡疽。咽膿不利舌腫喉閉。二便結滯。

連翹　當歸　大黃　梔子　芍藥
金銀花（各等分）

生姜三片水煎。

真人活命散（回春）治一切癰疽疔腫。不問陰陽虛實。善惡腫潰。大痛或不痛。

乳香　防風　白芷　貝母　芍藥
當歸　沒藥　皂刺　花粉　甘草
山甲（各一分）　陳皮　金銀花（各三分）

右水酒煎服後側睡覺痛定面生神功浩大不可臆度。

榮衛返魂湯（外科秘方）此藥流注癰疽發背傷折非此不能效

何首烏　當歸　木通　芍藥　白芷

茴香　烏藥　枳殼　甘草（各等分）

水酒各半煎。又名通順散。又名何首烏散。流注加獨活。

○回春名追風通氣湯。

犀角湯（集驗）治石癰熱毒氣盛腫硬疼痛口乾煩悶。

犀角　木香　連翹　梔子　射干

當歸　升麻　芍藥　玄參　枳殼

甘草（各一兩）　大黃（二兩）

右水煎。

神效解毒散（樞要）治一切瘡瘍。

金銀花（一兩）　甘草（五分）　黃芪　皂刺　當歸（各三分）

乳香　沒藥（各二分）

右水酒各半煎。

托裏黃芪湯（聖濟）治癰疽諸瘡潰後膿出多內虛。

茯苓　黃芪　桂枝　麥冬　當歸

人參　甘草　遠志（各一兩）　五味子（一兩半）

右水煎服。

玉藥托裏散（經驗秘方）治疔瘡癰疽發背。不問陰陽二症。已成未成。太醫院麻同知用大効。

黃茋（四兩）　人參　芍藥　當歸　熟地黃

蓮花蘂　乳香　沒藥　甘草（各二兩）

右酒水各半煎。有熱。加連翹。

治癰疽大小便不利。（修月魯般經後錄）

大黃　黃芩　木通　甘草　麥冬

燈心

右水煎。

當歸和血散（神効名方）治瘡瘍未發出。內痛不可忍。及婦人產後腹痛。

當歸（二分）　沒藥（一分半）　乳香（半分）　芍藥（三分）

右水煎。婦人。酒煎。瘡瘍者。加人參木香。

犀角消毒散（經驗良方）治發背發腳發手發脇。一切惡瘡。此藥溫和。大能散毒。

荊芥　防風　甘草　鼠粘子　羌活

白芷　獨活　桔梗（各等分）

右水煎。

内托黄芪散（施圓端効）江淮間。治諸瘡証。

黄芪　連翹　葛根　甘草（各等分）

右水煎。

五聖散（經驗秘方）治諸般惡瘡。

大黄（量病加減）生姜　甘草（各五分）　苽蔞（一箇去皮）

皂角針（一兩）

水酒煎。如疽疔大瘡。全作一服。其餘減半可也。

連翹托裏散（烟霞聖効）治壯實之人。多患苦瘡。

連翹　甘草　梔子　獨活　黄蓍

金銀花（各半兩）大黄（半兩）　母蠣（一兩）

右水煎。

内托羗活湯（正宗）治尻臀患癰。堅硬腫痛。脈緊數。

羗活　黄栢　防風　當歸　藁本

肉桂（各一錢）　黄芪（一錢五分）　連翹　甘草　蒼朮

陳皮（各六分）　紅花（五分）

水酒各半煎。◎奇効無紅花。

托裏回陽湯（樞要）治瘡瘍。治純陰。

補中益氣湯加附子乾姜。

護心散（正宗）治瘡毒内攻。口乾煩躁。惡心嘔吐者。

眞豆粉（一兩） 乳香（三分） 硃砂（一分） 甘草（一分）

右共研細。每服二錢。白滾湯調服。早晩二次。○案原出聖濟。名托裡湯。無乳硃。○本事。無硃砂甘草。名乳香散。又精要。一名内托散。一名乳香萬全散。○準縄去乳香。名百二散。治疔瘡發狂。○纂要名乳香護膜散。三味以甘草湯送下。

加減八味丸（精要）治癰疽已發未發。口乾作渴。舌乾黄硬。

本方。去附子。加五味子。

化毒排膿内補十宣散（局方）治一切癰疽瘡癤。未成者速散。已成者速潰。

黄芪 人參 當歸（各二兩） 厚朴 桔梗

桂心 芎藭 防風 甘草 白芷（各一兩）

右細末。每服自三錢至五六錢。熱酒調下。

廻毒銀花散（保命）治腦疽。及諸發陰瘡不起。色變紫黒者急服之。

金銀花（二兩） 黄芪（四兩） 甘草（一兩）

用細酒二十兩同藥入小口砂罐內密封重湯內煮盡三香為度取起濾清服之益緩患上其瘡漸漸高腫此轉陰為陽吉矣後用托藥潰膿如服後不痛不起瘡頭流出黑水此真陰不治○局方有當歸名神効托裏散又醫宗說約名四妙湯○袖珍加牡蠣名內托散

內補散千金治癰疽發背已潰排膿生肉（廣濟名排膿散）

當歸　桂心（各二兩）　人參　芎藭

厚朴　防風　甘草　白芷

桔梗（各一兩）

右治下篩酒服方寸匕日三夜二

○精要一名十奇散醫說名內托散○寶鑑加黃芪木香乳香沒藥連翹治一切惡腫名千金托裡散○經驗秘方有茯苓連翹木香金銀花芍藥無桔梗

內消散聖濟治瘡腫久不愈

皂莢刺皮（一兩為末）　乳香（研二分）

右為末和勻每服二錢匕酒一盞煎七分溫服其毒內消或微利是效

疔瘡 脫疽

黃連解毒湯（正宗）治疔毒入心。內熱口乾。煩悶。恍惚脈實者。

黃連 黃芩 黃栢 山梔 連翹

甘草 惡實（各等分）

燈心二十根。水煎服。

疔毒復生湯（正宗）治疔毒走黃。頭面發腫。毒氣內攻。煩悶欲死。

牡蛎 山梔 銀花 木通 連翹

牛蒡子　乳香　沒藥　角刺　花粉

大黃　地骨皮（各八分）

右水酒煎便秘者加朴消〇纂要名救命仙方以瓜蔞仁代花粉治疔走黃打衮欲死者一服見効

人參清肺湯（正宗）治疔瘡潰後餘毒未盡五心煩熱精神恍惚

人參　黃芪　當歸　白朮　麥門

陳皮　茯苓　遠志　地骨皮（各一分）　甘草

柴胡　黃連（各五分）

糯米一撮水煎服

內托安神散（正宗）治疔瘡出膿時元氣虛弱睡臥驚悸心志不寧或毒未盡流入心竅致生健忘

人參　茯神　黃芪　白朮　麥冬

玄參　陳皮（各一分）　酸棗　遠志　甘草

石菖　五味子（各五分）

水煎臨服入朱砂末三分

解毒濟生湯（正宗）治脫疽初起惡寒體倦發熱作渴或腫或紫或麻或痛四肢倦怠心志恍惚不寧者

川芎　當歸　黄栢　知母　天花粉
金銀花　麥冬　遠志　柴胡　黄芩
犀角　茯苓（各一匁）　甘草　紅花　升麻（手指加）
牛膝（足指加各五分）
水煎臨服入童便一杯
追疔奪命湯（急救仙方）能內消腫毒（醫方大成無方名）
羌活　獨活　防風　青皮　黄連
芍藥　細辛　甘草　蟬退　僵蚕
脚蓮　河車　澤蘭　金銀花

各等分水煎加少酒服以衣被蓋覆汗出為度病退減後再加大黄利一兩次去餘毒此藥以藥味觀之甚若不切然屢用屢效萬無一失（回春脚蓮作獨脚蓮即是鬼臼河車作紫河車注云一名金線重樓即是蚤休○今無蚤休則以蜂房代之大河外科云紫河車一名金線重樓一名大蜂窩○銚吉無鬼臼蚤休有白芷外科集驗云脚蓮即鶏凢黄連誤）
內托連翹散（經驗良方）治諸般疔瘡
連翹　白芷　生地（各壹兩）　大黄
薄荷　梔子（各七匁）　甘草（一兩半）　黄芩（半兩）　朴消（一兩）
燈心竹葉水煎其人喘加人參

大乙紫金丹　正宗　解諸毒療諸瘡真能起死回生（方出備預丹藥）

瘰癧　鬢疽　癭瘤　發頤

防風解毒湯　正宗　治風毒瘰癧耳項結腫痰凝氣滯者

防風　荊芥　桔梗　惡實　連翹

甘草　石膏　薄荷　枳殼　川芎

蒼术　知母（各一錢）

燈心二十根水煎服

連翹消毒飲　正宗　治熱毒瘰癧腮項成核或天行亢熱作腫

連翹　陳皮　桔梗　玄參　黃芩

芍藥　當歸　山梔　射干　花粉
紅花（各一分）　甘草（五分）　大黃（初起便燥者加之）
水煎。有痰者。加竹茹一錢。

益氣養榮湯（正宗）治抑鬱或勞傷氣血。或四肢頸項筋縮結成。纍纍如貫珠者。謂之筋癧。此由思慮太過所得也。

人參　茯苓　陳皮　貝母　香附
當歸　川芎　黃芪　熟地黃　白芍（各一分）
甘草　桔梗（各五分）　白朮（二分）
姜三片。棗二枚。水煎。○撮要有柴胡。

芩連二陳湯（正宗）治痰癧項側結核。外皮漫腫。色紅微熱。或腫形長堅。作痛。名曰馬刀。初起並宜服。

黃芩　黃連　陳皮　茯苓　半夏
甘草　桔梗　連翹　牛旁子　花粉（各一分）
木香（三分）　夏枯草（二分）
姜三片。水煎。

夏枯草湯（正宗）治瘰癧馬刀。不問已潰未潰。日久成漏。形體羸瘦。飲食不甘。寒熱如瘧。漸成勞瘵。並効。

夏枯草（二兩）　當歸（三分）　白朮　茯苓　桔梗

陳皮　生地黄　柴胡　甘草　貝母

香附　芍藥（各一錢）　白芷　紅花（各三分）

先用夏枯草三碗煎至二碗濾清同藥煎至八分服

逍遙散（正宗）治婦人血虛痰嗽潮熱漸成骨蒸

本方加香附丹皮黄芩

柴胡清肝湯（正宗）治鬢疽初起未成者毋論陰陽表裏俱可服之亦治瘰癧

柴物湯去半夏人參薑棗加山梔花粉防風惡實連翹○樞要只用柴胡黄芩人參梔子川芎連翹桔梗甘草八味

梔子清肝湯（正宗）治少陽風熱上攻成鬢疽痛連頸項胸乳

牛旁子　柴胡　川芎　芍藥　石膏

當歸　梔子　牡丹（各一錢）　黄芩　黄連

甘草（各五分）

右水煎服○樞要無芩連石膏有茯苓

鼠粘子湯（正宗）治鬢疽初起熱多寒少二便祕澁煩悶寒痛

鼠粘子　桔梗　當歸　甘草　芍藥

連翹　玄參　地骨皮　防風　花粉

木通（各一）　大黃（二錢）

水煎服

加味逍遙散　正宗　治鬢疽七日以上根盤深硬色紫焮痛

薛氏加味更加貝母花粉紅花羚羊角

參苓內托散　正宗　治鬢疽已成堅而不潰潰而不斂氣血

俱虛

十全大補湯加山藥附子丹皮地骨皮

海藻玉壺湯　正宗　治癭瘤初起或腫或硬或赤不赤但未

破

海藻　貝母　青皮　昆布　川芎

當歸　半夏　連翹　甘草　獨活（各一錢）

海帶（五分）

水煎服凡服此門藥餌先斷厚味大葷次宜絕慾虛

心者為妙

十全流氣飲　正宗　治憂鬱傷肝思慮傷脾致脾氣不行逆

於肉裏乃生氣癭肉瘤皮色不變日久漸大

陳皮　茯苓　烏藥　川芎　當歸

芍藥（各一匁）　香附（八分）　青皮（六分）　甘草（五分）　木香（三分）

姜棗水煎。

柴胡葛根湯（正宗）治頤毒表散未盡。身熱不解。紅腫堅硬作痛者。

柴胡　花粉　葛根　黄芩　桔梗

連翹　牛旁子　石膏（各一匁）　甘草（五分）　升麻（三分）

水煎服。

牛旁甘桔湯（正宗）治頤毒表邪已盡。耳項結腫。微熱不紅疼痛。

牛旁子　桔梗　陳皮　花粉　黄連

川芎　芍藥　甘草　蘇木（各一匁）

右水煎服。

消腫湯（東垣）治馬刀瘡。

大力子　黄連（各五分）　當歸　甘草（各七分）

瓜蔞根　黄芪（各一匁）　黄芩　柴胡（各一匁五分）

連翹（二匁）　紅花（少許）

右水煎服。

七賢散（纂要）治瘰癧。初起即効。已潰速愈。

皂角針　皂角子　連翹　黃連

花粉　金銀花（各一兩）　土茯苓（八兩）

分七劑。每劑水五碗。煎二碗半。一二日服完七劑。疾即愈。

治瘰癧（彙言）

用水葒花子。不拘多少。一半微炒。一半生用。同研末。食後好酒。調服二錢。日三服。破者亦治。久則效。效則止。

九味柴胡湯（保嬰撮要）治肝經熱毒。一切瘡瘍。或風毒惡核瘰癧便毒腫痛。

柴胡　黃芩（各五分）　人參　山梔　半夏

龍胆草　當歸　芍藥　甘草

右水煎。

柴胡通經湯（試效）治小兒項側有瘡。堅而不潰。名馬刀。

柴胡　連翹　歸尾　黃芩　生甘

黍粘子　桔梗　三稜（各二分）　紅花（少許）　黃連（五分）

右水煎服。

內消散（丹方彙編）治瘰核。不拘近久。已破未破。

花粉　苦參（各五戋）　角刺（四十九箇）　土茯苓（三斤）

共煎湯當茶飲。屢試屢驗。奇異方也。

玉燭散（寶鑑）治瘰癧。和血通經。服之自消。日進一服。七八日取効。

當歸　芍藥　川芎　甘草　芒硝

熟地黃　大黃　黃芩（各等分）

右生姜三片。水煎。

廣濟犀角丸（外臺）療瘰癧。

犀角（四分）　升麻（三分）　大黃（六分）　牛蒡子（八分）

烏蛇（十分炙）　玄參（八分）

右末。蜜丸如梧子大。每日至午後。煎牛蒡湯。下三十五丸。

四海舒鬱丸（大全）氣頸乃七情抑鬱不伸。肝脾氣鬱不舒。結喉之間。氣結如胞。隨喜怒消長。甚則飲食噎碍。治以此方。

木香（五戋）　陳皮　海蛤粉（各三戋）　海帶　昆布

海螵蛸（各二兩。滚水泡去鹽）

共研細。每服三錢。不俱酒水。日服三次。渣澄在碗底內者。敷氣頭上。愈後用黃藥子四兩。生酒三大壺。煮三炷香。窨一七。去火毒。早晚任飲數杯酒。完永除根。

妙靈散（朱氏集驗）治瘰癧。

滑石（一兩。用靜者）

右為細末。每服二錢。米飲調下。若有琥珀。研細。濃灯心湯。服之尤佳。良久旋下其物。正如剝皮子蒲萄肉。而瘡盡平復。

單方（朱氏集驗）治瘰癧。破與未破或出血淋漓。其効如神。

牡蛎（煅。八兩） 甘草（二兩）

右二味。匀拌。每服二錢。食後以建茗同點。日二服。忌魚酒。酢醬鹽梅味等。此病多有人父子相傳。至死。如服此藥。定並不疼痛。亦無吐痢。

必効散（精義）治久患瘰癧不較。服此藥取効如神。

南鵬（二錢五分） 輕粉（一錢） 麝香（五分） 斑猫（四十箇。去頭翅）

巴豆（五箇） 白檳榔（一箇）

右同匀。極細。取鷄子清二箇。去黃。調藥匀。却傾在鷄子殼內。濕紙數重糊定。無令透氣。坐飯甑內。與飯一處蒸。

飯熟取藥曝乾。研極細末。用時相度虛實。並用炒生姜酒下。五更初服藥。至平明取下惡物。

流注（附痞癖）

調和榮衛湯（正宗）治流注初起。漫腫無頭。結聚不散。

川芎　當歸　陳皮　獨活（各一錢）　芍藥
白芷　烏藥　茴香　黄芪（各八分）　甘草
紅花（叁分）

水二鍾。入酒一杯煎服。下部加牛膝。

附子八物湯（正宗）治房慾後。陰虛受寒。致生腫塊。又或遍身腿脚疼痛。不能步履。

即十全大補湯。去黄芪。加木香附子。

通經導滯湯（正宗）治婦人產後敗血流注經絡結成腫塊疼痛。

香附　赤芍　川芎　當歸　熟地黃

陳皮　紫蘇　牡丹　紅花　牛膝

枳殼（各一戔）　甘草　獨活（叁分）

水二鍾。煎八分。入酒一小杯。食前服。

調中大成湯（正宗）治流注潰後。膿水清稀。飲食減少。不能生肌。

即十全大補湯。去川芎地黃。加山藥。丹皮。藿香。砂仁。

附子。遠志。陳皮。

黃芪六一湯（正宗）治流注潰後。膿水出多。口乾作渴煩躁不寧。

黃芪（六戔。半生。半蜜水炒。）　甘草（一戔五分。半生半炙。）　人參（一戔）

右水二鍾。煎八分。

散血葛根湯（正宗）治跌撲傷損。瘀血凝滯。結成流注。身發寒熱。

葛根　半夏　川芎　防風　羗活

升麻　桔梗（各八分）　白芷　甘草　細辛

紫蘇　香附　紅花（各五分）

姜葱水煎。

阿魏化痞散　正宗　治痞癖初起腹中覺有小塊舉動牽引作疼。久則漸大成形。甚者翕翕內動。氣血衰弱。

川芎　當歸　白朮　茯苓　紅花

阿魏　鱉甲光（酥炙研各一錢）　大黃（酒炒八錢）　蕎麥麵（一兩微炒）

右共為末每服三錢。空心好酒一茶鍾調稀。三日後腹痛便出膿血為驗。

乳癰

牛蒡子湯　正宗　治乳癰乳疽。結腫疼痛。毋論新久未成膿

陳皮　牛蒡子　山梔　金銀花

甘草　瓜蔞仁　黃芩　天花粉

連翹　角針（各一錢）　柴胡　青皮（各五分）

水二鍾煎八分。入酒一杯。

橘葉散　正宗　治婦人有孕胎熱為內吹。有兒吃乳名外吹致乳結成腫痛。寒熱交作。甚者惡心嘔吐。

柴胡　陳皮　川芎　山梔　青皮

石膏　黃芩　連翹（各一錢）　甘草（五分）　橘葉（二十個）

右水煎服。

消癰散毒湯（玉案）治乳癰惡寒發熱。焮腫疼痛。服此立消。

青皮　貝母　天花粉（各一錢）　蒲公英（一握。搗汁）

連翹　鹿角屑　當歸（各一錢五分）

水酒各一鍾煎服。

治乳癰未潰方。（新効方）

青皮　栝樓　桃仁　連翹　川芎

橘葉　皂角刺　甘草（各等分）

右水煎。○王機。名連翹飲子。

治乳癰已潰方。（新効方）

人參　黃芪　川芎　當歸　芍藥

瓜蔞　甘草　青皮　連翹

右水煎服。

治婦人乳汁不行。乳房腫痛者。（本草彙言）

穿山甲（六錢）　王不留行（九錢）　乳香　沒藥

麻黃　天花粉（各四錢五分）　蒲公英（一兩二錢）

分作三劑服。

鹿角散（正宗）治乳癰新起結腫疼痛增寒發熱但未成俱效。

鹿角尖三寸用炭火內煆稍紅存性碾末每服三錢食後熱酒一茶鍾調服甚者再服必消。

神效瓜蔞散（精要）治婦人乳疽嬭勞神效無比万不失一

黃瓜蔞（一箇去皮焙為末）　甘草（半兩）　當歸（半兩）　沒藥（別研）
乳香（各一分別研）

右用無灰酒三升同於銀石器中熳火熬取一升清汁分為三次食後服如毒氣已成能化膿為黃水毒未成即內消。

治乳巖（公選良方）此病先因乳中一粒大如豆漸漸大如雞蛋七八年後方破爛一破則不可治矣宜急服此藥

生蟹殼數十枚於沙鍋內焙焦為末每服二錢好酒調下須日日服不可間斷。

露蜂房散（聖惠）治吹嬭疼痛不止或時寒熱

露蜂房　鹿角（各一兩）

右燒為灰細研以熱酒調下二錢。

囊癰　懸癰　臀癰　鸛口疽

清肝滲濕湯（正宗）治囊癰肝經濕熱結腫發熱焮痛。

川芎　當歸　芍藥　生地黃　柴胡

龍胆　山梔　花粉　黃芩（各一錢）　澤瀉

木通　甘草（各五分）

燈心二十根。水煎服。

滋陰內托散（正宗）治囊癰已成腫痛發熱。服之有膿即可穿潰。

當歸　川芎　芍藥　熟地黃　黃芪（各一錢半）

皂針　澤瀉　山甲（各五分）

水煎服。

滋陰八物湯（正宗）治懸癰初起。狀如蓮子。紅赤漸腫。悠悠作腫。

川芎　當歸　赤芍　生地黃　丹皮

花粉　甘草（各一分）　澤瀉（五分）　大黃（便祕加一分）

燈心二十根。水煎服。

還元保真湯（正宗）治懸癰已潰。瘡口開張。膿水淋漓。不能收斂者。

十全大補湯。加丹皮。枸杞子。澤瀉。熟附。

滋陰九寶飲（正宗）治懸癰。厚味膏粱蘊熱結腫。小水澁滯大便祕結。內熱口乾。煩渴飲冷。六脈沉實有力。

四物湯。加知母。黃連。大黃。天花粉。

活血散瘀湯（正宗）治臀癰初起。紅赤腫痛。墜重如石。大便祕澁。

川芎　當歸　防風　芍藥。　蘇木

連翹　花粉　皂針　紅花　黃芩

枳殼（各一分）　大黃（二分）

右水煎服。便通者。去大黄。加乳香。

黄芪内托散（正宗）治懸癰已成。服前藥勢定者。欲其潰膿宜服。

黄芪（二分）　當歸　川芎　金銀花　皂針

穿山甲　甘草（各一分）

水二鍾。煎八分。入酒一杯服。

滋陰除濕湯（正宗）治鸛口疽。發在尾閭之穴高骨頭尖。初起形似魚肫。朝寒暮熱。日輕夜重。如瘧。

柴物湯。去半夏。人參。加陳皮。知母。貝母。澤瀉。地骨皮。

和氣養榮湯（正宗）治前證已成。突如鸛嘴。不得内消。

十全大補湯。去肉桂。川芎。芍藥。加陳皮。丹皮。沈香。

滋腎保命湯（正宗）治前證元氣虚弱。膿水淋漓。久而不斂。

十全大補湯。去川芎芍藥。加杜仲。山茱。丹皮。熟附。

解毒排膿散（脩月魯般經）

連翹　川芎　柴胡　黄芩　青皮

忍冬　牛蒡子　黄芪　當歸。　大黄

皂角刺

右水煎。

炙粉草膏（正宗）治懸癰。已成者即潰。未成者即消。既潰者即飲。此治懸癰良藥也。

大粉草（四兩）

用長流水浸透。炭火上炙乾。再浸再炙。如此三度。切片。甘草三兩。當歸三兩。水三碗。漫火煎至稠膏。去渣再煎稠。厚為度。每用三錢。無灰好熱酒一大杯化膏。空心服之最妙。○精要及本綱引李迅癰疽方。並不用當歸。

下疳便毒黴瘡結毒

龍膽瀉肝湯（正宗）治肝經濕熱。玉莖患瘡。或便毒懸癰。小便赤澁。或久潰爛不愈。又治陰囊腫痛紅熱。

囘春本方。（見小便門）加連翹。黃連。大黃。

山甲內消散（正宗）治魚口便毒。騎馬癰。橫痃未成膿者。

當歸　甘草　大黃（各三錢）　穿山甲（三大片）

姜蚕　黑牽（各一錢）　土木鱉（三箇）

水酒各半煎服。大便行三四次。方吃稀粥淡味飲食為妙。

紅花散瘀湯（正宗）治入房忍精強固不泄。以致瘀精濁血。凝結兩胯。或小腹之傍。結成腫痛。小水澁滯者。

當歸　皂針　紅花　蘇木　姜蚕

連翹　石决明　穿山甲　乳香　貝母（各一錢）

大黃（三錢）　牽牛（二錢）

水酒各半煎。

黃芪內托散（正宗）治魚口便毒。橫痃已成。不得內消者。

川芎　當歸　黃芪（各二錢）　白朮　金銀花

天花粉　皂角針（各一錢）　甘草　澤瀉（各五分）

右水煎服。

升麻解毒湯（正宗）治楊梅瘡。筋骨疼痛。久而不愈。及治遠年近日。流注結毒。皮肉破爛。咽喉損破。

升麻　皂針（各四錢）　土茯苓（一斤）

頭之以上。加白芷。咽內。加桔梗。胸腹。加芍藥。肩背。加羌活。下部。加牛膝。各一錢。用水八碗。煎至四碗。作四次。一日服盡。每次頭熱。加麻油三茶匙。和匀。量病上下。食前後服之。

歸靈湯（正宗）治楊梅瘡。不問新久。元氣虛弱者。

川芎　當歸　芍藥　熟地黃、米仁

木瓜　防己　花粉　銀花　鮮皮

人參　白朮（各一分）　甘草（五分）　威靈仙（二分）　牛膝（下部加各五分）

土茯苓（二兩）

水三鍾煎二鍾。二次量病上下。食前後服之。渣再煎八分服。

十全大補加附子湯（薛氏）治便毒膿水清稀。瘡証悉至。脈洪大而虛。

消疳敗毒散（摘要）專治下疳瘡。

防風　獨活　荊芥　連翹　黃連

蒼朮　知母（各七分）　黃栢　芍藥　茯苓

龍胆　木通（各九分）　柴胡（一分半）　甘草（二分）

右燈心二十四寸。水煎服。若有便毒。量人虛實加大黃一二分。

茯苓湯（回春）治楊梅瘡。

土茯苓（四兩搗碎）。　桔梗　防風（各一兩）　乳香

沒藥（各五分）

水五碗。煎至三碗。溫服。一日服盡。

萆薢湯（發揮）治楊梅瘡。不問新舊。潰爛。或筋骨作痛。
川萆薢（俗呼土茯苓。每用一兩）
以水三鍾。煎二鍾。去柤。不拘時。徐徐温服。若患久或服攻擊之劑。致傷脾胃氣血等症者。以此一味為主而加以兼症之劑。有熱加芩連。氣虛參芪。血虛四物之類。

搜風解毒湯（本綱）治楊梅瘡。不犯輕粉。病深者月餘。淺者半月即愈。服輕粉藥。筋骨攣痛。癱瘓不能動履者。服之亦效。
土茯苓（一兩）　苡仁　銀花　防風　木瓜
木通　白鮮皮（各五分）　皂莢子（四分）
水二大盞。煎飲。一日三服。氣虛加人參七分。血虛加當歸七分。○外科纂要。引得効良方。治男婦一切下疳瘡疳。蝕疳。內疳。外疳。爛疳。無有不効。下疳日久不愈。必生楊梅瘡。此方預服。可使不起。已發可使速愈。雖是結毒並歷神効。誠濟世之良方也。樞要去防風。加當歸白芷甘草。用皂角刺。名換肌消毒散。治時瘡。不拘初起潰爛
○入門名仙遺粮湯。

蠲痺消毒散（樞要）治時瘡肢節筋攣。

姜黃　土茯苓　獨活（各五夂）　白朮

○當歸（各一夂五分）　芍藥（一夂）　白芷（五分）

右水煎服。

紫草飲（壽世仙丹）治楊梅如神。

紫草　金銀花　白鮮皮　薏苡（各三兩）

山慈姑（一兩八夂）　白蒺藜（二兩半）　土茯苓（四兩）

右水煎服。痛。加乳香沒藥。

一方（壽世仙丹）治便毒。

川山甲　黃芪　苦參　皂角針

乳香　沒藥　當歸　桔梗　麻黃

梔子　連翹　芍藥　甘草（各一夂）

先一服。加大黃一兩。水二碗。煎一碗。空心服。渣再煎服。

二服不用大黃。即全消屢效。

二連湯（纂要）治楊梅瘡。生于頭面。

胡連　川連　牛膝　薏苡　川芎（各六合）

土茯苓（四兩）

水六碗。煎三碗。頻頻服。三劑効。㊀啓玄云。治楊梅瘡如神。秘之。秘之。

治楊梅瘡良方（壽世）胡雲卿傳。

當歸（一兩三分）　牛膝　黃芩　○大黃（三）　金銀花（各一兩三分）

木瓜（一兩）　皂角刺（八分）　蟬退（五分）　土茯苓（二斤）

葱白三根。水煎服。

龍胆瀉毒湯（玉案）治一切下疳。

柴胡　龍胆　山梔（各一分）　大黃　黃連

滑石　木通（各一分五分）　甘草（五分）

加燈心三十莖。煎服。

治楊梅惡瘡。毒氣不起。瘡脚冷停。不攻發者。（本草彙言）

麻黃（一兩）　蟬蛻　姜蚕　肉桂　當歸

皂角刺　白芷　紅花（各五分）

羊肉湯煎服。

雙解散（直指）治便毒內蘊熱氣。外挾寒邪。精血交滯。腫結疼痛。

辣桂　大黃　芍藥　澤瀉　牽牛

桃仁（各一分）　甘草（半分）

右為麁末。生姜五片。水煎服。小便出後。大便利。皆是毒。○纂要名通眞散。

十服神效湯（瘍醫大全）楊梅結毒流注。筋骨疼痛。不論已未破爛神效。

升麻　皂角刺（各两）　土茯苓（一觔）　頭項加白芷。胸中喉面加桔梗。　胸前加白芍。　肩背加羌活。　下部加牛膝（俱只加一匁）

共一劑。水八碗。煎四碗。臨服入蔴油三匙。一日服一劑

十劑全愈。此神方也。

治關節四肢筋骨攣痛。舉動不便。或楊梅瘡毒筋骨疼痛。（彙言）

薔薇根（一两）　五加皮　木瓜　當歸　土奇良（各五匁）

每日水五碗。煎二碗。徐徐服。日用一劑。

小柴胡湯加草龍胆胡黃連（丹溪）治舊下疳瘡。忽頭疼發熱自汗。

九龍丹（正宗）治魚口便毒。騎馬癰。横痃。初起未成膿者服之。

兒茶　血竭　乳香　沒藥。　巴豆（不去油）

木香

右各等分為末。生蜜調成一塊。磁盒盛之。臨時旋丸安

豆大每服九丸空心熱酒一杯送下行四五次方吃稀粥腫甚者間日再用一服自消

五寶散（正宗）治結毒筋骨疼痛腐爛口鼻諸藥不効者服之

滴乳石（如乳頭下垂敲破易碎亮似蜻蜓翅者方真四分）　琥珀（二分）

硃砂（二分）　珍珠（三分）　水片（一分）

右各研極細對準共為一處再研數百轉磁罐密收用藥二錢加飛羅麪八分再研和匀每用土茯苓一斤水八碗煎至五碗濾清作五次每次加五寶散一分和匀量病上下服一日服完十服自愈如鼻子腐爛每日土茯苓內加辛夷三錢忌食海腥煎炒房事等件◎纂要名五寶遇仙丹

結毒紫金丹（正宗）治遠年近日楊梅結毒筋骨疼痛日久腐爛臭敗不堪聞或咽喉脣鼻破壞諸藥不効者妙

龜板（放炭火上炙焦用新安酒漿濃筆蘸漿塗上反復炙塗三次以焦黄為末二兩）

石决明（用九孔大者煅紅童便內漬之一次）　硃砂（明亮者各末六分）

共再碾極細爛米飯為丸麻子大每一分筋骨疼痛酒下腐爛者土茯苓湯下至重者四十日而愈力勝於五

寶散。

鉛囬散（正宗）治楊梅結毒。筋骨疼痛。朝輕夜重。喜熱手按揉者。

用鉛半斤。銅杓内化開。傾入水内。將鉛取起。再化再傾。如此百遍。鉛盡為度。候半日。待水澄清。傾去。用鉢底内沈下鉛灰。傾在三重紙上。下用灰收乾水氣。取起。晒乾。與硫黄等分。研細。礶收。每服一錢。温酒調服至重者。不過三次即効。

硫黄不二散（大全）楊梅結毒。發於咽内。腐爛疼痛。湯水難入者。

硫黄（一分）　靛花（一分）

共乳細。凉水二酒杯調服。其痛即止。可進飲食。

姚次先方。治廣瘡結毒。爛壞鼻梁。及陰蝕陽物。（彙言）

鍾乳石（一兩）　乳香　沒藥（瓦上焙出油）　象牙末（各五分）

蛀竹屑（八分）　枯白礬（二分）

倶為細末。白蠟用鐵刀輕輕刮下浮衣。四錢。總和勻。每早晩各二錢。土茯苓煎湯調下。

解毒至寶丹（錦囊）治楊梅瘡結毒。一切熱毒。久患骨蒸熱。

毒流注六脈俱數用之清熱毒神效。

人參三七（微火焙二分）　滑石（三分）　珍珠（生用）　琥珀（各四分）

甘草（一分）

各研極細和勻。每服二分。加至三四分。人小者一（分加）至二分。萆薢三錢。煎湯調服。

疥癬　丹毒　天泡

當歸飲子（濟生）治血燥皮膚作痒。及風熱瘡疥瘙痒。

當歸　川芎　芍藥　生地黃　防風

蒺藜　荊芥　何首烏（各一分）　黃芪　甘草（各五分）

右生姜五片。水煎服。

消風散（正宗）治風濕浸淫血脈。致生瘡疥搔痒不絕。及大人小兒風熱癮疹。遍身雲片斑點。乍有乍無。並效。

當歸　生地　防風　蟬脫　知母

苦參　胡麻　荊芥　蒼朮　牛旁子

石膏（各一錢） 甘草 木通（各五分）

右水煎服。

化斑解毒湯（正宗）治三焦風熱上攻。致生火丹。延及遍身痒痛。

玄參 知母 石膏 人中黄

黄連 升麻 連翹 牛蒡子（各等分）

甘草（五分）

竹葉二十片水煎服。

解毒瀉心湯（正宗）治心經火旺。酷暑時臨。致天泡發及遍身。

黄連 防風 荊芥 山梔 黄芩

牛蒡子 滑石 玄參 知母 石膏（各一錢）

甘草 木通（各五分）

燈心二十根。水煎服。

羚羊角散（正宗）治葡萄疫。其患多生小兒。感受四時不正之氣。鬱於皮膚不散。結成大小青紫斑點。色若葡萄。發在徧體。邪毒傳胃。牙根出血。初起宜服之

羚羊角 防風 麥冬 玄參 知母

黄芩　牛子（各八分）　甘草（二分）

竹葉十片水煎服。

胃脾湯（正宗）治葡萄疫久則宜滋益其内。

白术　茯神　陳皮　遠志　麥冬

沙參（各六分）　五味子　甘草（各五分）

水煎服。虚弱者。去沙參。加人參。黄芪各五分。

升麻和氣飲（局方）治瘡疥發於四肢。增寒發熱。浸淫浮腫。

五積散。無川芎。肉桂。麻黄。厚朴。有升麻。葛根。大黄。

郭氏升麻牛旁子散（準繩）治時毒瘡疹。脈浮洪。瘡發於頭

面胸膈。

升麻　牛旁子　甘草　桔梗　葛根

玄參　麻黄（各一分）　連翹（二分）

右生姜三片。水煎。

浮萍散（回春）治諸風癬疥癩瘡。

浮萍　當歸　川芎　荊芥

麻黄　甘草（各二分）　芍藥

葱白二根。水煎熱服出汗。

平血飲（澹寮方）治遍身生瘡。膿血瘙腫。極痛且痒。

即升麻葛根湯（四味等分）

右水煎如對症及藥材得真則功在和氣飲之上

治斑疹時毒及痄腮腫痛（彙言）

牛蒡子　柴胡　連翹　貝母

荊芥（各二匁）

水煎服

頑癬浮萍丸（正宗）

紫背浮萍　蒼朮　蒼耳草（各二兩）　苦參（四兩）

黃芩　姜蚕（各一兩）　鈎藤（一兩五匁）　豨薟草（二兩酒蒸）

共為末酒糊丸白滾湯每服二錢隨病上下服

烏龍丸（精義）治遍身風瘡瘙痒疥癬等疾服之消風散熱利膈化痰唾治肺氣此藥推陳致新去腸垢

皂角（肥者不以多少炙刮去皮弦搥碎甜水揉取濃汁去柤銀石器內熬成膏另放）

黑牽牛（不以多少微炒令香熟碾取頭末）

右將藥末與皂角膏和丸如梧桐子大每服三五十丸氣虛者一二十丸食後溫水送下利三五行不傷正氣

跌撲　金瘡

大成湯（正宗）治跌撲傷損或從高墜下以致瘀血流入臟府昏沉不醒大小便祕

陳皮　當歸　蘇木　木通　紅花

厚朴　甘草（各一錢）　枳殼（一錢）　大黃（三錢）　朴消（二錢）

右水煎服入蜜三匙亦妙

獨參湯（正宗）治跌撲傷損金瘡出血過多昏沉不醒

膠艾湯（千金）主男子絕傷或從高墮下徵者唾血甚者吐血及金瘡經內絕（方出姙娠門）

當歸鬚散（入門）治打撲以致氣凝血結胸腹脇痛或寒熱

如挫閃傷血不順

當歸（一錢半） 紅花（八分） 桃仁（七分） 甘草（五分） 芍藥

烏藥 香附 蘇木（各一錢） 官桂（六分）

水酒各半煎

治馬墜及一切筋骨損（肘後）

大黃（一兩） 亂髮灰（如雞子大） 桃仁（四十九枚）

右以童子小便量多少煎湯成內酒一大盞分溫三服

○聖惠名大黃散

治亂打血攻心（醫法指南）

大黃 當歸 蘇木 紅花（各三錢）

酒水各半煎服

花蘂石散（局方）治一切金瘡打撲傷損猫狗咬傷急於傷處摻藥如內損血入藏府煎童子小便入酒少許調一大錢服之立效又治產後血運惡血奔心胎死腹中胞衣不下至死

硫黃（上色明淨者擣為麁末四兩） 花蘂石（擣為麁末一兩）

右二味令勻內瓦罐子容泥封口乾了用炭一秤籠疊

周匝自巳午時從下生火令漸漸上徹直至經宿火冷炭消盡又放經宿罐冷定取出細研以絹蘿子篩至細蕘令內盛依前法使用

內托黃芪圓（得効）治針灸傷經絡膿流不止

黃芪（八兩） 當歸（三兩） 肉桂 木香 乳香 沉香（各乙兩）

右爲末用菉豆粉四兩姜汁煮糊圓梧桐子大每服五十元不拘時候熱水下

預血散（本朝經驗）治一切打撲傷損及產後血運

當歸 川芎 芍藥 蒲黃 澤瀉 枳殼 人參 大黃 沉香 茯苓（各一分） 接骨木（五分） 甘草（五分）

右剉細每服二分盛小麻布袋擺沸湯中服一方有白檀地黃白芷名川芎散

治打撲傷金瘡悶絶（得効）

右蒲黃不以多少爲末熱酒灌下

治從高墮下崩中（千金）

當歸 大黃（各等分）

右治下篩酒服方寸匕日三〇聖惠名導滯散治重物壓迮或從高墜下作熱吐血下血血出不能禁止或瘀血在內胸腹脹滿喘麄氣短兼能打去瘀血〇三因去當歸加杏仁名鷄鳴散治金刃傷打撲傷血瘀凝積煩悶欲絕右剉酒煎服◎施圓端効方加射香少許名大活血湯治打撲損傷內壅欲死

治破血在心腹（經驗良方）

蘇木（半兩）　乳香　沒藥（各一分）　生姜（一塊長約二寸）

右擣破用瓦器以濕紙遮口不與走氣好酒慢火溫時服一盞

林氏祖方治跌撲打傷或從高失脚下墜內傷瘀血者用苧根或苧麻燒灰五錢或一兩熱湯或酒調服瘀血立散

沒藥散聖惠治馬墜撲損內有敗血疞刺疼痛不可忍

沒藥（研）　麒麟竭（末）　黃丹（微炒）　白礬（燒灰各一分）

右為散不計時候以溫酒下

湯潑火燒

四順清凉飲（正宗）治湯潑火燒。勢極逼毒入裏。或外被凉水所汲。火毒內攻。致生煩躁。內熱口乾。大便祕實。

連翹　芍藥　羌活　防風　當歸

山梔　甘草（各一錢）大黃（炒二錢）

燈心二十根。水煎服。

玄妙飲（玉案）治湯火所傷。先服恐火毒攻心。

黃連　花粉　玄參（各二錢）陳皮　桔梗

山梔（各一錢五分）

竹葉升片。煎服。

逐火丹（石室）

大黄（五兩） 當歸（四兩） 荊芥（三錢黑炒）。 甘草（五錢） 黄芩（三錢）

防風（三錢） 黄芪（三兩） 茯苓（三兩）

右水煎服

蜀漆湯（千金）

蜀漆 甘草 知母 龍骨 牡蠣

右水煎。此方原治小兒潮熱。今用之火邪有熱候者。頗效。

清涼散（奇方類編）耑治湯泡火燒。敷之止疼立愈。

大麥。淨砂鍋內炒。至漆黑爲度。取出。以紙鋪地上。出火氣。研細末。爛者。乾搽。未破者。以香桐油調搽。

治湯火傷（暴症知要）

雞黄油 如法取傅。

法用雞子。不拘多少。煮熟。去白留黄。入銅杓內。每十箇。加菜油一小酒盞。煎枯去查。出火氣。用傅甚佳。黙齋陳君。每用藥油救人。隨手愈。似即此也。

觀聚方要補卷八