觀聚方　九

松
科別
K 62-1
F 8
カ-96

觀聚方要補卷九目録

婦人產前

芎歸膠艾湯　鈎藤湯
半夏茯苓湯　治惡阻方
柴胡散　人參散
四七湯　六君子湯加旋覆花赤石脂
六物湯　鄭氏人參散
人參散　柴胡散
柴胡散　人參飲子

490.9
Ka-20
8
慶應義塾大学医学情報センター
47年7月4日
富士川文庫
H 2570
K 62-1
1518

芎蘇散　阿膠散
澤瀉散　防己散
木通散　馬兜鈴散
地膚大黃湯　冬葵子湯
冬葵散　附子湯
半夏湯　紫蘇飲
羚羊角散　芩連四物湯
二合湯　馬通湯
蟹爪湯　當歸飲

竹葉湯　治過月不產方
佛手散　黑神散
達生飲　當歸散
白朮散　刪繁黃耆散
枳實檳榔丸　千金保孕丸
乾薑人參半夏丸　當歸芍藥散
葵子茯苓散　療諸痙子癇方
子癇昏冒方　龍骨散
摟灰散　烏賊骨散

奪命圓

産育

牛膝湯
治横倒生方
半夏湯
加味芎歸湯
脱花煎
免血暈方
又方
治諸産難方
加味芎歸湯
治胞衣不下方
奪生丹
催生如意散
催生如聖散
救産難方
下死胎方
備急圓
養正丹

産後

大黄湯
療惡露不多下方
桃仁散
芎歸湯加芍藥
蒲黄散
生化湯
治惡血不除方
救氣脱昏暈方
六味回陽飲
犀角地黄湯
漢防己散
當歸芍藥湯

桂心湯　人參當歸散
三之一湯　大承氣湯
蜀椒湯　桃仁芍藥湯
内補當歸建中湯　調中湯
治石瘕方　治身痛方
柴胡破瘀湯　小柴胡湯
竹葉湯　療風虛方
白頭翁加甘草阿膠湯
膠蠟湯　當歸湯
安心湯　桂心散
參蘇飲　二母散
八味地黃湯　竹葉湯
療大渴方　熟地黃湯
虛渴方　桑螵蛸湯
玉龍湯　當歸黃耆飲
囬乳四物湯　四順理中圓
麒麟竭散　芎藭散
黑神散　失笑散

大調經散　延胡索散
博濟蓬莪朮散　紫金丹
赤馬通散　清魄散
牡丹散　烏金散
血暈方　二神散
崩中方　愈風散
牛膏湯　正脾散
小調經散　琥珀散
麒麟血散　七珍散

胡氏孤鳳散　桃花散
治乳汁不行方　湧泉散
治汗不止方

婦人衆疾

温經湯　大黄甘遂湯
抵當湯　小建中湯
甘草小麥大棗湯　四物湯
逍遙散　竹茹湯
如聖散　乞力伽散

桂枝桃仁湯　玄胡索湯
玄胡苦楝湯　丁香膠艾湯
加味烏沈湯　栢黃散
桂附湯　十棗湯
四物湯加呉茱萸　調氣養血湯
黃連解毒湯　涼膈散
温經湯　柴胡散
滋血湯　增損四物湯
芎藭散　十味養榮湯

治熱入血室方　治癥瘕方
當歸白朮湯　治淋疾方
逐瘀飲　礬石丸
腎氣丸　紅藍花酒
大黃圓　蒲黃散
牛膝散　治血分方
熟附圓　治赤白帶下方
治血崩方　備金散
苦楝丸　龜栢薑梔丸

阿膠散　紅花散
内補當歸建中湯　治崩中方
和血通經湯　白芍藥散
四神散　治經血周歲不行方
當歸散　通膈散
琥珀散　瑞金散
治經來則小腹痛方　治血瘕疼痛方
走馬散　血極膏
治血塊方　烏金丸　橘歸丸

觀聚方要補卷九

東都　丹波元簡廉夫　輯

婦人産前

芎歸膠艾湯（金匱）有妊娠下血者。假令妊娠腹中痛。爲胞阻。

芎藭　阿膠　甘草（各二兩）　艾葉　當歸（各三兩）

芍藥　乾地黄（各四兩）

右以水五升。清酒三升。合煮取三升。去滓。内膠令消盡。温服一升。日三服。◯小品療妊娠重下痛引腰背安胎

止痛方無芎藭甘草艾葉有黃連雞子秫米集驗用本方治頓仆失跌胎動不安腹痛聖濟無芎藭名熟乾地黃湯治妊娠胎萎燥過時未產三因有黃芪一兩胡氏有乾姜一兩奇效加黃芩名四物湯治有熱久患血崩

釣藤湯（聖濟）治妊娠八九月胎動不安心腹疞痛面目青冷汗出氣欲絕（此）由勞動用力傷胎宮宜治之

釣藤　當歸　茯神　人參（各一兩）

苦梗（一兩半）　桑寄生（一兩）

右水煎服○良方云煩熱加石膏二兩半臨產月加桂心一兩金鑑云孕婦忽然顛仆抽搐不省人事謂之子癇用此湯

半夏茯苓湯（千金）治妊娠阻病心中憒悶吐逆惡聞食臭頭眩體重四肢百節疼煩沈重多臥少起惡寒汗出疲極黃瘦

半夏　生姜（各三十銖）　乾地黃　茯苓（各十八銖）

橘皮　細辛　旋復花　人參

芍藥　芎藭　桔梗　甘草（各十二銖）

右水煎服。

治妊娠惡阻。嘔吐不下食。千金

竹茹　橘皮（各十八銖）　茯苓　生姜（各一兩）

半夏（三十銖）

右水煎服。○良方。去竹茹。加砂仁。甘草。烏梅。名半夏茯苓湯。

柴胡散　聖惠　治妊娠心煩。頭目昏重。心胸煩悶。不思飲食。嘔吐。

柴胡（一兩半）○　茯苓　麥門（各一兩）　枇杷葉　人參

橘紅　甘草（各半兩）

右生姜水煎。

人參湯　聖濟　治妊娠嘔逆不下食。和胃氣。利胸膈。

人參　山芋　茯苓　陳粳米（各一兩）

半夏（半兩）

生姜五片。棗三枚。水煎。

四七湯　易簡　婦人惡阻。尤宜服之。

即半夏厚朴湯（方見咽喉門）

六君子湯加旋覆花煎。調赤石脂末（寓意草）　治妊婦病膈飲

粒全不入口。痰沫上湧。

六物湯（楊氏）安胎下氣。治胎動不安。腰腹疼重。惡露頻下。

阿膠　糯米　黃芪　川芎　當歸

熟地黃（各等分）

姜葱水煎。

鄭氏人參散（永類）治漏胎敗血湊心。日漸胎干。子母危困。

人參　黃芪　阿膠　竹茹　木香

甘草　附子（各半分）　川芎　陳皮（各一分）　苧根（一片）

生姜（三片煨）。糯米（三七粒）

右水煎。

人參散（聖惠）治妊娠熱氣。乘於心脾。津液枯少。煩躁口舌乾渴。

人參　麥門　茯苓　地骨皮　葛根

黃芩　犀角屑（各三分）　甘草（半兩）

右水煎服。

柴胡散（聖惠）治妊娠傷寒。微嘔。心下支滿。外証未去。

柴胡（一兩）　黃芩　人參　芍藥　甘草

犀角屑　半夏　麥門（各半兩）

右棗姜水煎。

柴胡散 聖惠 治妊娠傷寒、壯熱心煩。

柴胡 黃芩 石膏 阿膠 麥門（各二兩）

甘草（半兩）

右生姜水煎。

人參飲子 聖惠 治妊娠熱病。嘔吐不食心煩。

人參 竹茹 葛根（各一兩） 蘆根（二兩） 麥門（兩半）

知母（三分）

右水煎服。

紫蘇散 濟生 治妊娠外感風寒、渾身壯熱、心胸煩悶。

紫蘇 川芎 芍藥 白朮 麥冬

陳皮 葛根（各一兩） 甘草（炙半兩）

右姜蔥水煎。

阿膠散 聖惠 治妊娠瘧疾。胎不安穩。腰臍下重。

阿膠（兩半） 芍藥 當歸 柴胡 黃芩

茯苓 白朮（各一兩） 麥冬 甘草（半兩）

右水煎服。

澤瀉散 聖惠 治妊娠氣壅。身體腹脇浮腫。喘息促。大便難。

澤瀉　桑白皮　木通　枳殼　茯苓
檳榔（各一兩）
右生姜水煎。○聖惠又去檳榔。加商陸。冬葵根。名桑白皮散。亦治妊娠四肢腫滿。小便不利。時時喘息。○醫統云。妊婦喘急脹滿。小水不利。謂之子滿。宜此方。

防己散聖惠治妊娠通身浮腫。喘息。小便澁。
防己　大腹皮（各三分）　桑白皮　紫蘇
茯苓（各一兩）　木香（一分）
右生姜水煎。

木通散醫統治妊娠四肢浮腫。或通身面目俱浮。謂之子腫。
白朮　木香　檳榔　紫蘇　枳殼
茯苓（各五分）　木通　黃芩（各八分）
右生姜二片水煎。

馬兜鈴散聖惠治妊娠胎氣壅滯。欬嗽喘急。
馬兜鈴　苦梗　人參　甘草
貝母（各半兩）　陳皮　大腹皮　紫蘇
桑白皮（各一兩）　五味子（七文重）

右生姜水煎。

地膚大黃湯（外臺）療妊娠患子淋。

地膚草　大黃（各三兩）　知母　黃芩　茯苓

芍藥　枳實　升麻　通草　甘草（各二兩）

右水煎服。

冬葵子湯（聖濟）治妊娠大小便不通。

冬葵子（二匁微炒）。大黃（一匁炒）。

右水煎。

冬葵散（壽世）治孕婦轉胞。小便不通。

冬葵子　山梔　滑石（末各半匁）　木通（三匁）

右水煎服。

附子湯（金匱）婦人懷娠六七月。脈弦發熱。其胎愈脹。腹痛惡寒者。少腹如扇。所以然者。子藏開故也。當以此湯溫其藏。

金匱方闕。準繩載少陰篇附子湯。當然。

半夏湯（千金）妊娠九月。若卒得下痢。腹滿懸急。胎上衝心短氣。

半夏　麦門　吳茱萸　當歸

阿膠（各三兩）　乾姜（一兩）

右棗十二枚。白蜜八合。水九升。煮取三升。溫服。

紫蘇飲（本事）治妊娠胎氣不和。懷胎近上。脹滿疼痛。謂之子懸。兼治臨産驚恐氣結。連日不下。

大腹皮　人參　川芎　一　橘皮

芍藥（各半兩）　紫蘇（一兩）　當歸（三分）　甘草（一分）

右生姜四片。蔥白七寸。水煎服。○濟世全書。無人參。有香附。名紫蘇和氣飲。

羚羊角散（濟生）治妊娠中風。頭項強直。筋脈攣急。言語蹇澁。痰涎不利。或搦搐不省人事。名曰子癇。

羚羊角　獨活　酸棗　五加皮（各半錢）

薏苡　防風　當歸　川芎　茯神

杏仁（各四分）　木香　甘草（各二分半）

右生姜五片。水煎。

芩連四物湯（方考）治子癇陰虛火亢。

四物湯加黃芩。黃連。半夏。（各等分）

生姜水煎。

二合湯（壽世）治妊娠忽然口噤吐沫。不省人事。言語錯亂。

四物湯合二陳湯。加麥門。遠志。石菖。竹茹。

馬通湯（千金）治妊娠卒驚奔走。或從高墮下。暴出血數升。

馬通汁（一升） 乾地黃 阿膠（各四兩） 當歸

艾葉（三兩）

右水煎。臨服內馬通汁。

蟹爪湯（千金）治妊娠僵仆失據。胎動轉上搶心。甚者血從口出。逆不得息。或注下血一斗五升。胎不出。子死則寒熨人腹中。急如產狀。虛乏少氣。困頓欲死。煩悶反覆。

蟹爪（一升） 甘草 桂心（各二尺） 阿膠（二兩）

右水煎服。若口急不能飲者。格口灌之。藥下便活也。與母俱生。若胎已死。獨母活也。若不僵仆。平安妊娠無有所見。下血服此湯即止。

當歸飲（聖濟）治妊娠胎萎燥不長。

當歸（一兩） 芎藭 阿膠（炙各三分） 白朮（二兩）

右水煎。○聖濟又去芎藭。用阿膠一兩半。甘草三分。名阿膠湯。治胎萎燥。全不轉動。

竹葉湯（三因）治子煩。

防風 黃芩 麥門（各三兩） 茯苓（四兩） 竹葉（數片）

右水煎服。○指迷一方。無黄芩有知母。

治婦過月不産方。（寶鑑）

　四物湯。加香附。桃仁。枳殼。縮砂。紫蘇。

　水煎服。即生。

佛手散（本事）治妊娠至五七月。因事築磕著胎。或子死腹中。惡露下。疼痛不已。口噤欲絶。此藥探之。若不損則痛止。子母倶安。若胎損。立便逐下。此藥催生神妙。

　當歸（六兩）　川芎（四兩）

右水酒煎服。口噤灌之。如人行五七里再進。不過三二服便生。○局方。名芎歸湯。治産後去血過多。運悶不省。○

案此方。本出千金方第四卷。

黒神散（良方）治胎死腹中。緣兒死身冷。不能自出。服之暖其胎。須臾胎即自出。

　本方。有附子。無蒲黄。（方見産後門）

達生飲（丹溪）難産死胎。此血氣滯病也。至五六箇月來。服數十貼。甚好。易産。腹少痛。

　大腹皮（三錢）　人參　陳皮　紫蘇（各五分）

　當歸　芍藥　白朮（各一錢）　甘草（二錢）

黄楊樹腦（七箇）

右水煎服。○又名束胎散。

當歸散（金匱）婦人妊娠宜常服。

當歸　黄芩　芍藥　芎藭（各一斤）

白朮（半斤）

右為散。酒飲服方寸匕。日再服。○金鑑云。妊娠無病。不須服藥。若其人瘦而有熱。宜服。

白朮散（金匱）妊娠養胎。

白朮　芎藭（各四分）　蜀椒（三分）　牡蠣（二分）

右為散。酒服一錢匕。日三夜一。○金鑑云。婦人肥白有寒。恐其傷胎。宜常服。此良方。加當歸。地黄。阿膠。名白朮圓。治妊娠宿有風冷。胎痿不長。或失於將理。傷動胎氣。多致損墮。妊娠常服。益血保護胎藏。

刪繁黄芪散（外臺）療婦人懷胎。數落而不結實。或寒冷熱百病之源。

黄芪　吳茱萸　干姜　人參　甘草

芎藭　白朮　當歸　乾地黄（各二兩）

右為散。清酒服一匕半。日二。加至兩匕。○聖惠名熱乾

地黃散治懐胎落而不結實者。此是子宮虛冷所致。

枳實檳榔丸宣明安養胎氣破癥瘕癖塊有似妊孕。

枳實　檳榔　黃連　黃蘗　黃芩

當歸　阿膠　木香（各半兩）

右為末水和丸如小豆大温米飲下三十丸。日三。

千金保孕丸醫鑑治婦人常慣小産久而不育者過七箇月不必服。

當歸　黃芩（各二兩）　熟地黃　陳皮

香附（各一兩）　人參　續斷　杜仲（各半兩）

白朮（四兩）

右細末糯米飯為丸梧子大每服七十丸。白湯下○幼幼集成無香附。陳皮。人參。名三合保胎丸製法甚精云方至神至聖幸勿輕視。

乾姜人參半夏丸金匱治妊娠嘔吐不止。

乾姜　人參（各一兩）　半夏（二兩）

右末之。以生姜汁糊為丸。如梧子大。飲服十丸。日三。

當歸芍藥散金匱治婦人懐妊。腹中疞痛。

當歸　芍藥（各一斤）　茯苓　白朮（各四兩）

澤瀉　芎藭（各半斤）

右為散。取方寸匕。酒和。日三服。

葵子茯苓散（金匱）治妊娠有水氣。身重。小便不利。洒淅惡寒。起即頭眩。

葵子（一斤）　茯苓（三兩）

右為散。飲服方寸匕。日三服。小便利則愈。○古今錄驗。去茯苓加滑石。水煎。名葵子湯。

小品。療諸痓子癇。絕起死也。當速辦竹作瀝汁。（外臺）

子癇昏冒（溫隱居方）縮砂。和皮炒黑。熱酒調下二錢。不飲者米飲下。此方安胎止痛。皆效。不可盡述。

龍骨散（聖惠）治因損娠。下惡血不止。

龍骨　當歸　地榆　阿膠

犀角屑（各三分）　艾葉　蒲黃（各半兩）　乾地黃（一兩）

右為散。以粥飲調下二錢。

椶灰散（聖濟）治妊娠胎動。下血不止。臍腹疼痛。

椶櫚皮（燒灰）　原蠶砂（炒各一兩）　阿膠（炙燥三分）

右為散。每服二錢。溫酒調下。不拘時。

烏賊骨散（聖濟）治妊娠胎動不安。下血不止。臍腹疞痛。

烏賊魚骨（去甲一兩）　芍藥　芎藭　龍骨

赤石脂（半錢）

右擣羅為散每服二錢匕米飲或溫酒調下食前

奪命圓（良方）專治婦人小產下血至多子死腹中其人增寒手指唇口爪甲青白面色黃黑或胎上搶心則悶絕欲死冷汗自出喘滿不食或食毒物或誤服草藥傷動胎氣下血不止胎尚未損服之可安已死服之可下

牡丹皮　茯苓　桂心　桃仁

芍藥

右為細末各等分以蜜圓如彈子大每服一圓細嚼淡醋湯送下速進兩圓至胎腐爛腹中危甚者立可取出

（案此即金匱桂枝茯苓丸耳）

産育

牛膝湯（千金）治産兒胞衣不下。令胞爛方。

牛膝　瞿麥（各一兩）　滑石（二兩）　當歸　通草（各一兩半）

葵子（半升）

右水煎服。○得効用赤小豆二合半。○案此方。治産後

水腫甚効。

治横倒生者。或先手足者。（良方）

阿膠　滑石（各一兩）　葵子（二合）

右水煎服。

半夏湯（保命）治胎乾而不能產。

半夏（一兩半） 大黃（五錢） 肉桂（七錢半） 桃仁（三十箇）

右為粗末。先服四物湯一二服。次服此湯。生姜三片。水煎服。

加味芎歸湯（得効）治交骨不開。不能生產。

川芎 當歸（各一兩） 自死龜板（一箇炙） 婦人頭髮（一握燒存性）

右每服五錢。水煎服。約人行五里即生。如胎死亦下。○入門。名龜殼散。壽世名活命芎歸湯。金鑑名開骨散。氣血不足者。加人參服之。

脫花煎（景岳）凡臨盆將產者。宜先服此藥。并治難產經日或死胎不下。俱妙。

當歸（七八錢或一兩）。 肉桂（一二錢或三錢） 川芎 牛膝（各二錢）

車前（錢半）。

水二鍾。煎八分。熱服。或服後飲酒數杯亦妙。○幼幼集成。水煎加酒對服。若胎死不下。及胞衣不來。再加芒硝五錢。氣虛困劇者。加人參二三錢。更加附子一錢。服不下者。此方比平胃散加芒硝（出良方下死胎。）功勝百倍。以其藥味甘溫。不傷元氣故也。

臨蓐之時。用冷水調熟蜜。隨意呷之。免血暈。且滑胎氣（博聞）

（類纂）

常于臨產之時。用參一錢。以助內氣則易產。且後無虛暈虛脫之患。邇因參貴。又常用鹿鞭。切片二錢。水炊爛。入鹽少許。連渣服。功能較勝于參。（女科要訣）

治產難及橫生逆產。或血海乾枯。以致胎死不下。惶惶無措。死在須臾。（幼幼集成）

皮硝（五錢）　熟附子（一錢五分）　好酒　童便（各半杯）

同煎三沸。溫服。立下。百發百中。

加味芎歸湯（幼幼集成）催生及產後。最為穩當。功亦鉅大。

當歸（一兩）　川芎（五錢）　上青桂（二錢）

催生但用此三味。水煎酒對服。立下。預防血暈。以本方加酒炒荊芥二錢。先將此藥煎好。俟胞衣已下。隨即服之。永無血暈之患。效經千百。斷不悞人。○丹溪云。催生只佛手散最穩當。又效捷。

崔氏治胞衣不下。（外臺）

水一升。煮螻蛄一枚。三沸用。

奪命丹（保慶集）治胞衣不下。上衝心胸。疼痛喘急者。

附子（半兩炮）　牡丹皮（一兩）　乾漆（一分碎之炒令煙盡）
右為細末以釅醋一升大黃末一兩同熬成膏和藥圓
如梧子大温酒下五七圓不拘時

催生如意散（良方）臨產腰疼可服之
人參（為末）　乳香（各一分）　辰砂（半分）
右三味一處研臨產之時急用鷄子清一箇調藥末再
生薑自然汁調開冷服如橫生倒生即時端順子母平善

催生如聖散（良方）
黃蜀葵子（小半合一方二分）
重研爛以酒濾去查温服神妙或漏血胎乾難產痛極
者並進三服良久腹中氣寬胎滑即產亦治打撲傷損
如胎死不下煎紅花温酒調下○又用黃蜀葵花

救產難經日不生（良方）
雲母（半兩研細）
温酒調服入口當產不順者即產萬不失一

趙和叔傳下死胎方（良方）
桂心末（二分）　麝香（一箇）
右同研温酒調服須臾如手推下何氏方無麝香每用

桂末二錢。痛陣密時。用温童子小便調下。名觀音救生散。兼治產難。及橫倒生。○今用真麝二分。亦神効。此方原出本事。胎產救急方。名桂香散。濟生名香桂散

備急圓得効治妊婦熱而大便秘。脈實。死胎不知人。温水下七圓即活。

即三物備急圓。

養正丹得効子死腹中。難產。脈微弱昏沉。一二百粒。乳香湯下。即當胎下。人活。（方見中風門）

產後

大黃湯（千金）治產後惡露不盡方。

大黃　當歸　甘草　生姜　牡丹

芍藥（各三兩）　吳茱萸（一升）

右水煎。加人參二兩。名人參大黃湯

廣濟。療產後惡露不多下方。（外臺）

牛膝　大黃（各八分）　牡丹皮　當歸（各六分）

芍藥　蒲黃　桂心（各四分）

右水酒煎服。（原為。散。以生地黃酒服方寸匕。）

桃仁散（聖惠）治產後惡露不下。臍腹氣滯。時攻脇肋疼痛。

桃仁　生地黃　莪朮　檳榔

當歸（各一兩）　牛膝　桂心　牡丹（各三分）

右生姜水煎。

芎歸湯加芍藥（三因）產後或服斷血藥早。致惡血不消。鬱滯作堅。亦成崩中。宜本方大料治之。

蒲黃散（局方）治產後惡露不快。血上搶心。煩悶滿急。昏迷不省。或狂言妄語。氣喘欲絕。

干荷葉（炙）　牡丹皮　延胡索　乾地黃

甘草（各三分）　蒲黃（二兩）

右水煎入蜜少許服。○保命去乾芐。延胡。甘草。加當歸。紅花。名紅花散。治血暈。

生化湯（幼幼集成）此方去舊生新。凡產後無論有病無病。能服數劑。使惡露盡去。新血速生。誠產後之要藥也。

當歸（五錢）　川芎（二錢五分）　桃仁（二十一粒）　黑炮姜（一錢）

炙甘（二錢）

右水煎服。○此原出于景岳。云會稽錢氏世傳。治婦人者。有熟芐。

治產後惡血不除。四體並惡方。（千金）

續骨木二十兩。破如筭子大。以水一斗。煮取三升。分三服。或小便數。或惡血下即瘥。此木得三遍煮。○產書。治產後血運。五心煩熱。氣力欲絕。及寒熱不禁救。

氣脫昏暈。（幼幼集成）氣脫症。產時血既大下。則血去氣亦去。故昏暈不省。微虛者。少刻即甦。大虛者。竭絕即死。但察其面目。如眼閉。口開。手撒。手冷。六脈微細。或浮。此即氣脫症。速用

人參（五七錢至一二兩）

加入炒米。煨薑。紅棗。煎湯徐徐灌之。但得下咽。即可救活。若少遲延。則無及矣。

六味回陽飲（幼幼集成）凡真元已敗。氣血既亡。陰陽將脫。非此莫能挽回。誠回天贊化第一之功。此景岳新方。知者尚少。

本方。加鹿茸數錢。功更捷。（方見虛勞門）

犀角地黃湯（東醫寶鑑）產後氣血散亂。入於諸經。不得還元。故口鼻黑色起。及傳變鼻衄。名曰胃絕肺敗。此症不可治。宜用犀角地黃湯救之。或急用荊芥散。（方見傷寒門）

漢防己散聖惠治產後風虛氣壅上攻頭面浮腫

漢防己　猪苓　枳殼　桑白皮（各一兩）

商陸　甘草（各三分）

生姜半分水煎

當歸芍藥湯千金治產後虛損逆害飲食

當歸（一兩半）　芍藥　人參　桂心　生姜

乾地黃　甘草（各一兩）　大棗（二十枚）

右水煎服○保慶去桂心干节大棗加干姜名增損四物湯治產勞乍寒乍熱

桂心湯聖濟治產後虛熱狀似勞氣瘦瘁無力

桂（一兩）　黃芪（一兩半）　芎藭（一兩）　當歸（二兩）　赤芍（一兩半）

人參（一兩）　附子（半兩）　甘草（一兩）

生姜三片棗一枚水煎

人參當歸散局方治產後去血過多血虛內熱心煩短氣頭疼體痛

乾地黃　人參　當歸　肉桂

麥冬　芍藥（各二兩）　粳米（一合）　竹葉（十片）

大棗（五枚）

右水煎服。

三之一湯（奇効）治產後虛勞發熱。日久不安。

即小柴胡湯合四物湯。○保命名柴胡四物湯。一名三元湯。

大承氣湯（金匱）治產後少腹堅痛。此惡露不盡。不大便。日晡時煩躁讝語。

蜀椒湯（千金）治產後心痛。此大寒冷所為。

蜀椒（二合）　芍藥　當歸　半夏　甘草

桂心　人參　茯苓（各二兩）　蜜（一升）　生姜汁（五合）

右水煎臨服入蜜及姜汁。

桃仁芍藥湯（千金）治產後腹中疾痛。

桃仁（半升）　芍藥　川芎　當歸　干漆

桂心　甘草（各二兩）

右水煎服。○寶鑑去桃仁甘草。加熟地黃莪术。三稜。名增損四物湯。治婦人血積。

內補當歸建中湯（千金）治產後虛羸不足。腹中疞痛。不能飲食。產後一月。日得服四五劑為善。令人力壯。

當歸（四兩）　芍藥（五兩）　甘草（一兩）　生姜（六兩）　桂心（三兩）

大棗（十八枚）

右水煎。內飴糖六兩。崩傷內竭。加地黄六兩。阿膠二兩。

調中湯（局方）治産後虚冷。腹痛作陣。或如錐刀所刺。洞瀉腹鳴。

當歸　肉桂　川芎　芍藥　附子

良姜（各兩）　甘草（半兩）

右水煎服。

一婦産後因子死。經斷不行者半年。一日小腹忽痛。陰戸內有物。硬塞之。而痛不禁。衆醫不識。青林曰。此石瘕也。

用（怪証奇方）

四物加桃仁　大黄　三稜　檳榔

玄胡索　附子　澤瀉　血竭

右爲湯。二劑而愈。

治婦人産後遍身疼。痛。腰背不得轉側。手脚不得動揺。身熱頭痛。若作傷寒醫。遲則變生他病。婦人女子遍身疼痛。身脚不能動。（經驗良方）

牛膝　當歸　白朮　黄芪　肉桂

獨活（各等分）

生姜五片。薤白七寸。水煎。

柴胡破瘀湯（入門）治産後因傷寒。熱入血室。或惡露不下。
即小柴胡湯。去人參。加芍藥。當歸。生地黄。桃仁。五靈脂。

小柴胡湯（金匱）治新産大便堅。嘔不能食。

竹葉湯（金匱）治産後中風。發熱面正赤。喘而頭痛。
竹葉（一把）　葛根（三兩）　防風　桔梗　桂枝
人參　甘草（各一兩）　大棗（十五枚）　生姜（五兩）　附子（一枚炮）。
右以水一斗。煮取二升半。分温三服。温覆使汗出。頸强。用附子一枚。嘔者。加半夏半升。○活人無附子。

經效療産後風虛頭痛。語言時僻方。（産寶）
乾葛　防風　茯苓　麥冬（各八分）　芍藥
黄芩（各六分）　犀角（四分）　甘草（三兩）
右水煎。

白頭翁加甘草阿膠湯（金匱）治産後熱利重下。
白頭翁　甘草　阿膠（各二兩）　秦皮
黄連　蘗皮（各三兩）
右以水七升。煮取二升半。内膠令消盡。分温三服。

膠蠟湯（千金）治產後三日內。下諸雜五色利。

阿膠　黃蘗（各一兩）　蠟（如棊子三箇）　當歸（一兩半）

黃連（二兩）　陳廩米（一升）

右水煎。內膠蠟令烊服。

當歸湯（千金）治產後下利赤白腹痛。

當歸　龍骨（各三兩）　干姜　白朮（各二兩）

芎藭（二兩半）　甘草　白艾　附子（各一兩）

右水煎服。

安心湯（千金）治產後心衝悸不定。恍惚不自知覺。言語錯誤。虛煩短氣。志意不定。此是心虛所致。

遠志　甘草（各二兩）　人參　茯神　當歸

芍藥（各三兩）　麥冬（一升）　大棗（三十枚）

右水煎服。虛煩短氣。加淡竹葉二升。

桂心散（聖惠）治產後血氣上攻於肺虛喘。

桂心　橘皮　人參　當歸（各一兩）　紫蘇子

五味子（各半兩）

右水煎。原方為散。以粥飲調下一錢。

參蘇飲（良方）治婦人產後血入於肺。面黑發喘欲死者。

人參（一兩為末）　蘇木（二兩）

右水兩椀。煮取一椀。去滓。調參末。隨時加減服。神效。○得効。名小參蘇飲。金鑑云。產後氣喘。極危証也。因下血過多。孤陽上越。用參附湯。若因惡露不行。以敗血上攻。面色紫黑。宜奪命散。及此方。

二母散（得効）治產後惡露上攻。流入於肺經欬嗽。宜服。如傷風痰喘。却以尋常傷風藥治之。

知母　貝母　茯苓　人參（各半兩）　桃仁

杏仁（各一分）

右水煎。如覺腹痛。併服之。立有神效。

八味地黃湯（幼幼集成）產後氣浮喘促。不甚虛者。以此納氣歸元。至虛者不能。

即八味丸。去山茱萸。加棗皮。

水煎極濃空心服。

竹葉湯（千金）治產後虛渴。少氣力。

竹葉（三升）　生姜　半夏（各二兩）　大棗（十四枚）　小麥（五合）

甘草　茯苓　人參（各一兩）　麥門冬（五兩）

右水煎服。○千金。又治產後心中煩悶。不解若其人食

少。無穀氣。加粳米五合。

療產後大渴不止。（產寶）

蘆根（一升）　栝蔞　人參　甘草　茯苓（各三兩）

大棗（二十枚）　麥門（四兩）

右水煎服。

熟地黃湯（三因）治產後虛渴不止。少氣脚弱。眼昏頭眩。飲食無味。

熟地黃（一兩）　人參（三兩）　麥冬（二兩）　栝樓（四兩）

甘草（半兩）

糯米一撮。生姜三片。棗三枚。水煎。

產後虛渴。（徐氏胎產）

煎人參五味麥門冬湯。調益元散服。（良）

桑螵蛸湯（千金翼）治諸產後小便數。

桑螵蛸（三十枚）　鹿茸　黃芪（各三兩）　人參　甘草

牡蛎（各二兩）　生姜（四兩）

右水煎服。

玉龍湯（良方）治婦人產後。用力太過。產門突出。

四物湯入真龍骨末少許。

右水煎。空心連進二服。麻油湯熏洗。

當歸黃耆飲（丹溪）治產後陰脫。

黃耆（三錢）　人參　當歸　升麻（各二錢）　甘草（一錢）

右水煎服。

回乳四物湯（正宗）治產後無兒吃乳。致乳汁腫脹堅硬。疼痛難忍。

四物湯（各二錢）　麥芽（二錢炒為末）。

水二鍾。煎八分。食遠服。用脚布束緊兩乳。以手按揉其腫。自然消散。甚者再用一服。

四順理中圓（千金）已產訖。可服。新生藏虛。此所以養藏氣。

即理中丸。

麒麟竭散（聖惠）治產後惡血衝心。痛氣欲絕。

麒麟竭（二兩）　沒藥　木香（各一兩）　代赭

麝香（各半兩）

右為散。當歸酒調下二錢。如人行五七里再服。當下惡血。神效。

芎藭散（聖濟）治產後血塊。攻築心腹痛。

芎藭　當歸　栢葉（各一兩）　桂（半兩）　大黃（一分）

右爲散每服二錢七當歸酒調下

黑神散（局方）治產後惡露不盡胞衣不下攻衝心胸痞滿或臍腹堅脹撮疼及血暈神昏眼黑口噤產後瘀血諸疾

黑豆（炒半升去皮）　熟地黃　當歸　肉桂

炮姜　甘草　芍藥　蒲黃（各四兩）

右爲細末每服二錢酒半盞童便半盞同煎調下○良方一名爲金散○幼幼集成云血暈胸腹脹痛氣粗外証兩手握拳牙關緊閉此血逆症也宜此方無脹無痛者屬虛大劑芎歸湯加肉桂○得效加百霜五分名烏金散

失笑散（局方）治產後心腹痛欲死百藥不效服此頓愈

蒲黃（炒香）　五靈脂（等分爲末）

右先用釅醋調二錢熬成膏入水一盞煎七分食前熱服○良方五靈脂末二分溫酒下名立效散治兒枕痛又五靈脂爲膏以蒲黃搜和爲丸名紫金圓○雲岐子獨行散治產後血暈昏迷不省衝心悶絕五靈脂二兩半生半炒爲細末每服二分溫酒調下口噤者拗開口

灌之入喉即愈。

大調經散（良方）治産後血虛。惡露未消。氣為敗濁凝滯。榮衛不調。增寒發熱。或自汗或腫滿。

大豆（一兩炒去皮） 茯神（一兩） 琥珀（一分）

右為細末。濃煎烏豆紫蘇湯調下。

延胡索散（良方）治産後兒枕腹痛得效。

延胡索 當歸（各一兩） 琥珀 蒲黃（各一分炒）

芍藥（半兩） 桂心（三分） 紅藍花（二分）

右為細末。以童便合溫酒調下三錢。○聖惠只用延胡索。桂心。（各半兩）當歸。（一兩）三味名延胡索散。治産後兒枕痛。

博濟蓬莪朮散（良方）治産後腹藏疼痛。心胸注悶。每遇經脈行。或多或少。及有塊積者。

莪朮 桃仁 大黃 當歸（各一兩） 桂心

川芎 木香 牡丹皮 延胡 芍藥（各半兩）

右為細末。溫酒調一錢。臨臥服。

紫金丹（醫林方）治産後敗血衝心脇肋痛。

代赭石（一兩燒紅醋焠七遍研細） 桃仁（三分） 大黃（五分）

右為細末。薄荷水打麪糊為丸。每服三十丸。加至五十

丸。臍腹痛。煎四物湯送下。血瘀。酒煎四物湯加玄胡索。

赤馬通散（聖惠）治產後血運。纔覺惡心頭旋。多涕唾。身如在舡車上。使速冝服。一名返魂散。

赤馬通（四兩。五月三日收。瓷瓶中。燒令通赤） 麒麟竭（一兩） 沒藥（一兩）
延胡索（二兩） 當歸（二兩）

右為散。以童子小便半中。水酒各半中。入散三錢。煎三五沸。和滓服。

清魂散（保慶）治產後血暈。極甚者悶絶不知人。口噤神昏。

澤蘭葉（一分） 人參（一分） 荊芥（一兩） 川芎（半兩）

右為末。温酒熱酒各半盞。調一錢。急灌之。下咽即開眼。氣定省人事。（良方作清魂散）○幼幼集成。有當歸。益母。甘草。生姜。大棗。水煎服。又治瘀化為膿。流出臭穢。

牡丹散（保慶）治產後血暈。悶絶。振狽。若口噤。則拗開灌之。

即大黃牡丹湯。（方見腸癰門）

烏金散（醫林方）治婦人產後血暈。牙關不開者。可治。張口死不治也。

黑牛角胎（用醋燒。蘸三遍。）

右為細末。龍腦少許。每服三錢。童子小便調下。

產後血暈（便產）

鹿角（燒灰出火毒）

右為細末。好酒調下。即醒。行血極快。

二神散。便產治產後血暈。血入心經。語言顛倒。健忘失志。

血竭　沒藥（各等分）

右研細為末。纔產下。便用童便細酒各半盞。一兩沸。調下二錢。良久再服。其惡血自循下行。更不衝上。免生百疾。白湯調下亦可。○亂產名奪命散。

治產後崩中下血。良方

熟地黃　赤石脂（各一兩）　鹿茸　牡蠣

當歸（各半兩）

右為細末。粥飲調二錢。

愈風散（本事）療產後中風口噤。牙關緊急。手足瘛瘲。如角弓狀。亦治血暈。四肢強直。不省人事。或築心眼倒。吐瀉欲死。

荊芥穗（輕炒過一兩）

右為末。每服三錢。溫酒調下。○良方云。豆淋酒調下。用童便亦可。其效如神。口噤者灌。齒齦噤者吹鼻中。皆效。

指迷加當歸等分水一琖酒少許煎至七分灌之下咽即有生理不問多少便服不可以藥味尋常忽之屢用救人有效○入門名古荊歸湯此清神氣通血脈其効如神○本綱一名如聖散一名舉卿古拜散一名一捻金一名獨行散一名再生丹

牛膏湯（玉機）治產後熱入血室

朱砂　鬱金（各三分）　牛黃（二分半）　牡丹皮（二分）

甘草（一分）　龍腦（五分）

右為末蜜丸皂子大每一丸井水化下

正脾散（產寶 百問）治產後通身浮腫

蓬朮　香附子（童便浸）　茴香　甘草

陳皮

右等分為細末每服二錢灯心木通湯下

小調經散（良方）治產後浮腫

當歸（一兩）　桂心　芍藥（各五分）　沒藥　琥珀

甘草（各二分）　細辛　麝香（各一分）

右為末每一錢溫酒入姜汁調服○局方無甘草名調經散治產後敗血循經流入於四肢留滯日深腐壞如

水漸致浮腫。大抵産後虛浮。醫人不識。便作水氣治之。凡水氣多以導水藥。極是虛人。夫産後既虛。又以藥虛之。是謂重虛。往往因致枉夭。但服此藥。血行腫消則愈。

琥珀散（聖惠）治血邪攻心。迷悶。言語錯亂。

琥珀　鐵粉（各一兩）　人參　遠志　茯神

阿膠　生地黃（各三分）　朱砂（半兩）　甘草　麝香（各一分）

右爲末。研勻。以金銀湯調下一錢。

麒麟血散（聖惠）治産後血邪攻心。恍惚如狂。

麒麟竭（一分）　蒲黃（三分）

右相和研令勻細。以溫酒調下二分。

七珍散（保慶）治産後不語。

人參　石菖蒲　川芎　干地黃（各一兩）

細辛（一分）　防風　辰砂（各半兩）

右為末。每服一錢。薄荷湯調下。○濟生。有甘草。名八珍散。心法附餘云。産後不語。有熱血迷塞心竅。宜七珍散。有熱痰迷塞心竅者。宜孤鳳散。肥人多是熱痰。瘦人多是熱血。

胡氏孤鳳散（良方）治産後閉口不語。

用白礬研細熱水調下一錢

桃花散（聖惠）治產後大小便秘澁

桃花　葵子　滑石　檳榔（各等分）

右為細末每服二錢葱白湯空心調下

治乳汁不行方（良方）滋益氣脈營衛行津液

葵菜子（炒香）　縮砂（各等分）

右為細末每服二錢熱酒調下上蔡張不愚方常用極有驗

湧泉散（良方）治同上成都教授單驤方亦治乳癰結腫

穿山甲（一兩炒令燥）

右為細末酒調服方寸匕

產後汗不止粳米粉散方（產寶）

牡蠣（三兩）　附子（炮一兩）　白粳米粉（三升）

右為散攪令勻汗出傅之

婦人衆疾

温經湯（金匱）治下利數十日不止。暮即發熱。少腹裏急腹滿。手掌煩熱。唇口乾燥。此病屬帶下。

呉茱萸（三兩）　當歸　芎藭　芍藥　人参
桂枝　阿膠　生姜　牡丹　甘草（各二兩）
半夏（半升）　麥門（一升）

右以水一斗。煮取三升。分温三服。亦主婦人少腹寒。久不受胎。兼治崩中去血。或月水來過多。及至期不來。○百一選方。無芎藭。甘草。有熟地黄。名正經湯。入門。名大温

經湯。

大黃甘遂湯（金匱）治婦人少腹如敦狀。小便微難而不渴生後者。此爲水與血俱結在血室也。

大黃（四兩）　甘遂（二兩）　阿膠（二兩）

右以水三升。煮取一升。頓服之。其血當下。

抵當湯（金匱）治婦人經水不利下。

小建中湯（金匱）治婦人腹中痛。

甘草小麥大棗湯（金匱）婦人藏躁。喜悲傷欲哭。象如神靈所作。數欠伸。此湯主之。

甘草（三兩）　小麥（一升）　大棗（十枚）

右以水六升。煮取三升。分溫三服。

四物湯（局方）調益營衛。滋養氣血。治任衝虛損。月水不調。

當歸　川芎　芍藥　熟地黃（各等分）

右水煎服。○易簡去地黃。加人參乾姜甘草等分。治婦人血氣不足。四肢惰怠。乏力少氣。兼治產後下血過多。榮衛虛損。陰陽不和。乍寒乍熱。又加莪朮官桂等分。名六合湯。治經血凝滯。腹內血氣作疼。

逍遙散（局方）治血虛勞倦。五心煩熱。頭目昏重。心忪頰赤

發熱盜汗。及血熱相搏。月水不調。臍腹脹痛。寒熱如瘧。

甘草（半兩）　當歸　茯苓　芍藥　白朮

柴胡（各一兩）

右生姜一塊。薄荷少許。水煎服。○聖濟。名逍遙湯。治產後亡陰血虛。○神巧萬全。治血風勞。無當歸。芍藥薄荷。有人參。黃芪○易簡。無薄荷。○得効。煩熱。無薄荷。有麥冬。一方。加知母地骨皮。○薛氏加丹皮梔子。名加味逍遙散。○彙言。引方脉正宗云。肝火血鬱成勞。用夏枯草。入逍遙散良。

竹茹湯（千金）治婦人汗血吐血。尿血下血。

竹茹（二升）　人參　芍藥　桔梗　芎藭

當歸　甘草　桂心（各一兩）　乾地黃（四兩）

右水煎服。

如聖散（良方）治婦人血氣不足。不耐寒暑。易冒疾傷。月水不調。四肢易倦。筋骨少力。五心煩熱。肌膚不長。

柴胡　茯苓　甘草　熟地黃　人參

當歸（各一兩）　鼈甲　胡黃連　沈香　知母（各半兩）

桑寄生　乾葛（各三分）

右烏梅一箇。棗二枚。麥冬數粒。水煎服。

乞力伽散（良方）治血虛肌熱。又治小兒脾胃蒸熱。不能飲食。

白朮　白茯苓　白芍藥（各一兩）　甘草（半兩）

右姜棗水煎。○入門。名三白湯。治虛煩。○寶鑑補遺。去甘草。加人參。名人參三白湯。治吃逆。

桂枝桃仁湯（良方）治經道不通。繞臍寒疝痛徹。

桂枝　芍藥　生地黃（各二兩）　桃仁（五十箇）

甘草（一兩）

右姜棗水煎。

玄胡索湯（良方）治婦人室女。心腹疼痛。一切血氣。經候不調。

玄胡索　蒲黃　芍藥　姜黃

當歸（各一兩半）　乳香　木香　官桂

沒藥（各一兩）　甘草（半兩）

右生姜水煎服。

玄胡苦楝湯（試效方）治臍下撮痛。陰內大寒。

甘草（五分）　肉桂　附子（各三分）　玄胡索

苦練子（各二分）熟地黃（一錢）黃栢（二分）

右水煎服。

丁香膠艾湯（寶鑑）治崩漏走下不止。自覺臍下如氷。白帶之物多。間有惡露水下。時有鮮血不止。

即芎歸膠艾湯。加丁香。去甘草

加味烏沈湯（奇効）治婦人經水欲來。臍腹疞痛。

烏藥、　縮砂　木香　玄胡索（各一兩）

香附（二兩）　甘草（一兩半）

右生姜水煎。（案方中無沈香。豈犀角消毒散之類耶。）

栢黃散（雲岐）療經血不止。

黃芩（一兩二錢半）　側栢葉　蒲黃（各一兩）　伏龍肝（一兩）

右水煎服。

桂附湯（東垣）治白帶腥臭。多悲不樂

肉桂（一錢）　附子（三錢）　黃栢　知母（各五分）

右水煎服。○寶鑑。不用黃栢。用黃芩。

十棗湯（潔古）治帶下少腹寃結而痛者。先以此下之。次服苦練丸大玄胡索散調之。是先攻後補之法也。

四物湯加吳茱萸（要訣）四物湯。婦人要藥。於内加吳茱萸

半錢或一錢。一應血氣病。無不治。○此說原出良方。云
徐明仲方。加香附子。

調氣養血湯（回春）治婦人室女。血氣不和。胎前産後諸病。
四物湯加香附。烏藥。砂仁。甘草。姜棗。

黄連解毒湯（壽世）治婦人五十以上。經脈暴行。不可以冷病治之。如下峻藥即死。
本方。加棕灰。蓮殼灰。後用四物湯和血。（張子和單用本方）○
奇效云。醫以黄連解毒湯。加大艾。治血崩無不効者。
又當量其虛實用之。

涼膈散合四物湯（醫鑑）西園公。治婦人六十二歲。患血崩不止。以黄連解毒湯四貼。後用此方六貼。即愈。

温經湯（十便）治婦人經道不通。繞臍寒疝痛徹。其脈沈緊。
當歸　川芎　芍藥　桂　牡丹皮
莪朮（各半兩）　人參　甘草　牛膝（各一兩）
右水煎。○入門。名小温經湯。

柴胡散（修月魯般經後錄）治婦人寒熱體瘦。肢節疼痛。口乾心煩。不欲飲食。
柴胡　黄芪　赤茯苓　白朮（各一兩）

人參　地骨皮　枳殼　生乾地黃
苦梗　桑白皮　芍藥（各三分）　鼈甲（炙二兩）
麥門（三兩）　甘草（半兩）

生姜三片水煎○寶鑑同

滋血湯（寶鑑）治婦人血熱氣虛經候澁滯不通致使血聚肢體麻木肌熱生瘡渾身疼倦將成勞瘵不可妄服他藥但宜以此滋養通利

馬鞭草　荊芥穗（各四兩）　牡丹皮（一兩）　赤芍藥
枳殼　肉桂　當歸　川芎（各二兩）

右烏梅一箇水煎

增損四物湯（寶鑑）治婦人血積

本方加廣茂桂三稜乾漆各等分

芎羌散（本事）治婦人患頭風每發必掉眩如在車上蓋因血虛肝有風邪襲之爾

川芎（二兩）　當歸（三分）　羌活　旋覆花　細辛
蔓荊　石膏　藁本　荊芥　半夏
防風　地黃　甘草（各半兩）

姜五片水煎

十味養榮湯（朱氏集驗）治婦人氣血不足。臍腹疞痛。月水不調

熟地黃　黃芪（各二兩半）　牡丹皮　五味子

肉桂　芍藥　茯苓（各一兩）　當歸

川芎（各一兩半）　炙甘（七錢）

右水煎服

治婦人經前經後感冒頭痛。發熱譫語。妄見煩躁類傷寒

此熱入血室症。（本草彙言）

益母草　柴胡　半夏　當歸　丹皮

黃芩

水煎服。

薛國球開元記事治婦人癥瘕塊痛。（彙言）

芍藥　玄胡索　木香　乾漆

五靈脂　肉桂　莪朮

右水煎服

當歸白朮湯（活人）婦人未平復。因有所動。少腹急痛。腰胯疼。四肢不任。舉動無力。熱發者。

白朮　當歸　桂枝　附子　甘草

芍藥　人參　黃芪（各一分）　生姜（半兩）

右水煎

治婦人淋疾（藍溪府君製）

紅花（二匁） 甘草（一匁五分） 阿膠 滑石（各一匁）

右水煎服

逐瘀飲（櫟窻新製）治血水壅遏遍身洪腫

冬葵子（一匁） 紅花（八分） 滑石 桃仁 牛膝

延胡索（各六分） 牡丹皮 木香（各四分）

右水煎服

礬石丸（金匱）治婦人經水閉不利藏堅癖不止中有乾血

下白物

礬石（三分） 杏仁（一分）

右末之煉蜜和丸棗核大内藏中劇者再内之

腎氣丸（金匱）婦人病飲食如故煩熱不得臥而反倚息者此名轉胞不得溺也以胞系了戾故但利小便則愈宜此方（方見虚勞門）

紅藍花酒（金匱）治腹中血氣刺痛

紅藍花（一兩）

右以酒一大升煎減半頓服一半未止再服

四物湯（局方）調益營衛滋養氣血治任衝虛損月水不調

當歸　川芎　芍藥　熟地黃（各等分）

右水煎服○易簡去地黃加人參乾姜甘草等分治婦人血氣不足四肢惓怠乏力少氣兼治產後下血過多榮衛虛損陰陽不和乍寒乍熱又加莪朮官桂等分名六合湯治經血凝滯腹內血氣作疼

滋血湯（局方）治婦人勞傷衝任氣虛不能約制其經血或暴下謂之崩中或下鮮血或下瘀血連日不止形羸氣劣

赤石脂（火煅紅）　海螵蛸　側栢（各五兩）

右為細末每服一錢用熱飯飲調下一日連進三服即愈此藥功効不可盡述

加味四物湯（得効）治經斷後多年忽然再行遂成崩漏腹痛寒熱

本方加人參吳茱萸生姜紅棗煎兼用熟附圓（方見後）

神仙聚寶丹（局方）治婦人血海虛寒積聚成塊或成堅積及血氣攻注腹脇疼痛小腹急脹此藥一切婦人並宜服之

沒藥　琥珀　木香　當歸（各一兩）　辰砂

麝香（各一兩）　乳香（一分）

右為細末。滴水擣為圓。每一兩為一十五圓。每服一圓。

温酒磨下。

大黃圓（千金）治帶下百病無子。服藥十日下血。二十日下長蟲及青黃汁。三十日病除。五十日肥白。方。

大黃（破如米豆。熬令黑）　柴胡　朴消　乾姜（各一升）

芎藭（五兩）　蜀椒（二兩）　茯苓（如雞子大。一枚）

右為末。蜜和丸如梧子大。先食服七丸。米飲下。加十丸。

蒲黃散（千金）治漏下不止。

蒲黃（半升）　鹿茸　當歸（各二兩）

右為末。酒服五分匕。日三。

牛膝散（良方）治婦人月水不利。臍腹㽲痛

牛膝（一兩）　桂心　芍藥　桃仁　延胡索

當歸　牡丹皮　川芎　木香（各三分）

右為末。每服方寸匕。温酒調下。○本朝經驗去木香加紅花。水煎服。治產後惡血諸疾尤效。

養正必用方一方（良方）治經脈不利即為水。水流走四肢。

悉皆腫滿。名曰血分。其候與水相類。醫作水治之非也。宜此方。

人參　當歸　大黃　桂心　瞿麥

芍藥　茯苓（各半兩）　葶藶（炒一分）

右為末。煉蜜圓如梧子大。空心米飲下十五丸。

選奇後集三稜煎（良方）治婦人血癥血瘕。食積痰滯。

三稜　莪朮（各三兩）　青皮　半夏　麥芽（各一兩）

右用好醋六升。煮乾焙為末。醋糊圓如梧子大。每服三四十圓。淡醋湯下。痰積。姜湯下。

熟附圓（得効）

川芎　當歸　赤石脂　龍骨

木賊　熟附子（各等分）

右用醋米糊圓梧桐子大。每服五十圓。米飲吞下。漸安。

治婦人赤白帶下。不問遠年近日。皆治。（奇効）

龍骨（半兩）　舶上硫黃（二兩）

右為末。每服半錢。無灰酒調下。

治婦人血崩屢效方。（良方）

當歸　芍藥　乾姜　棕櫚（各等分）

右各煅存性。為細末。醋湯調下。○椶櫚燒存性。為末。湯破酒令淡。調下三錢。

備金散（寶鑑）治婦人血崩不止。

香附子（四兩炒）　當歸（一兩二戔）　五靈脂（一兩炒）

右為細末。每服五錢。醋調。空心服立效。

苦練丸（正傳）治赤白帶下。最妙。

苦練　茴香　當歸（各等分）

右為細末。酒糊為丸。如梧子大。每服五十丸。温酒送下。

龜栢姜梔丸（入門）治赤白帶下。或時腹痛。

龜板（三兩）　黄栢（一兩）　乾姜（一戔）　梔子（二戔半）

右為末。酒糊丸。白湯下。

阿膠散（聖惠）治婦人赤帶下。腹内疞痛。

阿膠　當歸　芍藥　熟地黄

牡蠣（各等分）

右為散。以粥飲調下二戔。

紅花散（朱氏集驗）治婦人女子。經脈不通。如血膈者。二十服效。

好紅花　蘇枋木　當歸

右等分。酒水煎。

内補當歸建中湯（吳氏集驗）治婦人十八般血氣痛。

當歸　赤芍藥（各半兩）　甘草（三匁半）　白芍藥

川芎（各一兩）　乳香（三匁）

右為末。每服二錢。酒調熱服。

治婦人崩中下血。切痛不止。（千金翼）

桑耳　牡蠣（各三兩）　龍骨（二兩）　黄芩　甘草

芍藥（各一兩）

右細末。酒服方寸匕。日三。

和血通經湯（寶鑑）治婦人室女。受寒月事不來。惡血積結堅硬如石。

當歸　三稜（各五匁）　莪朮（四匁）　木香　熟地黄

肉桂（各三匁）　紅花　貫衆　蘇木（各二匁）　血竭（一匁）

右為細末。每服三錢。熱酒一觴調下。

白芍藥散（寶鑑）治婦人赤白帶下。腹臍疼痛。服半月見効。

白芍（二兩）　乾姜（炮半兩）

右二件。同為粗末。炒黄色。碾為細末。每服二匁。空心温米飲湯調下。至晚又服。

四神散（朱氏集驗）治男子婦人。一切氣痛。不可忍者。

芍藥　良姜　甘草（各一兩）　香附（一兩半）

右為末。每二錢。酒調服。煎亦好。

治婦人無病。經血周歲不行。（本草彙言）

用螻蛄二個。搗爛。綿子裹。塞陰戸內。一日即通。

當歸散（事親）治月經欲來前後。腹中痛。

當歸　玄胡索　沒藥　紅花

右為末。温酒調下二匁服之。

通膈散（朱氏集驗）治婦人心腹刺痛。寒熱往來。

蓬朮　延胡索　芍藥　當歸

川芎　甘草　牡丹皮

右等分。細末。每服二錢。姜酒調服。

琥珀散（良方）治婦人血氣。攻心腹。煩躁悶亂。疼痛不止。

琥珀　沒藥　當歸　芍藥　丹皮

胡索　蒲黃　莪朮　桂枝

右等分。為末。每服一錢。温酒調下。

瑞金散（良方）治婦人血氣撮痛。月經不行。預先嘔吐疼痛。

及月信不通。

姜黃（四兩）　丹皮　莪朮　紅花　當歸

芍藥　川芎　桂心　玄胡（各兩半）

右為末。每服二錢。水一盞。酒三分。煎七分。溫服。日三次。

草方（朱氏集驗）治婦人遇月經來。則小腹痛。脚膝疼。遍服藥不効。

香附子（半酒半醋浸。焙。又浸炒。）

右為末。或為丸。任意空心下。病猶未除。後用艾膠湯加必附子。併此藥服。

章氏醫鑑（彙言）治血瘕疼痛。

川芎　當歸　乾漆　玄胡索

五靈脂　芍藥　三稜　牡蠣

各等分。為丸。每服三錢。

走馬散（醫林方）治婦人血氣發來。似刀攪腸胃刺痛。及血氣衝心痛死。

當歸（一兩）　沒藥　紅花　官桂　芍藥

蘇木　青皮（各一兩半）

右為細末。每服三錢。酒一中盞。同煎。和滓溫服。來日再服。末止再服。

血極膏（寶鑑）治婦人乾血氣。此藥破婦人經水之仙藥也。

大黄一两（為末）　釅醋一升

右二味。熬成膏子。丸如鷄頭大。每服一丸。熱酒化開。臨臥温服。大便利一二行。後紅脈自下。

丹溪治塊方　医綱

海粉（醋煮）　三稜　莪朮（醋煮）　紅花

五靈脂　香附（各等分）　石鹼（減半）

共為丸。白朮湯呑下三十丸。

烏金散（朱氏集驗）治婦人諸般發搐。三山曾醫方

眞川墨。乃松烟也。磨酸醋。緩緩呷兩呷。即効。有婦人産後。頭搐目不開。服之。便住。次用豆淋酒一味。[illegible]一宿。次日兩服好。

橘歸丸（朱氏集驗）治婦人肌膚手足。俱有血線路。此怒氣傷肝。血失常經。所以如此。服後藥兩日無事。

橘皮二两　當歸一两

右為細末。蜜丸。温酒下。

觀聚方要補卷九