# 觀聚方 十

松
科別

k 62-1

F 9
カ-96

490.9
Ka-20/9
No.2571
K62-1
慶應義塾大学医学情報センター
昭和47年7月4日
富士川文庫
1519

# 觀聚方要補巻十目録

## 小兒初生

平和飲子　甘草法
朱蜜法　牛黄法
集驗黄連法　柴胡湯
湯氏生地黄湯　釀乳方
治嘔吐乳汁方　犀角散
紅花散　紫丸
治胎熱撮口方　茯苓丸

治胎寒腹痛方　治惡穢入腹嘔吐不止方
定命散　瓜蒂散
沈瀣丹　五香散
龍膽湯　竹瀝磨犀角飲子
導赤散　治慢驚風方
虛風湯　銀白散
治卒得癇方　張渙烏蛇散
療驚癇瘲單方　張渙安神湯
張渙犀角湯　緩急湯
醒脾散　烏蝎四君子湯
烏沈湯　黑附湯
川烏散　沈附湯
鈎藤飲　鈎藤散
犀角湯　羚羊角湯
醒脾散　沈香天麻湯
固真湯　六柱散
銀棗湯　柴胡加大黄湯
抑肝散　參附湯

治肝虚諸證方　急搐飲
牛黄丸　治驚癇方
延齡散　胡黄連散
瀉青丸　利驚丸
凉驚丸　治驚癇客忤方
董汲抱龍圓　朱砂鐵粉散
神烏散　人參牛黄散
陰癇散　寧神膏
防風天麻散　分肢散
奪命散　無價散
礞石丸　白附丸
琥珀散　紫金錠
治風痰吐沫方　治内熱痰壅方
加味回陽散
諸疳
張氏三和飲子　黄耆湯
淨府散　抑肝扶脾散
消疳飲　清胃養脾湯

治小兒直腸泄瀉方　麝青丸
鐵粉丸　四靈丸
大蘆薈丸　地黃圓
胡黃連丸　劉氏蘆薈丸
張氏五疳丸　王氏保童丸
消乳丸　朱氏肥兒丸
五靈脂丸　鱉血煎
附苓丸　阿魏丸
治小兒不思食方

## 小兒諸證

鈎藤散　石膏散
加減四味飲子　治夜啼方
四物解肌湯　藿香散
升麻葛根湯　惺惺散
宣風散　張渙葛根湯
脱甲散　連翹飲
清肌散　四順散
越桃飲子　人參犀角散

胡黃連散　黃耆茯神散
六神散　益黃散
白朮散　藿香散
半粟散　惺惺散
山薊湯　生犀人參散
藿香散　雙金散
清膈飲子　白朮散
麥門冬散　香葛湯
益脾散　赤茯苓散
貝母散　紫蘇子散
瀉白散　補肺散
治呀方　麥門清肺飲
白附飲　清脾飲
鶴蝨散　當歸散
烏梅散　五苓加車前子薏苡水煎
調中散　升麻飲子
紫圓　二物石膏湯
黃耆丸　蝦蟆丸

補腎地黃丸　六味地黃丸加紫河車
四黃丸　陰陽二勝散
立効散　香雲散
二黃散　乳附元
神仙救生散　半夏圓
黑散子　海漂消散
玉訣貝母丸　甘瓜散
王氏墜痰丸　滴金散
如聖散　碧玉丹
張渙溫脾丹　苦楝根散
古今錄驗牡丹五等散
嬰孺芍藥丸　海蛤散
金鈴散　治弔氣方
治陰囊腫方　又方
水蘚散　乳沈膏
牛黃解毒丸

## 觀聚方要補卷十

東都　丹波元簡廉夫　輯

### 小兒初生

平和飲子顱顖　治小兒初生日及百晬與之

人參　茯苓　甘草（炙）　升麻（各一匕）

右水煎時時與之臨時冷加白朮熱加芒硝

甘草法（千金）小兒新產出取甘草如中指節炙碎以水二合煮取一合以綿纏沾取與兒吮之連吮汁計取一蜆殼入腹止兒當快吐吐去心胸中惡汁也

朱蜜法（千金）甘草吐惡汁後。更與之。以飛鍊朱砂。如大豆許。以蜜一蜆殼和之。以綿纏筋頭沾取與兒吮之。得三沾止。一日令盡。此可三日與之。則用三豆許。以鎮心神。安魂魄也。勿過此。則傷兒也。

牛黃法（千金）與朱蜜竟。可牛黃如朱蜜多少也。牛黃益肝膽。除熱。定精神。止驚。辟寒氣。除小兒百病也。○張渙云形色不實者。不宜多服。若胎熱。或身體黃色。宜多服之。

集驗黃連法（幼幼新書）小兒初生。必有惡汁留於胸。次若不消去。即胸膈壅塞。易生蘊熱。驚癇瘡癬。皆由此也。用好肥黃連搥碎。每少許。厚以綿裹。如嬭頭。湯內浸成黃汁。時一二點。在小兒口內。即惡汁自下。其後或間以朱蜜與之。○陳文中黃連同甘草。百沸湯泡。拭口。次用朱蜜。（按今所用甘連湯。原于此。）○[illegible]藏百壽散。黃連朱砂。水煎。拭去口涎淨。灌下。

龍膽湯（千金）小兒初出。面目悉黃。而啼。閉目聚口撮面。口中乾燥。四肢不能伸縮。皆是血脈不斂也。宜與此。（方出驚癇門）

柴胡湯（仁齋）治變蒸骨熱。心煩啼叫不已。

人參　甘草　麥冬　柴胡（各二匁）

龍膽　防風（各一匁）

右水煎服。○聖惠無防風。有玄參。

湯氏生地黃湯（集成）治生下遍體皆黃。身上壯熱。二便不通。乳食不進。啼叫不止。此胎黃之候。

即四物湯。加天花粉（各等分）○得効云。又治生下面赤眼閉。口熱如湯。乃胎熱之候也。

奇方。治初生不飲乳。及不小便。（得効）

右用葱白一寸。四破之。以乳汁銀石器煎。灌之立效。

釀乳法（袖珍）解胎中受熱。生下面黑。眼閉不開。大小便不通。不進乳食。

澤瀉（一兩半）　猪苓　茯苓　天花粉

生地（各半兩）　甘草（三匁）　茵蔯（四匁）

右水煎。服食後。令乳母。捏去宿乳。却服此藥。凡有胎熱症嘔逆。服此藥百無一失。若遽以冷藥攻之。必損脾胃。加以嘔噦。必成大患。

治百晬內嘔吐乳汁。或大便青色。（百問）

右用小婦人乳汁一盞。入丁香十粒。陳皮一錢。於器內

同煎三十沸去丁陳稍熱與兒服

犀角散（全効）治胎疸及小兒黃疸

犀角（五分）　茵蔯　瓜蔞根　升麻

龍膽　甘草　生地黃（各二分半）　寒水石（煅二分半）

右水煎服○醫綱不用瓜蔞根用葛根

紅花散（本朝經驗）治小兒一切胎毒

大黃（三分）　紅花　沈香（各二分半）　黃芩　丁香

連錢草（各二分）　桔梗　檳榔　藿香（各一分半）　甘草（少許）

右沸湯中擺服○一方無黃芩有青木香升麻連翹鬱金○一方無連錢草沈香黃芩桔梗藿香有桃仁枳實

紫丸千金凡小兒不能乳哺當與紫丸下之小兒始生生氣尚盛但有微惡則須下之必無所損及其愈病則致深益若不時下則成大病疾成則難治矣（方見于癎門）○嬰兒指要曰凡有臍風撮口胎風撮口鎖肚撮口齣腸撮口卵疝撮口皆出結鬱于腸胃閉不得通腹中滿脹肚上青筋撮口不乳証候甚急用紫圓子利之纔通疾去兒和用者敬信而已

治小兒胎熱撮口（聖惠）

牛黃（細研一分）　竹瀝（一合）

右令勻。時時與少許服之。

茯苓丸（嬰兒指要）嬰兒初出。惡穢入腹。腹滿氣短。不能飲乳。宜服之。

赤茯苓　川黃連　枳殼（各等分）

右為末。煉蜜圓桐子大。每一丸。乳汁調灌下。（原出聖惠）

治胎寒腹痛方（嬰兒指要）

木香　陳皮　檳榔（各一分）　辣桂　白姜

甘草（各半分）

右末。取一捻。水煎。以綿醮與之。

治惡穢入腹。令兒嘔吐不止。（嬰兒指要）

木香　乾姜　茯苓　甘草（各一錢）　木瓜

丁香（各半分）

右麁末。一捻。水煎。以綿與之。

定命散（陳氏）治初生兒口噤不開。

蟬蛻（十四箇去嘴脚）　全蝎（十四箇去毒）

右為細末。入輕粉少許。和勻。用乳汁調。乳前服少許。

瓜蒂散（袖珍小兒）治臍風撮口。吹入鼻內。啼則可療。又療小兒

三歲忽發心滿堅硬脚手心熱則變為黃病不急治殺人

瓜蒂（七箇）　赤豆（七粒）　秫米（七粒）

右為末用一豆許吹兩鼻内令黃水汁出殘藥末盡水調服之得吐黃水即瘥

沆瀣丹（集成）治小兒一切胎毒胎熱胎黃面赤目閉口舌諸瘡小便赤大便閉十種丹毒諸般風搐並皆神効

川芎　大黃　黃芩　黃栢（以上酒製 各九匁）

黑牽子　滑石　連翹　芍藥（各六匁）

薄荷　枳殼（各四匁五分）　檳榔（七匁五分 [illegible]）

研極細末煉蜜為丸如芡實大月内之兒每服一丸稍大者二丸俱用茶湯化服微有泄瀉則藥力行病即減矣如不泄再服之

五香散（福田）近世醫人多為小兒總治和劑方云升降諸氣宣利三焦疎導壅滯發散邪熱治陰陽之氣欝結不消諸熱蘊毒腫痛結核或似癰癤而非使人頭痛惡心寒熱氣急

沈香　丁香　木香　乳香　藿香（等分）

右納生絹袋煎、或綿裹良、又或除藿香、（用麝香尤妙、）○棊總錄癰疽門、局方咽喉門、方用麝香、而去藿香、千金、癰疽門、與本方同、

---

## 諸癇驚風

龍膽湯（千金）治嬰兒出腹、血脈盛實、寒熱温壯、四肢驚掣、發熱大吐哯者、若已能進哺、中食實不消、壯熱及變蒸不解、諸驚癇悉主之、

龍膽　鈎藤皮　柴胡　黄芩　桔梗

芍藥　茯苓　甘草（各六銖）　蜣螂（二枚）　大黄（一兩）

右水煎服、○萬全方、不用蜣螂、百問云、去蜣螂亦可、

竹瀝磨犀角飲子（聖惠）治小兒心熱驚悸、

竹瀝（二合）　犀角

右將犀角於竹瀝内磨令濃。量兒大小。分減服之。

導赤散（方訣）治驚熱上竄咬牙。

生地黃　木通　甘草（各等分）

右入竹葉同煎。一本不用甘草。用黃芩○局方加防風。名防風導赤散。治小兒初驚。

石壁經治慢驚風。心煩躁惡。（幼幼）

人參　炙甘　沈香　藿香　白朮（各一分）

右水煎服。（原方爲末。飲調下。）

虛風湯（幼幼）治小兒慢驚風。

黑附　南星（各一箇）　白附子（七箇）　全蝎（一箇）

右水煎服。

銀白散（幼幼）治小兒胃虛。吐瀉。煩渴。成慢脾者。

乾葛　人參　茯苓　山藥　扁豆（各半兩）

半夏（一分）　糯米（一合姜汁浸一宿）

生姜五片。水煎服。○玉訣四君子。加扁豆。藿香。名銀白散。生胃氣。取下後宜服。

肘後治卒得癎（幼幼）

釣藤　甘草（各等分）

右水煎服。如小棗大。

張渙烏蛇散幼幼專治一切風癇。角弓反張。潮搐甚者。

烏蛇梢（一兩生用）。　白附子　半夏（各一分）　天麻

白僵蠶　人參　全蝎　羗活

石菖蒲（各半兩）　附子（一枚）

生姜十片。薄荷五葉。水煎服。

肘後。療小兒驚癇瘲掣。幼幼

右取熊膽一兩。豆大。和乳汁及竹瀝汁服。並良。得去心中涎至良。高家用效驗。

張渙安神湯幼幼截驚癇。

茯苓（二兩）　甘草　犀角（各一分）　人參　遠志

菖蒲　白鮮皮（各一兩）　石膏（半兩）

右入麥門冬少許。水煎。

張渙犀角湯幼幼退癇鎮心神。

犀角屑　茯苓　麥門冬　人參

甘草　黃芩（各半兩）

右入生地黃汁少許。水煎服。

緩急湯總微治虛而生風。發搐喘滿。此慢驚候。

桑白皮（三兩）　茯苓　白朮　陳皮

僵蚕　杏仁　桔梗（各一兩）　人參

甘草（各半兩）

生姜三片水煎。

醒脾散指要治吐瀉脾困不食。

全蝎（焙半炙）　白附（炮）　天麻（焙）　甘草

人參　茯苓　石菖蒲　木香

蓮肉　白朮（各一分）

姜棗水煎服。◯又去天麻。石菖蒲。白朮。加橘紅。南星。陳

倉米。名大醒脾散。

烏蝎四君子湯指要治慢驚風。

四君子。加川烏。全蝎。焙。半炙。姜棗煎服。

烏沈湯指要慢驚。驅風動胃。

天麻（二炙）　人參　川烏　全蝎　南星

木香　沈香（各一炙）　甘草（半炙）

生姜三片。水煎。◯案此沈香天麻湯之祖方。

黑附湯指要治慢脾風盛。四肢厥冷。

附子（炮二炙）　木香（一炙半）　白附子（二炙）　炙甘（半炙）

右生姜五片。水煎。以匙送下。若手足煖而蘇省。即止後劑。○又本方。去甘草。加全蝎。南星。名蝎附散。治慢脾風回陽氣。豁風痰。○撮要。黑附子湯。加人參一戔半。

川烏散（指要）驅風回陽。

川烏（一分）　全蝎　木香（各半分）

姜四片。煎。滴入口中。嘔吐。加丁香。兼用金液丹。白圓子。

沈附湯（指要）治慢脾風。厥冷吐瀉。

沈香　丁香　木香　黑附　白附

全蝎　藿香　天麻（各半分）

---

右水煎服。（原方為散。甘草生姜煎湯下。）

鈎藤飲（指要）治天瘹。

鈎藤　茯苓（各半兩）　大黄（二戔半）　防風　朱砂

蟬殼　獨活　青皮　甘草（各一戔半）

姜棗煎服。

鈎藤散（指要）治內瘹。

鈎藤　人參　犀角（各二戔半）　甘草（一戔半）

全蝎（半分）　天麻（一分）

右水煎服。

犀角湯（指要）治心驚熱盛。

犀角　防風　木通　茯苓　桑白皮

甘草（等分）

右水煎。

羚羊角湯（指要）治諸驚壯熱。

羚羊角　蟬殼（半分）　伏神　麥冬

柴胡　地骨皮（各一分）　黄芩　甘草（半分）

右姜棗水煎。

醒脾散（朱氏集驗）治慢驚吐瀉不止。

肉豆蔻　檳榔（各一箇）　胡椒（二十四粒）　茯苓（二匁）

木香　藿香（各一匁）

右水煎。

沈香天麻湯（寶鑑）治驚癇發搐。痰涎壅塞。目多白睛。項背强急。醒後復發。數十月不差。神思如癡。脈沈弦而急。多服鎮墜寒凉之劑。復損其氣。兼灸申脈照海各二七壯。

沈香　益智　川烏（各二匁）　天麻　防風

半夏　附子（各三匁）　羗活（五匁）　獨活（四匁）　炙甘

當歸　姜屑（各一匁半）

生姜三片。水煎。

固真湯（心書）治吐瀉後胃虛脾慢。四肢口鼻氣冷。沈困睡。

人參　附子　茯苓　白朮（各二匁半）　山藥

黃芪　肉桂　甘草（各二匁）

姜二片。棗一枚。水煎。

六柱散（心書）治吐利泄瀉。胃虛脾慢。手足俱冷。六脈沈微。

（方出泄瀉門）

銀棗湯（袖珍）治驚熱潮熱。

---

麥門　地骨皮　遠志　人參

茯苓　防風　甘草（各三匁）　大黃（二匁）

右剉散。每服一錢。

柴胡加大黃湯（袖珍小兒）治急驚風。最利痰熱。

小柴胡湯加大黃（量虛實加之）

抑肝散（撮要）治肝經虛熱。發搐。或發熱咬牙。或驚悸。或木乘土而嘔吐痰涎。腹脹少食。睡臥不安。

柴胡　甘草（各五分）　川芎（八分）　當歸　白朮

茯苓　鈎藤（各一匁）

右水煎。如蜜丸。名抑青丸。子母同服。

參附湯（類萃）治元氣虛脫。將成慢驚。

附子　人參（各一匁）　丁香（五粒）

生姜五片。水煎。

治肝虛内熱。時驚惕。時夢魘。時狂怒。時搐搦。或大人中風。小兒驚風。及五癎癲癡。人事狐惑。一切心神失靈。肝神昏亂諸症。（彙言）

羚羊角（白湯磨汁）　半夏　當歸　防風

天麻　茯苓　棗仁　人參

白朮　鈎藤（各三匁）

水煎一鍾。和角汁服。立安。小兒減十分之七。

急攅飲（本朝經驗）療驚風痰毒衝胸。上竄搐搦不已。

積雪草　蕺菜（並生用）　青黛（極研）

右先杵積雪草蕺菜。絞取汁各半合。入青黛五分。拌匀。數灌之。加牛黃亦良。

牛黃丸（聖惠）治小兒大便不通。心中煩熱。

牛黃（一分。細研）　大黃（三分。微炒。為末）

右煉蜜和丸如麻子大。每服以粥飲下七丸。以利為度。

量兒大小。加減服之。

治小兒驚癇極妙方聖惠。

鐵粉　石膏　牡蛎（各一分）　黃丹（半兩）

右為細末。以井華水。調下半錢。量兒大小。加減服之。

延齡散聖惠治小兒驚熱。

釣藤鈎（一兩）　消石（半兩）　甘草（一分）

右為散。温水調下半錢。

胡黃連散聖惠治小兒驚熱不退。

胡黃連（一分）　朱砂（半兩）　牛黃（一分）　麝香（半分）

犀角（一分）

右為散。用乳汁調下一字。

瀉青丸方訣治肝熱。手尋衣領。及亂捻物。

當歸　龍膽　川芎　山梔　大黃

羌活　防風

右等分為末。錬蜜和丸。如鷄頭大。每服半丸至一丸。煎竹葉湯。同沙糖温水化下。

利驚丸方訣治小兒急驚風。

輕粉　青黛（各一分）　天竺黃（二分）　黑牽牛（末。半匁）

右同研勻。蜜丸豌豆大。一歲一丸。温薄荷水下。

涼驚丸方訣

龍膽　防風　青黛　鈎藤（各三分七）

牛黄　麝香（各一字七）　黄連（五分七）　龍腦（一分七）

右末。麵糊為丸粟米大。每服三五丸。至一二十丸。金銀湯送下。

藥性論治小兒驚癇客忤。鎮心安神方。（幼幼）

麝香（一粒）　丹砂（一塊大小相似）

右以細研。熱水灌之下。

---

董汲抱龍圓（幼幼）　治小兒一切風熱中暑。驚悸瘡疹欲出。多睡面赤。手足冷發温壯。睡中驚。搐搦不寧。脉洪數頭痛嘔吐。

牛膽南星（半斤）　天竺黄（二兩）　雄黄（半兩）　麝香（一分）

牛黄（一字）

右為細末。滴水和圓雞頭大。竹葉或薄荷湯。化下一圓。

（此孫兆方。錢氏不用牛黄。）

朱砂鐵粉散（楊氏）　治小兒身體壯熱。急驚搐搦。涎潮壅塞。悶亂不醒。

朱砂（一夂別研）　鐵粉（二夂別研）　膩粉（半夂別研）

右同研令勻。半歲兒每服一字。一歲兒服半錢。煎薄荷
湯調下。

神烏散（總微）治暗風癇極妙。歌曰。

臘月烏鴉一箇全。　半兩朱砂口內填。
麻纏烏嘴安瓶內。（用瓶盧）　鹽泥固濟火中安。（窨乾火煅）
黃昏上火天明住。（用木炭一秤半）取出篩羅為末研。
每服一夂射酒下。（一日三服）服之十日定須瘥。

（案本綱附方引總微論作用臘月烏鴉一箇。鹽泥固濟。於瓶中煅過。放冷出為末。入朱砂末半兩。每服一夂。酒下。日三服。不過十日愈。却覺簡便。）

人參牛黃散（總微）治小兒驚熱。

人參　牛黃（等分）

右為末。以薄荷水調下最佳。

陰癇散（指要）祛風豁痰。回陽正胃。

白附子　黑附子　南星　半夏（各一分半）

右為末。井水浸七日。逐日換水。浸訖控乾。次入全蝎末
二錢。每服一字。生姜湯調下。（原出三因）

寧神膏（朱氏集驗）用防風導赤散後用此藥。

麥門（半兩）　麝香（一分）　茯苓　朱砂（各兩）

右碾細。煉蜜為小餅子。每服一餅。臨睡同薄荷湯化服。一夜一服。

防風天麻散（朱氏集驗）治驚風頭疼。

防風　天麻　川芎　白芷　甘草

川烏　麻黃（各等分）

右為細末。葱蜜湯下。薄荷湯亦可。

分肢散（宣明）治小兒卒風。大人口眼喎斜。風涎最心驚癇天吊。走馬喉痺。急驚。一切風熱等症。

巴豆（半分不去油）　大黃（一兩）　朴硝（半兩）

右大黃為末。後入巴豆霜朴硝一處細研。用油貼起。如有前患。每服半錢。熱茶下。吐下頑涎。立愈。大人半錢。小兒一字。看虛實加減。只是一兩服見效。不宜頻服。如吐瀉不定。以葱白湯立止。

楊氏拯濟方奪命散（寶鑑）治肺脹喘滿。胸高氣急。兩脇扇動。陷下作坑。兩鼻竅張。悶亂嗽渴。聲嗄而不鳴。痰涎潮塞。若不急治。死在旦夕。

白牽牛　黑牽牛（各一兩半生半熟）　大黃

檳榔（各一兩）

右為細末三歲兒每服二錢冷漿水調下涎多加膩粉少許○醫綱引田氏云無時加蜜少許用此藥後用白虎湯主之此證俗云馬脾風在百日内者不治○金匱鉤元加木香三分輕粉少許名神聖牛黃奪命散治小兒急慢驚○幼幼集成去檳榔加枳實

無價散（寶鑑） 治風熱喘促悶亂不安俗謂之馬脾風

辰砂（二分半） 輕粉（五分） 甘遂（麪裹煮焙乾一分半）

右為細末每服一字用温漿水少許入滴油一點挑藥在上沈下去却以漿水灌之立效○入門名馬脾風散

**附灸法** 小兒喘脹俗謂之馬脾風又謂之風喉者以草莖量病兒手中指裏近掌紋至中指尖截斷如此二莖自乳上微斜直立兩莖於稍盡頭横一莖兩頭盡頭點穴灸三壯此法多曾見愈（拔萃）

礞石丸（袖珍） 大能利痰不問急慢驚脾風痰涎潮盛塞於咽間其響如潮名曰潮涎百藥俱不能過其咽命在須臾但先用此藥入喉其痰墜下功有萬全

青礞石（一兩別研） 焰硝（一兩同礞石入甆罐子内用炭火煅通紅須消盡為度藥冷如金）

右為末。急驚痰壅。用生薄荷自然汁。入蜜調。微温服之。良久。其藥自裹痰墜下。隨大便過。如稠涕膠黏。乃藥之效也。又為末。稀糊丸菉豆大。每服二丸。急風。薄荷荊芥湯下。慢風用木香湯磨下。○一名奪命散。原出湯氏嬰孩寶鑑。

白附丸（新方）效治風痰。

南星（八兩切片）　白礬（半兩末）　白附子（二兩半）

右以水浸南星白礬過一指。晒乾研細。入白附子和勻。飛羅麪為丸芡實大。每服一二丸。姜蜜薄荷湯浸化下。

（指恐宿誤）

琥珀散（百問）治小兒急慢驚風。入口立效。驚癇發作。常服除根。

辰砂（一夂半）　琥珀　牛黃　天麻　殭蠶

全蝎　白附　乳香　蟬蛻　代赭石（煆醋淬七次各一夂）

片腦　牛膽南星（各一字）　麝香（半夂）

右為末。薄荷湯下。慢驚加附子一分。○薛氏撮要。去龍麝。

紫金錠（類萃）治小兒一切驚風癇症。痰涎壅盛。功過牛黃

等劑。

即百一萬病解毒丸加雄黃辰砂。（詳出余所輯救急選方）

治小兒風痰吐沫氣喘欬嗽肚腹膨脹不思飲食。（彙言）

射干（一匁）　大黃　檳榔　牽牛子（各二匁）

麻黃　甘草（各八分）

俱微炒。研為末每服五分。蜜湯調服。

治小兒內熱痰壅。喉間吐不出。或因驚熱生痰。或因風熱生痰。（彙言）

取雪梨汁。時時與之。或加牛黃數釐更妙。

---

加味回陽散（大還）治慢驚面青。四肢逆冷。泄瀉不止。

人參　白朮　山藥　茯苓　甘草

附子　赤石脂（煆）　全蝎

姜湯下二錢。

## 諸痟

張氏三和飲子（幼幼）治三焦膈寒。五藏凝滯。氣逆痰涎。米食後惡涎。太陽昏痛。面色浮黄。指甲青黒。痟勞吐乳。及大人小兒久病乍安。神氣未復。寒熱往來。並皆救療。

紫團人參（三両） 甘草（乙両） 綿黄茋（三両酒浸一宿剉）

生姜三片。棗三箇。水煎服。○東垣治小兒驚。黄茋湯。魏氏保元湯。皆其祖方。

黄茋湯（指要）治痟勞。

黄茋　當歸　川芎　人參　芍藥　生地黄

蝦蟆（炙焦） 鱉甲（醋炙焦各三匁） 人參 茯苓

橘皮 半夏 柴胡 史君子

甘草（各一匁）

右姜棗煎服。

淨府散醫鑒治小兒腹中癖塊發熱。口乾小便赤。

柴胡 茯苓 澤瀉 三稜 莪朮

山查（各一匁） 黄芩 半夏（各八分） 白朮 猪苓（各七分）

人參 胡黄連 甘草（各三分）

姜棗煎服。

抑肝扶脾散醫鑒補元氣。健脾胃。退熱消癖。

黄連（一匁） 白朮 茯苓 龍膽 白芥

山查（各八分） 陳皮 青皮 神麯（各六分） 胡連

柴胡 甘草（各三分） 人參（五分）

姜棗水煎。

消疳飲濟世治小兒疳疾。身熱面黄。肚大青筋瘦弱。

人參 白朮 茯苓 黄連 神麯

砂仁 甘草 胡黄連 青皮

水煎。傷食加山查。有蟲加史君子。

清胃養脾湯（回春）治小兒愛吃泥土乃脾虛胃熱所致

黄芩　石膏　陳皮　白朮　茯苓

甘草（等分）

水煎服

治小兒直腸泄瀉水穀不分小便不利口乾作渴（經驗良方）

人參　白朮　茯苓　木香　訶子

砂仁　陳皮　瞿麥　車前子　麥門（各等分）

甘草（減半）

右水煎

麝青丸（聖惠）治小兒氣疳壯熱增寒腹脹下痢皮膚乾燥眼澁揉鼻乳食難化日漸羸瘦

麝香（細研）　熊膽（研入各半分）　茯苓（一分）　胡黄連

蘆薈（細研）　三稜　桂心　大黄（炒各一分）

檳榔（一枚）　當歸　木香（各半分）

右為末煉蜜和丸如菉豆大溫粥飲下五丸量兒大小加減

鐵粉丸（聖惠）治小兒驚癎壯熱及睡中多汗心神煩躁多驚

鐵粉（三分。細研）　麝香（一分。細研）　朱砂　天竺黃

青黛　熊膽　蛇黃（各研細）　史君子

黃連（各一分）

右都研令勻。以米飲和。丸如麻子大。一二歲。每用粥飲下三丸。三四歲每五丸。日二三服。

四靈丸　聖惠治小兒五疳。

大蟾（一枚。去却四足。擘開腹。去腸肚。入胡黃連末一兩在腹內。以線縫合。用濕紙三兩重裹。以泥四面固濟。令乾。微火出陰氣。便以炭火三斤。燒令通赤。即住。待冷去泥及紙。放擣細羅為末。更入後藥。）　盧會　麝香

熊膽（已上各一分）

右同研令細。以麵糊和丸。如麻子大。每服以粥飲或嬭汁下三丸。日三服。三歲已上加丸服之。

大蘆薈丸　方訣治疳殺蟲。和胃止瀉。

蘆薈　木香　青皮　胡黃連

黃連　蕪荑　雷丸　鶴虱（微炒。各半兩）

麝香（別研。二分）

右為細末。粟米飯丸。菉豆大。米飲下十二十丸。

地黃圓　方訣治肝疳。白膜遮睛。瀉血失音。身瘦瘡疥。又治胃虛不言。解顱。小兒長大不能行者。專服取效。

熟地黃（八匁） 山茱萸 山藥（各四匁） 澤瀉
丹皮 茯苓（各三匁）

右為末。煉蜜和丸如梧子大。三歲已下七丸至十丸

胡黃連丸（聖濟）治小兒乳哺不節。生冷過度。下利不止。面黃肌瘦。腹脹。蒸熱。名曰疳痢。

胡黃連末 白蕪荑人末 蘆薈（研）
麝香（各研一分） 巴豆（五粒去皮心膜出油研）

右合研勻細。煮麪糊和丸如粟米大。每服五丸至七丸柳枝湯下。不拘時。

劉氏蘆薈丸（幼幼）治小兒疳疾。

蘆薈 黃連 白朮 史君子
蕪荑仁（各一分） 巴豆（半兩連殼銀器内煨存性取一分）

右末之。研飯圓粟米大。每服五丸或七丸。飯湯下。

張氏五疳丸（幼幼）

熊膽 蕪荑（各一匁） 麝香（一字） 胡黃連（別杵為末秤一分）
大乾蟾（燒存性為細末一分）

右先將蕪荑研細。次麝香。次入胡黃連蟾末。研令勻。傾出。却研熊膽。以沸湯鎔化。再入前四味。更研令勻。糊為

丸如菉豆大。每服二三歲十丸。四五歲十五丸。米飲下。

王氏保童丸（幼幼）治五疳。消化宿滯。進食長肌。肥孩兒。

胡黃連　龍膽（各半兩）　史君子　木香

蘆薈（研。各一分）　麥蘗（半兩。巴豆三七箇。去皮心。同麥芽炒。令蘗紫色。去巴豆不用。以蘗為末）

川苦楝（一分。炒）

右為細末。用醋糊為丸。如菉豆大。每服十粒至十五粒。米飲下。此藥大治小兒疳腹脹。

消乳丸（幼幼）治宿食不消。

砂仁　陳皮　三稜　神麴

麥芽（各半兩）　香附（炒。一兩）

右末。麪糊丸如麻子大。白湯送下。○百問無三稜。有甘草。

朱氏肥兒丸（幼幼）小兒常服疳藥方。

蕪荑　黃連　神麴　麥芽（等分）

右為末。用豶猪膽煮糊丸如麻子大。每服三十粒。米飲下。○葉氏名消疳丸。經驗良方名五疳蕪荑圓。張氏無黃連猪膽。用胡黃連酒煮糊丸。名消疳消食丸。局方無蕪荑。有肉豆蔻。史君子。檳榔。木香。丹溪去麥芽。加蘆薈。

胡黃連。白朮。山查。醫林方。有蘆薈。指要加青皮。史君子。名黃連肥兒丸。寶鑑加胡黃連。

五靈脂丹 葉氏 小兒疳藥。因嗽成疳。常服尤佳。

五靈脂（半両） 蟾頭（一箇塗酢炙微黃） 蟬殼 款冬花（各半両已上為細末） 青黛（研） 雄黃（研各一分）

右糯米飯元如黍米大。每服十粒。煎人參湯下。量兒加減服。

鱉血煎 指要 治疳勞。

人參 川芎 蕪荑 柴胡（各一両） 史君子（二十箇） 胡黃連 川黃連（各二両）

右用鱉血一盞。吳茱萸乙兩。拌和二黃連。淹一宿。次早炒乾。透去茱萸并血。只用二連。夾餘藥杵末。粟米粉糊丸麻子大。每二拾圓。食前熟水下。

附苓丸（永類鈐方） 治溏洩。小便不利。即如五苓散加附子

附子（炮半両） 茯苓 澤瀉 滑石（各三分）

右為末。糊丸小豆大。三歲二十丸。燈心湯下。

阿魏丸 丹溪 治小兒食積。腹如蜘蛛狀。肚痛。小便白濁。

阿魏（醋浸一宿研如泥半両） 黃連（炒半両） 花鹼（研如粉三分）

山查肉（一两）　連翹（半两）　半夏（皂角水浸一宿。一两）

右為末。炒神麯糊丸如蔔子大。每服二十丸。空心米飲下。

小兒不思食（保童秘要）

大黃　人參　白朮（各等分）

右為末。蜜丸如梧子大。每日空心。每服七丸。温水下。

## 小兒諸證

鈎藤散（聖惠）治小兒驚啼。壯熱。心煩。不得穩睡。

鈎藤　龍膽　犀角屑　茯苓

黃芩　甘草（各等分）

右水煎服。

石膏散（聖惠）治小兒夜啼。壯熱驚懼。

石膏（一两）　人參　龍骨（各半两）

右為散。水一小盞。煎至五分。温服之。

加減四味飲子（聖惠）治小兒百病。

當歸（體骨多熱多驚則倍用之）　大黃（小便赤少大便多熱則倍用之）

芍藥（四肢多熱多驚大便多瀉青黃色倍用之）　甘草（熱即生用寒多泄多即炙倍用之）

右藥平常用各等分水煎○此方幼幼引葛氏肘後無方名治溫壯熱實及諸百病乃是局方清涼飲子活人四順飲子聖濟大黃甘草飲直指四順清涼飲是也

治夜啼新效方

人參（二分半）　黃連（一分）　甘草（半分）　竹葉（二十片）

右分作二服水一盞姜一片煎至半盞去滓溫服○金匱鉤玄無人參

---

四物解肌湯（千金）治少小傷寒○王寔証治云瘡疹與傷寒疑似之間先可與之（活人）

芍藥　黃芩　升麻　葛根（各半兩）

右水煎服

藿香散（聖惠）治小兒傷寒吐逆不定

藿香　丁香　木香（各一兩）　葛根（二兩）　人參

甘草（各半兩）

右水煎服

升麻葛根湯（方訣）治傷寒溫疫風熱壯熱頭痛體痛瘡疹

已發未發並宜服之。

即四物解肌湯。去黃芩。加甘草。

惺惺散（方訣）治傷寒時氣風熱痰壅欬嗽及氣不和。

桔梗　細辛　人參　甘草　茯苓

白朮　苦蔞根（各一兩）　薄荷（五片）　生姜（五片）

水煎服。一法。用防風二分。川芎一分。○幼幼莊氏家傳。

無白朮。有乾葛。

宣風散（方訣）治小兒傷風冷病。

檳榔　橘皮　甘草　牽牛

右水煎。

張渙葛根湯（幼幼）治小兒傷寒。體熱煩渴。

葛根　人參　麥門冬　甘草

茯苓（各一兩）　澤瀉（半兩）

薄荷三葉。生姜二片。水煎。

脫甲散（袖珍）治傷寒體熱。夾驚夾食。寒熱大小便閉澁。夾積傷滯腹急。日夜大熱。及驚癇客忤痘熱。

柴胡　當歸　龍膽　茯苓（各三分）

人參（二分）　知母（三分）　甘草　川芎（各二分）

右每服二匁。葱白三枚。水煎服。此方熱在表裏之間。施無不可。○兒科方要去茯苓。人参川芎。加芍藥。地骨皮。鱉甲。黄連。名鱉甲退熱散。治疳勞發熱。

連翹飲（活人）治小兒一切熱。

連翹　防風　甘草　梔子（各等分）

右水煎服。

清肌散（幼幼）治小兒初春。不問有病無病。但宜服。踈解積熱。

當歸　大黄　人参（各一両）　芍藥　甘草

犀角（各半両）

竹葉二片水煎服。

四順散（幼幼）治小兒風熱肌瘦。五心煩熱。不長肌肉。面黄痿瘦時發虛汗。難服凉藥。

柴胡　地骨皮　桔梗（各三分）　甘草（半分）

右水煎服。

越桃飲子（幼幼）退小兒積熱。

山梔　甘草　大黄　芍藥（各一分）

連翹　黄芩（各三分）

右水煎服。（原方為末。蜜湯調下）

人參犀角散（幼幼）治小兒榮衛不和。上焦虛熱。因積變為肌熱。肌熱不已。變為疳勞。夜汗頰赤。多嗽不止

人參　茯苓　白朮（各半兩）　犀角　柴胡

鱉甲　甘草　半夏（各一分）

右姜棗煎。

茅先生胡黃連散（幼幼）治小兒諸渴。及疳渴。及解諸般熱。

胡黃連　麥門　乾葛　玄參　甘草

枇杷葉

右等分。生姜一片水煎。

黃耆茯神散（經驗良方）治小兒榮衛氣虛。精神不爽。面無顏色。唇口青白。噦逆昏睡。全不思食。身體微腫。

黃芪　茯神　南星○　扁豆　防風

白附　肉桂　芍藥　山藥（各等分）

右姜棗水煎。

六神散（三因）

人參　白朮　茯苓　山藥　白扁豆

炙甘（各等分）

生姜二片。棗一箇。水煎。此藥用處甚多。治胃冷。加附子。治風証。加天麻。治痢。加罌粟殻。○醫說。小兒發熱。氣不歸元。而陽浮於外。再發熱。本方。加粳米。聶氏。更加烏梅。○幼幼。趙氏六神湯。本方。無白扁豆。有黄芪。治胃虚多困。不思乳食。○又王氏人參白扁豆散。即本方加罌粟子。治脾胃不和。不思飲食。吐瀉。○又毛彬銀白散。本方加半夏。罌粟米。治痰逆不食。

益黄散方訣治脾胃虚冷（又名補脾散）

陳皮（一兩）　青皮　訶子　甘草（各半兩）

丁香（二錢）

右水煎服。

白朮散方訣治積痛。專和脾胃。生津液。（得効。一名清寧散。）

人參　白朮　木香　茯苓　甘草

藿香（各一兩）　乾葛（二兩）

右水煎服。○局方去白朮。名人參散。止嘔逆。除煩渴。

藿香散方訣治脾胃虚有熱。面赤嘔噦涎嗽。及轉過度者。

麥門　半夏　甘草　石膏（各半兩）

藿香（一分）

右水煎服。

半粟散（方訣）治小兒脾胃虛寒。吐瀉等疾。

半夏（一两）　陳粟米（三分。陳粳米亦得）

生姜十片水煎。

惺惺散（幼幼）治久瀉脾困。不思乳食。恐作脾風。

天麻　全蝎（炒各半两）　木香　糯米

人參　茯苓　匾豆　山藥

甘草（各一錢）

棗半片。水煎服。○永類鄭氏云。小兒嘔吐。但吐不瀉。爲逆。吐而有痰發驚者危。治之當斷乳。但與稀粥。

山薊湯（揚氏）治小兒胃氣怯弱。乾噦嘔吐。精神昏困乳食全減。

人參　茯苓　白朮　甘草　藿香（各二錢半）

丁香（一錢）　糯米（一百粒。炒令黃）　白萹豆（三十粒）

右姜棗水煎。

生犀人參散（葉氏）治小兒胃氣虛弱。及虛熱潮作。

人參（二两）　桔梗　乾葛　茯苓（各半两）

犀角（一两半）　白朮　甘草（各半两）

棗一箇水煎。如瀉入灯心七莖。如傷寒用淡竹葉七片。

藿香散（百一）治小兒脾胃虛弱。乳食不調。時作身熱。或吐瀉。

藿香　人參　茯苓　丁香（各一分）

右水煎服。

雙金散（百一）治小兒吐瀉。

丁香　人參　甘草（各一分）　白朮

茯苓（各半兩）　半夏（半分）

姜二片。棗二箇。水煎。

清膈飲子（幼幼）治小兒伏暑嘔吐。

香薷　竹葉（各一兩）　茯苓　人參　半夏

檀香　甘草（各半兩）　糯米（一合）

右水煎服。

白朮散（本事）治小兒嘔吐。脉遲細有寒。

白朮　人參（各二分）　半夏（半分）　茯苓

炮姜　甘草（各一分）

姜三片。棗一枚。水煎。○易簡名增損白朮散。

麥門冬散（本事）治小兒嘔吐。脉數有熱。

即白朮散去白朮。炮姜。大棗。加麥門冬。

梅月天時行瀉。香葛湯每服生姜二片。豆豉五粒。水一盞煎。得効即十神湯（方見傷寒）去麻黄。加蒼朮。

大柴胡湯得効治下痢。舌黄口燥。胸滿作渴。身熱腹脹譫語。此必有燥屎。服此下之。后與止藥。

益脾散（兒科方要）治小兒水腫。補中行濕。

白朮（一兩半）　甘草（五分）　薏苡　澤瀉　神麯

半夏　茯苓（各八分）　赤豆（一百粒）　薄荷　茵蔯（各一分）

水姜煎服。元氣不足加人參（七分）。

赤茯苓散（聖惠）治小兒痰實壅悶。時復嘔不欲乳食。

赤茯苓　朴硝（各半兩）　甘草　陳皮

旋覆花（各一分）　生姜（棗子大）

水煎服。

貝母散聖惠治小兒欬嗽。咽喉不利。狀如呀者。

貝母　紫苑　麻黄（各一分）　麥門　甘草

杏仁（各半分）

右水煎服。

紫蘇子散（方訣）治小兒欬逆上氣。因乳哺無度。内挾風冷。

傷於肺氣。或小兒啼氣未定。與乳飲之。乳與氣相逆。氣不得下。

紫蘇子　訶子　蘿蔔子　杏仁

木香　人參（各三兩）　青橘皮　甘草（各乙兩半）

生姜三片。水煎服。

瀉白散（方訣）治小兒肺盛氣急喘嗽。（又名瀉肺散）

桑白皮　地骨皮（各一兩）　甘草（半兩）

粳米百粒。水煎服。

補肺散（方訣）治小兒肺虛氣粗喘促。

---

阿膠（一兩半）　黍粘子　甘草（各一分）　馬兜鈴（焙半兩）

杏仁（七箇）　糯米（乙兩）

右水煎服。○心書。去黍粘子。加茯苓。

治呀（保童秘要）

桔梗　甘草（各一分）　朴消（三分湯成下）

右以水五合。煎取一合。分作兩服。

麥門清肺飲（保赤）咳甚。氣喘。連聲不住。名為頓嗽。甚至飲食湯水。俱嗆出。或欬出血。此熱毒乘肺而然也。

天門冬　款冬花　桑白皮　貝母

麥門冬　馬兜鈴　地骨皮　知母

杏仁　牛蒡子　甘草　桔梗

水煎食後温服。

白附飲（兒科方要）頓嗽者。小兒欬即嗆頓連聲。嗽則臉紅吐即嗽止。嗽久不已。眼腫而目中白珠起。有紅絲者。即不可用涼藥。

白附子　枳實　防風　全蝎

膽星　天麻　半夏（各一匁）　姜蚕

官桂　丁香　木香（以上三味。若痰中有血當去之目紅可用。）

甘草（各四分）

生姜煎服。

清脾飲（錦囊）治脾經蘊熱滯頤。

人参　黄連　半夏（各四分）　茯苓（八分）

山藥（六分）　米仁　石膏（各一匁）　石斛（五分）

加蓮子七粒。燈心七莖。水煎服。

鶴蝨散（聖惠）治小兒多吐蛔蟲。

鶴蝨　大黄（各一分）　朴硝（半両）

右水煎服。

治小兒蟲証腹痛啼哭。如口角青者。蟲証也。抱起稍止。臥之則大啼。蓋臥則蟲攻上。起則蟲攻下故也。以平胃散加生硫黃一粒如小指大。煎服。痛即止。（經驗良方）

當歸散（指要）治癩疝。陰核氣結。腫大而吊痛。痛不能忍。

辣桂　牽牛（微炒各半兩）　當歸　大黃

桃仁（各二兩半）　全蝎（一兩半）

右入蜜煎服。以利大便。利後。青皮。陳皮。茯苓。木香。縮砂。甘草。和胃。惡症。唇青不治。

烏梅散（心書）治腹疼。及初生冷痛疝。夜啼。陰囊腫

烏梅　玄胡索　粉草（各五分）　乳香

沒藥　鈎藤（各二分）

右水煎服。

五苓加車前子薏苡水煎（心書）治陰囊赤腫脹痛。

調中散（全幼）治小兒盤腸氣。腹內築痛。

青木香　川楝子　沒藥　人參

茯苓（各半分）　桂（二分半）　牽牛子（炒一半生一半二十五粒）

右葱白半寸。鹽一捻。煎服。

升麻飲子（保童秘要）治小兒丹毒。赤如烟脂。或稍帶白色。

升麻　黄芩　梔子　通草（各一分）

犀角　大黄（各半分）　朴消（三分。湯成下）

右水煎。

紫圓（千金○幼幼引葛氏肘後）治小兒變蒸發熱不解。并挾傷寒温壯。汗後熱不歇。及腹中有痰癖。哺乳不進。乳則吐哯。食癇先寒後熱。

赤石脂　代赭（各一兩）　巴豆（三十粒）　杏仁（五十枚）

右為末。巴豆杏仁別研為膏。相和。更擣二千杵。入少蜜同擣之。密器中収。三十日兒服如麻子一丸。與少乳汁令下。若熱未全除。明旦更與一丸。百日兒服如小豆一丸。以此準量増減。此丸無所不療。雖下不虚人。○肘後用巴豆四十枚。○王氏易簡云。一名醫云。小兒乳哺不節。化為痰癖。痰滿則搐。日久為癇。愼勿以驚藥投之。宜毎日隨兒大小。以此藥與之。一以消乳食。使痰氣隨下。其証自然磨退。良妙。此藥。固是小兒之妙藥。余以此治大人因滯吐証。極効。又一切痢疾。亦先服數十圓。然後治痢尤切當。（醫方類聚引）

二物石膏湯（千金）治少小中風。手足拘急。

石膏（三分）　真珠（一两）

右同研匀細為末。三四歲兒每服一錢匕。水七八分煎至四分。去滓温服。日三。量兒大小。以意加減。（右煎法依聖濟）

黄耆丸（聖惠）治小兒羸瘦。體熱。面色萎黄。不欲乳食。

黄芪　芍藥　人參　胡黄連　甘草（各半两）

麥門　鼈甲（各一两）　柴胡（三分）

右為末。錬蜜和丸如麻子大。以粥飲下五丸。

蝦蟆丸（幼幼）殺蟲。去骨蒸。

蝦蟆（一箇。去腸爪甲。用姜汁塗炙黄乾別研）　蘆薈　宣連（各二分）

胡黄連（一分）

右為末。取獖猪膽汁。為丸菉豆大。每服三丸。飯飲下。日三。○楊氏去蘆薈。加蕪荑。名五蟾圓。治五疳羸瘦。頭髮作穗。面黄。煩渴。潮熱往來。

治小兒盜汗（衛生易簡）寒熱往来。用胡黄連。柴胡。等分為末。蜜丸如鷄頭大。每服二丸。銀器中以酒少許化開。入水五分。重湯煮二三十沸。放温。食後和滓服。

補腎地黄丸（心書）治禀賦不足。腎氣虛弱。骨髓枯竭。顖大頭縫不合。體羸。語遲。行步多難。齒生緩者。

山藥　山茱萸　熟地黃（各五匁）　鹿茸（酒炙）
牛膝（酒洗各四匁）　丹皮　茯苓（各三匁）　澤瀉（二匁）

右焙爲末。煉蜜圓作麻仁大。每服十五丸至三十丸。鹽湯下。○寇氏心鑑。去澤瀉。更加人參。

六味地黃丸加紫河車（醫學大全）解顱。乃先天稟受本虧。乳食不調。生面多病。是以頭顱分解。惟此方爲丸服之自合。用之屢效。

四黃丸（類萃）治肺熱龜胸。

黃連　黃芩　大黃　胡連
山梔　柴胡（各五匁）　青黛　甘草
香附（各三匁）

爲末。猪膽汁爲丸菉子大。每服百丸。姜湯下。日三服。

陰陽二勝散（蘇沈）治久患飜胃。及小兒驚吐。諸吐。並醫。又名田季散。

好硫黃（半兩細研）。　水銀（一分與硫黃再研無星）

右同研如黑煤色。每服三錢。生姜四兩取汁。酒一琖。同姜汁煎熱調藥。空心服。衣被蓋覆。當自足指間汗出。迤邐徧身汗出即瘥。守庫卒李吉。治三年反胃。楚人田醫

善治小兒諸吐。並此藥也。小兒量長少。服一錢至一字。冷水調下。吐立定。此散極浮難調。須先滴少水。以至緩緩研殺。稍稍增湯。使令調和。若頓入湯酒。盡浮泛。不可服。○方訣名二氣散。活幼口議。名青金丹。

立効散（經驗良方）治小兒十六風熱吐不止。累經効。

川甜消（一匁）　桂府滑石末（三匁）

右研匀。每服半錢。漿水少許。生油一兩點打匀同調服。極者三服必定。兒大者每服一匁。忌生魚菓實。

香雲散（醫林方）治小兒吐瀉不止。

---

硫黃（二匁）　滑石（四匁）

右為細末。每服一二錢。米飲湯調下。

二黃散（呉氏集驗）治小兒未周歲吐瀉下血。此因乳母氣血勞動。或熱乳傷胃。

雄黃　大黃　五靈脂

右等分為細末。每服一字。以磨刀水下。

乳附元（永類）治藏寒胃冷。泄瀉氣虛。便青白膿。心腹疼痛。叫啼有汗。

附子　乳香　當歸　訶子　桂心

乾姜　吳茱萸（各等分）

右為末酒糊元小豆大月内兒一元釣藤湯或米飲下。空心大小加減服。

神仙救生散（全幼）治小兒痢疾赤白晝夜百十行不止。

檳榔（炒赤皮）　罌粟殼（炒黃焦色各五錢別搗為細末用銅鍋炒）

右二味各自收用和勻紅痢蜜湯白痢沙糖湯赤白痢沙糖蜜同煎湯食前調化服。

半夏圓（心書）治痰証神妙若驚搐後風涎潮作服之尤驗。

即消痰茯苓圓（方見臂痛門）

黑散子（幼幼）治小兒涎壅欬嗽吐逆。

南星　半夏　牙皂　巴豆　白礬

右等分入瓦鑵子用火煅存性每用半錢薺汁調下或麥冬桑皮湯入蜜調下。

惠眼觀證海漂消散（幼幼）小兒定喘。

海漂消（乃浮石也）　牡蠣　馬兜鈴　木香（各二兩）

牽牛子（一兩）

右為末每服半錢用生姜煎湯調下不得近鹽醋。

玉訣貝母丸（幼幼）治小兒齁齁。

貝母　南星（姜汁製）　人參　茯苓

甘草　白附（各等分）　皂角子（七箇）

右為末。錬蜜丸。每服五七丸。薄荷湯呑下。

惠眼觀證甘瓜散（幼幼）治小兒齁鮯。

瓜蒂　甘草（炙各二匁）

右為末。每服一大錢。五更初。用茶清調下。小兒半錢。

王氏墜痰丸（幼幼）治小兒痰實欬嗽。壯熱生驚。呀呷喘滿。

頭痛心忪。胸膈不利。心嘈惡心。

半夏（一兩。姜製）　南星（米泔水浸切作片子。炙）　薄荷　茯苓

枯礬　人參（各半兩）

右為末。姜汁打麪糊為丸。每服七丸至十丸。薄荷湯下。

滴金散（葉氏）化痰止嗽。

馬牙硝（半兩）　黃丹　白礬（各三匁）

右研細。入小罐子內。用物蓋。以赤石研細。水調成糊。塗縫。再用黃泥固濟。火中燒通赤。取出。候冷。入朱砂末一匁半。同研令極細。每挑二字末。甘草煎湯調下。

如聖散（活幼全書）治諸喘諸嗽。或十年。或二十年。諸藥治不差者。

蝙蝠（一箇。去頭燒令焦）

右為末。每服二錢。米飲湯無時調服。

碧玉丹（醫商）意治頓嗽無時。連聲不已與食吐出而止。

天花粉（六分）　南星（姜礬牙皂湯煮熟）　膽南星（各四分）

石膏（煅六分）　青黛（二分）　冰片（六釐）

共為細末。白蜜調。每服三四歲者。一分五分。週歲者錢許。服後片時仰臥。忌食油醋葱韭醎辣等物。

張渙溫脾丹（幼幼）治小兒滯頤。

半夏　丁香　木香（各一兩）　乾薑

白朮　青皮　陳皮（各五分）

右末。麪糊丸如黍米大。一歲拾丸。米湯下。

苦楝根散（聖惠）治小兒腹藏有蛔蟲。

苦楝根　鶴虱　薏苡根　檳榔

牽牛子（各一兩）　糯米（一分）

右為散。三歲兒。每服以粥飲調下半錢。日三服。

古今錄驗牡丹五等散（外臺）療癩疝陰卵偏。大有氣上下脹大。行走腫大。

牡丹　防風　黃蘗　桂心（各一分）　桃仁（二分）

右為散。以酒服一刀圭。小兒以乳汁和。如一大豆。

嬰孺芍藥丸（幼幼）治陰㿗氣疝。發作有時。

芍藥　茯苓（各三分）　大黃（二分）　半夏（一分）

桂心　胡椒（各半分）

右為末。蜜丸。酒下大豆大十元。日三。○聖濟以蜀椒代胡椒。

海蛤散（幼幼）治小兒疝疾偏墜。

海蛤　茴香（炒香各三分）　薏苡仁　白朮

檳榔（各半兩）

右為散每服半錢。以溫酒調下。

金鈴散（幼幼）治小兒驚疝及五般疝氣。陰腫。先服下涎寬氣。

青皮　莪朮　陳皮　茴香　三稜

甘草　川楝子

右等分為末。入鹽少許。水煎服。

治弔氣（朱氏集驗）○案弔氣卽弔疝。

鈎藤　乾姜　甘草

右為末。湯點下。

治百二十日内陰囊腫如柿大者。（朱氏集驗）

大黃　黃連　黃芩　黃栢

右等分焼留性為末。以雄猪膽汁調抹服。則消毒散血。

治小兒陰囊忽虛腫痛者。（朱氏集驗）

生甘草汁。調地龍糞。輕輕塗之。

水萍散（活幼全書）治小兒陰囊腫大。色如琉璃。

浮萍草為末。三歲兒服一錢。煎葱白湯調下。

乳沈膏（永類）治盤腸氣弔。軀身啼叫。面紅青黑不定。大便青白。嬭片不化。

附子（炮二匁）　乳香　當歸（各一匁）　麝香

沈香（各一字）

右丸製湯使。與上乳附丸同。

牛黃解毒丸（保嬰撮要）治胎毒瘡癤及一切瘡瘍。

牛黃（二匁）　甘草　金銀花（一兩）　草紫河車（五匁）

右為末。煉蜜丸。量兒服。（頭面瘡門不用河車）

文政二己卯年孟夏
聿脩堂觀聚方要補刻成

書肆

東都　須原屋茂兵衛
皇都　風月庄左衛門
同　勝村治右衛門