k 59

F
カ-97

疳症

錢仲陽云小兒諸疳皆因病後脾胃虧損或用藥過傷不能傳化乳食内亾津液虚火妄動或乳母六淫七情飲食起居失冝致兒爲患五臓之疳不同當各分辨肝疳者一名風疳其症白膜遮睛或瀉血羸痩心疳者其症面黄頰赤身體壯熱脾疳者一名肥疳其症肢體黄痩皮膚乾澁多生瘡疥腹大食土肺疳者一名氣疳其症喘嗽不已口鼻生瘡腎疳者一名骨疳其症肢體削痩遍身瘡疥喜臥湿地楊氏云又有疳傷者五臓虫疳也其名甚多姑挙其要虫疳者

490.9
Ka-16
No. 2560
12 K59
慶應義塾大学医学情報センター
昭和47年7月4日
富士川文庫
1507

其虫如絲出於頭項腹背之間黄白赤者可治青黒
者難療蛔疳者皺眉多啼嘔吐青沫腹中作痛肚脹
青筋唇口紫黒頭揺歯痒脊疳者身熱羸黄煩渇下
利拍背有声脊骨如鋸歯十指皆瘡頻齧爪甲腦疳
頭皮光急滿頭餅瘡腦熱如火髪結如穗遍身多汗
顋高疳渇者日則煩渇飲水不食夜則渇止疳瀉者
毛焦唇白額上青紋肚脹腸鳴瀉下糟粕疳痢者停
宿滞水穀不聚瀉下悪物疳腫脹者虚中有積肚腹緊
脹脾復受濕則頭面手足虚浮疳勞者潮熱往来五
心煩熱盗汗骨蒸嗽喘枯悴渇瀉飲水肚硬如石面
色如銀無辜疳者腦後項辺有核如弾丸按之轉動
軟而不疼其内有虫不速針出則内食臓腑肢體癰
疽便利膿血壮熱羸痩頭露骨高相傳兒衣夜露爲
鵰鳥羽所汚亦致此症若手足極細項小骨尻削體
痿腹大臍突號哭胸喘名丁奚若虚熱往来頭骨分
開翻食吐虫煩渇嘔噦名哺露若牙歯蝕爛名走馬
疳蓋歯属腎腎虚受熱疳火上炎致口臭歯黒一盛則
齦爛牙宣大抵其症雖多要不出於五臓治法肝疳
用地黄丸以生腎心疳用安神丸以治心異功散以
補脾脾疳用四味肥兒丸以治疳五味異功散以生

土肺疳用清肺飲以治肺益氣湯以生金脳疳亦用
地黄丸無辜疳用大蕪荑湯蟾蜍丸丁奚哺露用肥
兒丸大蘆薈丸走馬疳敷雄黄散服蟾蜍丸若作渴
瀉痢腫脹勞瘵等類當詳參方論而治之蓋疳者乾
也因脾胃津液乾涸而患在小兒為五疳在大人為
五勞總以調補胃氣為主也

治驗

陳職方孫三歳面頰患瘡沿蝕兩目肚大青筋小便
澄白此肝疳之症也用大蕪荑湯二劑而愈

陳司廳子遍身生瘡面色痿黄腹脹内熱大便不調
飲食少思倦怠口乾為肝脾疳症用大蘆薈丸不月
而痊

陳工部長孫腹内一塊小便不調或用行氣破血等
藥発熱口乾體瘦懶食面黄兼青幾成瘵症以補中
益氣湯煎送大蘆薈丸四服又用前湯加車前子煎
送六味丸四服又用清肝生血之藥而痊

一女子十二歳目生白翳面黄浮腫口乾作瀉用四
味肥児丸而痊
一小児頭揺目劄口渇下血此肝經血虚風熱也用
地黄丸而痊若肝經實熱兼用瀉青丸蓋虚則補其
母實則補其子也
一小児十一歳両耳後腦下各結一核色不変不痛
而面色痿黄體倦口乾去後不調用蘆薈丸治之諸
症頓愈
一小児鼻外生瘡不時揉擦延及両耳又一小児視
物不明鼻内或痒或生瘡用四味肥児丸並愈
一小児水入耳内耳外生瘡膿水淋漓經歳不愈余
謂肝火上炎用大芦薈丸而愈
一小児遍身如疥或痒或痛肌體消瘦日夜発熱口
乾作渇大便不調年餘不愈用九味芦薈丸而愈
一小児數歳腦後並結二核肉色如故亦不覚痛用
於大芦薈丸以清肝脾佐以地黄丸補腎水形體健
而核自消
一小児腹内結塊小便不調此肝疳内癖也用龍膽
瀉肝湯及九味芦薈丸而痊
一小児自生後両目赤腫或作痒或生翳此胎稟用 肝カ

次用芦薈丸六味地黄丸而痊

一小兒患瘰癧小便頻數兩目連劄作嘔少食泄瀉後重用補中益氣湯六味地黄丸漸愈佐以芦薈丸而痊

一小兒食瀉土困睡泄瀉遍身如疥此脾經内外疳也用六君子湯肥兒丸而愈

一小兒面黄頬赤発熱作渴睡中驚悸此心經内外疳也用秘旨安神丸而痊

一小兒患前症兼掌心發熱遍身如疥用安神肥兒二丸而愈

一小兒咳嗽寒熱咽喉不利鼻上有瘡久不結痂此肺經疳症也用地黄清肺飲而愈

一小兒下疳潰痛尿黑面黧遍身生疥此肝經内外疳也用地黄芦薈二丸而痊

史小參幻子二歳項後結核不時仰呌或以為熱瘡内潰用針決之服消毒之薬後曲腰啼哭余謂此名無辜疳仰身而哭外瘡症也曲腰而啼内瘡症也元氣敗矣果歿

一小兒四肢消瘦肚腹漸大寒熱嗜卧作渴引飲此肝脾疳症名丁奚哺露用白术散為主佐以十全丹

月餘諸症漸愈乃以異功散加當歸乃六味丸而症

一小児患疳虚症悉具熱如火矣病状不能盡述朝用異功散夕用四味肥児丸月余諸症稍愈佐以九味地黄丸自能行立遂朝以六味地黄丸夕以異功散及蚵蟆丸而痊

一小児四肢消痩肚腹脹大行歩不能作渇発熱去後臭穢以十全丹数服諸症漸愈又用異功散肥児丸調理漸愈

大蘆薈丸　治疳殺虫和胃止瀉

胡黄連　黄連　白蕪荑（去扇）　蘆薈　鶴虱（微炒）

木香　白雷丸（破開赤者不用）　青皮（各半両）　麝香（二銭另研）

右為末粟米飯丸菉豆大毎服一二十丸米飲下

愚案前方肝脾疳積食積發熱目生雲翳或疳熱頸項結核或耳内生瘡肌體消痩發熱作渇飲食少思肚腹膨脹或牙齦蝕落頬顋腐爛或陰嚢玉茎生瘡或胸脇小腹作痛並効内青皮以竜膽草代之麝香不用尤効

六味肥児丸　消疳化虫退熱

黄連　陳皮　神麹（炒）　川練子（去核炒）　麥蘗（炒各一両）

白蕪荑（半両）

右為末糊丸麻子大毎服一二十丸空心米飲呑下

愚案前方又治脾疳飲食少思肌肉消瘦肚大頸細髪稀成穗項間結核發熱作渴精神倦怠大便酸臭嗜食泥土或口鼻頭瘡肚見青筋囓齒下痢便白五疳用此丸加乾蟾一兩蕪荑五銭尤妙

蚵蟆丸　治無辜疳症一服虚熱退二服煩渴止三服瀉痢住

蟾蜍一枚（夏月溝渠中腹大不跳不鳴身多癩癗者）

右取糞蛆一杓置桶中以尿浸之桶上要乾不令蟲走出却將蟾蜍撲死投蛆中食一晝夜以布袋盛置浸急水中一宿取出瓦上焙為末入麝香一字粳米飯揉丸麻子大毎服二十丸米飲下

愚按前方又治無辜疳症面黄壯熱不食舌下有蟲或腦後有核軟而不痛中有粉蟲隨氣流散侵蝕臓腑便滑膿血目漸黄瘦頸大髪竪手足細軟變生天瘹瘈瘲鵝口木舌懸癰重腭口噤臍風撮口重舌亀背亀胸一十二種敗症急用蟾蜍丸大蕪荑湯治之多有生者

生熟地黄湯　治疳眼閉合不開

川芎　赤茯苓　枳殻（製）　杏仁（去皮）　川黄連

半夏麹　天麻　地骨皮（各二戔半）　甘草（炙二戔半）

生地　熟地（各半両）

右毎服二戔、黒豆十五粒、薑水煎服ス

嚏疳散　治ス疳ヲ

蘆薈　黄連（各一戔）　麝香（少許）　瓜蒂　蝦蟇灰（各五分）

猪牙皂角（五分）

右為末ト、吹キ入レ鼻ニ、嚏スレハ則可シ療ス也

脂連丸　治ス五疳潮熱腹脹髪焦ヲ

胡黄連（半両）　五霊脂（一両）

右為末ト、獖猪膽汁ニテ丸シ麻子ノ大ニ、米飲ニテ下ス

茯苓丸　治ス心疳驚疳ヲ

茯神　蘆薈　琥珀　川黄連（浄各三戔）　赤茯苓（三戔）

釣藤皮　遠志肉　蝦蟇灰（各三戔）　石菖蒲（一戔）

麝香（少許）

右為末ト、粟米ニテ丸シ麻子ノ大ニ、薄荷湯ニテ下ス

神効換肌丸　治ス脾疳肌痩潮熱盗汗泄瀉糟粕頭大腹急ナルヲ

胡黄連（炒）　鼈甲（酒製）　肉豆蔲（煨）　史君子（麹裹煨）

神麹（炒）　麥芽（炒各半両）　麝香（五分）　訶子肉（一戔半）

右爲末糊丸芥子大木湯下

天麻丸　治肝疳風疳疳眼
青黛　川黄連　天麻　五靈脂
夜明砂（微炒）　川芎　芦薈（各二戔）　蟬退（去足）
龍膽草　防風（各一戔半）　全蝎（二枚焙）　麝香（少許）
乾蟾頭（炙焦三戔）
右爲末猪膽汁浸糕丸麻子大毎服十丸薄荷湯
下

化䘌丸　治諸疳生蟲不時啼哭嘔吐清水肚腹脹
痛唇口紫黑腸頭濕䘌
蕪荑　芦薈　青黛（乾）　白芷梢
胡黄連　川黄連　蝦蟇灰（各等分）
右爲末猪膽汁浸糕糊丸麻子大毎服一二十丸
食後臨臥杏仁煎湯下其鼻常用熊膽煎湯筆蘸
洗俟前藥各進數服却用青黛當歸赤小豆瓜蒂
地楡黄連芦薈雄黄爲末入鼻瘡歛

靈脂丸　治脾疳食疳
白豆蔻　麥芽（炒）　五靈脂　宿砂　蓬朮（煨）
青皮　橘紅　史君子（各焙二戔）　蝦蟇（炙焦三戔）
右爲末米糊丸麻子大毎服十丸米湯下

下蟲丸　治二疳蛔諸虫一

新白苦楝根皮（酒浸焙）　木香　緑包貫衆

桃仁（浸去皮）　蕪荑（焙各二銭）　鶴虱（炒一銭）　鷄心檳榔（二銭）

軽粉（五分）　史君子（五十取肉煨）　乾蝦蟇（炙焦三銭）

右為レ末麪糊丸二麻子大一毎服一二十丸天明清肉汁下内加二當歸川連一各二銭五分

龍膽丸　治二腦疳腦熱瘡一

龍膽草　升麻　赤茯苓　苦楝根皮（焙）

防風　芦薈　油髮（灰各三銭）　青黛（乾）

黄連（浄各三銭）

右為レ末犺猪膽汁浸糕糊丸二麻子大一薄荷湯下仍以二芦薈末一入レ鼻

黄連丸　治二疳勞一

黄連（半兩浄犺膽汁浸晒）　石蓮　瓜蔞根　杏仁（浸去皮焙）

烏梅肉（各二銭）

右為レ末牛膽汁浸糕糊丸二麻子大一煎二烏梅薑蜜湯一下

香蔲丸　治二疳瀉一

黄連（炒二銭）　肉豆蔲　木香　訶子肉（煨）　砂仁

茯苓（各一銭）

右爲末飯丸麻子大米飲下

木香丸　治疳痢

黄連（淨三錢）　木香　紫厚朴（製）　夜明沙（隔紙炒各二錢）

訶子肉（炒一錢）

右爲末飯丸麻子大乾艾生姜煎湯食前下

十全丹　治丁奚哺露

青皮　陳皮（各去白）　川芎　白豆蔻仁

五霊脂　雞心檳榔　芦薈（各五錢）　木香

史君子（焙）　蝦蟇灰（各三錢）

右爲末猪膽汁浸糕糊丸麻子大毎服一二十丸

米飲下有熱薄荷湯下

湯氏十全丹　治前疳

檳榔　青皮　陳皮（去白）　枳殻（湯浸去穰麩炒）

丁香　木香（各二錢五分炮）　香附子（炒一兩）

右爲末神麴糊丸黍米大毎服三十丸空心食前

米飲下

愚按前症因乳哺不調傷損脾胃不思飲食氣血日損四肢日瘦肚腹漸大是名丁奚呼吸少氣汲々苦熱謂之哺露屬形病俱虚雖用前藥宜佐以異功散壯脾胃以行藥勢

鱉血煎　治疳労

蕪荑　紫胡　川芎（各一両）　人参（半両）

史君子（二十一箇）　胡黄連　宣黄連

右用鱉血一盞呉茱萸一両和二黄連淹一宿次早炒乾去茱萸并血用二連入餘茱末粟粉糊丸麻子大食前熱水下

地黄清肺飲　治肺熱疳蝕穿孔或生瘜肉或鼻外生瘡

紫蘇　前胡　防風　赤茯苓　黄芩

當帰　連翹　天門冬（去心）　桔梗　生地黄

甘草（炙各二銭）　桑白皮（炒半両）

右毎服二銭水煎服次用化䘌丸

九味地黄丸　治腎疳

史君子（肉）　赤茯苓　川練子　山茱萸（肉）　當帰

川芎　牡丹皮　山薬（各二銭）　熟地黄（四銭半）

右爲末蜜丸桐子大毎服八十丸空心温酒下

東垣大蕪荑湯（一名梔子茯苓湯）治黄疳土色爲湿爲熱當利小便今反利（知黄色中爲燥胃経熱也）髪黄脱落（知膀胱腎倶受土邪乃大湿熱之症）鼻下断作瘡（上逆行営氣伏火也）能乳（胃中有熱也寒則食不入）喜食土（胃足也）面黒色（爲寒為痺）大便清（寒也）褐色

（熱蓄血也）闇黄色腸胃有熱當滋榮潤燥外致津液
黄栢　甘草（炙）　羌活（各二分）　柴胡（三分）　防風（一分）
白朮　茯苓　大蕪荑（各五分）　山梔仁（三分）
麻黄根　黄連（各一分）　當歸（四分）
右水煎服
硃砂安神丸　治心痵怔忡心中痞悶
硃砂（四戋）　生地黄　黄連（各半两）　生甘艸（二戋半）　銅青
軽粉（各五分）　蘭香葉（二戋燒灰）
右爲末乾敷上
白粉散　治痔瘡
海螵蛸（三分）　白芨（二分）　軽粉（一分）
右爲末先用漿水洗拭乾傅
六君子湯
異功散（二方見内鈎）
六味丸（方見腎臓）
四味肥兒丸（方見寒吐）
瀉青丸（方見肝臓）
龍膽瀉肝湯（方見疝氣）
補中益氣湯（方見虚羸）
白朮散（方見積滞）

二便色白

秘旨云小兒便如米泔或溺停少頃變作泔濁者此脾胃湿熱也若大便泔白色或如魚凍或帶紅黄黒者此湿熱積滞也宜理脾清滞去湿熱節飲食若忽然変青此是変蒸也不必用藥若久不愈用補脾制肝若心膈伏熱則成疳矣大抵多因乳哺失節脾氣有傷元氣下陥或乳母飲食七情所致小便如泔或大便泔白者用四味肥兒丸積滞黄黒者用四君子湯加黄連木香色青日久不復或黄泄瀉或腹痛者用六君子湯加木香芍藥若小便不利大便褐色髮黄脱落鼻下瘡痍用梔子茯苓湯乳食少思胸腹膨脹大便頻數用四味肥兒丸仍審乳母飲食七情主之也

治験

一小兒每食停滞大便色白而頻先用大安丸異功散少加炒黒黄連一二服後小水澄久如泔発熱體倦用四味肥兒丸而愈

一小兒患前症停食發熱先用大安丸而愈後患腹脹每後發熱用五味異功散而瘥

一小兒患前症兼自利用異功散加升麻柴胡而愈

但日晡微熱倦怠用補中益氣湯四味肥兒丸而愈

一小兒患前症服驅逐之劑手足並冷作渇少食此脾氣復傷也用六君升麻柴胡而瀉止又四味肥兒丸而愈

五味異功散（四方見内釣）

龍膽瀉肝湯（方見疝氣）

大安丸（保和丸加白朮　二方見虚羸）

四味肥兒丸（方見寒吐）

梔子茯苓湯（即大蕪荑湯　方見疳症）

大尾。

目録

小兒門

一急慢驚風　二諸疳
三癖疾　四感冒
五傷食　六腹脹
七腹痛　八泄瀉
九痢疾　十瘧疾
十一咳嗽　十二喘急
十三雜病　十四痘瘡
十五麻疹　十六水痘

前症之藥方以上九十六

小兒科

小兒諸病但見两眼無精光黒精無運轉目睫無蜂芒如魚眼猫眼之狀箇〻不治或神藏於内但外若昏困者無妨其有病篤而眼神氣不脫者猶可以活眼者五臟六腑神気之所發神氣已脫脉雖僅存亦未能保

一歳至六歳曰嬰孩以男左手女右手次指三関脉爲驗病輕重兒生之訣名曰虎口

第一節名風関無脉則無病有脉則病輕

第二節名氣関脉見則病重

第三節名命関脉見則病劇九死一生悪候也

三関通度脉候是極重之証必死

三関通度斜入指甲者不治

三関紋色主歌

紫熱紅傷寒青驚白色疳黒時日中悪黄即困脾

端

凡診小児大指按三部一息六七至平和八九至発熱五至内寒弦脉風癇沈緩傷食　七八歳曰齔九十歳曰髫始可以一指探掌後三部之脉以一息七八至為無病十一歳至十四歳曰童丱以一息五六至為常脉

急慢驚風

夫急驚之候因聞不常之声或驢馬禽獣之唬以致面青口噤或声嘶而厥発過則容色如故良久復作其身熱面赤引飲口鼻中気熱大小便黄赤惺々不睡蓋熱甚則生痰々盛則生風偶因驚而発耳

一鎮驚散　治驚風搐搦痰嗽喘熱

天南星　防風　蝉退　薄苛　甘草

右入姜煎服

按急驚之主方也初発時可与九丈加天麻白殭蚕

地骨皮而取験多

二 醒脾散　治小児吐瀉不止作慢驚風脾困昏沈黙々不食

人参　白朮　木香　全蝎　天麻
丁子　白附子　甘艸
右入姜棗煎服
按慢驚之主方也

三 敗毒散　治急驚風初起発熱手足搐搦上竄天吊角弓反張并一切感冒風寒頭痛發熱咳嗽喘急鼻塞声重及瘡疹欲出発搐並宜服之　方見于傷寒門

本方加天麻全蝎白殭蚕白附子地骨皮各ホ分

四 天麻湯　治急驚脾胃虚弱或変慢驚者

半夏七分　天麻二戔五分　甘艸炙　茯苓　白朮各二戔
右入姜三片磁器内水煮候乾為末毎服一銭五分姜棗湯調下

五 芎活湯　治急驚風角弓反張

人参　黄芩　杏仁　石膏各一戔　麻黄
甘艸炙　肉桂　川芎　葛根　升麻
當皈　獨活各三戔
右入姜水煎服

六 人参湯　最能利驚

小柴胡湯加防風枳殻

七 加味和中湯　治小児慢驚風

人参　白朮　各一戔　茯苓　陳皮　全蝎　各五分

半夏　天麻　各七分　薄荷　甘艸　各二分　細辛　三ケ

右入姜棗水煎服

八 啓脾湯　百病愈後俱用此薬調脾為主

蓮肉　一両　白朮　茯苓　山薬　神麹

山査子　各五分　人参　猪苓　沢瀉　藿香

木香　當帰　芍薬　辰砂　各三戔　肉豆蔲

三ケ　陳皮　二戔　甘艸　一戔　驚風後加辰滑各二戔

右為末任意姜湯調服初生児塗乳頭上服之

九 補脾益真湯　治小児胎稟怯弱外實裡虚因吧吐

乳泄糞色青而成慢驚風氣逆涎潮眼珠直視四

肢抽掣或因変蒸客忤而作或因特拘驚嚇而作

或因悞服鎮心寒涼薬而作

木香　當皈　人参　黄芪　訶子

丁子　陳皮　厚朴　肉豆蔲　甘艸　炙

草菓　茯苓　白朮　肉桂　半夏

附子　各七分　全蝎　一ケ

右入生姜煎服

○渇者去附子丁子肉豆蔻加人参牛染茯苓

○瀉者倍丁子訶子

○嘔吐者倍陳皮丁子半夏

○腹痛者加厚朴良姜

○腹脹者加厚朴丁子前胡枳殻

○咳嗽者加前胡玄参去附子肉桂草菓肉豆蔻

○痰喘加前胡枳壳赤茯苓去附子丁子肉豆蔻草
菓

○足冷加附子丁子厚朴

氣逆不下加前胡枳壳去當皈附子肉豆蔻

悪風自汗加黄芪肉桂

十
寛氣飲　治小兒風痰壅滿風傷於氣不能言語

枳壳　人参　天麻　羌活　白殭蚕（各三匁）

甘草（減半）

右毎服二銭用水一盞姜三片煎五分不拘時服
之

按予治慢驚口眼拘攣手足搐搦甚者用此湯得
數効見準縄幼科

十一
銭氏白朮散　（慢驚通用　方見消渇）

諸疳

内経曰数食肥令人内熱数食甘令人中満盖其病因肥甘所致故命名曰疳又恐食肥甘甚與夫凡菓生冷及一切烹飪調和之味朝飡暮食漸成積滞膠固以致身熱躰痩面色痿黄或肚大青筋虫痛瀉痢而諸疳之証作矣

十二

消疳飲　治小児疳疾身熱面黄肚大青筋痩弱

人参　白朮　茯苓　胡黄連　神麹
黄連　青皮　陳皮　砂仁　甘艸

右水煎傷食加山査子有虫加史君子

按諸疳通治之方也

十三

消疳丸　治五疳皮黄肥痩髪直尿白肚大青筋好食泥炭茶米之物或吐或瀉腹内積塊諸虫作痛

蒼朮　陳皮　厚朴　枳殻　檳榔
神麹　山査子　麦芽　三稜　莪朮
砂仁　茯苓　黄連　胡黄連　芦薈
蕪荑仁　史君子

右為末史君子殻煎湯泡蒸餅為丸弾子大毎服一丸清米湯化下

十四

黄芪湯　治小児疳労喘嗽虚汗骨蒸渇而腹瀉少

食
黄芪　人参　當歸　川芎　蝦蟆（炙去足）
生地黄　鼈甲（各一戔半）　茯苓　陳皮　半夏
柴胡　史君（各一戔）
右入姜棗水煎

△癖疾

銭仲陽云癖塊者癖兩脇痞結者否於中脘此因乳哺失調飲食停滞邪氣相搏而成或乳母六淫七情所致古人多用尅伐痞癖既久飲食減少脾氣必虚久而不愈先以固胃氣爲主使養正則積自除若欲直攻其結不惟不能善消抑亦損其脾土也

十五　消癖湯　治小児癖疾発熱口乾尿赤
人参　白朮　茯苓　半夏　柴胡
黄芩　猪苓　沢瀉　胡黄連　麦門
三稜　莪朮　山査　茸艸
右入姜棗煎服則立効
如癖病日久元気虧損此方不効宜多服醫王養正積自除按小児癖積之主方也

十六　抑肝扶脾湯　治小児癖疾日久不消元氣虚弱脾胃虚損肌消削肚大青筋発熱口乾吐腹脹滿

人参（五分） 白朮 茯苓 龍膽 白芥子
山査（各八分） 陳皮 青皮 神麹（各六分） 柴胡
胡黄連 甘艸（各三分） 黄連（姜製一匁）
右入姜棗煎服

十七 大連翹飲 治小兒傷風感冒發熱痰核顋赤癰癤眼目赤腫口舌生瘡咽喉疼痛小便淋瀝胎毒痘疹餘毒一切熱毒并治
連翹 句麦 滑石 車前子 牛房子（各八分） 赤芍薬（八分） 山梔子 木通 當皈
防風（各四分） 柴胡 黄芩 荊芥（各一戔二分）

蟬退（五分） 甘艸（一匁六分） 竹葉（十） 灯草（十莖）
右水煎服
○風疹骨蒸加麦门冬○實熱丹熱加大黄
○胎熱痘疹餘毒加薄荷○癰癤熱毒加大黄芒硝

十八 羚羊角散 治夜啼及多驚熱也
羚羊角 黄芩 犀角 茯神（各一分） 麦门（五分）
甘艸（少）
右水煎服

十九 生犀散 治心經虚熱
犀角（二匁） 地骨皮 柴胡 葛根 赤芍薬

各一匁　甘草五戔
右水煎服
二十 導赤散　治小兒小腸實熱小便秘赤
生地　木通　甘艸（炙各五分）
右入淡竹葉水煎服
△感冒
小兒傷寒与大人無異所異者夾食夾驚而已雜病
亦然
六一 惺々散　治外感風寒鼻塞痰嗽発熱
人參　白朮　茯苓　桔梗　細辛
甘艸　薄荷　瓜蔞根（各等分）
右水煎服一方加芍藥
六二 羌活湯　治風邪所傷頸目昏眩痰涎壅滞肢節煩
疼
羌活　前胡　麻黄　茯苓　川芎
甘艸（炙）　黄芩　枳殻　細辛　石膏
菊花　防風　蔓荊子（各ホ分）
右水煎服
六三 大羌活湯
羌活　獨活　防己　防風　黄芩

黄連　蒼朮　白朮　甘草　川芎

細辛（各二匁）　知母　生地（各一匁）

右水煎服

六四

脱甲散　治小児発熱頭疼日久不愈

麻黄　柴胡　當皈　知母　龍膽（各三分）

人参　川芎（各二分）　茯苓（二分半）　甘草（四両）

右入姜棗水煎服表不解加麻黄裏不解加大黄

六五

葛根湯　治太陽陽明無汗悪風發熱悪寒頭痛項背腰強目痛鼻乾不眠肢躰拘急骨節煩疼胸脇満悶不問一切傷寒温病時行寒疫等症兼治剛柔二痓

葛根（三匁）　麻黄（二匁）　芍薬（一匁半）　桂枝（一匁）　甘草（八分）

右入姜棗水煎服加黄芩二戔名葛根解肌湯

△傷食

傷食者宜消導也

六六

消食散　治小児傷食腹痛或脹満或宿食不消面色黄目無睛此薬能調和胃氣乳哺消化

山査子　神麹　砂仁　麥芽　白朮

陳皮　青皮　甘草

右入姜煎服

受寒作痛加藿香呉茱萸有熱加黄芩

按小児傷食之主方也

六十七

清中解鬱湯　治脾氣虚弱飲食停滞鬱熱生瘡或

身熱赤暈

白朮　茯苓　陳皮　川芎　桔梗

神麹　甘艸　麦芽　山査　山梔子（各等分）

右水煎服

六十八

大和散　治内傷乳食肚腹脹痛外感風寒頭疼發

熱宜服

紫蘓　陳皮　羌活　蒼朮　川芎

枳殻　神麹　麦芽　甘草　香附

山査（各等分）

右入姜水煎

六十九

銀白散

升麻　知母　山薬　人参　白朮

黄芩　白扁豆　甘艸（各等分）

右為末毎一銭沸湯調服治小児百病加減由人

○慢驚搐搦麝香飯湯下○急驚定後陳米湯下○

驚吐不止丁香湯下○天柱骨倒脚軟濃米湯下

○夾驚傷寒薄荷葱白湯下○疳氣肚脹氣急多

渇百合湯下○壯熱面赤驚叫金銀薄荷湯下○
赤白痢不思飲食及諸病後倦怠不思食姜棗湯
下○喫食不知飢飽不長肌肉芽姜湯下○暴吐蘇
風湯下○神形脱語言不正及大人吐瀉藿香湯
下○若稟受氣怯小兒可每日一服最妙也

△腹脹

夫腹脹由脾胃虚氣攻作也亦有實者必悶亂喘滿
可下之

三十
消脹散　治小兒腹脹

蘿蔔子　紫蘇　葛根　陳皮　枳殻（各等分）

甘少

右水煎服食少者加白朮

廾九
史君子丸　治藏府虚滑及疳瘦下利腹脇膨滿不思
乳食

史君一兩　甘艸炙　厚朴　訶子（半生半煨）　青黛（各五
分）　陳皮（二匁三分）

右爲末煉蜜丸芡實大每服五丸米飲化下

△腹痛

腹痛面黄只是積間有寒熱相擊面赤爲熱面白寒
冷熱不調多嘔逆心腹俱痛面皖白光口中吐沫虫

攻的也。

廿二
凡小児腹痛多是飲所傷宜此湯
白朮（二匁半） 陳皮 青皮（各七分） 山査 神麹
砂仁 麥芽（各一匁） 甘艸（炙五分）
右為末米飲或白湯下有寒加藿香呉茱萸有熱
加黄芩

廿三
乳頭散 治夜啼不止腹中疼痛
黄芪 木香（各等分）
右為末少許著乳頭上使吮乳就服之

廿四
六神散。 治腹痛啼哭面青口中冷氣四支亦冷
曲腰而啼或大便泄瀉青白糞及不吮乳
四君子湯加山薬白扁豆
右入姜棗水煎服
凡腹痛通用大七氣湯見積聚 香砂平胃散宜用見内
傷

廿五
人参散 治嘔逆
人参 白朮 半夏 干姜 桑白
陳皮（各等分） 甘艸（少）
右入姜棗水煎服

廿六
定吐飲 治吐逆投諸薬不止服此神効

半夏（二両）生姜（一両）肉桂（三戋）

右姜切作小塊如菉豆大同半夏和匀入小鐺内慢火須手炒令香熟帯乾方下肉桂再炒匀微有香氣以帋攤開地上去火毒候冷略播去黒焦末毎服二銭水一銭姜三ケ煎七分空心少与緩服

△泄瀉

泄瀉之症皆脾胃不調或寒或熱或過傷乳食或素有表積所致

六七

参苓白朮散　治脾胃虚弱飲食不進多困少力中満痞噎心中氣喘嘔吐泄瀉此薬和中不熱久服養氣育神醒脾悦色順正辟邪

人参　白朮　茯苓　山薬　甘艸（炙各）（二戋）蓮肉　薏苡　砂仁　桔梗（各一戋）白扁豆（一攵半）

右為末毎服二戋棗湯調下量兒歳數加減

六八

四神丸　治脾胃虚泄瀉不食或不時去後不實或乳母患此致兒為患

肉豆蔻　五味子（各二両）蒲骨子（四両）呉茱萸（一両）

右為末水二碗姜八両紅棗百枚煮熟取棗肉和

如麻子大毎服二三十丸空心食前白湯下子母并服

卅九

錢氏白朮散　治吐瀉或病後津液不足口乾作渇和胃生津止瀉利將欲成慢驚風者

人参　白朮　茯苓　藿香　葛根

木香　甘草（各等分）

右水煎服頻々泄瀉將成慢驚風加山茱萸白扁豆肉豆蔲○慢驚已作加細辛天麻全蝎白附子○吐蚘胃寒加丁子○胃虚不能食而大渇不止者加天花粉○能食而渇者白虎湯加人参　中氣虚熱口舌生瘡不喜飲冷者宜此湯

四十

益黄散　治脾土虚寒嘔吐泄瀉

陳皮一（戔）　青皮　甘草　訶子（各五分）　丁子（二分）

右水煎○驚啼瘈瘲臥不安加全蝎釣藤白附子○赤白痢加當歸罌粟殻○白痢加干姜○泄瀉加陳皮厚朴○傷風加川芎防風羌活細辛○吐瀉肢厥顖陷加藿香丁子○発渇加葛根枇杷葉

△痢疾

痢者利也痢之為疾無積不成治法大要散邪熱行滞氣消積滞解暑毒開胃進食為先也

清熱化滞湯　治痢主方

黄連（呉茱煎湯拌炒）　芍薬　陳皮　茯苓　枳殻

黄芩　甘艸

右入姜水煎服　○初起積熱正熾加大黄芒硝　○血痢加黄芩當皈地楡　○白痢加厚朴枳殻　○赤白并下加川芎桃仁當皈紅花滑石陳皮干姜炒　○白痢久虚加白朮黄芪茯苓去黄芩黄連枳殻　○赤痢久虚下後未愈去黄芩黄連加當皈芍薬川芎阿膠　○裏急後重加木香檳榔子　○腹痛加芍薬延胡索枳殻　○小便赤少加木通猪苓澤瀉　○下如豆汁加白朮蒼朮防風　○食積加山査枳實麥芽神曲　○久痢氣血両虚加人参黄芪當皈川芎升麻肉豆蔲　○下後二便流利惟後重不去者氣陥于下以升提之

一方　治痢疾或紅或白或紅白相兼裏急後重身熱腹痛

黄連（姜汁拌炒）　檳榔　青皮（各四分）　當皈　甘艸

地楡（各五分）　紅花（酒洗三分）　桃仁（去皮尖一匁）　赤芍薬（二分）

右水煎服　○單白無紅者去地楡桃仁加陳皮（四分）用芍薬（三分）　○滞渋甚者加大黄（二匁）服一二剤仍

除之

四十三
香連丸

黄連十兩用呉茱五兩水拌湿入木香二兩
（磁器頓滾湯中半日焦黒）

右為末醋糊丸如赤豆大毎服二三十丸白湯下

凡脱肛色赤或痛用補中益氣湯送香連丸、久痢裏急後重欲去不去手足并冷者用補中益氣湯加木香補骨脂倍升麻柴胡

△瘧疾

風寒暑湿邪自外来飲食起居邪由内作豈特夏傷于暑秋必痎瘧哉古人以暑受病者多言之耳

四十四
七味淸脾湯　治食瘧吧吐痰沫及時行瘴瘧不同先寒後熱諸瘧通用方見于瘧

小便赤加猪苓沢瀉

四十五
養胃湯　治停食感寒熱発瘧及中脘虚寒吧逆悪心等症方見于瘧

四十六
截瘧飲

白朮　蒼朮　陳皮　青皮　柴胡
黄芩　猪苓　澤瀉　常山　草果

右入姜棗水煎露一宿服之○有汗而熱多者加人参黄芪前胡知母○無汗熱多者加葛根紫蘇

○寒多者加干姜草菓○痰多者加半夏貝母○食積加枳實山査子神曲麥芽○夜發者爲陰分加當歸升麻○二日三日一發者加人参黄芪白朮烏梅去蒼朮○單寒加干姜附子人参去柴胡黄芩猪苓沢瀉○腹痛加厚朴檳榔○室女熱入血室合小柴胡湯用

四十七

截瘧玅方　治寒熱相半

柴胡五戔　陳皮三戔　甘五分

右水煎臨發日五更空心温服已發時不可服○寒多熱少加陳皮一銭減柴胡一銭○熱多寒少或全無寒減陳皮按初發二三次元氣實者用之必効

四十八

一方　治患瘧已久或元氣虚弱

貝母（去心）二戔　人参一戔

右水煎臨發日五更空心服未全愈可再服一二剤

△咳嗽

咳嗽者肺傷風也

四十九

参蘇飲　方見于咳嗽門

若肺實有邪去人参加黄芩桑白杏仁

五十　人参平肺散　治心火尅肺咳嗽喘呕痰涎壅盛膈

胸痞悶

人参　陳皮　甘草（炙）　地骨（各五分）　茯苓

知母（各七分）　五味　青皮　麦門（各四両）　桑白（炒一戔）

右水煎

△喘急

五十一　喘急者痰氣盛也

人参欵冬膏　小兒脾胃虛寒久嗽不止咽膈滿悶

咳嗽痰涎呕吐悪心肚腹膨脹腰背倦痛虛旁呤

嗽諸薬無効者宜用之

欵冬　桑白（各一両）　人参　紫苑　杏仁

五味（各八戔）　紫蘇　梹榔　木香（各五両）　貝母

桔梗　馬兜鈴（各二戔）

為末煉蜜為丸如龍眼大每一丸姜湯化服

△雑病

五十二　夜啼六神散　乳頭散（方共見于小兒腹痛門）

五十三　追虫丸　治小兒虫積痛凡腹疼口中出清水者虫積也

史君子（二戔五分）　梹榔子（一戔）

右水煎服

五十四
當歸連翹湯　治小兒心脾有熱舌下有形如舌而
小者名曰重舌及唇口兩傍生瘡
當歸　連翹　白芷（各三戔）　大黄　甘草（各一戔）
右水煎服

五十五
瀉黄散　治小兒木舌弄舌（方ハ見熱症）
凡弄舌得病後最難瘳一悪証也

五十六
清胃升麻湯　治小兒齒腫涎流腮腫馬牙疳
升麻　川芎　芍薬　半夏（各七分）　葛根
防風　黄芩　甘草（各五分）　石膏（一戔）　白朮（七分）
白芷（三分）

右水煎服

五十七
瀉心湯　治小兒口瘡
黄連　爲末蜜水調服
一方　治小兒滿口白爛口糜
白朮　茯苓　猪苓　沢瀉　木通
生地　肉桂　甘草（各等分）

五十七
清胃養脾湯　治小兒愛吃泥土乃脾虚胃熱所致
此薬主之
黄芩　石膏　陳皮　白朮　茯苓
甘草（各等分）

右水煎服

五十八
菖蒲丸　治小兒在胎其母卒有驚怖邪氣心古本
不通長四五歳猶不能言
人參　菖蒲　麦門　遠志　川芎
當皈（各三）　乳香　辰砂（各一戔）
右為末煉蜜丸如麻子大毎服十丸米飲下

五十九
調元散　治小兒禀受元氣不足顱顖開解肉肌消
瘦腸大而腫語遲行遲手足如筒神色昏慢齒生
遲
山薬（五分）人參　芍薬　熟地　當皈
黄芪（各二戔半）　茯苓　茯神（各一戔）　白朮（二戔半）　昌蒲（一戔）
甘艸（一戔半）
右入姜棗水煎服

六十
破故紙散　治遺尿
破胡紙（一両）
右炒為末毎服一錢熱湯下

六十一
澄青散　治小兒大便白小便濁或澄之如米泔
白朮　黄連（姜）　澤瀉　山查（各一戔）　青皮（四分）
甘艸（三分）
右水煎服

六十二

沒薬散　治小児風與痰滯留蓄上焦胸膈高起大便不通

沒薬　大黄　枳殻　桔梗各二戔　木香

甘艸各一戔

右入姜煎服　小便不通五令散主之　方見中暑

六十三

茯苓滲湿湯　治小児黄疸寒熱吧吐而渇欲飲冷水身体面目倶黄小水不利不得安臥不思食

茯苓　茵陳　山梔　黄連　黄芩

防已　白朮　蒼朮　陳皮　青皮

枳殻　赤茯各一戔　沢潟三分

右煎服○小便不通加木通○食傷不思食加砂仁神曲麥芽

六十四

羽澤散　治耳中出膿或疼通（痛）或出水

枯礬少許為末吹入耳中即愈

一方用抱出雞卵皮炒黄色為末香油調入耳內即時痛止

六十五

四順清涼散　治藏府有熱頬赤作渇四支驚掣大便秘濇或風熱結核頭面生瘡目赤咽痛一切有餘之症

赤芍　當皈　甘艸　大黄各等分

六十六
○甘桔湯　治小児咽喉腫痛風熱等症
桔梗三匁　防風
荊芥　黄芩
甘草　薄荷
各一匁
右水煎服

右水煎服

六十七
化痰降火湯　治痰火尾骨節痛
陳皮　半夏　茯苓　沢瀉　黄柏
知母　甘草各等分

六十八
仙方活命飲　治一切瘡毒未成内消已成即潰此
右剉必用前胡木香為引若痛不止加乳香没薬
消毒排膿止痛之聖薬也若膿出而腫痛不止者
元氣虚也當補之
穿山甲　白芷　防風　没薬　甘草
芍薬　當皈　乳香　天花粉　貝母各五戔
金銀花　陳皮各三戔　皂角一匁
右酒水各半煎服

六十九
練陳湯　治小兒吐蚘虫
苦練皮二匁　陳皮　半夏　茯苓各一戔　甘草五分
右入姜煎服

七十
宣風散　治初生兒臍風撮口多啼不乳口出白沫
全蝎（二十ケ頭尾全者去毒用酒炙）　麝香（一字）
右同和匀細末毎用半字金銭薄荷湯調服

△初生通用

七十一
五香湯　治毒氣入腹托裏若有異證於内加減

丁子　木香　沉香　乳香（各一兩）　麝香（三戔）
右煎空心服若吐去麝香加藿香渴加人參一兩
一方ハ本方去丁子加藿香連翹各一兩名小五香湯
七十二 加味五香湯　治瘡癤無名腫毒專小兒用之
沉香　木香　乳香　丁子　藿香
升麻　葛根　連翹（各一戔）　木通　大黄（各五分）
右煎服小兒帛包此湯振出熱湯而服
按大人小兒瘡毒入腹則托裏之方也壽法仰和
五香加黄連青皮其少而常与小兒即盛脾胃止
吐逆清心火治虫積遁瘡癤痘疹

△痘瘡

小兒痘瘡大抵与傷寒相似發熱煩燥赤唇紅身痛
頭疼乍寒乍熱噴嚏呵欠喘嗽痰涎始發之時有因
傷風傷寒而得有時氣傳染而得有因傷食發熱嘔
吐而得有因跌撲驚恐畜血而得或爲目竄驚搐如
風之症或口舌咽喉肚腹疼痛或煩燥狂悶昏睡或
自汗或下利或發熱或不發熱証候多端卒未易辨
必須以耳冷尻冷驗之蓋瘍疹属陽腎蔵無証其耳
与尻俱属腎故腎之所部独冷又不若視其耳後有
紅脉赤縷爲之真

凡痘瘡欲出而未出因発搐者外感風寒之邪而閉発心搐也宜惺々散（見于感冒）或升麻葛根湯或參蘇飲敗毒散等冬月大抵用五積加減加味敗毒散初起発搐即服此薬神効本方加防風荊芥天麻地骨皮去人参茯苓宜加紫草蟬退紫蘇麻黄白殭蚕葱解搐表汗泄瀉加猪苓沢瀉去紫草水煎服出汗為佳

七十三

升麻葛根湯　発熱之初未分麻痘傷寒傷食等証以此薬解散庶無誤事（方見傷寒）

寒月加紫蘇○四肢逆冷加桂枝○時氣酷烈發熱太甚乃是毒氣加牛房子○加連翹名連翹升麻湯

七十四

痘初出之時色白者當大補氣血

人参　白朮　黄芪　川芎　升麻

葛根　甘草　木香　丁子　當皈

芍薬

如大便泄瀉加肉豆蔲訶子

七十五

清毒飲　痘瘡欲出及未出已出熱未解急宜服之

牛房三分　荊芥一匁　甘草　防風各五分

右水煎加犀角尤妙○虚熱加地骨皮○壮熱加

黄芩紫草〇痘已出未匀減荊芥〇出不快及痒
加蟬退〇有汗加防風〇減食加人参山査〇便
秘加大黄〇氣虚加人参白朮〇血虚加當皈川
芎

七十六
快斑散　治痘出不快
紫艸　蟬退　人参　芍薬（各五分）　木通（二分）
甘草一分
右水煎服一方去木通加穿山甲治痘已出被風
復入

七十七
如聖湯、治痘疹已出未出身熱如火頭疼腮赤呵
欠鼻瘡
芍薬　升麻　葛根（各五分）　甘草　紫草
木通（各三分半）　山査（二分）
右入姜葱水煎服〇心煩加麥門赤芍〇煩渴合
生脉散〇身熱如火加黄芩地骨皮

七十八
加味四聖散　治痘出不快及變陥倒靨小便赤澁
餘毒不除一切悪候或痘出被風吹復不見入皮
膚内骨熱不散
紫草　木通　木香　黄芪　川芎
甘草　人参（各等分）　蟬退減半

右水煎服便閉加枳殻便調加糯米

七十九

神功散　治痘出毒太盛血紅一片不分地界如蚊蚕種或諸咲血或吐瀉七日以前諸証可服解毒

黄芪　人參　芍薬　紫草　生地

紅花　牛房　前胡　各等　甘草　減半

右煎服○熱甚加黄連黄芩赤退者毎加大黄○有驚加蝉退○頭粒淡黒者有寒家之加肉桂○面紅不退地界不分者加前胡○泄瀉者火盛而奔戦也加升麻以提之

八十

紫草木香湯　治痘出不快大便泄利

紫草　木香　人參　白朮　茯苓

甘草　各等　糯米　三十粒

右煎服或隠見者加藿香

八十一

保元湯　治痘不起脹

人參　二戔　黄芪　三戔　甘草　一戔

右水煎服○當起脹而不起加穿山○血弱不起根底淡薄加丁子肉桂當皈川芎○一二日初出圓暈成形乾紅少潤加肉桂　治血加當皈芍薬○匀氣加陳皮○解毒加玄參牛房○二三日根窠雖圓而頂陥者加川芎肉桂○根窠雖起色不

光沢加芍薬肉桂糯米〇五六日氣盈血弱色昏紅紫加木香當歸川芎〇六七日氣交不旺血雖帰附不能成漿加肉桂糯米〇七八日毒雖化漿而不滿爲氣血有凝不能大振加肉桂糯米〇八九日漿不沖滿血附線紅加糯米〇十一二日気血沖滿血盡漿足湿潤不飲者内虚也加白朮茯苓〇十三四日毒虽盡解漿老結痂之際或有雜症相仍宜卌湯〇痘瘡発渇加麥门冬五味子如不止宜參苓白朮散　痘瘡不起発膿漿不厚加川芎丁子夏月加糯米〇頭額不起脹加川芎〇胸膈不起脹加桔梗〇腰膝不起脹加牛膝〇両手不起脹加桂枝〇出不快加川芎肉桂〇小便赤加大腹皮茯苓〇大便瀉加白朮茯苓肉豆蔲〇小便短赤加大腹皮木通〇大便實秘加當歸〇泄瀉加白朮木通肉豆〇嘔吐加干姜丁子陳皮〇煩渇加麥门冬芍薬五味子〇減食加白朮人参神曲〇傷食加神曲麦芽山査子〇喘嗽加杏仁麥门冬五味子〇発痒加川芎當歸芍薬白朮茯苓

八十二

内托散　治氣血虚損或風邪穢毒中觸使痘毒内

陥伏而不出或出而不匀快此薬活血匀氣調胃
補虚内托瘡毒使之盡出易収易靨
黄芪　人参　當皈（各二戔）　川芎　防風
桔梗　厚朴　白芷　甘艸（各一戔）　木香
肉桂（各三分）
右水煎服○紅紫黒陥属熱毒者去肉桂加紫草
黄芩○若淡白灰黒陥伏虚寒者加丁子救裡加
肉桂救表○當貫而不貫膿者倍人参黄芪當皈
煎熟臨服入人乳汁好酒同参温服此貫膿之巧
法也○泄瀉加丁子干姜肉豆又名十奇散

八十三
木香散　治灰白黒陥吧吐白沫為表虚
木香　前胡　甘艸　訶子
大腹　人参（各五分）　陳皮　肉桂　半夏（各八分）
丁子（五粒）
右入姜水煎

八十四
異功散　治寒戦咬牙痒塌泄瀉為裏虚
當皈　白豆蔲　陳皮　白术　茯苓
附子　半夏（各一戔）　厚朴　肉桂　木香（各八分）
人参（五分）　丁子（七粒）
右入姜水煎服

八十五
起死回生散　治痘瘡至七八日忽然變黒收入腹内偏身抓破吮喘死在須臾服之從新別発出立可回生
當歸　川芎　芍薬　地黄　升麻
紅花
右半水半酒煎服○上偏加白芷下偏加牛膝遍身黒偏麻黄○脚下有黒疔至七八日用針挑去以太乙膏貼之

八十六
馮氏天花散　治痘後失音
天花粉　桔梗　茯苓　訶子　昌蒲
甘艸（各等分）
右為末用調半匙在碗内外以竹七茎黄荆七條縛作一束點火在碗内煎臨卧服

八十七
熱眼丹溪方　治痘瘡傷眼
山梔子　決明子　赤芍　當歸　黄連
防風　連翹　升麻　桔梗
右水煎服

八十八
化毒散　治痘後餘毒生翳
當歸　川芎　赤芍　生地　防風
葛根　菊花　天花　蟬退（各等分）　谷精（倍用）

右水煎服〇赤腫痛加黄連山梔子〇翳眼加木
賊

八十九 麦門冬飲　治痘毒発熱作渴咽痛
麦門四分　黄芩　人参　玄参各三分　甘草一
金銀花各五分
右水煎服
凡孕婦身發瘡宜馮氏罩胎散若胎動不安宜独聖
安胎二方身熱甚宜参蘇飲或瘡稠密宜十奇散倍
芍薬当帰減肉桂加香附烏薬如治已五月則田心
之属倶不必禁

九十 罩胎散
赤茯　白朮　当帰　芍薬　柴胡
葛根　人参　桔梗　黄芩　防風
陳皮　荊芥　枳殻　紫草　阿膠
糯米　白芷　甘草　川芎　砂仁
大熱加爵金
右細切作一服水一盞半煎至一盞乾柹蒂七个
野苧根七寸胡瓜蒂一个用銀器煎以荷葉蓋定
至八分去粗仍用荷葉蓋覆空心温服

九十一 独聖散
用黄連枳殻砂仁火炒去殻為末毎半匙

九十二

熱湯調下胎動則服々後覚胎熱則安矣

安胎散

大腹　人参　陳皮　白朮　芍薬

當帰　川芎　香附便　紫蘇　砂仁

茯苓　甘草各等分

右入燈草糯米水煎服

凡妊娠痘瘡者以安胎散爲主加黄芩白朮天寒有表症者間用五積散去麻黄半夏厚朴干姜肉桂換白朮赤茯苓赤芍薬加柴胡黄芩阿膠人参糯米等分

痘出不快者消毒飲

痘出後血虚者芎帰湯加芍薬氣虚者保元湯加芍薬

熱盛恐胎墮者罩胎散胎動者安胎飲或罩砂仁炒爲末酒調服之後覚胎熱則安

△麻疹

小児時氣咳嗽声重涕唾稠粘目眶微赤煩熱渇燥此則肺胃蘊積熱毒發則易出一出遍於肌皮之上如泡子見而漸没病在表受毒之淺此名麻子亦名膚瘡俗曰麻子

凡麻疹初起呵欠發熱惡寒咳嗽嚏流涕頭眩宜升麻葛根湯潮熱甚加黄芩黄連地骨皮咳嗽加麻黄杏仁麦門冬石膏咳甚別用涼膈散見傷寒加地骨皮桔梗

○泄瀉宜四令散見泄瀉

○便血四令散合犀角地黄湯

○吐衄犀角地黄湯見血証加山梔小便赤加木通

○寒熱似瘧宜小柴胡湯又柴苓湯

○初起全類傷寒但面赤中指冷爲異耳已出煩燥作渇者解毒湯合白虎湯　二方見傷寒

○便閉二四日小承氣湯　方見傷寒　防風通聖散見中風譫語溺閉者導赤散見小兒熱証　如淋者四苓散車前木通

○譫語如狂者解毒湯調辰砂六一散

○煩渇作泄者白虎湯加蒼朮又猪苓湯　見小便閉

熱盛乾呕解毒湯

○傷食呕吐四君子湯

○夏月因暑作呕四苓散加人参忌用肉豆蔲木香生姜肉桂熱薬

九十三

二仙湯　治麻疹已出而又發或出不透心慌哭啼

不止十分危症死在須臾或下痢腹痛

黄芩　芍薬各等分

右水煎服

九十四

犀角解毒湯　治麻疹已出大便下血或小便下血衄血或二便閉澁瘡疹稠密熱渇赤痛

犀角一銭　生地五分　牡丹　赤芍　黄連

黄芩　黄栢　山梔各一銭

右水煎服

如吐血衄血加炒山梔童便

麻疹前後有潮熱不退等証並爲血虚血熱可服四物湯

發渇加麦门犀角〇嗽加瓜蔞仁〇有痰加倍陳皮〇麻疹正出之時雖不進飲食但得麻疹淡紅沢潤真正不爲害加神曲砂仁用〇麻疹已出之時如色紅紫乾燥暗晦乃火盛毒熾用生地黄加紅花黄芩〇麻疹已出既過三日不能没者乃内有虚熱宜本方如失血之症加犀角地黄解之〇麻疹退後若有牙根腐爛鼻血横行并爲失血之症急用本方加茵陳木通犀角之類以利小便如痲瘡色白者死〇孕婦出麻本方倍加白朮黄芩

艾葉安胎清熱爲主如胎上冲急用苧根艾煎湯
磨生梧桐服之更以本方大進之

九十五

十仙湯　治疹後余毒

柴胡　葛根　玄參　黄連　黄芩
山梔　陳皮　茯苓　枳殼　生地黄

右入姜水煎服

麻症初起已出已沒及一切雜症与痘毒大同但始終宜清涼雖麻喜清涼痘愛溫暖不易常道虚則補實則瀉醫家活法故治麻亦有血虚而用四物湯氣虚用四君子湯天寒傷冷用温中理中之薬一時之權

麻症沒後余熱内攻循衣摸床譫言妄語神昏喪志者死如熱輕餘毒未除必先見諸氣色雖預防之始終以升麻葛根湯爲主或消毒飲解毒湯隨症選用仍忌魚腥葱蒜之物

△水痘

水痘一證与正痘不同易出易靨不宜燥溫或溫表亦不爲害但不能結痂則爛成瘡

九十六

麥湯散　治小兒水痘

麻黄　大黄（温帋裹煨）　知母　杏仁（隔帋炒）　羌活

人参各一匁　滑石　地骨　炙甘草各半匁

右入小麦七粒水煎メ服ス

大尾