k 60

F
カ−98

490.9
Ka-17

No,2561
旧 K 61

觀證辨疑目次

寒 八
厥 九
呕 十九
吐 二十
渇 二十六
煩 二十八
喘 四十二
咳 四十三
噦 二十二
頭痛 一
発熱 二
厥逆 十
逆冷 十一
不仁 十一
汗出 十一
身疼 十三
腹痛 十五
腰痛 十七
心痛 十九
咽痛 十九
乾呕 二十一
呕吐 二十一
少気 三十六
腹満 三十七
脹満 三十七
腹脹 三十八
讝語 三十九
上衝 四十
目瞑 四十一
身重 四十四
水腫 四十五
衂血 四十五
吐血 四十五
無大熱 四
頭汗出 十三
身疼痛 十四
腹中痛 十六
胸中痛 十七
脇下痛 十八
心下痛 十八
大便鞕 二十四
大便難
心下痞 三十一
心下鞕 三十二

490.9
KR-18

慶應義塾大學醫學部北里圖書

慶應義塾大学医学情報センター
昭和 47.年 7.月 4 日

富士川文庫
1508

微熱 三
有熱 四
身熱 四
煩熱 五
潮熱 五
悪風 七
悪寒 七
厥冷 十
往来寒熱 六
身體疼痛 十四
骨節疼痛 十五
小便不利 二十五
小便自利 二十六
小便数 二十六
心下痞鞕 三十一
少腹急結 三十八
少腹堅満 三十九
少腹拘急不仁 三十九
噫気 二十二
下利 二十三
乾燥 二十七
心煩 二十九
煩燥 三十
煩躁 三十
胸満 三十四
短気 三十六
下血 四十六
狂驚 四十七
発黄 四十八
攣急 四十九
拘急 四十九
項背強 一
頭項強 一
身體強 一
少腹攣（弦）急 三十九
経水不利 四十六
少腹腫痞 三十九
不得屈伸 四十九
不能轉側 四十九
心中懊憹 二十九
起臥不安 五十
無汗及不汗出 十二
目眩及頭眩 四十一
身疼 五十
心下悸 三十三
心下満 三十四
胸脇満 三十五
少腹満 三十八
不得眠 四十八
不得臥 五十
不大便 三十四
燥屎 三十四

目次 終

京都帝國大學醫學部圖書

觀證辨疑

平安　吉益猷修夫著

頭痛

血氣上攻所致也血不滯不為痛氣不通亦不為痛也有氣為主者有血為主者有血氣倶迫者有由水血氣迫者

桂支湯（表）四逆湯（裏）呉茱萸湯（内）

右歷觀諸症桂支湯氣為主故脉浮發熱汗出若劇必衂血氣盛而逆血也四逆湯血為主故脉沉發熱不汗出絡致厥冷血滯而氣不能循也血為主者其狀逆也氣為主者其狀急也二方之病在

表與裏吳茱萸湯血気倶迫故無熱汗不出病自内上攻吐涎沫是其證也

麻黃湯（表）小柴胡湯（裏也症闕）十棗湯（内）

右歴觀諸症曰身疼無汗而喘曰心下痞鞕滿引脇下痛是水気之証而頭痛不為主由水気迫也

五苓散

右一方水竭血気迫水気行則自治非頭痛為主者也

項背強　頸項強　身體強

強者血也有由気血迫者有血凝気不循者有由水血気滞或血気迫者

桂枝加葛根湯（表）葛根湯（表）瓜樓桂枝湯（裏）

右歴觀諸症桂枝加葛根湯葛根湯二方由気血迫者也故曰悪風強在項背也栝樓桂支湯血凝気不循也故脉沉遅強在身体也凡強者血気為主者有几々之状可辨別焉

小柴胡湯（裏）桂支去芍茱加茯苓朮湯（裏）

右歴觀諸症曰脇下滿是水気之症也小柴胡湯症由水血気滞也或身熱悪風水在外血気不暢也加茯苓朮湯由水血気急也発熱頭痛水在内血気外行是茱之所以異也

発熱

気欝結也熱気翕然外発按其身上不灼熱者為発熱也有自表発者有自裏発者有自内発者有陰状而発者

桂枝湯　麻黄湯　大青竜湯　小青龍湯　麻黄杏仁薏苡甘草湯・桂枝去芍薬加茯苓朮湯　柴胡桂枝湯　厚朴七物湯　黄耆桂枝苦酒湯　五苓散

以上表症発熱也曰悪寒曰悪風曰頭痛曰頭項強痛曰身疼是皆表症発熱也桂枝主之、

小柴胡湯　大柴胡湯

以上裏症発熱也

小承気湯・調胃承気湯　大承・気湯

以上内実発熱也内実発熱者無表裏之症有大便之変是其候也大黄芒硝主之

猪苓湯　梔子蘗皮湯　消礬散　大黄牡丹湯

以上血症発熱也血証発熱者曰大便黒時溏曰少腹腫痞是所以異于実熱也

附子細辛湯　四逆湯　附子湯

附子当作乾
此字誤也

真武湯　大書（黄）附子湯

以上陰症発熱也

右歴觀諸症其脉浮曰悪风曰悪寒曰頭項強痛曰身疼表症発熱也桂支主之吧而無表症裏証発熱也柴胡主之無表裏症有大便之変者内実発熱也大黄主之其脉沉或弦先発熱而後発諸症也曰手足厥冷曰身體疼痛曰身瞤動是陰症而非圭支之治也附子主之

微熱

微熱者非謂熱之微也論中依畱證發方謂若此證微有熱則此方主之唯為若詳明也

小柴胡湯　五苓散　四逆湯　大承気湯

右歴觀諸症皆裏症而屬身熱也

無大熱

無大熱非全無熱之謂即微熱也不言微熱者論中論症之勢明当有大熱而無大熱者也

白虎加人参湯广黄杏仁甘草石羔湯

乾姜附子湯大陥胸湯越婢湯

以上諸方皆微熱之意而屬身熱也

有熱

唯謂有熱者廣指之辭是亦屬身熱也

黄連湯　大承気湯　調胃承気湯

抵當湯　白虎湯　桂支湯　梔子豉湯

以上諸症虽屬身熱者多是論也

身熱

身熱者裏熱也其熱無翕々之状按胸腹則如灼唇口必乾燥也手足不熱假令虽熱心有休止也迫而身熱者石羔主之外襲而身熱者柴胡主之血滞症発作有時也而剤頸而還症於実事多有之也

按迫疑急之誤不然對逆乎

梔子豉湯　梔子乾姜湯（屬方）

以上気迫而身熱者也

白虎湯　白虎加人参湯　白虎加桂枝湯

以上逆而身熱者也

小柴胡湯

右外襲身熱也

右歴觀諸症身熱者腹中不熱無水結之状及大便之変也

煩熱

煩熱者虚熱也心中手掌足心熱也煩者不可奈何之状也

三物黄芩湯　八味丸　梔子豉湯

小柴胡湯　小建中湯

右歴観諸症曰婦人在草蓐曰悸曰衂曰失精曰発汗若下之皆有血脱之状也血脱者地黄主之水間者巵子主之水気逆者小柴胡湯主之血気逆者小建中湯主之

（按小柴胡湯症外襲煩熱也毋以有頭痛亦寒乎三物黄芩湯也不可為虚熱此処誤入者乎）

潮熱

實熱也古今釋潮熱曰熱如潮信以時来也然則日晡所発熱以時来也何以分熱伏古人命名也審若以時命之則何不曰汐熱非潮信之義可以知也歟

按夫潮也者取充実之義也海水潮則海隅江曲亢中岩間無処水之不充満也潮熱之発則身体手足胸背腹中無処熱之不充満也故曰潮熱者実也有潮熱者水走于外作身重作腹満作短気不能発熱遂致潮熱故汗多則其熱不潮以水未実也其水未実則必発熱調胃承気湯証是也其所挙潮熱者小柴胡湯大陥胸湯大小承気湯而方中各有逐水之薬観者察焉

大承気湯　大陥胸湯　柴胡加芒硝湯

小承気湯　小柴胡湯

在歴観諸症潮熱者大黄芒硝所主而有枳実耳遂柴胡之類遂水之薬也水気血気但実也

往来寒熱

寒熱者非身熱固有之也邪気往于内則為寒精気来于外則為熱故去往来寒熱而不云寒熱往来水気外襲而血気不暢之証也

小柴胡湯　大柴胡湯　柴胡桂支乾姜湯

在歴観諸症有外襲者有外行者外襲者嘔而無頭汗先見表症而後有寒熱外行者頭汗出而不嘔先見裏症而後有此症是其別也雖発熱不汗出必胸脇満或脇下満是水気外襲而血気不暢之症也

悪风

気欝而未発散之症也

桂枝湯　桂枝加葛根湯　葛根湯

麻黄湯　桂枝加附子湯　桂枝甘草附子湯

在歴○観諸症曰悪寒曰頭痛曰項背強曰身疼曰风湿表症而悪风者桂支主之

小柴胡湯　白虎湯　越婢湯

防已黄耆湯

右歴觀諸症小茈胡湯白虎湯雖為裏症以表未解致此悪风也曰頸項強曰表裏倶热可以知表未解也越婢湯防已黄蓍湯曰一身悉腫曰身重此以表有水而気未発散致此悪风也此水気主而自汗出無気逆之状右四方曰手足温而渇曰大陽舌上乾燥而煩曰自汗出皆無気逆状故不用圭支也

悪寒

気難行之症也有気虚而悪寒者有気逆而悪寒者有裡有状热而悪寒者所以気難行者一也

附子湯　芎茱甘草附子湯　四逆湯

桂支去芎茱加附子湯　附子瀉心湯

四逆加人参湯

以上気虚血滞者也附子主之

桂支湯

汗出悪寒無热者血気急症也陽明篇桂支湯是也悪寒発热汗不出者外襲之症也不可不察予阳明病脉遅汗出多微悪寒又曰産後中风（云々）頭痛発热

以上気急血滞者也　圭支芎茱主之

大青龍湯　白虎湯　白虎加人参湯

以上気逆伏熱者也桂支芍茱主之
大黄牡丹湯　葵子茯苓散　肖砮散
以上血滞気不得行是非主症之
右歴観諸症曰歩艱病口中和曰発汗
後曰下之曰吐利曰脉微而利是気虚
之症也附子主之曰乾呕曰心下悶気
逆之症也桂支主之曰煩燥曰口燥渇
心煩曰身熱而渇是熱気伏於裏之症
也石羔主之

寒

悶気之症也病人意知之無其所者也
大建中湯　柴胡姜主湯　理中丸
乾姜黄連黄芩人参湯　通脉四逆湯
四逆湯
以上気逆而寒者也
附子粳米湯　附子湯　大黄附子湯
以上気虚而寒者也
當皈四逆湯
以上血閉気而寒者也
右歴観諸症曰呕曰吐気逆之症也乾
姜主之曰身体痛曰切痛曰脇下偏痛
気虚水滞之症也附子主之乾姜症者
虽有不痛無不呕不吐附子症者虽有呕
吐無不通也不呕不痛者當帰主之是

其利也

厥

厥者欲也説文曰欲逆氣也所循環之血氣斷絶自失血色劇則冷也其寒有別冷者人按之覺其冷寒者病人意知之按之不冷者也

甘草乾姜湯　四逆湯　通脉四逆湯　通脉四逆加猪胆汁湯　橘皮湯　白虎湯

右歷觀諸症血氣逆所致者乾姜主之水氣逆所致者生姜主之以何知之吐利者血氣逆之症也噦者水氣逆之症也石羔之厥外襄而閉非氣自然逆者故裏有熱而無嘔吐下利之症也汗出而厥者氣虚之症也附子主之以異其所在而無兼症異症異所以氣逆者一也

厥冷

厥之劇症也

四逆湯　烏頭湯　呉茱萸湯　瓜蔕散

右歷觀諸症曰下利曰大汗曰自汗出而氣虚者附子主之曰吐利煩躁而血氣急所致者呉茱萸主之曰脉乍緊曰心中滿而水氣外襲者瓜蔕主之

厥逆

気逆最甚者也當冷而不冷者何甚則逆極而気復外行所以不冷也

通脉四逆湯　四逆湯　白通加猪膽汁湯　烏頭湯　赤丸條云寒気厥逆（症闕）

桂支茯苓五味甘草湯

右歴觀諸症其劇於厥冷者以脉絶乾吃或面色赤或翕然如酔有上逆症也或腹痛或下利而乾吃則干姜附子主之腹痛不乾吃無上逆之症則有附子而無干姜面翕然如酔無腹痛下利等之症則有乾姜而無附子是其別也

逆冷

気逆之症也厥冷者気逆上行也逆冷者気逆不上行也

烏頭桂支湯條曰腹中痛逆冷白虎湯條曰下之則額上生汗手足逆冷

右歴觀諸症気虚而裏無熱者附子主之気逆而裏有熱者石羔主之不厥不上行故無乾姜也

不仁

裏血滞気不行之症也

黄蓍桂支五物湯條曰血痺云身体不仁

烏頭桂支湯條曰寒疝（云〻）手足不仁

八味丸條曰脚気上入少腹不仁

白虎湯條曰三陽合病（云〻）口不仁

右歷觀諸症、気急而血滞者黄蓍主之曰血痺不冷不痛是其症也、気不循血滞者附子主之曰寒疝曰痛曰冷是其症也血気倶滞者石羔主之曰身重難以轉側曰手足逆冷是其症也

汗出

汗出者水気[illegible]外出之症也有自表出者有自裏出者有自内出者

桂支湯　桂支加葛根湯（属方）桂支加附子湯（属方）　越婢湯　防己黄蓍湯

以上表気急而汗出也

五苓散　茯苓甘草湯（属方）　白虎湯　白虎加人参湯　黄蓍圭支苦酒湯　圭枝加黄蓍湯　甘草附子湯　十棗湯　麻黄杏仁甘草石羔湯　葛根黄連黄芩湯

以上自裏起而出也

大承気湯　大黄消石湯　小承気湯　大黄牡丹湯

以上自内起而出也

大烏頭煎　四逆湯　通脉四逆湯

通脉四逆加猪膽汁湯　附子瀉心湯

以上陰症也

右歴觀諸症自表起者曰発熱曰悪寒曰悪風其自裏起者曰渇曰小便不利曰喘曰下利其自内起者曰大便必鞕曰大便已鞕也帯厥者此陰症之徵也

気急而汗出者圭支主之逆而汗出者石羔主之脱而汗出者黄蓍主之実而汗出者大黄主之陰症而汗出者附子主之

無汗及不汗出

水襲気之候也曰無汗者水滞而無可汗之状也曰不汗出者汗將出未能出也

麻黄湯　葛根湯　大青竜湯

以上表水也

桂支去芍薬加茯苓朮湯

以上裏水也

右歴觀諸症表水者身疼或喘也桂支麻黄主之裏水者心下満或小便不利苓朮主之

頭汗出（内）

頭汗出者血気上行而不結胸之候也

大柴胡湯　柴胡姜圭湯

以上水気外襲也

茵蔯蒿湯　梔子豉湯

以上水気急上行也

右歴觀諸症曰往来寒熱者是外襲証而気逆上攻頭汗出者也柴胡主之無外襲証気急上行者梔子豉湯主之

身疼（表）

疼騰也水滞而気血欲行不能行之候疼者按之徹而不移其所在也

麻黄湯　麻黄加朮湯　麻黄杏仁薏苡甘草湯

以上表水外襲而気逆之症也

桂支加黄蓍湯

以上血気自裏迫表之症也

右歴觀諸症自表襲而逆者無汗也麻黄主之自裏出而急者自汗出也黄芪主之

身疼痛（表）

痛通也気通而痛移所在按之不知痛處疼痛気将行而不能行症也

桂支湯　桂支加芍薬生姜人参湯

以上血気外行也

麻黄湯　大青竜湯

以上水気外襲也

烏頭桂支湯（属方）五苓散（属方）

以上裏水外行也

右歴觀諸症血氣外行而疼痛者虽汗出不発热而桂支剤主之水氣外襲而疼痛者発热而不汗出麻黄主之裏水外行而疼痛者発热汗出茯苓朮主之

身體疼痛

曰身体者裏位而病在血分血滞而気不能行也

桂支附子湯　四逆湯　真武湯
附子湯

右歴觀諸症疼者血滞而気不暢故致煩而不為寒主用附子而桂支佐之痛者気脱而血不行故必寒而不為煩也主用附子而人参佐之疼痛者血滞不行気逆不伸也主用乾姜而附子佐之

骨節疼痛

曰骨節者痛最及于裏者也

麻黄湯　烏頭湯　桂支芍薬知母湯

以上疼痛無汗者也

甘草附子湯　附子湯

以上疼者也

柴胡桂支湯　白虎加桂支湯

以上疼煩者也

小建中湯

右歴觀諸症疼痛無汗者必用麻黄汗出煩疼者必用圭支疼而不痛者有圭支而不用附子痛而不疼者有附子而不用圭支也

腹痛裏

腹痛者血滯氣難行之症也有由水痛者有血滯氣急而痛者有氣逆血迫而痛者

大承氣湯　厚朴三物湯　枳実芍薬散

以上滿痛由水者也

大烏頭煎　真武湯

以上血滯氣急之證也

通脉四逆湯　桃花湯　大建中湯

以上氣逆迫之證也

桂支加芍薬湯（畧方）

右歴觀諸症由水而痛者曰滿痛曰煩滿是其候也枳実主之血滯氣急而痛者曰脉沉或弦曰自汗出曰発熱曰頭眩曰四支沉重是其候也附子主之氣逆血迫而痛者曰厥曰乾嘔曰嘔曰上衝曰便膿血是其候也乾姜主之

腹中痛

曰腹中痛者其所在最深也有血気俱急而痛者有血滯気急而痛者有気脫血滯而痛者有水気外襲而痛者

小建中湯　桂支加芍薬湯

以上血気俱急之症也

當帰建中湯　當皈芍薬散　當皈生姜羊肉湯　芎皈膠艾湯

以上血滯気急之症也

小柴胡湯　柴胡桂支湯　四逆湯

黄連湯

以上水気外襲之症也

右歴觀諸症曰急痛曰自痛曰裏急曰悸皈血気俱急之証也主支芍薬主之曰疞痛曰刺痛曰滿痛下皆血滯気急之症也當皈主之曰呕曰咳曰卒痛留飲閉血気之症也半夏枳実主之曰逆冷曰手足不仁曰不得轉側手足厥逆曰腹中寒是気脫血滯之症也附子主之附子之症必寒也當皈之症必熱也

腰痛

腰痛者裏侯也痛者気欲行不得行之候也有血滯而気不得行者有気急而血滯者有気急而水滯者有水滯而気逆者有気不行而水滯者

八呆丸當皈建中湯圭支加黃蓍
湯苓姜朮甘湯麻黃湯
右歷觀諸症曰拘急曰刺痛此血氣急
而所致之症也曰少腹不仁曰不能飲
食者其毒在裏也血滯氣急之症當皈
主之小便不利者血氣不行之症也地
黃主之曰身疼重者其毒在表也黃蓍
主之曰身疼者表水閉血氣之症也麻
黃杏仁主之曰冷痛者血氣逆而水滯
（逐一本作復）
血分之症苓朮逐水甘姜逐其氣也

（一本無中字）
胸中痛裏
胷痛者裡也有疼飲而氣急者之有氣
逆者有血凝氣逆者有氣急血滯者
栝樓薤白々酒湯十棗湯調胃美
氣湯
右歷觀諸症曰喘息是水氣外襲而痛
也瓜呂薤白々酒湯主之曰咳煩者有
留飲而血氣急也十棗湯主之曰欲吐
胸中痛者血氣上行也調胃美氣湯主
之

（一本無下字）
腹下痛
腹者水氣之所在也
小柴胡湯大黃附子湯
觀察此二條曰胸滿者此水氣外襲之

証也小柴胡湯主之曰発熱脉緊弦是血気急之症也大黄附子湯主之

心下痛

心下固有水之地也故心下痛者此由水所致

太柴胡湯　大承気湯

以上水気上行之症也

十棗湯　大陥胸湯

以上水気結実之症也

圭支去芍薬加苓朮湯

右水気停滞之証也

右歴観諸症水気上攻之者枳実主之曰鞕満曰石鞕曰鞕痛者水気結実者甘遂主之曰満微痛小便不利者水気停滞也苓朮主之

者当作也字

按大建中湯辨闕方解曰治腹中血滞而気逆者曰腹中寒曰上下痛者血滞之症也曰嘔不能飲食曰上衝者気逆之症也可考辨也

心痛

瓜呂薤白白々酒湯　桂枳生姜湯

走馬湯　備急湯　梔子豉湯　梔子大黄豉湯　甘草粉蜜湯　大建中湯

右歴観諸症曰胸痺不得臥曰諸逆水気在胸則枳実半夏主之留滞于上者半夏主之自下迫者枳実主之曰腹脹水気在腹則巴豆主之曰身熱曰熱痛熱気迫心者卮子主之甘草粉蜜湯由

蚘虫所致者非其主症也

咽痛

曰咽中痛者必有痰飲曰咽痛者気共血之変而已

甘草湯　桔梗湯　苦酒湯　半夏散

猪膚湯　通脉四逆湯（屬方）

右歴観諸症気逆而所致者甘草主之血滞而所致者桔梗主之有痰飲而所致者半夏主之兼下利血気迫而所致者此非主症猪膚湯通脉四逆湯主之

所致下之而字削之

吃

吃気逆之症而其病在胸也由留飲気迫而致者或有気逆而有留飲者或有気特迫而致者或有気逆而致者

小半夏湯　小半夏加茯苓湯

小柴胡湯　柴胡桂支湯　黄芩加半夏生姜湯　葛根加半夏湯　大柴胡湯

以上有留飲気迫者

半夏瀉心湯　苓甘姜味辛夏湯

以上気逆而有留飲者（按当作有水而気逆者）

梔子生姜豉湯　四逆湯　大建中湯

以上気逆者也

呉茱萸湯　真武湯

以上気自迫者也

按小柴胡湯非気迫者方解曰治病在裡水毒及気血気逆而有諸留飲者依之当在下條

按半夏瀉心湯非気逆而有留飲者也方解曰治気鬱満于心下而有留飲者也

又按苓甘姜味辛夏湯方解曰治前症而水気在心下者曰吃者水在心下也曰前症者苓桂五味甘草湯去桂加姜辛者也故曰逆気下降是無逆気也

猪苓湯　白虎加圭支湯　（属方）

以上呕非主症也

右歴観諸症曰胸脇満曰腹痛曰煩曰鞕満曰支結有留飲水急者年夏生姜主之曰腸鳴曰胃気逆而有留飲者年夏乾姜主之曰心中懊憹曰胸満曰小便不利或咳気急而所致者生姜主之曰見厥曰腹中寒気逆而所致者干姜主之

吐

吐者血気自腹上攻者也

大黄甘草湯　調胃承気湯　茯苓沢瀉湯　茯苓飲　五苓散　（属方）　甘草乾姜湯　呉茱萸湯　乾姜黄連黄芩人参湯　四逆湯

血気逆下当有者之一字

右歴観諸症吐食者大黄主之吐水者茯苓沢瀉主之血気迫生姜主之血気逆者乾姜主之曰手足厥冷曰煩又吐下之気逆而所致者乾姜主之曰渇曰満而不能食曰煩躁欲死血気急者生姜主之

乾呕

乾呕者裏症也有気逆而致者有気迫而致者

呉茱萸湯　橘皮湯
圭支湯　十棗湯　小柴胡湯
以上気迫而所致也
通脉四逆湯　六物黄芩湯　甘草瀉
心湯　小青竜湯　白通加猪胆汁湯
以上気逆而所致也
右歴觀諸症曰悪寒曰頭痛曰鞕満気
迫而所致也生姜主之曰下利曰厥曰
心下痞鞕有気逆之状者乾姜主之

吧吐

吧吐者有留飲而血気迫者有血気逆
而留飲者
乾姜人参半夏丸　黄連湯　大半夏湯
附子粳米湯　大柴胡湯　小半夏湯
右歴觀諸症如大柴胡湯小半夏湯由
水而血気迫者半夏生姜主之曰姙娠
曰服中痛曰反胃血気逆之状而有留
飲者半夏乾姜主之

噫気

噫気者血気迫心下而飲食不下者也
生姜瀉心湯　旋覆花代赭石湯
右曰心下痞鞕者血気迫之症也人参
以治痞鞕半夏以去其水生姜以逐其
気也

按方解曰乾噫食臭脇下有水気此気不行之症也曰噫気者有留飲而気不循之症也曰心下痞鞕者是血凝気不循之症也依之則痞鞕非血気者也噫者気不行也而其凝者血也不行者気也又曰以気不行之故有水滞食不化而噫気者也気即水気也

噦

噦者水気迫之症也

橘皮湯　橘皮竹茹湯　小半夏湯

小承気湯

右歴觀諸症自胸中起者橘皮生姜主之自心下起者小半夏湯主之自腹中起者小承気湯主之皆有水気迫之症也故論中有與水則噦或噦而腹満見其前後之症也

下利

按附子主之下当有気急而下利者黄芩主之又曰大黄下従下條所去而可補芒硝二字也

下利者裏症也気不行而水降也気脱而不行者干姜附子主之気急而不行黄芩主之熱実而不行者大黄主之

又按下條大黄主之下当有ゝ热而水為気見逆而利者主支或白頭翁主之血気迫而不行利者当逆挙處主殺十字又按附子之上无干姜二字以真武湯有生姜之故乎

白虎湯　真武湯　四逆湯　通脉四逆湯

右歴觀諸症曰脉微曰厥曰厥冷曰脹満曰清穀是気脱之症也附子主之

黄芩湯　六物黄芩湯　甘草瀉心湯

葛根黄連黄芩湯　生姜瀉心湯　乾姜黄連黄芩人参湯　大柴胡湯

桃花湯

右歴觀諸症曰嘔曰心煩曰乾嘔曰乾噫食臭曰喘而汗出曰食入口則吐曰嘔吐而下利皆所気急之症也芩主之

一本食臭下有曰乾嘔心煩五字

（按小承気芒硝雖然是皆方意一数者也故云也與真武湯之於四逆湯小異也小承気芒硝無而真武干姜無而有生姜也）

小承気湯　大承気湯　調胃承気湯

右歴觀諸症曰譫語曰乾燥曰心下鞕曰脉遅而滑是熱実之症也大黄芒硝主之

桂支人参湯　白頭翁湯

右歴觀諸症二條曰協熱利曰熱利是為熱所遂而所致也故曰利下曰下重而不曰下利也

呉茱萸湯

右血気急而所致者故厥冷煩躁是非乾姜附子之類亦非黄芩之類

甘遂半夏湯

右宿水自利者也故曰利反快曰心下續堅滿此其症也

以上四條特曰利而不曰下利亦其異也

太便鞕

水竭之証也

大承気湯

以上熱実而太便鞕也

小承気湯　麻仁丸

以上熱少表裏有水大便鞕也

小柴胡湯　圭支附子去圭加朮湯

抵當湯

右歷觀諸症曰手足濈然汗出曰潮熱曰多汗曰小便數曰吧曰小便自利是水竭之徵也曰潮熱是熱実而大便鞕者也大承気湯主之曰多汗曰小便數者小承気湯主之曰小便自利曰大便反易血凝而大便鞕者加朮湯抵當湯主之（未詳）

燥屎

大承気湯

不大便（及不通）

大承気湯　小承気湯　調胃承気湯
大陷胸湯　抵當湯　走馬湯　小柴胡湯　厚朴三物湯

右歷觀諸症曰腹滿痛曰煩躁曰腹脹曰腹大滿曰噦曰從心下至少腹鞕滿曰脇下鞕滿是水気逆上頂而大便不通之症也由于熱而水気竭者承気輩主之由于血而水気竭者抵當湯主之水気停滞者巴豆芫遂主之

小便不利

有水気竭而不利者有水気滞而不利者有熱結而不利者也

栝蔞瞿麥丸　猪苓湯　五苓散
柴胡圭支湯　圭支加附子湯

桃花湯　圭支加黄耆湯
右歴観諸症曰若渇曰渇不已曰渇欲
飲水曰煩躁曰下利不止曰発汗遂漏
不止皆水気渇之症也　苓圭朮甘湯
葵子茯苓散　真武湯
圭支去芍（○薬）加苓朮湯　苓圭五呆甘
草湯　甘草附子湯　四逆散
右歴観諸症曰身重曰四支沉重曰短
気曰時又冒曰心下満曰微腫曰或咳
或悸皆水気滞之症也
茵蔯蒿湯　大黄硝石湯　大黄甘遂
湯　柴胡龍骨牡蛎湯　小青竜湯
右歴観諸症曰身黄渇引水漿者曰黄
疸曰譫語曰往来寒熱曰黄腫曰発熱
是熱結之証也
八呆丸　茯苓戎鹽湯　蒲灰散
右歴観諸症曰淋瀝曰少腹拘急此由
血気之変小便不利者也

小便自利

自利者血気迫于内而不循環也
苓圭朮甘湯　圭支附子去圭加朮湯
抵當湯　小建中湯　真武湯　八呆
丸　白虎湯
右歴観諸症曰冷痛曰大便鞕曰発在

曰消渇曰讝語曰眩皆血気迫之症也

小便數

小便数者有気盛而逆水者之有気逆而水自下者也

按圭支加附子湯気盛而逆水也當列于此

小承気湯　麻子仁丸

甘草乾姜湯

右歴觀諸症曰大便鞕者気盛之症也曰心煩微悪寒曰眩而涎沫多者気逆而水自下之症也

渇

内津液竭之症也有由热水竭者有血液竭者有水竭而渇者

白虎湯

右表裏倶热曰舌上乾燥而煩曰口乾舌燥曰身热皆热気伏而致此渇也石羔主之

茵蔯蒿湯　大陥胸湯

右曰發黄曰潮热是热気結水致渇者大黄主之

瓜蔞瞿麥丸　柴胡姜圭湯

柴胡去半夏加瓜呂湯

右虽小便不利心下不滿不悸少腹不滿不見水腫者是血液間竭之症也瓜呂圭之

五苓散　茯苓沢瀉湯　猪苓湯
八呆丸

右歴観諸症曰発汗曰吐曰咳而呕曰小便反多是水渇之症也沢瀉主之

小柴胡湯　黄蓍圭支苦酒湯
生姜甘草湯　小青竜湯

右無有渇是客症而不為主故無治渇薬也

乾燥

気盛而水渇之症也乾者易症也燥者劇症也燥者不目見之則不去之故大承気湯曰口乾燥白虎湯口乾燥又曰口乾燥燥然則不可概也口舌曰燥咽胃中曰乾也有由汗吐下津液渇而乾燥者有熱而乾燥者有血液涸而乾燥者

白虎湯　大承気湯　大陥胸湯
己椒藶丸

右歴観諸症曰熱結在裏曰渇曰煩是熱結而作乾燥者

五苓散　苓圭五呆甘草湯　生姜甘草湯　甘草乾姜湯

右歴観諸症曰下之曰多唾曰涎沫不止曰吐逆是水気渇之症也

小建中湯　桔梗湯　桔梗白散

右歴觀諸症曰悸衂曰失精曰吐膿是血液竭之症也

煩

煩者気為主有在表者有在裏者有在内者皆気欲発而不能発之症也有血滞而煩者有水滞而煩者有熱実煩者有虚煩者也

圭支湯

右血滞而煩者也

麻黄湯　小建中湯　小柴胡湯

瓜蒂散　大柴胡湯　十棗湯

右歴觀諸症曰胸中煩曰心下急是病在于裏之症也水滞而煩者也

調胃承気湯　小承気湯　大承気湯

右歴觀諸症曰大便溏曰大便鞕曰燥屎是病在内由熱実而煩者也

梔子豉湯　梔子乾姜湯　酸棗湯

右歴觀諸症曰虚煩曰大下之曰不曷眠是病在于内虚而煩者也

心煩

心煩者裏症也有外裏気逆而煩者有気急而煩者有気自觧而煩者

黄連阿膠湯　猪苓湯

右気自然鬱而煩者故他無兼症黄連阿膠主之

梔子厚朴湯

右気急而所致者也梔子主之

白虎湯　甘草瀉心湯　調胃承気湯

右歴観諸症曰背悪寒曰乾嘔是気逆而所致者也甘草主之

小柴胡湯　柴胡姜圭湯

右外嚢而心煩者也曰往来寒熱胸脇苦満是外嚢之症也雖非主証外嚢則気逆而煩甘草主之

心中懊憹

気攻心而所致也有結胸而所致者有燥屎而所致者也

梔子豉湯　大陥胸湯　大承気湯

右歴観諸症心中懊憹者梔子主之但無見症也曰短気曰心下因鞭此結胸之症也大陥胸湯主之曰有燥屎而所致者必心煩而心中懊憹大承気湯主之

煩燥

燥者乾也津液竭之症也

五苓散　圭支加黄耆湯

甘草乾姜湯

右歴観諸症曰大汗出曰從腰以上必汗出曰小便不利是津液竭之症也気急而煩躁者圭支主之気逆所致也曰厥逆吐逆是気逆之症也

煩躁

躁者騒也気欲行而不能行血動者也

乾姜附子湯

右気欲行而不能行故有昏夜之別是其徵也

茯苓四逆湯

此條當有四肢厥逆之症方名可知乎

以上気逆而煩躁也

圭支甘草龍骨牡蛎湯

以上血気逆而所致也曰因焼鍼者亦血気之変也

大青龍湯

以上水外裏血気而所致服茱水去則煩躁自止水不為主也

呉茱萸湯　甘麦大棗湯

以上二方気急而煩躁者也曰頭痛曰乾嘔是血気急之症也大棗主之

心下痞

病在裏也痞者気不行也有自蔚滞者有血滞而所致者有水滞而所致者也

泻心湯

右気自不行者也

半夏泻心湯

右血滞而所致也

小半夏加茯苓湯

右水滞而痞也

右歴観諸症曰按之濡者水不聚血不凝也気自滞者黄芩主之腸鳴者血滞気不行也茯苓主之

心下痞鞕

鞕者血凝之証又有水滞而鞕者

圭支人参湯　生姜泻心湯　木防己湯　甘草泻心湯　旋覆花代赭石湯

以上血自凝之証也

十棗湯　大柴胡湯　小柴胡湯

以上水滞而所致者也

右歴観諸症曰下利曰利下曰雷鳴者水下降血自凝之症也人参主之曰短気曰引脇下痛曰吃吐是水滞而所致之症故主遂水而不治痞鞕也

心下鞕

由水而血気偃息之症也有自表迫者有自裏迫者有自内迫者気不蔚滞故鞕而不痞

主姜棗草黄辛附湯

此湯之所治或悪寒或不仁或手足逆冷而所致之者也是自表迫之症也

枳実湯

是自裏迫者也

大承気湯

右曰下利曰脉皆平

甘遂半夏湯

曰下利曰續堅滿是病在内位有留飲之症也

大陥胸湯

以上自内迫者也

右歴觀諸症自表迫者曰悪寒曰不仁是表証也自裏迫者無表症心下卒堅是其症也

心下悸

気動血之証也有津液竭而悸者気逆而悸者有水気上攻而悸者有留飲而悸者

主支甘草湯　小建中湯

以上気逆之症也

真武湯　茯苓甘草湯

五苓散　苓主甘棗湯

以上水気上攻而悸者也

小柴胡湯　半夏麻黄丸

小半夏加茯苓湯
以上留飲而所致者也
右歴觀諸症曰叉手自冒心曰煩曰衂是気逆之症也圭支主之曰頭眩曰厥曰癲眩是水気上攻之症也茯苓主之曰喜呕曰呕吐是留飲之症也半夏主之気逆者用圭支因其主症也用茯苓者気逆而水倶迫也故苓圭並用之真武湯之証因發汗之変水獨為患故不用圭也用半夏者由留飲而気逆水去則逆自治、故不用圭也気逆迫于血分者一也故為気逆動血之証也

心下滿

水結気之症也
大陥胸湯　十棗湯　甘遂半夏湯
以上水結血気也
半夏瀉心湯　甘草瀉心湯
小柴胡湯　大柴胡湯（屬方）
以上由留飲所致也
苓圭朮甘湯　圭支去芍藥加茯苓朮湯
以上気逆水迫之症也
右歴觀諸症曰鞕滿曰鞕痛曰堅滿水結血気之症也甘遂主之曰痞曰雷鳴曰不欲食留飲閉気之症也半夏主之

曰上衝曰眩曰小便不利有気逆之症者茯苓桂支主之

胸滿

裏症也有気逆而致者有気急而致者有由水而気逆者有気急而水迫者

主支去芍薬湯

在曰下之後者亦気逆也是気自然之痞故無兼症也

呉茱萸湯

右気自急而所致者曰呕曰胸滿者是気急之症

大承気湯　厚朴大黄湯　茯苓飲

枳実薤白主支湯　葶藶大棗湯（屬方）

以上四方気急而水迫者也曰口禁曰自吐出水是水気急之症也枳実主之

苓甘五味姜辛湯　麻黄湯（屬方）

小柴胡湯

以上由水而気逆也

桔梗白散　桔梗湯

以上由血而気逆也

右歴觀諸症水気逆者曰喘曰服痛也由膿而気逆者曰振寒曰吐膿也桔梗主之

胸服滿

裏水為主有襲気者有気逆而水滞者
有水聚而気迫者

小柴胡湯
右曰往来寒热曰默々不欲飲食曰心
煩是水裏気之症也外襲則気実故為
热而不雷鳴也

附子粳米湯
右気逆而水滞之症也気逆者為寒而
不見热無煩痞鞕等之証曰腹中冷曰
雷鳴是気逆而不結実也

苓圭朮甘湯
右曰支滿者支於呼吸者也不襲不逆
冒眩者水聚而気迫之症也

短気　裏
水気迫之証也

茯苓杏仁甘草湯　苓圭朮甘湯
以上二方曰胸中気寒曰有微飲是水
気迫之症也胸中塞自上閉而迫者茯
苓杏仁甘草湯主之自心下逆而迫者
苓圭朮甘湯主之

十棗湯大陥胸湯
以上二方曰心下痞鞕滿水気実而迫
者也甘遂逐之自胸陥而及心下者大
陥胸湯主之自腹下及心下者十棗湯

按此必脱大柴胡
湯条
曰之上当有心下鞕
三字蓋写脱也

主之
栝樓薤白々酒湯　大承気湯
以上曰腹満而喘水気自腹迫者承気
湯主之曰喘息咳唾胸背痛由痰飲而
閉者瓜呂薤白々酒湯主之
主支芍薬知母湯　甘草附子湯
以上二方曰歴節疼痛曰骨節疼痛由
疼痛而短気者非主症也

（按此処当有是水気衷而迫也六字）

少気

水気脱之症也
梔子甘草豉湯　竹葉石羔湯
右歴観諸症曰発汗吐下後曰虚煩曰
虚羸是脱症也気急者卮子甘草豉湯
主之気逆者竹葉石羔湯主之

腹満

水気不行也
梔子厚朴湯　厚朴七物湯
小承気湯　大承気湯
右歴観諸症曰身重曰短気曰喘水嚢
之証也枳実厚朴湯主之
己椒藶黄丸　茵蔯蒿湯　大黄消石
湯
右歴観諸症曰小便不利曰口舌乾燥
水気不行疼熱之症也不用枳実者非

按此二方症非水聚者考方辨主支湯曰治上衝之症劇而血滞気將行而不能行因脹痛者是血滞気不行之症故借芎茱也白虎湯曰治血気伏裏作熱渋不能循環者又以自汗出曰腹満身重無見水状亦非其矣之也依之則不可曰水聚惟曰水気不行則可也

外襲也
主
支加芎茱湯　白虎湯
右血気不循而水聚之証也曰時痛曰不可轉側是血気不循之症也此脹満非主症故不用逐水之茱也

脹満

水気聚之症也脹者作形満者不作形
血気不循水気聚之証也
厚朴生姜半夏甘草人参湯
右血気走表留飲不消化因作脹満者
曰発汗後者亦血気迫于表也
四逆湯
右血気逆水聚致脹満者也此湯主之曰下利身體疼痛者血気逆之症也
調胃承気湯
右血気迫于心水気不行作脹満者此湯主之曰吐後亦血気迫于心也
備急円
右以気聚血気迫而所致之脹満者此湯主之曰卒痛者血気急之症也

腹脹

大承気湯　消萶散　走馬湯
右歴觀諸症病在血分水聚所致也曰少隂病曰心痛曰大便必黒是其証也

脹而不滿者水自滯也其脹者必大便不通也

少腹滿

有由水而滿者有由血而滿者

小青竜湯　大黄甘遂湯　大陥胸湯

右歴觀諸症曰小便不利曰小便難是由水滿之症也

抵當湯　抵當丸　土瓜根散

右歴觀諸症曰小便自利曰狂曰經水不利是由血而滿之症也

少腹急結

気急而結血之症也

桃仁承気湯

少腹堅滿

水滯而血気不循環之症也

大承気湯

少腹拘急不仁

血滯而気不能行之症也不仁者易証也拘急者劇症也

八果丸

（按此方無辨方解曰少腹弦急目弦者是血気上逆之症也按血気上逆之故少腹気血不行而致也）

少腹弦急

血気迫症也

主支加龍骨牡蛎湯

少腹腫痞

血滞気不行也

大黄牡丹湯

右歴觀諸症血滞気不行之証也曰如狂曰悪露不尽曰腰痛曰失精曰腸癰是其症也

譫語

熱気攻心之症也

調胃承気湯

右主治譫語也故舉譫語一症而已

大承気湯

右熱実而有水気者主之曰潮熱曰微喘是水気之症也曰不大便曰有燥屎是熱実之症也

小承気湯

右水気渇而作実熱之状者主之曰多汗曰下利曰噦是水走于外渇于内之証也非実熱者故不用芒硝以上三方熱気急者也

去

（按噦者異于多汗不可嘔水渇也曰欲飲水者其水渇之証乎）

白虎湯

右血気不循熱伏而譫語者此方主之曰難轉側曰不仁曰遺尿是血気不循之症也

柴胡龍骨牡蛎湯

右血凝滞而作熱実之状者此湯主之

曰煩驚曰不可轉側是血凝滞之証也異於白虎湯者胸満而不腹満小便不利而不貴遺尿有水気之変也以上二方熱気逆者也

上衝

気逆不能外発之証也

圭支湯　圭支加圭湯

以上気逆而上衝者

葛根湯

右気逆上衝而血迫者曰無汗小便反少曰口禁不得語是血迫之症也

苓圭朮甘湯　苓圭五呆甘湯　苓圭甘中湯

右由水気逆上衝者此方主之曰心下逆満曰小便難時復冒者是有水気逆之証也

瓜蒂散

右水気在胸而上衝者此方主之此症亦非逆気故無圭支也

目眩及頭眩

眩乱視也水気迫之症也頭眩者目眩之劇者也

葵子茯苓散　苓圭朮甘湯　真武湯

五苓散　小半夏加茯苓湯　澤瀉湯

右歴觀諸症曰身重曰心下逆満曰胸

脇支滿曰心下悸曰嘔吐曰有水也曰支飲是由水気迫之証也

甘草乾姜湯

右気逆而眩者此方主之曰遺尿曰小便数是気逆之症也

圭支芍薬知母湯

右血凝気急者此方主之曰歴節疼痛是血凝之症也

茵蔯蒿湯

右熱気迫而致者此方主之曰心胸不安久発黄者是熱気急之証也

目瞑

瞑失明也血迫之症也曰必衄者是血急之症也

麻黄湯

喘

喘者水在于胸中気不行之証也

麻黄湯

麻杏甘石湯

圭支加厚朴杏仁湯

右表水逆于咽而所致者杏仁主之曰身疼曰悪風曰無汗曰発汗後汗出曰太陽病下之是表水逆于咽之症也

小青竜湯　小青竜加石羔湯

越婢加半夏湯

右裏水迫于咽而所致者半夏主之曰心下有水気曰乾呕曰或渇曰不渇曰目如脱状是裏水之症也半夏所治者咳而喘杏仁所治者喘而不咳是其別也

栝樓薤白々酒湯

右痰飲自外冒者此方主之異於小青竜湯者有胸背痛之症此自外冒之徴也

葶藶大棗湯

右胸有水所致者葶藶主之曰胸滿脹曰迫塞曰不得息是胸有水之症也

葛根黄連黄芩湯　木防已湯

大承気湯

右三方者血気之急而喘不為主也故無治喘之藥也

咳

咳者水気在上之症也

苓甘五味姜辛夏湯　猪苓湯

真武湯

右水在血分而所致也茯苓主之曰手足厥逆曰手足痺曰下利曰四肢沉重是水在血分之症也

小青竜湯　越婢加半夏湯

小柴胡湯

右留飲所致者半夏主之曰乾嘔発熱曰上気曰往来寒熱曰喜嘔是留飲之証也以熱上気亦不在血分也

十棗湯

右水迫干血分而所致者此方主之異半夏者作胸痛作煩是迫血分之症也

桔梗湯　生姜甘草湯　桔梗白散

右三方因血之変所致者咳不為主也此他有血迫所致者或吐血或涎沫中帯血其症必咽中乾是非水気故不用逐水之薬也

身重

身重者表水滞之証也有外嚢而水滞者有血気急而水滞者有血気不循而水滞者

大青竜湯

右一方曰脉浮緩曰作有軽時是外嚢之症也

防己黄耆湯　圭支加黄耆湯

右二方曰脉浮曰汗出者是血気急之症也防己黄耆湯者無裏症而圭支加黄耆湯者有煩躁小便不利之裏症是其別也

大莱気湯

此汗出身重血気急之症而異於防己黄芪湯者有短気腹満等之裏症而热実也

葵子茯苓飲（表）真武湯裏苓圭（姜）朮甘湯（内）

右曰洒淅悪寒曰腰中冷曰腹痛曰沉重是血気不循之症也葵子茯苓散者曰洒淅悪寒而病在表也真武湯曰腹痛下利而病在裏也苓姜朮甘湯小便自利而病在内也

白虎湯柴胡加竜骨牡蛎湯

右血気伏于内而不循環者曰煩驚曰讝語者血気伏于内之症也曰難以轉側曰不可轉側者是血気不循之証也

水腫

腫者水気見于表也有自表起者有自裏迫者也自表起者曰身自裏迫者曰身體曰四支

越婢湯越婢加朮湯

右曰脈浮曰悪風曰汗出曰不渇是水気起于表之症也加朮湯曰脈沉小便不利者虽見裏証是有自表迫于裏者故曰一身也

防己茯苓湯　防己黄耆湯

右四肢其々動曰腰以下腫及膝者是水氣自裏見于表之証也麻黄所治之水者表而在上防已所治之水者裏而在下是其別也

圭支甘草附子湯　圭支芍莱知母湯
牡蛎澤瀉湯

右三方血氣不循而水滯者也曰身體疼痛曰支節疼痛曰太病差後者是皆血氣不循之症也故以治血氣為主以水氣不為主

衂血（并）吐血

氣急而逐血之症也

圭支湯　小建中湯　瀉心湯
黄土湯　麻黄湯

右圭支湯者自表而迫者也故曰頭痛也小建中湯者自裏而急者也故曰腹中痛也瀉心湯者自内而急者也故曰心氣不定自表裏逆而急者作痛也主支甘屮以治氣逆芍莱以治痛也自内者氣急而吐血者瀉心湯主之自外逆所致者黄土湯主之麻黄湯因水而氣逆所致者衂不為主故以麻黄逐水衂自止也

下血

有血滞而下血者有気脱而下血者

芎帰膠艾湯　桃花湯　黄土湯

右歴観諸症腹中痛者血滞而気不循之証也芎帰膠艾湯主之曰下利不止者気脱之証桃花湯主之自外迫而所致者下血或吐血或衄血也黄土湯主之

経水不利

有血乾而不利者有疼血而不利者有経閉而不利者

大黄䗪虫丸　抵當丸　下瘀血湯

土瓜根散

右歴観諸症曰羸痩曰肌膚甲錯者血乾之証也腹満而不鞕不能飲食者是血乾不能消化故也大黄䗪虫丸主之曰発狂曰少腹鞕満曰喜忘曰屎虽鞕大便反易其色必黒曰消穀善饑是瘀血之証也抵當湯主之下瘀血湯亦主之帯下帯滞也行経中而滞変白物下或経一月再見者或陰癩腫者経閉之症也経閉者肌膚自肥満土瓜根散主之

狂驚

血攻于心之症也

圭支去芍薬加蜀漆竜骨牡蛎湯

柴胡竜骨牡蛎湯

右歴觀二方血気逆而迫者作狂驚作煩驚此竜骨牡蛎之所主曰胸滿曰小便不利者是水気之証也水気血気俱迫者柴胡竜骨牡蛎湯主之血気将逆而迫者圭支去芍薬加蜀漆竜骨牡蛎湯主之

桃仁承気湯　抵當湯

右歴觀諸症血自下部急者狂而不驚曰少腹急結曰少腹鞕滿是自下部急之症也血為主者抵當湯主之気為主者桃仁承気湯主之

発黄

発黄者水気滞而瘀熱之症也有自表起者有自裏起者有自内起者

麻黄淳酒湯

右自表起者主之

茵蔯五苓散（證闕）

右自裏起者也當有渇小便不利等之証越婢加朮湯此証非黄疸也由水腫裏有熱而見黄色也

茵蔯蒿湯　梔子大黄湯　大黄消石湯　梔子蘗皮湯

按証也下当有茵蔯蒿湯主之字

右歴觀諸症曰食則頭眩心胸不安曰頭汗出曰腹微滿曰心中懊憹是自内起之証也自内起而気息則卮子大黄豉湯主之頭汗出然不去則大黄消石湯主之発熱而汗不出則卮子蘗皮湯主之

消石散

右血証而発黄色者主之他虽有畢発黄之條皆非主症故不載焉

不得眠

津液脱之症也

酸棗湯　猪苓湯　梔子豉湯

五苓散　乾姜附子湯

右歴觀諸症曰虚煩曰心煩曰煩躁曰液竭而気息之症也曰発汗吐下後曰発汗後曰下利以示津液脱也

攣急

血滞而気急之症也

芍薬甘草湯

拘急

血脱而気急之証也

四逆湯　八味丸　烏頭湯

以上脱症而気急者也曰四支厥冷曰虚勞曰厥逆是血脱之症也

當歸建中湯
右虚労不足者亦脱症也異附子者或
刺痛或引腰背是血滞之症而不厥冷
厥逆也

不得屈伸
圭支加附子湯　甘草附子湯
烏頭湯
右歴観諸症曰微急曰掣痛曰疼痛者
血気不得循環之症也

不能轉側
血気逆而不循環之症也
柴胡竜骨牡蛎湯　白虎湯

圭支附子湯
右歴観諸症曰一身尽腫曰身重曰身
體疼痛是血気逆而不循環之症也

起卧不安　卧起不安
気急者卧起不安血逆者起卧不安也
不安者不能久之状乍卧乍起也以心
煩狂驚致此不安也
梔子厚朴湯
圭支去芍薬加蜀漆竜骨牡蛎湯

不得卧
水気急之症也
小青竜湯　八味丸

右歴觀諸症曰倚息曰短氣是水氣急
之症也小青竜湯者水主而氣逆故曰
咳逆八味丸者氣主而水急故曰煩热
也
身疼表
疼騰也水滯氣不行之候也疼者按之
痛劇不移其所在
麻黄湯　麻黄加朮湯
麻黄杏仁薏苡甘屮湯
以上表水裏而氣逆之証也
圭支加黄耆湯
以上血氣自裏迫表之候也

右歴觀諸症自表裏而逆者無汗也麻
黄主之自裡出而急迫者自汗出也黄
耆主之

觀證辨疑　終

天保十一庚子初春
於京師寫之
南海琴浦
市郎俊安