

X

g 28

F
ケ-36

口氣豆湯 經互 黑墨 草蔻子 大黃子 喜連

右至味以水煎半煎取一合次服

口瘡瘍膏 一合破敵膏

苦歷青膏 六分 腐爛膏 四分 右擦勺

口瘡瘍膏 一合合參膏

白蘿蔔子 二分 墓壁膏 半分 三分

口瘡瘍膏 一斤 蒜頭子 十三分 碎石 檀脑 各八分

苔味合勾沸開半合中ニヒツ入ニ事ハラ待テ 嘴裏ヲ洗フ


口瘡瘍膏 白蘿蔔子 常歸根 各八分 龍膽子 二分 烏丸 三分

右單以水煎半煎取一合擦服

口瘡瘍膏 佛手根大根子 滌治者ハ始ヨリ半切断可也之ヲ切断スルハ一具治
タニ似シトモ必又再糞スル者也シ一若し根ノ滌治タソ待テ切断スル必又再糞スル



490.9
Ge-6



1112

外科起廢序

帆光見

醫之有内外科也固矣治內者必審虛氣之舍喫血
行之壅視其應節宣之而已治外者必明臟腑之輸
辨筋敵之束凝固者割之破傷者瘳之而已至其能
痊復故二者皆天也狀人之所能為也東方之治外
華岡氏尤著用刀之妙剗惡之勤殆與西人抗行而
莫微不及者於臍腑脉絡之形有所未明也今觀錄
田子之技因華岡氏法而精之格領宮收癩疝其他
割斷瘻縫之巧西人不能加也余每恨左邦人睿敏不
技巧遠過西洋而度數之學器械之用供軍國備不

1月28
No. 1640

虞者猶有不及未暇講習耳讀之書者雖及於學而進於技將有豪傑之士經興豈唯瘍科之爲哉

又 附文子明

采良東矯

予嘗讀魏志方技傳觀華佗之爲醫診若病在內鍼藥竹不能及剗割湔洗斷勝絕膜奇驗如神而其傳泯矣至宋明有瘍科之書率不稱之言謬妄凡手無足取者大洲徐田辰夙精外科近者輯其所治奇疾若干事錄爲十卷副以圖余曰外科走廢夫孔叢癩症古目爲不可治之病而今有人能治之勢不得奈附題記則雙重價以待之世醫徒之病然嗜疾不奈附題記則雙重價以待之世醫徒之病然嗜疾

用心之不仁可謂甚矣。昔廡之篠田景爲人來染歸敗利赴愈如不及。其不尚事財利技既足以配古華佗之徒。尚且不自足研精考覈益有所發明亦毫不斲喪。教誨子弟無新松益深。有察乎世醫之弊也是書而行其必有觀而興起者。豈特割湔洗區々走瘍之爲耶。余痛嘉尼用心之忠及其徵序叙斯言實於首簡并從忠上諸木云。

又

附文子明

毛利空桑

余嘗作序

木是二字及何二
改レド見レト行字
去ヘシ
余後トハ云ニス余
往ニ改ケヘレ

金廡鑄徒子之老於瘍科也久矣。於是金役受業於
門者亦多贍帰盛稱其精巧先是六年鑄子便松

皆外ハ序比々以タレ

精巧ハ精巧ニシキ假傍シテ用ヒハ次ニテモヨシ

生齋其所著外科走瘍而西請余文改其尾後而閔

載弱宋而至
トラス及壽者

徑詮世所未竟
先聞刃之善之

莫不立廢被許
至支韃侃要

巴意也半記
兄情如矣之走者

亦得人全人之過
テモ改メハ勿ルヘレ

生宮等家ニツ

然使人愕坐大見喫人言必吸嗚咲豈鳴得呼生寓

亦得人全人之過

無窮枉因知鑑子遠出世醫之右名不妄虚立

謂咲

生宮等家ニツ

獨唯聞之而已矣

趁船軍布完四百聞不如一見但

妻宋ハイウレス

恨余未得揚帆於東海而云升簾子之臺觀其美力之勝

虛主之改ムシ以

乃ナニハタヘレ

嘆仰若然者私生之技與茲端所載皆鈎之一斑耳

又ハナラス観サ

玩茲端者其勿以爲窺幽復遺文哉

矣アリ之妙之以

妻而妻革八秒子舊草稿書以先此把返ト以ナレ

其勿以爲下段ニス其勿以爲弁髮而妻焉之妙之以

ハ云ヘレ

但今ノ日於園川生瘻在少子村後次書序寫入
是不不主疾逐將矣久矣上幸是々々俟之
リカノ日欲往用西行以多也或之疾憂還北乞川
改元者即其時修車午未午言主介收篤寢
後虧千刀自至不保乞不立

後日寫入

外科起廢

南豫大洲

桂林鑑由先生口授

門人

松岡玄醫筆記

用麻沸湯辨

抱節先生曰按ニ病

寢急アリ緩ヒハ則

可若其急ヒニ逢ハ

唯本病ノ不利ヲ為ス

ノミナラス已ニ其期

ヲ失ヒ全ツ逆境ニ

陷ハニ及テ華陀

復生ヒト雖之ヲ加

色痿黃四肢羸瘦或ハ寒熱往來飲食味ナキ者一診也

ルシムテ先務トス前ノ三診トハ患者稟質虛弱ニシテ顔

亢麻沸湯シ用元前ノ三診後ノ三診アリ此診法ヲ審カニス

ハ失ヒ全ツ逆境ニ

陷ハニ及テ华陀

三此大ツ捨ラサツ取
ノ説未タ信ス可カラ
ズトス

諸ヒ血後元氣未復心下本有畜飲動作短氣スル者ニ診
也常ニ心下悸胸動劇ク或煩滿吐水シ或ハ呑酸嘈雜ス
ル者ニ三診巴坎候アル者妄ニ異フ可カラス若シ其壯實十
ル者ハ其証ニ隨テ主剤ヲ投シ諸症退テ後是ヲ用ニ妨ナ
カル可シ後ノ三診より其瞑眩スルヤ否シ察エスハ也是シ異ニ半
時許リソ経テ頻リニ小水ノ通氣有リト云漸ク脉浮數シ見矣
大凡首三診也此三候見ハス時ハ則瞑眩ノ兆トス可シ煩擾妄
詣撮空摸床即チ此ソ醉迷惑スル時ニ及之前シト欲スル
時脉ヲ診シテ具平常ヲ知リ腹ヲ按シテ胸動シ審ミシ且眼

又按煩滿吐逆者則
由有其病也否則未
必吐逆概用二湯者
果何意乎
又每其用之以不飲
食為要食後服之
多致吐逆不可不知

中シ見テ瞳子ヲ察シ置ヒ人或ハ常ニ脉浮數者アリ或ハ
胸動常ニ甚キ者アリ或ハ瞳子サシケ散大凡者寧ニ審視
シテ比シ知ル時ハ後ノ三診ニ於テ疑惑スルヲナシ凡麻藥シ
用ユル時ハ必先立六日前ヨリ半夏泻心湯或ハ茯苓飲等シ
投テ後之シ興凡時心下煩滿吐逆ノ憂憂ナシ其用ユルノ前
食餌常ノニニシ興ビシ既ニ其此レシ用ヒハ患者ヲ一室ニ
安堵スル者アリ大抵暝眩一時許シ期トス又或ハ半時或一時
餘ノ者アリハ兒ハ分量半減シ用エト雖大概半時許ニシテ
應スル也又此ノ用テ應セカル者ハ一両日ソ経テ酒製シテ


分量シ益テ專フ可シ別ニ口授アリ或ハ世醫末ニ酒服スル
ノ法有レニ多ハ心下煩滿吐逆シ又テ無用トナル者アリ故ニ
余カ家煎用シテ而散服スルフシ用ヒカル也凡術シ施ニ臨テ
患者ノ目シ手巾ニテ掩フ可シ己ニ瞑眩セシモ常ニ痛苦スル
ヲ思ヒケル故療具シ見ハ恐怖擾亂シテチシ上ゲ足シ地
チ甚タ力ノ強キ者ニ故ニ側ヨリ手足シ抱ヘ持シメ事ニ偏ム
シ性質ニ因テ瞑眩シ易クシテ又テ醒易キ者アリ故ニ瞑眩
十分ナラヌ内ニ術シ施ス一其内ニヨク瞑眩スル者ニ凡術シ
孰ニ者診候最肝要トス世医或ハ乳巣散シ療セシドテ少ヒリ
麻沸シ典ヘ漸瞑眩スルニ及テ此シ療ニ患者痛苦ニ堪エビ頻ニ

叶喚シ治シ辞ニニ誤テ妄語ト作シトガリニ切り剖キ挾シ出ス
ニ及テ已ニ斃シタル者アリ此シ診法ニ暗キノ咎也誠ニ恐ルヘ
キノ甚キナラズヤ如此ノ輩ハ唯患者ノ仇ノミナラス實賓ニ医門
ノ茅塞也故ニ世俗常ニ云麻薑シ服スル者ハ三年シ出ズシテ
死スト亦唯俗人ノミナラス庸工技倅無キ者亦隨テ之シ唱入
ノ技有ハシ疾ミ已カ拙シ掩フノミ嗚呼亦笑フ可ク憎ク可
キノ愚ニカラズヤ事ニ臨テ痛若発聲シ或ハ平常ノ言ノ如
キモ醉迷惑詔ナヘ彼是ノ始末自相合セズ此等ノ事モ
能ク神シ留メ意シ注シ可シ諸器物シテシ能是シ辨スト
雖能三診シ審ニエル時ハ眞偽自ラ辨ス可キシ己ニ療スル

ノ後清茶及象方ノ菉豆湯ヲ冷服セシム可シ其解醒スル
ニ遲速有リ或ハ二三服或ハ四五服ニシテ醒ム又翌日ニ至リ精
神常ニ復シタリト雖瞳子猶ヲサマラズ物ヲ見テ動カ如ソ
覺ヘ一物ニシ見ニ及三日ノ後自ラ故ニ復ス故ニ療後
一二日ハ菉豆湯ヲ興フレシ雨後或ハ調溼或ハ和血或ハ補
托証ニ随テ用ニ可リ或ハ參連湯或ハ泊夫藍ヲ多服セシ
尤事モ有ルシ別ニ麻沸湯辨ノ一篇有リ參觀ス可レ

瘡本腮上癰下

小兒腮上癰肉瘤



凡肉瘤ヲ發ス固ヨリ定處ナシ其療法ニ於ニハ大率乳
岩ト同じ但肉瘤ハ突起レ乳岩ハ突起ヤス其テ之ヲ療スルニ
挾ノ真中ヲ割ク一カラス挾ヲ撮ミテ四步六歩ニ分ナテ堅ニ
切シトナラハ四步カタ右ノ方一ヨセテ割キ横ニ切ラントナラ
ハ四步ガタ下ノ方シ割クレシ凡堅ニ切ルモノハ後日膿ヲ釀
スルニ至テ淄ルトナク横ニ切ル者ハ下ノ方シ割クスハ後日膿
ノ流レヨキカ為ニ四步ガタ右或ハ下辺一ヨセテ割クモノハ
挾ヲ取出スニ便ナリトス譬言ハ挾ノ徑リ三寸凡者三寸
餘切リ所チ根ヲ切取ルす四步方ノ処ヨリ鉗ヲ入レハニ

原嘉百上有三
四字

ラニナリテ甚便ナリ若真上ヨリ割サハ挾ノ径ヨリハ長
ク割クニアラサレハ根ヲ切取ニ當テ鉄ノ火ノミアタリテ甚
便利ナラストス切割テ后ハ挾ト皮肉トノ界シ指頭ニ
テ押分ク一レ恰モ柑子シムク加クニ分ナ易キニ若シ
或バ分ケリ唯キ处ハ龍鬚刀或バ及鉄ニテ切分ケ又指頭ニ
テ分ケテ根ヲ切取ハシ然ニ元此兒ノ痛ノ如ク至下リタル者
或ハ重サ凡百目モアル大痛ハ四歩六歩ノ論ナリ痛根ヨリ三
四歩ガタ横ニ切一レ餘皮凡者故下刃ノ方ハ尽ク挾ヲ分
ツニ及バス根ヲ取り后餘皮共ニ切斧一レ缝合スニテ緩急過
不及ノナキヨウ注意ニレ乳岩全下宣ク參校ス可レ

小兒反足

封内八多木村ノ農児齡三歳天賦壯寔初生ヨリ反足ニ一期
來テ未タ歩立ト能クス偶起ツハ趾頭地ニ着テ踵地ニ附ス父母
甚之シ患ヒ里医ノ治シ乞フ里医之シ視テ曰嗚呼後シタリ此証
如チハ瘡術初生ノ時ニ在リ已ニ一則シ症ルナハ瘡術ノ施スニナ
シト父母大ニ望ツ失シ只苦思ノ年月シ經ノミ偶ニチシ瘡テ
起ヒルナハ趾平地シ歩立ト高低ノ地ヲ歩スハカ如シ寔ニテ
見シ思ヒス一日瘡來テ治シ乞フニシテ診エニ反足ニ足裡地ニ
舟クルト進ク却テ足跡シ舟ルト易シ即ナ内舒筋湯加附子シ
吳ニ外足裡ニ扶骨板ニアテ綱帶術ヲナシ破リタル筒ニテ両胫

ノ包ミ跡上ノ瀉帶ヲ括リ附ケシキ日ニ三次之ヲ解ナ家方ノ合歡
木陽ミテ薰熨ニ整骨術ヲ施シ終ツア家方ノ緩筋恙ヲ搘込
ミ斯ノ如クスハト一日モ急テス教月ニメ骨筋稍整理シ一年
餘ニテ步行スツ常ノ如し

一僧左頬車発骨痛

新谷ノ一寺僧齡四十歳天賦壯実前年左頬車並故突起ニ然
左疼痛セス三年及ビニ益大ナリ事ニ害アルニ非スト雖容貌
醜キシ耻テ一日來テ治ヲ乞フ之シ診スルニ坚硬石ノ如リニシ乍轉
セス熟思スニ骨痛也即チ麻沸湯ソ既ニ刀ヲ執テ痛上シ斜ニ
効割左右ノ肉ノ壓分見ハニ頬車骨突起スツ鶴卵ノ如シト

雖骨髓中ノツニ非ス獨骨膜堅硬テ中ニ毒液凝着ス龍鬚
刀ニテ之ヲ切剥キ小鑿ヒシムテ毒液ヲ擗リ出ス其色灰白ニ能
之ヲ取焼酒ミテ洗ヒ縫合シ下端ヨリ穿瘻維シ骨膜中マテ伸ニ
三巾一帯ヲ施シ麻沸湯后ノ定創ヲ既ニ眼眩解シタル故ニ調
經陽シ既ニ創口前法ノ加クレニ日ニ至テ膿氣シ催ス故ニ排歛
膏シ貼レ七日ニソ絆シ取太ル膿氣未タ全リ尽キス故ニ水銃
ニテ家方ノ消毒水シ射入シ猶前後ソ入レ内家方ノ木剣湯ヲ
既ニ二十日許ニテ創口稍愈ルト雖壯口漏孔シ成シ稀水淋漓
タリ故ニ鉗ニテ壯口ヲ切開シ猶消毒水シ射入シ家秘ノ速欽
油シ綿ニ漬シ之ヲ填メ二月餘ニシ全ク痊タリ

男子患癩疝 痘瘍猖加岩

封内櫛生村ノ一農夫齡四十二歲天賦壯寔八年前陰囊
腫起ス其物事ニ害ナシ故ニ農ヲ事トメ常ニ隴畠ヲ上下ス
漸々ニ長大テ步タルヲ稍リ准シ故ニ囊裹ニ納レ頭ニ搾ケ步ス
ルヲ己ニ半年許一日來テ治ヲ乞フニシ診スルニ脉弦教舌胎微
黃ニテ四辺淡紫黒ナ腹寧急スト雖精神常々如是皆疝ノ因
也患處ヲ見ハニ大サ西臥ノ如ク陰莖ハ囊裹中ニ藏ヒテ無キカ如レト
雖囊ノ下辺一ノ尿口アリ是陰頭ニ蒙ハ孔ト云一凡陰皮囊皮
頑痼凸凹トメ奇石怪石ノ加キ陰根及毛中疣瘡トノ密ニ鍛
沒ノ如ク陳ナル處ハ蝦蟆ノ背面也患者曰世人ノ話シ聽リニ囊裹

大ナル者ハ水ヲ取テ愈ユトニ願リハ早行ヲ施セト予曰然ラス汝カ患
是癩疝ナル者ニソ世人ノ謂フ处ト異ニ此瘻ノ如クハ切新セシハ治ス
一カラスト雨后麻沸湯ヲ與ヘ陰頭ノ處位ヲ触察シ囊裹ノ下辺ノ孔
ヨリ鉗シ入上ヘ切割クノ四寸許シ始キテ陰頭ノ見ヌ夫ヨリ皮シ撮
ミ上ケ茎一鉗ノ當ラヌ様ニシ陰根ニ切上テ左右ノ頑皮肉ヲ切公
ルニ出血甚シカラス囊裹下面ニ至ル寸小血絡アリテ出血淋漓タリ
漸々ニ頑皮シ切尽レ俗ニ離鉢ト云徑リ八寸許ノ器ニ盈ツ日
欣状殆ト野猪肉ヲモノ終ニ切創カ如レ創口焼酒ヲ洗ヒ綿
血竭羔ニテ先ツ陰茎ヲ卷キ后ニ囊裹シ覆ヒ綿帶シ施シ麻沸
后ノ定剤ツ等ヘ翌ニ朝膾眩解ニリト雖癰熱頭痛口渴振栗

時々下腹绞痛盜汗自汗或々讐詰ツル発し殆ト傷風寒ノ如し是皆
症ノ所為也故ニ烏頭湯調經湯ヲ混服ヤシメ創處ハ瘡術ソ
加一スニ日ニテ内証未タ退カス故ニ獨前方シ此ヘ創處綿穿瘀血シ
貼し帶シ施し其夜三更、頃ヨリ内証微ヒリ退キ翌日ニ至テ大
半舊ニ復ス創处ハ瘀血漸クニ膿汁ニ變シ三四日ニメ氣血虛
慢兆シ見ハス故ニ十全大補湯シ共ヘ創處獨前恙シ貼し十餘
日ニシテ膿氣稍減シ元氣稍復スト雖ナ版拿急腰脚冷痛ス故
ニ家方ノ橙皮湯シ共ヘ外排歛黑シ貼し一月餘シ内外全リ治
タリ

凡世人陰囊ノ大シ見テ本草瘡症シ以テ名トス雖然其因

ニアリ下腸橐中ニ生下ノ大者アリニ大者アリニ之シ陰狐疝トス又瘀水
ノ橐中ニ充满ナ大ナル者アリニ之シ水瘡トス又瘀水並ウ次第ニ
頑痼ノ大ナル者アリニ之シ瘡症トス此患者ノ如キ是ニ此三因シ
分辨ヘシ凡テ瘡症水瘡シ療スルハ兩三日ノ間必發熱
口渴寒或々讐詰シ發し殆ト傷風寒ノ如キ者アリ是其ノ
當然也必ス恐ル可ラス大渴引飲スト雖石黑剤ノ事ニ非エ
症ノ瘡シ従フ可レ

一僧患附骨疽而股内穿貫大漏孔

封内内之子村ノ一寺僧齡七十歲天賦壯实六年前右股附骨疽
癈ス衆医ノ治癈ソト雖全痊ス未テ治シ乞フ患处シ見ハニ漏孔シ

穿チ膿水内ニ溢テ並ニ瘡口ニ淋漓タリ銀子ヲ以テ孔中ヲ探ルニ脾
骨缺出ハフニ枚是膿汁内ニ溢ル、ア故ニ骨益腐る者ニ外面ヲ見ル
ニ致年腐爛セし故ニ表皮已ニ薄シ故ニ孔ヲ通シ膿汁内外ニ流ル
ナハ治スヘシト乃チ刀ヲ執テ漏孔ノ外面ヲ堅ニ切削ツクニ寸許股
内ノ舊孔ト通透セシメ銀子ヲ以テ孔中ヲ探ルニ又朽骨二枚ヲ出ス其
長ク各七八歩ニソ薄扁ニ創口焼酒ヲ洗ヒ縫鶴卵焉ラ内トヨリ
填メ繩帶ヲ施し調経湯ヲ塗フ垂ヨリ腐氣元故ニ二日ニソ膿汁内
外ヨリ逆出ス於是水銃ヲ消毒水ヲ射入シ漏穿瘡ヲ填メ木剣
湯ヲ與一十餘日ニソ膿氣稍減ニ故ニ縫排欬ン填メ時ニ家方ノ
遠効油ヲ入レ一月餘ニ創口全癒ト雖漏孔充塞セスノ内外
之ニ應ヘ彼絶倒ス

遁逸ス雖然起居動作ニ害ナシ此僧是ヨリ交リシ入レ時々訪未
一日門弟子彼ノ孔ヲ見テ戯テ曰股内狐狸ノ竈シ開ケト僧モ亦
戯曰方丈ニ公等ソソ此中ヨリ出入セント張吳此ア故事ソヘテ
之ニ應ヘ彼絶倒ス

凡テ附骨痕、朽骨ヲ取リ膿汁ヲ取ハフ專要ニ又胸肋骨ニ発
肋骨ノトヲ通リ漏孔ヲナシタル者ハ切斷スヘモ准シ口授ソ解
ス外ニ非ス親視ノ其機ヲ得シ

予カ工夫スル處ノ貫皮子ト號スル器ハヨ母常ノ消息子ノ如リニ
剛鉄ミテ作リ其先ノ珠トナス处ヘ三稜針ノ如ニ刃ヲ附ケタル器
ノ孔口ヨリ斜ハスハ三稜ヘ丸ニ堅キ黑糞或ハ髪附油ヲ

モ附ケ堅ノ物ノ斯加ソスナハ肉皮ニ礙ルトナソ突通ノ後
三段ノ下ヘ糸シ括リ孔口ヘ引貫テ糸シ約ハシ猶痔漏ニ
糸シ繫ル術ト全ク同レ痔漏ニ糸シカルハ肛門中ノ皮薄
キ者ニ故ニ先ノ久シ尖タル消息子ニテモ佳シ表皮ヲ破ル必
此器ニ非シハ破レス雖然處位ヨリテハ強ク突テモ破シ先处
アリ此時ハ左チニテ突上ケテ表皮ノ高リ張ル处ヲ鉗針ニ
カシ破リ突通ニシ

男子左尺澤火傷膠着而不能屈伸

丸火傷ニテ尺澤委中其外屈伸ノ處膠着シタルハ前ニ伸ハ処ノ
長鍼金創鍼、加ニメ長ニ寸許+
ル者真鍮ニテ作ルモ亦佳ナリノテ裏肉ト禪肉トシ能撮ミ

見テ其處一横ニ突通シ置テ切刃斯加ソスナハ裏肉一切込ム
誤ナシ屈伸ノアル處ハカシ動レテモ加減、達フ者ニ故ニ以針ノ
度トスシ長鍼ハ大痛切所尋ニモ用ルノモアリ一概ニ委中尺
沢ニ限ル可カラス云々

男子患腸痔反出如山茶花

凡腸痔療治口授甚多シ軽忽ニ之シ切所尋ニス、脱血ソ忽テ
死スル者ニ其瘻意血痛全様ト心得、し腸痔シ出ス、満肛
齊シ又出スル者ハ一度ニ糸シ繫ルヲ能バヌ一處ニ糸シカケ置
切ル、シ見テ又次ニ糸シカケ次第ニ切太公一レ云々

婦人陰痛

凡陰瘡ハ名レ異ニスト雖猶粉瘡ノ一種ニコト立六人ヲ療
アルニ皆瘻水中ニ栗米ノ如キ物ヲ文エシシ撮ミ見ハニ獨粉ニ

小兒鎖肛

凡鎖肛ヲ切斷スルニ小兒ノノ啼シテ呼吸ヲ張ラレムレハ肛門ノ處位張
ハ故ニ指頭ミテ探ルサハ能分者ニ切斷法ハ上下左右ト切割干具
中ノ四端シタシツ、切取シし譬言ハ物ヲ中央ヨリ十文字ニ切割キ中
西端取ハカ如レ肛門ハ尋常ノ孔ヨリハ今カシ廣キカト思フ位ニ新
スシ療後格別膿氣モ催サヌノ稍ク狹リタル者ニ彼ノ器具ト号
ス物ハ綿ミ末タ開サル松蕈ノ散ノ如キ物ヲ作り綿絲ミテ疎々ニ
卷キ其散ノ茎トナスニキ處ハ黒苔リ肛門一塊凡ニ便ヲ通ル

每ニ入換一或ハ時々更ニ入換ル事無モ亦通ハニ故ニ兒シ護た者
ニ能教エ漏帶モ強クスシ若シ漏帶復フノ一度ニテモ黒具拔ル寸
ハ愈附ク者ニ故ニ黒具ハ肛門創口ヨリハ今カシ大キクタルト思フ程
ニテ抑置ニシ愈ルニ從ヒ肛門狹ク者故ニ其時ニ次第ニハク作
テニハ墮ラヌ者ニ能々意シ用ニシ肛門ノ處タケ色變リ皺ミタ
ル处アリテ只表皮ノミ闇ヨツテ居ル者ハ切斷シ黒具シ入ヒテ佳ニ
是ハ追タニ常ノ如タル者ニ又肛門ノ孔藏ナシノ切斷セスシハ有一カラ
サル者アリ前年封内立石村ノ一小兒初生立六月ヲ經テ父母携一
來リテ治シ乞フニシ視ニ肛門ノ處位ヨリカレ會陰ノ方ヘヨリテ
一小孔アリ其孔絶ニ消息子ヲ入ル位ニ糞汁不斯此孔ヨリ出ル

ト云即切取ニテ常ノ如レ是等肛門ノ處位分辯シ易フソ瘻汰
モ亦准カラス又前年宇和島封内東多田村ノ一女兒三歳ニ
ノ鎖肛丸ノ薑汁ハ毎ニ陰門ヨリ出タリ予之ヲ瘻メ後薑汁
總テ陰門ヨリ出テ全愈シタリ予母一小孔アリテ薑汁シ出シ
或ハ陰門ヨリ薑汁シ出スハ生ツ得ヒト雖薑汁一滴モ出ル处
ナリメニ年餘生ツ得タル者アリ予徃年紀州花岡先生之門ニ
遊フ時先生一児ヲ瘻スルシタレ親視ヒタリ父母ノ詰シ聞クニ小
兒每ニ黃汗ツ發シ是臭氣アリト云是亦怪シシム

婦人項上癰髮瘤

封内阿藏村ノ一農婦齡二十七歳天賦壮実前年項上ニ瘤シ

癰ス痛痒ノ知ス年月ヲ経テ漸リ大ナリ右承テ治シ乞フニシ見ルニ坚硬
石ノ如レト雖手裡ノ粉瘤ト而テ麻沸湯煎一罷頭髮カシ執テ豐ニ
切剖ク一寸許ニ粉シ出ス故ニ指頭ニ壓出セシニ毛髮ヲ縛シガ
キ物アリ銀子ミテ引出ス皆毛髮也長キ一寸六步ヨリ一寸許ニ至ル
於是始テ髮瘤丸ヲ知ル尽ク取去リシ粉瘤ト全ク裏膜アリ故ニ
之ヲ半ハ取去リ燒酒ヲ洗ヒ缝合シ紙シ入レ三巾一帯シ施シ麻沸
后ノ定剤通ヘ眼眩解后調經湯ヲ與ヒ膿氣ノ催スラ見テ排歛ヲ
貯し八日ノ後瘻キ取去リ二十餘日ニシテ全ク痊タリ

凡肉瘤粉瘤相類ノ坚硬者初心ノ者ハ之ヲ分辯スルト難シ雖然
多年之シ診スルハ一揆ノ辨ニシト虽其診法詳ニ口授シ誰シ先

其大率シニハ肉瘤ハ坚硬也ト當然ニ雖然其堅ニ泥クカラス
カソク軟カナル者モ間ニ在ル者ニ粉瘤ハ堅クノ堅キニ非ス軟ヤル
カ如クニメ軟ラカナラス指頭ニ押し見ルニ微ク張ルノニ息アリ何
レモ其診法言ニ准レ心システ心ニ傳フシ其他諸瘤膠々瘤
脂瘤血瘤如キハ庸医モ猶能ソニシ辨ス髮瘤如キハ予偶ニ
人シ療シタリト虽未タ的當ノ診法ヲ得ス前年宇和島封
内野村ノ一農夫天貴骨上ニ瘤ヲ発ス其大サ雞卵ノ加シ手裡
以爲ラク粉瘤シト即チ之ヲ刺ス微シ粉アリト虽大半毛髮
シ交エ是亦髮瘤ニ此二人ニ止ルノミ

玄巣昌曰師ノ述如ク肉瘤粉瘤ノ分辨寔ニ准シ前年宇

和島封内郷内村少太郎ナル者隣人ノ為ニ薬ヲ乞來ルニテ以
男シ視ルニ頃上ニ瘤シ發ス大サ茶碗ノ如レ之シ撮ニ見ルニ堅
硬石ノ如クニメ根脚運轉ス以爲ラク是肉瘤ナリ而チ以ヒニ
瘻ヲ進ム患者曰僕カ瘤發スルト已ニ七年今ニ至テ痛
痒シ知ラヌ且ツ事ニ害ナシ雖然瘻シ賜ヒテ全愈ラ得
再ヒ來テ治ニ就ケシト兩後十餘日ニメ來ハ故ニシ師ニ告
ケ師即チ之シ診曰汝カ言ノ如ク肉瘤セト雖ニシ熟思スル
ニ肉瘤ヲ粉瘤シ莫ニ者ナシト麻沸湯ヲ與ヘ之シ切
断スルニ始ハ粉ヲ出スフ四撮ニ許シ其餘皆肉疣ニ之シ
取大カリ缝合ノ全ク痊タリ師ノ言符珪シ合スカ如レ

一男子患陰狐疝

封内黒之内村ノ農夫齡二十六歲天賦壯寔三年未陰狐疝
患ニ來テ治シ乞フ瘻症條下ニ詣ル加クヤ腸囊中ニ垂下ス者
是ナリ左横骨上辺指頭ヲ没た程ニ穴アリ世間陰狐疝ノ治法
シ云者穴上ニ灸シ或ハ漏帶シ施スノニ枝ニ止ルノミ予一ノ意匠ア
リ乃チ麻沸湯ヲ與ニ瞑眩是早クシテ半時許テ瞑眩ス門人傍
ヨリ患者ノ手足ヲ強ク撮ミ見ハニ聊顰蹙足色ノ色ナリ面紅
メ醉人ノ熟睡スルカ如シ即龍鬚刀ヲ穴上ニ堅ニ切割ク
一寸許ラ指頭ヲ掘リ見ハニ猪血脉ニ道アリ其間ニ食指頭ヲ
没スル許ナル穴アリ是ヨリ腸ノ出入ル也此穴ノ四辺シ龍鬚刀

ニテ削ルカサツシスルノ理ナリ燒酒ニテ洗ヒ其穴ヲ表皮ヨリ収立ニ
一鍼逢透シ筋ハスノ其、仍ニテ糸ヲ切シキ又横ニ一針逢透シ
前ノサク閣キ夫ヨリ切跡セシ創口ヲ逢合タル創口ノ上ニテ筋ニ又横ニ縫置
浩ハヌメ閣キニ至ノ糸ヲ逢合タル創口ノ上ニテ筋ニ又横ニ縫置
シキツ創口ノ上ニテ筋ニ是ノ加リスルナハ逢合ヒタル上ニ十文字ニ成
ルニ夫ヨリ速欽油ヲ敷キ三巾一帯ヲ施セ麻沸后ノ定剤ヲ與ニ其
夜ニ更后ヨリ瞑眩解タリ夫ヨリ調經湯ヲ與ニ創口ノ前後ノ加リ
シ三日ニシテ微膿シ僅ス故ニ排欽ヲ貼ス此時ニ当ニテ憎寒發
熱陰囊微腫ス故ニ退症湯ヲ與ルノ十日餘シノ内証全リ退
キ創口大半愈ルノナ故里ニ歸ル此患者麻沸湯既タ應ス

性ヲ如是ノ切創ヲ尤ニ聊痛苦ヲ知ラズ唯熟睡スルカ如リニメ時
々渴シ發ス眼眩ノ解ト亦早クノ夜半ニ至テハ常ノ如レ

凡陰狐疝ハ是如キ療方ハニア意匠ニ出ル處シ彼ノ腸ノ生下ス
ル處左右定リナシト雖必血脉辺ニアリ故ニ切剖クノ血脉ヲ傷ネル
心得肝要ニ腸ノ出入ル處ノ孔ヲ縫合スルト其廣狹シ量ル
ニシテ狹者ハ堅横ニ鍼ニ佳ニ廣者ハ縫横斜ニモ縫合スレ
假令廣者ト雖相指シ沒スニ過ケニ者ニ右ノ加リニ先ニ表皮ヨリ
腸ノ出入ル孔ヲ縫透シテキ夫ヨリ創口ヲ縫合ヒ且上ニテ治フア
壁言ニ囊ノロツ拘ルカ如リニシテ其創口一小口シマケ漸ク生肉
シ揭ケ接合スル術ニ又腸傷ノ腸ヲ切出ル者先ニ腸シ瘻ヒ納メ

夫ヨリ創口ヲ縫ヒ合メ此口腸シ縫ニキシキ取本ノリ術如クルモノ
可ニト雖前術ニ捷径トス以療ノ如キハ患者療后心得甚大事ニ
故ニ療前子細ニ言諭シ恠ト領會シタル上ニテ療ヲ施スシ療治
セシム患者晝夜仰臥セシノ蒲團四ツ折位ニテ腰下ニシキ腸ノ下
ニル様ニシテ溺脫ニテ取ヒシ大便モ竇シ切明ケ臥ニタル修ニテ側
ヨリ通スニシ若是非廁一行シト欲マニ綿ニテ創口ヲ覆ヒ且上シ手ニ
テ能シ押ヘテカニモ弛ケニヤラス患者ヲ護テ者モ患者ノ寐入
允す横成丸様ニ氣ヲ附シ創口上ニシテ横臥スルハ可シ若
創口全ツ愈ルニ起ウサハ單ヨリ腸ハ金下ニ癒アリテ孔口一箇

ム者ニ警一ハ濡紙石ソ載ハア如ク急チ破ル、者ニ雖然何レ凡
外患ニ處ナキ者二十日許モ右ノ加クニ勉ルフハ誰ニ者ニ故ニ性
柔弱ナル者或ハ貧賤ナル者ハ決メ療シ施ニカラス前年吉田封
内北灘浦ノ一漁人陰狐疝ヲ患ヒ右ノ療術シ施セシニ性剛果テ能
ク起居ソ懊ミ全ソ治ルソ得タリ今以患者療前ニ言諭セシニ
能領會セシカ性柔懦ナル者ニヤ療后逸ニ十五日ニメ故里ニ既ル
雨後二月餘ニソ恩ソ謝シ來ラテ曰前日生下ル處ニ較シハ十
ノ七八分減ヌトニ凡陰狐疝ノ患者ハ士人ニ次フノ必農夫漁人
ニ多シ是勞力ノ下部ニカシ入ル、事ノ多キ故ニ腸膜破裂ヌ
ト見一タリテアカ象ニ伺候ニ處ノ一舟師前年未愈ラ謙ニトテ

芭瀬ニトスナ腹辺音トソ。覺フ是ヨリノ漸々陰狐疝
患アド云是勞力ノ腸膜ヲ破ハ者ナラニ雖然勞力一概ニ論ス
カラスハ兒ニモ間以患アリハ兒輩ハ孔上ニ各スルフ日ニ三十壯
半年ノ間一日モ急ラスノ愈ハソ得タル者アリ又一兒相木ニテ
雞卵ガ物ソ作り沸ニテ巻キテ漏帶ソ施スソニ三重ニソ其上
一坎ノ具シアテソキ又帶ソ施シ内燈皮湯ソ此ニ六七月ニソ愈
ソシ得タル者アリ益ハ兒ハ漸ソ肉長タル者故ニヤ右ニ法ニ大
苦ニ堪ニス急ラス矣ソ加ルニ加アス右ニ法ノ如キハ父母ヨリ嚴
密ニシテ怠ラルスハ瞼アリト雖農夫賤民ハ生計ニ忙シ故必レモ

心ノ用ヒル者多クノ遂ニ廢物トナル嗚呼可不憐哉

玄醫曰予蠡測管見シテ考ルニ近コロ郭率侏離學大ヒ
開ケ諸治方シニフ尤精レ雖然陰狐症治方ニ於テハ只綱帶
ノ一枝ニ止ルノミ今是ノ療術・於ル寔ニ予ク師ノ意匠ニ出ル处ニ
シテ師ノ師事ヨシ花岡先生モ未タ施サル所ニ凡陰狐症論
ニ者其説坊トシテ一ナラス彼ノ垂下丸處ノ物ハ腸膜トキニ或ハ大
腸ト云ニ或ハ膀胱トキニ或ハ大腸トラフ雖然大腸ハ大腸ノ后ニ在テ堅
ニ位ス然ニ則横骨上ニ出ハノ謂レシ是空論妄說ナルト言シ待タス
膀胱ト云ニ亦非ナリ彼ノ物垂下スナ便通利常ノ如レ是亦
膀胱ニ非ハト明ラケン腸膜ト云者モ亦疑キニモ非ス彼ノ垂

下ニ處ノ物手ニテ撮キハ鳴ルチニ收ケルナハ鳴ル自ラ收マルニモ
亦鳴ル腸膜何ゾ鳴ルアラン今夫鳴ル者ハ風氣或ハ水氣アテ動
クニ非シバ鳴ルト能ハス警言ハ草袋ニ風氣ヲモナ竹筒ニ水ヲ入ルカ
ロレ之シ壓レ之シ動スニ非ハ皆声ヲナスト能ハス假令空虚ナル
物アリテモ風水ナキスハシテ声ヲナスト能ハス風水アリト雖動クテ傳
サレハ亦ヒテ声シナスト能ハス腸膜何ソ空虚ナラン又何ソ風水アラン
凡ソ腹中雷鳴尤ナス必下利レ必轉夫氣ス是其應見ハ者ニ
是ニ由テ之シ觀レハ腸膜ト云者モ亦妄說也予嘗テ之シキク或医
陰狐症シニ囊大ナル者シ見テス考ク水瘻セト即チ之シ刺スニ畫
汁シ出ス於是予毎ニ以爲ラク彼ノ垂下ニ物ハ蓋ナ腸也トコアカ

而以療術ヲ施スすコアモ亦介ソ親ク視ルニ與ル。彼ノ孔上ヲ切割テ
後少腹ヲ壓ニシテ少腸穴口ニ臨ムシミル。寔ニ前日思フ處ト符合ドス。
自ラ之ヲ試ミテ發明エルコシ得タリ。彼ノ少腸ト云ノ説確言也。以ノ
療ノ如キハ、師ノ前ニ述ル如ク。療后ニ養生忽ニセガルナ必不治ナ
ハコハ無シ。此患人予カ寓居スル處ノ岡本屋某ノ旅館ニ宿シ得テ
師ノ治ニ就ケ。故ニ予朝鮑羔ヲ貼シ帶ヲ施シ、毎ニ之ニ諭シ曰汝
慎シテ起ツ一カレト云患者寔ニ諾ス。似タリト雅瘡后僅ニ十
立日ニシテ吊カ不在中告ス。故里ニ飯ル。爾后其詰シキクニ前日
至下ニ處ニ較ハナノセハシ減ストシフ。

男子患腸癰一医誤刺臍下盡汁自出

吉田封内朝立浦ノ農夫、齡三十七歳。天賦壯実。前月腸癰ニ患ヒ
医治ニ就ケト。雖刺痛益甚。アノ臍下漫腫ス。里医ニ為ラク。膿汁已ニ充
滿ス。ト即ナ之ヲ刺ス。膿汁微シク出ハシ。爾后創口時々盡汁シ出ソ
歛マラヌ故ニ。未テ治シ乞フニシ。診スニ脉沉澱舌胎滑白四支羸瘦
元氣虛損ス。即ナ家方ノ黃芪湯シ進ル。二十餘日ニテ元氣漸
ク復シ。一月餘許ニ全ノ復ス。於是創口水銃ニ生新火シ射入レ
速。飲油シ漏ニ瀆レ之ヲ換シ。神竹馬ラ覆。加斯トニ二十日許ニシ
蓋汁稍出テ。猶前油シ入レ排歛シ貼シ。二月許ニノ全治ス。是后
六七月シ往テ傷風寒ニ患ヒ。遂ニ鬼錄ニ上ヒ。ト云

婦人陰門翻花

玄醫書曰陰門及花瘡徽疾ヨリ未ハ者タシトニ凡モ前年
一奇ノ及花ノ見タリ大洲封内郡中上三谷村ノ農婦胎シ更
ルテ四五月ニ陰門大ニ及花スコアア治シ乞フ曰假令脱胎スルトモ
歎フコナシ顯リハ麻沸瘡ヲ施マトニシ見ヒ及花一面ニ滋蔓シニ黒
粒ノ如キ物簇着スルヲ水ニ漬シ數多ノ如ク其色淡藍大丁亦
同ニ毛中及股根辺疣瘡タリ苦似ノ如シ且頸辺胸肋辺ニ疣瘡
シ生エテ鮫皮ノ如シ乃チ麻沸湯ツ此ニ銀子ミテ彼ノ簇着スル處
ノ物シリソニ是脆シテ皆缺落ツ其落ケル处ハ鉗ヲ切タリ又挺
孔上ヨリ及花ノ生下た物アリ此何物ハソソ刺繡セズト雖鮫皮
ホコラ知ル故ニ之ノ根ヨリ切所セシニ出血淋漓クリ毛中及股辺ノ
奇

疣瘡甚キ处ハ鉗先ヨリ切荒シ出血有無ニ拘フ焰鉗ヲアテ穿
木瘤ノ貼シ兩后及色状シ目元ハウズノ愈タリ十月ニ合魄ス時ニ
股辺頸辺胸肋上ノ疣瘡タル者自ラ消散ス後四年ニ又胎シ
坐ク陰門及花ニ頸辺疣瘡タリ獨前年ノ如シ又治シ乞フ未
ハト難切斯マス分娩后又自ラ消散ス毎ニ月經一々滞ルサ
股肉疣瘡ヨリ月經未ハスハ自ラ散散ス是氣血凝滯ノ所
為大首ナニカ寔ニ一奇事也此事シ師ニ告ハニ師亦大ト云
シ里云故寔驗ツ矣ノ此ニ附ス

男子右膝頭敗液流注

本藩ノ一士人異姓三十七歳天賦壯寔二十日來右膝頭腫起ス

一医之ソ療エト雖漸ノ腫脹ソ疼痛忍一アラス医号溼脹エソ見テ
以爲膿氣アリト故ニ之ニ針セントス患者モ痛苦ニ堪ヘルヤ故ニ其意
ニ従ハシト欲ス良族之ソ肯ニセズ曰假令之ニ鍼エルニ或ハ寢足跛ス
至ニ如アハ他医ニ就ミハト即チ予ヲ迎フ往アソシ詣ス前医側ニ在
テ自己ニ熟膿エニ修タリ之ソ刺ハ如何予曰是瘀液ノ流注スハ首ニ
耳根状膿氣アニ似タリ雖皆瘀水ナリ今四五日ソ経テ瘀水ノ充満
スハシ見テ切新し或ハ管鍼ソヘルシ先ツ和血ノ薬ヲ貼ヒ利水ノ剣ヲ
テ佳シト医生心ニヨア言シ信セウルニ似タリト雖只面従メ丸ル即チ
木防己加附子湯ツニ黃龍焉ツ貼シ翌日ニ至リ疼痛半減ス
ト雖腫氣全ソ消マス四五日ソノ瘀水充満ス故ニ膝頭堅ニ切割シ

七八分瘀水出ルヲ三合許創口排飲ヲ貼ス前方ニ見ラヨ前ニ
ニ有クソニ熟膿エト然ハニ今斯ノ如シ嗚呼過ラリ他日來リ謝曰
予医ノ輩トスルヲ此ニ致年ニ愚陋甚し實ニ前日君口言シ疑フ
今瘀水滲ノ如クソ見テ始ラゾ然タリ予カ罪遁レ、处ナシトヨア曰
瘀液ノ流注ス者往々者誤ス者ト時ニ患人ソ診スニ腫氣
スニテ尙レ創口微膿シ合ク故ニ白明シ貼シ前方シ既ツ一月許
テ全治シ得タリ

凡膝頭或ハ手腕瘀液流注ス者疼痛甚シキアリ又甚ニカ
えアリ又瘀液流注ス者アリ瘀液ハ催爛膏ヲ貼シ水シトリ
或ハ刺ス一し瘀血、乱刺ノ蟲し和血ノ膏ヲ貼スハ消散ス者ニ

甚じキモノハ乱刺し催爛萬ヲ貼スシ膝頭廢液ノ流注スル者是
キ水瘡ソラ瘻ニアガニメソ取ヘアリト雖外衍ハアリテハ根治
マス内服シ此ニシ水モ充満セアル中ニタリ刺ニカズ腕頭ニハ
瘀血多ク膝頭ニ瘀液多シ是亦疝家ニタク在ルナリ

男子鳥銃傷右足

凡弾丸傷シ瘻スルニ凡医筆全創瘻ノ如ク縫合ニ者アリ是大
た誤シ假令大创ト雖縫合ニロラズ如何様ニ縫合スヘニ次メ
愈ハ者ニ非ス萬カ一創口半ハ愈ヘ凡内ニ毒氣アリテ大ニ膿シ醸
レ却テ之アキニ害シ爲エテ多シ終リニ附骨疽状ニ大者ニ弾丸
傷ニ縫合ヤユソ水玉シ射入シ馬シ瘻アメ或ニ紙ヲ入ヘアリニ三條

或ニ七八條ミ挿ム一シ之ツ上策トス斯如クノモ毒氣早ク尽シルスハ
創口愈一ノ漏孔ト成テ膿汁内ニ溢ヒ久ヒク疽ケルアリ此時ニ
アメツアハ孔端潤メ馬シ瘻ノ膿シ取ド可シ

男子眉間癰砍痛

予諸病場所數百人也ト雖砍痛ハ止ノ一人ニ止ハノミ之攝
ニ見ルニ坚硬石ノ如クト雖其チ裡肉瘤ニ較ヒハ愈硬キ似
ケリ後學ノ名ニシ辨セヨ

男子陰頭翻花切折

凡尿口一伸ム管ハ鉛管又ハ鳥羽茎根ヲ用ニシ且長ケニ三
す位ニ功刃ソ附ケ挿シテ后腰一括附シ瘻后一二日ニ止持ムノハ功

一僧顛門発血病

封内中山村ノ一寺僧嵩三十六歳顛上左傍痛ツニ及ス衆医ノ治シ乞
「凡敷テ瘡六者ナシ末テ治シ」
漢江ニテ瘡頭跳動ス僧告テ曰是血瘤丸者ニノ其瘡方最難し強
テ治就ト欲セバ其術ヲ施スし僧曰衆医皆止月ニスハナシ食道
甚苦思ス今治瘡ノ賜テ萬ク一物故ナニ遺憾シ願ク瘡ノ賜
ト於是麻沸渾ソ壁一先ワ痛中一通スル玉枕骨上ニ通ク血管ヲ縫
シ留メ置キ桐木ミヲ作りし鶴卵ノ如キニ綿ヲ包ミ縫止シタル
血管上ニアリ繩帶ヲ施シ瘡ノ一刀切割リ出血爆如レ其創口シ

一縫ニ又其創端ヨリ刀ツ入レ次シ切割リ出血始メノ如リナヌ又
一縫ニ次第ニ如是ニ切縫シ先リ速歛油ヲ塗リ三巾一帯ヲ施シ
麻沸后ノ定剤シ壁ノ脣眩解后白調湯泊夫藍獨煎ヲ單用シ
創口前法ノ如クシ血管上ノ繩帶ノ其ノ例ノ閣キ三日ニシテ微腫シ
消ス故ニ排歛シ貼シ十二日ニテ缝綫ヲ取ナリ善用剤ヲ休メ獨前
法シ壁ニテ餘日ニテ創口全ク愈シ見テ血管上ノ繩帶ヲ取タ
リ創口常ノ如シ

一女子粉毒脣眩口肉膠着

封内本ツ村ノ一女子嵩二十一歳天賦壯寒前年徽疾患心ノ医治
就カ俗家ニ鬻南所粉刮シ服し脣眩甚フ口中大ニ腐爛シ瘡

ノ比ロシビ口肉勝着ス未テ治シヒフニシ視ル。頬肉當銀。祐着
口シ削クテ能ハス物シ食フニ是難ク言詰最不利ニ即チ麻沸鹽
一鉗シ執シ頬肉祐着マレ處ツ切擣。當銀尽ト外ノ邊ニ至ラ。亂
髮刀ニテ切り綿排歛。密ニ埋メ一寸五歩廻リノ丸ナ木長ヲ一寸許
ヒタ。啞マセ紐ニテ項辺ニ若附ケ麻沸后定剤シ。眼脇解后調經
湯シ。創口前法ノ如クシ畫ハ時ニ取たり。時に嚙ヤ痛ム。木シ
啞マテ紐ニテ結附三日シ。微曠シ。催兩颊。車辺微熱アリ。腫痛一
倍ス。故ニ家ナノ清解湯加石炭ノ等。セハ日シ。腫全ク消散ス。於
是家方ノ五倍子湯。含セ前黑フ密ニ埋メ二十餘日シ全愈シ食
事言詰常ノ如シ。

凡粉毒眼脇ノ當銀或ヒ唇。祐着スヘ前瘡ノ如シ。馬ラ毒ニ
埋ミ。肝要ノ若蟲ニカルスハ又勝着ス者。食事スヘスハ黒
ソ更今リ。舌嚙割シ。啞マテ後飲食ス。又唇ノ祐着ニタル者
鉗シ切擣。鉤針ニテ鉤如臂。物ツ作リ。綿ヲ卷キ。馬ラ塗テ創口
一列拭。其具ニ絲ツ附ケ項辺ニテ引結ニシ。

男子右肩癰。擔肩痛

凡擔肩痛。名シ異ニスト。雞肉瘤ノ一種。故瘡術モ亦同シト。雖擔
肩痛。其挾里カラス色灰白ア軟ヤト者。且其根脚運轉セリ者
ハ決ノ瘡ス。ドラス出血甚。ノ後必又花。モノ。假令運動者ニテ
モ根ヲ丸シニモ取残ス。ハ他痛ト遠ニ忽テ又花ス者。シ能ノ意シ

留ナ治シ施ス

男子患水瘡刺之引水

凡水瘡ヲ瘡ストハ先ツ囊裏シ撮ミテ墨丸ノ所位ヲ絞シ穿ニ刺
ニト欲スル處シ指頭ニ押し動ノ有無ヲ候ヒテ後針ヲ入シ水
瘡ハ囊裏中ニ又囊膜アリテ此中ニ瘀水溜ラ舊ノ如し雖然膜
取ラサルスハ二三月或ハ半年許ニソヌ瘀水溜ラ舊ノ如し雖然膜
ノ時ニ取ニユカラス針しタルス銀子等ニテ引出シ取ハスハ忽チ
脱状ヲ見ハシテ遂ニ不救ニ至ル故ニ穿瘀絲ヲ入シ膜ヲ腐ラシ膜
メ漸々ニ取シ若穿瘀絲十分ニ腐氣ヲ催サシムニ膿瘡絆
入シ囊膜モ尽ク取ハシ及破ヒロ膿ツテ以後囊膜ノ接

合セタル様ニナルスハ瘀水溜ニアル者シ班シ入ヒシ夜ヨリ二三日或ハ四
五日ノ熱口渴寒振栗譫詰ツキニシ殆ト疫狀ノサソガ者
或ハ囊腫大疼痛シ囊瘡ノ如タル者アリ或ハ腫大ナラズ熱マサ
ル者ミ間ニハ有シニ大抵ノ熱口渴寒振栗者シ大渴引飲スル石
膏剣シ此フニヤラス瘡前瘡后猶烏頭剣ニ宜シ囊腫大ラ歛
痛赤色ヲ帶ヒヤ便不利スル者ハ清肝淡滯陽佳シ又針口ヨリ膿
汁益出飲食ニ思四肢倦怠精神短少ニ稍シ脈狀ヲ見
ハス者ハ滋陰内托散佳シ凡針ツ入ル、ツハ囊ノ大ニヨハト雖
大率一寸ヨリニナシ至ハシ膜中一届シナチ裡ニテ針ノ先ヲ上ト
一切割ク意ニスハシ膜破ヒテ瘀水流レ出ス是時針ヲ引カヌシテ

かし上へ掲え意ニテヤキ銀子シテ針シ傳コテ膜中一入し届キ
す針ソスキ銀子ノ先ソ開クナラ瘀水漏ノ加シ流し出ハニ瘀水減スハ
従ヒ囊裏モ漸リ痛ル者故銀子ソ次房ニカシムニシヨク水シ押
出し銀子シ引カヌメ又之シ傳コテ紺又入レシ又血ノ鉢ミテ管ヲ作リ
其中ニ鍼ヲ入レ囊裏刺膜ヲ破リシ後管シ膜ニ挿込ミ針ニテ
放ソ術アリ此患者ノ如キ是也ヨリ毎ニ水瘡ラ瘡スルヲ呪テ敷フ
カラス此シ試ハニ鉢針ミテ刺レ銀子ソ入ルト術シ便シト覺ユ何
トナハ銀子先ノサキ者故ニ膜中一入ハシ便シテ治シ入ルニモ銀
子ヲテカヌノ入ハシ又佳シ若抜テ后紺又入ルオモト滿大ナル寸
針シタル者ニテ瘀水減シ囊裏痛ハ故ニ表皮ノ針口ト囊裏膜ノ針口ト

鉢詰シテ多ク膜中一至リ准シ管針モ管中ヨリ長キ紺シ入ヒ管
シ引紺ノ端ソ切り或ハ管シ引大リ消息子ニテ膜孔シ擇リ紺シ入ヒ尤
又甚不便ニ雖然何ニテモ手ニ得シ法シ施スシ紺シ入タルニ四日
膿氣シ催ス迄ハ鉢針ケル様急シ留クシ一夜ニテモ拔ルスハ膜ノ
針口腫居ハモノ故ニ又入ルコト能ハスガ是ナラ神妙ラ復ヒ創ロシ
痊シ其后瘀水ノ滌リタルナ前術シ施スシ几水瘡ノ水シ引シ術側
ヨリ見ハスハ易キニ似タレ凡甚ク准シ若し誤テ罩丸ソ微シニテモ傷ル
すハ即時人シ斃スシ前年封内某村ノ一医生水瘡ノ水シ引シトテ
誤テ罩丸ソ傷リ針下ニ人シ粒ス其聲市街ニ通スヤル肇獻ニ
蝦蟆シ捕テ之シ剥レ医生ノ名ソ呼テ曰我ハ彼医シ汝我ハ鍼

下ニ至ニミトテ道路呼フ医生偶之ヲ廻リ忸怩トノ遁去ル是皆
墨丸ノ所位ヲ察マスソ軽忽ノ瘻ヲ施ス誤し故ニ能ク所位ヲ察ムニ成
恤ノ術シ施スニ

男子左眼胞癰筋瘤

宇和島封内下瀬浦ノ一高人齢四十歳天賦壯寔ニ六年前ヨリ
右眼眶無ルヤサリ年月ヲ経テ稍ソ垂下レ眼ヲ掩ヒ物シ見ハフ能
ハス來テ治フヒ之ヲ見ハシ軟カたゞ如レト雖膠瘤ニ非ス又脂瘤
ニ非ス内ニ致傷ノ線アリカ如シ暗ニシテヨリ是蓋古人所謂筋瘤
也者也ト即チ麻沸湯ヲ與ニ鼈髮刀ヲ執テ瘤根ノ表皮ニ步カ
タツ切剥ワニ瘻水アリノ宰麵ノ一寸許ニ切リシガナ物七八枚ヲ出ス

之ヲ鋸子ヲ引出シ其條根ヲ切取リ又垂下ス外ノ裏皮ノニ步カ
タツケリ焼酒ヲ洗ヒ缝合シ紺ヲ入レ三回一帯ヲ施シ麻沸膏ノ定割
ニ此ノ脣眩解后調絆湯温ニ微瞼氣ノ出ハシ見テ排歎ヲ貼し八日
ニ縫合ノ取立リ二十餘日ニ全愈ス

凡筋瘤ニ世上帝ニ在ル所者ニ以患人ソ瘻セし后吉田封内
北瀬浦一農夫右大陽上ニ瘤ヲ癰ス大ツ難卯如シ其半徑以
ニ十為ノ脂瘤ト即チ之ヲ剥スニ脂ヲ出し針口宰麵ノ契物出ツ
一計子ア之ヲ引三ルニセハ歩許ノ筋四條アリ之ヲ切取リ馬ラ貼シ
全愈ス是亦筋瘤也

男子下唇及花

宇和島封内野村ノ一農夫矣三十六歳天賦壯寔二月前唇風シ
患ニ医治ニ就キ膿氣稍ク薄フソ瘡處却テ滋蔓シ膿刃ニ及フ
一日治シ乞來ルニシ診スニ脉沉敷舌胎微黃往來寔熱下利ニ
三行ス患处ソ見ハニ及花病蔓々殆ト山茶花ノ如シ於是家方
ノ金創湯シ此ニ瘡处排歛シ貼し十篩日シ内訶全ク退ク即チ麻
沸湯シ此ニ龍鬚刀ニテ及肉シ切大公リ血竭黑シ貼し麻沸后走
割シ此ニ脣脳解后調症湯シ萬用シ三日シシ微膿シ見ハス坎ヨ
リ家方ノ火煎湯シ此ニ瘡上ヲ三稜針ニテ刺スフ四丘处深キフ
一安許シノ其創痕痕一家方ノ信石錠ヲ挿ミ綿穿瘀シ貼し五六
日シノ錠ヲ挿シ外ヨリ四凹黒膏シ善ニ附テ脱落ス故ニ綿抜盡

黑シ貼シ微ノ生肉シ爌ラクレ穿瘀シ貼し腐肉取ナリ鉛粉黑シ
貼シ清解湯加石黑紅花シ此ニ一月餘メ全ク愈タリ

凡諸患處腐瘍ヲ敷キ膿脳甚シク惡寒振栗發熱口渴
ノ火創湯佳シ若性ニヨリ脣脳甚シク惡寒振栗發熱口渴
心下煩悶ソ食進マヌ少水亦淡ニ者ハ忽ニニヤラヌ家方ノ西
洋湯ヲ此ニシ諸腫漸リ萎メ及花者ハ腐瘍ヲ敷キ或
信石錠シ挿ミ及肉シ黒膏敷取ナリ生肉近モ微シ取外ル
一然ラニハ又及花者ハ且瘡后調摄堅疎丸ナリ再貯シ

敷年產ウル者也

男子左股下癰瘍屢漸將及花

宇和島封内布喜之川村ノ一農夫齡五十歳天賦壯寔幼キ時ヨ
リ左眼下セワノ黒子簇着スモソ生エルヲ各々一本人見テ之シ墨トス
六七年以前ヨリ漸々大シ遂ニ一塊トナリモソ生エルノ敷テ疼痛
ナシ一年ヲ経ルニ稍蔓大シテ微痛ヲ覺フ一日治ヲ乞未ル之シ診スルニ
癌鬱也其取凸凹トノ黒キノ塗ノ如ク其凸ナ处微爛ノ肉漸々又花セ
ントス即チ麻沸湯フ興一時許ニテ眼眩セス一時半陰ニ至ラ眼眩ス於
是訥髓刀シ机テ上刃肉ノ界シ切剖キシ根脚溼フノ肉中ニ入ルヲニ失
許故ニ次第ニ下刃一削去ルヤカクルニ出血夥シ故ニ烙鉄ヲアテ焼酒ミテ
洗ヒ縮血竭羔シ貼シ滿帶ヲ施レ麻沸后ノ定剤シ興一翌朝之シ診ス
ヒ脉浮数ニ而醉ハア如ク瞳子散大シ猶妄詣シ既し眼眩未タ解セ

ス故ニ定剤シ倍服セシメ家方ノ圓鍼丹ヲ萬用シ日晡ニ至テ漸々解
クリ故ニ調經湯ヲ興一創口前法ノ加クし膿氣ノ出ルシ見テ穿療シ
貼シ減スハシ見テ排歎シ貼シ二十餘日テ全ク癒タリ

凡癌鬱ヲ俗ニキヤ上ヒ又野火ヤケトニヒ又ウミセルシト云甚
形狀凸凹アリテ突起ル者ハ切斷シ或ハ瘻穿ヲ創立リ治スシ
或ハ他肉ヨリカシク高クメ疣瘻タルヲ蝦蟆ノ背面如クモノハ
三棱針ヲ刺シ創痕卫信石錠ヲ挿ミ又花瘻ノ瘻術ト全フ
ノ佳シ之ソ刺スオムニ出血タキ者シ是恐ルカラス或ハ猿香ニ
テヤナ或ハ灸火シ上セ其痕一箇所ヲ敷リモ可シ内服ハ火剤
湯ニ宜シ若地ナリニ高ケリ只毛ア麦シタル者ニ催爛羔シ貼シ

効シ得ハアレル一定ノ事ニ非ス

男子両股発虫瘤

豊后瀬戸ノ一男子、齡三十五歳、天賦、壯実、五年前、左右股痛シ發ス、年月々経テ漸大ニ、医治シ受テす効ナシ故ニ、遠ク西海ヲ航メ治シ乞来テ曰僕前年ヨリ痛シ発し、頃日甚大也、世人ノ詰シ聞ク、凡諸痛病痒ナシト然ルニ、僕ノ病中時、甚痒氣アリ故ニ之シ敲テ、毎ニ忍フ、兩后又痛氣ヲ催シ須臾テ止ム、何ノ謂レルフ、知ラスト之シ見ルニ、兩股突起大サ西凹、如シ手裡粉瘤シト即テ麻沸湯ヲ與、一託、醫刀ヲ執テ左股ノ瘤ツ堅ニ切割リ、肉杖アリ、訝シテ取去リ、燒酒ヲ洗ヒ、縫合し、其後ツ見ハニ他ノ肉瘤ヨリ較軟ヤテ、杖中物有テ

春蟲病ツハカ如シニシ割、見ルニ處、粉シ丈、其ヲニ尺許、白虫二條アリテ、肉中シ瘻ツ其取頭尾ツ分カクス、扁丸索麪、如シ夫ヨリ又右股ノ瘤ヲ切割、杖ツ出シ、焼酒ヲ洗ヒ、縫合し、兩处、綿入レ、三巾一帯シ施し、杖ツ割キ見ルニ左ノ瘤ト全アス、又白虫一條アリ、瘻右内服外黑頭條肉瘤ト同ソア他症ヲ出ウス、一月篤ニ全愈ニ。

凡諸瘤ツ瘻スヘテ教百人テ未タ虱病者ヲ見ス、而等阿波封内セ多村ノ一農夫、膚肉ニ瘤シ、瓦ス之ヲ切断スニ粉中七八頭虫アリ、此テ米中ニ生スル虫、如シ是等シ指シテ虱病トスル者カ此患者杖中ノ虫ハ、扁索麪、如シ益是寸白虫、杖中フ瘻

者ヲ是等シ虫瘤トスル者ア始リ疑ヒテ有ス

女子血塊自陰中擇出

封内森山村ノ一農婦齡三十立歲天賦壯實立年未月事不調ニ或
末リ或未エト雖塊状ナシ二年前始テ一塊ヲ生ス其始大ケ鶯卵ノ
如シ一年ヲ漸ク大シニ三医ノ治ニ就キす効ナシ故ニ未ヲ治ソヒフ之シ見ル
ニ横骨上突起敦ボシ為ス故ニ鼈甲湯ソ投ス一月許ニ未タ効シ奏セ
ス故ニ再ニ未ヲ診ラヒ之ヲ見ハシ敦状前日ニ倍ニ陰中ツ窺ニ子宮
坐下ノ陰門ニ臨ム試ニ消息子ヲ孰テ宮中シ探ルニ薄膜アリカク之ヲ
破ルニ出血スニ為シ宮中膜凝ラ瘀血凝滯尤ムシト即チ麻沸湯ヲ
一管鍼ニテ宮中ツ探リ膜ヲ破ルニ瘀血ヲ下スコ七八合許身ニ凝結スル
物アリ或ニ流出ミノアリ其他爆ノサ敷状十ノ六セシ減ス而テチ
度ヲ失セスト云

術止メ麻沸后ノ定剖ラニ、眼脳解后調榮湯一方ノ桃核湯ヲ
呑一服マシメ抵當丸ヲ萬用シ是ヨリ不斬瘀血ヲ下ス其色猶爆ノサ
時々水銃ニテ家秘ノ薑水ヲ射入レ或ハ坐薑キア填メ二十日許ニ瘀
血稍リ減シ其色稍リ鮮明シ故ニ号曰暖膠艾陽ソ此マコ十日許ニ
故里ニ返ル兩后時ニ人ソニテ薑ヲヒ未リ三月餘ニシ月事未ル丁
度ヲ失セスト云

凡子宫中ニ針ヲ入ハフ是准し初心者妄ニ施スニテ又旦夜管
針ニ食指中指ヲ添ニ拇指無名指ニテ持シ中指頭ヲ宮口ノ下
迎ニアテ管管ノ宮中ニ臨マセ拇指ニテ握リ达ニテ針ヲ入レ管ヲ拔
タリ膜ヲ破リ塊ヲ碎クシ針ヲ出スナリ針ノ本ヨリ管中ヨリ針

ラ引クシ水銃ウ入ルモ右ノチ法ニラ入ハシ雖然血塊ヲ碎ク療
術ハ詳ニ口授し准し親矣ノ其要ヲ得シ

女子子宮口鎖塞

土佐封内橘原村一女子年十九歳天賦才美ナリト雖天癸通
スキ時ヨリ一ヶ月事々見ビ頃日元自ラ升降セス動作ニ懶シ故
ニ未テ治ソエフ之ヲ診ルニ面部支體豐滿シ肉色赤アリ且ア
祕状殆ト患人ノ如クナラス脈平シ舌色淡紫黒柄下甚脹脹ス
予以爲天癸通ニキ時ヨリ一ヶ月經ノ見ルすハ蓋し子宮口鎖
塞ナ計ナシト而ナ指頭ニテ宮口シ擗ルニ只凹丸ノミ又測隱子ニテ
擗リ見ルニ全ク閉塞ス而ナ麻沸湯ヲ呑ハ一管針シテ宮口一

幅マセ針シ擗込ミ一孔シヤ分ツニ瘀血出ワ夫ヨリ又鉗針シ
紙ニテ巻シ又刃三寸許出シタルニ食指シ添一宮口シタヒリ切開
ムニ瘀血稍ク溢出ワ其色殷黒テ深如キニ至ラニ暗下脹脹十
ノ六セシ減ス於是速欽油シ錦シ漬シ宮口一塊テ又錦シ陰門
中一塊ノ端帶ヲ施レ麻沸后ノ定剤シ興一瞑眩解后調榮湯興
一水銃シ水薑ヲ射入シ前ノ如ク速欽油シ塊メ日ニ瘀血シ下セ
八日ニテ未タ全ソ尽キス暗下タレ脹脹ス故ニ桃核陽加附子シ興
一瘀血大ヒ下リ兩后立六月ニテ月事來ルノ常ノ如シ一年シ經
テ同墨ニ嫁し子一人ヲ産ヌト

凡生末子宮閉塞ノ者稀ニ在ル者ニ俗ニ之ヲカラダスト云人々

忌憚ハ處ニ貯如者ハ特ニ脂シ曼ケルノミナラスニ十六七歳マテ
ハ命ヲ保ケル者ニ月事不調ル者トテモ十四五歳ヨリ十八九歳マ
テニカシミテモ未ル者シ若未ラカル者ハ熟ニ意シ苗メテ診ス
レ必子宮鎖塞ニ者シ雖然其診法療術最難し詳ニ口授
レ進シ親父メ領金ス

予往耳紀川ニ遊フオ子宮口鎖塞ノ患人治フ乞來リシカコヤモ
亦之ソ探ル且取風呂敷シ絞リシ如クニノ度ナレ予ア師ニシ診
ノ瘡ヲ加ニス患者望ツ失ノ飯リシカニ十二歳シノ腹肚脹脹
遂ニ鬼錠ニ登ルトニ凡子宮ハ雞卵ノ如クニメ十端ニ一孔ヲ横ニ
穿カツコ一ノ字ノ如シ是ヨ等常ニ今以患人ノ状キハ是タ異ニ

男子石淋

凡石淋シ患者大凡ニ手術ミテ石シ陰頭ヘ撮出シ銀子ニ狹ニ出スシ
テ勤労者ハ切折ノ取出一し切剖テ導水管ニラ伸ミ創口シ縫合
シ全リ痊ハマテ管シ取出ニカヌ或ハ鳥ノ羽茎モ可シ

前年封内大瀬村ノ一農夫石淋シ患ニ麻湯湯ヲ與一切折シ石シ出スニ
ナ孔ニワアリ其一孔中ニ一寸許ノ稿ノ心ノ折レ帶リタリ瘻后患者ニ
其所ニソ問フニ低頭スル久良久メ曰僕之ノ患ハト已ニ三年少水ノ淋
瀝スルシ苦シテ時々小紙條入ル一日田野ニ行テ紙條ナシ故ニ稿心シ
入ヒニ事アリ其時折レ残リニヤ否シ知ラスト具出ハズノ稿茎一二年
ニソ猶生意有アシ是亦一奇事也

文書曰呑切術ノ術ニ類スル一等確キ術アリ宇和島封内川之内村
三松大者前年高ヨリ顛仆ノ金瘡シ傷ル里毛之ツ縫合ス愈トノ頃
遂ニ癪瘍ノ會陰十漏孔ヲ穿ツフニ處カ水茎中ニ通スハト能ワス
此ノ漏孔ヨリ又一年許ニテ未リテ師ノ治ニ就ク師之ツ診レテ内火割湯
シ考ニ創口腐瘻経シ入レニ命メ之ツ瘡マシム故ニ創口ノ漸シ腐
ルシ見テ延月刀ニテ切術ニ二孔一トス渠シナスフ殆ト瘍門ノ如シ小
水ノ通スルシ見候頬肉中ヨリ出ルト山谿ノ岩石中ヨリ水ノ滴瀝スル
カ如シ故ニ略尿道ノ處位ツ考一テ腐瘻経ク挿ミ又茎中ヨリ消
息子ヲ入ルニ癪瘍ニテ會陰ニ至ラス故ニ空露管此器師ノ
外ニ酒家ニ用ル上戸ト号スル
器ノ如ニカク茎ノ長キ物シシ瘍頭ヨリワシ猛汞水ヲ入レ感ハ

拔毒散ノ消息子ニ附ケ管中ヨリ敷キ會陰ノ創口ヨリ、鍼針ニ陰
根一切上テ又腐瘻ノ瘻生肉ヲ上ケ漸ク高クル故ニ又拔毒散ヲ敷キ
黒腐セシテ斯ノ如クルフ立度ニ及フ千懸萬状ニテ遂ニ茎中ヨリ會
陰一通セシメ會陰ミテ膀胱近ノ尿道モ透ス於是患者ヲ立シメ會
陰之創口ノ後ロヨリ廻ミヤ水シ通セシニ瘍頭ヨリ通利ルト始テ舊
如シ患者喜テ曰吾カチ術ニ因テ僕一年餘ニテ水始テ茎中ヨリ
通スハツソ得タリト此患者九月二十九日未テ治ニ就キ此時十二月二
十四日也日々勉テ術ヲ施シ八十餘日ニテ尿道ニ成ハ翌日縫合セ
トテ先ツ導火管シ陰頭ヨリ會陰ノ創口一通ヒ夫ヨリ又膀胱
一通シ創口ヲ刀ニテ切リ放シ或ハ鉗ニテ切荒シ創ヲ新ニし縫合

スルト十二針ニシテ三巾一帶ヲ施ス時ニ患者改歳ノ為ニ故里ニ返ラシトテ
翌日発ス爾后正月六日再來テ曰飯后療ツ加ケタルモノ故ニヤ創モ全リ
接合ロス之シ見ハニ或ニ接し身ハ接マス故ニ其接しリハ处ヲ切放ナ前
如ク創口ヲ切新ニシテ之シ達合ス以時ハ道守水管シ掉マス患者ニ命メ
少便シ通スル時創口ヲ錦ニシテ復ヒ壁ニ通ニシト夫ヨリ三日ニシテ達目
达微膿ツ催ス故ニ排歎ヲ貼シ二十日許ニシテ全ク痊メリ少便通り常
加レ此等ノ瘻術ハ淋切折ニ比スハ禍肉シ功拔、尿道ヲ作焉スルト
寔ニ准シ故ニ其実事ヲ記ソ次ニ附ス

男子左耳下癰瘍痛

吉田村内宮下村ノ一農夫嵩四十四歳天賦壯寔七年來左耳下

痛ツ癰ス漸ツ大テ越氏ノ如レ一日治ツ乞未ル之シ診タルニ根脚稍ク小
テ痛頭甚大ニ而テ麻沸湯ヲ典ヘ先ツ長針ニ繩ツ透し癌根ツ横ニ
貫キ置キ龍鬚刀ニシテ癌根ヨリ頭ノ方ニ三步カタ表皮ヲ斜ニ切割キ枝
肉ノ塊ヲ押分ケ根ヨリ壳ス前ニ貯キ置キシキ引張リ及鉄ニテ根ツ切
取リ癌頭ハ皮ノ附キシテ裏面ニ炭火タシニ切太ク之縫合ニシテ綻帯ニ壓
創高方前條肉癌瘍ノ條下ニ詳シ以患人篤訥ナリ一月許ニシテ全殲シ
得タリ

凡瘻癌ハ每ニ切新スニキ者ニ非ス其運轉ヨリル者ハ決ノ瘻スカラ
ス必及花子者ニ且耳下ノ所謂一歩ハケ處ノ葉穴アリ故ニ
前ニ長針ニシテ骨界ニ置キ縫シ引テ之ソ度トシ根ヲ切取ルシ

癰瘍切新ノ診治ハ詳ニ口授し准し初心者先ワ切新サル
一

男子左脛上癰肉瘤

松山封内松前村ノ農夫齡五十歳天賦壯寔十一年末左脛上肉瘤シ矣ス其初癒ノ如し年月ヲ逎テ梢ノ半ヨリ頭ニ至ラ是大ニ主下毛ノ筋状獸尾ノ如し即テ麻沸湯ヲ與一亂髮後刀ヲ丸テ根ヨリ二度カタ表皮ヲ切剖キ筋肉界ノ裡令ケ根ヲ切たり裡面ニ二度カタヨリ切リ合之追合ス其餘前條肉瘡ノ如し此患者餘証ナクニテ篤日テ全治ス瘡ノ形甚奇ニ他ノ肉瘤ト大ニ異ニ故ニ此譽キハノミ

男子右脛患瘡

吉田封内火野川村ノ農夫齡五十二歳天賦壯寔五六年末右脛自ラ腫ハア加レト雅疼痛シテ又年月ヲ逎テ漸ノ滿大也一日治シ乞來ル之シ見ハニ皮色変セズ胫肉滿大ニテ其取陶器ノ如し是所謂瘡病也俗保多足ト云即テ麻沸湯ヲ與一亂髮後刀ヲ執テ胫ニ切剖クテ三寸許深キ一寸篠ノメ瘀血流出ス是中ニ雪花菜ノ如キ物ノ文ニ肉中ニ薄膜アリ銀子ヲ引出シ取布テ焼酒ヲ洗ヒ追合シ瓶ノ入レ三巾一帯シ施し瞑眩解后調經陽ツ興一四五日ニ膿氣ヲ催ウス故ニ腐肉薑絆ノ允、三大ニ瞑眩し是夜惡寒振栗サラ鳴し吼声ヲ發し痛ト瘡状如し故ニ西洋湯ヲ與一猶腐肉薑絆ノ入ハニ瞑眩漸ク軽し斯ノ如クス

ノ四ニ日ニノ膿汁流ハヤ加ク自更穢近クヨラス而ナ内托湯フ與ルノ二
十日許シ膿汁稍ク減シ一月許シ創口漸癒ハト雖ニ漏孔ヲ成シテ
時々漏水ヲ出ス故ニ又創口ノ切潤ノ綿穿處ヲ填ノ水鏡ヲ消盡火ヲ
射入し内木剣湯ヲ與ヘ更ニ月許シメ全モ瘻タリ

凡ニ尋常ノ瘻病ハ切斷ニ者ニ非ス内利水剣ヲ用ヒ或ハ乱刺ニ或ハ
催燒裏ヲ貼ニシ此患人胫肉中ニ瘀水ノ元湯久ヲ知ル故ニ此

ノ瘻術ヲ施シ

婦人腮下癰脹痛

凡ニ尋常ノ脹痛シ瘻也ハ切斷ニ及ハス鉗針ヲ刺し桃源ノ如キ物ヲ
出し経ヲ挿ミ脹ク取テ佳シ此患人ノ如尤者切斷ノ膿氣ヲ十分ニ取リ

婦人尿道破裂縫合之

宇和島封内野田村ノ農婦齢三十歳天賦壯美二月前種胎ソ分
娩ス收生婆術ヲ讀ニシテ尿道破裂衣シ起居動作ナシ淋漓ト禁ナム
一日治ラ乞未ルニシテ診エルニ脉沉敷舌胎滑白微熱アリテ頭目昏重
血虛勞倦ス故ニ坐物湯ヲ與ルノ二十日テ諸証稍リ退クト雖頭
目昏重未タ全ク復セス故ニ加味逍遙散ノ味エルノ二十日許シメ元氣
漸ク復ス於是日麻沸湯ヲ與ルニ歩針ヲ以テ尿道破裂ノ半ニ縫
通し其キヲ引張リ裏屨ヲ出し破裂ノ处ノ缺唇瘻術ノ如ク左右ヲ
鉗ニテ切リ之ヲ縫合し速飲油ソ綿ニ漬シ之ソ門中ニ填メ鳥羽茎

シ尿道ニ挿ミ漏帶ニノカ孔ヲ穿テ具孔一管頭ヲ出し擴龜禪帝
スルア加リし麻沸后ノ定剤ノ異一瞑眩解后調經湯ノ異一創口猶速
欽油ヲ塗メ前法ノ如クシニナ日許ノ前ニ五支鍼ミテ逢ラキシ牟端ヲ
引キ裏皮ヲ出シ見ルニ創口全リ愈ヨリ於是逢キシ取たり鳥羽茎
モカリ水通利常ノ如シ

丸陰門尿道破裂縫合ノ術是准しテア立患匠ニ出ル五支針ニ
キヲ附ケ食指中指頭ヲ夾ミ陰中入レ破裂ノ處シ横ニ通シ
其糸ヲ引クシ裏皮外一及リ出ルノ斯ノ如ク破裂ノ左右ヲ缺
唇瘡ノ如ク切り縫合ノ内入ハナリ前ニ縫し五支針ノ糸切
テニシテフキ創口愈ドス又引出し縫キシ取ム一し又一術アリ

・ 五支針ノ刺スノ熟練者ニ非シハ甚難し故ニ口中鍼ノ如キ又ノ
ツアル先ニ曲リカレシ長ク引カケテノアリ尿道ノ引カケ出シテ后多シ
通ヒテ前ノ如ク瘡スノ術アリ尿道破裂瘡ノ術ハ莫ニ甚難しロ
授及フ处ニ非ヌ而視スニ非シハ耳ニ意息ソ領會スルト能ズ

小兒左右缺唇

封母本川村ノ農兒齡七歲天賦社生庚左右缺唇也一日治シ
未ル即チ麻沸湯半副シ異一鍼ヲ執テ先ツ中ノ唇ノ下齒齦ニ鉤附ケ
先处ヲ切放テ夫ヨリ中ノ唇ノ右辺ヲ切リ右ノ唇左端ヲ切リ燒酒ヲ
洗ヒ缝合スルヲ二針ヲ唐欽油ヲユリニヨラ施し麻沸后ノ定剤ノ異一
瞑眩解后調經湯ノ異一創口前法ノ如クシ三日ニ微脹シ見リス故ニ

排歎シ貼し八日ニメ達多々取去リ二十日許テ右缺全ク瘡タリ夫ヨリ
半月許テ又麻沸湯シ味ニ左唇端ヲ切リ中唇ト右唇ト接合シタル
处ヲ切り縫合ス。猶ヨ尋常ノ缺唇瘡如し此時兩頬一塊喧絆
恙ヲ貼し額上ニ繩帶シナシ之ニ治ヒ附ケ且絃術ハ前ノ如ク二十日
許シ全ク瘳カリト雖カレノ道痕ノ見ハ处ア故ニ催爛恙ヲ貼し
カレノ爛ハシ見ラ紫エシ貼し更ニ十餘日テ全ク痊タリ

女子患鳴痔垂下如綻

凡鳴痔ノ色灰白者アリ又青黒者アリ又紫黒者アリ又
赤色者アリ中ニ就テ紫黒者赤色者出毬ニキモノナ
レ痔痕ノ附ク处上下左右定處ナシ故ニ亂ニ根ノ附ケ處ヲ能ク擇

見定テ切大一し患者ニヨリテハ是嘵シナス者アリ切新スルニ意ヲ
留ムシ

男子発紫舌脹

城外渡場ノ一舟師齡四十五歳天賦壯実ハ九日未舌根腫起
ス其初飲食ニ害ナシ五六日ニソ益腫大シ満口ニ及フ故ニ來テ治シ
セフ之シ診スニ脉沉数往末寢熱時ニ口渴舌色紫黑ニ稍
ク彌漫シ口外ニ張出し飲食咽ニ下えルト已ニ二日寢ニ危篤
証シ所謂舌脹ニ而ナガ高ノ穴ヲ刺し出血し舌上ヲ亂刺し舐
脳散シ敷ナ内涼膈散。集ヘ乱刺スル一日二次出血約スルニ
次一盃ニ盈ワ六七日ニソ腫漸リ減し舌漸ク収マルト雖強硬石

如し故ニ日々乱刺し内黄連泻心湯ヲ與一月許ニ全リ痊キリ

小兒蹶仆傷渴尾

凡腹部ノ金創ハ創口ナレト雖出タル者大ナル者ニ容易ニ收リ者
腸ノ出タル者創口大ナル者ニ二針縫合ノ腸ヲ收クシ或ハ漸ク收キ
今僅ニテウタ取マニアルス金創針ニテ腸ヲ刺し取ルスハ忽テ取マル者
ニ之シ譬言ニ鯉魚等ノ腹中ニ風氣ヲ含ミタル囊裹ノ如キ者アリニシ
刺スハ忽テ萎シ其理斯ノ如し若腸トモニ破レ出ルスハ先其腸ヲ
縫合シ兩糸端ソ長リニテ收メ又創口ヲ縫合シ瘻ハノナシ密ニ
創口ヨリ腸ノ糸ヲ拔キタル法アリト雖詳ニ口授し誰し雖然
腸ヲ切割キタル者、大半ハ不治ニ属ス者也

外科龍鹿摘要

志城霞裡
雪堂藏書

