一 ▲氣血上下 血氣以發及[illegible] 蠱脹風[illegible]

腰已入上腫[illegible]宜針下[illegible]

一 上下本例 已 水腫部

[illegible]

一 腫是治例 辨

水腫先[illegible]入腹 [illegible]

一 水腫皮腹 已

月經入行 [illegible]

一 經絡痛前 傳

F
キ-13

K 107

手〈陽　絡〈下齦嚙物而動悪寒喜热

一　火証虚実　（虚／実）〉火〈（補陰／瀉陽）　心

一　氣血辨補　労〈（倦辛苦主補氣／心思慮主補血）　着

一　沢裏労因　（心／腎）〉主〈（血／精）〉精竭血燥則労生焉　心

一　内傷脾胃　（飲食損胃／労倦傷脾）〉脾胃虚則火邪乗之而生大热　脾胃論

一　土静木動　強直而〈（静湿／搐風）〉也蓋（土静無汗流湿／木動有汗祛風）　王痓証部

富士川文庫
1598

490.9
Ki-25
No. 2663
旧K107
慶應義塾大学医学情報センター
昭和47年7月4日
富士川文庫
1598

橋黄録卅稿巻

鹽田陳庵

疫論

丑年正月中旬ヨリ疫行ハル諸医舌上黒胎乾燥脉数壮热等ノ症ヲ見テ大黄ハ石羔ノ類ヲ投スルニ寸効ナク危急ニ至ル症多シ予清燥養栄加人参人参養栄湯ヲ用テ功ヲ得ルヿ多シ又此症ニシテ下利スルモノアリ他医真武湯ノ类ヲ用ユ然レモ寸効ナシ予清燥養栄加炮姜ヲ投シテ効ヲ得此年ノ疫舌上乾燥芒刺ヲ生スルヲ見テ硝黄ノ类ヲ用テ死ニ至ルモノ多シ呉又可ノ説信スヘカラサモノアリ

従時気其邪虚実不同假呈壮热舌乾者必非以石羔硝黄之類治之耳毎古方家者流之偏治異学者夫思之

疫热服寒凉之剤而数日其热不解者可以為虚更不可攻也有大热譫語渇舌乾等症仍投硝黄剤而数日其热不解者是胃中已有虚也更不可攻若強攻則必促命期不可不慎也

当春之疫疾ハ兎角ニ滋潤サヘスレハ治スル者多カリケルニ四五月ニ成リ又流行ス其時ハ初春ト違フテ咽吐壮熱煩躁或ハ瀉スルモノアリ併舌上ニ胎ハナシ白胎ノマヽニテ黄黒ニ変スルモノ少ナク舌上胎ハ無ケレトモ熱勢煩躁ノ类煩渇ノ症ヲ見ルニ白虎湯ノ附ヘキ容子斗ニテ滋潤ナトノマダルキ薬物ハ毎ヘラルヘキ症ナシ因テ白虎大黄ホノ剤ヲ与エテ置ニ熱不解イツマテセメテモ同シヿ故理中ナトニスルト反テ暴行シテ解ス者アリ五六日ヲヘテ又発熱前症ノ如キモノ多シ三度四度発熱スルモノアリ時行ノ一定ナラサルヿ見以ヘシ其少シク感スルモノハ咽喉痛眼赤痛等ニテスムモアリ何レ火邪ト見エタリ

是邪沾着胸膈中而胃中已有虚者故雖毎石硝黄之类薬気不徹邪而徒損胃陽耳故久毎理中之类和胃気則其虚火須[illegible]解所以暴行解也雖然其餘火尚未熄故発熱及再三也若胃実敢絶[illegible]者非此例

又案邪粘着胸中留飲而醸上焦則発咽痛眼[illegible]等症也

前言フ所ノ疫邪盗汗下利発熱往来二三十日五六十日モ熱解セサルアリ与達原飲其効略同九呆清婢是全蛔薬也小児発熱者宜批湯七味清婢ナト緩々ニスヽメ熱解スルト或急腹痛或足脚腰股筋牽急痛ニ三日忍フヘカラサルモノアリ此年ノ邪スヘテ少腸旁光エ付ト見エテ疝小腸気ノ候ヲナスモノ多シ扨疫邪ハサテ置キ当時一般流行スサル病ニテモ卒瀉スルモノアリ是又疝瀉ノ类ト見エテ不換金正気散加枳実四逆散加蒼朮ノ类ニテ功アリ又熱無クシテ手足牽急暴痛スルモノアリ是モ小腸気ノ类ト見エタリ其他ノ病人ヲ考ルニ皆疝ノ動キト見エタリ暑ニテ疝ヲ動スルモノアルヘシ余按スルニ当時疫邪ノ着キ所明白ナラサレハ當時ノ他病ニテ邪ノ侵ス所ヲ知ルヘシ是至而ノハヤ道く

以他雜病之所苦楚知邪所粘着是千古未発之論非陳菴先生不能発

此妙

生脈散　柴胡清燥湯　柴胡養栄湯

○○○今年ノ疫邪ハ初春以来流行スレモ七八月甚シ大抵ハ壮热下利水瀉シ舌上胎ナシ或ハ白胎日ヲ経テ胎ナク乾燥ス石羔硝黄ノ类ヲ投スレハ命期ヲ促ス生脈散清燥養栄ノ类ヲ与テフラリトシテ居レハ解ス但至テ邪ノ解シヤウ遅シ二三十日或四五十日ニテ解スルモアリ下利ノ多キモノ汗多モノ解シヤウハヤシ下利アリテモ汗ノナキモノハ邪不解ナリ

舌上乾燥者素硝黄所宜雖然歴数十日則津液為邪炒旋当此時奪下則胃陽之津液益不足舌乾更甚所以促命期也故与滋潤剤胃気和邪融解津液足而後汗出解

胃陽已絶津液耗散大邪放陥入則舌乾口燥亦更甚而雖飲湯水食飲残着舌上不得下咽是必死之候也

案傷寒舌胎黒乾燥食飲残着舌上者死症也[illegible]此時無有大承気症不可与也雜病舌乾食残者亦死症也不可妄攻也世医見舌燥輙動与下剤而促命期可不謹哉

今季文化十三年次丙子自季春至季秋東都温疫大行焉六七月之交最嚴矣連门閭戸無不病者其死亡者亦復不少也或云浅艸閲过處門一日之中擔棺者以百数不虚語也延予請薬者凡三百許人他雜病不与其数焉其症初如感冒有至四五日十余日而後発热手足倦怠者与柴胡圭支（歴十余日其ハ邪任両而不解則傺傺腸冒故为大患也）葛根麻黄之类不愈此症往々为大患焉又初悪寒発热自汗出有発作似瘧者有如痢疾下利七八行者非疫利非怔热下利非热結旁流方此之時与二味痢薬也枳実芍薬之类不应与消黄石羔之剤不験其症为大患焉（不数日而発譫語者是陽気有所缺而然非州根木伐所当及也了詳下条）又初二三日即有舌乾口燥譫語絶食者百薬無効其症不越七八日或十餘日死難治之候也有此人雖不係外邪後必可発労咳嗽似労热者後発微腫下利日三四行舌上如常食日減必死之候也有乾嘔絶食舌上乾燥皮膚枯燥精神如故者此症石羔所主心下鞕雖虚羸骨立而無虚候者乃

腹虚満無熱者
假令虽有大渇
脈数症妄不可
与白虎湯

里熱舌之候

与竹葉石羔湯或小半夏加茯苓石羔湯五六日乃至七八日虽諸症自若然医識石羔当飲故也心下微和乎却過服石羔則発此症腹張亦然微腹痛乎則轉方与麦門冬湯或清燥養栄湯而後有愈者此症如必死之候而此陽気未絶之候精神正則有可治者存焉又全症有腹虚満大渇脈数而無熱者是虚候也每参附養栄湯或生脈散加附子湯医観心下和大渇止之機因轉進和胃滋補之剤有愈者又有舌上乾燥腸中有蓄血候邪粘着腸中結燥屎則里乾燥也赤色光彩射人者此症荏苒延日熱不解心下鞕者進消黄之剤心下和稍似愈而不愈後与柴胡養栄清燥養栄之类有漸愈者此舌上十中居七八焉予按有湿熱而心下不和者上焦有熱也此舌上候最難为治焉而有石羔者有大黄者有滋潤者不可一定为治也世称古方家者流者眩此舌上而与消黄大過費人命者不少焉可慎可恐也又大熱舌上乾燥脈数絶食者諸薬無験与小浄府湯而後有解者是百中之二三而疫中挟蛔一奇症也

舌上赤色者与硝黄类而下利虽及二三行或四五行而未愈为其剛邪可見矣

梅雨久則必湿疫流行由之考之熱病素中湿邪而発者也又繫因圍者必患症（湿）瘡或熱病是無日可照又無风可散而居湿気蔚所致也

又曰熱病後発湿瘡者間有之左右手腕後急有偏枯燥者他症較枯燥症則不甚是又疫中挟蚘者也不可不知也

疫論兼脚気

按今年疫熱症虽軽者或月余日而後漸解也至其重者二月三月或歴半歳有尚未全愈者或腰脚痿弱足脛懲脚気候不仁不能起床経半年余而後漸歩行由之観之則兼湿熱者過半矣予自得此説以往不至掣肘也

熱病素中湿邪而発者也兼脚気湿熱豈不宜乎哉

有疫邪兼脚気者疫症全具而足膧痿弱麻痺不仁此症为脚気与越婢輩

者或死不眩惑于脚気症柴胡養栄湯輩緩々為治則漸愈薏苡散調治尤可

疾中夾脚気者先治熱邪勿治脚気矣熱解而後治宜脚気矣

疫下利

疫熱腹満下利譫語者与葛根湯胃苓湯下利不止又与竹葉石羔湯或五苓散加石羔湯有下利止者

疫皮膚燥

疫邪三十余日他医治之不愈絶食心下痞鞕舌乾肌燥不鮮者与大承気湯五六貼而后戦汗如流三日不止而後有漸解者与大承気湯戦汗者殊少因書于此三日不止者亦少

疫腹満

又如前症而加之腹微満者与桂支人参加羣龍湯発汗六七日後有鮮者

寔腹微満之一症羣龍所主也

疫死

疫邪舌上黒胎乾燥皮膚甲錯絶食忘語脈細数無可攻之候与四逆湯有死者然与四逆湯三日舌漸潤遂死

舌漸潤者已亡陽也非四逆湯能奏効也

疫論

今年流行疫絶食者以漸愈者尾能食者反有不治者予未得其解

疫邪二三日即譫語不省人了者死経八九日或十余日譫語者非此例矣

疫熱平解後小便閉而有死者是下焦陽脱乎此症恐前医峻撃之剤所為也矣

舌上赤色乾燥下利清水虽食不分五昇症候変於疫邪然而無此二少之熱候気宇如平歴二月而不愈服石羔剤数日愈按虽無熱候然疫中之一種乎

秋田侯藩松井慶太妻係此症与調胃承気湯舌潤食加後与清燥養栄湯愈

予歳々亥秋之交治脚気病数十人之今年亥秋之間僅廿有余人由是考之湿热之悪気皆为温疫而不为脚気之故温疫多脚気少以故温疫中必畜脚気毒学者不可不知也

疫死

一茶僧連年困酒食過多淫房無度腎虚憊虽雪风寒雨之旦炎热酷暑之夕非水則不为旨矣非女則不就眠矣以故常下焦虚脱而虚火釀上則発此症口乾大渇小便淋瀝眠睡則矢便故通宵服便器一夕計遺尿得三四合云茲季享和元年亥月之初偶係于温疫悪寒発热大渇引飲舌上白胎脉弦数作小柴胡加黄連湯連進三日舌胎変黄心下痞鞕煩渇益甚矣余以为此人平生鬱火素有咽乾燥渇之症今也为邪热使津液煎熬涸燥如此因与清燥養栄加石羔湯三日諸症自若矣加之飲食減少石羔之害数脉倍初咳嗽呃吐渇則呑呑則吐余又意胃中素虚虽有热邪然不堪寒涼之劑因是進理中加半夏湯二日諸症似穏坐然邪热蒸々不解仍清燥養栄加乾姜人参湯進之而後心下痞鞕胸腹牽痛呼吸促迫煩躁不安舌胎益厚如敷粉余又惑以为热邪未解而又進人参乾姜所致也洒大陥胸湯四貼兼以滾痰丸八十丸一便閉结不更衣一日有半虽似胸痛微安呼吸尚猶促迫且頭汗忘語脉細数余驚怖投四逆加人参湯不終日没矣嗚呼可恐哉干戈不動三百年於此焉天下無丁人生以壽老非有罪則其身不毀傷非夭寿則重器不夭死居太平之世袖利兵懐鴆毒者持医而已人参失宜即害生砒石得所反起死可不慎乎書過吾以为後人之戒云

石町二丁目一疫丈アリ無热舌燥食一盞譫語初発前医茯苓四逆ヲ与フ又轉医石羔剤ヲ与フ余診ノ日感邪十一二日ナリ人参養栄湯ヲ与フルヿ六日諸症自若脉仍細数ナリ一日噦逆二三出ツ予仍テ固辞ス片倉元周ヲ吹挙ス元周来診シテ茯苓四逆湯ヲ与テ泰然タリ後十余日ヲ経泉下ノ使トナル予固辞スルユヱニハ養栄湯ヲ与フル

柴胡蒼朮湯柴胡清燥湯糸養栄湯参胡芍薬湯之點ヲ次テ

之間六七日諸症自若タリ其上嘔スル故ニ漸シテ丞治トス热虚ニ
属シテ附方定マラサルハ滋潤ナル剤ヲ与テ杞椒ヲ窺ヒ見ルヿ瘥ヲ
治スルノ一大上計也

播磨屋平助年三十七八八月疫ヲ患フ此人胃中常ニ虚メ心下ヱ結ル
ヿ些少ノ風邪ニテモ胸中挛痛呼吸ニ痛甚シ其時前々半夏瀉心湯
或ハ麦门冬湯加乾姜ヲ用テ速ニ治ス今年ノ外邪壮热絶忘脉弦数
有力例年ノ比ニ非ス其症心下痞鞕嘈胸ノ如シ仍テ先半夏瀉心ヲ
与テ見レ圧邪益甚シ大柴胡湯ヲ与フ下利三四行心下少シ緩ニシ氣
力少シヨシ次日清燥養栄湯ヲ与エテ撮要ヲ見レハ自若タリ五六
日ヲ過テ又心下如前仍甘遂奪命丸ヲ与フ大便四五行脉大弦数痛
热亦自若タリ呼吸不穏麦门冬湯加乾姜人参三分与フ次日胸痛去
リ陽気已絶脱热过半ハ解シ諸症穏シ係呼吸脉数舌上乾燥ハ加
ワルヿナシ此時病人曰他ニ苦シム所ナシ但口中乾燥ヲ苦シミ

云傍儀紛々医ヲ易テ添田道周菜ヲ用ユ茯苓四逆湯也荏苒八九日
又心下痞鞕シテ脈力脱シ遂ニ死ス予按ニ附子ノ过タル故ニ麦门
冬湯加乾姜位ニテウツチヤツテオイタラ必ス治スヘシトオモエ
圧巫祝タヽリヲナシイカニモスルヿナシ

速水氏年六十余八月初旬ヨリ八月末ニ至ル迄患热不解热亦不盛食
減少口中乾キ首尾格別ノ異症ナシ秋山升貞之ヲ療スルヿ廿日斗
不愈菜ハ平和之剤ニシテ逍遥散火湯ノ类ト見エタリ治ヲ請フ仍
テ診スルニ微热蒸々脈虚数小便不利赤渋一昼夜一合舌上無胎乾
燥紫黒斑點アリ不渇食一小盞小豆粥ヲ好ム因テ真武湯加炮姜日
光人参三分ヲ与フルヿ三日舌上少シ潤カ如シ解热シ却テ手足冷
ヲ加フ諸症如前因テ自若トシテ前方ヲ与フルヿ八九日此時予患
癇不能行歩故ヲ以診セサルヿ五日九月八日夜半心下ヱサシコミ
気呆アリト其明旦殞ス按此症初ヨリ不按心十ル所ハ他ナシ热

久軽キニ合セテハ脉数ト舌上ノ紫黒班点ナリ

両替町大坪直七二十七歳八月初旬患疫至同八月中旬尚未解一日便血一行家父驚遽延予診之脉細数無度呼吸促迫絶汗出手微冷舌紫黒色予固辞主人懇請不得止与又可氏人参養栄湯朝鮮人参五分不尽二貼之弗而死

増子三郎兵衛娘トセ歳十八月患疫熱不甚水瀉日三四行与清燥養栄湯十六日熱減食少加気爽也似無故愈者矣一日腹脹痛青筋吐蛔虫三条微煩菜食不入口手厥冷至肘与理中安蛔加附子其夜冷回腹痛不減又与七星清婢湯吐蛔虫五条橋尚貞診之曰与鷓古菜湯而後可与補脾剤因与鷓古菜丸約八十粒大便下利一行明日呕吐甚脉数亦甚其夜死

樋屋亀吉年十二患疫熱少解而後羸瘦甚シク皮膚枯乾一日吐蛔虫二条其后三四日間一吐大便秘投承気便不利骨立如死厥一夕手遂逝

遅恐腫

冷人ヿ不省後二便遺又脱里便五六塊如有血色其后亡陽之兆皮膚微湿久後十餘日経テ死　案者蓄血ノ症乎

照嶋清八妻廿余五月患疫二三日大熱如熾譫語如狂予診之与人参養栄湯五六日死

按疫症大熱譫語頭痛悪寒等之諸症有劇甚不可如何之症者有虚候不可不知矣

牧野屋藩番谷八兵衛妻年二十余疫ヲ患フ大熱一医大柴胡湯ヲ与フ下利日四五行熱不減舌上乾燥予診曰熱甚シ下利スルモノハ虚熱ナリ清燥養栄湯加乾姜ヲ与フ四十日計ニテ漸々熱解患然時々呕吐ス食ノ味ヲ聞ハ則呕ス小半夏五苓ノ类効ナシ後発狂ス而即チ発狂而蓄血損處故呕止呕止ム狂不愈六七日過テ脉細数微喘汗出将死一医投下剤大便不利遂死

久留里屋奥女子綾吉年十六、平素痫症足筋牽急与浄府湯月余無効追

桂支加羣龍筋緩一日感温热暴泻十余行呕吐不止雑進三黄瀉小半
夏之类呕止時々譫語狂七八日如発狂状絶食投清燥養栄湯加乾姜
後脈促短予因辞他医ヲ更ルヿ六七輩予辞後九日遂死

案与前症大同小異畜血症也

加納侯藩一女年廿余秋感微疫四五日譫語昼夜不止如発狂脈数舌上
無胎脈燥渇食少一医投滋潤之剤予診之心下鞕微热予梅热候与譫
語不相応以故辞去隅一日来又請治曰譫語更甚翌日死（与前症同）

皆川町大工庄次郎年四十二歳臘月廿二日係于外邪更医三四輩正月
廿九日来診請[illegible]往則一医先未診之医曰前医投真武湯然而特非附
子毒耳肺中有畜血者咳痰中見血色因与黄芪建中湯加牡丹皮且虫
舌白胎而大便不通八九日兼以承気丸翌日便下一塊即日舌上黒胎
乾燥歯齦乾垢舌不出予診之云可死矣翌日果死

案傷寒不死四十余日是可生之症也然舌上白胎不大便假令黒
百日也無可承気之症宜滋潤温補之症也而与承気丸即日変症舌
上黒胎遂致死又案虚症責而不為虚寒亡陽之症而却為黒胎乾燥
之症可看傷寒热病虽虚寒応補之症不可与烏附純热之剤矣

上田侯藩歩卒服部作兵衛歳二十一二許季秋患時疫林有益治之至初
冬下血猶未愈迎余請治焉診之脈微弱不欲食一二盞舌白胎邪不解
加之手足浮腫腹微満足痿弱其親戚告余曰前医与通利之剤且曰腫
病可禁飲物与某一日二貼病人渇好飲然而恐腫之増長而不云余按
腫病者不因飲水之多寡而因通利之多少也飲多則通亦多也且克热
邪未解不得不渇与清燥養栄加炮姜湯日五貼如此十余日如愈如不
愈予意無可死之症断然与前方一日来告死嗚呼生死難決如此哉余
学医三十余年于茲診病夫一年間不下千人療病日多而為医日思
按此病人無諸症可死之候死後考之気宇蔚々不了々如放心者此
一症精神不守舎之候而必死之候乎

清水侯西大夫前田織部君歳四十六去冬以来感微邪悪寒微热歳晩公私多事不遑就枕強勤夜以継日至正月六日初伏枕翌日七日往診之脉強數食少譫語無热舌上微黄好眠余曰是少陰病而不治之也雖薬無益也固辞欲帰挙家請薬不止焉先投以復元湯翌日令杉本仲温先生診之曰陰兼陽之症也前方佳既済湯乎九日山本玄旦来診曰少陽傳陽明症也柴白湯或大柴胡湯加黄連乎十日譫語愈加食愈減小便自利余意必死矣又辞其家盖神卜亀吉也曰無意更医託以死而不服矣余長嘆息束手不知所為也又謂死生有命救以術而不能救也命也与参附養栄湯朝鮮人参四分十一日脉少弛肌少温無有遺尿撮空在之而似参附之効有之小川文庵法眼診云既済湯症未可言必死矣代韓参以日光参數倍亦可同功云々是無他以韓参價貴故也代韓人参四分以日光参一戔十二日晡時診之舌上乾躁脉又是数急不大便八九日余又意得大便一行僥幸萬一哉進清燥養栄加大黄十三日[illegible]之害口舌増乾燥吸呼不穏直視睛不轉死期在旦夕此夜四鼓来使云即刻来診余有故不敢往令門生宇野本立往診進独参湯此夜七鼓為泉下之使者

案伏枕無日数譫語者神不守舎之候也為死候服將軍剤却口舌乾燥大便不利者亦為死候矣仲景氏曰少陰病口乾燥者急下之宜大承気湯雖乎不被之論非明眼如炬者及薬殺人可慎可恐不可用也

中橋下槙町研工竹屋清八歳五十六四月上旬患疫予診脉不數食一盞舌脹乾燥吃叫不寐噦或出或不出閲前医之剤即参附剤也予曰前医剤的当矣家人云用参後喘息不穏請薬不止即与参附養栄湯予意不急死翌日来云早朝喘息急迫遂逝矣云

案前剤参附剤也予之病加者是死候乎其余雖有悪候而未嘗見急死之候

伊坂利助妻歳四十余仲夏患疫热不更衣凡十有余日医与大柴胡湯不

愈大便亦不通更医々復与大柴胡加芒硝湯延予診之脉弦数譫語舌上黒胎乾燥食少盞心胸下痞鞕予曰據脉症則可攻撃之症也前医進硝黄剤十余日而大便不通者実中有虚也且夫目中失神采矣与又可人参養栄湯四五日舌胎去滋潤譫語少然而咳嗽吐粘痰与姜貝養栄湯不應翌日胸下鞕微痛仍亦桃梅湯翌日告急往診之脉細数自汗出周身発白疹与伏令四逆湯此夕死始終大便不通云

按目中失神采是死候初攻撃大便不通捨脉症与人参養栄湯是予長處後眩惑与桃梅湯是予短処

水野壹岐守君大夫井上八郎左エ門妻仲秋患疫熱几廿有余日其間白虎承気柴胡之類無所不至然熱未解請予治診之脉強数食少与人参養栄湯隔一日而数脉不減加焉咽中微喘予固辞曰不治也乞与石羔消黄熱不解者実中有虚也今進滋補之剤而熱尚不解脉不減又微喘虚候也其翌日更医歴三四日死云

蛔家疫死

吉田侯藩勝田清左エ门娘死是予失死期之一也此婦歳廿二三初嫁後一夕発積痛顛倒人事不省如此四五発干時自初春至仲夏月ヿ不来代医三四二医与桃仁承気桂苓丸之类月余諸症自若矣或時一発請茉干予与小浄府湯月余而月ヿ来食進気宇快然其後仲秋初感疫邪壮熱頭痛不食予又柴胡養栄清燥養栄湯类雑進而熱解但心下痞鞕食少加虫然精心恍惚因与半夏瀉心加大黄湯四五日而諸症不変加之脉细数予按服将軍剤而加脉数者全是胃中虚之所使然也与温茉乎又按此婦平素蛔家而又見此脉乎春来之怪症以蛔菜治因与小浄府湯三日此時余偶劇病人繁冗不往診三日其夜無故手足厥冷須此人予春来以蛔菜為得効又失死期為医者不貪療病多日深切診脉工夫可也

松平和泉守侯藩松石源助嫁年廿一二疫邪二十日計藩医柴胡半夏瀉

心湯竹茹温胆湯参雜進不觧請予余診之脉細数譫語無大熱下利白
五六行絶食六七日唇乾舌上無胎予曰難治之証也家人託余請薬因
与清燥養栄湯加黒永以為脉数苦辛減則救於什一乎翌日諸症自若
矣又与阿片丸尓其日下利減而三行其夜咳喘少出之其翌日午後遂
死

按雖難症備而以無大熱之一候却失死期

疫似労死

久留里侯藩永野仙太郎歳三十許初春患外邪一医山本某者治之月余
日不愈仲春中旬診之脉不数発熱悪寒自汗淋漓食少咳嗽吐白沫状
如労瘵也投以竹葉既剤湯十餘日而咳止汗少食稍加因逍遥散小浄
府湯加大黄七呆清脾湯交進飲雖然色憔悴未収全効也病者厭薬餌
暫憩焉六月上旬前症再発因薏苡散小浄府加大黄四呆茴香散大七
気交進不験予固辞延医治之々者有至九月死

傷寒陰症死

上田侯藩山口氏萱堂歳六十六正月廿一日係微邪廿二日診之脉細数
舌上乾燥渇絶食譫語予曰直中陰症也矣与四逆加人参湯更加苓朮
麦門冬其夜大便大通日五六貼廿三日譫語止告医自以所苦楚食一
盞廿四日無故廿五日又発譫語小便閉少腹膨張進参養栄湯廿六日
来告曰前候加甚矣片倉某者灸之不及而死

傷寒死

櫻井又兵衛尚容甚兵衛者歳六十許四五日患外邪一医治之不愈正月
晦日予診之曰是寒邪也手足倦惰疼痛無食心下痞鞕脉不数予以為
可治与清燥養栄湯加炮姜二月二日来告曰昨朔日得呑下湯水而今
二日不得下咽急来診焉予又以為無故午後当往診之又来告死嗚呼
悲哉予未知可死悲哉

按治傷寒雖微邪日々診之可也予平生自負曰生死明決舎我其誰
哉正月晦日診之為易治焉而日々不診之一二日間而死者何也無

他不知変症之語也为医者看前車之覆豈可忽哉

疫死

牧野侯藩大越源右衛门娘年十有八九初春患疫合田祐順者与柴胡湯或柴白湯等不愈延予請診脉細数無度舌上乾燥食少譫語煩燥夜不眠無大熱予按無死症而脉細数可為怪脉又按是脉細数全是柴白湯所為也因与清燥養栄加乾姜人参辰砂与四日舌上黒胎乾燥六日告急令门人玄東診進清燥養栄大黄湯其夜死

按脉細数全是不治之症予以為前医柴白湯之罪与人参乾姜四五日脉自若矣予又謂参姜不足因是謬死期

新白銀町家根屋次良兵衛妻疫熱七八日一医進三硝飲次進柴胡清燥湯四月七日診之脉不数舌上黄胎乾燥譫語不食目脉赤予按前医用大黄不徹也因与清燥加大黄湯其夜大便下利翌日亦用前方諸症益甚翌日投清燥養栄湯乃死

按疫邪服大黄而目赤者虚症也

下婢松女年二十三感邪以家ヿ煩冗不臥床二三日五月念一日体熱翌日絶食廿三日譫語熱不甚与柴圭湯廿四日心下痞鞕与半夏瀉心湯廿五日舌上黒乾大便不利与清燥加大黄湯此日輿至于東小松川村行程二里許輿致走道撼頓致腹満張其夜鶏死于父母之傍嗚呼悲哉

植田侯藩白井傳次年近而立患疫熱七八日持医丸山某者治之不愈五月十三日請治診之脉数腹満呼吸促迫舌上黄滑予曰是呼吸促迫一症不治之症乎固辞親戚請治不止与四逆加人参湯五六貼翌日診之其夜脱汗呼吸益不穏腹満亦倍張因与大承気湯其夜死

對州太夫平田氏二月廿日外邪ニ感ス藩医与小柴胡加大黄天花粉二十二日夜予診之脉弦数微熱不渇舌上黄食二三盞悪寒頭痛倶甚シ左乳痛ミ引脇下予按ニ之ヲ攻ントスレハ乾燥実熱ノ症ナク之ヲ

補セントスレハ微熱舌胎ノ候アリ薬ヲ處スルニ迷惑ス又云此ノ三四日ヲ歴ルノ間微快ヲ覚エハ猶可也不然則為大患先ツ臍下痛ヲ治スヘシ小建中大建中湯合方ヲ与フ二十三日自若タリ小建中当皈ヲ加与廿四日柴胡養栄湯此日心下痞鞕前方中加消黄又乾呕ス半夏泻心湯ヲ与フ眠睡スル時ハ譫語ス杦本先生ニ請ス未診テ柴胡桂支湯ヲ与フ廿五日渇ス微腹満白虎湯廿七日腹張満二便不利大承気湯ヲ進ム大便微利如腸垢白色三月朔日遂ニ逝ス

佐野某膳歳五十患疫十有余日呃逆一医大柴胡湯ヲ与ヱ又調胃承気湯ヲ与テ大便一二行呃逆幸ニ止ム予此時疝痛患テ往診スルヿ不能因テ津金長元ヲシテ令診略其症ヲ聴クヿヲ得タリ其後四五日ニシテ予病間アル寸往診ス脉弦数六動ニ過ク舌上黒胎乾燥脣脉赤呼吸不穏時ニ一声ヲ発シテ長大息大便不通食絶シテ但カタル米泔湯ノミ肌熱無キカ如ク手足不温而ルニ衣被ヲ去テ覆フヿヲセス夜不眠腹九歳上ニ逼リ虚腹物ナシ予曰目赤舌乾ハ上実下虚ノ候衣被ヲ去テ手足不温ハ虚陽浮散スル也長大息ハ胸膈有物也虚腹便秘ハ陽気不降也是ノ症候有テ脉数ハ大虚ノ候也必死不可治矣喜多村某者請薬不止因テ竹葉既済湯人参五分以調進ス曰温補以救陽則方中ノ一ヲ救フヘシト病家不審又一医ヲ延テ薬ヲ請フ其医意ク可治ト小柴胡加麦门石羔大剤ヲ与フヿ三日遂ニ死ス

当山町源治郎傷寒正月十八日予診スルニ発熱悪寒脉数心下痞鞕微煩躁大柴胡加芒硝ヲ与フ下利三四行十九日廿日諸症微シク快ト云依テ廿一日ハ不診廿二日診スルニ脉微々手足冷汗出忘語予錯誤シテ四逆湯生脉合方ヲ与フ廿三日死ス

按ニ大柴胡湯ヲ与ヱ少快ヲ告クユヱ一日診セサル内ニ救フヘカラサル症トナル傷寒攻撃ヲ与フル寸八日夜一二度ツヽ診スルヘシ変証掌ヲ反スカ如シ恐ルヘシ又按此人首尾煩躁ノ症

アルヲ見ルニ是必結胸症ナラン仲景曰結胸症ニシテ煩躁ス者死ト是其类ナラスシテ煩躁ノ甚シカラサルヲ見テ誤ルノミ

江戸橋永井氏嫁年廿余初夏疫邪ニ感ス寒热胸脇苦満一医小柴胡加石羔湯ヲ与フ不解大柴胡石羔湯ヲ与フルヿ三日又柴胡養栄湯ヲ与フ其夕ヘ心下痞鞕微煩躁ス別ニ三黄湯ヲ与フ其脈ヲ診ルニ促热不甚絶食ス予意フニ邪勢甚シカラス舌上胎ナシ今心下痞鞕煩躁スル所以ハ前医大黄石羔其胃中ヲ損スル故也ト半夏瀉心湯乾姜人参ヲ与フ三日ニシテ心下少ク和シ肌热イヨ〱微之五日清燥養栄湯ヲ与フ六七日ニシテ微ク食ス一夕醴二盞ヲスヽル即時ニ吐ス吐中ニ蛔アリ前方ヲ進ムルヿ七八日一夜大ニ発热譫語汗出ス其翌日脈加数次日診スルニ脈更細数予困辞シテ去ル其夜大便二行八九日メニシテ通ス安睡スルカ如シ夜四更遂ニ死ス

按此人始終脈促其上呼吸兔角穏カナラス是死候カ

本所一ツ目佐野屋利兵衛年六十許患疫蔚々不解廿日余前医進益気合生脈散予診之舌上乾燥面色発黄微煩不寐脈弦数予曰邪気[illegible]之症也因与柴胡養栄湯少加大黄二貼一朝戦汗解黄去身冷脈静与八解散炮姜翌日衄血自午至子因与人参養栄湯其後八九日気字平夜快寐生然舌上中央乾食未進[illegible]一夜二夜煩不寐俄然脈亦加此数異于尋常之数与竹茹温胆湯少加大黄其夜汗出而発白疹諸医大黄与参附予不敢延川村寿菴諸薬復元湯也経五六日死云

按半途而加脈数此不治之脈予悟非復元湯之故

疫発狂死

本街三丁目鰯屋市左エ门嫁歳二十四五孟夏感外邪悪寒発热嘔逆四月五日予診シテ小半夏加茯苓大黄湯ヲ与フ仝八日嘔止諸症自若也柴胡養栄湯ヲ与フ仝九日如発狂来カ欲死家姑即トヽメテ死セサルヿヲ得タリ病者予ヲ見テ云治病ノ薬ハ不服微热煩渇舌上[illegible]

胎アリ白虎湯ヲ与フ十日他医ヲ延テ薬ヲ請半夏瀉心湯翌日大柴
胡湯全十又三日積痛シテ死ス
按疫邪日数ヲ経ス乄狂ヲ発スル者ハ死ス早ク譫語スルモノモ
不宜精神乏シキ所有リト見ユ尤此人ハ素ヨリ癇積モチナリ

疫便血死

對孔庵上川屋六年三十余初冬之初係邪凡人寒热往来如瘧悪寒不
可忍也予診之与柴胡姜桂湯而三日而下利日三四行食不進腹満転
矢気如痢状因与四呆茴香散加当帰芍薬炮姜一両日而微下利有畜
血所以往来寒热甚人也便血一二升脉微細数絶食腹満起則頭暈以
故臥而二便下利日八九行因与三因方烏白散加附子諸症自若矣病
人困気力乏自服人参當一日虚気上奔将脱之兆痞塊逼心下周身逆
冷絶汗出脉欲絶予按参附之类却動痞塊乎因意苡散予又以[illegible]
諸悪症悉具然無鬱冒讝語之症気宇了然告所苦楚處莫得甚死中之一
生乎此時石川玄徳者来診曰恐附子所主乎与真武湯六七日而死

疫愈

一男子夏月温疫七八日壮热舌上乾燥脉弦数下利請水日二三行与家
方知母加石膏湯七八日而其热益盛或益々如労热加之脉細緊数更
不可投石膏也仍作桃花湯与之[illegible]三剤而其热半解利止尽十五六剤
而全愈也

室半卒年十三六月初疫ヲ患テ壮热脉[illegible]食二益吉見道花是ニ薬シテ
十五六日自若タリ予ニ治ヲ請フ柴胡養栄湯ヲ与フルヿ十日斗热
不解時々煩燥癇症ノ如シ心下右ニ当テ脇肋ノ間ニ塊アリ以タ全
リ此カ為ク前方ニ大黄ヲ加フルヿ二日大便二三行通ストイヘモ
热益々壮ニ舌上胎ヲ加テ且乾燥ス形状初ヨリ悪シ仍テ清燥養
栄加乾姜ヲ与フヿ七八日七月中旬热初テ解ス羸痩骨立骸骨ノ如
シ七八日解ス而后又発热ス此热朝鮮シテ昼後ヨリ夜中ニ至カアリ[illegible]

ノ如シ格別ニ悪寒ハナシ如此ヿ三十日計羸瘦益甚シ衆医以為トス脉細数腰立ツヿナラス七呆清脾湯ヲ与フルヿ七八日其熱少シツヽ解シテヨケレ𪜈脉数不減其間狂ノ如ク或呃気ヲ加ヘ種々萬変ス七清ニテ遂ニ熱解ス因テ医王生脉合方種人参三分ヲ加熱又出ス又抑肝散ヲ与テ愈然レ𪜈頭髪脱シテ赤ヤクワントナル付髪シテ戯遊ス此病児治スルユヱニハ始終食ヲ不減絶食ナルヿ一日モナシ胃気ニ大丈ナル所アリト見エタリ仍テ予辞セス危篤ヲ凌テ大攻ニ得タリ首尾一百日斗ニテ愈

小松屋清兵衛倅年十三疫熱不食二十四五日其間潮熱腹満痩極羸痩夜間煩燥求之症交蜂起ス清燥養栄或生脉散ノ差泰然トシテ与首尾六十余日ニテ熱解食進ム其後腰痛甚シク歩行スルヿナラス其痛発作有時抑肝散或小建中湯之差新進不験后鷓古菜湯ヲ与テ治ス但シ虫不通如此不食ヿ廿日余ナル𪜈痼症ノ為ナルヿヲ知ル故愈ユヘキヿヲ知ル他医舌黒胎壮熱煩燥ノ症ヲ見テ不治トス後腰痛ノ時鷓古菜ヲ与ルユヱニハ痛発作有時ヲ以テ虫痛タルヿ知ル

又疫邪頭痛甚シ衄血一升余頭痛愈不食舌上乾燥盗汗淋漓咳嗽脉細数綿々トメ労瘵ノ脉ノ如シ又可ノ参養栄湯ヲ与テ諸症追々ニヨケレ𪜈脉自若タリ仍テ前方ノ人参ヲ去テ与レハ一二日ニシテ脉シマリ数減シ食進ミ諸症穏ナリ

越後屋幸助年五十余夏月温疫痰咳腥臭如膿浮水則沉ム不得臥不食不寐十四日脉細数汗如流亡陽ノ状ノ如シ与四逆加人参十日余汗減平臥臭咳未止因与小陥胸湯加貝母桔梗咳止愈

大坂屋小奴歳十五八月患疫無舌脉数潮熱剤頸汗或肌膚凋燥三十日如愈如不愈清燥養栄大柴胡湯抑肝散浄府湯椒梅湯之変交進無験与七呆清脾加君子湯愈

疫下血

堀平七郎如前症下血便下白如前症呼吸促迫冷汗出脉細数舌上有苔
気紫黒色与人参養栄湯加黒永阿膠経三十余日而愈舌上紫黒日減

傷寒

吉田侯藩鋤柄孫左エ門年六十余初春傷寒左胸脇痛如割日夜不寐五
日絶食大便清与当帰建中湯七日脉促急一日煩燥因与真武湯合生
脉散十貼煩燥止脉亦緩胸痛尋安与前方月余而愈

巣鴨美野屋七兵衛年四十六傷寒一医与葛根湯柴胡湯之类七八日而
大熱煩渇胸痛悶乱一医又与大柴胡湯三貼此夜三更来余壚干使請
診往診之脉細数欲絶人ヿ不省直視余曰必死之候命在旦夕請辞不
止与茯苓四逆湯翌日死

案此二病者同症而一人者一医眩猶大熱煩渇与大黄遂促命期矣
一人ハ初ヨリ攻撃セスメ中焦ヲ助ケシニ因テ快覆ス夫邪中人
也虚実雖分一語治死生如反掌医可不恐乎可不慎乎

疫症

畳屋傳兵衛初夏患熱病脉数食少自汗出如少陰病与四逆加人参湯
時呃逆人ヿ不省舌上乾燥余以為必死辞去病者一族更請不止又投
人参養栄炮姜熱解呃逆亦減食不進更香砂六君子或医王生脉散交
進踰月愈

佐久間町臨門人嘉右エ門患疫月余不愈舌上灰白色脉不数寒熱往来
如瘧状自汗如流与截瘧方不愈因天枢大横連灸十日与医王生脉散
合方愈

太田原帯刀君藩黒崎久馬患疫前症同以同方同天枢大横灸治之又愈

按舌上与自汗之症所以連灸得効也　灸疫邪汗症従瘧症発明

酒井讃岐守侯家臣池上太兵衛妻年未笄季夏患疫施藩医治之不愈延
福西宗玄者請藥服差日余其間諸症雖出吐蛔七八條大小柴胡白虎
承気之輩無不至也七月十八日咳嗽吐痰苦楚不忍睹宗玄至此困辞

不瘳翌十九日請診于予診之脈数護従舌赤色絶食乾嘔微熱一紫瘦骨立予曰大邪也今目中有神未不可死也与清燥養栄湯食少加夜安眠経十余日右耳下腫起日増長痛疼又加焉使杉田玄伯截之差之因又与竹茹温胆湯八月上旬膿（腫）潰膿出至九月中旬而愈

八町堀同心中田四助悴山助十一歳夏月患疫大便不通一医為痞症云若大便快通則少愈投大黄剤十有余日未通余診之脈数食少日晡潮熱益々不解予曰是非痞症疫熱也与清燥養栄湯熱漸薄腫弱而不能起因与七巣清脾加炮姜湯経廿四日大便纔通熱因解食少進足跗見後腫又轉方進六君子合生脈散加使君子其後大便六七日或四五日通経月余加食倍諸症復故

八町堀同心永嶋金十郎室三十余患温疫壮熱耳聾食三盞清燥養栄湯柴胡養栄湯雖進不解心下支結因与清燥養栄加大黄芒硝湯十貼大便三行熱少解去大黄芒硝与前方一夕大黄呈其熱解却動積気虚気上奔鞕咳嗽繁々与姜貝養栄湯不止因進浄府加杏仁湯首尾三十余日而安

藤堂侯藩田村氏妻歳二十余季秋患疫熱乾嘔潮熱山本玄譚治之小半夏湯大柴胡湯雖進無験延予診之脈数下利四五行腹微満面色如黄胖如之今年新産后未復云予以為果然与浄府湯兼用金花四六七日而下利不止諸症不減因辞不許因理中安蛔湯加附子扁豆山茱与之自初冬四日至季冬漸愈

須坂侯賤役夫年廿許患疫三十余日藩医寒涼剤雖進不解請治診之脈強数有力自汗出微熱悪寒食不進心下痞与半夏瀉心湯不能又灸天枢気海却与清燥養栄湯加人参附子二十余日愈

勢州内宮之一士溝口茂三郎年五十余寒月以主命来東都途遇寒邪微悪寒食不進無熱面色凄然不楽予大柴胡湯浄府湯建理湯雖進不解又不堪大柴胡湯之峻而又動胸膈乾嘔絶食因与半夏湯不功脈微細

数与真武湯五味麦門十又余日數愈

投与大柴胡湯而嘔止当此時不止者有虚候所以真武湯奏効也

久留里侯藩吉田宗右衛門年五十許初春傷寒藩医治之不験治三余日

請フ診ルニ脉細数口舌乾燥皮膚甲錯絶食無大熱与麦門冬湯月余脉

数減皮膚微シク潤食少進与八解散愈

酒井讃岐守侯藩池上太兵衛嫁年二十四五傳染疫邪無大熱絶食胸下

結鞕吐白沫藩医薬之十有余日苦悶増請薬于予ニ云挾蛔虫之症

也与半夏厚朴湯以鷓古菜山椒煎胸下覚胸中快因与鷓古菜湯食初

進二十余日而復故

一諸侯室女年十五歳仲春傷于外邪発熱咳嗽侍医小青竜湯以与延予

診之脉強数大熱煩渇脇下痛食不進下利四五行時々癇症譫語如見

鬼状進沈香天麻湯三四日腹脹鳴下利不止熱渇亦益甚也於是延流、

行之時医四五輩診之或曰小柴胡或曰大柴胡或曰枚本仲温先生白

虎湯諸説不同也君侯狐疑取決乎侍医々々恐懼頓首云以吾輩不能

治之非使他医治之耶然則何以決断于他上士之術案故君其決之侯

亦不能決也坐以待且実明且熱稍解譫語或止予進前方自若如此七

八日諸症半愈唯咳嗽未止雖進参术調中湯医王生脉合方安蛔湯未

月余而全愈

案雖大熱煩渇脉数譫語之症而有腹脹鳴下利之虚候所以沈香天

麻湯之温薬治之也　此症疫兼癇症也

疫衄血症

橋町大坂屋徳兵衛冬月温病前医雖治不愈予診之更甚於又皮膚枯燥

脉数問之則曰邪後時々衄血与犀角地黄湯犀角一日一日月余而愈

疫兼労症

本衛二丁目馬関甚兵衛歳二十三月十四日感微邪発熱自汗脉数咳嗽

胸痛下利与建理加附子湯一夕衄血与和解湯夜々衄血頭痛廿八日

補肺湯四月三日加味逍遥散兼養栄生脈散交迭投解咳止食進
下痢未止四月十九日与参苓白朮散至六日愈
案似労非労者若一轉恐為労之症其後経一年果労症死

傷寒結胸症

冨沢町木屋茂兵衛傷寒大熱胸痛如結胸状数脈絶食咳則如破日夜不
臥能三月十八日与陶氏四逆湯日五貼痛微和至四月下旬愈
案其痛甚不能横臥不可如何者有歴候也
案傷寒如結胸症不与大陥胸湯反有与参附而治者誤与硝黄則速
死診察有認虚候口傳不可筆而傳也

牧野備州侯藩永田常工門於日光山中傷於寒帰来尚未愈五月十一日
予診之脉数往来寒熱心下痞鞕与半夏瀉心湯加大黄其夜与大黄及
発此二症有虚故也大熱大渇仝十四日与清燥養栄湯歴十余日愈

傷寒誤治

牧野備州侯藩吉田安五郎年弱冠正月初旬患傷寒発熱大渇脉当右脇
下有塊（為邪動痞塊若雑病而有此塊則難治）大如拳堅如石食少一匙与大柴胡湯滑便
一行又小柴胡加石羔湯四日七貼予診之脉不数舌不乾是不実渇而
虚渇也与清燥養栄湯加麦門乾姜種人参居二日一夕脇下塊作痛煩
躁翌日診之無余症渇稍愈進前剤廿有余日熱去渇已塊消食進与不
換金正気散加乾姜湯而愈

傷寒塊

紺屋町代地庄兵衛妻傷寒微熱心下有塊如前症与半夏瀉心湯加大黄
湯大便為一行余症自若矣因与清燥養栄湯経三四日診之失塊之所
在但少気絶食又投香砂六君子湯食以漸進
案右二病者堅塊不消于大黄而消于滋潤養栄煩渇不止於石
羔而止於人参麦門是無他有虚実之分耳

疝熱症

對馬侯藩永田勝作年五十余秋冬初自感微邪大熱胸脇鞕痛腹堅満予以為疝塊發動与厚朴七物湯三日大便日二三行日晡潮熱痛減半而熱未除腹満如故因投中柴胡湯痛去熱解四日十日進服不換金正気散加枳実愈

案此人素疝家似外邪非外邪全是疝熱乎此症間有之

疫症

田邉侯藩城所運太史年五十許温疫坂[illegible]法純若用柴白湯凡十日日四五貼遂発吃逆四月十又四日診之脈数食一盞面腫足附亦微腫大熱赤苓後語与清燥養栄加炮姜人参服七日呃止熱解初無人了矣今月廿四日与香砂六君子加炮姜湯而後至五月初旬橋郷書

津軽侯藩三浦氏三十余年初冬係疫疾一医与大柴胡湯下之三四日又三瀉心湯交進不験信於予五月十有一日診之脈弦数壮熱目脈赤舌上白胎乾燥咽喉津液涸渇腹満食不進食則吐心下痞堅腹肚按之如無熱脈候異（其赤色異于常人）面色之熱候大便日一二行其大平素肥美異尋常人予曰脾胃不和之人前医誤診与大黄剤以故至於此矣病者口乾燥不能語侍婦告予曰此人平生過酒飽食初春患黄疸痢蛮医杉田某者飲之以白細末之薬（案白末不審何薬）日不下不愈其夜水瀉三四十行無出園之間其後雖黄疸愈与食心下痞[illegible]予曰果然乎与清燥養栄加炮姜人参茴香脈少弛目脈赤微減同月廿一日轉以真武湯加桂支食微加不吐六月初五与烏沈湯加麦芽枳実同廿一日進烏苓通気湯調理

吉田侯藩飯田市右エ门妻年五十余平素虚弱人殊去年冬中臥枕六十余日柴瘧偉幸ヲ以愈エ今春年賀ノ為ニ门外エ出ス其日寒起尤甚シ其翌日発熱悪寒其翌日往テ診スルニ脈細数舌上乾燥ス予以為不治也早ク謀ラスンハ後臍ヲ噬ント麦门冬湯加石羔（心下凝結ヲ退ル故ニ石羔大投ス）三貼ヲ与フ其（石羔之害若一変則脱而至不可救乎）夜積痛煩躁冷汗出正血暈ノ如ク侍医山本某者血剤ヲ進テ積愈後麦门冬湯加人参三分四五日ヲ経テ

脉緩ニ食進ム尓初メ診テ必死之症トス石羔ヲ与テ蘇生

庄兵衛妻歳三十余仲春傷疫邪挾虚候カト思フテ柴胡養栄或清燥養栄乾姜朮ヲ与フルヿ六七日舌上白胎心下痞鞕胸膈中穏ナラス因テ前方中加石羔与フルヿ四日痞少ク去リ膈中快ヲ覚フ其後（邪熱稍 処将除）（之 非）咳嗽甚シ因テ蔞貝ヲ与フルヿ十四日咳止ミ日暮微熱自汗出ルヿ十日許他ニ苦ム所ナシ但シ食未進香砂六君子乾姜炮附子ヲ与ルヿ十余日汗止ミ漸ク復

○附子ヲ与フ証ニハ后方モルヒ子ヲ用ヘシ

按中コロ石羔ヲ与エスンハ邪不去又石羔ノ功ヲ得シヲ見テ長服スヘカラス胃中ヲ損セシ後身汗日晡熱ヲ見テ附子ヲ与フルヿ遅テ虚候ヲ見得サレハ補瀉ノ誤アリ用ヒカタシ

疫結胸症

仁正寺侯藩五井平三郎年三十余季春外邪ヲ得脉数心下逆満鞕痛近クヘカラス呼吸促迫四呆茴香散炮姜人参ヲ与フ諸症自若タリ呼吸促迫甚シ食少半夜浮心乾姜倍加ス服スルヿ四五日呼吸微クユルミ心下亦少シ和ス服スルヿ十二三日熱去リ心下半和ス未タ呼吸不穏四呆茴香加羣竜湯ヲ与フルヿ廿余日全快ニ似テ食進起居常ノ如シ歩行労動スレハ呼吸未タ悉穏ナラス

案此人初メ結胸症ノ如シ予下剤ヲ与エサル所以ハ酒客ノ上結毒家也結毒中巴豆軽粉ノ薬ヲ服シテ胃中不平微邪ヲ受テ虚気上奔シテ如結胸状予初ハ必死ノ症ト為ス固辞シテ不得河原林春塘一医結毒内攻トス十棗湯ヲ与エントス其説ヲ信セサルニ因テ僥幸ヲ得タリ

對氏侯藩阿比留久右エ門年五十余結毒家也仲秋ノ初疫ヲ患フ壮熱食ニ椀心下鞕ク大便不通柴養大黄湯ヲ与フル者三日ニシテ大便不通予按ルニ大黄ヲ服スルヿ三日大便通セサルハ実中ニ虚アランニト清燥加乾姜ヲ与エ又既済湯加羣ヲ与フルヿ七八日熱少ク解シ

脈却テ（非羣竜故）実大忘語一日呃逆ヲ発ス橘皮竹茹湯ヲ与フ一医ヲ請
フ麦門冬湯也且蜜煎導ヲ行フ終ニ死発病ヨリ三十日斗大便一行モナシ
按ルニ始終能食ス死前四五日ハ熱解ス脈モ実大ナラス為死候
ナシト但大便ノ通セヌノ不審ナリシニ遂ニ死
又按有风症之兆者也独非疫邪耳雑病亦有夾风症者可考

對凡藩村喜兵衛年五十余季春患温疫峯某者与大青竜湯兼以承気丸
不愈又進大柴胡湯一夕俄口噤不語絶食峯氏以為大便少故也因投
調胃承気湯三貼其日大便三行三月廿八日請診于予診之為攻撃如
此脈微細手足逆冷耳聾不語但有時手目瞬耳観感連坐束手咽涙辞
予曰病之急如此君若有神方救萬分之一則自今已来至死之年君之
賜也矣乃投茯苓四逆湯自黄昏至三更未尽一貼而病者初能言至鶏
鳴服尽三貼明旦食少加至四月四日諸症（脈微細足逆冷未之症愈）半愈虽然前
医駿剤之害腰脚痿弱眠睡則盗汗出因進善附医王湯仝廿一二日食
進脚亦舒自起上圊仝廿四日（痼症兼蛔虫者為撃剤発動与平和之剤則必治也）咽中結痰如梅
核気之状因与加味四七湯不愈加之吐白沫廿六日四味茴香散加羣
竜廿九日理中安蛔加羣湯交進不愈且気閉額上汗出手足冷或手足
麻痺或痿或飲食不能嚼或否無一定之症不意者必也蛔虫所為乎以
鷓古菜湯尉胸脇之間而後報微快然而気塞冷汗之症尚未止焉五月
朔日与小浄府湯同三日下蛔虫一條気塞稍開頻進前方至五月初八
日気塞初安白沫亦尋減然尚未全愈時々塞動作則塞語言則塞音
響音則亦塞其塞也不至手足微冷未之已甚而已五月下旬諸症租復時
々起坐於床上然未能一歩五六日大便日一行与更衣手足遷濡弱少
頃安仝月念八日与家方薏苡散加附子仇一百余日肉漸肥健於不病
之初

疫症死

對凡藩早田弥四郎年五十許夏月疫熱ヲ患フ脈数熱甚シカラス不柴

胡大黄ヲ与フ大便四五行下利絶食渇燥加干姜附子ヲ与フ微煩シテ日夜不寐一日呃逆ス一夕下血数行シテ死ス

案此病人考ノツケニクキ症ナリキ全ク畜血ノ故ノコト見ヱタリ

按ニ此人死候ハ見ヱス而ルニ十日許ノ病ニテハ疲労ノ甚シキヲ異ナリト思イシニ終ニ下血メ死畜血候見ヱサリキ

小谷小傳年三十余結毒家也去冬疫ヲ患フ前医難治メ不愈診ルニ微熱絶食心下膨脹痛呃大建中加良姜茱萸茴香ヲ与フ呃不止案便言一カラス薏苡散ヲ与フ不応又此和飲加莪朮ヲ与フ食少ク進ム此人脾胃虚極食ニ三戔ナル才ハ服満或ハ吐ス仍テ米食ヲ止メ麦粥ヲ進ム如此コト三十余日ニメ漸ク米粥ヲ進ム此時熱解シ面部手足微腫行気香蘇散ヲ与フ一百余日ニテ五六町ヲ歩ス

案ニ此人必死ノ症ト見ヱシモ精神正ク神氣ノアルノミ死中ノ生ヲ得シト見ヱタリ

飯田町大和屋藤助患疫大熱大頭痛渇頭汗出与人参養栄湯五日脉加数譫語争辭而去一二医更来曰舌上乾燥是陽明証也進大承気湯大便不通遂死

疫眼症

温疫ニテ眼ノ盲スル者アリ亀田屋ノ娘年十三四後藤四郎兵衛小児当歳長坂和多利姪ニモ此ラハ壮熱下利皮膚枯燥眼不痛而盲シ蜆肉ノ如シ遂ニ死ス

案邪毒上衝シテ眼中エ粘着スル也痢病ニモアリ必死ナリ

疫盲症

松平某者一日発狂乱心脉弦数舌上白胎無熱目赤予曰温疫発狂之症諸医為乱心難治ス七八日シテ目盲ス不痛蜆肉ノ如ク狂少ク緩ム遂ニ死ス

汗症

鈴木邑内室弌四十余心下痞一医与苐半年許今四月条脊際二日望日
往来寒热発汗如瘧日三四発延予診之脉強不数盈有寒热邪热浮
当敀大黄湯無効又四磨湯或生支加羣龍湯交進不応遂更医

瘧症

三世庚吏八年二十五弌仲夏患日発瘧热多寒少渇進柴胡姜桂湯兼以
麦门冬湯不効又進達原飲人参養栄湯無験面部足跗微腫因進医王
加猛湯七八日而腫消至六月中浣瘧愈而後邪處移咳嗽甚進参朮調
中湯咳愈一旦（発瘧根元）積痛悶乱呼吸促迫臥則脇肋牽痛進陶氏四逆湯
七八日積又愈以香砂六君子湯和中進全愈

一富士患瘧（此間治療十率莒任）百余日絶食呃逆小便不利腫満陽日発作（瘧母癪気所作）
冲心日三四衆医束手延余診之進四逆加半夏湯四五日瘧愈小便日
十四五椀食亦進八九日諸症虽穏小便又減少進前湯二十余日遂瘦
日加而死

對州侯藩中川四郎次歳五十許自四月至九月患瘧未愈其間陽日発或
日発或不発四五日而又発浩診于予診之脉数陽日発食可也腹満其
発也热多寒少与附子粳米湯而灸微十六椎十四椎期门天枢気海
大横之内日百壮交灸凡十有余日寒热大減灸廿有余日無寒而热少
発瘧未除仍与五粒丸腹満有時減因進烏苓通気湯兼与五粒丸日二
灸依前法経三十余日諸症快然

一諸侯六十才支月微邪（有畜血故也）咳嗽不能臥甚則頭痛目眩欲吐脉弦数
食少待医進発表剤一夜振寒発热如瘧状大汗出予診之無肌热自汗
出咳益甚進麻杏甘石半夏湯其夜戦汗如前日予以為瘧症無疑与九
味清脾湯三日夜々発作大汗（異症胸膈中畜血移處故）一日咳頓止脉微細不定而
似有汗多亡陽之兆因進人参養栄湯日充参五分其夜大発大汗未定
微冷翌日予走而診之進真武湯五味麦门韓参五戔勢将不及因又進
茯苓四逆湯其夜又振寒翌朝遂逝矣死後吐悪血一升余云（此症非真）瘧症

按此人平素痰咳有微邪則咳尤甚今也病勢未衰而咳頓止为異也
又大汗脉细为虚候也然而一旦瘧截則可愈以嫋不能峯死期也序
为医三十年於茲未能決死生悲哉

大坂屋源右エ门母年七旬余患瘧咽与小半夏加茯苓石羔愈
案平素実人也故ニ七十余ノ老婆ト虽モ石羔ヲ与テ効ヲ得タリ

類瘧症

平岡公藩山里平三郎傷寒似瘧非瘧似労非労微熱自汗病状多端不遑
悉記写記方以為医語三月廿五日與蓋湯同廿八日圭支加峯竜湯四
月五日作葉既済湯和解湯四月十七日半支瀉心湯同廿二日不換全
正気散乾姜猛五月八日解労散六月廿一日不換全正気散乾姜遂愈

中風症

御成小路亀屋利兵衛此人平素放蕩無聊遂貧乏初知貧賤之苦如此七
八年以故心下痞塞腹満鬱々不楽面色青黄如浮腫茲季年過而立頭
痛目痛経月余不愈一旦嗽逆三日三夜寐中尚未止遂発右半身不遂
之症舌上白胎脉遅喜睡眠過四十余日死（非为貧賤苦傷生来頭脳中有悪物者故也）
案古人云手足麻痺者三年之间有中風之患亭数識脉常実大者必
有中風之患而此人平素無麻痺之症脉不実大也認一症难变如此

不遂症

一諸侯大夫人驚于落雷之響音即時発右手足不遂症百方不愈
案為動積気発乎

矢野半兵衛六十余歳中風ヲ患フ喘気八十ケ日モ昏睡ス小続命湯ヲ
与フルヿ数日一旦微快ヲ覚エテ食モヤヽ進ム然ルニ小便ノ通ス
ルヿヲ知ス遺尿ス微又再発シテ死

隅野丈左エ门亦、風症ニカヽル前症ノ如亦、遺尿ス食進ミ三四ケ月
苦タリ微快ヲ覚エテ後チヿニ觸レテ悲泣ス其悲泣スル必悲シム
ヿノミニ非ス後再発メ死ス

案風症諸症快シト云ヒ遺尿スルモノハ死候也下焦陽気缺ルノ
候ナリ

雲及侯年六十六平素鈇肝石心気宇安然觸物不動如山岳又数十年無
忿怒之声一旦及不圖之难而後怯虚反素晝夕不寐觸物易動大丈夫
忽変為怯夫也辛苦之禍身甚於刀鋸焉如是凡五年间疝痛难歩或足
脛微腫或頭痛或大便秘諸症交蜂起于其间然未嘗有卧枕減食之甚
矣今茲仲秋下旬步庭見足脛不定待婢扶而進枕尓后昏睡不覚待医
進烏薬順気散翌日食後吐宿飲一日因又進外臺茯苓飲此時命予診
之予曰中寒症将発風症也進附子理中湯加半夏翌日朝食后欲至圊
未至途中而吐得如傾手足逆冷呃逆人ヿ不省昏睡二日仍進茯苓四
逆湯加丁香如覚如不覚一日中約二時或一時覚而不明了語言艰渋
食粥一二盞又多紀安長先生者請薬進（半夏ノ下イキ烈ナル者）南星附子之类凡
十余日不功又請薬于枚本仲温法眼先生不日而卒

藤堂侯藩古沢翁助妻年四十許七八年间患痫症或咳嗽甚或足脛攣急
疼痛不可忍或心下痞鞕或食減或大便秘百方無効遂発中風不遂之
症初右不遂一夕忽変為左不遂可謂奇

案遽然トシテ左右互移轉スルヲ見レハ素ト積気ノヿト見ユ

又案痫症中風同種ナリ

東门随筆曰一老婆平日痩形ニテアリタルカ労心ノヿアリテ一日
卒痫発シ右半身不遂口眼鍋鈄昏睡ス一夕俄ニ左不遂ニナリテ口
眼喎鈄モ左ニカワリタリ夫故肢ノ緊急ナルモ左ニ替リタリ此変
タマタマ在ルヿナリ

本町二丁目越後屋幸助六十余歳中風左半身不遂一夕頓ニ左ハ愈エ
テ右半身不遂ニナルナリ

三河屋彦七歳六十有余初春無故腰痛足脛微腫行歩不便予診之曰疝
也与圭支加附子湯不効又与前方加大黄湯居七八日一朝卒中風死

案此二病者無麻痺不仁脉実大ホ之風症候然素有疝且寒月足脛微腫之一候恐発中風之前兆乎（疝気亦素ト積気也中風ヲ発スル所以ナリ）

吉田侯藩山崎仲八年六十許強実人也中風右半身不遂食如故大便秘診之脉不実大無热不頭疼但手足痿弱与越脾加薄苛湯三十余日而手足漸能屈伸経四十余日歩来予廬謝愉快其従発前症死

千葉忠兵衛ナル者中風ヲ患フ但語言雅淡ノミ余苦シム所ナシ其后俄ニ疝気悪寒発热一二日ニシテ治ス語言モ尋テヨシ其後六七年ヲ歴テ中風ヲ発シ手足不遂百方無功而又不死歴五六年死

按スルニ中風者疝積ニ因ルニ似タリ可考

不語症

丹後田邊侯ノ藩ニ一婦人アリ故無シテ口言語スルヿヲ得ス其婦ニ筆ヲ取ラセテ答セシニ心下ヨリ鉄炮玉ノ如キモノ上テ咽喉中衝クニ因テ語スルヿ能ハスト云語セサルヿ三年余其児病気ニテ一夕終死ス此時唖婦頓ニ発声シテ言語故ノ如シ其唖スルノ日三十余歳今年七十余尤壮健ナリト云　（一悲積気移轉可謂僥倖矣）

又同所一士不正ノヿアリ其主直ニ其ヿヲ尋シニ即坐ニ唖テ答ルヿヲ不得遂ニ囹圄中ニ因ルヽヿ八年ノ后囹圄ヲ出ルヿヲ得タリ其後言語故ニ復ス　右二ケ條嶺田氏ノ語也

案ルニ一愕一悲一憂一喜其周身ノ機関ヲ動シテ天然ノ幸不幸ヲ為スヿ見ルヘシ凡庸ノ医人此理ヲ悟ラス艸根木皮ノ小剤ヲ以テ治セント欲スルハ何諸

風症候

古人預メ風症ヲ知ルノ候ヲ云フヿ詳之予モ識ル症候一二ヲ挙ク外邪ノ热症モ無ク常ニ脉実大ナルモノ又腹部臍下臍旁ヒハラノ邊按テカナク腐瓜ヲ按ヤウニテ内ヨリ張ル勢ノナキモノ又年四十五十ニシテ面部皺文ナク色光沢由張赤色ノモノ是皆遂ニ風症ヲ

発スルノ前兆ト知ルヘシ又面部左右緩急目高低アル人左緩ナラハ左不遂右目高ケレハ右不遂

北山医話ニ云面色暴光沢ハ死兆ノ説アリ

頓死症

群城侯年五十有七平素癇癖家而觸物易動堪暑不堪寒自初冬至臈之交寒風起則頭痛肌寒如感冒一日天暖則前症如忘或夜間発熱或不食歳々如此交月盛熱則気宇爽然異於冬月之多病被任参政已来病癖少間甚動不堪悟也一二年間入直則行歩毎歩上怨屡遅期鼓而心中不穏以故両肘疲痛或痛若心胸中痛尤不甚他日閑暇時試歩庭除則當不痛剤薬或服或不服如此又一二年許今季十月廿四日失火在郭中俄輿入直行七八丁呼吸促迫急吸水三盞又輿而帰輿中気息絶脉絶四逆薬汗不入灸火不徹遂死

案肘疲胸痛全是死血而一旦発動而膻中実満気閉而死是壅死也

卒倒症

皆川町一丁目鈴木伊賀年六十許平素（業事労動ヲ云）辛苦人初春以来微喘至正月下旬盃血吞肺部而粘着肝胆故之喘愈而心下痞満食少気宇爵々一夕五更清便大通後卒倒気絶四肢逆冷少刻而蘇生如是三四日同月二日又発如故遂死予初診之其症知不尋常豚児請薬不止予又意無急死之候乃与外臺半夏湯服六貼忽死噫乎死生難決如此

御蔵前松坂屋市蔵妻歳三十許二月十日混堂ヱ入テ卒倒気絶ス湯ニ酔ノ故ニアラス一医針灸或ハ五積散ホヲ与テ蘇生ス翌日予診スルニ脉不数絶食気爵冒左手肩井ノヘン大ニ痛膻中モ亦少疼麦門冬湯廿中大ニシテ与フ両三日ヲ経諸症脱然食進ム但手足力ナキノミ一夕無故俄ニ胸痛悶乱疼喘絶汗出テ死ス

按ニ肩井痛胸痛ヲ以考ルニ膈中畜血アルノ人ナランニ此時不死ハ又吐血シテ死スナラン

癇症

對州侯大夫大森繁右衛門歳過耳順七八年前患癇症其症常戰々怕恐病間則如不病人而其發則足脛腰股攣急臍右有塊堅硬或吹唫呢呼或悲泣発大声呼吸促迫如将死者也脉弦数舌上赤色滑而燥大便秘更医数十人百方無験歴二年半而無当此時与四逆散数百日非四逆奏効也故愈茲李文化六年孟春之初下血十有余日予診之与芎帰膠艾湯加人参下血止而后又（畜血着心胞絡故可謂不幸）発前症對州侍医立軒者柴胡竜骨牡蛎湯温胆湯竹葉石羔湯之類雑進不愈予亦診之四逆散竜且大黄之類交進無効予又進之以行歩病間日或輿詣二国橋邉或金龍山[illegible]之茶店而帰亦後膝脚急攣啼呼苦吟或終夜不寐咽喉詰滑喜吐白沫延石川玄常請治与銀丸二十粒其夜能寐（按此銀丸恐阿片）吐白沫倍於前日小半夏加茯苓或半夏厚朴湯之类交進而脚攣喘呼之症稍緩也如此五十余日（胃中損故也）小便短少大便秘澁延附微腫食減于此時傍俄紛々無一定之説延阿州侯侍医某者請治此医泰然握刀圭与大黄柴胡朮之剤凡五日大便日一二行食絶肉如削腫稍増加之妄語雑乱如失心健忘之症医尚安然進前剤十余日遂死

婦人産[illegible]癇症眩暈一本堂所称癇症具亦後更妊娠シテ前症愈

案川田一郎右エ門痔疾愈後疝并癇症ヲ覚ルト云リ

一婦人同症悪寒交衣如冬衣汗淋離尓来月（可謂倭律）経如山崩漏後ヲ号癇症静シテ十カ七八ヲ減ス未愈

江戸橋照降甼豊田甚左エ門年六十許患癇症年余身躰無苦楚之所觧了無変斷多岐亡羊故焚香捨珠数禱神佛或時掩衾臥而夜不能睡食及倍于常予診之曰莫薬但待時而将愈雖然任意隠然偃臥則無愈月矣病夫云頗聞不薬而愈之術予教之曰唯佛神日歩行于二国橋戯場街喧嘩騒忙之地則度幾乎愈欤請薬不止因与甘麦大棗湯梔子豉湯合方如此二月余気宇和食又減

案尚未全愈其後更医数輩病夫抬曉無薬験信予言而奔走東西一
年余癇症脱然愈来賀新年

後藤縫殿助殿飯田町右エ門娘加川行全遺言所謂之癇症也時々黒便烟
煤色ナルモノヲ下ス瘀血ヲ兼ル者ニ似タリ但癇症ノ因ハ瘀血ナ
ルカ　此症間々有之

米屋十右エ門母世ニ云フ肝積ト云モノニテ口眉牽縮発熱不食発ス
ル寸ハ眉目ビクビクシテ癲癇ノ発スル寸ノ如シ年々二三發ス一
年眉上額ノヘニ小瘡ヲ発ス膿水徴々ト〆急ニ愈ス其後前症不発
ト云其后母子同フニ瘡愈テ又眉目動発ト云

松平伯耆守藩町田小一左エ門癇症眩暈心中煩悶一医青木号膽吐剤
ヲ与テ后大黄剤ニテ持重スル丁半年許食不進一戔ノ粥ヲ啜ル寸
ハ心下痞鞕気塞リ不食則気宇ヨロシ却肥満予ニ荘ヲ請フ薏苡散
良姜ヲ与フ月余ニシテ食進ミ却テ痩セ催ス遂ニ全復ス

案薏苡散ヲ与フル所以ハ大黄ヲ与ルフ久シクシテ胃中不和ス
ル故ナリ

虚煩似狂

田邉侯藩牧野某者癇症ヲ発シ或時ハ狂ノ如ク形モ無キフヲ思慮シ
夜不寐一医大柴胡湯ヲ与テ効ナシ予診ルニ丸癥上ニ逼リ脉微弱
茯苓建中湯小麦或三因温竹茹湯加炮姜ヲ進ム微快ヲ覚フ正月下
旬行装シテ帰国ス道中ヨリ大ニ快ク帰国后益々快復ノ旨ヲ書テ
以テ報ス

案ニ虚候アリテ発癇スルモノ峻剤ヲ以攻レハ弥上逆シテ其癇
ヲサマラス世上癇ヲ治スルニ虚実ヲ不論芒硝大黄則石羔則
瓜蒂可笑甚者ナリ

一諸侯ノ小児生テ二月余発癇角弓反張日夜無度一小浴脉細必死ト
シテ固辞ス灸治天枢神闕中脘涌泉至テ廿ル処ナシ予診ルニ脉不
数熱ナシ病間アル寸ハ能乳ス且渇スト見ヘテ菜汁ヲ吸フ独甘屮

湯ヲ与フ其夜能眠ル癇発ナシ又翌日発ルヿ前日如シ乳后ハ必発スル故胃口不和ト思フテ加累平胃散ヲ与フ自若タリ右ノ肋骨下府容ノ処ニ当テ一塊ヲ得タリ塊上エ灸ヲスエ却テ越脾加半夏湯ヲ与フ其夜少ク緩ムト云圧又発ス且一日胎毒瘡ノ如ク大声ニテ啼キ啼后必ス発ス此時主人ノ好ミニテ大浄府湯ヲ与フ大便通シ虫ナシ役足スル内ニ日数十五六日ヲ経ル故カ病勢衰エ発癇心コルシ浄府湯ヲ与エテ其進退ヲ試ム此時京師ノ女医者来テ真珠麝香ハノ丸薬并ニ鼡霜ノ散薬ヲ進ム女医云本外邪ノ発動故ニ達原飲加石羔ヲ与フ二三日ニテ発癇止ム四五日ヲ経テ乳汁進ニ歯色肥[illegible]覚フ

案ルニ初生ノ発癇ハ必死ナレ圧此児死セサルユエニハ無熱脈不数能ク乳ス十五六日ヲ経テ不死此四ツノモノ死セサルユヘ也 直珠鼡霜達原飲ノ恐クハ効ヲ得ルニアラサルヿ必セリ

安藤侯藩大嶋代右エ門妻年四十許癇症周身肉脹手足牽急医ヲ更ルヿ数人四年ノ間不愈予診ルニ脉無故食常ニカワラス面色赤ク経水時ヲ以テ来ル二便平ナリ手足急縮一歩モカナワス臥シテ起ルヿ能ズ甘麦大棗湯ヲ与フ三十余日ニシテ痛稍弛ム二ケ月斗ニテ少ク歩ス因テ四物湯甘麦大棗湯合方ヲ与フ半年斗ニテ近隣歩ス服スルヿ三年余ニテ漸愈エ

上田侯藩小林源太左エ門云従是二三年前同藩岩崎熊治者年三十余無病之人也一日伴同僚五六人遊浅草寺途ニテエレキテルヲ見ル卒尓ニ癲癇ヲ発ス其后为痼疾

案エレキテル癖積ヲ治スヘシ未験

幼癇症

一初生驚動吐乳時々身（発癇之兆）難治 振々如発癇之状一医与涼膈散兼以紫円二三粒不験也予云剤不足又与紫円十五粒一時苦楚汗出啼泣極

矣後与獨甘中湯愈
又有初生児脈紫黒時々吐気与紫円五六丸不験因与一戋余苦楚不甚
過半時滑便不水浮后与獨甘中湯而安

癲癇症

嵜陽下畢馬木氏廼郎年僅三七患癲癇月三四発請治于余与瓜蒂散凡
十五次隔三日一吐而后経五十余日腹痛悶乱不可觧近世因投鷓古
菜湯尚此時余去崎陽后二年病者兄来東都巷其病状未愈云尓後吐
数人未有一人全治者也
佐竹侯藩大島兵馬麻疹后癲癇ヲ発スルヿ四五日ノ間ニ三発其后発
セサルヿ半年許ニシテ又発ス大柴胡湯ヲ与エ千金翼ノ五所ノ灸
ヲ壮スルヿ二三日ニシテ黒便通スルヿ二行其翌日又発ス麻后癲癇ヲ
発スル者二人見タリ右五所ノ灸ヲ壮スルヿ二十日斗ニシテ癇発
ルヿ五六后歯齦紫腫腮モ亦腫瓜蒂散六分ヲ用ユ留飲ヲ吐スルヿ
一升余下ルヿ二升斗内ニ黒血二合斗リ下リ又其内ニ鳥ノドリノ
如キモノ五夕斗リ下ル齦腮ノ腫レ頓ニ消四五日ヲ経テ余邪未夕尽
サルヤウス心下痞有ニ依テ甘遂大黄ノ末ヲ服サシムルニ又吐ルヿ
五合許ニ鳥ノドリノ如キ赤キモノ少シ有前薬ハ柴胡竜蚘湯ヲ
与フ大便日二三行其后下血スル故癇者一切発セス三十余日ヲ過
テ口中歯齦紫黒ニ腫ヲク歯ノトマリ黒ク腐肉アリ口臭甚シ試ニ針
ヲ以テ黒腐ノ所ヲ刺スニ不痛シテ黒血出ルヿ甚シ仍テ山田安貞
ヱ見セケレハ倉薬數薬等ヲサセ血ヲ取ラス血ヲトレハ腐肉邑ク
ナルト云ヲ四月五日ヨリ内外共ニ安貞ニ任ス涼膈散ノ芒硝ノナ
キヤウナル薬ヲ与エ口中附薬ホヲ与テ十四五日居ル中ニ口中紫
黒血ハ余程ウスクナルヤウニ見エケルカ時々腹痛シテ呕吐度々
ニナル安貞小半夏加茯苓芍薬湯ヲ与エテ少シク呕ハ止共腹痛ハ
ハ止マス其上日々四五度ツヽ下血ス其時ニ至リテ脈虚数ニナリ

虚里ノ動甚高クナリタリ是迄トハ容子カワリ消黄ナトノ行ク場見エス反テ参附ノ类ヲ与エ子ハナラヌヤウスニ見ユ此時病人又治ヲ余ニ請フ余診ルニ胸下痞寒食少ク其上虚里高ク奔豚気ニテモ発シリウナルヤウス之見エルニヨツテ桂支加茯令牡蛎旋覆人参朮ヲ入テ与フルヿ五六日諸症自若ナレ𪜈食呆モ少シツヽ出テ腹痛モダンダン薄クナリ虚里モ次第ニ軽クナリタリ又六七日ヲ過テ腰痛シ下血四五行合メ下血一升斗翌腹腰痛ハ甚タヨケレ𪜈下血日ニ三四行合メ一合斗ツヽ通ス初ノ口中ハ益スマスヨシ食亦減六七日ノ間先右之様子ニテ下血モ未ダトマリキラスニヨツテ親類トモ石川元常ヲ乞テ治ヲ受ク主剤阿膠牡丹皮朮之内エ附子ノ入菜之兼用サフランヲ与フルヿ十余日大便秘シ三四日一行尤鞕シ其後先平穏ノ趣ニテ食力食気次第ニ能キ姿之如此ヿ十四五日ニテ両臂肘脹不痛手足骨節痛腰痛尤甚シ痛甚則白虎歴節等之痛トコトナラス五月十日又治ヲ予ニ請フ診スルニ小便不利昼夜凡一合余骨節疼痛身躰浮腫時々喘或乾嘔因テ四物湯加竜旦柴胡山梔木香ヲ与フルヿ四五日骨痛微ク緩フ其後手足厥冷脉絶茯苓四逆加呉茱萸ヲ与フ二三服シテ脉出ス服スルヿ四五日脉愈出手足温シカルニ手足不仁浮腫萎弱シテ独ニテハ床カエリモテキス人ニ食モヤシナハレテ食ス微シ呼吸モ促迫之気呆アリ全ク脚気ノ症トコトナラス小便利シテ水気ハ大體太ルヤハリ四逆湯ヲ与フルヿ又五六日一日口舌乾燥大渇ス因テ黒豆湯天花粉童便ヲ与フルヿ十余日病症依然タリ一夜雞卵雑水ヲ食ス急吐スルヿ一度微喘翌日診スルニ臍旁ノ動気心下ニセマリ脉微細噫気甚シ因テ旋覆花代赭石加大黄湯ヲ与フ一貼ヲ尽サスシテ死

狂症

産后発狂者歴三四ケ月或半年而発由之考之瘀血急非粘着臓腑者漸

漸欝積而后発也　産后発狂者十中八九治者也

高橋君召政年未三十産后経年余放心如狂而非狂気宇欝々食如常九蔵過止心下堅満予欲与瓜蒂散而無新者代以苦辛汁吐一升許其后精神稍爽進三黄湯而如不甚寒涼者因又与七味清脾湯諸症減半後灸脊際十余穴狂愈後又妊

對刕藩青柳喜兵衛年四十余季春下旬発狂罵詈不避親疎予到診病者怒辞以不病卒不得診与柴胡加竜骨牡蛎加鉄粉湯大便日四五行予以為剤小而大便過通胃中必有虚因又与甘麦大棗湯不数日愈後以不換金正気散乾姜調治

古橋某者歳二十余発狂スルコト八九ヶ月吉田梅庵硝黄剤ヲ与ルコト三ヶ月諸症自若タリ診之脉弦数食或ハ進ミ或ハ不進夜不寐其人狂走死ヲ好ムノ症ナシ予按スルニ硝黄ヲ過用メ愈期ヲ失スル症也因テ家方薏苡散ヲ与フ月余ニメ全愈セリ

案前医与硝黄而不愈者胃中有虚故也又与薏苡散調利脾胃而愈

此薏苡散治発狂剤也可秘々々

紀伊国屋長兵衛母五十余歳発狂久一医硝黄剤ヲ用テ其狂益甚シ予診之腹微満中下焦ノ虚ヲ知ル仍薏苡散羣竜ヲ与フコト二十余日全愈

按発狂ハ猛烈ノ剤ニナクテハ治セスト思フ人アリ愚医ト云ヘシ

上田侯藩山口平兵衛娘年三十所仲春発狂身熱煩渇与柴胡竜蛎湯熱解渇止与瓜蒂散蒂五分小豆五分雖吐不快吐与半夏瀉心湯歴七八日又与瓜蒂一目不快吐狂自若矣因又雑進養血安神湯清心温胆湯帰脾湯之类月余無効又按初身熱煩渇之時似蚘虫之候於是与鷓古菜湯兼用神効丸一目下利水瀉一二行凡与神効丸三無寸効余赧汗愧面而辞其後経年半尚未愈

高橋某室産后気宇欝々似狂非狂似健忘非健忘肥満食二便如故及月水腫一医治之腫消而気宇自若矣如此凡一百余日診之心下結鞕

目中不了ヽ与生姜瀉心湯兼用苦辛五分亦小豆五分末（此時無瓜蒂／不得用苦辛）
強進盗湯数碗探吐沫汁粘膠苦味者二升許峻瀉一行翌日気宇治十
八九焉経十有余日又与苦辛小豆赤各一目用以白湯数茶戔探吐五
合余其夜大腹痛水瀉一行尓后大便不通十日許因半夏瀉心加大黄
湯気宇益健也矣其后与半瀉大黄之間下三虫服却湯少気塞

不寐症

仙石庚室歳五十許夜不寐三十日余食不進心下支結時五心煩悶常愁
然如有所懐（開塞膈中故／変飲至紫色）　面色青咽中如梅核気与清心温胆湯不愈
因与加呆四七湯石羔兼以金花四水瀉日七八行経十余日瀉止食進

夜又寐

不食病

大橋与三兵衛娘年十六不食病ヲ患フ食セサルヿ百五十日米粒ハ勿
論菓子マテ不食初ノ内ハ三十日許（下如膈／治者）大便微利日々四五十行
共後噦逆スルヿ四五十日昼夜不絶百五十日ヲ経テ漫頭ノアニ斗
一ツ或ハ二ツ宛食ス併絶食ニシテハ一切痩ノケミキナキヲ怪ミ
トス遂ニ二百日斗ニテ食ニ付キ全愈ス但シ絶食ノ内菜汁湯水ハ
平日ノ如ク飲ム
案虫患不食病者間有之如此久下利久噦逆者可謂異症
当時与浄府湯之変今日療之与意苡散持重之矣

発狂蛔虫

丹後田邊一士竹内弥三郎青歳二十四五生平無病ノ人ナルニ三四月
癇症ノ如キヿアリシニ一夕発狂シテ刀ヲ以テ腹ヲ截テ自ラ丸家
人驚愕シテ見ルニ腹脱出血中蛔虫大小幾千萬ナルヿヲ不知腸胃
中但蛔虫ヲ満ツルノミ他物無キニ似タリト同藩ノ一士云ヿ
按ルニ発狂ノ治方中古ヨリ殺虫ノ菜ヲ兼子サルハナシ而ル腹
中満蛔虫ナル寸ハ何ノ些少ノ殺虫剤ヲ与フ氏治スルヿヲ得ン

ヤ医ノ知ラスンハ有ヘカラサルモノナリ

黄胖症

鍛冶町岡田屋喜三郎娘年二十余初春已来呼吸促迫周身微腫面色痿黄予一診云黄胖也可治因与不換金正気散加腹皮兼用金華圓凡二月余而愈（至愈水気亦能呼吸矣中下焦不相接続而積気丸逼之丸道故也奥君三春息佐云投下病写）

早川氏得病與医于東都投寓於敬廬診之黄胖病也多年過酒遂脾胃不和運動失常於是水穀滯不化為血而却為停飲以故色黄髪焦起則頭眩行則呼吸促迫食欲如故与不換金正気散腹皮鉄粉湯兼以家方金華圓居月余日謝微快予云不然服前方年有半断酒三年初可称快矣若不慎則前症劇甚加之肚脹肌枯遍身洪腫雑症蜂起当此時噬臍亦何及古云病加於少愈豈可不慎哉

按ニ此人国ニ帰リテ二年ノ後前症ヲ発シテ死ス強壮ノ勢ヲタノミ医ノ言ヲ不用多酒多房遂ニ死ス可嘆息

黄疸症

仙石公室年三十所季春患黄疸与不換金正気加大黄湯不愈黄色日甚目如金小便赤進茵蔯五苓散又進小柴胡加茵蔯湯其色益甚（虚候）食不進腹満因又投四苓茵香散加羣竜湯於是色日消経廿余日愈

案黄疸病投症薬有故無損

藤堂津侯藩竹村甚左エ門六十余歳二月十八日夜両国向ニ失火アリ馬ニ策テ往ク其帰路ヨリ黄疸ヲ発ス同月廿二日治ヲ請フ診ルニ脉数便秘周身金色急下有一塊茵蔯蒿湯小柴胡湯合方ヲ与フ因テ固辞シテ曰死ナン四月ニ至ラハ黄泉ノ迎必来ランニ医ヲ更ルヿ数輩四月下旬果メ死ス（当此時俄然非発此症従是前必心下支結乎哉）

按此人食気アリ故ニ急ニ不死四月ニ至レリ黄疸ノ症周身金色神氣ナキモノ必死ノ症之後必黒疸ノ如クナル

又按黄疸見塊物者難治焉有塊者易発黄疸可考矣

発黄症

石黒衛守室産后経三七日乾嘔不食寒熱或積痛与小半夏湯数大七気湯不應其后発黄与越脾加半夏山梔黄芩食進諸症尋愈

疝気症

吉田侯藩小島善助室廿余歳腹疼腰脚痛不能転側也同藩医為風湿与大黄剤疼痛日甚似一日邀予一診与圭支加羣竜当皈湯三帖疼減十余貼而全愈

上田侯藩茶道宮下良佐年近而立右脇下至横骨凝結如石不行歩半年与当皈四逆湯（君羊竜）不数日愈

能勢公藩本郷良助年六十所四年来苦疝気或愈或発一日無寧日也今年初夏后大発苦楚不可言請診診之腹満心下支結食少起則脇下急痛臥則腹堅満以故臥共不能呂衆衣食坐以倚之与四呆茴香散加羣竜湯又甚矣因又進家方薏苡散如愈如不愈三十余日腹満減初就臥明年至初春猶未愈其間丸散交進無寸験可観疝之病因容易不可治也其後服他医之薬不数日死

大孫清兵衛三十余歳正月下旬卒腹痛吐瀉呃逆心下中脘ニ当テ一塊突起而痛手不可近也脈数後熱煩渇絶食大建中湯加半夏ヲ与フ痛甚シ小承気湯ヲ与フ下利スト云𪜈痛不止再ヒ考ルニ疝塊発動ニ疑ナキ容子故解急蜀椒湯加羣ヲ与フ二月中旬呃逆頻ニ出ツ薏苡散加丁香ヲ与フ十日許ニメ呃逆止更蜀椒湯ヲ与フ食少シ加ルト虽モ柴瘦骨立其後三月四月出来不出来有レ𪜈漸々快復ヲ覚フ五月節前ニ至テ初テ休昇ス、未タ痩ハ平復ニナラス

案此右體ノ病人処々ニ見ユ皆疝塊ノ発動ト見ユ

戸田大隅守藩西郷蔀三十余歳前症ノ如ク中脘突起痛解近クヘカラス或ハ吐解急蜀椒湯加羣竜ヲ与フ其塊又テ発動シテ不愈又四呆茴香散加半夏与四五日ニテ其塊消散ニ食進三日ニ報快

案此人其後他医ノ下剤ヲ服シ又熱海エ浴ス帰而後診スルニ労瘵ヲ発シ又脚気ニ変シテ死ス

小紋屋市太郎母六十余歳一日腹痛吐瀉如霍乱又前症ニ似テ中脘突起近クヘカラス四呆茴香散加羣ヲ与フ吐ス連理湯ヲ与吐ス因テ薏苡散ヲ与フ一二日少ク痛ミユルミ快方ニ至ルカトヲモイシニ一日又大発シテ死

峯小便閉又ハ淋病等症気ヨリ発スルモノ多シ医心得ヘシ又癥毒攻撃シテ其毒少ク去ルニ似テ全愈ニ至ラス数月苦楚スルモノアリ攻撃剤却テ症ヲ動シ治セサル者アリ其詳ナルヿアリ

四呆
茴香
散

烏薬
青皮
良姜
茴香
右細
シ沫ト

久悪寒症

森孫之右夫無熱悪寒経一百余日不愈予曰是症也与生姜草棗黄辛附湯月余日愈其後歴二三年発前症死

吉田虔藩勝田清左エ門同症烏苓通気散加羣与愈

頭痛症

石居某室年四十余頭痛耳鳴眼爛頭痛如裂煩躁悶乱発則如狂不能離枕也年余而猶未愈大便秘其欲大便則裏急後重常有便気苦後重与四物湯加柴胡升麻自若矣又前方中加羣竜服七八日燥屎少通翌日又通凡得燥屎廿余枚而後々重初安服前方余日矣頭痛尽愈

案此婦不大便数日以故前医与攻撃剤下之虚気上奔而其害如此大津屋於常卯唐沢専助此症軽者

大津屋又助妻年三十許正月下旬下利二十余行水瀉或ハ白腸垢ヲ下ス寒熱ナク食少シ一医圭苓术甘湯或ハ大黄剤ヲ与ヘテ一日下利頓ニ止ム此夕頭痛如裂苦楚言ヘカラス且絶食ス二月中旬予診スルニ脈不数腹虚軟四呆茴香散加羣竜湯ヲ与フ其夜下利二行頭痛微軽シ又翌日頭痛甚シ天枢大横ニ灸又頭痛右偏愈テ左扁ハ猶未愈前湯ヲ服シ連灸五六日頭痛初テ安シ

案以此救病人考之頭痛者以温薬治者多矣下焦騒動ニ虚気上奔醸上

焦也

一

持重者ハ常ニ言ヒ

遜謀者ハ善取ル