奇方録

F
キ－17

奇方録

奇方録

神祐丸　治痢妙方

阿片一匁　黄連　宕砂　沈香　黄蘗各五分　木香五分　右為末小麦麹丸如緑豆大辰砂為衣冷水飲一丸日二丸盛者初二三日量其軽重施三黄承気紫円之類候毒稍退而后用此葉若方其毒盛極此丸雖當時疾已熱解后恐生塊癖痞癖之腫脹等之病慎不可漫用也

又瘡　灸幽門章門究用補中益気湯効

骨硬　鸕鷀霜吹入咽中神功

咽痛　甘桔湯一方加防風三匁名吉更防風湯要訣加荊芥

慶應義塾大學醫學部北里圖書

490.9
KL-2

No. 149

慶應義塾大學醫學部北里圖書

慶應義塾大学医学情報センター
昭和47年7月4日

富士川文庫

1559

一羌羊名如聖湯（三因）要訣曰咽痛者宜甘桔湯不効者如聖
湯方中更如黄連連尭防風
金鎖匕方　口中痛吹薬
焔硝一兩半　硼砂半兩　竜脳二分半　右細末
治雀目方　或昼ハ目ニ何事ナクシテ悪者
唐白朮一斤用テ毎々将切和田是胃中之水飲ヲ捌
故ナリ
発狂　古金薤汁用佳
治中風大奇方　カウカト云木一寸ハカリニ切叙篆淋
酒一合ニ右木ヲ焼テハ消シ焼テハ消シ一合ノ酒尽ルヲ
為一回后某研ニテ為末一日三度七日酒ニテ用病

重者ハ四巡モ用ヘシ
灸法　憤皇ニ一壮灸ス大○如此平素灸而不中風
奇々妙々
小児脹張夜啼胎毒者
芎連紅甘積雪竹　連雪湯ト名
辰砂散（山脇）治黄胖顔　圭苓朮甘加牡蛎吉踈人
参辰砂　右水煎
重正湯　治鯨魚毒　不換金加橙皮
治喘欬嗽神方　桔大甘　紫苑欵冬花中　水煎
寒飲大丸　治五痾専痾労脹張者奇方
寒々飲　（蚯蚓也長五六寸者廿枚）黄蝋廿目右二味以寒々飲為糊煙尽

爲度下火細末即以蠟煉丸法以雞卯一枚穿孔納丸一粒以濕紙裹之安火中令熟一日一雞卯丸七日爲一回病不尽者更作服

初痢腰湯毎々蒸之治之ヿ妙々

三將軍　脚氣上衝心　大黄　木瓜　呉茱（各一兩）

右爲末糊丸

○左金丸　積聚　連（六兩）　呉（一兩）

硫黄丸　血毒耳聾及諸頭痛

硫黄　硝石（等分）　木鼈紙（子）　芎（各一戔）　雄黄（五戔）

蚊遣線香方

右末煉蜜爲香一炷燒時ハ致悉去立妙々

至宝丹　治中風小児痘疹初熱夜中不寐或河豚魚一切之

毒神効　犀角　辰砂　玳瑁　雄黄（各三戔）　竜脳　麝香（各八）

金箔（五枚）　銀箔（五枚）　牛黄（一戔）　右丸

湯浴法　凡痘瘡至四五日六七日未起張者或○語（讝）煩狂或不食或疼痛雜症変出尚此時令児浴此湯則必起張

水一斗　米糖（二升）　好酒（廿三戔）　赤小豆（三粒）　胡荽（三枚）　塩（一合）

右五味煮爲熱湯内盤中自児頭而至手足遍浴之拭巾成一身令氣莫泄微汗則如自起張凡春夏行此法易起張如秋冬雖起張則再三浴之而効児五歳以下者宜用水四五升或七八升糖酒塩亦随之増減

雄黄臙脂散　治痘瘡諸薬不験而黒陥者　大黄
紫（絲）卄　雞冠　雄黄（彡各ホ）　右先以之毎針刮破瘡以小
竹管頻吸之而后三味細末以水和寒劑製脂傳病上而
封令風不入則毒能解
痘毒入眼者酒湯之后　雞卵三ツ米（一亼）　飯ニタ一日食
尽禁ニ一七日是之ヲ用テ快
腹痛悪寒　雄黄ヲ蜜煉ニメ服
卒手足ノ寒腹痛　葱ノ白髪共五七茎細剉醇酒二盃
入一盃ニ煎服
諸薬ニテ腹痛不止　茗荷根擂テ汁ヲ取服テ佳
河豚魚毒　枯礬　麻油ニテ可服　又方樟脳咊白
湯ニテ服吐血則治
蕎麦毒　枇杷葉湯ニ久年母皮ヲ一貼ダケ加服
鮮食蕈中毒欲死者方　礬石　茶（各ホ）為末煮服須臾腹
中痛大便乃下明日復常
下水銀方　鷹糞　磁石　右末白湯下自小便下
玉穗湯　理獣魚毒頭痛実熱面紅腫或遍身発赤理者
荊芥　橘皮　山巵子（各ホト）煎服
小児灸熱　防風　天南星　煎服
小児喘氣　山螵蛸　白長刀豆　白茬　白砂糖　右振出
治臍風　露蜂房　黒焼ニメ点（又方口ヲスボメ欲ト死白姜蚕ヲ為末蜜ニテ用）
馬脾風欲ト死　和白朮（黒焼）（一両）　軽粉（一匁）　右湯ニテ服

吐乳　無患子（黒焼）白湯ニテ用（又方連翹屮三両甘屮五卜樟脳一分　黄連五卜　右煎）
小児嘔（ヨダレ）出　鹿角粉　米飯（イヒ）ニテ用
治暴喘（并）馬脾風　巴豆　大黄　雞冠石（各等分）　右蜜煉
為丸十才以上毎服三分后服白扁湯佳
療小児咳嗽及痰喘　桑白皮　茯苓　杏仁　甘屮　右煎
小児久咳　海人　忍冬　甘屮　右白刀豆細末白湯用佳
又方　天南星　氷糖（等分）
治鵞口瘡　石羔滑石明砂辰砂（各等分）　右末和水以鳥
羽塗之　又方馬明退（ヤマイ）紅花　甘草　右黒焼為末和臙
脂塗患上不過三日而愈
夜啼　前胡ノ末蜜ニテ服　又方五加皮末塗臍

清津丹　痰切　香附（十匁）茯苓（五両）干姜（三匁）
利気丹　気付痰切　南星　辰砂　杏　人参　川烏
附子丁子　右為末蜜丸生姜汁送下
痰切方　香附　白芥子　白朮　萊菔子　蘿蔔子　右糊丸
瘙疹　蒼朮　葉花実何モ等分為末黒豆ヲ炒焦酒ニ已
々し其汁ニテ粉薬ヲ服スへし
水芝丹　遺精夢泄　蓮肉　竜骨　益
智　右為末服或酒或猪脂ニテ為丸佳之
奇功丸　牡蛎（煅）　為丸主病煮剤ヲ以飲へし
朗明湯　治遺精久不止盗汗五心煩熱等症
枳、　朴　蛎　朮　梔　連　竹茹　石

恙　甘　右九味、煎服
小児盗汗　亀板尤佳或ハ鼈甲白湯ニ送下
治白禿瘡　大蒜ヲ摺其汁ヲ以葛粉ヲ解付又椒
実黒焼軽粉少右ゴマ油ニテ点
神愈散　主治同前　天花・蛇骨　甘竹（各一）
戋　白粉（一戋）　菊葉（黒焼）　右細末ゴノ油ニテ点
頭瘡或楊梅瘡点薬（五彩）　赤小豆　硫黄　右為末ゴマ油ニテ
点口辺手足ニヨリタルニ佳
頭瘡　花椒　木香　檳良　紅花　甘艹　右煎　又方
地黄（黒焼四戋）　天花粉（四匁）　軽粉（二戋）　右ゴマ油ニテ点一方無軽
粉有地竜霜
癜根元髪不生　馬尿ニテ可洗
又元薬　丹礬　朱砂　硼砂　右猪油ニテ煉付
小児小瘡　樸（ミキ）皮　蜂房（各黒焼）　軽粉（少）ゴマ油点　翌音連
薬湯ニテ洗　又大黄　黄芩（大）　圭支　茯苓（中）　川芎
黄連（小）　甘艹（少）　右煎
虎[illegible]如大燃十八六　黄芩末水ニテ可塗
丹入服ト外　白芷　寒水石　為末葱汁ニテ調可塗又方
牛膝甘草伏竜肝為末塗佳
虚損補胃養心　茯苓　没薬　右等分為丸服
乾坤丸　治心気虚労及労瘵初発　乾牛（廿匁）　茯苓
薯蕷（ヤマイモ各十匁）　大棗（去核四十枚）　右為末糊丸梧子大毎服二十粒

治癩瘡　大黄（二十両）皂莢（炒五匁）檳良（二匁五ト）鬱金　苦辛（炙同上）

牽牛子（炒香色）荊芥　羌活　鹿角（各三匁五分）大楓子（去皮一斤）右臼

中ニ入杵合弾丸大丸一日ニ三粒用四日メヨリ左ノ下剤ヲ用

大黄　皂莢　檳良　牽牛　苦辛　鬱金（一匁）巴豆（五匁去皮）右搗

子大丸十五粒白湯ニテ用

再造散　或加天蓋（セイ）治大風及癩毒世石択新痛服之可也

回天神秘丸　霊天蓋（五匁）大楓子（五十匁）櫻皮　芦眼石　大黄

（各三匁）苦瓢（一匁七ト霜）　右末糊以丸弾子丸十丸ト十三一日ニ三

粒ツヽ白湯ニテ下

療癩方　雷丸（九十匁）大黄（七匁二分）川芎（四匁八分）木香（口）河豚魚全焼

温酒ニテ服吐血則愈。又方反鼻以醇酒服至酔為

度吐悪血愈

悪瘡出似癩瘡地黄ヲ砕汁ヲ塗ベシ

治労咳　黒猫（黒焼）散服　又霊天蓋（三匁）煎服或散

又方　天蓋（二匁五ト）柴胡　犀角　広香（各三匁）甘中　桃枝

柳枝　榴枝　青蒿　葱白　薤白（各七分）煎服

治痔労　嘴太鳥　鰻鱺（各霜）右丸之炙鰻下レ鰻上豆油

和鳥霜塗服用若鰻則薯蕷代之

五石散　治痔労　霊天　貝母　半夏　石羔　瓜呂　右煎

又方　乾漆　栢子仁　酸棗仁　山茱　朱萸　右丸白湯下

治心腎不足虚煩而少睡自汗盗汗遺精白濁者

安神散　本方加广名　奴香散

治労咳　石羔　右取匹入人尿中卌日喰人尿而后取出洗
流水盛土器密封焼為末糊丸
神授丸　治労瘵之症先灸四花患門后宜服此方
大黄　皂角　桃人　擯良　雷丸（各弐戔）　安息香（一匁）　右糊丸
桃柳葉煮汁送下
治虚労　地骨皮　鼈甲（各一匁半）　五味子　右末糊丸毎服
五分日三
疝　柘榴皮（大）　擯良子（大）　橙皮（大）　青皮（少）　甘艸（少）　大疝
気自少腹起而作痛者主之　漆木皮　胡桃木皮
乇蓼　芍薬　厚朴　右煎　疝筋引腹痛腫痛
橙　絲瓜　圭支　甘艸（又疝ニテ節弯急スルニユブリコ松前同屋ニアリ右煎洗又痛ニ煎服）
治寸白虫　柘榴粥方　柘榴皮　兵良子　右水煎去
渣以煮粥服之后輙下寸白虫
茴香丹　治疝瘕腫脹痛或引嚢大者　鹿角霜（五両）
茴（二両）　胡椒（二両）　右丸
疝腫痛甚　乇蓼　桂　甘艸　右煎　又疝節弯急
腫痛　ユヅリ葉　橙皮　木通　甘艸　右為末白湯ニテ用
小児陰腫痛　木香　枳壳　甘草　右煎　又方蜜柑実砂
末酒ニテ用
寸白妙方　地膚（葉実共ニテ五匁ニ下）　青苔　右為末白湯送下ツヨ
リ蚕服
痛甚時ハ　桃子五箇去壳共黒焼ニメ右二味内加用

沉香桂附丸　治疝浮腹痛寒利　附子烏頭沉香肉桂
干姜良香茴香呉茱萸右末醋糊丸毎服五七十空六服
疝痛　カヤ　良姜　青皮　付屮　煮服　又方　乾漆
肉圭　玄胡　右丸塩湯ニテ用
嗝反胃　烏頭（黒焼）　白湯ニテ服。又　反胃　黄連　黄芩
林檎（黒焼）　右末牛乳煉　又方　阿魏　五霊脂
右炒黒メ加朱砂丸　又反胃吐食及嗝噎　帆青（バラン）
茯苓　夲煎。　治噎方　丁子（一匁）　香附（五ト）　右為末
三年梅干肉ニテ拼目大丸廿粒ヅヽ白湯ニテ用
乳腫　千金曰四十以内之乳腫可治五十以下者不可治
乳腫或汁不通　鯉（焼）用　又方　天花粉　青黛夲散

服或煎服　又天花　赤小豆　醋ニテキ塗
乳腫散薬　忍冬　芣莒（カキドウシ各黒焼）　黄栢　赤豆
右醋ニテ貼
當皈湯　治婦人乳腫痛実熱劇者　小當皈　青皮　貝母
紫胡　天花粉　白姜蚕　金銀花　付屮　右煎
通乳散　治汁不通　露蜂房　糯米　右為末湯下
一方加天花粉　又方　瓢蒂霜（十匁）　兵良子　天花粉
右末服用
治瘜肉（ハナダケ）　百會ニ灸　外口傳
従鼻中乇生ニテ昼夜長ク痛アリ　乳香　硇砂（ホウシヤ）丸服
搐鼻　蒼耳ノ葉酒ニテ蒸為末可服。枇芭葉　山梔子

為末服。鼻赤ニハ蜜柑実炒為末二匁ツヽ寢時付自
瘡ニテ落。硫黄明礬等分為末茄子ノ汁ニテ可塗黄丹ヲ
加軽粉ニテモ吉

療酒查鼻面末如天刑病者　黄連　地黄　大黄
山巵子　葛根　芎苿　紅花　甘艸　右煎覚痛痒者
毒氣尽ノ候也　。附苿　乳香　硫黄　巴豆　軽粉
右蜜傳之

治悪阻呕吐不止者　伏竜肝　白朮　猪苓　右末毎服
自三分至五分　又橘皮湯　陳皮　茯苓　麦門　白朮
甘艸　厚朴　生姜　竹茹。又蝙黒焼草麻子油ニテ如
胡桃大丸ニ一丸可三ケ月ヨリ内ハ必隨。　一方辰砂

（三分）芎苿（五分）生牛膝（三匁）大黄　巴豆　右糊丸如小豆ノ
大暮六時十五粒五時廿五粒九時同白湯用大下利后ニ
粥ヲ食　又悪阻　香附　藿香　甘艸　右末塩湯用
流産ノ方　唐牛膝　水銀　雄黄　牽牛　右糊丸百四十粒
一方有大黄

脱肛難理　昆蒻ヲ味噌ニテ热温寸旦ヲ以押入ヘシ
又古キ蓮葉黒焼末脱肛ニ振掛温湯ニテ押込ヘシ
又蛇脱　為末ニ广油ニテ貼之

痔漏或膿不出為痛薫法　荊　莞　防　十二十
蓮葉　忍冬　一方有葱白右等分ノ大袋ニ入酒ニテ煮
其侭袋ニテ薫也

治下血痔漏白帯下　黄連　黄芩、卮子　黄栢　芍
側栢葉　生地黄　艾葉　右煎　又蝸牛ヲ广油ニテ塗痔
疣痔下血　赤小豆末傳上膏茶　又方田螺　黒焼
松脂（少）入ニ广ノ油テ煉貼
越桃散　治下血及下利　越桃（也）（卮子）槐花　青州棗
干姜　右等分焼存為性未陳米飲調二攵服

川芎膏（一名タツ膏）　タヅノ木葉軸共土用中ニ取切テ鍋
ヱ入喩ハ水一斗ヲ煎テ三升汁ニメ扨渣ヲコシ揚テ
サマシ其煎汁ヲ又小キ捐庅ノ鍋ニ入テ一升或ハ一升
五合汁ニ煎ツメテ其ヲ又サマシ銅鍋ニ入炭火ニテユル
ミミ子リ為膏アてりカメキハ不宜已上三ケ日程掛ル

○第一ニ疝気ニテ胷抔イタメ或ハサシコミ痛ムニ飲テ好シ
疝気痛上紙ニ付テ張モ佳其外ノ尋常ノ腫物ニ好
飲様ハ右膏ヲ壷ニ入置ムクロジ粒程茶碗ニ入湯ニ
テトキノム　（花園帳中寫）

一ニ瘡　キラン艸根共ニヨリ洗黒焼ニメゴマノ油ニテ煉
箆ニテツリル也灸ノツヨリ痛惣メノデキモノニ佳
戦墕ニ臨大ニ働時ハ蒸気逆上メ眩者也此時ハ辰砂
益元散佳　滑石六攵　甘草一辰砂（少各攵）　右細末水服
姙婦男女ヲ弁スルニハ男子ヲ孕ムモノハ肌膚ノ色自ラ
善ナリ女胎ヲ孕ムモノハ不好ナリ又曰男胎ハ右腋ニ在リ
女胎ハ多ク左腋ニ在リ又曰男胎ヲ孕ム者多按ニ摩スルヲ

妊身体甚壮健ニメ當テ悪疽ナリ胎動早ク乳房ノ實大ニナルヿ右ヨリ始リ左ヨリ右先実ス乳頭両ナカラ隆起メ突出シ乳汁稠クメ濃ク身体右ノ部ニテカアリテ動作ニ鋭クタトヘハ起坐スルニ先ル右ノ足ヲ始ニ用ルガ如シ此ノ徴ニ反スル者ハ女子ヲ孕ミタル候ナリト云也

○治瘭疽　鼠糞　研末可塗如神効（中川目軒語）

○癬瘡　従委中曲池抔ヨリ出血メ后下剤ヲ可施ト也

治産後陰門破傷（療治茶話）　霊天蓋末點ス

池田口決痘疹秘蔵之傳

痘發紫色ニメ無神者死（神トハ痘ノフチヲ巡ル血ハ虚痘ニテ色ヲ云無血色乱ル者有候）

何レモ以補剤治忌用當帰ミハ後内故也

大補保元加附子ニ宜シ補益トハ行入故不宜

痘裏（ニワシ出ヨリ云）大海出者難治筒ニ見黒点者不治（大海トハ口ノ邊リヲトリ）

一死症ト可哭

痘出脉中者一身痘由ニ微ク発ノ難治也脉中数多者十二日ニテ必死（サス）（十二日トハ始三日ヲハブキテ後ノ日ヲ）

池田家序熱三日ハ不取従見点定日（此方中従其例）

痘裏肛門者必死（八日メニ死始三日ヲ除後ノ日ヲ云　肛門ノフチナヲトリテワメ出ル）

至十五日不落痂者廿日ニシテ死

痘閉目八日ニシテ目ヲ開クモノハ十二日ニシテ死（不雑痘或多出者母旻膿ニカハル）

（事ニテノ）

最初発熱三日ノ内下利ナキモノハ八日ニシテ下利アリ至テ出痘

也痘ノ多少ヲ以テ死生ヲ分ツヘシ
出奸門（是ハ両眼ノシリ）者ニ痘ニ至テ危シ能溫補スヘシ
痘地閣（下アキヲメクリ両ノホウアタリ）ニ黒点ヲ発スルモノ至テ危シ急ニ溫補スヘシ参附不可闕尤灌膿晕時急用忌冬剤解毒之類
腰部痘多者ハ危シ背部次之
痘声唖者ニ至テ唖者死
痘ニ痒者痒之甚跡凹モノハ死凹ノ内少ニテモ有膿者不死
司空ヲ痒者至テ危シ
痘灰白ニメ無血色者切ニ可行附剤多出目不開（開）抓ニハ久シヘ目ハ盲
（参附ヲシキリニ用ルナハ命ハ保ツベシ　大人ハ生小児ハ危シ）
治子ト外胞中不出又逆生及横生不出手足先見者

取竈（ツウ）下黄土三指撮以酒服之立出
荊芥石羔湯　治上熱如裂者
荊　石　芥　芎　甘
欲用抵當丸者先令禁塩気而三日斗以三黄瀉心之
类下胃中之汚穢而后可用此湯丸（令禁塩者以水蛭之功尚故也面白説也未延語）
萆薢湯　淋疾疼痛白膿多者
朮　厚　橘　甘屮　茯苓　龍胆　各二ト
萆薢一匁　以水煎
温胆湯（千金）大病后虚煩不得眠此胆寒故也
半夏　竹茹　枳実　橘皮　生姜　甘屮
薔薇根湯（未延方）治ニ黴口胃ニ痛軽剤

薔　土伏（各大）　防風（中）　竹瓜　梹　羗　大黄
白鮮　翹（各中）　甘艹（少）　銀花（中）　太
茹荃湯（日）治黴毒骨節疼痛者
茹荃　薏苡（各二銭半）　土茯　金銀花（各二銭）
反鼻（大）　太水煎
潤神湯　労瘵増寒発熱口乾咽渇
人参　芪　竹葉　甘艹　麦門　桔
治角弓反張妙方　芒硝（一匕）　水煎立治
觧労湯　治虚労　柴苓　芍　枳　鼈　甘
地骨皮　鼈（五分）（各二分）　五味子（一銭）　右為末煉
蜜丸毎服五分日三次

治反胃（大野良治）　仙人艹（四両）　沉香（一両）
右為末蕎麦糊丸揚梅皮末為衣
芎藭一　治婦人眼病
四物湯方内加升苓
枳実芍薬湯　治疝気積聚腹中裏急
枳　芍　梹　瓜　茱　甘
石膏湯　口舌爛生瘡或歯痛
石　連　地　甘
林一鳥水腫方　胡瓜　地膚子　車前
木通（各小）　大麦　赤豆（各大）　右炒
小瘡治方（中野敬斎）
蒼　羗　皈　防　苓　甘

忍　荊　梔　但水腫加車前香附大腹節々腫

六倍加忍冬　右一日二三貼宛五日間十五貼

貼用毒気ヲ十分ニ表ヘ駆出后傳薬

ウヨウイヨウ　黄栢　右三日程傳

同薬湯（後藤）　塩（ゴモ一俵）　青木葉（五十五枚）

イヨウ一斤

同内薬　荊防敗竟銀花羌朮甘

右内外ヨリ同時ニ用ユ故ニ内攻ノ患ナシ

同傳薬（新山良甫）　石炭明（八戔）　軽（二ト）　各土ノ油

ニテトキ付ル内薬発表剤也

鮫蛇芎黄散　大（十二戔）　芎（九戔）　蛇（六戔）

治漆瘡　香蘇去甘散

治液臭方　銅緑（青大）　木香（少）　右極末湯洗腋

下　薄之凡壮者可用虚不宜

治丹毒　赤豆　雞卵　右煉合點之

近年天下狗疫若咬人則灸炎為第一上策次

用白虎承気湯之類亦可

火傷妙方　砂糖　馬油　各味

除口中臭気　益智（十戔）　甘艸（二戔）　為末塗舌

軽粉剤　丹（及八木傳）　牛膝（二戔黒色炒）　軽（一戔）　土伏（二戔半）

丁子（五分）　大黄（八分）　右糊丸六日間服尽

至七日　梅肉丸下

後服解毒湯
土茯 土戔
土伏皮 円
沢瀉 二戔半
温服
六
軽

芎 薏苡人
羊 渇 昄
彩 大黄 五分
子 大辰砂 袞

按腹 七法

第一排抱 先病人ヲアヲケニ臥セシメ医
者ノ病者ノ左ニ坐シ腰足ヲナセルヿ六七度ニメ
ヤメ扈里動ヲ暫ノ診ヿ医ノ左手ヲ病人ノ
臍下ニ按シ右手ヲ病者ノ胸腹ヲナセルヿ七法
ノ例ナリ先右手ヲ以テ胸乗中ヨリ膈テニ左右ヘ
ナセヲロルヿ六七度ニメ然右ノ如クナセル、ヘ手術
ヲ書記スルト雖モ口授ニナリテハ二レ雜シ

第二循胞
病者ノ仕法前ノ如シ医ノ左手ヲ病者ノ臍下
ニ按シテ右手ヲ以テ病者ノ左脇下ヲナセヲロスヿ
不容ノ穴ニ至ル右モ亦同シ

第三按住
病者仕法前ノ如シ医ノ左手ヲ病者ノ臍下按シテ
右手ノ大指食指二本ヲ以テ心下ヲナセ
ヲロスヿ口授有リ筆記ノ及所ニアラス

第四拘胸
病者仕法前ノ如シ~~医ノ左手ヲ病者ノ臍下ニ~~（左手ヲ病者ノ脇腹ニカケ）
按右手ヲ脇下ヨリ不容ノ穴ニ至ル（ナセヲロスヿ）右手ノ仕法ハ
循胞ノ術ノ如シ左手ヲカケ引上右手ヲ下スヿ
引カヘニスルナリ

第五檀挟
病者ノ仕法前ノ如ニ医ノ両手ヲ以テ病
者ノ右ノ傍腹ヨリカケ左ノ傍腹ニ至手至ル時ハ
医ノ手大指許ヲ以テ引上ルナリ右ハ十指
左ハ二指ニ施スナリ

第六拘背
病者ノ仕法前ノ如シ医ノ両手ヲ以テ医ノ
右ノ手病者ノ右ノ腹傍ニアテ医ノ左手ヲ病
者ノ左ノ腹傍ニアカイ背ノ七椎ヨリ

口 丹 瘤 瘵
瘡 疸 佃 末
行 痳 活 血
琉
甘
吒 大 便 秘
白 芍

薄荷　梹榔　桔梗　連翹（各戔）一耳中
（五分）大黄（二戔）右十一味水煎服

双解復生散　治癰疽発背諸般之腫毒初起
悪寒発熱四肢拘急内熱口乾二便秘者
荊　凡　芎　芍　著　广
耳（五分）荷　梔　沂　連喬　滑
金　蓋　蕿　朮（各八分）軍　硝（各戔二）
右十八味水煎服

托裏消毒散　治癰疽已成不得内消者未成
者可消已成者即潰腐肉易去新肉易生也
蕿　芎　芍　著　帰　朮
苓　金（各戔）一芷　耳　䏙　桔（各五分）
右十二味水煎服

透膿散　治癰疽諸毒内膿已成不穿破者
著（四戔）山甲（炒末一戔）芎（三戔）沂（二戔）䏙（一銭五分）右五
味水煎臨服入酒一盞亦佳

竹葉黄芪湯　治癰疽発背諸般之疔腫表裏
热煩燥而渇者
芪　耳　苓　芎　沂　芍
蕿　麦　石　葉　肉（各八分）地（二戔）
右十二味水煎服

回陽三建湯　治陰疽発背初起不痛不腫不

熱不紅硬如牛皮堅如頑石十日外脉細而身
凉肢體倦怠皮如鱉甲色似破粟項多生瘡孔
孔流血根脚平散軟陷無膿又皮不作腐手熱
足凉者俱急服之
附　蓡　蓍　沂　芎　茯
枸　橘　萸（各錢）一　蜜　甘　紫廿
朴　朮　琥　獨（各分）五　千（三分）右水煎
入酒一盞服以綿帛蓋暖瘡上
洗藁方　歸　獨　芷　甘（各錢）二　葱頭
五箇右以水三盞煎至二菜ノ爛一濾清以絹四帛蘸
湯二揾三淨ム瘡上一隨揉貼紅黑二膏蓋之常治背瘡
輕易者以此代猪蹄湯
荊防敗毒散　治癰疽疔瘡背發乳腫等凡諸
般之瘡毒者
荊　前　防　羗　紫　荷
翹　桔　枳　芎　茯　金
甘　姜　右十四味水煎服
潰瘍方
十全湯　治潰瘍發熱悪寒或自汗盜汗或膿
多或清氣血之不足
蓡　蓍　芍　圭　芎　地
沂　朮　苓（各錢）一　甘（炙）

八珍湯　益気湯　内補黄芪湯

保元大成湯　治潰瘍元気素虚或膿水出〻多神無所主以致睡臥昏倦手足冷或便溏或秘虽飲食無味諸不足者

葠　朮　蓍（各戋）二　茯　芎　橘

沂　甘　附　山茰　五味（各戋）一　木

砂（各分）五　姜　枣　右水煎服

托裏定痛散　治癰疽潰後血虚疼痛不可忍者

帰　地　乳　没　芎　芍

圭（各戋）一　粟殻二戋　右水煎服

癌疽

解毒天漿散　治脳疽積毒日深堅腫木硬口燥舌乾悪心煩渇六脉沈実大便結者

決明　姜蠶　山甲　防　翹　蔞

乳　甘　金　蓮　沂（各戋）一　黄三戋

天花　右水煎服

廻毒銀花散　治脳疽及諸発陰瘡不起色変紫黒者

金（連枝葉一両）　茋四両　甘二両　右三味用細酒二十両同茶入小口砂罐内密封重湯内煮尽三香為度取起濾清服之

小保安湯　治胎疽諸発已潰流膿者
茋　茯　芎　沂　因　橘
桔　蔓　复　甘　朮（各一銭）　藿（五分）
姜　棗（各八分）　右水煎服

大保安湯　治脳頂諸発癰疽瘡悪大毒已潰
之後膿水出〻多気血不足坐臥不寧煩燥不眠
或煩渇者
朮　沂　参　茯　芎　芍
山茰　茋　蕢　丹皮　地　味（各一銭）
圭　甘　肉　附（各五分）　姜　棗（各六分）
右水煎服

桑灸法　治諸瘡結毒堅而不潰潰而不腐新
肉不生疼痛不止者（用）新桑木長七寸劈指大一
頭燃着向患上灸之火尽再換毎次灸木五六
條肉腐為度

神妙抜根方　治脳疽発背陰證、初起不腫高、
不焮熱、灸不痛、其病将来難、㬎必致壊人、十日
以前用披針、当頂、插入、知痛處、方止、随用蟾酥
條、插至孔底、毎日二條、（膏）蓋、三日後加添插薬、
其根高、腫作疼、外用神燈照法、助陰為陽、插照
七日、其瘡裂縫、流膿、至十三日、其根自脱、如日
多根深蔕固不能脱者、披針（取）要之、内用玉膏、不

脱者自脱此法百人百活再無不愈者
癌疽癰用方
隔蒜灸法　抜筒法　琥珀蠟礬丸
太乙膏　眞君妙貼散　護心散
蟾酥條　乳香定痛散
聖愈湯　蟾酥丸　十全湯

疔瘡

黄連解毒湯　治疔毒入心内熱口乾心下煩
悶恍惚者
芩　連　栢　梔　翹　甘
牛房子　燈心　右水煎服

疔毒復生湯　治疔毒走黄頭面發腫毒氣内
攻煩悶欲死者
牡　梔　金　銀　翹　犕子
乳　没　䑕　祗　軍　蝞狢ハ
右水煎臨服加酒一盞和服
化疔内消散　治疔瘡初起或已針已灸之後
之能令内消
䑕　金　妿　姍　祗　岬　芰
乳　芎　复　甘　紫訶車　右水
酒各一茶鍾煎服
解毒大青湯　治疔瘡誤灸逼毒入裏致生煩

燥譫語不定者

玄〻　知ゝ　桔　大青葉　升〻　膏

梔　人中黄　門冬　通　貉一　黄

燒人糞　右水煎服

又方　治疔瘡及諸悪毒初起但不成膿者服之即効

白着麩三　葱白七茎　右二味同搗極爛分作七塊毎塊用熱酒一杯送下服畢用厚被蓋之再喫葱白湯一鐘少頃汗出〻如淋従容去其覆物其病如脱此無味淡雖服其功更妙

脱疽

解毒生濟湯　治脱疽初起悪寒発熱煩渇或腫或紫或麻或痛四肢倦怠心志恍惚不安者

芎〻　沂　栢　知　花　金

角　遠し　紫　苓　犀　茯

甘　紅　升　牛ゝ

瘰癧

防風解毒湯　治風毒瘰癧寒熱不調耳項結腫或痰凝気滞者

防　荊　桔　蒡　翹　甘

膏　荷　枳　芎　蒼　知

右水煎服

連翹消毒飲　治風熱毒瘰癧過食炙煿醇酒膏梁以致蘊熱腮項成核或天行亢熱濕作腫不能轉側者

翹　陳　桔　玄　芩　芍

沂　梔　葛　射干　莚　紅花各一

甘五分　軍八分　右水煎服

活血化堅湯　治一切瘰癧及瘿瘤痰核初起未潰膿者

防　芍　沂　天花　金　貝

芎　能　桔各一　姜三　朴　靈脂

橘　甘　乳　芷各五　右水煎服

咽喉

玄蔘解毒湯　治咽喉腫痛已経吐下飲食不利及餘腫不消者

玄　梔　甘　芩　桔　葛

地　荊各一　右水煎服又加竹葉燈心亦佳

連翹散　治咽喉腫痛胸膈不利欬吐痰涎舌乾口燥者

翹　葛　芩　芍　梔　桔

升　肉　蒡　甘　通各八　右水煎

涼膈散　治咽喉腫痛痰涎壅甚膈間有火大便秘澁者

附（防風）　荊　桔　梔　玄　膏

荷　連　茯　蒡　貝　軍　硝　等

五物散　治喉閉纏喉風痰涎壅塞口禁不省

焰硝（一兩五錢）硼砂（五錢）片脳（一字）姜蚕（一錢）雄黄

（二錢）右五味另研為末和匀以[redacted]竹筒吹患処

痰涎即出〻如痰虽出腫痛不消者急針患処去

悪血服薬

又方　治梅核気結於喉中嚥之不下吐之不

出如毛艸常刺作痒新則吐酸妨碍久成閉塞

膽礬　硼砂　明礬　牙皂　雄黄

右等分為末紅棗煮爛取肉為丸

氷硼散　治咽喉口歯新久腫痛及久[redacted]嗽痰

火咽唖作痛者

氷片（五分）硃砂（六分）玄明粉　硼砂（各五錢）右

極末吹搽患処甚者日五六次

時毒

荊芥敗毒散　治時毒腮項腫痛

五物大黄湯　治時毒焮腫赤痛者

軍　芩　升（各二錢）芷　梔（各一錢二分）

連翹消毒飲　治二毒表裏二症但罷餘熱不

消痰痛不退者

翹　芎　沂　芎　芍　蒡

薄　芩　天　甘　桔　枳（各一錢）
升（五分）黄　石水煎

防風通聖散　治時毒発熱悪寒煩燥口渇者
防　芍　荷　芎　桔　梔　芩　朮　帰
翹　荊　广　滑　膏（各一錢）甘（五分）芒（一錢）軍（二錢）
右水煎用

癭瘤

海藻玉壺湯　治癭瘤初発或腫或硬或赤不
赤未破者
海　貝　陳　昆布　青（ヒ）芎　沂　夏　翹
甘　獨（各一錢）海帯（五分）右水煎服

癰肺

四順散　治肺癰吐膿咳嗽気急不安者
貝　紫（ヒ）桔（各一錢五分）甘　杏（各七分）右水煎服
排膿散　治肺癰已吐膿後宜服此薬
蓍　芷　味　蓡（各等分）右水煎服

流注

附子八物湯　治流注生腫塊或遍身腿脚疼
痛不能歩履者
芎　芍　地　蓡　朮　苓
沂　附（各一錢）桂（五分）蜜　甘（四分）右十一
味水煎服

乳癰

牛蒡子湯　治乳癰乳疽結腫疼痛不論新久
未成膿者
陳　蒡　梔　金　甘　瓜実
芩　天　翹　鮑（各一戋）　紫　青ヒ（各五分）
右水煎加酒服

橘葉湯　治有孕胎熱為内吹有兒吃乳名外
吹致乳結成腫痛寒熱交作甚者悪心嘔吐
柴　陳　芎　梔　青　石ゥ　芩　翹（各一戋）　甘
橘葉各（五分）右水煎服

鹿角散　治乳癰結腫疼痛未成俱用
鹿角尖（三寸）右一味焼存性為末毎服三戋以
熱酒服

骨疽

六物附子湯　治骨節煩痛四肢拘急小便不
利手足時或浮腫者
附　甘（各一戋）　防ヒ　朮　苓（各八分）　桂（五分）　姜（三分）

獨活寄生湯　治風濕内攻膝痺攣重者
獨（二戋）　茯　芎　沂　防　芍　辛　蓡　桂
杜仲　秦艽　牛シツ　地　寄（各一戋）　甘　姜（各五分）

加味敗毒散　治濕毒流注脚踝焮赤腫痛寒
熱往来者

蓍　柴　参　前　芎　桔　茯　枳　甘

木瓜　朮（各分八）右水煎加姜

腸癰

大黄牡丹湯　治腸癰小腹堅硬如掌

失笑散　治産後心腹絞痛或血迷心竅不省

人事或瘀血積血作痛者

五霊脂　蒲黄（各分）等右細末服

排膿散　治腸癰小腹脹痛裏急後重時々下

膿者

蓍　沂　金　芷一　岬　防　芎　蔞仁（各銭一）

薏苡仁湯　治腸癰腹中疼痛或脹満不食小

便婦人産後多此症腸癰亦可

薏　瓜仁（各銭三）芍（銭一）牡（二）桃（各銭二）

蔵毒

内托黄蓍湯　治臓毒已成紅色光亮已欲作

膿不必内消者

芎　沂　陳　朮　蓍　芍　岬　鮑（各銭一）梹

（分三）右水煎

黄連解毒湯　治好飲酒食膏粱肛門結成腫

疼痛如刺堅硬如石者

痔瘡

生肌散　治痔上枯薬之後脱落孔竅不收者

乳 没薬各両一 海螵五戔 黄丹四戔 赤石七戔
龍骨四戔 血竭三戔 熊膽四戔 軽粉五戔 氷片
一戔 麝香八分 珍珠二戔 右研極末磁罐收貯
早晩用搽二次

人中白散　治諸痔腫痛堅硬墜重脱肛者先
用溢湯洗浄而後搽薬即臥勿動

三品一條鎗　治諸痔

胡連追毒丸　治痔漏不拘遠近有漏通腸汚
從孔出者先用此丸追尽膿毒後用閉管丸
胡黄連一両 刺蝟皮一両（炒為黄） 麝香二分 右三味為
丸广子大每服一戔以酒下

閉管丸　胡連一両 岬 決明煅 槐花各五 石
三味蜜丸服

下疳

竜膽瀉肝湯　治玉茎疳瘡或便毒懸癰小便
渋久潰爛不愈又治陰嚢腫痛者
竜 翹 地 澤各一 車前 木通 沂 梔
甘 蓮 芩各五 黄二戔 右水煎服

八正散　治下疳小便淋閉不通及一切淋疾
軍 車前 瞿麦 扁蓄 梔 木通 甘
滑石 水煎

木通解下毒湯　治五茎陰戸痒痛水濇滞白濁

至夜陽物興挙不得眠者
通　龍　連　瞿　梔　柄　知毋　戔各一錢
毋五分
珍珠散　治下疳皮損腐爛疼痛不可忍者諸
瘡不能生皮者
青釭花（五分如無則用頭刀靛花書虚色翠者代之）珠（一戔）粉（一両）
右三味共研为末腐爛甚者洗淨而搽之
便毒
六龍丸　治魚口便毒騎馬癰横初不成膿者
皂莢　血竭　乳香　没薬　巴豆
木香各六分右以生蜜丸服

黄芪内托散　治魚口便毒已成不得内消者
芎　沂　芪　戔各二朮　金　天　皂角　戔各一毋
澤各五分　右水煎
楊梅瘡
解毒天漿散　治楊梅瘡新久遍身潰爛及筋
骨疼痛者
天花二戔　防　已　皂角　白蘚　翹
芎　沂　木瓜　金花　蟬　苡仁
戔各一毋五分　土茯二両　牛七分　右水煎服
升广解毒湯　治楊梅瘡筋骨疼痛久而不愈
骨疽

生肌散　治腐骨脘出肌肉生遅不能收歛者
膏　粉　硼砂（各一）膩粉（二）龍骨　血竭　乳
香　朝脳（銭各三）右為末搽之
雄黄藜蘆散　治婦人陰中突出如蛇或雞冠
者
雄黄（一銭）葱管藜蘆（二銭）軽粉　鼈頭（煆黄色各一銭）
右細末和匀以芎帰湯洗滌後搽之
芎帰湯方
芎　帰　芷　耳　沙膽（各等分）
口舌
凉膈散　治下根腮項成腫多痛者
翹　梔　芩　薄（銭各一）耳（五分）黄（二銭）
硝（一銭五分）石（一銭五分）竹（三枚）
清中散　治牙歯疼痛者
沂　蓮　地　梔（銭各一）牡（六銭）升（八分）
耳（五分）右水煎服
大成湯　治跌撲傷損瘀血流注昏沈不醒胸
腹膨脹二便秘者
橘　沂　蘇　通　紅　朴
耳（銭各一）枳（二銭）黄（三銭）硝（二銭）
清胃散　治牙歯或牙根作腫出血不止者
芩　連　地　丹（ヒ）升　石（銭各一）

解毒浮心湯　治腫物有热渴煩悸而小便不
利者
蓮　防　荊　杷　芩　蒡
玄　滑　知　石（各匁）一　甘　木（各分）五

内消散　治癰疽発背對口乳癰百種無名腫
腫毒一切反瘡
金　知　貝　天　皷　叓
岬　[illegible]　乳（各匁）一　右水酒煎

貴中譜

古今方要

雄硫散　治大麻風眉毛鬚髮脱落併痒者
雄黄　硫黄　鳳凰皮（即雛雞殻焼存性各五匁）黄山
甲（十先炒黄）滑石（一両石各為細末用羊油核桃肉二両搗爛同猪膽汁一筒同薬和）
（勺用青紗包薬擦之日用三次其髪即生如舊是先生治驗方）

四黄散　治紫白癜風皮膚作痒者
石黄　雄黄　硫黄　附子　雌黄
川槿皮（各等分為細末紫癜醋調用白癜用姜切開蘸薬擦之）

治牙疼痛方　蓽撥一匁　蟾酥二分　川椒五分
老墻（三分石共為末用草桔咬毛蘸薬擦點痛牙根上妙也）

桃花散　治金瘡出血不止者

一石灰（半）（半）大黄（一両五戔）

雄黄散　治蛇毒細腫発熱疼痛者（右同炒石灰変紅色篩一为度去大黄細末入）

雄黄（二戔）蟾酥（二分）氷片（一分）軽粉（五分为末水数）

綉毬丸　治一切乾濕疥瘡及膿窠爛瘡

瘙痒無度者

樟脳　軽粉　川椒　枯礬　水銀

雄黄（各戔）二　凡子（百枚右極末以柏油和調円丸大擦瘡上）

蛇床子散　治膿瘡窠生扵手足遍身根硬作

脹痒痛不可忍者

蛇子　凡子　松香　枯礬（各両）一　黄丹

大黄（各戔）五　軽粉（三戔右广油調貼日二）

又方

黄栢　石羔（各両）一　黄丹（三戔）　軽粉（二戔）　枯礬

（三戔右細末以广油調付）

紅綿散　治耳内流膿腫痛已消膿尚不止者

枯礬（三戔）　乾胭脂（二戔）　麝香（一分去重）右末入耳中

三白散　治膝瘡

杭粉（一両）　石膏（三戔）　軽粉（三戔）

救生散　治凡犬咬傷

斑蝥（七箇頭足）去　杭粉（一戔）右両合空心温好酒服

追凡如聖散　凡犬咬傷隨數之

細辛　防凡　川烏　薄荷　竹烏

川芎　白芷　朮（各一両）雄黄（四戔）右調温
酒敷傷処

蝋礬丸　治癰疽発背已成未膿之際恐毒気不能出外
必致内攻預服此丸
白蝋（一両二戔）黄蝋（一両）雄黄（二銭）琥珀（一戔）硃砂（一戔）
蜂蜜（二戔）右上四味先極末另將蜜蝋銅杓内溶化離
火片時候蝋四辺稍凝時方入上薬攪調共成一塊丸

諸家雑方

治蚘虫発狂者方　苦楝皮（三銭三分）葛根（四分）黄（二戔）
芩（二分）耳（一戔二分）栟（一戔）人艸（五戔）

辰砂丸　治癲癇発狂者
辰（ネツブホト三ツ）巴（三粒）栟（五粒）石糊丸

治無名毒腫方　茜根（一戔）反鼻（五分）右水煎服之

治下血方
艾葉（入稉米之末）乾姜（各等分）右二味細末丸毎服丸薬一戔白湯丸

治諸血症方
朝鮮石榴花（陰干）右一味少許置舌上以津液下

治舌瘡及口中諸病方
水苦蕒（霜）昆布（焼霜）（各分）黄連（少）右三味末以管吹患処

治疣方
薏苡　一戋　甘（二分）　右二味煎服
治痔漏方
牛膝　楊梅　桃仁　牡丹　芍薬
大黄　川芎　茯苓　甘草　右煎服
治魚毒方
疑冬茎根生汁
治血麻方
乱髪霜　右毎服五分以白湯下
治丹毒方
蚯蚓泥　芒硝　右末、分数之
三龍散
治喘満欲死者　辰砂　土龍　枯礬　石
細末シテ以白湯和服
治小児痰癖方
南星　巴豆　朱（各五分）　右三味末、糊丸
治暴喘及馬脾風方
巴豆　大黄　雞冠石　右三味煉蜜和十歳已
上服三分後湯白布湯佳し
治吐不止者方
伏竜肝　右一味、毎服五分盞碗内熱湯攪調下
治蛙丸発方
烏頭　大黄（各等分）　右二味細末、和酢塗之
治老咳方
石亀（一箇）（中西之方）放糞中使大便喰数日後洗テ流水入土器蜜
封焼為末糊丸以白湯下此方去老熱至妙

五白湯　治肝労

ヨ大天蓋　貝母　半夏　石膏　瓜樓　右

五味水煎服

治癥毒諸薬無験骨節疼痛不止者方

土龍（霜）　右一味以酒服

治痘瘡発或未発瘡上凹者方

青豆　紫河車（各末少）　右二味糊丸以白湯下

治麻痺痛甚者

阿膠（三戋）　大黄（二戋）　附子（一戋）　右三味水煎服

治瘭疽方

蚯蚓（霜）　右一味和酥塗

治卒心煩悶欲死者方

呉朱　桑白（各九戋）　竹瀝（七匁）　姜汁（三匁）　右四味

先煮茱萸桑白後入二汁和服

沈香湯　治脚気気急毒攻上者

沈（三分）　香附子　木瓜　蘇（各二ゝ）　宿砂（五分）　甘艸（一戋分）

檳榔　塩（各五分）　右煎去滓後檳末塩ヲ入調服

又方

檳榔（三箇）　生姜汁（三合）　童便（二升）　右頓服

血暈ヲ治スル方

合歓皮　乱髪　鹿茸（各霜末少）　右末以白湯服

又方　治産後諸症

兎頭（霜）　右一味為末服

天童丸　治久痢諸治無効者

鳥舌（田ニアルウキクサ）　右一味糊丸

抜竹木入肉方

象牙　芍薬（各末）　右二味和糊附之

治喘方

黄芪建中湯加薤白附子

治呑針者
人爪（二錢） 右水煎服
骨硬
野蒜霜 右一味白湯下
治河豚魚毒方
蘆葉（生汁） 右一味服立功
治咽喉腫塞方
ダイリ（霜） 生昆布霜 竜脳 耳（廿ケ） 辰砂
右以管吹之
同
右皆茶
升广（二两） 桔梗（二分） 杏仁（一分）
治喉痺方
黄栢（中） 青黛（大） 辰砂（中） 右三味為
末以管吹之

治血軍方
鹿茸（炒） 上品茶（各等分） 右二味以白湯服奇功
治黄疸方
石菖蒲 櫁葉 陰干（各等分） 右二味水煎二服
治鼻中瘡方
琥珀油 右一味内鼻中日五六行
治瘰癧方
猪牙 當帰 軍 芎 亀版（黒焼） 皂莢
子（各等分） 右水煎服
治勞瘵方
旲天靈蓋如銭 紫胡 犀角 耳 桃枝 柳
枝 榴枝（各三寸 向東者） 青蒿（七分） 麝香（二分） 蔥白 薤
白（七分） 右末シテ丸服

治火炎疔及一切腫物

蝦蟆（去腸肉紅花黒焼）　右為末小児一条服大人条二服

以温酒服

治一切眼疾方

芦眼石四戋　黄栢二戋　黄連一戋　檳葉六戋

右先内芦眼石於土器中焼半日計栢連檳以水二合

半煮取七夕漸々攪土器中浸芦眼石安微花上

以煎汁尽石乾為度細末肉器内磨之半時計和

蜜煉

治眼疾方

連　沂　天花　牛芳　菊花　葛粉

蜜蒙花　穀精艸　木賊　羌　白蒺藜

柴　防風　地黄　中决明　薄荷　耳中　梔

生姜　芎　右水煎服

治労方　白

蛤蚧　山梔　樺皮　苦楝皮　右糊丸

神應蛤蚧円

蛤蚧（十戋此ヲ求カタキ代山梔奥ヲ用テ佳シ）故箱根産ヨシ浸水四足爪并眼九ヲ去九度浸酥九度混ヒ用ユ

山査子　白芍　麦牙　不　青皮　芩　使君子

枳実　各十戋　年　廿五戋　泻澤　二十戋

右小児五疳諸病ニ吉最胎毒疳虫鳥目ナ諸症ヲ治ス（肥後山中家ノ方）

痘瘡初発用之則毒気不迫咽喉

獨聖丸

大戟　右一味糊丸以白湯二戋ヲ用

痘瘡陰黒陥者ノ方

軍　紫草　雞冠石　各十分　右以寒中剣疋ノ紅粉和水

一散薬令相得如膏月傅黒ヲ瘡上又傅其ヲ四已

鎮咳湯　・治咳嗽

射干　生　款冬　蘇子　桔梗　其复　伏分研

右水煎服

治小瘡方　長州栗山孝庵方

帰　芎　蝉退　川骨　山茱　朮

香附子　母　木通（各半両）　大黄（二両）　防風（半両）　金銀花

紅花　玄参（各半）　右水煎

治耳痛方

白芷　右一味　和ノ油ノ耳中

治産後発狂方

サイカク　角骨　血竭　絡一　土ノ葉黒焼（二分）　右細末

治瘰癧方

串柿　梅干　味噌（五分）　右ヤキ和ノ付

治諸悪瘡婦人陰瘡方

胡麻　右水煎洗

三品一條鎗　去十八種痔五漏翻花瘻瘤気核治瘰癧

疔瘡発背脳疽等症

明礬三両　白砒（一両五銭）　雄黄（二銭四分）　乳香（一銭二分）　砒礬二味共

為細末入小礶内加炭火煅紅青烟已尽旋起白烟片時約

上下紅徹住火取礶頓地一宿取出約有砒礬浄末一両加

前雄黄二銭四分乳香一銭二分共研極細厚糊調稠

搓成如線條陰乾凡遇前症有孔者維入孔内無孔

者先用針放孔竅早晩插薬二次插至三日後孔大者

毎插十四條插至七日患孔薬條満足方住以後所患

四邊自然裂開大縫其至十四日前後其疔核瘰癧

痔漏諸管自然落下随用湯洗搽上コンフウシテヤルヘシ

ノルイラ

病因考　古ニ内因外因不内外因ノ三ツアリト云説アリ三因方ニ出タリ

中風傷寒附中寒

中風傷寒ハ傷寒論其変ヲ尽セリ師門常ニ講習スル所ナリ
故ニ今ノ其目ヲアグルノミ

中寒ハ此冬月厳寒ノ気ニアタルモノナリ方書ニ云如ク直ニ臓ニアタルト説スヘカラス又陰経ヘノミアタルト云ヘカラス何ノ経ヘモアタルナリ世ニ云コヽヘ病ナリ

治方大温薬可ナリ

中暍

此暑ニアタルナリ中寒ノ如シ後世夏日暑ノ防キトシテ香薷散ナトヲ服スルハ不可也暑ニアタラハ暑邪ヲ防モノナレハ服シテモ可也又暑ヲ避ルト

トテ水ヲ飲或ハ風ニアタリテ伏スヘカラス又清冷ノタメニ冷物ヲ過食スヘカラス暑者ノ甚シキハ午時ヨリ未ニテノ間ニ此時ヲ避ヘシ治方白朮ノ類遠ニ外カラヒヤスハ甚不可し霍乱ト云モ此暑邪ニ感シテ食ル傷ヲ兼揮（フルウ）テ霍撩（レウ）乱スルナリ病名トスヘカラス食滞ニ多キ事し

中湿

卑湿経絡ニ伏蔵シテ不去故ニニ病ヲ発ス風寒ト違テ當テモ當分知レス久シクシテ発ルし當分ハ湿散シヤスシ天民ノ内外ヲ分ルハ不可し湿ハ皆外感し治方五苓散内外一身ノ気ヲ疎通スル故ニ小便ヨリ湿疎通スルし

○瘧痢

発其因同寒湿ナリ始寒湿経絡ニアタリ居テサテ風カ入来ルヨリ瘧トナル瘧ハ邪表ヘ発ス風寒湿三気シカラシムルモノ痢ハ寒湿腸胃ニアタルナリ夏日伏陰内ニ在陽気表ヘ浮出時人コトニ冷物ヲ好テ食ス故ニ裏虚ス暑冷ニナル此時夏日湿人ニアタリヤスク又ヨク腸胃ニ容タリ瘧ハ風ヲ兼ル故其状寒熱往来頭痛等ノ表ニ症ヲナス痢ハ唯寒湿ノミ故ニ表ヘ不発シテ裏ヲ傷ルナリ其故ハ裏面ノ腸胃ニ寒湿アタリテ其所ノ血是カタメニ凝結スルカユヘニ裏面鬱塞ス又ヨク悪物ナトヲ食ヘハ其物ヲ傷ル故ニ其裏面タヽレテクルナリ譬ハ焼傷テ膚爛レタルト同シ始ハ只黄汁出即ナメナリ是気分ニ属ス津液化シテナメニナルし血分ヘ入ルト血下ル此毒気ノ深キモノし毒気深キモノハ膿ヲナス間ナク只血ハカリ下ルモアリ血ハカリ下ルニハ軽キ症アリ見分ツヘシサテ胃実スル処ノ火熾ニシテカミヘ升ントシ気ハ下ヘナカセントシ相戦テ急迫裏急後重ヲナス之是陰実痛し故ニ虚人ヤム事ナシ只強人ヨク病虚人ハ[illegible]タトヒ寒湿ヲ受ルトイヘトモ其侭瀉下シテ裏ニタモツテ居ル事ナシ強人ハ邪ヲ受ルカラシツトタモツテ居ル之痢ノ腹痛甚シキモ毒気密ナル故し今痢ニテ下ル血トモ臓ヘカヽルコトナラハ命甚危カラン腸胃ノ凝結ナル故命ニ害ナシ白ヲ寒トシ赤ヲ熱トシ又腸胃ノ湿熱トスル類後生ノ誤ナリ瘧ハ毎日発シ或間日或三日或五日至ルモノ其熱ル処ニヨリカタし素問瘧論其説詳ナリトイヘトモ難解此ハ闕テ可し古ハ瘧ヲ大病トシタリト見ユ故ニ字瘧ニシタカウ然ルニ今ノ瘧ハ少ノ呪法ナトニテ治スルモノ多ケレハ大病トハナリカタシ瘧ハ外ニテ其邪ヌケヤスク痢ハ裏面タヽレクル故ムツカシヽサテ瘧痢半年或モ一年モ不愈ハ毒気ノ凝ニアラスクセツキタルナリ又経絡腸胃瘧利ノクセツキテ毎年ヲコルモノアリ治方利ノ始ニハ朴角疎通解毒ノ剤ヲ急ニ用ヘシ大小承或ハ気剤加又蒼朮ノ類軽重ニシタカイ擇用ヘシ茯朮ナトハ不可し熱ルトキハ気剤中ノ荊芥ハ用ヲリモクルシカラスサレトモ急ニ疎通セント思ハヽ茯苓不可しトカク痢

三ノ死スルハ始誤ル故ナリ腹痛甚シキハ毒気甚シケレハナリ小承気ヲ与フヘシ初メ熱ツヨキハ黄連解毒湯或葛根黄連黄芩湯用ヘキナリ冷ルハ濕ムヘシ腰眼天枢十一十四ニ灸スヘシ脣白哀虚セハ獨人湯ヲ見合用ヘシ初発ニテモ不食或ハ労倦セハ獨人湯又ハ合用ヘシ凡承気ヲ用ルハ初二三日ノ内熱毒甚シキ時ナリ十日モ過テハ承気ハ用マシキナリ理中ヲ用ルモアルヘキ也気剤ニ木香芍薬ヲ加ヘ用カヨキ也又脣白舌カタク或ハ再発スルナトニハ順気或理中加木香肉豆蔲等ノ類ヲ上ニ用ヘシ禁口痢ハ此毒気甚シキモノナリ利毒傷ノミヲ傷テヨレ公レヲナサス上冒ヘ毒気薫蒸スルトコレヲナス故ニ速ニ承気ノ類ヲ以テ其トクヲゲスヘシ後ニナリテノ熱毒内ヲ攻腹ヨハクナリテカラハ獨人ヲ用ルナリ休息痢ハ多ク積気ニ属ス腹張スルモノ多シ是ニハ気剤又然相ヲ兼用ヘシ利ノ久シキニ建中湯不可シ脾気衰ル故ナリ理中湯ヨロシ扨鼻息タカキ痢ハ死スト素問ノ腸澼ハ痢ニ似テ異ハナリ其畜積ハ同ケレトモ疫ニモヨラスシテ自ラ下ル故ニ裏急後重ナシ此熱毒ナキ故ナリ傷冒ニ畜積スルモノ十九ヲ以傷澼ノ名アリ

○傷食

此証多ハ思慮労役シテノ上ニ集不和積気壅塞スル故飲食完化スル事アタハス故ニ思ヒヨラサルモノニモコレアルナリ腹痛吐瀉甚シキ時ハ四肢厥冷人事ヲシラス又ハ毒化セス腸中ニ停滞シテ吐瀉ナク四肢厥冷スルモアリサテ吐瀉シテノ後トイヘトモ脉ノ上ツタ〳〵ト来ルハ食毒ノ未タ中集ニ滞ルトシルヘシ毒気ヲ吐瀉シ尽ミスト脉スヽミ発出ルモノ之治方木香藿香益智子リ出シ用熊胆黒丸子吐瀉ノ後四肢逆冷スルニハ四逆参附ノ類ヘテモ用ユ

泄瀉

此水穀分利セサレハナリ故ニ煎湯ハ瀉ヲコスキニアリ散薬ヲ用ルカヨキ也瀉ニ疝気下リ多シ疝積ニテノ下集フサカル故瀉スル之コレハ久シク瀉シテモアマリ気ツカイノナキ也扨瀉ニヨリテ寒瀉多熱瀉コレ也暑月ノ瀉ナト多ハ暑瀉ナリ腸胃ノ陽気不須ニシテ食物ヲ消化スルコトナリカタキ故瀉スルヘ水腫モトモニ暑瀉ナリ今ノ食滞ナトニテノ邪熱熾ニシテ吐瀉スルアリ又吐ナクシテノ瀉ノミアルコレハ熱瀉ナリ五更瀉ハ脾腎瀉ニテ瀉ニ心ヲツクヘシ虚損ノ症ニアルコト陽気乏シク故ニ陰分ニハ瀉セス陽分ニ入テノ下集陰ニ動シテ五更ニ瀉スル又疝積ノ瀉ニモ脾腎瀉ニ似タルアリ治中散ノ類灸十一ヨリ十四ニテノ脾胃虚ノ久瀉ニハ水鳥アレヽ鶏告天子ノ類ヨロシ

○嘔吐噦　反胃

声アッテハクヲ嘔トシ声ナクシテバハリヲ吐ト云虫ユヘ嘔吐ヲナスモノアリ

食気ハヲ閉テ悪シレキナト多ハ食滞ナリ又虫ニテモ然リ常ニ好テ食スルモノモ餓ニ食スルコヲ得サル是虫之甚キノ呕吐積気ナリ又傷寒モノ呕吐アリスヘテ中集ノ病ナリ或ハ痰飲胸膈ニ滞リテ此ヲナスモノアリ中集ノ鬱スルヨリ食胃膈ニ滞ルナリ治方気剤生姜半夏生姜ハ呕家ノ聖薬ナリ虫ニテノ吐スルニハ妻田ノ類モ功ヲナシカタシステヲイテサシツマリテ薬ヲ用ヘシ噦ハ積気ユヘ胃口ノ気不須中集鬱結スレハナリ胃口有寒ト古来云ルハ未詳ナリ

○

噎嗝反胃

此三症ハ同病ナリ其食ヲ拒糺（キヨコセク）ニヨツテノ三名アリ噎ハ食物咽ニテノ下ツテノ下ラス又ハ嗝ハ胸膈ニテハ下レトモソレヨリ下ヘヨリカタシ反胃ハ胃口マテ至レトモ胃ノ二腑ヘヲサマリカタキシ或ハ其マヽ吐シ又ハ且ニ食シテ夕ヘニ吐ス三症トモ脾胃胃管ノ涸ナリコハリスホマル故ナリ凡老人此病アルハ天年無病之壮年ノ人又中年ノ人此病アルハ積気アツテ胃口ヲ押ユヘニ食ヲウケス涸又ケテ此病ナト有之故ニ老人ニ反胃ナシ唯噎嗝ナリ壮人ハ多ハ反胃之サレトモイチカイニ見ルヘカラス夫人年老ハ形衰皮枯燥ス是津液枯尽シ身中之涸ナクナリシ故シカリ食道胃管モ其如クニ涸カハキサラノコハリスホリ自ラ食入カタクツマルナリ是噎嗝ナリ反胃ハ積気ツキアクル故シカリ是モ胃口ノ涸ナクノシテシカルモアリ先ハ積気ナリ嗝噎モ又積気アツテシカラシムル之凡

老人胃管スホマル故ニ壮年ヨリハ食減ス譬ハ草袋ノ水ニ漬リ或ハ大ニ集レテノコハハルカ如シ故ニコレニ至ラサル始ニ滋補スヘシ故胃ノ気衰ルカ故ナリ此ヲ以老人ノ己ニ病ハ皆不治ナリ壮年ノ者ニ病ハ涸生シヤスキ故保養ヲヨクセハ治スルナリ治方灸治噎嗝ハ三五七反胃ハ九ナヨリ十六ニ至ル此症ナカく薬剤ノ及処ニアラス心気ノ保養ヲ第一トシ灸治ト餌治ヲ専トシ酒ヲ用イテノ気血ヲ須シ津液生スル様ニスヘシ往歳上加茂社家某七十二ニシテ嗝ヲ患フ然ルニ保養ヲヨクシテ平愈ヲ得九十八歳ニテ終リ又コレハ世事ヲステテカマハス心ヲ小児ノ如クシサテ灸ヲシタトキ灸トカンアルモイトハス灸シ餌食ヲ常ニタヤサス酒ヲサレツく用イ此ノ如クシテイツトナク快復シ二十年ノ後天寿ヲ終レタリ嗝ノ治方コレニ過ルコナシ喉嗶タヒくアルモノ此二症ヲ病フアリイカニトナレハ気屈スレハ喉痺シテ血ヘル故涸又ケルモノナレハナリサテ嗝症鼓脹其因積気ハ同シテ腹力サノセンくニハリ出シクルハ鼓トナリヘリテクルハ嗝トナルナリ二症トモ皆涸ナクナルユヘナリ一腫虫ヨリ噎嗝サスルアリ虫生シテ涸ヲハム故ニ一身ノ涸ナクナリテ皆コレヲ病シ

鼓脹 附 虫脹

手足痩腹脹ノ状鼓ノ中空虚ナルカ如シ故ニ此名アリノコシ積気ツヨク

中集ノメクリヲ阻隔シ元陽ノ養ウスクナリテ脹コレ気張ナリ腹中ノ気ニ妄行スレハナリ最治シカタシ此症煩渇引飲食スル者ハ此中集閉塞ノ気メクラス故胸膈乾燥シテ然リ其脉沈或手易ナルモアリ微細數ハ死遠カラス虫張此レ異ナリ其因多ハ血塊ナリコレハ婦人ノミアルモノ之虫血ハトクリナリ外堅シテ内空虚ナリ然ニ比シテ名ツクルナリ婦人姙娠セサルモノ此ヲ患ルヿ多シ然ハ鼓ノ如ク手足ハヤセルモノ之灸九ヨリ十六ニイタル

水腫

此一身腫ナリコレモ元積気ニヨリテ不須ニナリ分リアシク水道遊溢シテシカリ水穀分利セスシテ腹指四支ヘ水気アフレ然ニヨリテ津液トモニ水気ニ化セラレ同水気トナル故其腫勢甚シキモノナリ其腫ハ水穀鼓張ト別ナリ然亦脉沈ナリ微細數ハ死不遠此症陰茎陰門ノ腫ヲ見テ十分ノ腫ヲ知ヘシ膈青筋アラハルハ水気ニテ底ニアル節ヲオシ出ス之鼓モ亦然リサテ指頭ニテ按シ指ヲアクルト陥ミ忽起ルハヨシ起サルハアシ是甚シテ気カイナキユヘナリ鼓ト同シク煩渇引飲スルモノハ中集閉塞シテ胸膈乾燥スレハナリ治方茯苓、沈香附子名牛灯心一束鯉魚温泉或硫黄湯熊胆ヨロシ温泉ハ経ヲ温メ陽気ヲメクラス故ニ汗出ルニシタカイ水気ヌケル之

温泉用イカタキニハ硫黄湯又ハ只湯ニテモ溶（ヨリ）スヘシ浴湯後衣ノ類又ハ綿ニテモヨク〱ヲヽイ汗出ルヤウニスルカヨシ浮腫ツヨクハタヽシくニ浴湯ニテ汗出く皮膚水気ノヌケルニシタカイ元気ヲ固ムルヤウニスヘシ如此スレハイツトナク陽気ト成テ水気出ルナリ長病面部ノ腫ニハカニヒクハ陽気下陥スル之心ヲ用イ推察スヘシ

黄疸

其因水腫ニ同シ水腫ヲ病サレハ黄疸ヲ発ス黄ハセサレハ水疸互ニ病ナリコレモ積気ノアルユヘニ内ノメクリハルクナリ或寒湿アタリ其閉塞ノ気ニニテノ背スルニヨリ熱ス故ニ其寒湿ヲムシテノ黄ヲ発スルトハ麹窖ノ外ハ冷テ内ハ熱ヲモツテ麹ヲムスカ如シ外ハ寒シ内ハ熱スルヨリハシテ黄ヲ発スルナリ此症内ヲ蒸熱ヿ甚シテ脾胃コレカタメニソコナフテヨク穀ヲ消スルヿアタハス消シテモ養ノタメニハナラス故ニ大ハ病後或ハ老人ノ疸ハ皆難治ナリサテ腫カクルト黄ハ自ラ病モノナリ故ニコレハ軽キモノトス女労疸ハ房事過度シテナル脾胃ノ後多黄ヲ発スルナリ菜色ナルハムツカシヽハツキリト黄ハミタルハクルシカラス治方茵蔯五苓或気剤藿香白大腹ノ類ヲ加ヘ餌食鰻鱺鰌鯉鯽俗ハ蜆ヲ用ユ

爛之

消渇
中集渇ヲ俗ニカハキノ病ト云下集渇ヲ消渇気ト云

胃火ノ瀾レタルユヘ三ニ然ラシムルシユカ合ニ三集ニ分ツ無ニ一症見レハ三症通シテアル之中集渇スレハ上集モカハクシ胃火ニテ売気消スル故飲食スルヿ寻常ナラス食物肌膚トナラスシテセシクシニ痩カクルナリ又小便ノ通ルヿ飲食ノ十倍モアルヿトシ此ノ如クナルハ死ニ近キシ俗ニ小濁浩スルヲ消渇ト云コレハ白渇或淋症ニアルヿシ治方白虎加麦門冬ヲ栝蔞或天花葛根ノ類クヅモチモヨロシ美味不宜ラ

虚損花動

虚損労損ハ火動ヘ虚換スルユヘ虚火忘動スルナリ中古以来火動ヲ論スルハ只ハ昼日中ノ陰水虚相火元ユ症ノミヲ云是一際ナルコトナリ鬼ト角積気腹内ニ鬱結シ営衛ノ運行フシクナリ肉ノ潤乾クト火カ元ルナリ諸病ノ後多ク火動トナル是四十後ノ人多ニ病ナリ元ニ従ノ火元ルハ怒ノ火皆元ル火動ハ一身中ノ火悉元シ飲食不節ニテ傷レルハ脾ノ従ノ火元ルナリ房事ニ度直腎陰カルト胃ノ火元ル思慮ヲコラシ腎胸ノ気甚シケレハ発陽ノ気屈撓シテ肝ノ火元ル風寒ノ邪ニヨツテ欬嗽スレハ肺葉ヲアラチテ肺火ヲ元スル火ノ元ルハ説アリシハラク是ヲオク症病ノ后諸臓労スルニヨリ悉ク火動ニナルト云サテ此症発熱悪寒スルモアリ病候労ニ似タリ分ツヘシ是モ皆積気ユヘ本源陽気ノメクリ悪クナリヲル故ニ諸臓トモニ労レヤスシ此症世間ニ多シ欬スルモアリ欬セサルモアリ只ハ労ト異ナル処ハ脈ニアルノミ此症ノ脈ユラクトシテ根ナシ又根アルモアリ陽気之ク熱アル外ノ脈数ナリ最難治ナリ

労瘵
瘵ハ祭之死シテ祭ラルヽノ儀乎

此腹中ニ虫アリ水穀精微ノ気ヲ発シ津液ヘヅクラシカタク腎火自生シ骨蒸ヲナスナリ此虫腸胃ノ間ノミヘ生スルニハアラス気血凝結シテナル処ノ虫ナリ此虚労ヨリ生スルトノミ云ヘカラス実人ニテモ是虫ヲ生スルト此ニ病ニナル三十ニテノ内ニ多アリ虚シテ心腎ヲ労傷シテナルト云ソレナラハ老テハマスヘクコレヲニ病ヘキニ左ニアラス只虫ヨリ生スルト云フヲ知ヘシ又傳ムル病アリ コレモトヨリ虫アツテノナスモノヘシ兄ニ病テ死スレハ弟病テ死アヲ傳フノ或シ又十四五ヨリ内労ヲヤムモノアリ然レトモ真元ノ水ヘラス故ニイヘルヿアリ此ヲ疳労ト云此ラハ小児ノ氐疳ノ虫ヲルヲナラサスシテ内ニ伏蔵シテ漸コレヲイタスシ労ト云ハ和語之今テ時人三十ヨリ内ニ病ヲ労欬ト云咳ナケレハ労ニ症ト云右ハ虚労ト云リ欬労ヲ風邪ニヨリテナスニアラス其始ハ風寒ニヨリナスモ又外ノ事ニテナルモ肺気労シテノ欬スルエハ此名アリ労ニアル処ノ此異ハ

脊之

四十後ノ火動ト云ニハナシ蒸ハムスノ義ニ陽気盛ナルモノ表気ヌクラサルユヘ陽気鬱スル〻フタハス鬱結シテ熱内ニムセテ骨蒸ヲナス之譬言ハ大寒ニ井水湯ケタツカ如シ然ルニヨリテ蒸ノ字此症ノ眼目ナリコレムシタル気ノモノ虚火ナリ身ノ養ニナル陽気ニアラス壮火食気ト云ルモノ此類ナリ房事ヲ過シ真陰枯テ発者多ク論ナリ其脈微細数ナリ凡此症ヲ病ト云モ蓋本原積気内ニアルユヘ諸疫諸癥ノクハイアレケレハナリ年齢ヲ以テ火動労症ヲ病モノモアリ口ハ脈ノ微数ト浮数ナルトニテ名ヲ分ツナリ今時ノ労欬ト云ハ欬ト嗽ハ多ハ傷寒ニ瘧ニ痢ノ後或ハカリソメノ風邪ニ暫ク感シ咳嗽ヲ発シ内外乾燥シ終ニ此症ヲナス病因異ナルヤウナレトモ骨蒸スル気同シキ故ニ後ニハ虫ヲモ生シ以前ニ論セシ症ニ変スルナリ治方火動労ニ病ニモ気数一方壮熊但餌食平生ノ治ニテハ回生ヲナシカタク太陽ノ火気ヲ以真陽ヲタスクルナリ三ニ症當生ノ通患之

方的

三黄石膏湯　治陽毒発班如塗丹者

蓮　栢　芩　梔　广　膏　姜

茶　（右八味水煎服）

加減瀉白散　治咳嗽喘急胸満脇痛気促過熱者

桑　桔　瓜　升　蔞　杏　味

杏　耳　姜　（右水煎温服）

橘皮紫蘇湯　治痰咳喘急身熱汗出悪風者

橘　桔　田　桑　貝　味　紫

杏　耳　（右九味水煎服）

苓杏五味橘桔耳湯　治喘咳而咽痛者

茯　杏　橘　味　桔　耳

芍薬湯　治所謂痢疾者
餘　文　連　國　蜜　浙　枳
鬚　（右八味水煎溫服）
胃苓湯　治腸胃不和腹痛泄瀉水穀不化者
朮　朴　橘　茯　猪　瀉　芍
國　桂　姜　棗　（右十一味水煎服）
錢氏白朮散　吐瀉発熱咽乾口渇
蓡　朮　苓　葛　霍　香　耳
（右七味水煎）
加減涼膈湯　治口舌裂瘡
連　芩　梔　桔　翹　薄　浙
大　耳　右十一味

忍　芩　芎　通　黄　耳
乾熟地黄湯　治産後崩中頭目旋暈神思昏迷四
肢煩乱不知人事
浙　芎　膠　艾　朮　参　耳
姜　乾熟地　蓍　茯竜肝　赤石
利膈湯　治咽候瘡
荷　荊　防　牛房　桔　耳　白蚕
荊芥湯　治咽喉痛
荊　桔　耳
當帰飲　治瘡疥風癬濕毒
浙　芎　芍　地　防　白蒺　荊

荊　何首烏　著　耳

水腫方

赤小豆湯　治水腫小便不利旁瘡内攻

豆（三戋）陸（二戋）圭（五分）

赤子湯　治諸腫物膿出旁上膿

赤葉（カイハ）　忍　木通　各分ホ

治諸悪瘡方

苓　芍　忍　升　將　芪　蠦

紫根　耳

小林解毒湯

沂　羌　耳　忍　軍

獨歩湯　治虚労骨蒸

天石（三戋）（右一味以水二盞煮取一盞）

洗肝明目湯　治一切風熱赤腫疼痛

沂　芎　餘　芐　蓮　苓　梔

恙　翹　防　荊　荷　羗　蔓

菊　桔　蕤　決　耳　（右十九味以水煎服加減）

（痛不可忍者加川烏有翳障者加木賊倍蕤蔾去芍風熱肝火甚者加膽中柴胡去大便秘実者加大黄）

滋腎明目湯　治労神血少眼痛昏暗

沂　芎　芐　芍　桔　蔓　梔

連　芷　蔓　菊　耳　茶　（右十三味）

（熱甚加竜膽柴胡風熱高腫翹黄芩）

保肝散　治内障

梔　芷　沂　芎　枸　朮　恙

庚　荷　柴　藁　石　賊　翹

細　桔　防　荊　丹　朮

四明飲　治外障及一切眼目腫痛翳

大黄　葛花　澤瀉　石決

祛風清熱湯　治暴発眼腫如羔赤眼痛渋

沂　芍　芎　苄　芩　連　梔

翹　荷　防　荊　羌　桔　桔

枳　芷　丹　（右水煎腫痛甚加黄芒風熱蔓荊牛房子烏珠痛加天广）

補中益気湯　治目睛兩目緊渋不能視

四物龍胆湯　治目赤暴発雲翳疼痛不可忍

沂　芎　芍　苄　防　胆　防之

（右七味水煎）

犀角散　治脾胃受風食毒從下瞼生黄膜上衝黒睛痛澀難開

角　芩　輸　羌　麦門　白附　（右六味水煎）

白姜蠶湯　治肺虚遇風冷涙出冬月尤甚或傷風熱白睛遮霞黒腫堅腫痛痒

桑　賊　旋覆　蠶　荊　粉艸

細　（右七味水煎服）

蔓荊湯　治風熱黒水内横深瑕盤青色痛甚

蔓

洗眼散　治風毒上攻暴赤腫痛隠渋眵涙

荷　沂　羌　丹　將　芸　丹

芎

補陽湯　治陰盛陽虚九竅不通青白翳見大眥

紫（羊一戔）羌 舌 参 芐（熟）伽 著（各五

分）澤 橘 芎 芍（各三分）芐（生）茯 知

沂 主

地黄湯 治眼久昏澁

芐 沂 蔓 茯 連 苓 芎

羌 舌

聰明湯 治内障耳鳴

蒼 蔓 周 葛（各三分）芍 栢（各一分）蔓（二分）

養心明目湯 治両眼昏火流涙翳膜遮睛

沂 地（一戔）芎（七分）藁（六分）芎 芍 荊

知 節（五分）苓 翹（四分）羌 丹（翳膜加賊）

清上明目湯 治一切邅痛風熱疾

沂 芎 地 黄 栢

翹 桔 薄 芎 荊 羌 芷

菊 決 賊 舌

明目地黄丸 生精粮血退翳膜除羞澁多涙並治

赤热眼袪风明目

生地 熟地 知 藁（各二分）兎絲 獨 枸杞

牛 蒺莉

退雲散 治翳朦瞳子

沂 地 菊 賊 谷精艸 羌 石

決（燒）将 蔓 芷 栢 翹 旦屮

蝉退

治眼目暗昏方 六味地黄加菊沂枸杞佳也

大明散　一切暴発赤眼白日羞隠渋難角熱涙長

流腫痛不可忍者或生障翳拳睛胬肉内障昏朦不

向新久

沂　芎　芍　地　連　芩　栢

丹　翹　薄　芸　荊　節　蔓

牛（方）　紫　羗　耳（加黄佳也有翳障加賊木蒺藜子佳也）

明目流気飲　治风熱上攻眼目不明常見黒花多

涙難角

將　牛（炒）　芎　菊　白蒺　細　防

风　瘆　芩　梔　耳　蔓荊　賊

（各一銭）　草決（一銭五分）　蒼（二銭）

復明散　治内

橘　芎藭（兩）　青　生（地）　熟　紫（分）

蓍（一分）　帰（二分）

撥雲退翳丸　治内外障膜遮睛昏暗者大効

実　栝　耳　蔓　芎　草決（各五分）　芎

賊　蜜蒙花　荊　地骨　菊　白蒺　羗（一兩）

蛇蛻　蝉蛻　連（三分）　栟　帰（一兩半）　右蜜円

當帰竜胆湯　治眼中白翳

石　風（二分）　柴　羗　味　周（各三分）　耳

連　蓉　芩　栢　沂　芍（七分半）

醫事説約　　家方四劑

須氣劑

茯（大）田（中）枳（中）朴（中）甘（廿）姜（中）石以水二合煮取壹合分温二服不堪多服者三四服以茯苓半夏湯為立方之主吾門以須氣為治療第一義須氣者承氣也蓋取於仲景承氣湯意也苟能識得此方臨機應変以活用之則處劑治病可運掌上矣（下有加減刪之）

解毒劑

茯　通　丞（大）芎　黄（中）甘（少）

右以水二合煮取一合分温二服勝菓気者
當頓服内土茯五戔則以水四合煮取二合
大小黴瘡家必用之要劑也治黴瘡便毒下
疳結毒発漏筋骨疼痛諸壊症及癬臁瘡諸
悪瘡膿淋（下百加減刪之）

敗毒劑

茯（大）羌（大）桔（中）芎（中）柴（或用升）甘（少）姜（中）
右以水二合煮取一合分温二服勝菓気者
宜頓服治痛痺風毒温疫之類一切眼疾咽
痛瘡疥癬（加減之治畧之）

潤涼劑

茯（大）景（大）芩（中）知（中）膠（中）甘（少）姜（中）
右以水二合煮取一合分温二服治吐血下
血咳血或労瘵欲用湯菓為灸助則宜用此
方消息令知金瘡産後諸失血此方非所主

傷風寒

加減桂枝湯　主風邪軽症脉浮頭痛発熱悪
風或鼻涕々有於本方加芋升橋
須気劑　冒月加薫又方兼疫或咽痛
又方・兼疫或咽痛

汗出〻多者
以下刪之焦之

桂芍手桔升甘

桂枝湯　脉緩発熱汗出悪風者咥者加手

葛根湯　項背強几〻無汗悪風者或自下利

者咥者加手（方刪之）

广黄湯　脉浮絃頭痛発熱一身骨節疼痛悪

風無汗而喘者（方畧之）

大青竜湯　脉浮緊発熱悪寒身疼汗不出而

煩躁者取微似汗「汗出多者温彩撲之理論

温彩方朮止蒿芎以上四味分為細末一両

米粉三両不入蒿亦可也又牡蛎一味撲之

亦可也

小青竜湯　表不解心下有水気乾咥発熱而

咳或利或噎或小便不利少腹満或喘者莇

（加減刪之）

厚朴生姜半夏甘艸人参湯　発汗後発熱腹

脹満者

茯苓四逆湯　発汗若下之病仍不解煩躁者

加減益気剤　発汗後二三日脉芤面赤悪熱

或下利二三行舌上有胎或無苔不欲飲食

口好熱物重者不蘇而有譫言妄語眼目亦

如此症加附信蘐腹滿者公茋近歳時疫多
有此症汗吐下無功柴胡白虎亦不能解热
童者七八日驚不甚者荏苒引日終至于死
束手受敗而已播州同志試用此方得功云
不顧他症頻与數十貼稍知。十四五日予亦
試用向得功故記備後考

五苓散 発汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠
欲得飲者少々与飲之令胃氣和則愈若脉
浮小便不利微热消渴者

茯苓甘艸湯 汗出渴者五苓主之不渴者此
湯主之

猪苓湯 汗出多而渴者不可與脉浮発熱渴
欲飲水小便不利者

梔子豉湯 発汗吐下後虚煩不得眠若劇者
必反覆顛倒心中懊憹或煩熱胸中窒者

小柴胡湯 傷寒中風五六日往來寒熱胸脇
苦滿默々不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而
不嘔或渴或腹中痛或中胸下痞鞕。心下悸
小便不利或不渴身有微热或咳者凡用柴
胡湯但見一證便是不必悉具（加減法刪之）

故

大柴胡湯 十餘日二三下之後四五日柴胡症仍在者先與小柴胡嘔不止心下急鬱々微煩者與大柴胡下之則愈

小建中湯 援中急痛者心中悸而煩者嘔家雖用以詞詞也

桃核承氣湯 熱結膀胱其人如狂血自下者愈其外不解者尚未可攻當先解外表解已但少腹急結者乃可攻之

抵當丸（若湯） 傷寒六七日表症仍在脉微而沈反不結胸其人發狂者以熱有下集少腹當鞕滿小便自利者下血則愈所以然者惡瘀熱在裡故也〇喜忘者必有畜血所然者本有久瘀血故令喜忘屎雖鞕大便反易其色必黒身黄脉沈結少腹鞕小便不利者爲無血也小便自利其人如狂者血症諦也

大陥胸湯 脉遲膈内拒痛胃中虚客気動胸膈短気燥煩心中懊憹陽気内陥心下因鞕則爲結胸傷寒六七日結胸熱内実脉沈而緊心下按之石鞕者結胸無大熱者此爲水結在胸脇也但頭微汗出者重発汗而復下

下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所少有潮熱從心下至少腹鞕滿而痛不可近者脉浮大者不可下

十棗湯　下利嘔逆表解者乃可攻之其人漐漐汗出發作有時頭痛心下痞鞕滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也

大黃々連瀉心湯　心下痞按之濡脉浮者

生姜瀉心湯　傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞕乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者

附子瀉心湯　心下痞汗出惡寒者

甘草瀉心湯　下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞕而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞕

赤石脂禹餘糧湯　傷寒服湯藥下利不止心下痞鞕服瀉心湯已復以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚理中者理中焦此利在下焦此湯主之若無禹余糧則以土器代

代之

白虎湯　傷寒脉浮滑表裏有熱舌上乾燥讝語渴欲飲水者傷寒表裏俱熱時々悪風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者

小承氣湯　以汗多津液外出胃中燥大便必鞕々則讝語此湯主之若一服讝語止更復服讝語発潮熱脉滑而疾者與之若腹中轉疾氣者更與之明日不大便脉反微澁者裏虛也為難治不可更與也

大承氣湯　傷寒発汗若下若利小便亡津液胃中乾燥不更衣内実大便難者。脉遅雖汗出不悪寒者其身必重短気腹満而喘有潮熱者手足濈然汗出者此大便必鞕也。傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日日晡所発潮熱不悪寒獨語如見鬼状若劇者発則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視脉弦者生濇者死微者但発熱讝語者心下懊憹而煩少腹有燥屎者可攻之腹微満初頭鞕後必溏不可攻之不大便五六日繞臍痛煩燥発作有時者此有燥屎也

（似飴狀下投水中以硬為度百七字）

調胃承氣湯　発汗後胃中不和讝語者不吐不下心煩者傷寒吐後腹脹滿者

蜜煎導　小便自利欲大便者雖鞕不可攻此方導之

麻仁丸　大便秘結

茵陳蒿湯　頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴引水漿者此為瘀熱在裏身必発黄○傷寒七八日身黄如橘子色小便不利腹微滿

梔子蘗皮湯　傷寒身黄発熱者

附子湯　少陰病脉微細但欲寝者口中和背悪寒者身体痛手足冷骨節痛脉沉者

真武湯　少陰病二三日不止至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此為有水気其人或欬或小便利或下利或嘔者

白通湯　少陰病下利脉微者

半夏散　少陰病咽中痛者

四逆湯　脉浮而遅表熱裏寒下利清穀者手足厥脉或微欲絶身反不悪寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脉不出者

蓡姜湯　元氣頗虛脱者

理中湯　調胃虛理中集下利清穀難止大病差後喜唾久不了〻者宜理中丸或加附

竹葉石膏湯　傷寒解後虛羸少気〻逆欲吐吐者

瓜蔕散　病如桂枝症頭不痛項不強寸脉微浮胸中痞鞕気上衝咽喉不得息者此為有胸寒也當吐之

○瘟疫附蝦蟆瘟大頭瘟

排毒劑　頭大腫如瓜瓠乃面或腮頤曰大頭瘟咽喉腫痛失音頸筋張大者俗云蝦蟆瘟遍身紅腫發塊如瘤或頭上成磊塊者云疙瘩瘟又所称瓜瘟胸脇高起者所稀有也前症皆便時行之気然有此症則峯家傳染故屬瘟疫以下四劑宜擇用之不久升何則以主疫也或蓡防

白虎湯　熱壯而渴者或咽喉腫痛飲食難下者加桔

小柴胡湯

録驗續命湯

甘桔湯　咽喉腫痛者腫塞水漿不呵下者加鹽
亂霜
○中寒
一方随症可擇用之
蓡　朮　桂　附　椿　姜
附子理中湯　冬月中嚴寒身疼痛洒々悪寒
翕々発热面赤或有汗則口禁失音四肢強
直泄利或清穀者
四逆湯　衝突道途一時為寒気所中昏不知
人口禁失音四肢強直厥冷者自利而不渇
小建中湯　四肢拏急腹痛
蓡附湯　元氣脱四肢厥冷脉微者
灸天枢　中脘　三里　三陰交
○中暑
人参白虎湯　暍症身热煩渇口燥舌上有胎
者甚則昏不知人手足厥冷者
五苓散　小便不利而渇者
一方　中暍热軽症
果　知　升　茯　芎　甘
又方　暍症手足热身体倦怠頭重小便赤而

頻數者
升　甘　茯　薷　朴　橘　六味
熨方　急症卒倒者
以熱湯加塩酒浸帛熨臍上益湯則以小便
代之
○中濕
五苓散　四肢腫而渇小便不利者
排毒剤　風濕兼中発熱身躰重牽掣痛者
一方　卧卑濕之地新造之宅或遠行侵雨涉
水山沢蒸氣所中傷腰痛身重小便澁四肢
倦怠者方
伏　朮　附　桂　芍　茸　或升
○手痺
排毒剤　或加己罕桂初発如風邪悪寒発熱
頭痛遍身骨節走注疼痛俗所謂痛風也又
痛甚歷節疼痛如虎咬狀故名曰白虎節風
是也
排毒剤　或加牽桂痛甚加將熱解後歷節疼
痛不止痛処為腫小便不利者
録驗續命湯　初発痛甚則宜用此湯発汗

桂广各半湯　雖汗者擇用

黄耆建中湯　治風毒

神祐丸（及）散　前症痛甚者兼用之佳也

牽牛丸　頭末一味糊丸

一方　通（大）芎　獨　忍　亏　桂（中）將　硝
甘（少）

溫泉　但馬城崎新湯治癘疾手足拘攣及霍
膝風

硫黄湯　風毒腫痛瘡須浴此湯

蒸方

槐花或酒糟或紅花蒸熱湯裹綿布溫痛処
汗出為度日々数遍用此法以知為期

○瘧

桂枝加升广湯　瘧初發惡寒發熱頭痛狀如
傷風寒疑似難分先用此方

須氣劑　加桂柴芎苓　瘧疾不論虛實輕重
有汗無汗脉自弦與此湯以下二方隨症擇
用不可用早截某期邪氣稍減可行灸或截
薬也

柴桂湯

蕧姜湯　老人瘧疾元気脫宿癥発動口失五味飲食雖下諸薬不効虛羸者蕧姜各一戔水煎発日五更連進

白朮湯　甚熱而渇欲飲水者

截瘧湯　常山一味水煎発日早天頓服

一方　檳　知　常

又方　朴　梹目　用花椒亦可也

灸　五六発後自九至十六及章門瘧久不愈及有瘧癥者無如灸労瘵脹満之類大病中有瘧疾多得萬一之幸

及下可有至字

○痢疾

須氣剤　痢初発〇（大便）一二行瀉下後亦腸垢臍下疼痛裏急後重身涼脉緩者加芍稍重加將谷伏手呕者加倍半姜呕家聖薬也三日五日後芍薬連木梹之類随症加減

大承気湯　臍下疼痛及小腹若中脘鳩尾痛者是劇症也二三日元気未虛時宜用大承気湯疏滌四五日後加減治之

小承氣湯

小柴胡湯　加芍枳朴

大柴胡湯　初発熱甚時亘大小柴胡度痢加
升广桂
黄連解毒湯
大黄黄連黄芩湯
半夏瀉心湯　以上三方有熱似協熱痢者或
有毒難疏滌者小児最宜選用
建中湯　形氣衰弱腹痛二三日手足冷者老
人難（用）劇剤者加附子
理中湯　或加桂去参亦可也或加附肉豆又
加茯苓痢久腹痛裡急後重微者主之

香連丸方
木（中）連（大）或
加茱（小）

建理湯　或加茯苓或加木
主　芍　柴　令　蔓　术　付　姜
五苓散　口乾咽燥小水難分利者
参姜湯　以煎汁送下黒丸子或香連丸
治急痢頻虚禁口乾呕者或用熊胆亦可也
一方　茯　苓　姜　木　藿　或加桂
又方　茯　苓・枳　朴　姜
生鯽魚鱠　形氣壮実能食者初発服喫之佳
牽牛九　痢初発不輕重當（子）數十九下利穢物
治中散　或加木痢無努責腹滑或休息痢

赤石脂禹餘糧湯　治腸旺脱者
灸中脘　天枢　腰眼　自土至十六初発
灸最可也素有宿癥悪菜氣者並如灸努力
甚腰力罷者兼治痢病不了々者食療○痢
後元気難復羸瘦或壊症及小児病痢皆可
食鰻鱺魚雞卵

○傷食　（附滞食）

摂湯方　傷食腹痛呑酸不吐不瀉揮霍撩亂
急以三味摂湯須吐之吐不後煎法可也
蒼木　霍

湯