九畹摘英
三因抄
青囊瑣探抄
六物新志抄
一角纂考

小兒病目
胎毒遺毒治方
儒門事親抄
漫遊雜記抄

腎間動氣辨
麻疹撮要
醫賸抄

和
医書 門
五十三 号
類
架
一 冊

F
キ−18

490.4
Kn-1
No 5091
慶應義塾大学医学情報センター
昭和47年6月28日
富士川文庫
721

妊娠辨男女法
双胎重胎説

九畹摘英

荷蘭飜譯

平野藏書

妊娠男女ヲ辨スル法　月池公譯

俺貌曾止烏巴亜歴（アンボアスミウバアレ）曰婦人妊娠ノ間神思爽朗顔色悦澤眼中神彩アリテ身体壯健ナルハ男タリ且男胎ハ女胎ヨリ熱スルカ故ニ妊婦身体微熱アリ飲食日ニ義ニ初孕テ三四月ニ至テ腹中微動ヲ覺ルヲ男トス女ハ遲レ男胎ヲ孕モノハ其腹突尖シ右半身左ニ比スレハ甚輕便ニシテ行歩起坐皆右足ヲ先ニシ起ント欲ルオ右ノ手ヲ扶トス右眼快明右ノ乳頭左ヨリ大ナリ胎動モ多ク右ニアリ其胎女胎ヨリ上ニ居ス其高サ児頭ダケナリ

或ハ曰ク男子ノ右ノ睾丸ヨリ泄トコロノ精ヲ受テ男胎ヲ生ス其故ハ右ノ睾丸ノ精ハ純熱ニシテ且壮ナレハナリ嘗テ牛ノ羊及野羊ノ畜モノヲ見ルニ其左ノ睾丸ヲ緊扎シテ交シムレハ生スル所ノ子皆牡ナリ以的証ト為スヘシ

案スルニ男子病ニヨツテ右ノ睾丸ヲ損ヒタルモノ後男ヲ生ミタル者アリ然則造化ノ妙用智術勉強ノ為ニアラサルニ似タリ又只交合ノ間常理ニ反シ或ハ偏斜倚側男女地ヲ易テ事ヲ行ヒ女人モ快暢セサレハ縦令胎ヲ成ス𪜈皆女ヲ成ス惟婦人ハ男子ノ精ヲ受テ其胎ヲ養ヒ成スノミニテ男ヲ育ヒ女ヲ生スルノ根原ハ全ク男子ノ功ヲ用ルノ専精ト然ザルトニ在ナリ

重胎説

月池公譯

婦人双胎品胎或ハ数胎ヲ孕ヿアツテ其胎ヲ受ルノ原モ亦同カラス毎胎各胞衣アル者アリ又数胎同袍ノ者アリ其毎胎胞衣アルモノハ已ニ胎ヲ成スノ後再ヒ精ヲ受テ胎ヲ成ス者也数胎同袍ナル者ハ一時精ヲ受ルノ過多ナルニ因テ成モノナリ

尼歴奴私（カレヌス）曰ク凡人已ニ飲食ヲ為シテ胃中ニ充満シ再ヒ飲食スルモ亦同胃中ニ受ケ初次ニ容納シタル食物ヨリ漸ミニ消化シテ奇縷（即飲食消化シテ乳糜ト成ル者ナリ解体新書ニ見タリ）ト成リ

分テ周身ニ散達ス子宮ノ精ヲ受ルモ亦此ノ如シ其受ル所ハ只ハ一處ニシテ匱罍ニ物ヲ受ル如ク受ヘキ程ハ十分ニ受ルナリ初ニ受タル精ハ子宮ノ一邊ニ容レ後ニ受タル精ハ又其一邊ニ納ルヽニハ非レ𪜈交媾ノ時ト精ヲ受ルノ宴トニ因テ双胎品胎或ハ數胎ヲモ為ナリ子宮ノ内ニ許多ノ精ヲ受ヘキ空處アルニ非ス獸類ハ常ニ一産數子ナレ𪜈子宮ノ内ハ只ハ一室ナルヲ以テ見ヘシ或ハ曰ク子宮ノ精ヲ受ルナリ必ス是ヲ一邊ニ貯フト此説古説ト背馳ス但子宮ノ内気ヲ含蓄スル故ニ精ノ純壮ナル者宮内ニ撞入ハ気ニ包ルヽノ愛

有ガタキコトナリ只其人壮實ニシテ男子モ甚タ心愛ノ人ニシテ婦人モ性淫ナル者ニ多シ或ハ初胎ヲ受ルノ後重テ胎ヲ受ルニ其間数日ヲ隔ルコトアリ布利尼烏私曰ク一婦妊娠九月ニシテ孿子生ス其一ハ孕テ僅ニ五月ニ至ルノ胎ナリ又云一婦双生ス一ハ其面貌其夫ニ似タリ一ハ其面首男子ニ似タリト布羅維可念志亜曰ク一婢一日ノ内其主ト其管家トニ交ル産スルニ及テ双生ス一ハ其主ニ似タリ一ハ其管家ニ似タリ羅維烏設突曰ク一婦人一子ヲ産ス三七日ノ後又一子ヲ挙ク是ニ由テコレヲ見レハ重胎ハ其産スルモ亦日ヲ隔ルコトアルナリ是其胎ヲ受ル

ヿ同時ナラズ毎胎各胞ナルカ故ナリ數胎同胞ノ者ハ一時ニ胎ヲ受ルニ因テ生ルヽヿモ同時ナリ又云重胎ハ初胎ヲ受ルノ後四十日迄ノ内ニ受ルナリ尓後ハ初受ル胎気漸ク充實スレ故ニ子宮ノ内重テ精ヲ受ヘキ地ナケレハナリ羅馬人ノ説ニ亜力山的里亜ノ婦人一産四子後四十日ニシテ再ヒ一子ヲ挙クト但婦人乳房只二ツニシテ數子ヲ生スルヿ実ニ造化ノ変測知ヘカラサルナリ凡子宮ノ口處女ト妊婦ト石女トハ細小ニシテ男子ノ陰頭ノ如シ又既ニ産シタルト胎ヲ成ヘキ期ニ遠カラサルトハ子宮ノ口開居ナリ又既ニ精ヲ受タルハ即其口緊閉シテ辨シカタク産門底ヨリ門口ニ至ルマテ洞然トシテ物ナキカ如シ然レ𪜈再ヒ精ヲ受ヘキ時カ又ハ精ヲ泄スヘキ時カ月事及瀦塞ノモノ其他水液ヲ吐ヘキ時ハ再ヒ口ヲ開クヿアルナリ

食傷

分娩後 察色 拭口 浴児 襁褓 哺乳
断臍 裹臍 剃頭 服薬
胎疾部 不乳 吐哯 鵞口 重舌（重齦 重腭）不大便
不小便 不啼 胎毒痛 臍風
撮口 臍湿 臍突 胎驚 行遅（語、歯、髪、）

癇 驚悸 癲癇 風癇 驚癇 食癇
客忤 睡中驚悸
不乳食 吐瀉 痢疾 疳疾 宿食
馬脾風 咳嗽 亀胷 亀背 解顱
髪歯 脱肛 肛痒
瘡瘍 丹毒 頭瘡 附骨（多、）痘瘡 麻疹
眼目 内障 外障 赤眼 胎毒眼 風眼

口舌

走馬疳　齲歯痛

聤耳

鼻

痘瘡

八難腎間動氣之辨

八難腎間動氣註家ノ説紛々トメ歸一ノ論ナシ腎經ノ大絡ノ動脉ヲ指シテ動氣ト云或ハ胃經ノ氣衝ノ動脉ヲ指シテ動氣ト云或臍下丹田ノ地ヲ指シテ動氣ト云フ若諸註ノ意ヲ以テ解トキハ五藏六府之本十二經脉之根呼吸之門三焦之原ナルヿ何ヲ以テカ辨ゼンヤ且衆人ノ診スルニ臍下ニ動氣アルモノ稀ナリ然トキハ何以テカ動氣絶スルモノハ死ト云ンヤ若臍下ニ動氣アルモノハ病ニ因テ動ス十六難ニイワユル動氣是ナリ夫人ノ神妙ナルモノハ男女交會シテ體ヲ生スルニアリ腎間ハ腎藏中ヲサス動ハ大極動シテ陽ヲ生スルノ動ト同ク氣ハ静ニシテ陰ヲ生スルニ同シ動ハ子ノ神ヲサス氣ハ子ノ形ヲサス

動ハ郎神ナリ氣ハ郎精ナリ三十六難三十九難ニイワユル神精
精神ト同シ然ルニ此霊妙ノヲコナハル、右腎ノ下ロナクシハ
男ハ精氣飛出スルヿアタハズ女ハ胞ヲカクルヿアタハズ
故ニ腎ノ下ロヲ尊號シテ命門ト云蓋人命ノ出入ヿコレニヨラ
ズト云ヿナキノ意ナリ其口ハ腎ニ通シテ肺ト呼吸ノ開闔
ヲナス タトヱバフイゴノコトク呼スルトキハ命門開吸スル
トキハ命門闔々テヒラカザルトキハ呼吸絶ス呼吸絶ス
ルトキハ十二經脉絶ス此五藏六府ノ本十二經脉ノ根呼吸
ノ門三焦ノ原タルヿサンゼント〆明ナリ然トキハ腎間動
氣ハコノ口ニアリテ腎藏中ノ欵ニアラズト越人深ク嘆
美セラレタリ

節才　推　公辯　出

三因極一病證方論巻之十

勞瘵治法

取勞蟲方

青桑枝　柳枝　石榴皮　桃枝
梅枝（各七莖每長四寸許）　青蒿一小握

右用二童子小便一升半葱白七莖去レ頭葉煎及二一半一
去レ滓別入二安息香阿魏各一分一再煎至二一盞一濾〆
去レ滓調二辰砂末半錢檳榔末一分麝香一字一分作
二服一調下五更初一服五更三點時一服至二巳牌
時一必取下虫色紅者可レ救青者不レ治見レ有二所レ下即
進二軟粥飯一溫煖將息不レ可レ用レ性及食二生冷毒物一合
時須レ擇二良日一不レ得レ令三猫犬孝服穢惡婦人見二上

神授散治二諸傳尸勞氣殺一レ虫方得二之於清源郡王府一

川椒（二斤揀去子并合口者炒出汗）

右爲末每服二錢空心米湯調下須臾暈悶少頃如不能禁即以酒糊爲丸如梧子大空心服三五十丸昔人嘗與病勞婦人交婦人死遂得疾遇一異人云勞氣已入臟遂與此方令急服二斤其病當去如其言服之幾盡大便出一虫狀如蛇自此遂安續有人服之獲安濟者多矣

潤神散治勞瘵増寒發熱口乾咽燥自汗痠劇煩躁

人参　黄芪　甘草（炙）　桔梗

麥門冬（各等分）

右爲末每服二錢水一盞煎七分不以時自汗入淡竹葉小麥同煎

温金散治積勞咳嗽喘悶咯痰中有血

甘草（生用）　黄芩　桑白皮　防風（去芦）

杏仁（去皮尖以五味各一兩米泔浸一宿取出控乾炒）　麥門冬（一分去心）　茯神（半兩）

右爲末每服二大錢水一盞入黄蠟一片如指大同煎至七分食後熱服

蛤蚧散治積勞久咳失音方

蛤蚧（壹對去口足温水浸去膜刮了血脉用好醋炙）　訶子（煨去核）　阿膠（炒）

熟地黄　麥門冬（去心）　細辛（去苗）　甘草（炙各半兩）

右爲末蜜丸如皂子大每服一丸含化不以拘時候服

蘓合香丸治傳屍骨蒸殗殜肺痿疰忤鬼氣心痛霍亂時氣瘴瘧等方（方見九痛門）

同九痛門主治　治傳屍骨蒸殗殜肺痿疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘴瘧赤白暴利瘀血月閉痃癖丁腫驚癇鬼忤中人小兒吐乳大人狐狸等病

方

蘇合香油（入安息香内）　薫陸香（別研）　龍脳（各一両）　白朮

丁香　朱砂（研水飛）　青木香　白檀香

沉香　烏犀（鎊）　安息香（別為末用無灰酒一升熬膏）

香附子（去毛）　訶子（煨去核）　麝香　蓽撥（各二両）

右為末用安息香等膏回煉蜜旋丸如梧子大早朝井花水温冷任意化下四圓老人小兒二一圓温酒化服亦得辟邪用蠟紙裹二一圓如彈子大縫袋盛帶之

急慢驚風證治

小兒發癇俗云驚風有陰陽二證身熱面赤而發搐搦上視牙關緊硬者陽證也因吐瀉或只吐不瀉日漸困面色白脾虚或冷而發驚不甚搐搦微微目上視手足微動者陰證也陽證用涼藥陰證用温藥不可一槩作驚風治也又有一證欲發瘡疹先身熱驚跳或發搐搦此非驚風當服發散藥

陽癇

朱砂（研一分）　膩粉　麝香（各半錢）　蘆薈

白附子　甘草（各二錢）　胡黄連（一錢）　蝎梢（七箇）

白殭蚕（十箇炒）　金箔（七片）　赤脚蜈蚣（一條）

右為末二歳以上服半錢匕以金銀薄荷湯調下三歳以上一錢匕如口不開灌入鼻中

陰癇

黒附子（生去皮臍） 生天南星 半夏（各二戔） 白附（一戔半）

右研細井花水浸七日毎日換水浸訖控乾入朱砂二銭麝一銭拌匀毎服一字薄荷湯調下量兒加減一方用附子生去皮臍為末毎服二銭以水一盞半生薑二片同煎至半盞分三二服量兒加減吐者入丁香五粒同煎乳空時服或用水浸炊餅為丸如粟米大毎服二十粒亦可○餘（方見癲癇門）

三辛散治小兒頭骨應合而不合頭骨開解各曰解顱

細辛 桂心（各半兩） 乾薑（七戔半）

右為末以乳汁和傅顱上乾復傅之兒面赤即愈

胎毒遺毒

凡父母正患黴瘡時育兒鮮有免者其証混身破爛自頂至踵兩目外幾無完膚日夜號泣或吐或瀉似瘧似驚變態百出父母不知覺有他症別作治療十無一生治法牛黄散主之

牛黄散方

牛黄（一戔） 犀角 羚羊角（各三戔） 朱砂（四分） 氷片（一分） 广香（一分）

右研末和入土茯苓末十戔生蜜調服使兒日々利去惡毒見有他症隨宜治之毋亦隨宜用薬加以散毒劑不住口服

外傳方

粉艸 金銀花（各等分）

右為極細末三升破爛處洗淨大握數之半月後方見効再數日自愈々後一兩月當復発再後兩三月當再後発々漸輕仍加法治之自愈々後或口角眉角或肛門存二三餘毒

不必治矣其混身或癬或瘡忽聚忽散數之即愈大抵一年餘皆瀉除根若毋不禁口或見漸大不能禁口有延至二三年者然不發足矣胎中之毒徹骨入髓焉能旦夕除哉（廣筆記馬銘鞠方）

榮氏曰胎毒之症欲一時取下則生命不保決勿用攻擊之劑治法宜隨漸解之法六味生地黃丸加犀角主之

麻疹撮要

麻疹豆瘡皆依其形而名之也麻豆俱瘟毒而豆出於陰臟其毒雖有浅深必起脹必灌膿必結痂而瘡愈麻則出於陽腑其毒雖熾盛者必發表清解而消散則疹愈然麻屬陽疾而其熱毒上蒸肺實受其毒是以發熱之初肺家見症獨多咳嗽噴嚏鼻流清涕眼胞腫眼淚汪汪面腫腮赤是也治之之法惟在宣發其毒以盡出之於外雖紅腫之甚狀如漆瘡亦不足慮其毒既発出於外則可免內攻非若豆瘡之必顧其灌膿收結也故此症若調治得法則十可十全雖然調治失宜則殺人亦如反掌矣可不慎耶

麻疹有所大忌病家犯其所忌則至於殺人最可恐也醫家亦不能令其戒慎則其罪不可逭也宜詳其所忌令人勿犯今先標示之子弟輩其勿忽諸

第一戒

勿犯風寒、最忌沐浴、

憶昔二十四年前、歳在丙申、夏四月、浚明公行詣于日光山宗廟、留守官員土浦侯、年四十五、時麻疹大行、侯自覺頭痛惡寒、侍醫診視、皆謂蓋麻疹、宜勿犯風寒、而侯一不聽、遂沐浴而出、在于城中一日歸、則昏悶不省人事、衆醫不能救、終煩躁數日而卒矣、噫侍醫輩若有識、當以死諫之、而無其人、哀哉、

第二戒

勿食葷腥油餅酒醋魚子炙鱠、最忌酸收澀滯之物、

麻疹之治、凡以宣毒發泄為第一義、一切粘滯鬱塞收斂實酸之物類、皆為禁忌、犯之則令輕者重、重者或至不救、最宜戒慎之、嘗十餘歳男兒、麻疹既[illegible]而忽復發、熱煩悶、訊之則食鹽梅子耳、此物慣以為病人宜食、豈知酸收之為害、一至此際也、

第三戒

勿早用寒涼、最忌閉表遏塞出路、

表未解不可攻裏、為治外感之要法、雖傷寒與瘟疫異、治其惡寒發熱、則為表證一也、方其初發熱惡寒時、早用寒涼、則致凝泣其毒、令遏塞不能發出、則成內攻之變、最為可懼、惟可以發表清解為務、雖天氣暑熱、宜用辛涼發散、其早用寒涼、則恐壅遏其出路、最宜慎之、而其辛熱之劑、則在所忌也、嘗見一小兒麻疹發熱驚惕而未露其形、醫誤認驚風、以鎮驚劫劑攻之、遂令麻毒隱在皮下不發達、後醫復見其燥熱、投滋陰四物等劑、亦不能救、煩悶聲啞而斃者、嗚呼、用藥之機關、失其時則終至不能救、可不慎乎、

第四戒

勿多用辛熱、最忌辛溫辣熱、以助其毒氣、

初發熱時、桂枝乾薑羌獨活麻黃細辛之類、皆在所忌、犯之則能致助毒氣壅遏、而不得發出、亦恐有内攻之患、最宜戒慎之也、惟清毒發表爲宜、其與傷寒異治、職此之由也、

第五戒

勿用補澁、最忌參朮訶豆蔻之類、

初發熱時、多有自下利者、其毒亦因利而解、無妨、若泄瀉利過甚者、以加味四苓散分利而可矣、若誤用參朮訶子豆蔻之類補澁、則證重者令腹脹喘滿而不可救、輕者爲休息痢也、嘗見朱門之女兒十餘歲、疹後下利、裏急後重、奔迫百餘行、諸醫治之、終不起者、戒之〻〻

○凡治疹、不可拘天氣暑寒、正當以脉證爲主耳、若守株而不知通變、必有失焉、若能詳察、審而施治、則麻桂亦在所不忌、

碑医

常思学

百家取舎

特不执古方

醫學質験五種青囊瑣探 抄

相州　片倉元周深甫著

碑醫　余自少小好醫方、毎見古者必問其道、有一宿老曰、吾子能奮勵勿爲碑醫、余俛思久之、不得其解、乃叩碑醫義、曰、建察以還百有餘年、四海寧謐、誠是學者成不朽業之秋也、而醫人之多、國初以來未有若今日也、然率皆競馳勢利、雖至皓首、無一葉書著述、死而遺者僅墓上一片石而已、故我謂之碑醫矣、嗟宿老言可謂使人發憤激也

常思學　士君子之遊山川、不啻娯耳目之觀也、望山之巍巍、則宜思學而積累、觀水之悠悠、則宜思殆而不息矣、常存斯心、則古人或庶幾乎

百家取舍　聖人述作書外、百家典籍、無有全篇可廢取者、而又無有全篇可盡舍者也

特不執古方　自仁齋徂徠二先生唱復古學、醫家亦效顰、動稱復古、廼以素難爲後人之偽作而排之、特講究仲景氏之書者數家、其功亦偉矣、然至其甚、則使子弟輩禁觸目於晉唐以還之醫籍、乃言傷寒論湯方足治萬病矣、用多之爲觀、其識見則雖愉快、至治衆病則不能免牽強附會矣、蓋因其人立一家法、雖有奇病異疾、恥用後世之方、專執古方而誤人命者、亦不爲鮮、豈仁人之意也哉、夫天下事有古人未明而後人詳之者、譬如日食、秦漢以

鵝眼風
褥瘡
死候
金瘡

前哲莫能先知故春秋書日食三十有六記異以警人君也後世巧暦家推測殆盡上下千百年皆可坐致豈古之皆是而後之皆非邪而況在醫家亦後世之論勝古昔之説古昔無有之病後世偶起而人論定於後而功於世者不為少乎故拙执古方者我未敢信也

鵝眼風妙方　以青杉葉一握置炭火上乗墨煙升騰之時熏之日三回

褥瘡方　或云治褥瘡取小粉（シヤウフ）糊經三四年者貼患處極妙　又麝角霜黄栢南星栝蔞根各等分為末水和調傅患処（和漢三才圖會云治一切癰腫）

病人死候　凡病人肌肉柴瘠者手腕後肉脱而形羸医握其中央時指頭將相合者不問何證為死候也雖飲食如故此游魂之假息耳勞瘵之病累月後必見此候唯傷寒痢疾脚氣後有此候者往々愈　○皮膚之寛緊　久病之人雖羸痩甚其皮膚寛而有皺者猶有可生者若皮緊而無皺者必致不起是余之所屢驗也

金瘡　本邦金瘡方二寸八分厚如美濃紙也方書有謂金瘡幾許広者豈与此邦金瘡其濶狭厚薄相同否予疑之久之嚮得一古書蓋大永中竹田昭慶以所聞其師筆録者也（予姑名曰大永医書）其書曰中華金瘡形甚小宜以四片對此邦一片即師出中華金瘡以示云々又覧遠藤元理本草辨疑中華金瘡方一寸許比此邦者甚厚宜以二片敵一片云々二説雖互異以此推之当不失其大要矣

檽餐噎塞
灸女室
陰囊湿潤
鼻衂
白禿

檽餐噎塞　取牛膝一條尺許者急入口中向胃脘裏推下一送則忽通喉嚨開豁而安如無牛膝則代牛蒡根若並無則以摺扇取去母骨及紙以子骨相重切去尖銳紙包以代之

灸女室　續医説引癸辛雑志云劉漢卿郎中患牙槽風久之頷穿膿血淋漓醫皆不効在維楊時有丘経歴妙於鍼術与漢卿鍼委中及女膝穴是夕膿血即止旬日後頷骨蛻去別生新者宛然如昔又張師道亦患此證後用此法鍼之亦愈委中穴在腿膕中女膝穴在足後跟攷諸鍼經無此穴惜哉後人未之知其神且驗也元周密受治失心驚悸癲狂気逆等之秘灸於一老翁灸足後跟赤白肉際左右各五十壮經驗頗多即是女膝穴也近田安齋杉埜氏患骨槽風在頷穿一孔膿血淋漓不絶已三年余教之日灸女室穴一月而全瘳因

陰囊湿潤　有男子常陰囊湿潤不乾者牡蛎螺殻五倍子蒸重以上四味為末敷之

鼻衂妙策　以萆麻子加百草霜少許貼前頂穴即止若不止者鍼委中出血無有不止者

小児白禿瘡　治小児白禿瘡以石膏一味極研末漿水和調塗患上即瘳此法極妙

鴨跖艹治傷寒

陰癬

麻疹預防

椛

癜風

痘序発搐

鴨跖草（和名門由久佐）　気味苦寒無毒主治寒熱瘴瘧小児丹毒実此系解熱毒之妙剤也余嘗用傷寒温疫熱邪不解者服効甚多今人未知有斯奇效須試傷寒啓微所載所定方中用此者而為治知其功效之神也

陰癬奇方　薏苡不拘多少搗爛取汁牡蛎細末和調敷患処七八日而必效云

麻疹預防　麻疹流行之際以紫根二三銭常水煎服之則必避之假令罹此疾必稀少不害生命真絶世之妙方也安永丁酉歳天下麻疫大行甲州一士人三間泉者一家七八口連服此薬四鄰悉患麻疫而此家独不染遂傳之親戚皆尽験云因記以示同学

樺（カバ）　黄連黄芩大黄肉桂各等分右四味細剉黒炒者再此必徳本所用之樺正是也

癜風良薬　赤白癜風本属難治症矣近讀大永医話得一奇方附子皮硫黄礬石鐵精右四味等分極細末先使患者浴去垢膩而後貼薬於患処乃火焙乾復浴而貼薬火焙如此法日三四遍数日而必愈又門人斎藤生経験癜風方焔硝硫黄各等分右細末酢調敷之

痘瘡序熱発搐　小児痘瘡序熱搐搦上竄不省人事和誤認為驚風而灸薬兼施則此雖誤治不害於発痘若以驚風為痘瘡而与薬則変証蜂起矣痘瘡候必面色縁々赤自汗出而眼中含涙是也不可不詳察也

瘤

痘倒靨

内障

疣

取瘤妙法　瘤有痰瘤而疣瘤揺之則根与肌肉相离肉瘤則反之故疣瘤可取而肉瘤難取焉取疣瘤之法不拘其大小先以三稜針刺瘤頭一分許乃以礬石瓜子大入針痛另將礬石末打米糊和調貼瘤四圍以紙蓋之須臾以手揺瘤則當針痛白汁出乃以濕紙拭去（貼薬）所法所石再以礬石一二銭入盞内水解開如稀糊以雞翎塗之瘤上数十遍半日許而脱去如神

痘瘡倒靨及痘後内障奇方　瘡出而倒靨色黒唇口氷冷危證也用狗蠅七枚（狗身上飛走者）擂砕和酪酒少許調服蝿夏月極多易得冬日則蔵於狗耳中不可不知也　内障　用蛇蛻一具浄洗焙燥又天花粉等分細末之以羊子肝破開入薬在内麻皮縛定用泔水熟煮切食之

治疣神方　虵蛻不以多少滾湯浸頻洗患処即瘳　又方治疣蔓延者以活蛞蝓一箇輾擦疣母上着粘訖乃放棄則其疣自蛻其他子疣尋愈又方薏苡仁二銭甘草一銭以水一盞半煎取一盞温服四五日而疣如拂（一方無甘草用大服及赤妙）又方将茯苓三銭水煎温服数日而内痊

青

凍瘡 痘眼 癩

凍瘡　後世謂之寒瘡或名凍風又発跟曰凍跟発耳曰凍耳其初起赤班漸而微腫仍温則癢痒殊甚　予家傳一奇方、未破時与之百発百中応效如神方名掃凍煎散　土茯苓二錢乾薑一錢右二味細剉盛絹袋嚴醋蘸上火乗熱熨患処日三四次軽者二三日重者七八日不潰爛而全愈

痘毒入眼　凡痘当灌膿收靨之時眼一旦閉而復開者必毒害乎眼也此症涙自溢出者不失明矣若乾枯無涙者多致失明矣治之、法外宜以柳蠹虫数個擂加泥絞取汁頻灌眼内別以白斂子散貼足心内宜服清上防風湯兼用望月砂散兎糞丸百発百中累試累験　白斂子散　白斂子阿膠右二味研細末米糊調毒入於左眼者貼右足心入於右眼者貼左足心七八日而必效　清上防風湯　防風黄芩黄連梔子桔梗白芷枳殼荊芥連翹薄荷川芎甘草　右十二味水煎或加兎屎　望月砂散　谷精草密蒙花蝉退（去翅足各五戔）望月砂（炒一両）右細末毎服五分白湯下・兎糞丸　兎糞炒乾為末蜜丸菉豆大毎服二三十丸酒下

○諸家経験方

神仙百中散　治紫赤黒白癩疾百発百中屢経験無比神方非其人勿傳　人参白蛇血蝎真珠（各八厘）右細末日用一厘加金粉二分白湯送下更呑大楓子丸　大楓子丸　大楓子（十七厘）右為末米糊丸無槵子大日用三十粒兼白丸利腸胃　白丸　巴豆（四戔去皮膜入乳鉢内擂如泥）右米糊丸作四枚湿紙包裹煨以紙微焦為度壮者一日用四丸弱者用三丸其欲用之則先断塩二日而早晨頓服当大便屢下利若利下不止則宜以味噌汁及白粥冷食即止　震霊丸

治癩疾之神方　大楓子（去皮五十戔）天石（五戔）大黄（十戔）黄蘗（十戔）荊芥炉甘石（各三戔）甑瓦（焼存性）山櫻皮（焼存性各一戔五分）右八味細末為丸分作九十圓壹粒重壹錢四分日服三粒白湯下凢服此丸至十日則臨臥宜服全声散　全聲散　大黄（十戔）川芎（八戔）蕎麦（五戔）右細末臨臥以壹錢半温酒送下次早宜下玉振丸　玉振丸　白丑木香川弓（各五戔）巴豆（去油半戔）乾薑（一戔半）右末薄稀糊丸用五分与之日不可服震霊丸

骨鯁 血塊

骨鯁　全鳳散　治魚骨鯁及竹木刺神效方　鳳仙草（花実茎根俱焼存性）青松葉（焼存性各等分）右細末毎服五分温酒送下、此方非但治魚骨鯁咽其他竹木金銀銅鉄等刺身體不出者一服見效真絶世神方也東都本街一茶店賣此茶日得数千銭

下血塊妙方　蝦蛤（焼）右為末米糊丸梧子大毎服五十丸数日而当下血若塊減者宜加

金瘡 瘭疽 癰疽 齲歯

生蒲黄餅食亦宜蚶蛤藕根

金瘡鐵扇散（洗冤録） 治刀石諸傷起死回生神異霊験難以具述 象皮（切薄片用小鍋焙黄色以乳为度切令焦） 龍骨（用上白者生研各等分） 石灰（歴数百年者住） 寸栢香（即松香中之墨色者） 飛礬（将白礬入鍋内煎透便是） 松香（与寸栢香一同鎔化傾入冷水取出晾乾） 以上六味共为細末貯磁罐中遇有刀石破傷者用末敷傷口以扇向傷処扇之立愈忌撫熱処如傷処発腫煎黄連水用鵝毛蘸塗之即消 （沈氏医案載塗黄連水）

治瘭疽妙方（瘭音着于指初指頭先作黯疱後始腫赤黒黯疼痛入心是也） 杉葉蒐（二銭） 白梅肉（一銭） 右二味細研以水一盞拌和以患処浸之日六七次真水黏而痛立止若指頭潰爛路骨已欲類落者用後方 闘模古閣児蔵剌 丹礬淡菜（等分）燥 右二味窨和匀敷患処

癰疽発背諸腫瘍不能成膿者以之蒸洗之必潰愈 鶏卵（一枚） 麪粉（四合） 葱白（一把） 酒（一合） 生薑（切一合） 右以水五合煮乗熱慰患処具効如神

治齲歯疼痛灸法 上歯痛者灸足三里下歯痛者灸列鈌

止痛散 胡椒 楊梅皮 焰硝（各等分） 右为末擦患処則痛更甚須臾全安

青嚢頊探畢

儒門事親抄

三聖散 吐剤 防風 瓜蒂 藜芦 右三味煎徐ゝ服之不必盡剤以吐为度

益黄散 治小児痢 陳皮 青皮 訶子 丁子 甘艸 服食前

治気積方 香附子 为末生薑湯送下二三銭独治痃外者

葛根散 解酒毒 葛根 葛花 貫衆 縮砂 甘艸 右煎服

消毒散 治喉腫 鼠粘 荊芥 甘艸 右煎服

煮肝散 治雀目 青蛤粉 夜明砂 穀精艸 右为末毎服七五銭猪肝肉煮熟細嚼茶清下

無比山薬丸 調治 山薬（二両） 肉蓯蓉（四両酒浸） 五味（六両） 兎絲子（酒浸） 杜仲（各三両） 牛膝（一両酒浸） 沢瀉 熟芐 山茱 茯苓 巴戟 赤石脂（各一両） 右十二味为末煉蜜和丸食前温酒下米飲亦可

沈香降気湯 沈香 木香 縮砂 白豆蔻 青皮 陳皮 莪蒁 枳実 蘿白子（各一両） 大黄 黒牵牛（各三両） 右十一味为末生薑汁浸蒸餅为丸如桐子大毎服三十丸橘皮湯下

枳朮丸 治気不下降胸膈満悶 枳実 白朮 右为末焼飯为丸送下

治附骨癰及一切悪瘡　當皈芍甘草木鼈子（各一两）梔子（六箇）右為末冷酒下

当帰治血湯　治瘡瘍未発出内痛不可忍及婦人産前後腹痛　当皈没薬乳香白勺薬瘡瘍者（加）人参木香婦人赤勺薬酒煎服瘡已出不須用

諸物入眼中　好墨清水研傾入眼中良久即出

当皈散　治月經欲来前後腹中痛　当皈玄胡没薬紅花右为末温酒調下二戔

白花散　治婦人産中欬嗽　黄柏桑白（用蜜塗黄色为度焙炙）右为末

三才丸　治嗽　人参天門冬熟苄　煉蜜为丸含化服之

治小便渾濁如精之狀　没薬麝香当皈　以新棗心自然汁为丸

治小便頻滑數不禁　知母黄檗　右酒浸透炒微黄为末水丸如服薬前一日休喫夜飯来日空心立服米飲湯下一百丸只用一服切忌喫冷白粥一頓

治小兒脾疳　芦薈史君子　右为末米飲調下一二戔

奪命散　治小兒胸膈喘滿　檳榔大黄黒牽牛　蜜調服

妙功十一丸　治癇　丁子木香沉香乳香射香三銭莪茂牽牛胡連雷丸鶴虱黄連黄芩大黄陳皮青皮雄黄熊膽甘草（各三戔半）赤小豆（三百六十粒煮）白丁香（三百六十箇）軽粉（四戔）巴豆（七十粒）右二十三味为末赤小豆爛煮研泥同蕎麦打糊和作丸一丸朱砂为衣陰乾服時水浸一宿化一丸大便出随病各有形狀取出为験

朱砂滚痰丸　治五癇　朱砂白礬赤石脂消石（各等分）食後荊芥湯送下

○医賸抄

多紀安長著

消息　傷寒直格云、、謂損益多少也　公羊昭十九年曰樂正子春之視疾也復加一飯則脱然愈復損一飯則脱然愈復加一衣則脱然愈復損一衣則脱然愈何休注脱然疾除貌也言、、乃其節傷寒論消息二字得之而義自明此說得之

劑頸　、、而還無明解按劑丨限之義而還猶謂以還言劑限頸以還而頸汗出脈経有劑腰而還之文又尸子云莒国有名蕉原者廣尋長五十步臨百仞之谿莒国莫敢近也有以勇見莒子者獨却行劑蹱焉此所以服莒国也劑頸劑腰劑踵皆劑限之義耳

煙草　王逋蚓菴瑣語云烟葉出閩中辺上人寒疾非此不治関外人至以匹馬易烟草一

觔張洛本經逢原云北人籍以辟寒此果信近閲一書載鄂羅人人言云吃烟艸兒青腿戈疳之疾蓋其證固寒毒所發也

背阳腹阴、金匱真言論云言人身之阴阳則背为阳腹为阴或曰阴阳二字互誤已人南面則腹乃为阳背乃为阴老子曰万物負阴而抱阳又阴阳离合曰聖人南面而立前曰廣明後曰太衝況於其文南主夏故腹字从夏肉背为背故背字从北肉朱子云天地東西南可見而北不可見人之瞻視亦前与左右可見而背不可見此皆其明證也予謂此說不必也凡物有體質有功用以功用言則背阴腹阳也而以體質言背阳腹阴也蓋天地之道大为阳小为阴高为阳卑为阴外为阳内为阴易云立天之道阴与阳立地之道剛与柔又云乾剛坤柔今夫以大小視之背大而腹小以高卑視之背位于上而覆幬之勢乃天之象腹居于下而有受載之形乃地之象以剛柔外内言之背剛堅在于外腹柔輭而在于内且男生而覆女生而仰其溺水亦然背为阳腹为阴而阳經行於背阴經行於腹者體質之勢也人之於走獸飛禽魚鼈蟲豸之屬雖伏走飛翔浮游蚑行其狀各異然至其稟天地阴阳之気各具其體則一也今夫背阴腹阳於人猶可言耳至如走獸飛禽魚鼈蟲豸之屬謂之背阴腹阳而可邪且如背字說文云从北肉聲然如腹字則偏旁从复而非夏況易以腹为坤豈可为夏肉乎夏肉果为腹則背字當是冬肉北肉果为背則腹字當是南肉滑是水之骨坡是土皮字學字說豈足據乎因謂背腹阴阳有功用體質之別必不可拘於一說矣

痧

張錫駒傷寒直解云霍乱云不從表入不涉形層大邪從口鼻而入直中於内为病最急又云痧者即天地間不正之気混熱熏蒸從口鼻而入不吐不瀉腹中絞痛俗所謂絞腸痧是也此霍乱及痧并自口鼻而入而況明宗金匱注云中悪之證俗謂絞腸痧即臭穢悪毒之氣直從口鼻入於心胸腸胃臓腑也此中悪從口鼻而入也諸書所載已如此世人徒因異又可之言而知瘟疫自口鼻而已

廉瀝、、乃勞之謂外臺引襍遊論云因虛損乃名为勞極吳楚云淋瀝巴蜀云極勞按廉淋一声廉瀝即淋瀝又巢源云尸疰病者嶺南中瘴気土人連歷不差變成此病連歷乃綿延歷久之之義正与淋瀝同益江左時用方言書唐人乃改作勞也閲千金等書古方多用狸骨治勞而後世用猫頭方菜池物理小識論之詳矣

鄭声　左傳曰煩手淫声慆堙心耳乃忘和平謂之鄭声

一角魚全形図





泊夫藍全状図

竪割果中而見核

核蒂府利

核中仁謂之肉豆蔲



肉豆蔲果枝葉相連図

木乃伊全形図

亜丐里哥斯（アカリコス）附生魯尓更（ロルケン）樹図





是所載于安蒲児止私巴亜列之名



是所載于勇斯東私禽獣虫魚諸

西医窩葉都所著悉迦多蛤模児牒児業涅伊斯琵納丟児硬冶業斂亜更名（名）曰一角者卧児狼徳亜（地理之諸名所謂表国者是也）国之海産而係於鯨魚之異種者之巨牙也然而自古諸名所載有図有説並皆曰其形如馬額間生独角於是有一角之名焉蓋昔人目未乃親覩其物而徒受伝聞之誤漫然以模錄之於其名者已去然輓近之諸賢極知其不然而改擬以羅甸語或謂之烏泥哥爾奴麻力奴或謂之烏泥哥爾奴歇候烏泥哥爾奴麻力奴者此飜海一角烏泥哥爾奴歇候者此飜真一角而其称謂如此者以其久已膾炙人口之旧説未可遽廃故竊以海与真而仍存一角之名然必別有陸産及贋物之与此物異者之謂也大抵其魚与鯨魚同類而但其上顎骨鼻下生一條之巨牙其形円長而漸細突然挺出宛如角其形表面則黄裡面則白自根柢至杪末旋紋必左纏焉土人呼其魚曰襪児其屍曰納爾其民卑乃其屍牙以為貿易之資故二言連合謂之納爾襪児商舶時有載其顎牙連属者来余乃曲細観之則其巨牙自上顎骨之空罅処而突生亦与他血気類之牙一相同唯以長尖為異耳又其巨牙之側有一小牙孽生而微起者焉因竊想若有巨牙褪落則或更代之

者亦猶若人齒之亂而更生焉者耶是未可以窮詰也故姑存疑以俟後之識者焉而此物其明徵已。如蘄而猶有一角獸之說者是乃妄聽而未覩親之之所由誤則不可不以辨也然夫諭頓已窮其実理主治亦盡其精微以為其功与犀角象牙之復佀屈所烏喙（復佀屈者飛昇也所烏喙者塩気也是乃製薬之名其法凡諸薬之有塩気者飛昇之於鍋蒸而取其精粹之気可以用之於病者皆称之復佀屈所烏喙大抵血気族則蚯蚓亀蛇之類血気族之軟者則血脈胞衣脳髓之類其硬者則犀角象牙脳蓋骨之類其餘草木亦有塩気之類甚多詳見于西医之諸書不贅於此焉今所引用於此者則犀角象牙之気而乃以鍋蒸所製取者也言一角之功与此二霜之功相似也非血与犀角象牙同其功之謂也）相同其說徧傳于世何其明乎但粗学膚淺之徒不導繹其原由深拘泥於旧說又誤閲諭頓之論其功与犀角象牙之復佀屈所烏喙相同之言則以為已与犀角象牙同其功其為陸產也無疑焉誤已誤人妄誕杜撰終至於以無為有以有為無豈亦可不謂狂惑乎是余之所以辨駁排叱而不厭焉也

主治一切中毒驚癇麻疹及體疼痛専解諸熱毒並奏奇功宜平常收畜而備急卒之用

又列墨加伊（人名）曰強心気益精神治癲驚解諸毒又有発汗之功但世所謂此物掛在頸項則能避悪気者余試之無効乃無稽之言不足信也大抵此物甚貴重其形長而大質重実者為上好服量自一分六厘強至六分六厘強為度其謂襪児襪角謂羅盧者皆依蘭地之方言也又謂之理可爾涅德迷盧者拂郎察語也

泊夫藍

鐸度涅烏斯本草泊夫藍主治曰解胸中之結痰通肺気之窒塞能開散諸鬱閉故強志益気和筋脈神経利眼耳鼻口或療頭面重而不仁或忘憂而使人悦虚弱之人服之禆益殊多卒死者復其脱気而立甦用之自壹分伍厘至叁分葡萄酒送下喘急卒発者亦葡萄酒服久喘難愈者亦有効食滞酒毒随症加他薬為之引使又能開通肝膽之閉塞故兼治黄疸而使肌膚復於其本色故先哲曰倭斯可里垤私所謂泊夫藍能使人面悦澤者以此言之也曰倭斯可里垤私又曰此物作諸湯方内則治藏府諸疾外則通利関節又与衆薬相合則或墮胎或通経閉或下胞衣又作膏則治諸瘡瘍故諸膏方中用之者居多凡此物宜鄭重戒服量過度若実熱鬱発於上部之人則尤慎勿多服恐其開発之気猛烈而使火偏動故也或曰此物能益気力故艱産婦人作其随症之本湯而加此物少許与之則大有効又一切咳嗽吐血者並用之甚驗凡諸病在于胸膈者悉皆主之用之自壹分伍厘至肆分

伍厘喘哮則加麝香一分六厘温濃処酒（凡名中称酒者皆謂葡萄酒也下倣之）服有効冬月凍死者与之主甦蜘蛛及蝎之螫傷亦服之奴俗間相伝方頓服洎夫藍三銭並汁則能剤散憂欝故使人悦楽喜笑不已凡此物和酒而服則其味異常故服之者動過度而多却受害者其甚者至歓笑如狂故宜微々服之莫不有效焉

窩糞都之名曰洎夫藍（梅吸涌涅侶私所著之名曰 者亜刺比亜国所呼之名也・）洎夫藍羅甸語謂之歇盧修斯息産於東方亜細亜洲之諸国今則以西把尼亜諳厄利亜払郎察噸矢突利亜（以上四国倶属于欧邏巴洲）麻打葛失加爾嶋（地属于亜弗利加洲）都児格百爾西亜（以上二国倶属于亜細亜洲）等諸国多産焉而特以噸矢突利亜蟹斯河岸之所産為最上絶品殊勝於東方及諸国之所出者焉其物則其草花内之中心必作三線之蘂者是而其蘂恰若細長舌状其色赤黄其味辛而帯微苦頗似有油気其気極芳烈而直撲人之鼻（按列墨加伊之名云其草春生苗秋開花六辮 其色純黄其香似百合花謝結実其作三房）而其花内三蘂之間短矮之六葉相錯雑而生其末各作浅黄色（此六蘂則不堪入薬唯用三蘂耳）其根則似韮蒜而作毬蓋品類無数形状亦随地而少異故不可以一定認之也凡使用或生或末服

鑒法花蘂強厚而長潤其色鮮紅而清潔不粘滑醲郁有芬香者為佳其或腐黒或有黄白之汚点者皆不堪用

主治緩拘急止疼痛強心気益精神使眠者覚通利経閉兼有催生之功此物専為肺蔵之要薬故名曰亜泥麻毘爾牟奴模（此譯入于肺之要薬）大抵其功与抜爾撒摩樹脂相同凡配合之居方剤者甚多其用之之量法生而単用者参分参厘強配合於方剤者弐分伍厘弱以為率

肉豆蔲

茂質按肉豆蔲本非漢土之産故陳李輩雖博洽亦皆未得見其全物焉因為傅會之説而妄収之于草部自此以来漢土雖廣俊傑雖衆又何由辨其非乎和蘭人毎歳三月依例貢方物而入于都下譯官数輩従焉茂質不佞以夙従和蘭学毎私客館而請益於譯官率以為恒焉往年一日在于譯官之席上喫茶出糖果噉之其味絶美因問其名則和蘭之方言呼曰没私葛黙儒多退而験其名攤彼邦鐸度涅烏斯之本草及窩葉都列墨加伊簿之書而讀其説又以目記之形状与其図相照而比校之則漢人所謂肉豆蔲者必是而不復容疑焉是乃漢人所未得見而得観其全物所不能辨而詳其形状乃不得

薇

不此喜与海内之人共与輙即摸之図訳之説併以公之于世然独所根者莫人航海持此香而亦之彼俊傑耳

窩葉都之香曰肉豆蔲羅甸語謂之奴古私波斯曷太和蘭謂之波斯曷点儒多其樹如梨葉如桃花如薔而差小芬香可愛実大而如生胡桃其皮二層上者極厚熟則罅拆次者名曰府利比（外膜皮）鬆挟血色核之外而其質軟其香甚烈其色赤而以帯黄色擣之未経日者鮮紅如猩々緋剥之日乾而変黄色者飲食菓餌俱用之其中心者為核即仁也（漢土所謂肉豆蔲者即是也）其形橢其質堅実其外面則繭紬色而有皺紋其内則有如赤色班斕状之紋其気味辛苦而濇香亦烈

列墨歴伊所撰之鐸路阿業列英（書名）曰肉豆蔲樹凡一歳三結実其熟在二月六月十月殊以二月者為最盛其物産於印度之諸国番達嶋最多

主治窩葉都之香曰益脳髄強神経或療胃及諸蔵之諸病或治子宮之諸疾故姙婦用之則有壮胎気之功或挫積聚消風塊而能使其気下降△削墨児之香曰肉豆蔲性香竄接壮神気順呼吸強肝胃明眼目利小便通大便散風塊兼療子宮之諸疾大有神効△又曰消飲食殺蟯虫使人益強記除除面部班点（桜雀班類）肝脾痃塞乃固結者服之則得融通和觧

神経之事漢人所未言而其説已詳于解體術書凡病起於此者則諸痙諸痺中風偏枯頸項拘急口眼喎斜角弓反張直視上竄鼻煽搐搦循衣摸衣牀之類一切不便於機轉者皆是而今略附録之以為用此物及泊夫藍者之資讀者其察焉

有　之

木乃伊

西医吸蒲涅児（人名）所著嚩爾田勃孤児牒業力伊児牒髦翁業力伊児牒物伊列児鐸（書名）第五而七十五號曰摩密亜者所出於阨入多国上古王侯墳陵之下而因其上古之礼以按爾沙摩方之法殮瘞其死屍其死屍年代積久而以成焉者也然其国有制禁発掘焉但其民潜究其塚竊其死屍以鬻之於客商客商船之而輸之於他邦也蓋其以按爾沙摩方瘞之者為防其朽腐也故至其久者則星霜已近二千年而仍存者焉而我欧羅巴洲諸国之秘府閣有蔵其全體者余請観之其棺者以撒沙復羅斯木所作而其人屍則東方諸国之骨格其明衣則阨入多国制度其面目貼金箔徧體亦鍍以金而作數種之画図以寫其教法

之意蓋文之也凡薬局中所用者必擇其品之上好者總而其色黒褐而其肉恰如煙薫形其質黄灰軽然不好枯燥但充実潤沢者為上好之品也

主治専融通凝血故落墜打撲傷其絡而死血凝滞於肌膚者肺病者脾痛者（病証詳于別冊）胸肋熱痛者子宮疼痛者並服之有効兼癒金瘡及竹木傷其配之於方剤者湯散膏油之諸方亦皆用之

木乃伊者羅甸謂之摩蜜亜和蘭謂之摩蜜伊本邦謂之蜜伊刺漢謂之木乃伊皆摩蜜亜之声所訛轉也而摩蜜亜之名者本亜刺比亜国人之辞而其義則言其死屍以抜爾沙摩方之法殮瘞之也

噎蒲里哥

蔵質按噎蒲里哥者所羈縻於我邦之野作嶋所産而我邦呼曰野作松者之木耳也而挙世為有奇功而用之者既已久矣然漢人諸本草及府志等之書未嘗有載説之者也故其物性主治不可得而明辨焉而其用之者亦徒襲俗間傳習耳而未曾有的據也安永丙申春三月和蘭人入貢医官桂川君持此物就而問之於其医局列児必的爾性多瑛別児業名乃曰是下国所謂亜力里歌斯者是也余備之因替之於彼国之草木疏及窩葉都之書則図説倶与彼所言脗合不復容疑焉於是乎采草木疏之図譯窩葉都之説而以此欲令為夫用之者之明據已

窩葉都之書曰羅甸語或謂亜力里歌斯或謂亜力里歌謨歌傑太獮里斯者則我邦呼曰魯爾更鄒墨者而所附生於魯爾更樹之鄒墨（此云木耳）也其物産於伍羅児及斯窩児叱星恍爾（倶地名歐羅巴洲）居於等地之山谷林藪中我邦及物爾私卯度地人貿易于此而得之以貨於四方也其形或方或圓大者如拳小者如踝其外皮則色赤而帯黄白其肉則極皓白其質脆軟軽虚而多細筋其気味初如甘而漸苦辛不可得而嘗大抵其物四時不凋大小倶従其始所萌之処狭漸発起而不復加去焉又其性有異同品有上下者由其所附生之樹有雌雄故也生雄樹者其質重実其色帯黄是為最下品不堪入薬若誤服之則有害焉（瀏墨児曰但可）（以染色故染匠専用之）生雌樹者可専充之薬用若其形状則已説於前者是也薬舗就此品又分為三品其麁悪而下品者呼曰亜力里歌謨墨沙奴謨其中品者呼曰虚奴謨亜力里吉其上

西方呼曰喘修羅謨亞丐里吉此中上二品皆為上好其物俱輕虛皓白純苦蓋此二品者明乾收貯而切為片再細剉之者已

主治能下諸打噎及斯列伊謨（蘭語或謂打噎或謂斯列伊謨者是所生於腸胃中及百骸者而其物粘凝稠黏漢謂之痰飲凡諸病因於此者甚多）又導膽汁而送之於十二指腸之上口又入于腸則消水穀殺蛔蟲兼通月經此物單服則或有腹中急痛者故藥局中有加乾姜而製之使其性氣和柔以作錠者名曰亞丐里哥斯多路悉斯曷修斯

和蘭局方（是乃藥局中所用之諸方之名也）第百三十七號載亞丐里哥斯多路悉斯曷修斯方曰亞丐里哥斯貳拾肆錢乾姜貳錢右二味各為細末以喝納里嶋（島屬於亞弗利加洲）葡萄酒浸之以酒氣通徹為度作錠熱釜上焙乾或天日曝乾之亦得

主治打噎及斯列伊謨凝滞癖留於一身之諸部者服之則有能驅逐之、切其用之自二三分至一錢

鐸度涅斯草木狀亞丐里哥斯主治曰逐寒飲消冷痰解諸熱止腹痛殺蚘蟲通月經兼療小水淋瀝蟲獸螫咬內服外傅共得之

渉墨兒之名亞丐里哥斯主治曰腹痛腰痛頸痛脾胃疼痛子宮諸病頑痰諸疝並治之兼通利小便解諸食中毒其用之自一戔至六戔但從病者之強弱而增損之

魯甫更樹羅甸語謂之路伊吉斯樹吸蒲涅兒及渉墨兒之名並曰魯甫更樹產於斯徽洲爾卯度之高山及亞兒逆（山名此山甚高而在于帛察与入尓瑪泥亞之界）拂達烏盧涅。伱羅兒（地名屬於歐羅巴洲）等地其樹聳直其皮粗厚而外面則赤色而有芳香其楨幹中央以上至末梢四边生枝而其勢競起其末垂下而宛如楊柳其葉細長而稠密如綫其色黃而有香春生葉吐花其花赤而帶淺綠色至于夏而結實其形恰如松毬作魚鱗狀

脂　其幹鑿竅則其脂溜出凝固者乃世間尋常所謂的列並佗納者是而非真的列並佗納者然此脂有止出血治諸傷之功又能清肺之濁氣用之每服一戔治勞瘵咳嗽兼消頑痰去留飲

皮　可以加用於燥劑也

樹皆　服之則使人發嚏也

訳伊之下至語也従文

人魚

勇斯東私鳥獸虫魚譜曰安杜路卜木児畢悉（羅句語也和蘭語迷伊児名鱄或曆路烏吸悉俱此語婦魚）之図説者先世識爾計侶私之所著而以伊斯把儞亜国人所獲於東海者直寫其真即記其事者也其説曰伊斯把爾亜国人海行至於東海吸沙伊索嶋之属嶋必廃登嶋獲一奇物以其形頗似於人故名曰百設武唵爾此語謂曆路烏吸悉「譯伊斯把儞亜語於其方語也」土人呼曰受伊翁此其方言也其物形貌而無項頸之分与両肩相著其耳雖如人然輪郭濶大而内巻故内空如大鼓此為小異耳其眼及瞼睫不与人異其鼻匾平而有厨竈口唇甚似人故歯皆亦皓白而稠密不如他鱗族之鋸歯其乳大而白殆如婦人乳状白汁亦満其内然其態不全具但乳頭突起而若處女之乳其手短而匾従腋至腕無関節指間亦各有膜相連是皆便於游泳也其脉畧亦与人相似但腰以下有鱗鬣鰭尾而其為海族者莫疑焉此其所以与人不同也

肉　主治身上有黒色斑点者貼肉必許於患処則去又試置肉片於人之肌膚上則令其処傾不仁是無他此物立奪其生気故也

骨　主治能止血其功甚神猶若夫金瘡折傷之瘡口隙然其動脉而迸出之血輙止焉故此物為療出血之霊品

抱連爾印東海諸島産物志安具那島部曰和蘭曆国一千七百十有二年捕獲熱伊物以弗（此語海女）於東海武魯島之海（亜細亜洲小島名東与瓜哇安具那等島隣）輙攜歸養之於潮汐所通之池沼然与之言莫對亙絶不発其声音与之食不嘗又人未知其嗜好欲百計狎昵之終不能得其情四昼夜三時半而竟斃云其物去五十九冊指横径又以礼印狼度（国名）之度度之凡五脚図則其仍之之所由則安具那島主之臣沙米烏児花児烏爾者獲之於武魯島之海其生也寫之真其死也野之於茶汁内其形歴日稍短縮焉已而献之於其主般埵児私的爾般埵児私的爾一覧而還之蓋此物往々有之而不敢珍奇故也又観沙米烏児花児烏児所寫之図則其頭面眼耳鼻口胸腹乳房膞臂肘腕一与婦人相同唯其色白而有帯浅藍色之処其眼球為淡青色者此為異耳其髪則垂于項後灰白而帯浅藍色凡上體自臍至頷下度之其去十四冊指横径也下體自臍以下則魚也而當其上下體分界之処与自臍至両脇下之処而生半規之大小珠各十枚大珠擁小珠而並列相附著焉小珠色白其大各如

私叫伊的覺兒（襁小児所玩弄之丸子其大小未考也）大珠之色各与小珠相同其大各四倍於小珠而大小珠相附着而其状恰如瓔珞焉鰭自大小珠下生者其状猶若展開摺疊扇焉凡其数十四庁每庁其大一指横径其色黄而有浅鼡色之細理或六條或七條又鰭每庁其末各向於其方而捲曲其當於前而寂去者其捲曲之去与小脂中節同自此左右漸短漸小而在其両季肋約不過於脇部横径与一指横径相係合之去也蓋鰭之全状似亜奈那私花之蔓而其物以此若作上下體之間隔者焉（亜奈那私者本草名図説詳于和蘭本草）下体鱗鰭倶如加児不爾魚（鮒鯉之類）而其鱗椿迫於作間隔之鰭下者其色青自此以下至於尾前作界埒之処而其色白帶青其鱗二処倶滑沢而無与它魚異焉自間隔鰭至於尾端其長三十五拇指横径也又下体上下二面倶有鬣焉而其鬣上面二処下面与之相當処亦二処共為四処各長而並列恰如格子大抵間隔鰭及四鰭尾此三者其形皆相似又下体之終与尾相接処有一肉輪而三大珠生於其上其色黄而帶淡紅蓋肉輪似自作下体与尾之間隔焉

六物新志抄終

文政元年戊寅

一角魚亦有鱗図

此図所載安鐸尓窊児都物乙力尓度（書名）



卧児狠德亜地方地理志所載一角及一角魚之諸図、





此所穿空夫上顎骨内之牙根者、而其形随本牙之大小長短、而自作大小長短焉、



一角纂考抄

仙臺　玄沢大槻茂質子煥飜訳

浪速　巽斎木邨孔恭世粛筆記

別悉決列伊形杌方依蘭地卧児狠德亜氍蝶私太剌多達虚斯、（書名、此録私太剌多達虚斯及卧児狠德亜依蘭地之志、別悉決列伊形杌、志也、方、之也、氍蝶、及也、西洋語顛倒、故此録者如此、乃上巻所謂卧児狠德亜地方地理志者是、而彼則略言之耳、）一角魚條下曰、凡世所謂一角者、卧児狠德亜之海中所産、納尓襪児魚之巨牙、而其形宛如角者是也、前條已記彼海産有鯨魚數品、此魚亦其異種、而全體大要与彼諸品相同、唯生長牙者為異、故別録於此耳、此魚土人呼之、曰多襪狐、蓋方言也、厄勒奇亜語、謂之摩娩石悉斯、（尼勒奇亜国名、西洋言語之所由也、故其語古雅、字体稍異、讀法亦大別也、余未能知其讀法、故今所譯就其音之文字、取之於其彷彿之間耳、）羅甸語之旧称、謂之摩娩西路斯、和蘭語、謂之唵延浮倫、（此云一角、）又謂唵延浮倫虚斯、（此云一角魚、）蓋此魚全体肥栄、而自機魡噴水孔、至於吞噬小魚、係其生之事、皆莫不与彼鯨魚同也、然従来目覩之者甚少、故莫有詳悉之説焉、近時有剖剥其雌魚懐孕者、乃其胎子而齎来、然其物形未備、且経日已久、為乾腊縮肉、而全象難明、故其形状不可得而図画焉、尓後得客商之躬至於私太剌多達虚斯者而問之、詳聞其形状、其説曰、此魚全体、肥腴長大、而其体横出於縦、則狭全与斯的烏

尓（ル）魚相似（斯的烏尓魚未詳）但其頭不尖為異耳其肌膚滑沢色頗黯黒體上往々有灰白班点（本邦熊野浦所捕之鯨土人所呼曰小鯨者淡青色而有白点及鉄鏝文差似与此物相近詳載于鯨志）然肚腹之部則一皆白色也而此物大約長四丈四尺九寸許割之乃肉九百斤許而其腴肉饒之得脂数觔然比之於鯨魚則腴肉差少脂亦薄故其脂無悪臭焉而此物生長戈二條俱九尺余其一條則突生於嘴左側而其尖利又一條則生於右側比於左則差短其尖鈍圓而不利二者俱自根柢至頭尖作旋紋糾纏其表面各有緑色者而包之猶若莢然意此必海潮中種々汚穢之物纏縛固著於此矣又此說沙孤斯（サツクス）名人所著刳剥書中頭顱篇亦精為之図而詳記之

文政元年戊寅十月念有七日

漫游雑記抄　　赤馬関　獨嘯菴著

従事於古医方者其人勢利不集於心則亦未必多讀書枕一傷寒論足矣世医動謂傷寒論治外邪天下無加焉至于雑病未必然噫呼卑々哉夫傷寒有萬病萬病有傷寒廻互参差始可治傷寒始可治万病況一握驪珠於古医方中則千金外臺宋元迄明之頃百家說皆為我使用猶正統一帰則九夷八蛮悉受其正朔也

痢病初役尤可鄭重発汗諦視毒気集胃中而後可与大小承気也

傷寒二三日脉沈数巨里如奔馬或心下痞鞕者皆為大患

余年廿一之越前見奥村翁受吐方翁年六十曰我二十而為医知有子和氏試汗吐下技拙人不信欲休之不能休年近六十始見允於越南北人今又八年吾子千里来見我事畢我少見竹林生華其翌年枯我乃吾子猶竹林生華我死期不遠矣噫呼可謂窮而益堅矣而益盛也余将於越前采瓜蒂於四方悉不中用唯越州所産可共吐方耳翁而生其地豈不天乎

一男子患気疾左右脉洪数心下痞堅大便燥結躁擾不安語言失理称王称帝余以三聖

嗽吐之二高与参連白虎湯三十餘日而全愈

喘息軽症暨將発者吐之随宜施灸薬則可然但服気不堅実者謹不可吐香川氏薬撰載服蛤蝓法余試之往々有効

家猪胆通壅滞療逆気功不譲熊胆々々多疑似物非精於鑒賞者不能辨也

朝鮮人参潤枯渇下気其功過諸薬近世主張古医方者漫謂朝鮮参製焙之餘其力不過芳埜之産可謂寃矣至于補益延年之説今古之腐套鼠輩之口実不足掛諸歯牙也

南蛮人試肺癰疑似者法貯水於器皿中使病者唾其中膿沈唾浮有膿者為肺癰

淋病諸疾便道壅塞小便一滴不通者灸陰茎頭中央与陰茎根極処正中七壮有奇効

南蛮人能審癰疽之分癰為易治疽為不治今世人以癰為大悪危篤之病者不知其別也

夫癰者湿疽者乾癰者張疽者陥癰者紅潤疽者紫黒余受其法試之事実果然無差矣

凡種物以掌按之有気築々者不治也

癩病古称天刑其不可治必矣雖然謹喜怒遠房室蔬食菜羹則可掩醜終身者十中有三

四黒白癩蟹手足指梢拘挛腋削者皆不治矣眉髮堕落面色或隠起或腫脹或如紅酔或

班点如楊梅瘡者施治方可也

治狂犬毒方　華産斑猫五枚塩為衣炒以塩色変為度以三茶盞水煎至一茶盞服如此七日除尽宿毒

治瘧疾塊物方　反鼻　常山　大黄　鼈甲（各等戈）　右末用

治産後泄痢方　黄連　乾姜　烏梅　右末用

治疔瘡疼痛方　水蛭霜　烏梅　右二味傅瘡上

治一切疔癰便毒方　烏賊（一戈）大黄（五分）反鼻（五分）　右末用

紅夷人治小水不利方　白焔硝（一戈）麦（半合）　右水一盞半煎取一盞

治歯痛方　服山椒煎汁

又方　取蚯蚓膓置痛歯凹処

治咳方　地骨皮　鼈甲（各二戈半）　五味子（一戈）　右細末煉蜜丸梧子大毎服五分一日三次服

治衄血　反鼻霜白湯送下

又方　衄血軽者土龍霜塗鼻頭劇者紙包実鼻中

治咽喉腫痛方　鼺鼠霜白湯送下

治疔瘡暴悪者方　刺尺沢委中取血（紅痕大法）

金屑丸方　解諸毒停食

金礞石　百中霜（各十五戔）　硫黄（二十戔）　真砂（一戔半）　金箔（十二枚）　右細末糊丸

吹喉痺方　丹礬　烏頭　皂角（各ホ分）　以竹管吹之約壹分五厘

治乳不出者　栝蔞根（九戔）　青黛（六戔）　右末白湯送下

治産後百日間不乳者方　木通葉（六戔）　牡蠣（四戔）　麦門（二戔）

右末粘丸大豆大蒲黄為衣一服四十五丸日夜三服忌五辛青菜他魚湯

治乳腫方　蛇蛻　丁子　右末好酒解之鳥羽塗乳房

二気丸　治一切吐逆急迫者　硫黄（二戔）　水銀（一分）　右擂合以生姜湯送下

治鼠毒方　打碎生蟹敷之悪処灸五七壮以解毒之方下其宿毒知則悪処四辺発疹斑

治黴毒痼疾鼻梁欲絶軽粉諸薬不効者

百中霜（二合）　雄明丹（二戔）　右二味細末攪匀厚紙作袋如烟管大約去二三寸取薬末実袋中着于下鍼定其口臨服置香炉中焚以竹管嗾之作蓋被爐使烟気不洩七日而服尽

以口内爛穢物下為知

黴毒痼疾若面部若胸腹若腰背若四肢窩陥見肉四辺隠起若奇石嵒其色紫黒者丸為難治後方主之但腹気不堅実則不可服　大黄末（五戔）　辰砂（二戔）　天蓋末（五戔）　麹粉（五戔）　別貯鉛五戔於土器中安火上待鉛融本屑再加水銀三戔鎔化下火待凝定末之合匀諸薬為山皈末十戔取其汁毎朝以一茶盞服散薬若五分若一戔後自旦至臥時呑尽所餘薬汁若

受毒於母胎者雖壮実之人不治假令治後発換不可与

治大人小児頭瘡方　天花粉（四戔）　軽粉（二戔）　地龍霜（四戔）　右細末和胡麻油傅

治中烏頭附子毒者方　冷服味噌汁（和邦制）一盞

治湿家頭痛方　口含水半盞瓜蒂末少許貯小竹管中吹入鼻中

黒豆湯　治脚気上冲　黒豆（五戔）　大黄（八分）　檳榔（八分）

右以水三合先煮黒豆取二合去滓入諸薬再煮取一合服

治下血方　地楡　大宿砂（大寸中小）　右以水二盞煮取一盞服

治大人小児喘息　灸巨里動脈上、若十五壯、若二十壯、

乾牛丸　乾牛（十戔）合歡皮霜（六戔）桂枝（一戔）右三味為丸用、

癒蝮蛇咬傷方　採藥葉与青莨菪、手裡採和、傅患處、

又方　牽牛花（貳子）蝎虹（十筒）蒲黄　右末傅紙、粘帖患處、

治頑癬方　輕粉（一戔）綠豆　白附子　硫黄　牡蛎（各一戔）。右末以唾傅、　独嘯曰、謂瘡頑
癬傅薬癒之毒氣内攻者不少、故外傅薬、則内必下之、

白丸子　治久痢、　白朮　礬石（各等分）右粳米丸梧桐子大、

浮石丸　治血塊、　桃仁　大黄　浮石（各等分）右粘丸、

雄黄解毒丸　治纏喉急痺、　雄黄（一兩）鬱金（一戔）巴豆（十四粒）右醋粘丸津嚥下、

治乳癰豎乳不出方　鯉魚頭黒焼　右一味白湯送下、

吹喉痺薬　礬石（五戔）巴豆（五枚）右二味、土器中煅過、細末用、

治瘰癧結核方　絲瓜黒焼　酒送、壹戔日三度

治便毒方　大黄三　桔梗一　木鼈子二　穿山甲一　巴豆（三粒）右粘丸酒送、

治胞衣不下方　反鼻霜（一戔）角石霜（一戔）麝香（三分）右為末酒送、

理中圓　治小兒諸疳、　万年青（焼）乾漆（等分）蕎麦粉（減半）右為小丸、每服十粒、或二十粒、

治黄胖方　鉄粉（百目）黄連　蕎麦（各三十匁）右為丸、白湯送下、明年又發、則再用、凡經三年許、則
全愈、

治河漏停滯方　延胡索一味為末用、

紅夷人治吐血方　赤石脂　柘榴皮　右末用、

又方　赤石脂（壹分）阿片（五厘）

又方　赤石脂（三分五厘）於久利加甲爻利（同上）鹿角（同上）阿片（五厘）柘榴皮（三分五厘）
右為末、取新汲水一盞内、醋少許送、其症劇者、刺尺沢筋推之無動脈者、取血、

治蝮蛇毒方　塗蛞蝓於患處、

治痔瘡經年者方　蝎牛、四五十筒、以胡麻油、煎以至膏為度、

備中鬼好庵味噌薬方　緋（ヒ）知（チ）牢肝（シキモ）八目鰻（鱗）乾柿肉（經三年者）赤蝦蟇　雞膽（黒焼各五分）
右沸味噌汁於土堝中、入黒焼相和用、故稱味噌薬、　小兒疳眼、、睛見翳紋者用之有

奇効

治小便不、利方　茯苓（大）白朮（大）沈香（中）乾姜（中）並用、

療疔瘡方　針其頂、末熊胆水蛭巴豆、塗針口、則黄水大出、

治中蝎毒方　黐（俗曰登利毛知）右即時傅痛処、（以上諸方不択和漢語記之、歟或不失唐来之旧也、）

痿躄劫発、其人無退毒豐瘀血之諸症、而其心下痞鞕弦急者、是為気疾、服吐法後、須去服浮心之方、

労瘵不可治、似労瘵者可治、膈噎不可治、似膈噎者可治、世医動謂治労瘵膈噎、蓋似者也、

瘧病須服恒山吐之、大法以五発為期、寒少熱多者、不宜常山、可服密蒙花末一戔也、服備急圓一分亦可、

吐血後見膿者危矣、

産後三五日、悪露不下、腹満不減者、須急下之、数日後為痓難治、

半産後敗血不下者、惨毒尤甚、数日後心下鞕満如石、為難治、須先其時下之、宜雞鳴紫圓、

瘰癧服浮心湯、兼服再造散可也、灸肩井膏肓曲池身柱数十壮、

夫人多思慮、火易動、火動則津液涸、加旃恣慾、則因為腎労、亦多気疾、

亡血虚家及気疾家、其易火逆者、不可過用桂枝、一轉為労、

傷寒論簡易的切、無論為医流正典、治人元亀、而為叔和見撰壊、踳駁脊乱、非一、非深造超詣之士、不能明矣焉、傷寒例及脈法、皆成叔和之手、今以痓湿暍之條、為開巻第一章、[illegible]易而不断不柔、

去門村夫家世傳小冊子、余偶宿其家、閲之、其書中有苦瓠穰吐食傷之方、余試之数人、悉有効、於是無疑、常則代用之、爾後讀千金方、有苦瓠穰圓之方、可知我邦中古講讀唐之古方書、其流風遺言、猶存於辺裔也、

一小児遺尿、至十余歳不休、与鷓鴣菜湯、下虫、灸章門腰眼数千壮、全愈、又有一小児病形相形、治之如前法不愈、後遊藝州、受一方於恵美三伯者、曰、以伯湯服華渡[illegible]、日五分、約六十日若八十日許、而全愈、服之十日若十日餘、病存後者、其乃効益全、余試之或有効、

労瘵無咳無熱、脈不数、形軀枯燥、而声唖者不治、

梅毒痼疾、外候不見、或鼻孔裡、或咽喉裡肉瘦、声浊者難治、

梅毒手足所隠起者難治

金匱要略於胸痺心痛用附子桂枝不為火澆傳之世人民黙而多思慮以附姜火気可参連者多可桂附者必医詳其証候可無誤之

皷脹多因之於天蓋受體之初胎穢結為癖潜在腹裡壮年後労動心志甚則因発為皷脹決為不治故往々父子兄弟連発者有

産後血気易涸尋労傷精神則因舌乾泄利発咳為労又衍産之時悪露不全下凝結上衝舌傷泄利発熱発咳為労

漫遊襍記 抄 終

文政元戊寅冬 真

[illegible]

年中御通凡行事

春日録