F
キ－22

490.9
Ky-8
No.5049
慶應義塾大学医学情報センター 47.7.5
富士川文庫
1695

救急選方下巻

疔瘡急證門

程山齡曰療疔之法貴在乎早初起即療者十全十治稍遲者十全五六失療者十全一二内服莫妙於菊花甘草湯（外料十法）

甘菊花（四両）　甘草（四銭）

水煎頓服揸再煎服

消疔簡便方（大全）

疔瘡及諸悪毒初起但未成膿者服之神效

白礬（研三銭）　葱白（七莖）

右同搗極爛分作七塊毎塊用熱酒一杯送下服畢用厚被蓋之再進葱白湯一鍾少頃汗出如淋從容去其覆物其病如脫此雖味澁難服其效甚妙

萬靈奪命丹（大全）療一切疔毒入腹煩悶惡心并癰疽發背惡瘡

輕粉　膽礬（各五銭）　朱砂（水飛）　蟾酥（人乳泡）　銅綠　血竭（各一両）　雄黃　枯礬（各二両）

共為細末麪糊丸如芡實大毎服一丸令病人先將葱白三寸嚼爛吐在手心將丸包在葱內熱湯呑下出汗疔毒已篤者二服即愈（丹方彙編）

蛇蛻（一條）　土蜂房（一具）

黃泥固濟燒存性為末毎空心好酒服一錢少刻大痛痛止其瘡已化為黃水

追疔奪命湯（急救仙方）能內消腫毒

羗活　獨活　防風　青皮　黃連　芍藥　細辛　甘草　蟬退　僵蚕　澤蘭　金線重樓

右等分水煎加少酒服以衣被蓋覆汗出為

度病退減後再加大黄利一両次以去餘毒

黄連解毒湯（正宗）療疔毒入心内熱口乾煩悶恍惚脉實者　黄連　黄芩　黄栢　山梔　連翹　甘草　牛旁子（各等分）　燈心二十根水煎服

救命仙方（外科纂要）療疔毒走黄打滚欲死者一服見効　牡蠣　山梔　銀花　木通　連翹　牛房子　乳香　没藥　角刺　瓜蔞仁　大黄　地骨皮（各八分）　右水酒煎便秘者加朴消（節正宗疔毒復生湯花粉代瓜蔞仁耳）

大乙紫金丹（正宗）解諸毒療諸瘡眞能起死回生方（出飲食中毒門）

疔瘡生根入腹者便死用磨針刀鐵漿水一碗絲綿濾淨銀窩内煎三四沸服之病者須臾腸鳴行利一二次甦醒方妙（瘡瘍經驗全書）

托裏護心散（啓玄）療諸疔疽發背曽經汗下毒氣攻心迷悶嘔而痛二三服而安　乳香（明浄一両）　菉豆粉（四両）　右細末毎服三錢甘草湯調

下。（此方原出于精要）

金瘡攧撲門

傷重昏憒者、急灌以獨參湯。雖内瘀血、切不可下。急用花蕋石散内化之。（方出卒失血門）恐因瀉而亡陰也。凡瘀血在内、大小便不通、用大黄朴硝。血凝而不下者、急用木香肉桂末三二錢、以熱酒調灌服、血下乃生。若口噤手撒、遺尿痰盛、唇青體冷者、虚極之壞症也。急投大劑參附湯、多有得生者。（正體類要）

參蘇飲（類要）療出血過多、瘀血入肺、面黑喘促。

人參（一兩）　蘇木（二兩）　右水煎服

鷄鳴散（三因）撲從高墜下及木石所壓凡是傷損瘀血凝積氣絶欲死　大黄（一兩）　杏仁二七（箇）

右研細酒一盌煎至六分盌去滓鷄鳴時服次日取下瘀血即愈若便覺氣絶不能言取藥不及急擘口開以熱小便灌之

撲亂打血攻心（醫法指南）　大黄　當歸　蘇木

紅花（各三分）　酒水各半煎服（案斯方勝於大成湯）

凡被打損血悶搶心氣絶不能言可擘開口尿中令下咽即醒又墮車落馬及車碾木打已死者以死人安著以手袖掩其口鼻眼上一食頃活眼開與熱小便二升（千金）

跌撲傷損去血過多脉微欲死獨參湯加童便接住元氣再處太法傷損及金瘡去血過多與產婦同脉來和緩者生急疾亢者死宜虛細不宜數實（證治大還）

摧壓跌扑從高墜下及竹木所磕落馬撲車氣沈重取藥不及擘開口以熱尿灌之用半夏

末吹鼻以艾灸臍再將患人盤足坐住將髮提起使氣從上升則可活矣（顧體集）

又方（危證簡便）皂莢末急吹入鼻亦可如活却以生薑汁和香油打勻灌之

療人被人打死或踢死（危證簡便）急取百會穴艾灸三壯立甦

撲打墜損惡血攻心悶亂疼痛（救急易方）用乾荷葉五斤燒令烟盡空腹以童便溫一盞調下三錢

傷經砍斷血筒血出如湧泉者是（醫學集成）銅末付之又用葱一斤炒乘熱熨之

自刎者乃迅速之變須救在早遲則額冷氣絕必難救矣氣從口鼻通出　生薑（五片）　人參（二銭）　白米（一合）　煎湯灌之接補元氣急用

縫合法（正宗）

自行被擷穿斷舌心血出不止以米醋用鷄翎刷所斷處其血即止仍用真蒲黃杏仁去皮尖硼砂少許研為細末煉蜜調藥稀稠得所

嗃化而安（得効方）

順血散（本朝經驗）療一切金瘡撲損及產後血暈

當歸　芎藭　芍藥　蒲黃　澤瀉

枳殼　人參　大黃　沈香　茯苓（各）一（錢）

接骨木五（錢）　甘草三（分）　右剉細每服二錢

入麻布袋用沸湯擺服之

五金所傷並竹木刺流血不止上身被傷急以銀一錠燒紅烙傷處如下身急以鉄一塊燒紅烙傷處其血立止此急救良方也（瘍醫大全）

可法良規云凡傷損之症若誤飲涼水瘀血凝滯氣道不通或血上逆多致不救若入於心即死急飲童便熱酒以和之若患重而瘀血不易散者更和以辛溫之劑睡臥要上身墊高不時喚醒勿令熟睡則血瘀不上逆故患重之人多為逆血塡塞胸間或閉塞氣道咽喉口鼻不得出入而死（瘍醫大全）

破傷風門

大豆紫湯（千金）療破傷風入四體角弓反張口噤不能言或產婦墮胎凡得此者太重不過五劑

大豆（五升）　清酒（一斗）

右二味以鐵鐺猛火熬豆令極熱焦煙出以酒沃之去滓服一升日夜數服服盡更合小汗則愈

破傷風瘡口作白痂無血者殺人最急療之（葉氏方）

右以雄鼠糞直者是研細熱酒調半錢服

鎮風散（正宗）療破傷風諸藥不効事在危急者用

之必應。鰾膠（挫斷微焙） 杭粉（焙黃即官粉） 皂礬（炒紅色各一兩） 朱砂（三錢別研）、為細末每服二錢無灰熱酒調下、外灸傷處七壯、知痛為吉、如一切豬羊癲風發時昏倒不省人事者每服三錢二服即愈不發

玉真散（本事） 療風自諸瘡口入為破傷風項强牙關緊欲死 防風 天南星 右為末每服三錢童子小便一大盞煎至七分熱服（三因名防風散） 打傷至死但心頭微溫以童子小便調下二盞并三服可救二人性命

香膠散（三因） 療破傷風口噤强直 魚膠（燒七分留性）、右研細入麝香少許每服二錢酒調下不飲酒米湯下或以蘇木煎湯下

破傷風血凝心針入肉三症如神方（醫治大還） 烏鴉翎燒灰存性細研服一錢滾湯下

大芎黃湯（活法機要） 療破傷風在裏者宜疎導

川芎、 羌活、 黃芩、 大黃（各二錢）

右水煎服臟腑通和為度

○湯火傷門

凡火焼損愼勿以冷水洗之火瘡得冷熱氣更深轉入骨壞人筋骨難瘥初被火焼急向火更炙雖大痛强忍之一食頃卽不痛神驗（千金）

火氣入腹熱悶柳葉一升煎湯服（萬全備急）

火焼欲死（廣筆記）好煮酒三罈入浴缼内令患者没酒中極重不死

療人卒中烟火毒用黄豆醬一塊調温湯一碗灌之卽甦（本草彙言）○療人遭火焼身爛垂死者

用臭醬一兩取氷白酒一二壺將酒頓溫不可過熱調醬於中令患者浸酒中燒極重不死（天啓甲子秋八月敎場火藥發燒死藥匠數百人內十餘人遍體赤爛未死者令行此方浸活如數）

療火傷（肘後）破鷄子取白塗之又取爨灰以水和罯罯爾以敷之亦以灰汁洗之

又方（衛生易簡）凡湯燒先用鹽末摻之護肉不壞後用藥傅

又方（本草附方）用瓶盛麻油以筯就樹夾取黃葵花

收入瓶內勿犯人手密封收之遇有傷者以油塗之甚妙

平時收老黃瓜不拘多少覓厚實磁瓶貯之藏暗濕處自爛為水將此水塗湯火傷處立時止痛可不起泡此余幼時墜入烈火半體皆傷連療不効得此方愈（顧體集）

清涼散（肯方類編）常療湯泡火燒敷之止疼立愈

大麥淨沙鍋內炒至漆黑為度取出以紙鋪地上出火氣研細末爛者乾摻末破者以

香油桐油調搽

療湯火傷（暴證知要）鷄黃油如法取傳　法用鷄子不拘多少煮熟去白留黃入銅杓內每十箇加菜油一小酒盞煎枯去查出火氣用傳甚佳謨齋陳君每用藥油救人即此也

湯煎膏火所燒（外臺）熟擣生胡麻如泥以厚塗瘡上

漆湯煎膏所灼火焰所燒（外臺）牛糞新者和以鷄子白塗之此常用之亦不作瘡不痛神效

火盪熟油傷（公選良方）鷄子清油調淋洗或用蜜塗

火藥傷（危證簡便）取鷄蛋清多年陰溝泥和勻傳神效○又方先用臘酒冷洗以拔其毒再以鷄子十數箇熟去白以黃炒焦黑取油約一盞用大黃研末二十兩和勻傳上三日全好

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯（金匱）療火邪

桂枝（三兩）　甘草（二兩炙）　生薑（三兩）　牡蠣（五兩熬）　龍骨（四兩）　大棗（十二枚）　蜀漆（三兩去腥）

右水煎

玄妙飲（丹臺玉案）療湯火所傷先服恐火毒攻心

黄連　花粉　玄參（各二錢）　陳皮　桔梗

山梔（各一錢五分）　竹葉十片水煎如藥不便

只用好酒溫洗拔其熱毒内服童便以護其心使火毒不内攻隨取大黄末桐油調敷卽垂危者皆保無恙

逐火丹（石室秘錄）療無意之中忽為湯火所傷遍身潰爛與鬼為隣服之可以變死而生

當歸（四兩）　茯苓　黄蓍（各三兩）　大黄

甘草（各五錢）　荊芥（炒黑）　黄芩　防風（各三錢）

右水煎

火燒湯潑粥盪油盪奇方（瘍醫大全）平日泡過茶的茶葉剩下的茶脚不拘甚的粗細茶葉用瓦罎一個放朝北地上日日逐裝在罎内聚之已滿用大磚一塊蓋好須得一年用之方妙愈陳愈好凡遇上症不問已潰未潰搽上卽定痛結痂第一驗方

火焼滾湯起泡（瘍醫大全）陳蕎麥麪打糊裱上立止

疼痛結靨

滾粥燂傷（瘍醫大全）錫箔遍貼神效如受傷重者可

嚥溫香油一鍾

顧世澄曰凡被火傷之人亟用羌活一兩煎服

俾火毒得汗外泄庶免内攻（瘍醫大全）

咬傷門

人齒咬破指頭痛不可忍久則爛脱手指幷手掌諸方不載急用人尿使瓶盛之將患指浸在内一宿即愈如爛者用龜殻焼灰敷之如無龜用鼈殻焼灰搽敷亦可（壽世保元）○人咬傷者用龜板或鼈甲焼存性爲末以香油調搽

（奇效單方）

又方（危證簡便）咬時一日内先用熱小便浸傷處洗淨牙黄瘀血次以龜板或鼈甲調搽若腫痛

焮發疼甚者亦與童便浸洗拭乾用粗草紙撚蘸麻油點火用烟熖薫腫痛上良久方住以解牙毒如臭腐淋漓用葱白三兩粉草五錢煎湯每日洗淨再用藥搽

又方（集驗良方）人咬用溏鷄屎塗咬處立刻止痛不成膿○又方用生栗子嚼爛敷之

又方（丹方彙編）用熱尿洗去牙黄瘀血以蟾酥丸塗入孔中或嚼白菓塗之如痛用麻油紙撚火熖薫之用乾人糞裝荔枝殼内安定咬處加

艾圓灸之以不痛為度

又方（危證簡便）人咬指用飯店内陳久快子（案即筋兒）頭數十箇燒灰存性研細用米湯調傚一箇套子套上雖極重者亦可救

瘵猘犬咬人方（附後）先嗍却惡血灸瘡中十壯明日以去日灸一壯滿百乃止（案嗍却惡血人不肯為之宜用角法嗍之）

又方（附後）生食蟾蜍鱠絕良亦可燒炙食之不必令其人知初得啗便為之則後不發

又方（千金）急用鍼刺去血以人小便洗淨用胡桃殻半邊以人糞填滿掩其瘡上着艾灸之殻焦糞乾則易之灸至百壯次日又灸百壯灸至三五百壯為佳（出東醫寳鑑案千金無所攷）

又方（聖惠）杏仁去皮尖研作湯頓服之良○又方黒豆煮汁服之甚良

又方（奇效單方）急於無風處以冷水洗淨即服韭汁一椀隔七日又一碗四十九日共七碗百日忌食徐本齋云風犬一日咬三人止一人用此方得活親其驗一用膽礬末傅患處立愈（秘方集驗云韭菜汁一椀服之百日内常食韭菜更妙○此原出千金）

又方（萬全備急）將番木鱉子煆灰一錢熱酒調服

又方（秘方集驗）番木鱉一錢銅鍋炒雄黄四分為末冷水調三分五厘服之大小便出血即愈

又方（奇方類編）番木鼈三箇虎脛骨三錢甘草一錢
右水酒各半煎服

又方（壽域）用生杏仁搗爛傅之立效（千金療凡犬咬杏仁熬黒研傅）

療顛犬所傷或經久復發無藥可療者用之極驗（醫方大成） 明雄黃（五錢） 真麝香（五分） 右研勻用酒調二錢服如不肯服者則撚其鼻而灌之服藥後必使聽切勿驚起令其自醒候利下惡物再進前藥則見効

犬咬涎入瘡令人昏悶浸椒水調莽草末塗之（本草附方）

療風狗咬（本朝經驗） 鐵砂（一錢） 番木鼈（六分） 甘草（五分） 右水煎服小兒減半若過劑令人迷悶不醒

又方（本朝經驗）急用熱小便洗淨咬處生杏仁研爛封之日一換冝服 防風 升麻 葛根（各五分） 杏仁（一錢） 甘草（一分） 右水煎此方甚効

又方（本朝經驗）灸咬處冝服 金銀花（五錢） 木鼈 檳榔（各三錢） 白芷 橘皮（各二錢） 番木鼈 礬石 杏仁 甘草（各五分） 右水煎或加鐵漿一七或加韮汁為妙服此藥每五日內

再用寛中丸瀉下五七行下盡毒為度

狗咬寛中丸　青黛　百草霜（各三錢）　檳榔

木鼈　杏仁　黒牽牛　黄連　番木鼈

黄芩　大黄　雄黄　鐵粉（各一錢）　巴豆

（四十粒）　右為細末稀糊為丸大人三十丸

小兒十丸白湯送下以上二方神効無比

衆療不差毒攻心煩亂嘇已作犬聲者天靈蓋

燒灰末以東流水和服方寸匕以活止○（外臺　嘇）

（音董多言也）

誤呑諸物門

誤呑鈎方（附後）若繩猶在手中者莫引之但益以

珠璫若薏苡子輩就貫之著繩稍稍令推至鈎

處小小引之則出

誤呑錢方（外臺）擣火炭末服方寸匕則出

又方（聖濟）葵菜不以多少絞取汁冷飲之即出

又方（魏氏方）爛嚼鳧茈燕之多為妙生熟皆可（一百

方云自然消化成水）

又方（事林廣記）草索頭寸剪十四段燒葵菜汁調服

誤吞銅錢（經驗良方）　木賊草為末毎服一錢用鷄子白調下

又方（怪症方）　多食胡桃自化出也胡桃與銅錢共食成粉可證矣

又方（傳聞類纂）　以小羊蹄草嚼嚥即下

誤吞金銀或銅錢入腹（衛生易簡）　石灰（一杏仁大）　硫黄（一皂莢子大）　同研末酒調服

又方（續醫說）　韭菜熟而不斷與蠶豆同咽之不過二次從大便出

又方（救急易方）　肥肉與葵菜作羹食數頓則銅鐵自然下

誤吞銅錢（救急良方）　用桑柴灰細研米飲調下二錢或用菉豆粉冷水調下三錢或生茨菰取呷或濃煎艾湯飲或多服餡糖立出○又方用艾蒿五両水五升煮取一升頓服之立下○又方以蜜一升服之即出

療誤吞鐵石骨刺等不下危急（外臺百一方）

王不留行　黄蘗皮（等分）　右為細末蒸餅

圓如彈子大以麻線穿之掛當風處每用一圓冷水化開灌下立效

誤吞銅鐵或金銀等物不能化（得効）用砂仁濃煎湯服之自下

誤吞針類（救急易方）用好磁石含之即出或爲末服方寸匕○又以香油一盞服之次用乾麪燒餅令人食飽其針隨大糞中出

誤吞針刺咽中痛者（瘍醫大全）亂蔴筋一團搓龍眼大以線穿繫留線頭在外以湯浸濕急吞下咽頃刻扯出其針必刺於蔴中而出如一回不中節再吞再扯○又方針入咽無藥可施癩蝦蟇數個將頭刴去倒垂流血以甌接之得一盃許灌入喉中移時連針吐出針自軟曲

兒誤吞針哽喉不下死在須臾（保元）用黑砂糖和黃泥爲丸令兒吞下泥裹針于内大便而下

誤吞鈎線（聖惠）螻蛄去身吞其頭數枚勿令本人知

誤呑線鏁（續醫説）啖以錫半斤卽於穀道中隨綫而下凡誤呑五金者皆可啖也

誤呑竹木入喉咽出入不得者（本草附方）故鋸燒令赤漬酒中及熱飮之○又方秤鎚燒紅淬酒飮之

誤呑稻芒（本草附方）白餳頻食又用脂麻炒研白湯調下

又方（直指）蓬砂牙消等分為末蜜和半錢含嚥

誤呑蜈蚣（蕩醫大全）急呑生鷄蛋三枚不可嚼次日卽裹出○又方生公鷄熱血灌入喉中蜈蚣卽出（案堅瓠集載以上二方並云要飲采油盞許須臾大吐以蜈蚣畏油故也）

又方（醫法指南）韮菜連根擣汁一大碗灌之

誤呑水蛭（本草附方）藍靛和酒絞取汁服

又方（口齒類要）食蜜卽愈試以活蛭投蜜中卽化為水屢驗一書云井中生蛭以白馬骨投之卽無試之亦驗夫蛭卽螞蝗也雖死為末見水復活呑之為害不小療以前法無不愈者

誤呑馬蝗腹痛（壽域）用田中泥為丸水呑下其蟲

必随吐瀉出

誤呑氷蝨食蜜即化（醫法指南）

誤呑田螺下喉將死者（奇方類編）將鴨一隻以水灌之少時將鴨倒懸令吐涎與病人服之即化

誤呑小蛇悶亂欲死（本朝經驗）柿餅五六枚水煎多飲之瀉下而愈

木屑搶喉（奇方類編）鐵斧磨水灌之即愈

誤呑髪繞喉不出（本草附方）元頭亂髪燒作灰水服一錢

誤呑大骨（篆竹堂方）南硼砂含化即愈

誤呑硝子碎片哽喉不下欲死（本朝經驗）款冬花根莖燒灰為末白湯旬服之○又方山厓黄土水攪頻頻飲之極驗硝子得土即消也

呑桃枝竹杖（瘍醫大全）但口中數數多食白糖自消去

誤呑磁鋒（瘍醫大全）生紅蘿蔔搗爛呑下其磁鋒即從大便而出

誤食諸蝨（本草附方）蜀椒制其毒

誤食蜘蛛暴死（本草附方）取猫涎送下解毒藥

諸物哽噎門（附 兒頭入臼 指入竹筒）

療魚骨鯁在喉中衆法不能去（外臺）取飴糖丸如鷄子黄大吞之不去又吞此用得効也○又方以少許硇砂口中咀嚼嚥之立下○又方小嚼薤白令柔以繩繫中央持繩一端吞薤到哽處引下哽當隨出（救急易方云綿一小塊以蜜煮用即與此法同）○又方作竹篾刮令滑綿纏內咽中令至哽處可進退引之哽即出○又方好蜜一匙抄稍稍嚥之令下良

又方（續醫説）速取新綿白糖二物、將綿裹糖、如梅大、令患人嚥下、入喉間、留綿一半于外、時時以手牽掣、俾喉中作痒、忽然痰涎纏出、其骨粘於綿上矣、

又方（魏氏）砂糖如鷄子大、爛嚼、仰面以熱酒嚥下、骨隨酒便下、又白梅取肉去核、以砂糖含化、須臾骨軟自下、此方甚驗、

又方（百一）縮砂甘草等分為末、綿裹含之、嚥汁、當隨痰出、

咽中骨哽欲死者（本草附方）白鳳仙子、研水一大呷、以竹筒灌入咽、其物即軟、不可經牙、或為末吹之、

療食諸魚骨骾久不出方（本事）右以皂角末少許、吹鼻中、得鯁出、多秘此方、（禮云、魚去乙、謂其頤間有骨如乙字形者、鯁人不肯出也○案此方原出聖惠）

金銀銅鐵哽（本草百病主治）縮砂濃煎服、或加甘草

鳳仙子及根（擂汁下、鐵物哽）銅

薤白　慈姑汁

鳧茈　胡桃　石灰（同硫黄少許、酒服）

竹木哽（百病主治）半夏（服取吐）鯽魚膽（點）

象牙（爲末水服）

桃李哽（百病主治）麝香（酒服）

棗核哽（萬全續方）人頭垢爲丸茶下十九吐之

小兒誤吞一錢在咽中不下以淨白表紙令卷實如著以刀縱横亂割其端作鬅鬙之狀又別取一箸縛鍼鉤於其端令不可脫先下咽中輕提輕抑一探之覺鉤入於錢竅然後以紙卷納之咽中與鉤尖相柢覺鉤尖入紙卷之端不疑肌肉提之而出（儒門事親）

療諸鯁方（十便）胡氏方云以木炭皮為細末研令極細如無炭皮堅炭亦可粥飲調下二錢日四五服以鯁下為度此法人家皆有（沈存中云在漢東乃目覩其神有劉晦士人隣家一兒誤吞一錢以此飲之下一物如大烏梅割之乃炭裹一錢也池州徐使君極寶此方數數用之未有不效者近歲累有人言得此方之效不復悉載）

療竹刺筅帚鬚鯁在喉中（菉竹堂方）用多年舊籬笆竹截斷煎濃湯吃下立愈

竹絲鯁（醫方大全）不拘黑白芝麻炒熟泡湯飲再以
乾芝麻嚼服幾口或以芝麻擣爛嚼食

呑銅在喉不出（醫方大全）麩炭末指彈入喉中其兒
當即咯出

誤呑桃李不下（醫方大全）以少許水灌小兒頭承其
水與飲即出

誤呑鐵釘横喉不下（本朝經驗）馬腹中石研末水調
嚥下少頃吐出神驗

飡餻噎咽逡廵至死（本朝經驗）釅醋灌鼻孔中立噴
出○又方蘿菔自然汁灌鼻中亦佳○又方
鐵漿少許灌口中○又方鷄冠血和生薑汁
灌口鼻中雖死立出而甦○又方冬葵子水
煎灌亦佳

一小兒五歳因戲劇以箸入擣藥臼中不復出
舉家驚呼無計或教之使執兒兩足以新汲
水急澆之兒驚啼體縮遂得出（醫說）

兒頭入臼（事林廣記）兒頭入鐵臼以噴嚏藥着鼻中
即出

指入竹筒（車林廣記）以石灰浸水蘸餉時即出

諸物入肉門

療針折入肉中（千金）刮象牙為末水和聚着折針上即出

又方（瑞竹堂方）螻蛄腦子（搥爛塗）上即出

又方　右用硫黄研細調貼以紙花貼定覺痒時其針即出

針棘竹木諸刺在肉中不出鼠腦擣爛厚塗之即出（肘後○危證簡便方云療醫針人病而針折在肉中）

針悞入肉無眼者不動有眼者隨氣血遊走若走向心窩胸膛者險（瘍醫大全）急用烏鴉翎數莖

炙焦黄色研細末酒調服一二錢俱可

如聖膏（瘍醫大全）療針入肉　車脂輩油不拘多少研如膏調磁石細末攤紙上如錢許貼之毎日換二次

竹木刺在肉中不出（千金）頭垢塗之即出○又方嚼白梅以塗之又温小便漬之

又方（劉涓子方）鹿角焼灰末以水和塗之立出久者不過一夕

蘆葦刺入肉（外臺）細嚼栗子粗盦傷處

療竹木刺入肉（良朋彙集）萆麻子搗爛塗上即出

又方（瘍醫大全）收晩蠶蛾入竹管内塞之凡遇竹木刺戳入肉内即取蚕蛾研細和津唾調塗之即出

又方（本朝經驗）蟷螂頭研和米糊攤紙花上貼之並療針入肉效

如神散（本朝經驗）療針及竹木刺入肉並一切骨哽悉効　松葉　鳳仙花莖葉并子　右焼存性各等分為末毎服五七分温酒送下針及

竹木刺入肉者須刻出其効如神

療少陽魚刺（醫方集宜）用大麥不拘多少濃煎薫洗傷處即止（案海鷂魚食鑑一名少陽魚藏器云尾有大毒海人被刺毒者以魚尾竹及海獺皮解之）

又方（本朝經驗）焚樟腦或樟木枝葉薫之以解刺毒

中藥毒門

甘豆湯（千金）甘草解百藥毒此實如湯沃雪有同神妙方稱大豆汁解百藥毒余每試之大懸絕不及甘草又能加之為甘豆湯其驗尤奇（百一選方加淡竹葉）

凡中相反藥毒面青脉絕腹脹吐血（瘍醫大全）蠶退紙（卽出過蠶的紙）燒灰研一錢冷水調服雖危可活

石藥毒用白鴨屎人參（千金）甘草安和七十二種石一千二百種草解百藥毒（本草）

雄黃毒用防己（本草）

鐵粉毒用磁石　皂莢　乳香（本草）

錫毒用杏仁（本草）

礜石毒用大豆汁（本草）

桔梗毒用白粥（本草）

躑躅毒用梔子汁（本草）

杏仁毒用藍子汁（本草）

金銀毒水銀服數兩即出　鷄屎汁　煑葱白汁　鴨血及屎汁並療（本草）

大戟毒用菖蒲汁（本草）

甘遂毒用黑豆汁（本草）

芫花毒用防己　防風　甘草　桂汁（本草）

藜蘆毒用雄黃　溫湯　煑蔥汁（本草）

半夏毒用生薑及乾薑汁　南星毒同（本草）

蜀椒毒用葵子汁　蒜　桂汁　人屎　冷水　土漿　鷄毛燒吸烟及調服水（本草）

硇砂毒用菉豆汁　浮萍（本草）

丹砂毒用藍青汁　鹹水（本草）　用鹽半兩以冷

水攪勻令澄旋旋服之又以蚌肉食之良（奇効良方）

桂毒用葱汁（本草）

銅毒用慈姑　胡桃　鴨通汁（本草）

苦瓠毒用稷米汁　黍穰汁（本草）

瓜蒂毒用麝香（本草）○又方（本朝經驗）服瓜蒂吐不止啜味噌汁又令患人踞床以桶盛冷水漬脚至膝立止（案博物志以冷水漬至膝啖瓜至數十枚）

解砒霜毒（本草）煩躁如狂心腹疼痛四肢厥冷命在須臾黑鉛四兩磨水一盌灌之○又方麻油一碗灌之（經驗良方云立可起死神驗○暴證知要云緊束其腹吐之）

又方（百一）白扁豆不以多少為細末入青黛等分細研再入甘草末少許巴豆一枚去殼不去油別研為細末取一半入藥內以砂糖一大匙水化開添成一大盞飲之毒隨利去後服五苓散之類（醫林集要用益元散）○又方釅醋多飲之吐出毒即解不可飲水

又方（危證簡便）急以人屎汁灌之即解若在胸中作

楚者急以膽礬三分研細冷水調灌即吐出若在腹中痛甚者宜用黒鉛四両磨水両三碗漸磨漸灌即大瀉出毒氣而愈○在膈上則瓜蔕散吐之在腹中則萬病解毒丹下之（入門）

救急丹（辨證録）天下毒藥莫此為甚救法必須吐其毒

甘草（二両）　瓜蔕（七箇）　玄參（二両）　地楡（五銭）

水煎服一下喉即吐再煎渣服之又吐砒霜之毒必然

苦參湯（辨證録）此方亦神妙苦參三両煎湯一碗一氣服之即大吐而愈○總以吐解毒盡為度醒後仍顛不語者每日以菉豆水飲之毒盡自愈（秘方集驗）

瀉毒神丹（石室秘録）服砒霜之毒五藏欲裂者腹必大痛舌必伸出眼必流血而死最可憐也急用此

當歸（三両）　大黄（一両）　白礬（一両）　甘草（五銭）

水煎湯數椀飲之立時大瀉則生否則死矣

砒霜服下未久者取鷄蛋一二十箇打入碗内攪勻入明礬末三錢灌之吐則再灌吐盡便愈（洗冤錄）

解砒毒神驗方（秋燈叢話）白礬三錢調水飲之立解

黄礬散（醫學心悟）服毒者砒信為重也用小薊根搗汁飲之立救或用此散療據云奇效

大黄（一兩）　明礬（五錢）　共為末每服三四錢冷水調下

誤中砒毒横身紫纍百解不效此名砒霜纍瘡（瘍醫大全）黄土地上挖一斗大坑以井水滿之攪令渾濁以一碗與之少刻又與之待渾身紫纍俱散一吐即甦雖冬月間亦宐用此法必效

解斑猫毒（百一）以澤蘭挼汁飲之乾者為細末白湯調下

又方（青嚢雜纂）玉簪根擂水服之即解

又方（洗冤錄）黑小豆汁服之差用肥皂水灌下再以鵝翎絞喉數次令吐即活〇又方用生鷄

卵開孔灌入口中連灌五六枚得吐卽活倘閉以箸抉開灌入

療食野葛已死者方（肘後）以物開口取鷄子三枚和以灌之須臾吐野葛出○又方取生鴨就口斷鴨頭以血瀝口中入咽則活若口不開取大竹筒以一頭拄其胸脅取冷水注筒中數易注之須臾口開則可與藥若甚者兩脅及臍各筒注之甚佳○又方飲甘草汁但唯多更善

又方（千金）煮桂汁飲之又啖葱涕佳（葱涕療諸毒）

又方（秘方集驗）急以升麻湯探吐亦妙○又方用犬糞汁灌下卽可解或用韮菜汁灌下亦可

通腸解毒湯（辨證錄）療服斷腸草氣不能通腹痛便閉而死

甘草（一兩）　大黃（一兩）　金銀花（一兩）

水煎服下瀉

胡蔓草（卽鉤吻）葉如茶其花黃而小一葉入口百竅潰血人無復生廣西愚民私怨茹以自斃家人覺之急取抱卵未生鷄兒細研和以清

油幹口灌之乃盡吐出惡物而甦少遲不可救矣如人誤服此藥者止以前法解之（廣南衞生方）

烏頭天雄附子毒用大豆汁遠志防風棗肉飴糖（本草）○又用人參汁陳壁土（泡湯服）綠豆汁井華水（宋朱子文集云中烏頭毒勢甚危惡多飲新水大嘔泄而解此亦不可不知也）

又方（百一）多年壁土熱湯泡攪之令濁少頃乘熱去脚取飲不省人事灌之或掘地以水攪漿水飲亦妙

又方（本朝經驗）　班猫（五分）　大黄（一錢）　甘草（二分）

右為末水調下不肯飲撚鼻灌口内當救萬一

凡風犬咬者百日内忌飲酒忌食雞鵞羊猪肉肥膩諸口味及發風毒物麻物赤小豆倶不可見丁年勿食茄子終身忌食狗肉（危證簡便）○蕎麥赤小豆三年勿食之青梅實百日勿食之

崔氏云凡初被咬即覔一切物與喫後不發也

外臺

療常犬咬人傷處毒痛心悶（聖惠）

桃白皮（剉）一兩　杏仁（半兩生用）

右水煎服當吐狗毒差

療狗咬人（聖惠）以火灸瘡中腫上擣韮汁飲三二合日三五度瘡差即止

又方（危證簡便）先用米泔水洗傷處令極淨再以杏仁口內嚼爛敷之以帛縛之即差○又方松香為末傳之極効

凡犬傷人量所傷太小杏仁爛咬沃破處以帛繫定至差無苦（本草衍義）

又方（危證簡便）白礬納瘡中裹之止痛速愈

又方（同春）銀杏塗傷處

又方（袖珍）蓖麻子五十粒去殻以井花水研膏先以鹽水洗咬處乃貼此膏（危證簡便續方云萆麻仁研如膏先以藍水洗淨敷上即愈）

又方（山居便宜）燒蟾蜍為末傳之

狗咬血不止急以砂糖塗之立愈（博聞類纂）

犬咬傷瘡重發者用蔓青根擣汁服之（肘後）○又

方以蠟炙溶灌入瘡中（山居便冝云搗生蘿蔔汁服之可解）

療狗咬極重者雖遍身咬碎揉立刻止疼神効

方（續危證簡便方）用蚯蚓擣爛搽數狗咬眼内以帕縛之數日令愈奇驗

療犬咬傷不可便貼膏藥及生肌類閉毒於内也當先用舟車丸禹功散通經散等藥隨便服利十餘次腫減痛止後方敷貼（儒門事親）

療猫兒咬（百一）研薄荷汁塗之立効

療猫咬傷人常有竊窓放尿被猫咬其陰頭其人將死用老鼠糞燒灰蔴油調傅立效豈非物類相感而可以相制乎（壽域神方）

療猫咬（本朝經驗）雄黄末水調塗咬處○若猫毒不盡寒熱時發或遍身發斑者用鼠毒神方兼服紫金錠甚効

療鼠咬（聖惠）麝香封咬處上以帛繫之

又方（壽域）用砂糖調水冷服立效○又方猫屎揉之即愈

又方（危證簡便）桐油塗之○先以鹽湯洗淨次傅藥

又方（秘方集驗）班猫燒灰麝香少許津唾調敷

又方（本朝經驗）急以火硝盛咬處點火發之以散毒氣次將牡蠣石灰黃栢三味為末調繁縷汁塗咬處服後方

鼠毒神方（本朝經驗）療鼠咬毒或經久寒熱淋瀝如勞或遍身發紫赤斑或骨節疼痛精神不爽

當歸　芎藭　生地　芍藥（各一錢）　沈香

洋參（各五分）　茯苓（七分）　紫檀（八分）　白檀（六分）

甘草（二分）　千屈菜（八錢六分）　右每帖二錢水煎服忌食一切油膩動風物○若發斑於其上以鍼去惡血兼服紫金錠（亦療猫咬毒）

柞木皮湯（本朝經驗）療鼠咬傷　柞木皮（二錢）　當歸（三分）　川芎（三分）　金銀花（一錢）　大黃（五分）　甘草（一分）　右水煎服（柞木即櫟也實名橡斗者是ナリ）

療馬咋及踏人作瘡有毒腫熱疼痛（肘後）灸瘡中及腫上即差

又方（外臺）割雞冠血點所齧瘡中日三

又方（救急易方）灸訖或人屎或馬屎或鼠屎燒為末

和猪脂但取一味皆可傳○又方用益母草細切和醋炒封之

又方（醫説）用栗子細嚼付之立效

又方（秘方集驗）艾灸傷處内服蘇木湯一碗即止痛○服童便韭汁亦妙寒水石末敷傷處旬日亦愈

馬咬毒入心用馬齒莧煎湯服之立瘥（聖惠）

馬咬成瘡腫痛石灰傅之效（危證簡便）

猪齧人（千金）錬松脂貼上（山居便冝云以松脂鎔作餅子貼之以帛縛定）

○又方屋霤中泥以敷之（救急易方云即今之承溜也）

又方（危證簡便）梓樹葉擣敷之

猪咬成瘡（本草附方）龜板燒研香油調搽之

獠蛇咬方（十便）大衍方云黄蠟鎔化滴瘡口内蛇齒有四凡咬處必有四竅毎竅滴入黄蠟應時不痛其毒立散經時毒氣已入腸胃者用黄蠟為丸菉豆大研雄黄為衣酒呑下十圓或十五圓毒氣内消

又方（丹溪心法）急以小便洗出血次取口中唾塗之

又以牙涎封傷處傅而護之甚妙且不痛腫（山居四要云用犬糞傅患處亦佳）

路行卒被蛇咬當急扯裹脚帶扎縛傷處上下寸許使毒氣不能惔傷肌體又急用白礬安刀頭火上溶汁沸滴於傷處待冷以長篦子速挑去釁則毒血隨出黯腫尚未退更滴之以退為度村居山僻及途中夜行卒被蛇傷咬難求白礬處速作艾炷灸五壯以唾調鹽塗之如黯腫尚未消當更灸更搽毒涎自然流出且不透裏傷人蜈蚣咬亦宜灸（醫學綱目）

○趙延禧云遭惡蛇所螫即帖蛇皮便於其上灸引去毒氣即止（醫說）

療蛇咬（醫學綱目）　細辛（五錢）　白芷（五錢）　雄黃（二錢）
　麝香（少許）　右為末每服二錢溫酒調服

蛇傷潰爛百藥不愈以新水數洗淨腐敗見白筋挹乾以白芷末入膽礬麝香少許摻之惡水湧出數十日平復（夷堅志）

回生酒（醫鑑）療毒蛇所傷至死　杠板歸不拘多

少研爛用汁與生酒調服隨量飲之渣貼患
處立已

療蛇咬（聖惠）　白礬　甘草（各一兩）　右為散如蛇
螫着之時心頭熱躁眼前暗黑用新汲水服
一錢即止（瑞竹堂方名解毒散）

又方（救急易方）　急於無風處以麻皮縛咬處上下刀
剜去傷肉小便洗令淨燒鐵物烙之然後塡
蚯蚓泥次塡陳年石灰末絹扎住輕者針刺
瘡口弁四旁出血小便洗淨以蒜片着咬處
艾灸三五壯

又方（頤體）用藍葉搗汁調雄黃末敷之或用雄黃
一錢生礬二錢杓內溶化將筋頭蘸藥傷處
冷則易之連點七次若毒走腫痛者以麻油
熖熏之再用解毒紫金丹一錢酒磨服之取汗

魚腥草（即蕺菜）　療蛇傷用之輒愈亦解蕈毒（吳蕈譜）

毒蛇咬烟袋燒熱滴油搽之百試百效（瘍醫大全）○
又烟袋內油塗四邊腫處即消切不可塗咬
傷孔內

又方（本朝經驗）生柹及柿餅搗爛傅咬處極效若無生柿及柿餅用柿漆亦佳

蛇咬忌食酸物梅子犯之大痛（醫學綱目）

療卒為蛇繞不解（千金）以熱湯淋之無令人尿之

療蛇入口或入七竅（千金）一人因熱逐涼睡熟寤着有蛇入口中挽不出用刀破尾入生椒二三粒裹着須臾自出

又方（肘後）艾灸蛇尾即出若無火以刀周匝割蛇尾截令皮斷乃將皮倒脫即出○至道方云蛇出後急以雄黃朱砂細研煎人參湯調下灌之取蛇毒便下

蛇入七竅劈開蛇尾納川椒數粒以紙封之其蛇自出更煎人參湯飲之或飲酒食蒜以解內毒如被蛇咬食蒜飲酒更用蒜杵爛塗患處加艾於蒜上灸之其毒自解凡毒虫傷並效（口齒類要○衛生易簡云急以手捻定用刀刻破以辛辣物置破尾上用綿繫之自出不可力拔）

又方（瘍醫大全）以針刺其尾不過二三針則褪出

蜈蚣螫人（肘后）割鶏冠血塗之差又嚼鹽塗之効

又嚼大蒜若小蒜以塗之

又方（外臺）挼藍汁以漬之即差○又方取錫炙令熱以熨之不越十度即差

又方（聖惠）取蝸牛搽取汁滴入咬處須臾自差此方神驗○又方取蠟少許將筆管坐所咬處鎔蠟滴向管内令到創上三四滴便止

又方（衛生易簡）以生薑汁調雄黄末貼傷處瘥○又方用燈草蘸油點燈以烟薫之不問他毒虫傷皆可用此薫極驗（壽域方云用筆管一箇合在傷處用紙點燈火燒着吹滅將烟入筆管内用烟薫傷處止）

又方（秘方集驗）用艾於傷處灸三五壯拔去毒即愈

中蜈蚣毒舌脹出是也雄鶏冠血浸舌並咽之

一男子為蜈蚣入咽喉中咬之垂死之際一醫令殺生鶏血乘熱灌喉中蜈蚣即出而愈實良方也（青囊雜纂）

蜂螫人（肘後）取人溺新者洗之差又刮齒垢塗之

又方（千金）以淳醋沃地取泥塗之

又方（救急易方）用釅醋磨雄黃塗傷處
又方（本草衍義）用生芋梗塗之立効○又生芋頭刮
汁傅之（夢溪筆談）
又方（醫法指南）用吐沫調硃砂擦之又療蜈蚣傷
療壁宮咬（聖惠）取青麻葉心七枚以手挼令汁出
塗之差○又方硇砂雄黃各半兩同細研挑
破瘡內藥在瘡中
又方（願體）壁虎咬傷最難救療以青苔塗擦再用
敗毒散加青苔三錢煎服

蜘蛛咬（外臺）取生鐵衣以醋研取汁塗之差
又方（千金）以烏麻油和胡粉如泥塗之乾則易之
取差止
又方（外臺）以蒜摩地取泥塗之
又方（聖惠）雄黃（一分）　麝香（一錢）　藍汁（一大盞）
右為末於藍汁中以塗咬處立差○又方嚼
薤白傅之立効○又方嚼續隨子傅之立差
又方（直指）縛定咬處勿使毒行以貝母末酒服半
兩至醉良久酒化為水自瘡口出水盡仍裹

瘡口甚妙

又方（本草附方）烏鷄屎浸酒服又取冠血塗之

又方（醫學綱目）蜘蛛咬諸般蟲咬用葛粉生薑汁調傅

壁鏡毒人必死（酉陽雜俎）桑柴灰三度沸取汁調白礬末為膏塗瘡口即差

又方（救急易方）醋磨雄黃塗之妙

又方（本草附方）用大黃研醋水塗傷處立效

毛蟲螫人（本草附方）赤痛不止馬齒莧搗熟封之妙

又方（醫學綱目）雜色毛虫極毒凡人觸着則放毛入人手足上經數月痒在外而痛在内骨肉皆爛有性命之憂此名射工毒諸藥不効用鍋底黃土為末以酸醋揑成團於痒痛處搓轉其毛皆出在土上痛痒立止神効無比（黃土即伏龍肝也）又取蒲公英根莖白汁傅之立瘥

又方（危證簡便）甘草口内細嚼傅之立時愈○又方如肉已爛用海螵蛸為末傅之愈（經驗良方）

療惡蟲咬（聖惠）蛇蛻皮煮湯洗二十兩度又燒灰水

和傳瘡上○又方紫草浸油塗之

療蛇毒及一切虫傷但有小氣可以下藥即活

神效（千金）麥門冬煎湯調香白芷末服之腥穢黄水自口中出

凡蛇傷虫咬倉卒無藥去處以大藍汁一椀雄黄末二錢調均點在所傷處併令細細服其汁神驗如無藍以澱花青黛代之（醫説）

療諸蛇虫傷毒用青黛雄黄等分為末新汲水調下二錢服（衛生易簡）

諸虫咬傷（本草附方）以燈火熏之出水妙

又方（救急易方）諸惡虫傷以膩粉生薑汁調傅傷處

又方（奇効良方）用白礬雄黄黄蠟等分丸如指頭大遇有傷處匙上溶開滴傷處或以竹筒挼上滴入則毒不散

雄黄散（千金）療一切惡虫咬著人成瘡不可辨認醫療不効者（上）　雄黄　硇砂　白礬　露蜂房（各等分）　右為細末入麝香少許同研勻用醋調塗瘡上難辨認者尤宜速療（三）

五曰毒氣入心不得聞哭聲（衛生易簡無白礬有乳香療下）

（十七般虫咬傷人及瘡腫上）

凡蟲畜所傷痛極危急或因傷經風而牙關緊閉角弓反張不省人事者此毒流經絡也急用蒜切片以艾灸之令傷處着火痛裂則氣聚而毒隨氣返返則毒提傷處得火而散即隨火瘡而泄不致內攻矣若灸十餘壯不應即加至三五十壯無不應手而愈者故療癰毒者以隔蒜灸法有回生之功也古人有淋洗灸刺等法正以引導經絡祛邪解散之意予遇施此法而應手者比比故記之（醫級）

誤中蛇虺百蟲毒（瘍醫大全）雄黃（一錢）巴豆（去油一粒）乾薑（五分）麝香（一分）共研細開水調服

諸物入耳門附（入鼻　入目　眼被物撞着）

療耳中有物不可出方（千金）以弓弦從一頭令散傅好膠柱耳中物上停之令相著徐徐引出（附後附方云麻縄剪令頭散）

百虫入耳（千金）蜀椒末一撮以醋半升調灌耳中行二十歩即出○又方火熨桃葉捲之取塞耳立出○又方以葱涕灌耳中虫即出○又方若甲虫入耳者以火照之即向明出或蚰蜒諸蟲入耳以酢灌之或麻油或人尿亦佳

又方（衛生易簡）用鷄冠血滴入耳中即出○又方用蒼耳草搗自然汁灌少許於耳内其蟲即傾出

百蟲入耳不可驚動如在左耳以手緊閉右耳及兩鼻孔努氣至左耳虫自出右耳亦然（集驗良方）○又方宜閉口勿言以紙塞耳竅鼻竅只空虫入之耳用蒜油滴入耳竅中或出或死（瘍醫大全）

如蟲夜間暗入者切勿驚慌喊叫逼虫内攻宜平坐點燈光向耳竅其虫見光即出對面有人其虫不出（正宗）

蜈蚣入耳（肘後）以木葉裹鹽炙令熱以掩耳上即出冷復易之驗○又閉氣満即吐之復閉準前以出為度或死耳中徐徐以鉤針出之

又方（救急易方）用生薑汁灌耳中自出○又方（本朝經驗）用蘿蔔汁灌耳中亦佳

蚰蜒入耳（聖惠）小蒜搗研取汁灌耳中自出○又方地龍一條納葱葉中化水滴耳中其蚰蜒

亦化為水

又方（瑞竹堂方）蝸牛全搥碎置於耳邊即出

又方（衛生易簡）用龍腦少許吹入耳中其虫即化為水○又方用猫尿灌耳中立出取猫尿用盆盛猫以生薑擦牙

飛蛾入耳（肘後）先大喻氣仍閉口掩鼻呼氣其蟲隨氣而出○又方閉氣以葦管極吸之即出

亦療百蟲入耳（百代醫宗吸虫訣云療諸虫入耳藥品不便者此法最妙竹管入透半耳中使口用力一吸其虫隨氣而出俗人未識此捷）

又方（衛生易簡）用醬汁灌耳中又撃銅器於耳傍

蟻入耳（肘後）燒陵鯉甲末以水和灌之

療小蟲蟻入耳挑不出（衛生易簡）燈心浸油釣出虫

療百節蚰蜒并蟻入耳（本草附方）苦酒注之起行即出

水入耳中（救急易方）用薄荷汁點之立效又用麻油點耳内立出

水銀入耳及入六畜等耳皆死（怪症方）以金銀着耳邊水銀即吐出

療黄豆入耳（救急易方）用鵝翎管截作長一二寸許去其中膜留少許於一頭以有膜之頭入耳中口氣吸之即出

又方（本朝經驗）若在左耳以手緊塞右耳及両鼻孔令閉氣一人將中指緊按虫入耳根下凹處一手將耳朶向下引挽患人一勢努氣豆自出右耳亦然

諸物入鼻不出（本朝經驗）作紙撚刺鼻打嚏一聲即出若不出頻頻取嚏為佳

療目卒苡草沙石輩眯不出（肘後）磨好墨以新筆點注目中瞳子上

又方（聖惠）療雜物眯目不出鷄肝血注目中神效

○又方白蘘荷根擣絞汁注目中即出○又方書中白魚以乳汁和研注眼中良

又方（聖濟）生栗七粒嚼爛取汁洗之即出・

又方（本草）大藕洗搗綿裹滴汁入目中即出・

麥芒入眼不出方（外臺）煮大麥汁注眼中即出良

眼被物撞着（聖惠）杏仁爛研以人乳汁浸頻頻點

又方（葉氏方）牛漩日兩三次點之避風黑睛破亦

可

又方（本朝經驗）水仙花根掘取洗研爛和沙糖點眼

中○又方麻蠅頭數十箇研和砂糖水點眼

中○又方鹿茸為細末調人乳頻頻滴眼中

又方（本草）童尿飲之又黃連湯飲之

又方（瑣碎錄）麻痺不省者竹青濃煮汁溫冷服之

又方（保元）嘔吐不止以香油灌下立解

又方（暴證知要）目赤狂躁用蘿蔔汁入黃連甘草汁

各半盞服

又方（博聞類纂）急以冷水漱口飲一二口尤佳蓋野

猪每中藥箭必走入溪澗飲水此其驗也○一

方飲少生麻油

一人服附子酒多頭腫多如斗唇裂血出急取

菉豆黒豆各數合生嚼併煎濃汁飲之廼解（危證簡便）

巴豆毒用煮黄連汁大豆汁菖蒲汁煮寒水石汁冷水（本草）

又方（肘後）下利不止黄連乾薑等分為末水服方寸匕又大豆煮汁一升飲之

又方（危證簡便）以黄連黄栢煎湯冷服忌食熱湯熱性藥物

又方（百一）生油即解

又方（怪症方）芭蕉根汁解之

又方（本朝經驗）下利不止困頓用參連湯　人參（二錢）黄連（一錢）　水煎兼啜冷粥

解輕粉毒（本草）齒縫出血臭腫貫衆黄連各半兩煎水氷片少許時時漱之

又方（醫方摘要）出山黒鉛五斤打壺一把盛燒酒十五斤納土茯苓半斤乳香三錢封固重湯煮一日夜埋土中出火毒每日早晩任性飲數杯後用瓦盆接小便自有粉出為驗服至筋

骨不痛乃止

又方（暴證知要）誤呑輕粉筋骨痛川椒半斤湯泡晒乾三泡三晒為九天花粉為末空心温酒下五十丸

又方（萬全備急）黒鉛焼熱淬酒數次飲之

又方（奇方類編）川椒去目每日清晨呑之任意不拘多少白湯下

中水銀毒（萬全備急）生炭為末煎汁服

又方（本草）黒鉛解之

又方（湯醫大全）揀開口花椒二兩呑下卽裹水銀從大便出

解鉛粉毒（秘方集驗）砂糖調水服又肥皂搗爛取汁灌下皆效○又方以麻油調蜂蜜與服（敬信錄）

皂礬毒（湯醫大全）急取麵糊一鉢服之

多服犀角令人煩悶（入門）麝香一字調水飲之

硫黃毒用米醋黒鉛鐵漿朴消（本草）○又方黒錫煎湯服即解

又方（聖濟）硫黃毒發令人背膊疼悶目暗漠漠烏

梅肉焙一兩沙糖半兩漿水一大盞煎七分

呷之

啞芙蓉毒（保元）或不省人事用釅醋溫熱入砂糖

灌下一二椀探吐之

大黃芒消毒（暴證知要）泄瀉不止用炒乾薑半兩甘

草二錢烏梅二箇水煎服（陶氏殺車搥更有粳米人參白朮附子皮升麻右燈心一握水煎入炒陳壁土一匙調服）

麻黃毒（暴證知要）汗出不止將病人髮撒水盆中足

露于外用炒麩皮布褁款款熨之如再不止

用撲粉

撲粉方（醫方考）龍骨　牡蠣　糯米（各等分）

右為末撲之（孝慈備覽用麩皮糯米粉各二升龍骨牡蠣各二兩極細末以踈絹包裹周身撲之）

誤食藤黃（萬全續方）吃海蟄即解（案續醫說云氷母吳人名為海蟄）

誤服銀硃藤黃（瘍醫大全）韲菜水溫服即解

誤服銀粉（瘍醫大全）蔴油　黃蜜　紅砂糖

攪勻服之○又方多食生荸薺即解○又方

香油灌之○又方急搗蘿蔔汁飲之

桐油毒（本草）吐不止乾柿餅食之又甘草解之
又方（救急易方）熱酒飲之良
中石炭毒昏瞀飲冷水即解（本草）
服藥過劑悶亂者（外臺）水和胡粉　水和葛根
地漿　蘘荷汁　粳米瀋　豉汁　乾薑
黄連　飴糖　飲藍汁　呑鷄子黄　刮
東壁土少少以水一二升和飲之良　燒犀
角水服方寸匕　凡此諸藥飲汁解毒者雖
危急亦不可熱飲之待冷則解毒熱則不解

毒也
凡解藥毒湯劑不可熱服宜凉飲之蓋毒得熱
則勢愈盛也然此特以中熱毒爲言耳若解
木鼈菌蕈黄連石膏之類而中陰毒者豈仍
避熱而猶堪以寒飲乎（瘍醫大全）
集驗療中諸毒藥未死但聞腹中煩寃剝裂作
聲如腸胃破斷狀目視一人成兩人或五色
光起須臾不救方（外臺）取新小便和圊邊久屎
一升絞取汁一升頓服氣已絶但絞口與之

入腹便活也已死萬一冀活但數與屎汁也
療藥毒不止煩悶（千金翼）　甘草（二両）　白粱粉（一升）
蜜（四両）　右水煎如薄粥飲一升（楊氏家藏方不用白
粱粉用菉豆粉名甘粉散解一切藥毒）
礬灰散（三因）　療中諸毒　白礬　牙茶（各等分）
右為末每服二錢新汲水調一得吐即效未
效再服（楊氏家藏方名備急散此藥入口味甘而不覺苦者是中毒也）
青黛雄黃散（三因）　凡始覺中毒及蛇虫咬癰疽纔
作即服此令毒氣不聚　上好青黛　雄黃
（等分）　右為細末新汲水調下二錢
化毒散（楊氏家藏）　療中藥毒吐血或心痛或舌尖微
黑口脣裂嚼豆不腥者是　巴豆（一枚去心膜研如泥）
黃丹（半錢）　雄黃（一字同研細）　右用烏鷄子一
枚煎盤內煎成餅摻藥在上捲為筒子臨臥
一服爛嚼茶清送下當夜取下毒
解毒藥用露蜂房甘草等分用麩炒令黃色去
麩為末水二椀煎至八分令温臨臥頓服明
日取下惡物極妙（壽域神方）

誤食毒藥咽喉急閉（魏氏家藏）用羊蹄根細研醋調飲吐出涎灌蜜水聲方出

療中諸藥毒（衛生易簡）用四物湯香蘇散各一貼和煎服或嘗草根研汁飲之

解一切藥毒（百一）白扁豆生熬乾為細末新汲水調下二三錢呉内翰備急方云服砒霜大渴利腹脹欲裂以水調隨所欲飲與之即安○

又方續隨子隨多少以熱湯送下毒即隨大便利去

療吐却惡毒物後覺胸心不安穩（聖惠）茯苓　麥門冬　人參（各一両）　青竹茹（半両）　棗三枚水煎服且宜食粥

中飲食毒門

飲食中毒煩懣療之方（金匱） 苦參（三兩） 苦酒（一升半）

右煮三沸三上三下服之吐食出即差或以水煮亦得○又方犀角湯亦佳

貪食食多不消心腹堅滿痛（金匱） 鹽（一升） 水（三升）

右煮令鹽消分三服當吐出食便差

蜀椒閉口者有毒誤食之戟人咽喉氣便欲絶或吐下白沫身體痹冷急療之方（金匱） 濃煎豉汁飲之 桂煎汁飲之 飲冷水一二升

或食大蒜或飲地漿

誤呑椒閉氣不通（百一）喫京棗三個解之

食諸菌中毒悶亂欲死療之方（金匱）大豆濃煮汁飲之人糞汁飲一升土漿飲一二升

服諸吐利藥並解

食楓樹菌而笑不止療之以前方（金匱）

誤食野芋煩毒欲死療之以前方（人種芋三年不收成野芋）（並殺人〇金匱）

療中蕈毒同菰毒（聖濟）左纏藤取枝葉煎汁服之

又方（夷堅志）取金銀花生啖甚驗

又方（得效方）用芫花生為末每服一錢新汲水調服以利為度

又方（朱氏集驗）茱萸煎湯服吐下解又熟艾煮服三五盞雄鷄取熱血灌之

又方（秘方集驗）六一散（滑石六錢甘草一錢研勻）每服二錢水調服效

又方（鄉藥集成）生茄少許和油食之（村家救急方作冬瓜）癸丑年家僮摘蕈燒於火中戲云食之味甘一婢

信之食少許又二婢在傍取食些少須臾二婢眩悶一時倒竈中二人入房而倒倉卒無藥令食生水又喫與真油一小滴然後目開渠云眩悶中生水入口則一路冷徹咽中始知有生理

療蕈毒欲死（百一）用石首魚頭白水煮濃汁灌之

解菌湯（辨證錄）療悞食毒菌胸脹心疼腰痛腸瀉而死（上）甘草（二兩）白芷（三錢）水煎服服後乃用鵝翎掃其咽喉引其上吐必盡吐出而愈

又方（辨證錄）白礬（五錢）瓜蒂（七枚）水煎服非吐即瀉而愈

食松蕈中毒（本朝經驗）喫豆腐解之

諸蕈如餹蕈之屬經久皆毒人食之並有害茄子水煮食之且飲煮汁解之（本朝經驗）

野菌毒（百病主治）生薑　甘草（煎麻油服）防風（汁）胡椒　生薑　梨葉（汁）荷葉（煎）阿魏　童尿　人屎汁（案吳蕈譜云食蕈中毒二便頻遺身軟口噤以甘草濃煎灌之獲愈）

食芋中毒（本朝經驗）地漿　生薑汁

食蟹中毒療之方（金匱）紫蘇煮汁飲之、搗汁飲之
亦良。

又方（本草）生藕汁、煮乾蒜汁、冬瓜汁、丁香、

右服之並佳。

又方（證治要訣）丁香末、薑湯服五分。

又方（郷藥集成）大黄、紫蘇、冬瓜、右水煎一
大盞服之效。

蟹柿相反、令人吐血、服此解。（本草）蘆根汁、

蟹柿反惡、若連食時、莫教吐盡、血隨之。（澹軒方）

木香急煎湯飲之奇效。（蟹柿反惡、大吐、継之以血、昏不識人、病垂殆、用木香餅子灌之、見百一方）

食鯸鮧魚中毒（金匱）蘆根煮汁服之即解。

又方（百一）五倍子、白礬、右等分為細末、水
調灌之○又方槐花、腦子、右為細末、水調灌
之○又方以麻油灌之、太吐毒物盡出瘥。

又方（葉竹堂方）用新鮮肥皂一箇、如無、半新者亦可、
去筋膜内子、去黒殻、搗爛、如黄豆數粒、硼砂
少許、再共搗匀、切作指頂大、放入口、井水灌

下即愈

又方（醫法指南）用鷄血灌之

又方（萬全備急）人屎清汁灌之吐出得生蘆根汁葉豆粉橄欖甘蔗皆不及也

瓜蔕散（辨證錄）○人有食河豚舌麻心悶腹脹氣難舒口開而聲不出療法要吐出其肉

瓜蔕（七枚）白茅根（一兩）蘆根（一兩）水煎汁飲之必大吐吐後前證盡解

食河豚毒（本朝經驗）白鯗水煎服灸食亦可烏賊魚墨最制其毒○又方無患子燒存性調水服○又方蘘荷根研取汁服之○又方古文錢一文含口中嚥津唾

食魚中毒面腫煩亂方（金匱）橘皮濃煎汁服之即解

鱠食之在心胸間不化吐復不出速下除之療之方

橘皮（一兩）大黃 朴消（各二兩）右以水一大升煮至小升頓服即消

食魚中毒（萬全續方）橄欖汁蘆根汁吃下倶妙

又方（秘方集驗）冬瓜搗汁飲之

蟲魚毒（百病主治）蓬砂（同甘草浸香油）獺皮（煮汁並解一切魚肉）

（蝦蟹毒）苦參（煎醋）羊蹄葉（擣汁或煎解河豚及諸魚毒）

療自死六畜肉中毒方（金匱）黃蘗屑搗水服方寸匕

療食生肉中毒方（金匱）掘地深三尺取其下土三升以水五升煮數沸澄清汁飲一升即愈（此即地漿）

療食六畜肉中毒方（千金）燒赤小豆一升為末服三方寸匕神良

療食鬱肉漏脯中毒方（鬱肉者密器蓋之隔宿者是也漏脯茅屋漏下沾着者是也 ○金匱）燒犬屎酒服方寸匕每服人乳汁亦良（犬屎肘後作人尿）○飲生韭汁三升亦得

化漏湯（辨證錄）療食漏脯致胸膈飽滿上吐下瀉太腸如刀割疼痛

山查（二錢）甘草（五錢）大黃（三錢）厚朴（三錢）白芷（二錢）麥芽（二錢）

水煎服

療六畜鳥獸肝中毒方（金匱）水浸豆豉絞取汁服

數升愈

療食馬肉中毒欲死方（金匱）香豉（二両）杏仁（三両）蒸一食頃熟杵之服日再服○又方煮蘆根汁飲之良

療食牛肉中毒方（金匱）甘草煮汁飲之卽解

療食野菜馬肝肉諸脯肉毒方（千金）取頭垢如棗核大呑之起死人○又狗屎燒灰水和絞取汁飲之立愈

療諸食中毒方（千金）飲黄龍湯及犀角汁無不療也飲馬尿亦良又服韮汁數升

黄龍湯（本草）卽糞清大明曰臘月截淡竹去青皮浸滲取汁療天行熱疾中毒

療以雉肉作餅臛因食皆吐下方（千金）犀角為末服方寸匕

食雉子毒（事林廣記）飲醋少許卽消○又方（本草）飲薑汁

療食鴨肉成病胸滿面赤不下食（聖惠）糯米泔温服一中盞

療食白瀹鷄子過多致病（鄉藥集成）蘇一升煮服一云蒜一升煮服之（萬全備急云取蘇子一升煮食之吐而愈）

療中鴆毒氣欲死者（聖惠）用葛根三合水三中盞調飲之如口噤者以物揭開灌之

食鷄中毒吐不止（萬全續方）生犀角末新汲水調下即愈

諸鳥肉毒（事林廣記）生白扁豆末冷水服之

食鱸魚中毒欲死（聖惠）生蘆根舂取汁多飲乃良并療蟹毒亦可煮蘆莑茸汁飲之

食章魚中毒（本朝經驗）鹿角菜湯浸化飲之亦解諸魚毒○又方熱灰投滾湯中澄清服之

食鰹魚中毒（本朝經驗）炒豆屑湯攪飲之○又方鐵漿飲之○又方大黄為末五六分白湯送下○又方櫻葉水煎服嚼櫻子亦佳○椎樹蕈乾者水煎服○又方眼子菜水煎服大效

解食毒鱉（秘方集驗）飲藍汁數椀如無藍汁靛青水亦可

駒溺湯（辨證錄）療食鱉而腹痛欲死馬尿一椀

甘草一（両）水煎服得吐即愈不吐即再飲二煎無不愈者

中鱉毒（瘍醫大全）白芷　雄黄（各三錢）丹砂　山査　枳實（各一錢）茯苓（五錢）水煎服一劑痛止二劑毒出矣

又方（本草）胡椒解之

馬刀毒（本草）飲新汲水解之

食肉傷（萬全備急）山査三十個搥碎濃煎湯飲○又方阿魏煎湯飲

療飲酒連日醉不醒（肘後）蕪菁菜并少米熟煮去滓冷之内鷄子三枚或七枚調勻飲之二三升○又方擣生葛根汁及葛藤餅和絞汁飲之無濕者乾葛煎服佳乾蒲煎服之亦佳

飲酒中毒經日不醒者令人謂之中酒也用黒豆一升煮取汁温服一小盞不過三服即愈

（醫說）

飲酒過多不解（萬全備急）鷄距子煎汁啜之

酒肉過度腹脹以食鹽擦牙漱下如湯沃雪（萬全）

備急

燒酒醉死（本草）急以新汲水浸其髮外以故帛浸濕貼其胸膈仍細細灌之至甦乃已

又方（秘方集驗）冷汚泥搭胸前燥即再搭直至泥濕為度自愈凡酒毒至死黑大豆一升煎汁飲愈

又方（醫法指南）飲好醋二杯即醒

又方（願體）將頭髮浸入新汲水內用熱豆腐切片遍身貼之冷即更換再煎葛根湯飲之醒後

冝食菉豆湯

又方（東醫寶鑑）過飲燒酒中毒則面青口噤昏迷不省甚則腐腸穿脇遍身青黑冷吐下血死在須臾初覺便脫衣推身滾轉之無數吐之即甦又以溫湯裸體浸灌常令溫煖若灌冷水即死又取生瓜及蔓青搗取汁斡開口灌之不住又碎氷頻納口中及肛門又葛根搗取汁灌口中漸醒而愈

燒酒以錫壺盛經宿飲之令人醉悶不省以陳

壁土攪水澄清入甘草湯灌之即醒（危證簡便）

飲酒中毒（本朝經驗）眼子菜水煎服之

飲點剌酒中毒（西洋造者是○本朝經驗）食鹽水煮飲三四椀乃瘥

食熱麪中毒（本草附方）蘿蔔擣取汁飲之無生者則取子水研取汁飲之又地骨皮煮取汁飲之

又赤小豆末和水服即愈

又方（萬全續方）煖酒和薑汁服

食糉傷（萬全續方）以水服壁上黃土一錢即瘥

食蕎麥中毒（本朝經驗）楊梅皮為末白湯送下○又方多服蘿蔔汁亦可又杏仁生啖即消○又方萩花莖葉（即隨軍茶）剉水煎服○又方柑皮擣絞汁服乾者水煎服○又方海帶水煎服

豆粉毒（百病去治）杏仁　豆腐　蘿蔔

療豆腐毒（朱氏集驗）蘿蔔煎湯飲之

又方（入門）杏仁水研取汁飲之

又方（東醫寶鑑）過食豆腐腹脹氣塞欲死新汲水多飲即安若飲酒即死

解鹽滷毒（秘方集驗）　豆腐漿灌下。如無生漿將黃豆浸濕搗爛灌下。抹卓布水或肥皂水皆能令吐。切不可用熱。

又方（辨證錄）　鹽滷之毒必至口鹹作渴腹中疼痛身踡脚縮而死。療法必用甘以解之。用甘草三兩煎湯救之。如服已久加當歸二兩。腸潤未必皆死也。

多喫茶中毒（本朝經驗）　砂糖　甘草　白梅　釅醋　並解其毒。

食竹筍中毒（本草）　生薑及麻油能殺其毒。

又方（本朝經驗）　腹緊滿手不可近。喬麥殼水煎多飲之。又海帶煮汁服之亦可。

喫油煠諸物中毒（本朝經驗）　柑皮水煮飲之。

水荇毒（百病主治）　硬糖　杏仁（同乳餅粳米煮粥食）

食銀杏中毒（百病主治）　香油多飲吐之。又地漿藍汁甘草汁飲之。

又方（方便書）　銀杏樹根煎濃湯灌下即活。

又方（公選良方）　小兒食之過多胞脹欲死急用白鯗

頭煎湯頻頻灌之少頃自定（秘方集驗云白菓多食之成瘋）

（療法同上〇瘍醫大全云凡中白菓毒驟然一聲即暈去儼如驚狀者是療法亦同）

中白菓毒（敬信錄）將木香滾水磨汁入麝香少許服之即解或將白果殼搗爛煎服

食桃成病（外臺）桃梟燒灰二錢水服取吐即愈

食梨過傷（事林廣記）梨葉煎汁解之

食柑毒（事林廣記）柑皮湯解鹽湯亦可

食蒜傷作脹（萬全備急）生薑汁飲之立消又麝香少許水點服

食瓜過多（本草）但飲酒及水服麝香

又方（萬全續方）食白鯗魚即化為水或加麝香少許

〇又食瓜菓傷心腹堅脹痛悶不安用鹽二千兩水一攪煎消燉服吐下即安

食西瓜中毒（本朝經驗）番椒剉浸水飲之

食胡椒中毒（本朝經驗）菉豆粉解之嗆而欲絶者香油灌之（番椒同）

療食諸菜中毒方（千金）甘草　貝齒　胡粉（各等分）

右為細末水服方寸匕〇又小兒尿乳汁共

服一升亦好

又方（外臺）取雞毛焼末以飲服方寸匕差

療食諸菜中毒發狂煩悶吐下欲死（聖惠）雞糞焼灰為末水服一錢未解更服

又方（本草）甘草　香油　並佳

中菌蕈毒（醫説）生薑汁或濃薑湯服

食雜苽菓子過多腹脹氣急（東醫寶鑑）桂心為末飯丸菉豆大以水呑下十丸未愈再服又桂皮濃煎取汁飲之又服瓜蔕散吐之即愈

又方（入門）桂心末五錢麝香一錢飯丸菉豆大白湯下十五丸即效名曰桂香丸

喫菓腹痛（事林廣記）高良薑末熱湯調服立見效

凡海中菜多食損人令腹痛發氣吐白沫飲熱醋即安凡海菜傷皆同此法（東醫寶鑑）

飲氷水及涼水過多心脾疼痛（萬全續方）用川椒二十粒浸于漿水中一宿還以水呑之其病即愈永不發

解烟毒（秘方集驗）砂糖調水服

烟毒發熱欬嗽大作服之而痊（醫意商）　麥冬
知母　山梔　花粉　黄芩　蘇子
甘草　蔞仁　枇杷葉　煎成去查入砂
糖一兩和服
食諸肉中毒或吐下血胡荽子一升煮令發裂
取汁停冷每服半升又生韮汁飲之（本草附方）
療食諸毒肉吐血不止痿黄甚者用葱子一升
洗煮使破取汁停冷服半升日夜各一服血
定止（衛生易簡）

消肉化毒丹（辨證録）人有食牛犬之肉一時心痛
欲吐不能欲瀉不可冝用吐法亦有探吐之
不應者療法冝消化解毒
神麯　雷丸　山査　大黄（各三銭）　厚朴
枳實（各一銭）　右水煎服此方乃逐下之神
方倘可上湧不必用此方
黄龍湯（奇効良方）療因食中毒　右將竈底當釜直
下掘赤土為細末以冷水調隨多少服之或
以犀角水磨取汁飲亦療食六畜肉中毒大

効

飲食毒物（瑞竹堂方）鵬砂四両真香油一斤瓶内浸之遇有毒者服油一小盞又浸尤佳

又方（本草）雄黃青黛等分為末每服二錢新汲水下

神仙解毒萬病丸（百一）解一切藥毒惡草菰子菌蕈金石毒喫自死馬肉河豚發毒時行疫氣山嵐瘴瘧急喉閉纏喉風傷寒暑熱毒上攻或自縊死落水打折傷死但心頭微煖未隔宿者並宜用生薑蜜水磨一粒灌之須臾復甦癰疽發背未破魚臍瘡諸般惡瘡腫毒湯火所傷百蟲犬鼠蛇傷并東流水磨塗并服一粒良久覺痒立消打撲損傷折炒松節酒磨下半粒（朝鮮李宗準紫金丹方云如無松節酒以炒松節入酒湯用）乃以東流水磨塗男子急中及顛邪喝叫亂走女人鬼氣鬼胎並宜煖酒磨下一丸可分兩服有毒即吐或利毒盡自止（李宗準云通利一兩行無妨只用溫粥止住大抵下泄藥例多上吐如欲吐則吐溫粥一二匙壓下則不吐）孕

婦不可服

文蛤（三両淡紅黄色者搥碎洗淨本草云五倍子一名文蛤）紅芽大戟（一両半淨洗）山茨菰（二両洗即鬼灯檠金燈花根也○臞仙活人心云人皆不識以老鴉蒜為之其山茨菰者俗名金燈籠其葉似韭花似燈籠其色白上有黑點結子三稜二月長苗三月開花四月苗枯究地得之其茨菰上有毛包裹人不可識採時可於有苗時記其地至秋冬取之此藥中其山茨菰不真則藥不効李宗準曰本草云葉如車前根如慈姑則與余所得根如小蒜葉如韭者異乃知臞仙所云者與余同而亦為本草所謂零陵團茨菰無疑矣但其花上黑點或有或無亦豈風土之異乎○案葉氏錄驗揚氏家藏並云山茨菰乃是玉簪花根白花者今攷本草無其說尤可疑錄以待識者辨之）續隨子（一両去殼擇研細紙裹壓出油再研如白霜）麝香（三銭研）

右將前三味焙乾為細末入麝香續隨子研令勻以糯米粥為丸每料分作四十粒於端午七夕重陽日合如欲急用辰日亦得於木臼中杵數百下不得令婦人孝子不具足鷄犬之類見之（李宗準云今案合末重七両八銭然為飛羅所次不過七両五銭每劑可用糯米二合。滓淘作濃飯重六両六銭合以糊重十四両强杵棱重十四両三四銭蓋擣時或粘着乾燥則添水故也陳自明臞仙王應椅皆以一劑分為四十粒余恐人不度氣之强弱老幼

槩メ服二一粒ヲ一也今分テ為二八十粒一半○萬病解毒
應椅所レ謂毎服半粒亦タ此ノ意也
圓（得効）　文蛤一両半　山茨菰一両　續隨子半両
麝香一銭　大戟七銭半　全蝎五枚　山荳根半両
朱砂　雄黄各二銭　圭療修製同シ上ニ○大乙
神丹（一名追毒丹　乾坤生意）　文蛤三両　山茨菰二両
大戟一両半　千金子一両　麝香三銭　雄黄一両
朱砂五銭　右圭療修製同シ上ニ（外科正宗大乙紫金丹即チ是○）
案ニ解毒萬病圓始テ見二葉氏録験方ニ名二聖授奪
命丹ト又觀音散ト而楊氏家藏方ニ加二板藍根ヲ名ク
解毒圓ト然ルニ其ノ主療修製ノ之詳至二百一一方ニ而備ル
為後世或ハ名二玉樞丹ト或ハ名二紫金錠ト皆ナ此ノ方耳

而諸家増味頗多シ特ニ危氏萬病解毒圓　臞仙
大乙神丹諸家多採用ス故ニ附ス于此ニ

懸川門人　山本太玄校刊
沼津門人　軒村熈　覆校

救急選方下巻終

醫有讀汗牛之書而不能施理者焉又有好施理術而不識一丁字者焉故世人恒嘲言讀書者不善理善理者不讀書其為弊也久矣殊不知讀書而不善理者剡精刓神於無用之學也施理而不讀書者師心逞臆於司命之職也均是吾道蠹賊其不罹天網者僥倖而已矣吾先人創建醫學意在矯此二弊焉伯兄廉夫繼先志上自乾元崇文之秘帙石包天承之奥冊下至山經地志稗乘縢說苟涉係吾道者莫不搜索而採擷也今日所處

劑者即昨日所抄謄善讀而善理者唯吾伯兄有焉如此然後可能解世人之嘲矣頃伯兄著救急選方此亦抄謄之所得也其書援據該博在讀者自知之蓋先人選濟急方有意補續未果而逝故伯兄繼其志云此書之行不特在救疾疢之危急而在革醫家之宿弊焉伯兄之志能達寰宇則醫家負書簏之謗者與錯用錫餳之人均當愧沮而悔改焉其功於吾道豈淺淺乎哉癸亥正月初九日胞弟湯川元俟安道跋

家君以濟衆為己任每慨今世醫家或平素不研其術一旦遇卒暴之證錯愕失措遂致夭橫乃病在蓐也著此書以備應急之資其啟來學惠亦溥矣享和初付之開雕未幾燬于火今茲再命剞劂廣刷行之醫家預讀此書精窮其術使世人無復斃乎委靡乎則　家君濟衆之功亦與天壤不朽云

文化庚午孟冬既望不肖男元胤奕祺謹題

享和三年癸亥三月開鐫
文化七年庚午十月再鐫

江戸
須原善五郎
伏水宇兵衛
飯島金助