


2冊

490.9

Ky-5

1

No. 1145



富士川文庫

1691

窮鄉大人便方目錄

傷寒論

一

陽傷感門

二

陰傷感門

三

濕瀰門

四

疫方

五

瘧門

六

陽瘧

七

陰瘧

八

痢門

九

火病門

十

吐血門

十一

腹脹門

十二

頭痛門

十三

眼痛洗眼方

十四

心氣痛門

十五

牙痛方

十六

腰痛方

十七

新鐫窮鄉便方

毓秀齋張賓宇梓

傷寒類

凡病以傷寒為急要北方屬水風高地寒仲景方法不能外之南方屬火氣炎地燥且多山多水鬱蒸濕氣居多寒氣稍薄治法於仲景稍異六腑屬陽若陽經受寒邪先發於太陽五臟屬陰若陰經受寒邪必發於太陰陽經發病必先疏表清利邪熱六七日後

愈若陰經發病必須溫托扶正却邪臟病無瀉法二
七後乃愈

陽傷感

二

凡春初發頭痛怯寒潮熱是陽症也先用疏表

撫芎 六分

老蘇葉

香附子

陳皮

各一錢

羌活 九分

白芷稍

麻黃 各五分

甘草 三分

薑三片葱白三寸不拘時服

二用柴苓湯

半夏

黃芩

赤芍藥

各一錢

人參

三分

柴胡

澤瀉

各八分

猪苓

七分

羌活

九分

木通

一錢

薑三片

半饑服

三用人參敗毒散此其常也

柴胡

枳實

芎藭

各六分

薄荷

四分

獨活

八分

羌活

前胡

各七分

人參

甘草

各二分

赤茯苓

一錢

白桔梗

五分

薑煎服

若五六日內陽毒內鬱煩滿太甚宜以白虎湯竹葉
石膏湯大柴胡湯清之甚則以涼膈散雙解散利之

白虎湯

知母二錢

石膏一兩

甘草七分

黃連八分

薑五片不拘時服

竹葉石膏湯

淡竹十枝

石膏七錢

人參五分

半夏一錢

甘草三分

麥門冬一錢五分

薑三片不拘時服

大柴胡湯

半夏 黃芩

赤芍藥各一錢

柴胡

枳實

各七分

大黃二錢

甘草二分

薑三片空心服

涼膈散

枳實七分

黃芩八分

薄荷六分

連翹一錢

大黃三錢

甘草三分

芒硝三錢五分

淡竹葉十枝

薑三片空心服

雙解散

荆芥穗七分

防風八分

歸尾五分

黃芩

連翹 赤芍藥 梔子仁 各一錢 大黃 三錢
 薄荷 桔梗 各六分 石膏 芒硝 各二錢
 滑石 甘草 各二分 麻黃 三分
 薑三片空心服

陰傷感 三

若初發頭自昏重身體沉滯腹滿自汗卽是陰症宜用藿香正氣散

陳皮 半夏 枳殼 赤茯苓 各一錢 蒼朮

桔梗 各七分 厚朴 大腹皮 各六分 藿香 三分

甘草 二分

薑三片半饑服

二用入解散

陳皮 半夏 白茯苓 各一錢 藿香葉 人參 各三分
 厚朴 七分 白朮 五分 甘草 二分

薑三片食遠服

三用玄武湯

白芍藥 白茯苓 川芎 陳皮 各一錢 人參 五分

白朮 六分 肉桂 各二分

甘草 各二分

薑三片不拘時服

四用真武湯厥冷自利傳陰之極

肉桂

乾薑

粉草

各三分

細辛

白朮

丁香

各五分

白茯苓

二錢

黑附子

白芍藥

綿黃芪

各一錢

人參 六分

川烏

天雄

各八分

五味子

九分

薑煎服

十一日後內實煩悶潮熱不退寒熱往來似瘧非瘧

用人參敗毒散加半夏一錢烏梅一箇則發瘡毒而愈不厥日久發咳必成火熱不治

自立冬後太陽寒水司令凡感冒頭痛身熱惡寒背脊強者是正傷寒此必無汗津用十神湯大劑出汗汗後以柴苓湯分利之病自不傳經而愈矣如汗出而病不退再服敗毒散數劑無不平復

十神湯

蘇葉

陳皮

甘草

川芎

香附米

赤芍藥

白芷

乾葛

升麻

麻黃

薑蔥煎熱服

柴苓湯

同前方

敗毒散

同後方

先年冬或感寒在身至春分後或夏秋月方發者俱以九味羌活湯發表後用柴苓湯分利最為穩當

九味羌活湯

羌活

防風

黃芩

生地黄

蒼朮

川芎

白芷

細辛

甘草

春分後至立冬前亦有天時驟寒不正之氣人受之而病者謂之感寒較傷寒則輕矣用九味羌活湯或

香蘇散隨用

香蘇散

香附米

蘇葉

陳皮

甘草

凡傷寒表症已除傳變入裏口燥咽乾唇焦面赤大便閉結者用大承氣湯下之

大承氣湯

大黃

芒硝

厚朴

枳實

白水煎服

如胸膈不利以小柴胡湯加枳桔一劑而愈

小柴胡湯

人參 柴胡 黃芩 半夏 甘草 加枳實

桔梗

薑三片煎服

如上膈熱痰結滯以竹葉石膏湯至妙方同前

夏月傷暑只以黃連香茹飲太劑一二服自愈如甚重者以黃連解毒湯更妙

黃連香茹飲

黃連 香茹 白扁豆 厚朴 甘草

黃連解毒湯

黃連 黃芩 黃柏 山梔子

秋月患不正之氣嘔吐泄瀉霍亂等症只以藿香正氣散為主

若四時傷風鼻塞聲重頭痛身熱自汗者以香蘇散加防風黃芪或加薄桂可也

統治四時傷感正料

羌活 獨活 川芎

各五分

白茯苓

白芍藥

各七分

甘草 三分

柴胡

前胡

各八分

枳殼 桔梗 各六分

薑三片空心服

濕瘟

四

春末夏初發病有頭痛潮熱身體沉困或汗或泄係是風濕時感濕病不宜發汗惟治濕利小便乃治法也

初用芎蘇五苓飲

撫芎

防風

澤瀉

各八分

香附米

木通

蘇葉

猪苓

赤茯苓

各一錢

羌活

七分

甘草 二分

薑三片不拘時服

二用人參羌活散

人參 三分

羌活

猪苓

澤瀉

防風

各七分

甘草 二分

柴胡

枳壳

各八分

半夏

木通

赤芍藥

各一錢

薑煎服

三用清暑益氣湯

又名滲濕湯胃虛者宜服

人參 蒼朮

白粉葛

川歸身

各八分

升麻

六分

神麴

白茯苓

麥門冬

白芍藥

黃芪

各一錢

五味子

九分

澤瀉

青皮

黃柏

各七分

甘草

二分

薑三片 空心服

四用敗毒散

胃實者用

羌活

獨活

枳實

桔梗

各七分

柴胡

六分

前胡

防風

各八分

半夏

芎藭

赤茯苓

各

一錢

人參

薄荷

各五分

甘草

二分

薑三片 食遠服

辟溫丹

紅棗一觔

核研末 肉杵膏

蒼朮一觔 不必製 以棗

膏杵為丸 如彈子大 每置爐中燒一九

疫方

五

凡時疫大行沿門過戶皆發者此時最宜謹慎每日清晨五更命人用黑豆一大握投于井中勿使人見凡飲此水之家俱無傳染功德無量若自家水缸內

每早亦投黑豆一握于缸中則保全無恙
如受疫之家只人參敗毒散救之

若疫病是辛酉巳丑辛丑等不及不知之歲六氣鬱
發濕毒從人鼻竅而入三陰受之三陰經無瀉法不
宜寒涼宜溫燥

初用草果飲

草果仁 三分

川芎

白芷 各八分

甘草 二分

蘇葉 陳皮 各一錢

青皮 良薑 各七分

水煎服

二用人參養榮湯

草果仁 藿香 各一分

厚朴 枳殼 各七分

白茯苓 半夏 陳皮 各一錢

人參 八分

甘草 一分

薑三十片半饑服

三用聖散子飲

半夏 良薑 石菖蒲

赤茯苓 各一錢 厚朴

澤瀉 川烏 附子 枳殼 藁本 猪苓

蒼朮 各八分 柴胡 獨活 吳桔梗 各七分

防風

細辛

各六分

藿香

四分

白朮

五分

麻黃

三分

薑煎服

四用加味敗毒散前方內加

草果

三分

檳榔

五分

烏梅

一個

半夏

一錢

夏間陽氣在外胃虛邪氣易侵多作吐泄

初用薑陳湯

廣陳皮

一錢

生薑皮

一錢

水一盞煎不拘時服

二用藿陳五苓飲

藿香

三分

陳皮

水通

赤茯苓

各一錢

防風

六分

羌活

猪苓

澤瀉

各七分

薄桂

薑三片半饑服

三用胃苓湯

蒼朮

厚朴

陳皮

各八分

猪苓

赤茯苓

澤瀉

木通

車前子

各六分

薄桂

甘草

各一分

薑煎服_ス

四用六和湯

砂仁 木瓜

半夏 各六分 赤茯苓 藿香

扁豆 各八分

香菇 一錢 車前子 五分

人參 四分

薑煎服_ス

治_ル四時疫病方

春用九味羌活湯 春分前後用

條防風 一錢 蒼朮 生地黃 小川芎 各八分

羌活 白芷 各七分 甘草 三分 細辛

連翹 各五分

薑三片空心服_ス

夏用荆防五苓飲

荆芥 七分 防風 澤瀉 各一錢 柴胡 八分

木通 甘草 各三分 赤茯苓 猪苓 各一錢五分

虛者加人參 三分

薑三片空心服_ス

秋用藿香正氣散

藿香尾 五分 陳皮 八分 羌活 六分 蒼朮

白茯苓 柴胡 厚朴 各七分 甘草 三分

虛者加人參 四分

薑三片空心服

冬用十神湯

蘇葉 一錢 陳皮 四分 川芎 八分 赤芍藥

白芷 各七分 升麻 葛根 麻黃 各五分

甘草 三分 虛者加人參 五分

薑三片空心服

瘧門 六

凡秋月患瘧此病原于濕痰初起即問有汗無汗無汗者以敗毒散發之若有汗敗毒散加桂枝待服二三劑後分辨陰陽二瘧陰瘧柴平湯加查肉升麻倍下桂枝極妙陽瘧只以柴苓湯為主多加知母更妙

陽瘧 七

若發自上晝是陽瘧初用芎蘇五苓飲

撫芎 羌活 各八分
木通 各五分 香附米
草果仁 各四分
薑煎服
蘇葉 猪苓 澤瀉
陳皮 各六分
青皮
甘草 三分

二用清脾湯

青皮 黃芩 半夏 白朮 各五分
草果仁 四分 赤茯苓 六分 厚朴 七分 羌活 一錢
薄桂 三分 甘草 二分
薑三片煎服

三用加味敗毒散

羌活 獨活 柴胡 前胡 枳實 桔梗 各一錢
草果仁 檳榔 半夏 各六分 烏梅 一個
甘草 薄荷 各四分 芎藭 八分 薑三片食遠服

柴苓湯多加知母

人參 柴胡 黃芩 半夏 赤茯苓 肉桂
猪苓 澤瀉 白朮 甘草 知母
薑煎服

若用截藥用青蒿丸

青蒿 一兩
錢二分

冬瓜葉 二錢

薄桂

馬鞭草 各一

俱爲末，麪糊爲丸。未發先下，時每服二錢五分，白湯吞下。

陰瘧

八

若發自下午，面青寒多有吐，是陰瘧。初用人參、羌活散。

人參 甘草 各三分

茯苓

羌活

防風

厚朴

各八分

藿香

猪苓

澤瀉

木通

枳櫚

各六分

薄桂

四分

薑三片，食遠服。

二用草果飲

草果仁

八分

撫芎

青皮

枳櫚

各六分

蘇葉

白芷

各四分

良薑

甘草

各三分

薑三片，半饑服。

三用加味敗毒散

同前方

若用截藥，用不二丸。

常山

酒煮炒乾取末四錢

尖檳榔 取末一錢

麪糊爲丸當發日先晚酒下二十一粒次早酒下三十粒

斷瘡如神丹

砒霜 二錢

蜘蛛 三個

大黑豆 四十九粒

共爲末水成丸如圓眼大先一晚北斗下見過次早塞兩耳內各一丸

痢門

九

痢病手陽明經平素有濕積再感秋時燥氣發此病

初有潮熱頭痛兼有時氣先用芩蘇五苓飲若無潮

熱卽是枳連五苓飲

一患痢日久元氣下陷須用補中益氣湯加黃連

芩蘇五苓飲

撫芎

四分

蘇葉

五分

陳皮

羌活

木通

香附米

猪苓

澤瀉

各六分

甘草

三分

赤茯苓

八分

薑三片食後服

二用枳連五苓飲

枳殼 猪苓

澤瀉

木通

滑石

枳櫚各六分

製黃連一錢

赤芍藥

五分

甘草

三分

薑三片半饑服

三用朴黃丸

體壯年少者五日內可用五日以外不可用老弱者忌

大黃

十兩酒煮一日一夜

厚朴

三兩

木香

一兩

煉蜜爲丸空心服二錢一分老米湯送下

四用香連丸

宣黃連

二兩用吳茱萸二兩同黃連浸炒去茱萸不用

木香

五錢

醋糊爲丸每服二錢一分陳米湯送下

又方

無論紅白皆可服

生薑

陳好茶

各等分均勻冷水同煎吃或煎好濃茶兩碗用生薑一兩細切如米粒大放在茶內任意呷吃自然安好茶盡再煎呷吃雖禁口痢亦治若是紅痢卽連薑皮細切若是白痢去皮細切紅白相兼一半去皮一半留皮此法甚妙又容易可信服不誤

火病

十

火病有幾種施治亦難同六腑受邪熱鬱積日久太
腸移熱於胸小腸移熱於心胃移熱於脾膽移熱於
肝膀胱三焦移熱於腎是外感致內傷六腑有火五
臟相乘煎熬不已遂致感變熱証十有九不治有陽
明內實積熱內燥謂之實熱疏利腸胃又有七情鬱
發喜傷心怒傷肝憂傷肺思傷脾恐傷腎倘一臟受
傷則有偏勝之火傳尅不行調理宜虛補其母實瀉

其子以勝復之使之不致有尅又有陰陽勞役致損
真陰謂之陰虛火動宜滋陰降火收斂之又有胃虛
過食生冷抑遏陽氣於脾謂火鬱每巳午時肌熱燎
如瘡狀以升陽散火升發之
積熱先用疏導方

蘇梗 撫芎 羌活 木通 陳皮 赤芍藥

猪苓 澤瀉 香附米 各五分 甘草 二分

薑三十片煎服

二用開鬱散

羌活 陳皮 半夏 木通 大腹皮 枳榔
茯苓 撫芎 連翹 甘草 梔子仁 香附米
各等分煎服

三用清火湯 壯者可用虛者不宜

連翹 梔子 黃芩 黃連 薄荷 天花粉
羌活 川芎 桔梗 貝母 枳殼 獨活
柴胡 茯苓 各六分 大黃 製四分 玄明粉 三分
水煎服

四用六鬱丸

撫芎 香附米 半夏 薑汁製 神麴 炒 枳榔

杏仁 山查肉 蒼朮 海石 蘿蔔子 連翹

各等分麴糊為丸食遠時每服三錢淡薑湯下

大腑燥結用神芎丸 壯實者可用老弱血少燥結不可用

大黃 二兩 薄荷 撫芎 各一兩 黑牽牛

滑石 各二兩

麴糊為丸每服三錢空心百沸湯下

舌乾口燥用梔子金花丸

梔子仁 三兩 黃芩 黃栢 麥門冬 各二兩 杏仁

半夏

桔梗

各一兩

黃連

四錢

薄荷

八錢

麪糊爲丸

食遠時

每服三錢

淡薑湯下

陰虛火動四物湯加知母黃柏

六味地黃丸

治吐血熱病口渴

懷地黃

蒸熟四兩

澤瀉

五錢

山茱萸

去核

懷山藥

各二兩

白茯苓

牡丹皮

各一兩

煉蜜爲丸空心

三錢酒下

滋腎丸

薄桂

一錢

黃柏

俱鹽酒炒褐色

知母

各四兩

煉蜜爲丸空心

三錢百沸湯下

天一生水丸

熟地黃

八兩

山茱萸

去核

白茯苓

去皮

天門冬

去心

麥門冬

去心

黃柏

製

知母

製

山藥

各四兩

青鹽澄水煮麪糊爲丸

空心三錢百沸湯下

虛損是稟負素弱胃虛能容補劑服補中益氣湯

人參

黃芪

白朮

白茯苓

升麻

柴胡

當歸 陳皮 甘草
各等分薑三片空心服

十全大補湯

白朮 白茯苓 人參 肉桂 川芎 地黃
當歸 白芍藥 黃芪 甘草
各等分

八物湯

人參 白朮 當歸 地黃 白茯苓 白芍藥
各一錢 川芎 五分 粉草 三分

無此山藥丸

白茯苓 山藥 杜仲 兔絲子 川牛膝
肉苁蓉 各三兩 青鹽 五味子 各一兩
澤瀉 五錢 山茱萸 熟地黃 各四錢 石脂 三錢
巴戟 二兩

煮麴糊爲丸空心三錢酒下

天王補心丹

人參 石菖蒲 各五錢 玄參 丹參 桔梗
二錢 白茯苓 黃連 當歸 遠志 柏子仁

五味子

天門冬

麥門冬

各一兩

硃砂

三錢

地黃

四兩酒洗蒸

煉蜜爲丸

硃砂爲衣

空心

一錢

百沸湯送下

補天大造丸

紫河車

一具製

黃柏

鹽水炒

龜板

酥酒炙

五味子

各二兩

青鹽

三錢

川牛膝

杜仲

各

一兩

熟地黃

四兩

煉蜜爲丸

空心

一百丸酒下

大補陰丸

人參

白朮

白芍藥

山茱萸

兔絲子

川牛膝

沙苑蒺藜

各一兩

當歸

枸杞子

地黃

各二兩

白茯苓

胡蘆巴

破故紙

石斛

巴戟

各五錢

煉蜜爲丸

空心

三錢酒下

陽不足韭子丸

雞脰脰

燒灰

螵蛸

酒炙

龍骨

覆盆子

酒浸

附子

炮牛膝

沉香

肉蓯蓉

赤石脂

牡礪粉

煨

各等分煉蜜爲丸每服九十九粒空心鹽湯下內附子沉香減十之七遺精者全減

吐血

十一

吐血有幾種有積熱吐血謂之積血有因事夜不得睡而吐謂之失血有因怒氣傷肝而吐有因勞損而吐又有尸虫而吐一時暴見吐甚卽用童便磨微墨炒色山梔子爲末童便酒調三錢或用韭汁薑汁磨鬱金服或用花蕊石爲末童便調二錢積熱發血宜

用生藕汁生地黃汁蘿蔔汁大蘗汁生蜜調溫服氣鬱吐血用澤蘭葉取汁和水酒吃勞損吐血用獨參湯陰虛吐血用乾薑炒成灰爲細末童便調九分一痰火吐紅潮熱咳嗽曾雲賓傳

雞麻楊根上粉 三錢 楊枹根 一錢

用無灰好水白酒煎空心服查再酒煎三次吐血

罷羸脉微者加老雞一腿同煎

雞麻生道傍其葉如桃葉邊有倒刺枝有白星空心如蔥草開花似梅花而四出冬結子子焦綻如石榴狀而小如川椒大其根去外一重皮中有粉味淡取用仍去其骨 楊枹其條四方小桑根

香而味辣多生竹林中

腹脹

十二

腹脹之病多因脾土虛弱不能順養以致痰飲結聚遂成脹滿治法必須理脾燥濕行滯氣大抵脾虛之症難治若先見積聚而後發脹尤難治也初用紫蘇湯理脾導濕

- 木香 水通 人參 蘇子 枳榔 各五分
- 厚朴 半夏 各七分 甘草 草果仁 各二分

- 陳皮 八分 白朮 一錢 赤茯苓 六分

薑煎服有氣惱者減白朮

二用木香順氣湯

- 木香 厚朴 青皮 半夏 益智仁 各五分
- 澤瀉 當歸 赤茯苓 各四分 吳茱萸 二分
- 柴胡 豆蔻 升麻 各三分 蒼朮 六分 白朮 一錢
- 陳皮 八分

三用木香消脹湯

- 木香 紫蘇 桑白皮 各五分 枳榔 枳殼

大腹皮

製

蘿蔔子

各六分

甘草

二分

陳皮

香附米

各八分

薑煎服

頭痛

十三

頭乃諸陽之會陽症傷感必先發頭痛以香蘇散治之有風寒暑濕之氣積鬱日久謂之風熱上攻頭痛當用川芎茶調散有陽虛之人發風顛頭痛用如神散羌活附子湯又有腎虛頭痛用川芎散有痰厥頭

痛法宜清氣化痰各方加減至於真痛上穿風府入

泥丸非藥能愈

川芎茶調散

防風

荊芥

羌活

菊花

各八分

細辛

四分

石膏

薄荷

各五分

白芷

川芎

各七分

薑茶煎食遠服

如神散

防風

天麻

半夏

南星

川芎

各八分

川烏

製三分

甘草

四分

細辛

五分

烏藥

荊芥 各七分

薑煎服

羌活附子湯

黑附子 二分製

防風

白芷

僵蚕

羌活

蒼朮

升麻

麻黃

黃芪

各七分

甘草

五分

薑煎服

川芎散

川芎

白附子

僵蚕

石薑

菊花

麥門冬

各等分薑茶煎服

星烏湯

川烏 二分製

南星 四分製

天麻

白芍藥

歸身 各一錢

天台烏藥

八分

白附子

煨

甘草 各五分

煎服

眼痛

十四

經驗洗眼方

此方甚妙

秦皮

防風

紅花

歸尾

四味各二錢五分以青絹袋盛之用水一碗煎每
日洗五六十次即愈

心氣痛

十五

心氣痛非心痛心即胃脘痛也素性有熱遇感即發
初用芎蘇散

撫芎 蘇葉 陳皮 枳櫚 香附米 大腹皮
各八分 羌活 木通 猪苓 澤瀉 各四分
香草 三分 薑煎服

二用芎梔湯

川芎 山梔子

各等分薑五片煎服

三用玄明粉利壯者可用

玄明粉 五錢 空心用白沙糖調湯服

又方

門限邊履跡所堆泥泡百沸湯澄清服之

牙痛

十六

牙痛擦牙散或煎湯噙嗽

香附米 一兩

蘇葉 五錢

大黃 五錢紙包火煨

石膏 一兩火煨

腰痛

十一

凡腰痛用生薑四兩取自然汁略熬乾水氣成膏將貼患處外將裹脚縛住未貼膏之先須要稍醉然後以膏貼患處蓋膏到身上片時熱不可當醉則濃睡不覺其熱耳

