490.9
Ki-5
No.2676
旧K118
K118

奇效醫述小引

醫術肇自聖神其效可以安危而起死乃民生壽命之急需而造化功用所不及者賴之以贊助也古有達則為良相不達則為良

慶應義塾大学医学情報センター 47.年7.月4日
富士川文庫
1562

F
キ-4

醫之語蓋謂其與燮理同切耳然古今高明之士多視爲小技而漫不究心一旦自身有病與所親之人有病則委付庸愚之手使庸愚之陋識反得以握賢智之生死豈不謬哉閒有渉獵斯術者又自恃聰明不肯究極精深僅知粗淺而即自信自用反致悞己悞人其害尤甚也此二者古今之通弊余嘗鑒之而思

為身計又思為身所親者計是以究心於斯術數十年来傳取而精研之深思而透悟之自覺有入於神妙者因病製方不膠于古方得心應手不拘於成說其初聊以自為久而有知信者以軀命来托不論親疎貴賤皆盡心為之調治是以每每取效而其效又多奇也效何以奇凡病者易治者皆求治于時醫不

求余治也其有病危難治時醫束手者然後求救於予余不計其危而治之十嘗治其八九與尋常功效不同其所以奇也或有一二不治者則病已在膏肓而入骨髓扁鵲望之而走者耳然余且為之委曲求生至於必無生意而後已豈忍為扁鵲之走乎余歸休頗有暇日因取從前醫而效効而奇者詳述而

録之病情與治法俱備參
久可對勘也俾覧者咸知
某病已危用某藥得宜而
獲安某病瀕死用某藥中
竅而回生庶幾後之病症
有相類者可以觸類而通

合宜而用則於天下後世
之疾苦沉痾未必無裨也
此余刻醫述意也兹刻僅
録其往者而来者猶可以
續刻用是引諸其首
旹

萬曆丙辰仲秋之吉前知
福建汀洲府寧化縣事
清江久吾聶尚恒識

奇效醫述目録

痰氣成痞
腹痛嘔吐
外感誤服
二便虚秘
二便不通
虚火炎上
小兒積痢
暑天感寒

㊀治婦人痰氣成痞得效述
㊁治内熱腹痛因而嘔吐得效述
㊂外感誤服補藥因而增病述
㊃治大小便虚秘用補得效述
㊄治孕婦大小便不通脹滿欲死得效述
㊄治下元虚弱虚火炎上用滋補得效述
㊅治小兒積痢危困得效述
㊆治小兒暑天感寒用發散得效述

血虛夜脹
感寒泄利
吐血下血
火痰咳血
內傷外感
勞傷感寒
內傷感寒
內傷外感
鼻衄年久

㊇ 治婦人血虛夜脹用補得效述
㊇ 治傷食感寒泄利先清後補得效述
㊈ 治婦人吐血下血偏身筋腫用補得效述
（十一）治火痰咳血用清涼得效述
（十二）治內傷挾外感日久煩悶先清後補得效述
（十六）治勞傷感寒先發後補得效述
（十七）治內傷感寒日久鬱熱先清後補得效述
（十八）治強壯內傷挾外感溫寒兩用得效述
（十九）治鼻衄年久漸深漸危用清潤藥得效述

連年血崩
胸腹痛甚
治痢奇効
虛寒痰病
感寒日久
鬱熱腸痛
中脘積滯
產後發熱
產後感寒

（廿一）治婦人氣血大虛連年血崩用補得效述
（廿四）治感寒停食胸腹痛甚得效述
（廿七）治痢奇效屢得神效述
（廿九）治婦人虛寒痰病用補得效述
（卅三）治感寒日久悞用補劑後用解利得效述
（卅三）治鬱熱氣塊作痛用攻擊得效述
（卅六）治婦人中脘積滯用疏導得效述
（卅七）治婦人產後內虛發熱用補得效述
（卅七）治婦人產後感寒入裏先清後補得效述

極虛似熱
痘瘡狂譫
痘瘡毒盛
虛瀉似熱
熱瀉似虛
熱瀉身痛
鬱熱似瘧
感寒入裏
痰火吐血

三十九 治極虛似熱用峻補得效述
四十一 治痘瘡內虛大發狂譫用補得效述
四十二 治痘瘡內實毒盛終始用清涼得效述
四十四 治小兒虛瀉似熱用補得效述
四十五 治小兒熱瀉似虛用清涼得效述
四十六 治熱瀉身痛用清涼得效述
四十七 治鬱熱凝痰似瘧用峻攻得效述
四十九 治老人感寒日久外邪入裏用利藥得效述
四十九 治痰火吐紅隨症用藥得效述

痰咳發熱
寒咳失聲
四時感寒
發汗清解
清解熱邪
瘟疫方法
初病發汗
發汗清解

五十三 治婦人痰咳發熱用清潤藥得效述
五十四 治咳因於寒服涼藥失聲用發散得效述
五十四 經驗四時感寒發散方
五十五 經驗發汗後清解方
五十六 經驗清解熱邪方
五十七 治瘟疫方法
五十八 初病　上　出發汗方
五十八 發汗後清解方

京都帝國大學
醫學部記念圖書

（痰氣成瘀）

奇效醫述卷一

青江久吾聶尚恒 著

㊀治婦人痰氣成瘀得效述醫曹安

予適劉氏妹稟氣虛弱性情沉鬱年二十下得一病晩間發熱天明復止飲食少進煩燥不安肉削骨露諸醫用藥不效先大人憂之迎歸調治診其脉歇至心甚危之然因其煩燥發熱頻用芩連梔栢等凉劑雖不見效亦不甞寒凉以爲藥對症而病不瘳脉又停歇此不治之症也予竊疑其用藥過於寒凉恐多服致傷胃氣則無生機矣因詳察細問其晩間發熱從何處起妹云右脇

一園先熱遂致偏身發熱予因悟曰此必鬱怒氣鬱痰結成痞塊胸膈壅滯遂致燥熱氣結而脉結此脉與症合不足憂也當先攻其痞塊以除其病根則諸症自除因與先大人訂方用磨痞丸藥攻之每日服二次服至二四兩而塊消一半熱漸退服至七八兩而塊盡消熱亦盡退不數月而肌肉復舊精神爽健全安矣當其痰凝氣滯痞塊伏於右脇不惟醫者不知而病者亦不覺也此非察其病根而拔去之何能拯危困而致之安全耶

原用磨痞塊丸藥左

三稜　莪朮（俱醋炒各八錢）堅檳郎（六錢）川黃蓮（去蘆姜汁炒六錢）片黃芩（刮淨水洗酒拌炒六錢）陳枳實（炒六錢）廣陳皮（滚水泡浸一時刮去白四錢）山梔子仁（姜汁炒五錢）前胡（水洗五錢）白貝母（去心六錢）雪白花粉（八錢）酒炒大黃（[illegible]錢）童便香附（八錢）青皮（去穰醋炒五錢）南木香（不見火一錢）玄胡索（五錢）鬱金（二錢）連翹（去心蒂六錢）

以上共爲極細末和勻先用竹瀝畧洒燗次用粘米粉攪硬糊丸如菉豆大每服百丸一日服三次食遠服臨臥服一次忌生冷煎炒鮮魚牛羊鵝麵

初定此方先大人疑妹瘦弱恐藥太峻予曰痰凝氣滯結塊若不攻擊是養寇也何以成功大人意解遂用之

㊂治內熱腹痛因而嘔吐得效述

庚寅季春穀貴民饑本府別駕夏公祖至本里新興寺放饑穀予偕酒飯欵之正飲間忽然腹痛其痛從臍下小腹痛起痛至胃脘即嘔嘔訖痛止停一二飯久又從下痛上後嘔嘔訖痛止如是者數次下午歸家有一醫作感寒施治用藿香砂仁等藥不效至申刻予自覺是內熱作痛熱氣上衝而嘔必須利之然煎劑不可服恐反增嘔急製牽牛大黃丸服至數錢利數次而其痛脫然愈矣

原用牽牛大黃丸方

黑牽牛（四兩半炒半生其磨取頭末一兩二錢）　馬蹄大黃（酒拌炒一兩五錢）

堅檳郎（六錢）　陳枳實（炒六錢）　姜汁炒厚朴（六錢）

醋炒三稜　莪朮（各六錢）

大黃以上共爲細末與牽牛末和勻醲米飲爲丸如梧桐子大每服二三錢未利再服一錢服後停兩三時而見效

外感誤服

㊂外感誤服補藥因而增病述

壬辰初春予在京會試天寒夜坐久感寒頭痛服蘇散藥未經出汗其頭痛數日不止郤無他症同寓有一友云兄感寒甚輕已經五六日豈復有外感想是看書勞神內虛理宜補之勸服補中益氣湯一劑不知外邪未散補藥助邪爲害遂至神氣漸昏飲食少進晚間呃逆不止見者莫不危之如是者數日夕請醫治之醫用前胡桔梗貝母麥冬連翹香附陳皮甘草數劑而愈予生平少病其時外感未淨而輕用補身受其害若此後因漸悟而精於治外感內傷更精於治外感兼內傷與內傷挾外感等症其識見蓋原於此因述之以志折肱之意云

二便虛秘

治大小便虛秘用補得效述

戊子初秋先大人偶患左脇痛服行氣藥又服當歸蘆薈丸旬日而愈其時予未甚究心於醫也大人脇痛愈未數日予偶檢篋中舊書得丹溪纂要殘編一葉因取而觀之有秘結一條分別實秘虛秘且云實熱秘結則宜下利虛秘因氣虛不能傳送若誤用硝黃等峻藥下

之殺人如反掌是日下午先大人向予說大便偶秘欲用大黄丸予因見丹溪秘分虛實說又思大人旬日內服踈導藥已多何以復秘遂不用大黄丸疑是血澁用當歸潤腸湯數劑不通至次日小便又秘用蜜導等法亦不通至第三日加以腹脹事急予細察其大便欲解不解之狀潤而不乾澁因思此非血枯想是氣虛不能傳送遂於當歸等藥中加參耆等補氣之劑纔服一茶鍾停一時而大便即通且順利小便亦通而清長矣服此藥數劑而全安

原用補氣藥方

人參　蜜炙黄耆　當歸身　白朮（去蘆刮去皮炒）（四味各一錢）炙甘草　廣陳皮（各五分）白茯苓酒炒

白芍　熟地黄（各七分）川芎（五分）

生姜三片大膠棗一枚洗淨去核水一碗半煎至七分去

温服

二便不通

治孕婦大小便不通脹滿欲死得效述

予偶步田間觀農遇隣醫來問曰我治一婦人有孕八九箇月忽然大小便俱不通腹脹甚用承氣湯下之仍不

通今危矣予曰此非前藥所能下教以用牽牛大黃丸下之服至三十兩許而大小便俱通獲安次日其夫來謝因云諸病皆除只是小便時要人將手緊按小腹方可便若不按則不能便予因思此是氣尚閉與以青皮香附等行氣藥一劑而愈其婦踰月生子母子俱全原用牽牛大黃丸方（見前腹痛條）

虛火炎上

治下元虛弱虛火炎上用滋補得效述

予禀氣素弱神雖強而精甚弱腰腎兩虛雖極力寡嗜慾而不能使之不弱二十前後脾胃虛甚常服參术等補脾而僅免於病至三十後脾胃稍可而頗覺上膈有熱時有齒痛口舌瘡等病每服清上藥輒愈亦不爲大害也至乙未春夏寓京師數月自察脉覺兩尺弱而寸關亦不旺疑是下虛水不能制火理宜補下滋水以制火若单清上非治本之術也因與老醫饒佐甫商之渠亦以爲然遂用人參當歸熟地黃白茯苓五味石棗肉巴戟故紙肉蓯蓉鹿角膠仙茅遠志酸棗仁天麥冬枸杞兎絲之類用山藥末酒糊爲丸服之服至兩三月而上膈虛火盡除口齒等病不復作亦不必更服清上藥

小兒積痢

矣自此以後滋補丸藥服無虛日迄今二十餘年而無虛火者滋陰制火之功也

治小兒積痢危困得效述

予第五兒年十一歲零四箇月時因乳少吃粥飯過多成積又因多吃麵食遂成積痢先水泄後膿血其症極重時已斷乳飲食少進睡不閉目肛門如竹筒手指紋已過命關明是不治症予設法治之用清熱消積等藥緩緩用茶匙挑灌之覺兒精神極困時又另用人參麥門冬煎湯少少與之以保其元氣如是調理數日痢漸止而漸獲安但其兒肉削如柴調養半年始得復舊因思世之醫家病家遇此等極危之症又犯方書所載不治之條棄而不治而任其斃者不可勝計矣因述之以鏡後

暑天感寒

治小兒暑天感寒用發散得效述

予謫廬陵時吉安司理毛具次公與予相知癸卯季夏吉州大宦毛公奉巡道命往百里外請龍禱雨其公子年十一歲夜間忽然身發大熱頭痛身痛夜分其夫人發捕官來請予治時方盛暑予初聞以爲此必感暑之症

也袪暑藥以往及至寓詳問其致病緣由又細察其脈廼知係是感寒而非感暑也因諭以必須發汗其母又以現今汗多爲疑予曰此汗不可作數必須用藥發汗方可除病因製發散藥一大劑令其熱服出汗至天明而身熱頭痛身痛等症盡除再服清解藥數劑調理旬日而安

原用發散藥方

防風　羌活（各六分）　陳皮　甘草（各三分）　小川芎

白芷（各四分）　赤芍（五分）　香薷（一錢一分）　白乾葛（一錢二分）

蒼朮　蘇葉　生香附（各八分）

生姜三片水一碗半煎至八分熱服取汗

血虛夜脹

治婦人血虛夜脹用補得效述

毛貝次公一日告予曰賤內患一病已經兩月餘其初起時每夜至五鼓胸腹脹氣上衝不能卧起坐方安已而漸至四鼓又漸至三鼓起脹今則一二鼓起脹而終夜不能卧矣予初以爲此必氣血不調以調氣藥一二劑與之服後其病不增不減予因思其病作於夜間而日間不脹此必血虛之故因用四物等補血藥數劑而其病

歲半毛公因請予診其脉寒甚其脉弱不惟血虚而氣亦虚因用八物湯加二陳服十餘劑而全安

感寒泄利

治傷食感寒泄利先清後補得效述

廬陵縣公陳玉海乃岳在衙素以善醫見名忽患傷感泄利自用藥不效陳公請予治予診其脉知其原感風寒未經發汗久則入裏鬱爲温熱又内傷飲食脾胃不和是以作泄不止先用清解藥一劑如不止泄所以滌其入裏之邪次日又診脉知其邪熱已淨脾胃虚滑然後用補脾藥一劑而安

原用清解藥方

前胡（五分）　甘草（三分）　麥冬（去心八分）　連喬（去心蒂八分）
赤芍（五分）　赤茯苓（去皮六分）　酒炒花粉（七分）
去白陳皮（四分）　山查肉（八分）　製厚朴（五分）　炒黄芩（八分）
白乾葛（八分）　炒黄連（五分）　炒枳殼（五分）
生姜一片同煎

原用補脾藥方

製蒼朮（八分）　炒白朮（七分）　炙甘草（二分）　白茯苓（八分）
製厚朴（三分）　炒扁豆（八分）　炒山藥（八分）　炒香附（五分）

家蓮子（去心皮剉炒盞）一去白陳皮四分
生姜一片好膠棗一枚去核同煎

治婦人吐血下血徧身筋腫用補得無效述

癸卯之冬予論廬陵會試北上毛具六公告予曰吾老母年五十九歳病在家欲借重國手保道一醫治倘或得痊舉家之感不淺予問何病公曰老母性敏能文嘗代父理家政我每科在京會試凡作家書皆出母手自吻任吉州以後母病荏行俱廢不見母手筆者五年于茲矣言之情甚懇切予不得已便道至吉姑蘇盛之診視細察其脉六脉虚弱而肝脉緩弱尤甚詳詢其症則云每至一月餘日則有一二夜煩燥因而吐血一二碗或不吐則便血吐血便血後燥止而中稍寛快積至一月又復如是視其手足四肢大而臂膝小而指節凡活節有筋之處其筋青腫而露狀如鶴膝是以屈伸待行俱廢也又詢其病源則少年已有吐血症嘗服清火凉血等藥又查其屢年所服未效藥多或以風治或以血熱治多用黄蓮白芍藥生地黄牡丹皮等凉血行血藥或多用羌獨活防風等去風藥予曰受病之源正坐多服

涼血藥損傷肝氣而其每月失血俱因血虛不能歸肝肝虛不能藏血是以積至月餘而虛火載血妄行或吐或便也肝主筋筋得血而能運今肝虛筋無血養是以遂節腫露而屈伸持行俱不能也亦非外入之風也製方專以茯肝養血爲主煎藥用八物湯去白朮加法製何首烏甘枸杞川牛膝等少加羌活防風秦艽等以引行肢末丸藥酒藥則兼用鹿茸鹿角膠瑣陽片巴戟川故紙仙茅杜仲之類製方既定數日而別其家依方修合服至一月而吐血便血先除服至兩月而徧身筋腫漸消服至三月而手持足行之用俱復舊矣然後知藥果中病雖痼疾亦可痊也

火痰咳血

治火痰咳血用清涼得效述

丁酉之春有丁友在城候提學考因多飲燒酒咳嗽吐痰有血每日早起即出痰血三十口來求予治診脉製方已定其方雖用清涼而皆有製炒又兼滋補適有入薦一醫至見其火盛用桃仁承氣湯下之已合一藥一劑又合涼藥一劑純用生芩連生梔栢等藥此友欲求速效即欲用此醫之藥諸友中有疑其不可用者持

此藥來請正於予予曰若然用下藥其錯甚恐遂不可救無已則姑用其涼藥試之其友將涼藥一劑一日服盡寢至夜分咳吐不止同處者舉火視之見其牀榻前吐紅滿地驚訝不已然後用予方服藥四十餘劑又每日用雪梨絞汁一甌飲上頗溫服踰兩旬而咳與紅悉愈矣夫清涼一也或服之而轉劇或服之而漸瘳何也蓋火性急疾亟攻之則其勢愈熾緩治之則其邪漸息此理之常彼庸醫曾不識也

原用清涼藥方

麥冬（去心八分）側栢葉（炒六分）貝母（去心）知母（瀉腎火胃火）黃栢（但用青鹽酒炒）紅山梔仁（炒黑以上四味各六分）牡丹皮（去骨酒洗五分）生地黃（酒洗八分）黃連（酒炒五分）片芩（酒炒）白花粉（酒蒸各八分）前胡（水洗五分）天冬（去心蜜拌蒸六分）生甘草（四分）白桔梗（去蘆五分）童便香附（七分）玄參（去蘆）陳枳實（炒各五分）

生姜一片水一碗半煎至八分溫服

內傷外感

治內傷挾外感日久煩悶先清後補得效述（此條與後第八案按可參看其理相通）

甲辰夏月予族弟年二三十強壯有妻妾偶有房勞而感寒彼自知其有內傷也醫亦明知其有內傷也初用

蘇葉防風等藥一二劑而不效發汗其表邪固未散也至十六七日後表邪入裏寒鬱爲熱煩熱燥亂不可當一醫言用梔子豆豉湯吐遂不受一醫用人參五分加入知母石膏等藥內其煩燥愈甚延至十數日諸醫束手其家自謂必不可救矣適予自京回亟來請予治予診脉察症因思原有內傷則元氣固虛也外邪入內則邪氣猶實也當先清其邪氣而後補其元氣分兩截治之耳先用酒炒黃芩等藥每日服一二劑服至四劑病者煩熱大除喜甚以爲再生予則以爲未也至第五日仍依前方合藥二劑予戒病者曰今日當轉方用補此藥止可服一劑或半劑若覺服得不快即來請我再看當另製藥服果服藥一劑至午刻病者又覺煩燥自心慌亂以爲服藥既效而又變症病必不可爲矣至申刻復請予視予察其脉虛大謂病者曰外邪已淨內傷未愈服補藥當自安也因歸製加減補中益氣湯一大劑與之諸醫見予先用清涼得效而今驟用補又因前用人參五分不相投咸疑駭而戒其家必不可用補至日晡其兄又來說不敢服藥之意因病家有疑且將其藥煎熟

姑少飲試之果將藥煎熟先飲一酒盃便覺煩燥少除連飲數次盡劑至天明而煩熱盡除精神清安矣因連服此藥六劑而全安

原用清解藥方

黄芩（酒炒）七分　前胡五分　麥冬八分　天花粉（酒炒）七分　陳皮（去白）三分　甘草（生用）三分

桔梗（去蘆）五分　竹茹六分　赤芍四分　薄荷三分　貝母七分

連翹（去心蒂）五分　陳枳實（炒）四分　童便香附六分

生姜三片同煎　此藥服過五劑

原用加減補中益氣湯

人參一錢　黄耆（蜜炙）　當歸身　麥冬（各一錢五分）

去白陳皮　炙甘草　柴胡各五分　白术（去蘆去皮六分）

北五味子（大顆者研碎九粒）

生姜一片好膠棗一枚洗淨去核同煎　此藥服過六劑而愈

或問曰內傷挾外感與外感兼內傷何所分別曰先有內傷而後感寒謂之內傷挾外感先有外感而又內傷謂之外感兼內傷此大同小異其治法亦大畧相同也

然內傷不必皆房勞或飲食傷脾胃或勞倦傷神氣皆謂之內傷但不若房勞為甚耳或又問曰內傷外感相併俗謂之兩感言其內外兩受病非仲景傷寒陰陽兩感之謂也此病舉世不能治即治之全活者甚少何者欲攻外邪則愈損正氣而虛怯以死欲補正氣則反助外邪而熱燥以死且自古名公方論不惟仲景傷寒諸篇無一言及內傷即東垣內傷外感論言之雖詳然其意恐人悞認內傷發熱為外感發熱因辯若何為內傷當補若何為外感當發至於內傷挾外感等症並未論及亦無治法丹溪亦言之未詳古人未傳無怪乎時醫之不能治此病也今予分兩截治之先清其外邪而後補其內虛起死回生識見超越千古矣然此為日久而外邪入裏者立法也若內傷挾外感初起一二日寒邪尚在表者用何法治之曰此當速發其汗強壯者用羌活湯發之怯弱者用加減參蘇飲發之一汗之後即當用補虛甚者用加減補中益氣湯補之虛未甚者用生脉散補之此其收功比外邪入裏者尤速也若發汗後不補則虛陽外散發熱死矣

羌活湯

羌活　蘇葉　白乾葛（各一錢）　蒼朮

防風（各六分）　白芷　小川芎　去白陳皮（各五分）

生香附（七分）　甘草（三分）

生姜三片同煎熱服取汗

加減參蘇飲

人參（五分虛甚者加至一錢）　蘇葉　乾葛（各一錢）

去白陳皮　製半夏（各五分）　白茯苓（六分）　甘草（三分）

香附　白朮　小芎（各五分）　防風（五分）

勞傷感寒

生姜三片同煎熱服取汗

加減補中益氣湯　見本條煎去葉紮板

生脈散

人參（一錢五分）　麥冬（二錢）　北五味（五分打碎）

水煎不拘時服覺精神虛弱連服數劑亦可覺有火

加酒炒黃柏三分

治勞傷感寒先發後補得效述

辛亥季夏友于授福庠僚友有梁姓者年已七十因學道

歲考在傍收卷勞倦出汗多回衙洗浴感寒醫用防風

蘇葉羌活等藥已發其汗又用黄芩柴胡赤芍等藥清解之服清解藥一劑便覺精神昏倦沉重予聞其病重往視之見其又煎清解藥一劑將服予診其脉虚弱欲絶竊謂之曰外感已淨内虚已極若再服凉藥不可救矣急令勿服前藥因以補中益氣湯與之服一劑而精神頓起服一劑而稍安此友係刀州人其俗每夜必洗浴此時天熱甚又於晩間洗浴感寒身又發熱又請予治予曰昨因内虚而用補得安今又感寒補之不可發之不可將奈之何爲之沉思者久之因設一法將加減參蘇飲補中益氣湯各製一劑各用羌活煎熟先用參蘇飲熱服發其汗畧停一時候其身熱退即用補中益氣湯温服補之遂復得安再用補數劑而全安

原用加減參蘇飲方見前論内傷挾外感條

原用補中益氣湯　此與東垣原方雖同而等分稍異故録之

人參一錢二分　蜜炙黄耆　當歸身各一錢五分

白朮炒八分　去白陳皮五分　炙甘草六分　升麻三分

柴胡五分

生姜一片去皮好膠棗一枚去核同煎

治內傷感寒日久鬱熱先清後補得效述

予表侄年近二十新娶未久感寒未經發汗延至十數日煩悶已甚目昏耳聾醫咸知其有內傷也不敢用清解藥或畏用人參一二分入口嚥之即燥不可當大便秘十餘日又自汗不止諸醫束手其家求救於予予診其六脉洪數視其面容紅紫因謂其家曰此雖有內傷然其外邪鬱熱已甚若不先踈利而蕩滌之斷無生理因連用清涼藥三劑次日一更時用牽牛大黃丸一錢五分下之至三更以後利三四次便覺清爽耳自聞見後寢矣至天明以後又漸起煩熱予診其脉已虛知其內傷病出也連用生脉散一日服一劑而煩熱悉除後服補中益氣湯十餘劑而安

原用清涼藥方

黃芩　麥冬（各一錢）　連翹　前胡

白花粉　白貝母（各八分）　知母　赤芍

陳枳實（各六分）　黃蓮　桔梗（各五分）　梔子仁（炒黑七分）

生姜一片同煎　此藥服過三劑後一劑加煨過白芍

內傷外感

膏每劑三錢

原用牽牛大黃丸（方見前腹痛條三葉板）

治強壯內傷挾外感温寒二兩用得效述

予家僕年二三十歲稟氣素旺有內傷感寒身發大熱頭痛用乾葛防風羌活等發大汗已而身熱頭痛頓愈停一二時後復發熱煩燥予知其內傷病發製補中益氣湯人參止用五分黃耆生用服一劑而煩熱又除過一日後煩熱又大作自身與妻俱哭泣以爲必死矣予診其六脉洪數因思此僕稟氣壯原有內熱其內傷得補

鼻衄年久

而後其邪熱亦因補而作因用芩連知栢花粉連翹枳殼前胡等寒凉大劑每劑加酒炒大黃一錢五分服至七八劑而安

治鼻衄年久漸深漸危用清潤藥得效述

予論廬陵縣有稟生葉姓者家在遠鄉距城百里其子年十五歲患衄不止服藥不效向予求治予細詢其症則云此兒自九歲患衄其初每年不過五七次每次流血數茶匙至十歲十一歲則每月一次每次流血半酒盃至十二歲則兩月三次每次流血一酒盃至十三歲

則每月一二次每次流血半盞至十四歲則每月或一二次每次流血大半碗今十五歲則八九日一次每次流血盈碗矣瘦削骨立夜間身熱危困極矣諸醫用藥全不見效今束手待斃而已予問諸醫俱用何藥曰皆用清熱涼血之劑或十灰藕節韮汁等止血之劑予曰久患漸深則雖兒童其血已虛安可專凉專止爲之製清潤帶補之劑服至十劑而經減一二分服至二十劑而減四五分服至三十劑而減七八分服至四十劑而兩月一次每次血不過數匙服至五十劑而全愈生

肉而肥矣自後間或有時少發又將前藥服二十劑立愈

原用清潤帶補藥方

當歸身（酒洗）　懷慶生地黃（水洗淨晒乾酒浸一時生用五分炒鍋炒熟用五分）

大白芍（酒浸軟剉片生用四分蒸熟晒乾用四分）　甘草（生用二分炒熟用二分）

製何首烏　蜜蒸天冬（各六分）　牡丹皮（去骨酒洗五分）

酒炒花粉（七分）　酒炒黃柏　酒炒黃芩

童便香附（各六分）　酒炒黃連　川芎（各三分）

蜜蒸知母（五分）　龍眼肉（三箇）　麥冬（八分）

水煎每劑煎二次每次煎藥熟去渣後調法製髮灰一五

分食遠服

製髮灰法

用少壯無病男女梳下亂髮溫水肥皂洗油垢極淨又用清水洗淨肥皂氣將髮放入新瓦罐內罐之大小視髮之多少以塞滿緊實爲度用瓦蓋蓋罐口大小蓋定用鹽泥封口又將鹽泥徧塗罐四圍日中曬乾然後用木炭爆紅圍罐一大半煅一炷香久去火候冷取出其灰成塊仍研細篩過入藥此髮灰止吐血衂血等症俱效不特止衂血也若衂血暴發流不止者用童便二酒盃好酒一酒盃和勻調細髮灰一錢服立止曾有流鼻血盈盆單用此而止者多矣

連年血崩

治婦人氣血大虛連年血崩用補得效述

予婦年二十九歲生子月內調養未善至次年壬寅春月月經兩月餘不行一日忽然經水暴至血流不止一二飯久即昏暈不省人事急用十全大補湯去桂倍加參蓍又加熟附子炒乾姜各一錢作大劑煎熟灌之待其甦省連服一大劑血止十之七八又相繼服十餘日共服藥二十餘劑乃得全愈至次年癸卯春月血崩又

大作比前更甚昏暈更多又服前補劑三十餘劑其血尚未全止後用鹿茸炒燒存性研末酒調一錢服數次而血止又服峻補丸藥一料而一年不發矣然而病根未除也至次年甲辰八月十六日中午忽然經血又暴至其時予偶在吉安婦急召見將前方參耆姜附等補藥合成湯服一大劑然血流如水令痰湧吐至日晡而昏暈至更初而氣絕惟胸間微温觀者皆以爲必死至二三更有一醫用灶心土研細水調灌服一二酒盃令痰少開遂飲滚白水一甌方得甦省漸安此症危困已極而

得復甦何也豈初發時服大補藥一劑能令生意不[illegible]耶予在吉州聞報亟歸又多服峻補之劑調理幸而血止獲安矣因思以前二年之內嘗服峻補丸藥乃病根不除而每年血崩大作何也旁議者咸謂補血太過是以積而成崩又謂不宜用附子等熱藥推動其血遂至於崩予曰陋哉見也崩者取象於山土虛不固然後山崩豈有土實固而山反崩者乎今之血崩不止者必竟是血崩太虛耳且血氣相依附氣虛甚則降令多升令少是以不能攝血致令血不歸經而妄走下今不推當

大補血而丸當大補氣也而丸藥方雖用參耆歸姜附等峻補而不宜參入香附益母砂仁玄胡等順氣之物蓋順氣則損氣氣虛仍不能攝血遂致病根不除而復作也因製丸藥方專補氣血凡調血順氣等藥一味不用其丸服完一料而神氣爽健服完一料而身體復舊病根悉除次年出孕生第八兒矣其服煎劑丸劑時脾胃弱而慣泄因兼用參朮散理其脾

原用峻補煎藥方

人參（一錢五分間用一二錢）　蜜炙黃耆（一錢）　炒白朮（一錢）

炒黑乾姜（八分）　炙甘草（去皮五分）　酒炒白芍　廣陳皮（各分）

熟附子（錢）　白茯苓（八分）　大川芎（六分）　升麻

柴胡（一分）味俱用蜜炒各五　川續斷（去蘆酒洗一八分）

生姜（一片）去皮　大棗（一枚）去核同煎

原用專補氣血丸藥方

綿黃耆（蜜炙）　當歸身（酒洗）　甘枸杞（炒）　白茯苓（去皮）

川故紙（炒熟）　川巴戟（水洗淨酒浸軟打去骨取淨肉剉細炒）

大肉蓯蓉　北五味（去蒂炒）　瑣陽　蛇床子（揀淨炒）

製仙茅　製首烏（十二味各二三兩）　乾姜（火煨水淬以黑）

爲度

鹿茸（酥炙） 大川芎 酒炒白芍

熟附子 熟地黃 酸棗仁（炒熟七味各二兩）

鹿角膠 懐山藥（各三兩） 人參（二兩另碾末）

以上除人參山藥鹿角膠三味其餘共爲極細末將人參末與諸末和極勻將鹿角膠用好酒煑融如硬糊様又將山藥末入好酒打糊與鹿膠和勻共入前末內爲丸如梧桐子大空心温酒下三錢

原用參朮散

人參 炒白朮 白茯苓 炒山藥

大砂仁（去皮） 炙甘草 蓮子（去皮去心剉片炒） 米仁（炒熟）

大白芍（酒炒黄色） 廣陳皮（水洗） 雞頭實粉（炒各二兩）

姜汁製炒扁豆

以上共爲極細末每用煨粥清米飲調服數茶匙空心與饑時服

治感寒停食胸腹痛甚得效述

凡大人小兒胸腹驟然大痛其痛連延不止甚則有如刀割者皆因停食其停食皆因感寒或脾胃先感風寒而後飲食即能停滯作痛或先飲食而隨感風寒亦能

停滯作痛因感寒停食者不必皆多食過度而後停滯卽日用常餐亦停滯也是以病者莫測其致病之因而醫者亦莫知其受病之源或以内熱治而用凉藥錯誤甚矣或以傷食治而用消道藥亦非對症之劑也蓋感寒停食與傷食不同傷食者飲食傷脾胃内傷也停食者脾胃受風寒而飲食凝滯不運化外感也治傷食當以消道藥為主而兼補脾胃治停食當以發散寒邪為主而兼消導此立效之術也停食因於寒而不散其寒雖極力消導其食不消其痛不止予初亦未透此理毎治停食用消導多而用發散少取效尚遲至辛亥年治一侍婢停食腹痛先用消道藥罔效加發散一劑其痛未減因用炒鹽湯服一二碗吐之其痛減半又用發散為主加消導一劑其痛立止因悟寒邪停食作痛散其寒氣則食自消而痛自止其理甚明自後依此方治此病頃刻而痛若頓除可稱神妙矣此病患者甚衆予用此法治之而愈者甚衆難以盡述也因發明其理姑述其初悟取效一節以示後云

或問曰内熱蘊積亦能令人腹痛與感寒停食而腹痛

者何所分別乎曰積熱腹痛者其痛自時而作亦有時而止有時而急亦有時而緩停食痛者其痛最急連綿不止有延至數日者惟痛久或有時而畧緩耳但其初失治延至數日而後用藥者寒鬱爲熱難以復用發散藥當用木香檳榔丸與牽牛大黃丸微利之則痛止而安

發散兼消導方（此方兼吐泄霍亂與乾霍亂俗名攪腸沙）

羌活　防風　蘇梗葉　香附（生用）

蒼朮（各八分）　白芷　小川芎　藿香梗葉

砂仁（碾碎）　去白陳皮（各五分）　製厚朴

炒麥芽　山查肉　白茯苓　製半夏（各六分）

炒青皮　熟甘草（各三分）

生姜三片水一碗半煎至八分帶熱服此寒氣在內不必發汗服頭一煎或吐出宿食其痛立止更妙仍煎渣再服之則安或不吐痛亦漸止亦煎渣服之或未全愈寒氣必重宜依此方再服治吐泄霍亂與乾霍亂（俗名攪腸沙）此方可以通用不必加減

停食腹痛霍亂乾霍亂等症若事急製藥不便炒盐湯

治痢奇妙

赤可救急　用淮鹽八錢許將極淨無油鐵鍋入鹽炒紅入清水八碗淬之煎至二三碗取起候溫頓服三二碗自然大吐若不吐用雞翎探之吐其痛自減半

木香檳榔丸方見後（二十五葉板）

牽牛大黃丸方（見前腹痛條一二葉板）

治痢奇效屢得神效述

痢爲險惡之症生死所關最重不惟時醫治之未善而古今治法千家多不得其竅是以不能速收全效予治此病初時亦依古法或下或利小便殊覺其未效也經

驗既多漸悟病機遂不依古法而自製方藥隨試輒效後因往京偶遇窮途無藥自患此病透悟益精遂製爲一定不移之方刊布廣施初秋以後此病盛行時亦慕施藥所活甚衆難以盡述但施藥或一劑或二三四劑即救一人無不效者至於施方則病家醫家或吝藥本減少方中等分而不能依方或執泥舊聞舊見任意加減而不肯依方則多有不效者吾未如之何也然此藥用之千萬人無不效則此法得非傳之千百世而不可易者乎是以既刻奇方妙論而又重刻於此以廣其傳

治痢奇方

（此論下方千古神品痢[illegible]藏公屢試人至死或受其子孫病家詳說之云製卷末）（用藥輕重分釐俱要秤過[illegible]起死回生之神藥也）

川黃蓮（去蘆）　條黃芩　生白芍　山查（去子肉四味）

各一錢二分　陳枳殼（炒）　堅檳郎　姜汁炒厚朴

厚青皮（各八分）　當歸　甘草　地榆（各五分）

紅花（三分酒洗）　南木香（二分）　桃仁（一錢炒去皮尖研如粉）一

水二碗煎一碗去滓空心服滓再煎服　此方或紅或白或紅白相兼裏急後重身熱腹痛者俱可服　其有便純血便揚塵水大孔如竹筒等惡症古書指為不治者急服此藥亦可救但恐服之遲緩則毒攻壞臟腑難救耳　其有噤口者毒在胃口也將此藥煎熟去滓每一煎分五六次緩緩服之令其胃口毒氣漸開服完一劑後不惟藥可進而飲食亦漸可進矣不必另用他藥也　單白無紅者去地榆桃仁二味木香用三分加去白陳皮四分　滯澁甚者加酒炒大黃一錢服一二劑仍除之此方用之於三五日神效用之於旬日內外亦效惟半月外則當加減其法詳于後

黃蓮　條芩　白芍（三味生用各四分酒炒各六分）

山查（一錢）　製厚朴　陳皮　青皮

檳榔各四分　甘草（生熟各二分半）　地楡（醋炒）　當歸各一五分

桃仁粉八分　紅花三分　木香一分

如延至二月餘覺腹胃虛滑者　用酒炒芩蓮白芍各六分陳皮厚朴木香各三分醋炒地楡四分紅花一分當歸人參白朮熟甘草各五分（以上三方有孕婦人服之去紅花桃仁檳榔）

以上方法隨用輙效間有不效者必其初起參朮等補劑太早補塞邪熱在內久而正氣已虛邪氣猶盛欲補而碍之則助邪欲瀉而畏之則愈滑遂至于不救雖有奇方無如之何則初起溫補之一禍也予嘗治一公子一仕宦皆初起補劑而後不可救者故表而出之以戒後予有禁補禁下禁汗禁分利四大忌已詳于奇方妙論條茲不再述（活幼心法八十六葉板）

治婦人虛寒痰病用補得效述

己酉歲秒予寓京師河南夏邑陳公諱陛號抑吾者因予同僚路公以其夫人病來求予治詳述其病源病症云予婦年四十一歲稟氣怯弱飲食淡薄生育男女共六十人矣今冬自家來京路途受寒患痰咳兩月餘日間飲食少進晚間咳尤甚痰湧胸膈作熱終夜不得臥

則痰氣上促京中名醫用藥皆不效今則束手待斃且男女多劬苦不可言予因取其不效方藥來看多用清熱化痰行氣之劑予曰此危病本當診脉而公所述病源病症甚詳今又參諸醫所用不效方藥此病予已知之矣此肺虚受寒而咳其胸膈夜間作熱者虚痰凝而氣不流通非内熱也此當温肺而去其寒邪則咳自止彼清熱行氣是謂虚虚大誤也但舉世治咳惟知清肺不知補肺今吾聚用參朮等補劑見者必駭公能任吾意用藥則可若聽信不專參以旁議則吾亦不敢與聞也

陳公曰婦病已危甚矣公能救之是謂再造何敢復聽人言予即製補肺温寒藥一劑與之曰服此藥而病不加則可治也至第三日服完一劑藥後予往詢之陳公云前此終夜咳嗽不止或停止不過一二刻服此藥後夜間咳都有止或停一二時復咳且覺胸膈痰熱少減予喜曰此謂虚能受補病必可痊矣遂令連服前藥毎日一劑服至八九劑以後咳減十之七八夜間痰熱盡除終夜可以安寢服至十二劑後忽有音來云痰咳復發但比前減半予詢其故則云數日内月經適至予曰

經行則體益虛宜其病之增也仍用前藥每日服一二劑
而咳又漸減又製補血氣丸藥令其與煎藥相兼服至三
十月後而痰咳悉除平復矣後數日後陳公又來說婦
今咳嗽雖絶聲但夜卧至一二更後胸膈有一團發熱
煩燥或欲飲水嘗多服補劑而內熱乎予因察其六脉
虛弱知其仍是虛痰非熱也於補劑中加二陳等服數
劑夜間煩熱復除又十餘日後忽然胸膈氣不得上自
家心慌分付後事請予視之予診其脉弱知其仍是虛
痰為患復於補劑中加化痰藥服數劑又愈又旬日後

日間胸膈覺有凝滯飲食自患病以來比前大減至此
時雖諸證悉除而飲食比舊尤減半蓋因胸膈不開不
喜飲食也自是或夜間膈上作熱或有咽喉作痛隨症
加減用藥亦無不輒效然而病根不除其胸膈不開軟
食不能多進等病則無日不在也其時予已赴蘊庠不
踰月將出京矣陳公夫婦心忙以為前薦危病幸遇我
而生今病根不能拔而我又將別去此病何時而得奏
乎予亦深思用藥既效何以竟不能收全効也復再三
細察其脉猶然虛弱因思胸膈凝滯飲食少進必竟是

虚痰為病而多服四君二陳等劑不能開痰者由中氣微弱難以運行藥力也無已則用姜附乎遂與陳公商之於前藥中加炒黑乾姜熟附子每劑各四分服一劑而胸膈漸開飲食漸進又將姜附漸加（至六分）再服一劑而胸膈大開飲食復舊矣會計前後服藥七十餘劑去一二病又生一二病畢竟以姜附數劑而收全效者以姜附力雄能佐四君二陳以補中而開痰也自後仍除姜附製平常調養血氣等煎劑丸劑方陳夫人服之五六年常得安妥直至乙卯春夏又覺前方頗有不效者陳公父子不遠數千里差人來我家詳述其近日病症將前方求為加減予詳症知其身體益弱仍用峻補製煎劑丸劑方與之

原用補肺滌寒方

人參　炒白术（各錢）　炙甘草　製陳皮（各五分）

製半夏　白茯苓（各七分）　款冬花（去梗）　製南星（各五分）

百合（蜜蒸八分）　大杏仁（泡去皮尖炒）

（各六分）　真蘇子（微炒研細五分）　蜜炒桑白皮

生姜一片好膠棗一枚洗淨去核同煎食遠服

原用補氣血丸藥方

人參（另碾）　當歸身　蜜炙黄耆　白茯苓

酒炒白芍　川故紙（炒）　熟地黄　大肉蓯蓉（去鱗）

（甲酒洗八味各二兩五錢）製何首烏　鹿茸（酥炙去毛各二兩）

官桂　南木香（不見火各八錢）　眞阿膠（一兩五錢另煮）

以上爲極細末和勻將阿膠剉細用好酒一碗煮融入煉蜜半碗和勻和前末爲丸梧桐子大空心或食遠用溫酒下二錢五分白滾水下亦可

原用二陳加姜附湯

製半夏（七分）　去白陳皮（六分）　白茯苓（八分）　熟甘草（五分）

蜜炙黄耆（八分）　當歸身　人參（各一錢）　製南星（七八分）

炒乾姜　熟附子（先各加四分後各加至七八分）

治感寒日久悞用補劑後用解利得效述

予在福州時福建按察司經歷彭姓者安成人也年七十餘歲一日因送上司冒雨受寒未經發散即病半月餘諸醫因其年老皆用養血氣藥補之煩燥愈甚飲食少進請予治之予診其脉審其病源因謂之曰此寒邪未得外散入裏鬱爲熱邪豈可用補且年七十而原因受寒

鬱熱腹痛

稍輕又無內熱是以雖慣用補而猶可療耳　因用清觧藥日服一劑連服五六劑而寒熱漸除飲食漸進然其大便秘已十餘日矣予謂此必須下利然而不可以煎劑下也用牽牛大黄丸數錢分二次服下之而安

原用清觧藥方　（見前內傷挾外感條）

原用牽牛大黄丸　（見前腹痛條）

治鬱熱氣塊作痛用攻擊得效述

翰林丘公號鶴峯諱禾實者一日未食話房考取萬安門生會公諱學鏡癸丑與予同在京朝覲燈節日會公訪予曰家師患病廢寢食者旬日吾儕弟子情不容已敢請審視其疾倘得安則再造之德也予許諾次日往視之詳詢其病源則云因上年喪偶憂鬱左脇作痛數日而愈不一月復痛久之覺有痞塊走動每發時有形不發時則伏而不見經今一年屢次痛發不過五六日即止今次則痛發旬日餘不止其痛日間飲食少進夜間就枕則氣上而痛愈甚幾廢寢矣因取初患迄今諸醫所用藥方觀之予診其脉閱其方謂之曰此病原不難治所以久不愈而病日增者諸醫藥不對症也病生於

憂鬱原屬肝木木鬱生火凝痰成塊而諸醫多用二陳砂仁白朮當歸之類助火增鬱失之遠矣今宜開鬱清火平肝消塊此用攻擊之兵其屬多峻皆諸醫所畏縮不敢用者公請勿疑可也丘公曰吾意亦以爲必須用峻藥攻擊奈諸醫皆謂恐傷元氣不敢主張是以延綿至此高見正與鄙意合請任意治之可也予即製開鬱消塊煎劑方與之一日一夜服一劑覺胸膈稍寬飲食頗進然痛雖少減而未止也次日予又診脉因思止痛非煎劑所能姑用木香檳榔丸以止其痛後用黄連阿魏丸以消其痞塊而除其病根則計日可收功矣因取木香檳榔丸八錢與之一日一夜服完而痛即止可以出門拜客矣遂製黄連阿魏丸每日服二次服至十餘日而痞塊消病根除矣予因諭以病根若已除盡此丸即止勿服恐攻擊太過損元氣也又諭以病去後如覺體虛須服補氣血藥如八物湯之類補之

原用木香檳榔丸（此丸以意加減與古方不同諸般積滯氣血食積無不効惟虚寒者忌之）

木香（不見火）　檳榔　當歸　去白陳皮

青皮　枳殼（炒各一兩）　黒牽牛（半生半炒取頭末二兩）

醋炒莪朮　酒炒大黄各三兩　童便香附
姜汁炒黄蓮各二兩

以上共爲極細末和勻粘米粉打糊爲丸如胡椒大量病輕重服或服五分或一錢或錢半或二錢或二錢半或三錢止用白滚水吞下此丸通治諸般積滞或氣積或血積或食積無不立效惟虚寒者忌之

原用黄蓮阿魏丸

黄蓮（姜汁炒二兩）　三稜　莪朮　青皮（俱醋炒）
童便香附　大黄（酒炒）　赤芍　前胡（水洗）

龍膽草（酒洗炒各二兩）　當歸稍（酒洗）　去白陳皮（各一兩一錢）　蚶子殼（煅一兩）　南木香　猪牙皂角（炙去皮弦一兩）　眞阿魏（另用酒一盃許煮融各八錢）

以上爲極細末和勻另用白貝母去心研粉三兩量用水打糊入酒煮阿魏和勻爲丸胡椒大毎食遠用滚白水下一錢五分日服一次臨卧服一次

中脘積滞

治婦人中脘積滯用藥導得效述

福建方伯袁公夫人年五十歳胸膈積滞飲食減少終日不食亦不知饑勉强進食亦不知飽如是者半年諸

醫用藥不效請予治之予診其脉知其中脘氣滯痰凝也用化痰順氣藥加入莪稜等開之服二劑未效且云未服藥時胸膈覺凝滯而不甚作痛服藥後其痛稍增而亦不覺開朗予再診其脉謂袁公曰此病係積滯無疑矣而服行滯煎劑不效者此其中必伏有積塊煎劑徒能推動之而不能滌除之是以增痛而不開耳須用丸藥消磨其塊因製木香檳榔丸令其每服五分頻頻緩服之服至八錢而中脘漸開飲食漸進服至一二兩以上而胸膈寬朗飲食復舊矣因戒令胸膈無凝滯切勿輕服此丸

原用木香檳榔丸見上卷林脇痛條

奇效醫述卷二

清江久吾聶尚恒　著

產後發熱

治婦人產後內虛發熱用補得效述

方伯袁公長媳年十九歲産男臍風不育滿月之日婦姑相對而泣憂思勞神因而發熱頭痛一醫以外感治之用九味羌活湯數劑其煩熱愈甚事急請予治之予診其脉虛詳問其症則云頭重困倦而多汗予曰此內虛發熱奈何以外感治之此謂虛虛其悞甚矣用大補氣血之劑連服二三劑而煩熱漸除服至十餘劑而安

産後感寒

原用大補氣血方

人參　黄耆（蜜炙）　當歸身（各一錢五分）
白朮（炒）　白茯苓（各一錢）　大川芎　白芍（酒炒）
乾姜（炒）　熟甘草（各六分）　陳皮（去白）　童便香附
升麻（蜜炒）　柴胡（蜜炒各五分）　麥冬（八分）
煨姜一片去皮　好膠棗一枚洗淨去核同煎

治婦人産後感寒入裏先清後補得效之述（此條與正傳或問第二十七問參看）

一婦年二十餘歳冬月産女其未産前一二月已患感寒産後二三日内因洗手面又感寒身熱頭痛予用參蘇飲發其汗頭痛止而煩熱連日不除診其脉弱疑其去血多内虚發熱用補中益氣湯服一劑煩熱不减而有加予思産後脉弱其常也而煩熱不除服補不效得非外邪入裏與男子内傷挾外感久而入裏同症乎因用酒炒黄芩酒蒸苎花粉前胡貝母麥冬桔梗甘草乾葛赤芍連喬童便香附之類清解之服一劑而煩熱减半服至三劑而煩熱悉除粥食如常隨用八物湯一二三劑補之而安此婦若拘執治産後常規治之不敢用清解之藥則其熱經旬不除熱久則血氣焦枯變症傳風

而死矣以此知病情多端不可執滯蘭機應變神而明之可也

予因治此一婦而思及古名公之言亦多有欠周匝欠分曉而不可盡信者朱丹溪輩俱云產後大補血氣為主雖有他症以末治之若拘泥此言而不變通則此婦斷無生路矣今備論之產後大補血氣為主此一言非不有理然用之於無他症者則當用之於有他症者則乖何以謂之無他症如產後或去血過多或勞倦太早以致或五心熱身熱或頭重昏痛或多汗或偏身軟弱無力或骨節酸痛或腰膝運轉艱難而痛此則總是血氣虛弱之症而非他症也此惟大補血氣則諸症自除不必治也亦非以末治也何以謂之有他症如產後或洗浴太早而感寒或感風涼而感寒或口吃冷物而感寒以致身熱頭痛四肢痛等症則當先用參蘇飲之類汗之發散其寒邪而後用補如或寒邪日久未發入裏鬱為熱邪以致煩燥發熱則當先用清解之劑除其熱邪而後用補凡此他症皆當先治急治而大補血氣次之又何可以末治也若視為末不急治而遽用補劑

極虛似熱

則反助邪爲害雖不斃矣是以從來產婦傷寒百不救
一非獨時醫之拙亦古人立法疎漏之失也予故表
而出之以補醫工之闕漏以救婦人之危亡　此條與
前治男子內傷挾外感條其理相通可以參看

治極虛似熱用峻補得效述

一堂侄年二十四歲素恃強壯無病一日因母病製藥
飲燒酒睡醲覺微感寒次日召醫用發藥一劑覺直
腸墜下甚硬有如痢疾裏急後重之狀醫又用清表藥
一劑其墜硬愈甚第三日醫疑其熱墜用大黄等下之
僅得微利服下藥之夜身出大汗溫衣如水洗換衣良
久大汗又溫衣一夜換衣十餘次至天明請予視之予
診其脉虛大然坐一飯之久而又換衣一次予曰此虛
極而畏服凉藥大汗不止命在須臾矣用參耆附子共
壹大劑急服之服完一劑至午間大汗即止然其硬墜
則如故也知其氣虛而下陷用補中益氣湯倍加參耆
又加姜附服數劑其墜硬不甚減又不大便疑其血濇
又多加當歸熟地黄懷牛膝入生蜜和服以潤之得大
便一次其墜硬略止半日後仍復如故仍用大補氣血

之劑人參附子乾姜俱用一錢五分服數日而墜硬不減精神尤恍惚旁議有疑其熱者欲用炒黃連之類予再察其脉詳觀其形症灼知其虛之極也用上好人參五錢爲一劑加入前藥內服之四更時服藥至天將明時其墜硬後重之苦若人援而除之也自後隨服大補氣血之劑數十劑而安

原用參耆附子湯（五止虛汗此方之力予試之甚妙）

人參（二錢）　黃耆（蜜炙五錢）　熟甘草（五分）　熟附子（一錢五分）

水一碗煎七分溫服

原用人參大補湯（治墜硬後重）此方之力也

人參（一兩五錢）　炙黃耆（五錢）　熟甘草（六分）　炒白朮（一錢一分）

當歸身　熟地黃（各三錢）　熟附子　炒乾姜（各一錢）

水一碗煎七分溫服

痘瘡
狂譫

治痘瘡內虛大發狂譫用補得效述

予姻鄰有高姓者家數千金年五十餘獨有一子年十四乙卯年春月出痘經六日瘡已出齊晝夜譫語不已時或發狂欲走常用一人按之在床諸醫用藥不效請予治之一更往視其痘見其痘極稠密色頗帶紅而狂

譫特甚亦疑其毒重用酒炒芩連牛蒡連喬當歸山查之類少加參耆服一劑後頗安睡兩三時不發狂譫至五更復狂譫如故天明予往視之見痘色漸淡正視臉間見其勃然擡起如人被驚之狀予因悟曰此子痘雖出齊而稠密已甚其血氣內虛不能送毒氣出外成膿毒氣在內乘虛攻擾心經是以心神昏亂而譫語驚悸而狂走惟大補其血氣則血氣自能逐毒出外而狂譫自定矣因用內托散加減服之初定方合藥時有一醫在旁見之心甚驚駭而不敢言退而語人曰毒盛發狂而又服此熱藥今日必燥熱而死此子命在須臾矣庸醫不知其理固宜其駭而妄言也既而辰時服藥後即安寢半日至未時而痘脹目閉神氣安靜無一妄語飲食亦少進惟膿漿尚遲滯仍用內托散加味每日服一劑服至七八劑而漿漸滿服至十餘劑而漿滿收靨矣痘收還元後覺有餘毒身痒服大連喬飲加減數劑而安

原用加減內托散

人參　黃耆（蜜炙）　當歸身（各一錢）　熟甘草

炒白芍（各六分）　官桂　南木香（各五分）　川查肉（七分）
防風　白芷　製厚朴（各四分）
生姜一片　好膠棗洗淨去核一枚　同煎

此方服一劑而狂譫即止後因膿漿遲滯參耆各加至一錢五分又加酒炙鹿茸一錢服十餘劑而收功

痘瘡毒盛

治痘瘡內實毒盛始終用清凉得效述

予妻孫年十八歲乙卯春初偶來寧化衙內暫住忽然身熱頭痛其時寧化地方多有出痘者即用升麻葛根湯發其汗二日內即報痘報痘二日而嘔吐不止不能飲食痘色紫而不顯明因製連翹牛蒡飲服一劑即不嘔吐能進飲食痘遂出齊起脹痘出八九日膿漿雖滿不肯收靨身復發熱煩燥予知其症係有餘而毒氣未散與解毒藥數劑而安

原用連喬牛蒡飲

連喬（去心）　前胡　紫草茸（酒洗各六分）
白茯苓　製半夏（各五分）　牛蒡子（炒熟碾碎七分）
陳皮（去白）　小川芎　桔梗（各三分）　山查肉（八分）
生甘草　生黃耆（各三分）　人參（一分半）

水一碗清煎七分

原用解毒方

芩連（酒炒八分）　花粉（酒蒸八分）　前胡　牛蒡

連喬（各七分）　生甘草　防風　荊芥穗（各三分）

當歸稍（五分）　紅枝子仁（炒黒六分）　赤芍

生地黄（各五分）

水一碗半煎八分

以上二子出痘年皆相若一則大發狂譫其症似實熱而識其的是虛弱純用温補取效一則嘔吐不食其症似虛寒而識其的是實熱純用清凉取效凡此皆非徒中由於辨識精明而其所以能精明者由其詳於觀形察色又看其精神而得之微渺間也若識之不精辨之不明而以治後一人者治前一人治前一人者治後一人則此二子者皆不活矣如此疑似之症古人辨識不精誤投藥劑實實虛虛以致夭折者何可勝計予不能一一剖析姑舉此二子爲式以示後之司命者不可不詳察人之虛實寒熱也

虛瀉似熱

治小兒虛瀉似熱用補得效述

予家僕一幼男年一歲泄瀉不止醫用藥不效抱來予看見其面赤身發熱口渴又甚初疑其熱瀉用四苓散加木通車前子畧加姜汁炒黄連少許一劑與之又看其兒神氣困倦疑其未必熱也戒之曰此藥煎熟姑用酒盃少與半盃若服不相宜即止勿服速來換藥其兒服藥半酒盃泄不止而又嘔吐其母又抱來看而其身熱面赤口渴則如故也予知其脾胃極虛則陽氣無所依而欲外散是以身熱面赤脾胃極虛則津液內枯是以口渴因製參朮姜桂飲與之服一劑而泄止服二劑而全安

原用參朮姜桂飲

人參（五分）　白朮（炒七分）　乾姜（炒）　官桂（各二分）
白茯苓　扁豆（姜汁炒）　山藥（炒各六分）　廣陳皮
熟甘草（各四分）

生姜一片去皮好膠棗一箇去核洗淨同煎

小兒虛寒吐瀉犯此症者甚多時醫見其身熱面赤口渴皆視爲熱症而投以凉劑其悞甚矣凉劑悞投或半日或一日或二三日即傳慢驚而死者不可勝計而庸醫

熱瀉似虛

俱藉口病不可治不知其枉寃實殺之也彼且以爲小兒純陽何虛之有至於脾胃虛極陽氣外散極虛似熱之理則舉世執迷致死不悟兒童之患此症者何其不幸也亦可悲矣予自悟此理依此法活兒童甚多難以盡述姑舉其初悟顛末以示後人

治小兒熱瀉似虛用清涼得效述

予姪婦生一女孩纔滿十箇月其姐嘗抱往日中受暑氣水瀉數日不止其母不知錯認因是感寒用蘇散藥不效用分利藥又不效其泄瀉數而急消似虛予細察

熱瀉身痛

詳問知其病因於受暑氣也用益元散數匙服之少止然其瀉已久神氣困倦已極眼皮垂而哭聲不出父母及傍人皆以爲必死不必服藥矣予曰但得瀉止即可望甦用茵陳車前益元散四錢白滾水每次調四分頻頻服之服一半而瀉止六七分服完而瀉止小便漸利漸能飲乳越二日而全安

原用茵陳車前益元散方見後熱瀉身痛條

治熱瀉身痛用清涼得效述

予婿年二十六歲先時患痢服藥數劑而愈因食鮮魚

大早復發服藥數劑又愈旬日後忽患水瀉數日不止因而泄甚頻數纔食薄粥米飲即從大便泄出徧身骨節痛甚有如刀刺其時予偶出一二十里外速發人來報事急先請一醫看病見其瀉甚飲食直從大便出以為虛滑用胃苓湯加炒乾姜服之纔服一煎下咽而予至矣予診其脈數詢其骨節極痛知其瀉因濕熱而非虛滑也既而病者自言胸膈緊緊則知用胃苓乾姜者誤也予因用芩連炒黑各一錢五分枳實炒黑一錢甘草三分車前子五分木通赤茯苓各八分作一劑服之僅胸膈不緊而瀉與痛減不過一二分次日予製茵陳車前益元散四錢與之令用滾水調服至一半而瀉與痛減半服完而瀉與痛減七再服六錢而瀉痛悉除矣然積熱猶未除也瀉痛雖止裏急後重復作大便頻數澀滯猶甚用治痢奇方每劑加熟大黃一錢服十數劑而安旬日後覺脾胃弱服參苓白朮散數兩而精神復舊

原用茵陳車前益元散（此方治一切濕熱頭重徧身骨節疼痛水瀉小便不利等症）

車前子（炒研一錢）茵陳（研末一錢）各成六一散二錢　如多用照等分加　共和勻滾水調五分一次頻頻服之

此方原以意製初用以止水瀉不虞并骨節大痛俱止又不虞用不過數錢而遂除瀉痛大病也蓋瀉與痛皆屬濕熱此藥大除濕熱是以二症俱除後見輩有小便不利頭重徧身骨節痛者予知是濕熱也用此藥治之服四錢而頭輕痛止小便利亦前人未試之妙劑也

原用治痢奇方（見前治痢條二十七葉板）

鬱熱似瘧

治鬱熱凝痰似瘧用峻攻得效述

一老年七十因抑鬱成病氣滯痰凝腸有積塊皆作寒熱醫者與病者俱不知也以瘧治之又以虛治之凡十月服藥六七十劑不效又以瘧求方於予予以久瘧方與之亦不效親就予診脉予細察其脉詳問其症謂之曰此乃鬱火鬱痰凝滯胸脇積成痞塊因作寒熱似瘧而非瘧也以開鬱清熱化痰行氣藥與之服數劑後忽然腸腹大痛其子急求救於予予知其痰熱積滞已久服此開導之藥發動其病根是以作痛又詢其大便久秘知其必大利而後痛可除也以牽牛大黃丸五錢與之令用熱水分二次服已服而大便不行又以牽牛大黃丸四錢與之服仍不行因以煉蜜滚痰丸一兩與之

令分二次服大利數次腹痛立止積滞俱除痞塊亦消久病頓愈矣此乃因藥發病腸腹大痛遂不得已而峻攻用峻攻而痼疾除於一旦是亦一奇也又牽牛滚痰二丸每服二錢以上無不即利者此老一旦服一兩而後大利又一奇也然此老得此病其犯必死者二當其痰熱凝結胸脇若不得對症之劑踰年必鬱閉而死及其腸腹大痛若不得峻下之劑三日必痛苦而死犯此二死迺得廻生此老亦太幸矣哉

原用牽牛大黄丸（見前） 原用煉蜜滚痰丸（即礞石滚痰丸加蜜）

（感寒入裏）

治老人感寒日久外邪入裏用利藥得效述

丙辰初春予母舅八老官年七十有七生平少病不慣服藥歲暮因冒雨感寒未經發汗至正月初八九内熱煩燥胸膈緊滿十日不大便予用清解藥一二劑纔服即吐去大半又加熟大黄利之服下咽即吐去殆盡益其痰熱凝結胸膈拒藥不受也予因用牽牛大黄丸五錢許令其用白滚水吞下一次止服四五分緩緩服之服至四錢五分而大便通矣連利四五次後去内熱煩燥悉除胸膈漸開能進薄粥再服清熱化痰藥十餘劑而漸

安一月後又患腹脹用補脾藥不效以平胃散煮五皮散爲末三兩許服之而安

治痰火吐紅隨症用藥得效述

寧化縣一童生年二十餘歲痰咳吐血時或徧身發熱熱退四肢冷如氷瘦削將危叩禀求方予用後煎藥方服二十餘劑而血止熱退又用後丸藥方服一料而全安

煎藥方

懷地黃（酒浸晒乾用六分姜汁拌砂鍋炒熟用六分）　牡丹皮（去梗酒洗）

八方

生甘草一分　大白芍（生用四分酒炒用六分）

黃柏（去皮）　知母（去毛俱用青鹽炒各六分）　天門冬（去心去皮蜜拌蒸晒乾五分）

麥門冬（八分）　貝母（六分）　白花粉（人乳拌蒸晒乾八分）

當歸身（酒洗六分）

水一碗煎至七分食遠將臨時服煎藥熟去滓每一煎各入法製髪灰五分調服

丸藥方

甘枸杞三兩　白茯苓三兩　北五味一兩　懷牛膝（去蘆一兩）

覆盆子（去蒂酒蒸一兩）　麥門冬一兩　白芍（酒炒）

黃栢　知母（製同前）酸棗仁（揀凈炒熟）杜仲（去粗皮姜汁和酒拌濕炒去系各二兩）懷地黃（姜汁拌炒熟三兩）天門冬（製同前二兩）牡丹皮（去梗酒洗一兩五錢）

共爲極細末另用懷山藥二兩碾末入好酒打糊爲丸如梧桐子大空心溫酒下二錢五分

製髮灰法（見鼻衄條前二十葉板）

一表侄年二十歲咳嗽吐痰其中有線紅先服二母散痰咳少減而紅不止用後煎藥方服三十餘劑而咳止痰亦無紅忽然大便下血三日血在下爲順姑勿遽止之半月後用新製臟蓮丸服數次而便血立止

煎藥方

花粉（酒蒸）片芩（酒炒）麥冬（各八分）側栢葉（炒五分）
天冬（製同前五分）黃栢　知母（製俱同前各六分）
玄參（去蘆水洗五分）紫菀（水洗五分）白芍（酒蒸六分）當歸身（七分）
牡丹皮（酒洗五分）生地黃（酒洗七分）貝母（六分）前胡（水洗五分）
甘草（生用三分）陳皮（去白二分）
生姜（一片）龍眼肉（三箇）同煎

新製臟蓮丸

用川黃蓮爲細末酒拌潤入猪大臓内韭菜塞之蒸爛槝勻曬乾或焙乾仍爲末每黃蓮末一兩入側栢葉炒當歸末各一錢和勻米糊爲丸梧桐子大空心温酒下二錢五分或白滚水下亦可

予族侄年二十歳因鬱怒勞倦忽吐紅數口十餘日未服藥自後每日必吐數口予診其六脉頗旺胸膈嘗緊時或作痛知其鬱火熾盛也用後煎藥方服十劑而血止服十劑而安自後遇勞觸發服此藥二三劑甚愈

煎藥方

片芩　黃蓮　花粉（俱用酒拌蒸晒乾各七分）

貝母（六分）　前胡（水洗）　連翹（去心蒂研碎）　當歸（酒洗）

側栢葉（炒）　玄參　天冬（蜜蒸各五分）　童便香附

牡丹皮（酒洗）　生地黃（酒洗）　陳枳殻（炒）　麥冬（各七分）

黃栢（酒炒）　知母（各六分）　山枝子仁（慢火炒黑六分）

甘草　桔梗（各三分）　白芍（酒蒸晒七分）

薄截生姜一片水一碗半煎至八分食遠服

予甥年十九歳忽患吐紅數日後方來診脉服藥其病

勢頗熾毎日或吐紅一二十餘口然其禀氣怯弱可慮也予用後煎藥方服二十劑而血止服一二十餘劑而稍安病愈後因體虚兩足感冒風寒徧身發熱初以爲内熱也仍服清火化痰藥而未經發汗數日後遂成脚氣兩足脛及脚背腫痛又一二日則兩膝痛甚不能屈伸因而徧身作熱又似傷感且小便黄而大便秘濇予知其爲脚氣初發也用後脚氣煎藥連服一劑大便利數行下而身熱盡除脚膝腫消痛止再服清涼藥數劑而安

吐紅煎藥方　即前族侄煎藥方除連喬枳殼枝子二味餘味俱同

脚氣煎藥方

大黄（酒炒二錢五分）　赤茯苓　黄芩　漢防已
茵陳（炒各一錢）　白乾葛（一錢二分）　枳殼（炒）　製蒼朮
木瓜（各七分）　製厚朴　前胡（各六分）　羌活
防風　牛膝（去蘆各六分）　甘草（二分）

水二碗煎一碗空心服或饑時服

治婦人痰咳發熱用清潤藥得效述

寧化縣一婦人年四十餘歳因生産過多咳嗽身熱日

夜不止午後益甚肌肉瘦削經水不行諸醫用藥不効其夫叩稟求方用後煎藥方服十餘劑而身熱已退又加味再服二十餘劑而全安

煎藥方

白花粉（人乳拌蒸曬乾） 麥冬（去心各八分） 天冬（去心皮蜜蒸曬五分） 地骨皮（去骨酒洗） 當歸（酒洗各六分） 生地黃（酒浸曬乾生四分砂鍋炒四分） 人白芍（酒浸軟曬生用二分炒用二分） 懷山藥（六分） 百合（酒拌蒸曬八分） 前胡（四分） 知母（蜜拌炒六分） 童便香附（八分） 貝母（去心六分） 白茯苓（七分） 生甘草（三分）

生姜一薄片龍眼肉二箇同煎此藥服十餘劑熱退後又加桔梗四分酒炒芩連各六分再服二十餘劑而安

寒咳失聲

治咳因於寒服凉藥失聲用發散得效述

一親友以善醫自負稟性素熱慣服凉藥在京朝覲因傷風久咳求方於予予曰咳因風寒必先除寒邪而後可以清熱製方先用桑杏麻黄防風等品此友自是已見以爲素不用燥藥單用枝芩花粉等凉劑服多一日聲啞不出來請予治予戒之曰公能任吾意用藥勿參已見則聲可立出若要自用則不敢與聞其友事急不

得已而聽予因製加味三拗湯與之服完一劑坐歇未畢而聲出矣

加味三拗湯

杏仁（揀去雙仁者不去皮尖二錢五分）　麻黃（一錢）　生甘草（五分）

羌活　桔梗（各八分）　防風（去蘆一錢）　生姜（一錢切細）

水煎帶熱服

四時感寒

經驗四時感寒發散方（身熱頭痛骨節痛者皆用此發）

白乾葛（一錢五分）　升麻（水洗去小根五分）　真紫蘇葉（一錢二分）

香附（水洗搗去毛剉碎七分）　小川芎（五分）　蒼朮（米泔水浸一日洗淨剉片晒乾八分）　防風（去叉者不用水洗去蘆六分）　廣陳皮（去白四分）

甘草（三分）　京赤芍（四分）　白芷（四分）　羌活（八分骨節痛甚者用一錢五分冬月加麻黃去節一錢夏月不用春秋月如天寒加入天暖不必用）

生姜三片爲引約重二錢切細水一碗半煎至八分去渣熱服被覆取汗渣再煎如汗出不透仍熱服催汗若汗出既透其渣從容温服可也

服此藥發汗之後如身熱頭痛骨節痛等症盡除則不必服清解藥可也其或熱與痛未盡除則須服清解藥一劑或二劑或熱與痛雖除而覺有内熱煩燥大小便不利者亦須服清解

發汗清

藥一二劑其方具後

經驗發汗後清解方

黃芩（水洗刮淨）一錢　前胡（水洗去毛）六分　柴胡（水洗去蘆）一錢　白乾葛一錢

赤芍五分　枳殼（炒）六分　白花粉八分　山梔子仁（酒水炒黑）六分

桔梗（去蘆五分）　連翹（去心蒂打碎一五分）

甘草二分　薄荷三分

如小便不利加赤茯苓朱苓澤瀉木通麥門冬去心各八分車前子四分

右上方藥皆十二日內感寒能及時發汗者用之無不

清解熱邪

神效其有當時失於發散延至四五日以外則寒邪入內鬱爲熱邪或頭痛骨節痛等症已除止是胸腹五心發熱煩燥此則不可復用羌活麻黃防風蒼朮等藥發汗但當與清解其熱邪若大便秘濇則用大黃等藥疏利之可也

經驗清解熱邪方（此方治外感失於發表傳變成瘡者一二劑不愈至三四劑體氣虛久瘡者忌之）

白乾葛一錢二分　前胡六分　陳枳殼（炒七分）　連翹（去心蒂六分）

白花粉七分　柴胡（去蘆八分）　黃芩一錢　赤芍一五分

甘草三分　麥冬（去心一錢）　薄荷三分　山梔子仁（炒六分）

内熱盛者加黄連八分小便不利者加赤茯苓茵蔯朱苓澤瀉木通各八分大便秘者加酒炒大黄二三錢服一二劑如又不通大黄多炒加芒硝二三錢皆方盛碗内待藥熟澄渣傾入碗中調服立効

以上時感治法俱尋常感寒而不兼内傷者宜用之其有内傷挾外感外感兼内傷者詳見前條醫述（二葉及十七葉未板）中茲不復贅　其有外感失於發表傳變成瘧者即用此清解邪熱方服二三劑可表散而愈或不即愈服至三四劑自可漸愈若體氣虚弱及久瘧者切不可服

治瘟疫方法

瘟疫以六淫致疾嶺南閩廣間名曰瘴氣傳染流行病之最可畏者也張仲景無治法豈東漢以前風氣淳和此症罕作於民間乎厥後名醫著論立方亦多闕畧未詳豈此症有傳染之疑名公多不屑治遂致畧而不講乎世稱此症惟薄德之家有之若積善之家神明呵護必不罹此是亦降祥降殃之説也然先儒稱古今聖賢言百六十病唯心病可免謂其養心有道一切憂愁驚懼不能入而中病也若時氣之自

列於形骸之能必其不染否且以千古儒宗若周元公者當其驅馳王事猶不免於染瘴矧其他乎兵法曰不恃其不來恃吾有以待之此萬全之術也予亦素不究心於此近已因親鄰患此者多不諳治法而妄投藥餌以殞其身因詳考古今治疫之得失而以理以意斟酌方論以爲拯瘝救弊之一助云

疫瘴皆熇烈之氣似傷寒而非傷寒也俗人不知辨白混以傷寒名之俗醫亦以治傷寒方藥混治誤亦甚矣古法戒不可作傷寒正治大汗大下甚爲有理[illegible]明傷寒邪氣當其在表可大汗而愈及其入裏可大下而愈惟疫瘴之氣猛烈當其在表亦不可發汗以散之然太汗則恐正氣反虛而邪氣益難除也其入裏也止可用藥從容解散若大下之則恐胃氣傷而元氣反虛邪氣愈得肆也皆畏其邪氣熇烈故也然禀氣壯實者微發之後可单用凉藥解散若禀氣怯弱者微發之後當兼用人參入清解藥中扶其元氣然後邪氣可除也若不分虛實而一槩用寒涼壯實者猶可望生虛怯者必死無疑矣

初病一二日發汗方

羌活（一錢二分）防風（去蘆八分）蒼术（一錢）白芷（五分）

小川芎（五分）生香附（搗碎八分）陳皮（去白三分）甘草（三分）

白乾葛（一錢二分）真紫蘇梗葉（一錢二分）

生姜三片同煎熱服取汗不可大汗此方不論虛實俱用此發汗後則易愈

發汗後清解方

前胡（水洗八分）陳枳殻（炒七分）連翹（去心蒂打碎八分）

柴胡（去蘆八分）黄芩（一錢）桔梗（去蘆八分）白芍（[illegible]一錢）

升麻（五分）赤芍（六分）製半夏（五分）甘草（[illegible]分）

虛弱者加人參六分去連翹口渴煩燥者去半夏加麥冬花粉知母黃連各八分小便不利者加赤茯苓茵陳朱苓澤瀉木通各八分車前子五分大便溏者亦同加此六味大便秘者加酒炒大黃二錢微利之

三黃石膏湯　此方壯實熱盛者可服虛弱者忌之

白石膏（七錢五分生用）黃芩（炒）黃蓮（炒）

黃栢（炒）山梔子（十枚炒黒）麻黃（去根節三錢）

淡豉（半合）

水二碗煎至一碗去渣溫服連進兩服自愈

萬治四年卯月吉旦