

杏里筆叢

乙
止


X
k 212

醫學雜鈔
杏里筆競
醫學雜鈔

丙集

490.4
Ky-2
2

No. 2864
IRK 212



富士川文庫

728



醫學雜錄

醫學 標蔭多紀八著

醫學

晉以上無醫學之說及劉宋元嘉二十年太醫令秦承祖奏置
醫學以廣教授後魏及隋有太醫博士助教唐貞觀三年九月
諸州置醫學開元九年諸州置助教十一年諸州置醫學博士

內經之文似諸書

諸君冠子漢晉子春秋呂氏春秋春秋繁露
左傳孫子大子列子

余嘗著素問解題一篇論其為漢人之作證以前賢之說頃
刀圭之暇繙繹子史文間有與此相似古人雖不必剽襲然足
觀時世之所以合然茲擇其一二以證非典謨以前之筆矣云

其他大勢語氣類淮南多矣古甫曰既非三代以前文又非東
都以後語斷然以為淮南王之作豈其然與

鄭聲

鄭聲重語也義未明晰田藝衡留青日札云鄭聲淫今考鄭詩
非淫鄭聲則淫者聲之過也猶雨之過者曰淫雨水之過者
曰淫水故曰淫也左傳曰煥乎淫聲惱堙心耳乃忘和平謂之
鄭聲許慎五經通義云鄭重之音使人淫過也得之而我自見

劑頊

劑頊而還無明解按劑限之義而還猶謂以還言劑限頊以還
而頭汗出也脈經曰劑腰而還之文又尸子云莒國有石蕉原

者廣尋長五十步臨百仞之谿莒國莫敢近也有以勇見莒子
者獨却行劑踵焉此所以服莒國也劑頊劑腰劑踵皆限劑之
義耳

消息

傷寒直格云消息謂損益多少也錦城大田公幹元真嘗謂云
公羊昭十九年曰梁正子春之視疾也復加一飯則脫然愈復
損一飯則脫然愈復加一衣則脫然愈復損一衣則脫然愈何
休註脫疾除貌也言消息得其節傷寒論消息二字得之而義
自明此說得之

刀圭

陶氏本草序例云刀圭者十分方寸匕之一准梧桐子大医心
方引范汪方云二麻子為一小豆三小豆為一梧實二十黍粟
為一簪頭三簪頭為一刀圭外臺刪繁車前草湯方後云一
刀圭者準九如兩大豆大漢律曆志註云六十四黍為一圭按
數說似異而其實大抵同董穀碧里雜存云按晦翁感興詩刀
圭一入口白日生羽翰然學者皆不知刀圭之義但知其為妙
某之名耳嘉靖十四年八月晦日忽悟刀圭二字甚痛快不知
古人亦嘗評及此否前在京買得古錯刀三枚京師人謂之長
錢云是部中失火煨燼中得所者其錢形正似今之剗刀其上
一圓正似圭璧之形中一孔即貫索之處蓋服食家摩刀取藁

也

僅滿其上之圭故謂之刀圭言其少耳刀即錢之別名布也泉
錯也刀也皆錢之類也無年號款識殆漢物乎又按千金太乙
神明丹方後云凡言刀圭者以六粟為一刀圭一說云三小豆
為一刀圭據以上諸說六粟疑是共十粟之訛

丹藁

程宗衡釋方云丹丸之火者也程涓子一疏云丹單也一方治
諸病之謂予按二說皆非也趙與峕賓退錄引王忠誠翠虛篇
序云採時煥為藁煉時煥為火結時謂之丹又聖濟總錄云丹
者烹鍊而成有一陽在中之義凡者取其以物收攝而已今以
火鍊及色赤者為丹非鍊者為丸又按抱樸子云仙藁之上者

丹砂陶弘景云丹即朱砂也蓋以方士多煅煉服餌凡諸石煅
煉之物泛然稱之丹後本草如控涎丹亦稱之丹竟無知其所
由焉

茯苓

茯苓茯苓原是一物別錄強判之耳史記鼃羊傳作茯靈乃神
靈二字互用屈大均云茯苓者伏也神伏於土中而為苓故曰茯
苓者靈也神能伏則靈蓋有見于此

孔雀尾有毒

體仁彙編云鴟鳥毒即孔雀毛并膽也用乾薑三兩為末水調
頓服良嶺南雜記云孔雀尾金眼有毒孩童戲取啣口中有死

者其膽與糞尤毒能殺人品字彙云孔雀之頂有毛長一二寸
以之畫酒中飲之立死又謂之鴟毒此皆本草所不載亦不可
不知也

屠蘇考

病
韓鄂歲華紀麗曰俗說屠蘇乃草菴之名昔有人居草菴之中
每歲除夜遺閭里一茶貼令囊浸井中至元日取水置於酒樽
合家飲之不瘟疫索屠蘇字見魏張揖廣義尤為古矣而草菴
之說出唐韓鄂歲華紀麗其距晉未遠意此相傳之說足取信
焉而屠蘇屠蘇另無義訓乃屠蘇从广者而屠蘇蓋本是草菴
因假為菴為大冠為帽及羽帳又為酒名自餘如臚臚臚率皆

醜

病

假借會意不足深攷也、
臧志附錄論業云、兩漢之間、名匠者頗多、皆有其事、而無其方、
具詳不可得考也、仲景氏者、史官不傳、其人與才、不可復識也、
按其自序曰、感往昔之論表、傷大橫之莫救、乃勤求古訓、博
采衆方、然則集錄同漢之遺言、撰拾經驗之方、作傷寒論、雜病
論、以為帳中之秘者、猶王氏之有外臺秘要也、豈後人妄意杜
撰、自找作古之比哉、

醫事小言

傷寒十勸

鎮江府醫官沈應陽明鑒秘傳濟世奇方萬病必愈云

一傷寒頭疼身熱、便是陽證、不可服熱藥、

二傷寒必須直攻毒氣、不可補、

三不思飲食、不可服溫脾胃藥、

四腹痛亦有熱證、不可輕服溫煖藥、

五自利當看陰陽證、不可服補藥、煖藥、止瀉藥、

六胸腹痛、及腹脹滿、不可訖用艾灸、

七手足厥冷、當看陰陽、不可例作陰證醫、

八病已在裏、却不可用藥發汗、

九飲水為欲愈、不可令病人恣飲過度、

十病初安、不可過飽、及勞動、或食羊肉、行房事、及食諸骨汁、并

飲酒

行餘醫言

有
處方素靈驗方體格未備春秋已前和緩之書蔑聞史記道
經畧載扁鵲倉公數法至魏華佗亦有方法惟後漢張仲景氏
最善撰用為衆方之祖後之欲立方者宜模倣仲景之方以處
之

凡說方書專以傷寒論金匱方論為主自晉及唐初其間有名
醫數輩方法可取而無書存者盡在王焘外臺秘要中收之故
此書不可不說千金方產房煩雜說亦可不說亦可勿說宋
以下書自宋局方行而元明以來醫家者流皆從事於斯曾無

振出範圍別持正說者故不足說也

疝

京東二條河濱有一丐者以大筋為綽

即陰筋之自

陰囊腫脹大如二三歲兒屈脚覆卧其踞地沙

極禱蓋虞誇言

以乞米錢往來衆人擲錢求觀丐者乃振開示之覽者皆駭以

為怪物又浪華一丐者陰筋腫大可二寸許以布囊盛之穿繩

括之挂其繩於項以行不則甚重不能數步巡街叫化此其最

大者聊記以廣見聞○按外臺秘要所引集驗方古今錄驗並

云陰腫大如斗者是也

喘哮

虞搏王肩堂李中梓張介賓馮兆張五氏皆欲強分喘哮故爲
紛、耳、蓋喘者總名也凡病息及快間疾響及成宿患者際謂
之喘也其成宿疾滯患以時而發者後世俗間謂之哮也蓋喘
者總名古稱哮者後世俗呼固非別證但欲佔表宿患故舉哮
字耳○附字辨之哮驚喘怒號大呼哮喘之謂也蓋哮本俗醫
濫稱以其痰潮喘息咆哮斗呼似虎驚虎豹怒號之聲響故誤
呼未而醫書遂從用耳

痰

張介賓曰痰必因病而生非病之因痰而致也故內經之不言
痰者正以痰非病之本而痰惟病之標耳

傷食

外
以其上吐下瀉心腹痛苦揮霍_{霍亂}古昔稱為霍亂、々々即是
傷食腹痛吐瀉煩躁之形容耳非傷食之別有霍亂病也知是
意者惟孫思邈成無已歟恨其不直謂霍亂即傷食也惜哉、
後世不知霍亂即傷食又不知傷寒論即傷寒雜病論徒視王
叔和以霍亂病篇屬傷寒末而以謂是證亦與傷寒涉疑以故
附其後者疎昧之至未深考之所致也

中風

通鑑晉武帝紀云吳中書令賀邵中風不能言去職數月吳主
疑其詐收付酒藏掠考千數卒無一言

痘

聖祖云、隋煬帝詔討高麗、敕幽州總管元弘嗣往東萊海口造船、官吏督役晝夜立水中、膝下生痘死者什三四、

蕃沙病考

杏里逸氏 編集

栗園淺田惟常治痘編云、夫疫氣之行、或因歲運、或因方隅、或數年一發、或數十年一發、則一方蒙其害、其狀變幻無測、故痘有軟脚、捻頭、絞腸、楊梅、疙瘩、黑骨、山瓢、大頭、探頭、蝦蟇、葡萄、鰓鰂、鬚、芋頭、蟬子、版腸、結肋、刺螫、地葡萄、足麻、羊毛扣頭之名、瘡有黃、芒、青草、油、痧、唾、黃、梅、新、水、黑、脚、芳、草、朴、蛇、鎖、喉、中、箭、蟬、蛇、蚯、蚓、烏

蜂、迴頭、鸚鵡、花、風、楸、頭、桂、花、毒、水、孔、雀、江、米、毒、淫、菊、花、之、稱、翻、有、狼、搗、蚰、蜒、椅、子、扁、担、王、瓜、白、眼、達、臍、紫、疙、瘩、之、差、掙、有、麻、雀、鴉、子、烏、沙、黃、鷹、鷂、鴿、烏、鴉、兔、兒、長、蛇、纏、絲、唾、叭、母、猪、老、鼠、海、青、眠、羊、野、雀、狐、狸、猿、猴、莽、牛、鷹、嘴、之、別、皆、俗、間、之、所、名、而、其、為、疫、一、也、皇、國、疫、之、行、與、漢、土、畧、同、其、機、在、近、時、其、最、奇、異、者、二、一、為、文、政、壬、午、秋、一、為、安、政、戊、午、秋、壬、午、之、疫、其、初、自、朝、鮮、傳、于、吾、西、州、歷、山、陰、迨、浪、華、無、論、老、少、強、弱、闔、戶、傳、染、勢、如、破、竹、死、者、日、三、四、百、人、其、證、下、利、如、傾、腹、痛、嘔、吐、湯、藥、不、下、手、足、轉、筋、劇、者、一、二、行、輒、卒、厥、脈、絕、或、嘔、血、目、上、竄、而、殞、當、時、名、為、三、日、坊、謂、三、日、而、就、葬、僧、坊、也、今、歲、之、疫、則、自、崎、畧、始、經、山、陰、南、海、

而遍于天下死亡者倍蓰于往年其證亦畧同但無腹痛嘔血為異耳明吳有性曰或時衆人目赤腫痛或時衆人嘔血暴下俗名為山靛溫探頭溫又曰疫氣者亦雜氣中之一但有甚于他氣故為病頗重亦名之厲氣雖有多寡不同然無歲不有至于山靛溫疔瘡溫緩者朝發夕死急者頃刻而亡此又諸疫之最重者幾百年罕有之證故難以常疫並論也吳震芳曰崇禎十六年八月至十月京城內外病梅瘡瘡貴賤長幼呼病即亡不留片刻兵料曹良直右遺正與容對談舉茶打恭不起而殞兵部朱希萊念祖拜容急回入室而殞且興吳彥升授溫州通判方欲登舟一份先亡一份為之買棺久之不歸已卒於棺本店有同寓友鮑姓者勸吳

移寓鮑負行去旋入新遷吳畧後至見鮑已殞於屋吳移出明辰亦殞又金吾錢普氏同容會飲言未絕而亡少停夫人婢僕輩一刻間殞十五人又兩容坐馬而行後先叙話後人再問前人已殞於馬鞍手猶揚鞭奮起又一民家合門俱殞其室多藏偷兒兩人一俯於屋簷一入房中將衣飾疊包遞上在簷之手包積于屋已累々下賊擎一包托起上則俯接引之上者死下者亦死手各執包以相縛又一長班方煎銀蹲下不起而死又一新婚家合卺坐帳久不出啓幃視之已殞于床之面頭沿街小戶收掩十之五六凡楔杆之下更甚街坊間的兒為之絕影有棺無棺九門計數已二十餘萬大內亦然十月初有閨人補

選縣佐者曉解病由看膝灣後有筋腫起紫色無紋紅則速
刺出血可無患未就者曰以萬計後霜雪漸繁勢亦漸殺
汪期蓮曰麻脚瘟其症脚忽麻木肚腹疼痛吐瀉文作朝發
夕死道光元年金陵患此者甚多三氏之說與現今所患殆
符焉若夫求之古則素問所謂暴注下迫皆屬于熱者也張
子和曰夫大人小兒暴瀉水不已內經曰注下也注下者水
利也火運太過之病火主暴逆之故也

證治

余診疫疾七月至九月凡七百有餘人其證神色自若外無寒
熱內無腹痛卒然下利如傾盆腹濡弱如棉綿或脘上動氣衝

突腹中雷鳴奔迫肛門所下物或如熱湯或如葛汁或垢膩
或水穀不化或鮮血交下一二行後顏色青慘眼胞肉脫鼻
梁兀立額上泚然唇口乾枯舌縮聲啞劇者氣息奄奄脈沉
細或微欲絕須臾發嘔吐穀食或青水陸續翻出有時吐蛔
胸膈苦悶心下痞塞藥之不咽但欲飲水或至數升四肢轉
筋或發塊如瘤遍身流走厥冷脈絕手指皸縮或痲爪甲
紫黯或青黑發揭衣被欲得冷風煩躁不安席或遺尿不語
或膏汗如珠劇者一二時緩者一二日悶焉即斃其或差者
一二日後吐下稍止即發大熱舌上乾燥生黃黑胎始進飲
食小便自通厥漸復若其發噦逆心下硬塞不能飲食小便

短少大便如煤膠或如豆汁夢寐譫語面色青冷精氣不復者
雖經數日終死又有病證較輕者初微利一二日又二三日
至六七行又發嘔吐舌上白胎微渴飲食不進四肢沉重脉浮
數或沉緊有力眼胞雖肉脫面色尚紅活腹力雖爽動藥未高
或脉絕身尚溫或雖厥冷脉未絕肉未脫眼未吊當此時對證
投藥則愈若緩慢失期病勢已進成前件脫候者不可救也世
醫不辨此病或認為霍亂中惡濕溫之類投參附雄麝或用參
汗滲利之劑或以為青筋番沙瘴癘之毒施放血打膿灌洗之
術凡如此者百無一生

發陳湯 發熱下利飲食不進其證稍輕者德本十九方之一即於柴胡桂枝湯方中

去大參人參加
蒼朮茯苓者

大柴胡湯 腹中有熱心下急嘔吐而下利者

生薑瀉心湯 腹中雷鳴嘔吐下利者

小半夏加茯苓合甘草黃連石膏湯 吐甚煩渴心下苦悶者

竹葉石膏湯 下利嘔逆煩渴脉沈緊者

承氣湯 自利清水色純青或飲冷小便不利煩躁喜渴者

先服此方蕩其邪後隨證治之

大黃黃連甘草丸 下利但飲水而不進食肛門如火烙揚

手擲足躁擾無奈藥汁不納者此方原于寢意草

胃苓湯 利後遍身有水氣者

附子理中加半夏湯 吐利甚手足微冷者

茯苓四逆湯 吐利煩躁四肢厥冷者

通脈四逆加猪膽汁湯 下利嘔煩脈微欲絕者

吳茱萸湯 吐利煩躁心下苦悶欲死者

蕭翼飲 脫證稍復嘔逆仍不止者 翼川子玄方即按小半夏加茯苓方中加橘皮代乾肝者

備急圖 卒暴心腹脹滿痛如錐刺吐利不快者

灸法 吐利厥冷轉筋陽氣虛脫者且灸神闕上腕中腕天樞

關元湧泉承山承筋等穴尤効

罨熨法 瘟疫傷寒諸結胸痞氣支結臟結中氣虛弱不任用

藥攻擊者以此法治之炒鹽及葱薑蘿蔔等熨主之

刺法 血氣閉塞四肢轉筋或筋肉隆起然核起見紫黑色者

且刺

憑曰安政戊午七月至九月天下異疫大行其死亡

者不知幾許萬西洋所謂古列辣莫兒多斯者也而

漢土未聞有論此病以設斯治法者故本邦醫家

各以私見其名義其治法紛々不一予偶閱張氏醫

通其所舉名番沙者蓋是也因概舉其父于茲曰番

者感惡毒異氣而驟發黑沙此病起漠北流入中原

故以番沙目之其證卒然昏倒腹痛而色黑脹不呼

不叫如不急治而三時即斃有微發寒熱腹痛麻贅

嘔惡、神昏者、或滅片汗出、或隱片發斑、此毒邪燉發於表也、亦有發即瀉利、厥逆腹脹、無脈者、此毒邪內伏、不能外發也、所患最暴、多有不及見斑而殂者、初覺先將紙拭、點焮頭額、即以蕎麥焙燥去殼、取末三錢、溫湯調服、重者少頃再服、即安、蓋蕎麥能鍊腸胃、浮穢降氣、寬胸、而治濁滯、為沙毒之崇藥、倘蕎麥一時難得、或服之不應、杏蘇散杏附甘、陳、廣、加薄荷、荊芥、辛涼透表、次則辟邪為要、梔子豉湯、加牛旁、生甘、鮮毒安內、表熱勢甚、黃芩湯、加連翹、木通、分利陰陽、如見煩擾、腹痛、脈來數疾、急投涼膈散、以竹葉易生

毒熱劇、神昏、雖合三黃湯、不可救、煩渴引飲、遺尿、速清陽明、白虎湯、加蔥豉、使毒從表化、以上諸法、在未經誤藥、庶可挽回一二、

○此病與瘴癘相似、瘴癘則觸冒山嵐瘴氣、此則觸冒惡毒異氣、與時疫癘不殊、但時行則沿門闔境傳染、此則一人驟感、死於一日半日之間、不似時行之可以遷延數日也、又此病與伏氣相似、伏氣發溫、熱毒自裏達表、此則一身驟感異氣、無分表裏藏府、亦不似中寒竭暑、本虛不勝寒暑之病也、又此病與揮霍擦亂相似、霍亂是容邪、與水穀之氣相併、此則

正氣暴逆、不能與邪相亢也、又此病與關格相似、關格是上下不通、病純屬裏、此則兼有班沙表證也、大畧與臭毒相類、然臭毒所觸穢氣、此則觸冒惡毒、較之疫癘尤劇、初起昏憤不省、脈多沉匿、或渾渾不清、勿以腹痛足冷而與溫某、

華列亞波爾父斯說

緣起

歐邏巴諸洲之習俗有異事必告諸官廳官隨聞隨錄其事滿一張則捐貲刊行許國人得焉名曰格烏蘭杜故一張之刻成概無虛月云其紀事也有名人

之死生婚姻賞罰治道之斷戰爭訟事之勝敗飛潛動植之異品便用器賊之製度療疾製鍊之術等凡係日新之業者詳片密片載而無遺矣其意一在使未者警先哲之遺轍臨事而無蹉倒之憂而已是不啻國王都下凡有商館而行本土之政之地皆有之故雖瑣言小說遠傳于闔州焉日者閱跋太亞斯亞咬刺吧和蘭領地之都府格烏蘭杜當本邦文政四年西曆一十八百二年三月十二日發行者中有彼國醫勃微尔所記古列亞波爾父斯羅甸台此說一條是同年二月二十日夜告官府官察有益于濟民乃取收錄刊行

于世者云榕今譯之以告於全好諸名君其意亦復如彼爾云

文政五年壬午二月十六日宇田川榕葺識

古列亞沒尔爸斯說

跋太亞賜亞 勃微尔 著

江戸 宇田川榕葺 譯

古列亞沒尔爸斯ト名ル病東方諸國昔ヨリ多リ患ル病ニサ土人外人ヲ論セス老少男女ノ差別ナリ又毫毛前兆ナリ卒尔ニ歿ス此病ヲ歿スルヲ極テ迅速ナルカ故ニ治術ヲ施スモ亦當ニ速

ナルヲ要ス其病性酷々危險ニノ僅ニ半時或ハ一時ニノ斃ス者アリ故ニ峻効ノ薬剤ニ非レハ救フヲ能ハス○其證初起小腹臍ヲ繞テ劇リ瘧慙シ頭痛胃痛腸痛堪ヘ忍ビ難リ隨テ心下苦悶呃氣ヲ催シ夥リ泡沫ヲ雜ル水ノ如キ粘液ヲ湧吐シ又齊リ是ヲ瀉シ且重墮悲責甚リシテ始終腹中瘧瘵疼痛甚リ關節甚搖掣シ手足相牽縮シテ海蝦ノ狀ノ如リ腹筋ト胸筋トニ及ヒ全軀四肢冷汗ヲ流シ顔面陷凹特ニ兩眼甚リ又眼中酷々猛獐ニシテ白色ノ粘液ヲ流シ脉沉小ニシテ

指下僅ニ按索ス内臓熱シテ熾カ如シ大渴引飲
 常ニ冷水ヲ呼ヒ手飲登ヲ狀サス煩躁悶乱須臾
 モ安カラス卧蓐衣被絶テ擲去シ或ハ撲床撮空
 理線等諸ノ危極殆虚極ノ諸症ヲ現スルニ至ル
 ○次テ眩暈搖擗ヲ發シ四肢冰冷シテタニユス
 卒病ノ諸症ヲ發シテ數角ヲ反張シテ斃ル其屍
 ヲ剖觀シ其變狀ヲ左ニ示ス
 腹腔ヲ剖觀スルニ胃膨脹シテ空虚上口ハ吻乎
 トシテ緊合シ殆ント括囊ノ如リ下口ハ括約ヲ
 失ヒ洞然トシテ開哆シ十二指腸并ニ諸腸空氣

充テ膨脹セリ○肝ハ毫毛造化賦與ノ形ヲ失ハ
 ス○總管緊閉ニ是ニ由テ膽液已リヲ得ス膽
 囊ニ充實ス膽液黑色ニシテ相厚ナリ○脾脾ノ
 二臓ハ常ニ異ナルヲ無シ○膀胱牽縮シ小腹以
 上ノ諸臓其形萎ヤサシモ皆炊衝ヲ帶サシハ無
 ナシ○胸腔ハニ於テハ心ト心囊ノミ全リシテ
 肺ハヤ、炊衝シ氣管ト氣管ノ枝極トハ血色ノ
 泡沫充ツ○腦蓋ヲ鋸割シ觀ルニ腦ハ害ナリ唯
 其髓中ノ血脉并ニ外膜ニ繞ル細絡ニ施テスヘ
 テ血充滿セリ

右ノ諸症ニ蹤跡スレハ此病因ハ飲食消化器ニ
胃腸ヲ指ニ於テ劇キ痙攣ヲ發シ特ニ胃腸十
二指腸ニ隣接セリ諸部ニ於テ甚シ是
ニ由テ總管塞リ膽液撐衝ノ路ヲ失ヒ及ヒ皮表
ノ蒸氣閉塞セルヨリ發スルヲ明ナリ
此ノ治法ハ凡ソ三種ノ要訣アリ○第一所謂
劇甚ノ痙攣ヲ鎮止シ其熾衝ヲ消スルニ在リ○
第二ハ既ニ閉塞セル皮表ノ蒸氣ヲシテ故ニ
復セシムルニアリ○第三ハ飲食消化ノ器ヲシ
テ本然常度ノ運動ニ復シ過不及ナカラシメ又

ソレヲシテ再發セシムルヲナキニアリ
此病ハ極テ速ニ發セル力故ニ治ヲ施スモ亦常
ニ速ナルヲ要ス其證酷々峻重ニシテ僅半時或
ハ一時ニシテ斃ル故ニ効力他ニ起テ輒リ効ヲ
奏スル薬剤ニ非レハ救フヲ能ハス○左ノ一方
ハ劇キ痙攣ヲ緩和スルヲ屢試ムルニ無有遺策
カローナニ十
右ヲ末トシ左ノ飲液ヲ以テ送下ス
阿芙蓉液
薄荷水

右ノ劑ヲ與ヘテ後患者ヲ溫湯ニ浴セシムル
 寧時ニシテ後亞刺吉酒ト醋トヲ合シタルヲ溫
 ノテ身体ヲ洗ヘシ○患者天稟多血ナル者ハ夥
 刺絡シツシリ昏冒スルニ至リ大衆泡膏ヲ胃ノ
 部ニ貼シ芥子ノ毬布ヲ兩脚兩腓ニ貼シ左ノ煎
 湯ヲ溫ノ屎蕪湯スヘシ

蒸湯法

加密列花煮湯 適量 阿芙蓉液 四十滴ヨリ
 如此ナスト雖モ嘔吐復発シ厥冷ニ速ニ退カサ
 ルハ前ノカローナル阿芙蓉液ヲ尚一回與フヘ

シ

リニノンチユムホウチレカム○ホウチユム

製劑方名ニ阿芙蓉ヲ多リ加ヘタルモノヲ摩擦

スヘシ尚嶮症退サル者ハカローナル麝香葛私

多偉謨或ハ他ノ揮発シテ精神ヲ警覺スル薬品

ヲ加ヘアタヘ水銀膏ヲ頭胸肺ニ多リ摩擦スヘ

シ

患者大渴難耐ニ苦マハ左ノ飲料ヲ時々一二匙

ツ、與フヘシ一頃ニ多リ與フレハ百折シテ鎮

メタル嘔吐再発スルヲアレハナリ

止渴飲料方

稻米煮湯適宜 燒酒少許

以上藥劑ヲ服スルノ間溫覆シテ冷氣ノ冒サ
ルヲ要ス右ノ諸方ニ由テ諸症解散シ身体固有
ノ溫氣ニ復シ四肢關節ノ痙攣減スルノ後ハ腹
空虚ヤサルカ故ニ膽液直ニ之ニ觸レ刺痛スル
トアリ故ニ左ノ下劑ヲ用テ勉テ之ヲ瀉下スヘ
シ

下劑方

カローノル十ム

藥刺巴根

細末ニ又或用
芒硝一ヲ用

フルモ亦
良ナリ 薄荷水ニ

此ヲ以テ大便通利セシ後ハ胃腸大ニ衰弱ス故

ニ苦味ノ健胃藥品 按ニ五兄鮮蘆
薈莖類 ヲ用テ可シ

右ノ諸方ハ皆此ノ地在留ノ歐魯巴人ヲ療スル

ニ用ユ吾土人咬ヲ謂フ療スルニハ上ノカロ

ノ此ノ量ヲヤ、減シテ可シ又初發ニ左ノ散

劑ヲ用ユヘシ

其方

ホスホーニシエーニル 製劑名製法太亞腸
局方中ニ出ツ

芒硝 各半 揮發油 二滴或ハ

此散劑ハ近世ニ至リ「アウリ子ウス」一本作「アウリ子ウス」
 常ニ用ユ但シ予思フニ此劑歐魯巴人ニ用テ効
 ナキノミナラス土人ト雖モ危劇ノ症ニ至テハ
 此劑ノ能治スル所ニ非ス

切斷要法

中津

田代德子榮纂集輯

麻藥編

原本紀元千八百六十六年合衆國鑄行愚魯

嚼囉コロラ水ル

嚼囉水ハ澄明無色ニテ揮発芳香ノ液ナリ其
 味甘クシテ刺激シ稠厚ニテ水具温華氏驗温器卒
度ノモノ
 ヨリ重キ一一倍半大抵水ニ溶解セズ火ニ燃エ
 ス中和性ニシテ鞣法ワグ母斯紙ヲ紅變セズ又其青
 色ヲ消褪セス炭素三水一「コロリ子」三ヨリ成ル
 モノナリ○此物不正ノ諸品就裡可熱油並的兒

ヲ混スルヲアリ其油分ノ存否ヲ檢索スルニハ
強キ精製硫酸ヲ灌ケハ其異物ノ量ニ准_テ黄
色或ハ褐色ニ變ズ猶又簡便ニ之ヲ試ルニハ其
液ヲ手掌上ニ滴スレハコロラルホルム_ハ分ハ尽
ク揮発飛散シテ唯醜臭油狀ノモノノミヲ殘留
ス精製ノ品ハ之ヲ白帛ニ點スレハ全ク飛散シ
テ班痕ヲモ殘サス〇亜爾箇兒分ノ有無ヲ檢
査スルニハ宜シク小許ノコロラルホルム_ハヲ蒸
餾水ニ滴スヘシ其品精製ナレハ硝子器ノ底ニ
達スルニテ澄清ナリ若シアルコール_ハ分ヲ蘊_メ

徐施

ハ毎滴皆ナ乳汁色ニ變ス〇亜的兒ヲ混スルモ
ノハ蠟燭火ヲ點スルカ又ハ其液ノ発焰性アル
ヲ以テ之ヲ徴ル〇コロラルホルム_ハハ熱及ヒ烈
光ニ觸レハ其性ヲ損敗ス故ニ此藥ヲ收貯スル
ニハ之ヲ致_意置クヘシ

用_ハ法コロラルホルム_ハヲ用エルニ注意スベキ五
ヶ條ノ事件アリ則チ横卧胃中空腹横隔自由
運動大氣富饒_施用是レナリ此ノ如クセハ若シ
此藥精製ナラザルカ又ハ患者之ヲ嫌_テ大藥
異質アルニアラザレハ之ヲ用井テ危險ノ作用

ヲ起ス^一ナカルベシ其^一「**横卧**」^二重的兒ヲ麻藥
ニ用エルニハ坐スルト可^一レ^三氏^四言^五ラルホルム
ヲ嗅入スルニハ諸筋大ニ弛緩シ從テ心臟機能
元衰ヘ腦中ニ血液ノ運輸乏シキヲ以テ頭肩ト
胴ト平ニナルヨ^一ヲニ平卧スヘン若シ手術ニ障
リナケレハ側卧スルニ宜ロシ是レ則チ舌ノ陷
没シテ呼吸ヲ妨クルノ恐レナケレハナリ
其^二「**胃中空虚**」^一胃中空虚ヲ要スルニ二要
ノ道理アリ其^一ハ食後直チニ之ヲ用エレハ
大抵嘔吐ヲ発ス其^二ハ胃腑充滿スレハ横膈

ノ運動ヲ障碍ス之ヲ用エルハ食後四時^一_{按スニ本邦ノ二時}
ノ後ニ宜トス但シ復タ胃中空虚ニ過レハヨ
ロシカラズ其^三「**横膈之自由運動**」^一此藥ヲ用
エル前ニ帶紐ヲ解キ胸襟ヲ寬クスヘン此
壓迫ノ為メニ横膈ノ運動ヲ妨ケテ障害ノ基ト
ナレハナリ其^四「**大氣富饒**」^一コロラルホルム^二ノ如
キ猛劇ノ藥ヲ用エル間ハ大氣富饒ノ必要ナ
ルヲハ固ヨリ解ヲ待ズ重的兒ヲ用エルニハ花
程大切ナラガレ氏^一「**コロラルホルム**」ヲ用エルニ
當テハ患者ヲ安全ニ保護スルニ特技無二ノ

事件ナリ其五「徐々施用」之ヲ用ユルハ徐々ナ
ルヲ要ス急劇ニ用ユレハ心臓及ヒ脳髓ニ感
激シテ危險ノ症ヲ起スベキ恐レアリ故ニ
三腎脈及至ハ腎脈ニ十分ノ知ヲ養スルヲ常
トス○患者虛弱ナルカ或ハ恐怖シテ面色慘
憺スル如キモノハ施術ノ前燒酒半盞乃至
一盞ヲ與フ其知ノ久シキヲ要スル凡患者若
シ熱下スルヲ得ハ此量ヲ數回服用セシム
ヘシ

此藥ヲ用ユル込ハ手巾或ハ袖手巾ヲ資リ

之ヲ襪ミ其中央ヲ凹クシコロラルルハ一ヲ滴
シ掌中ニ握リテ施用ス可シ或ハ海綿ヲ以テ手
巾ニ代用スルヲアリ之ヲ用ユル為メノ器械多
種ナリト雖凡動輒患者ノ口鼻ヲ蓋ヒ大氣ノ
流通ヲ障レハ用ガルヲ勝レリトス患者ヲ横
卧セシメテ後ヲ十分ニ呼氣ヲ長クシテ肺中
ヲ空フシコロラルルハ一棧ヲ木綿ニ蘸シ鼻
ヨリ五把握徑ノ處ニ保テ漸ク進メテ一把握徑
ノ處ニ至ルベシ○此藥皮膚ヲ刺戟シテ水泡ヲ
癰スルヲアレハ顔面ニ軟膏ヲ塗リテ之ヲ預防

スヘシ之ヲ用ユルニ當テ其周圍ニ無用ノ難談
ヲ禁シ患者ノ精神ヲ安靖セシテ庶幾ス
コヲルホルハニ從事スル介者睹々木綿ニ
コヲルホルハニ注キ空氣ノ流通ヲ宜ク麻酔ノ
微顯然タルニ從テ別シテ爰ニ注意スヘシ感覺
全ク缺乏スルニ至リテ切斷ヲ始メコヲルホ
ルハニ蘸タル木綿ヲ時々鼻邊ニ接シ切斷全
ク終ル迄而シテハ大動脈ヲ結紮シテ止ム或ハ或ハ頸帶ヲ施シ終ル迄之ヲ
持重スベシ吸入ヲ始ムレハ介者脈狀呼吸及ヒ
面色ニ注目スヘシ若シ還ニ轉變スルコトアレハ

直ニ此藥ノ施用ヲ止メ大氣ノ流通ヲ宜クセ
シテ要ス然レ始終指ヲ脈上ニ抑按スルニ
ハ及ハス顔面ノ色呼吸ノ態ヲ觀レハ將來ノ
傍症ヲ防禦スルコトノ標的トナスヘシ

用量 手術ノ間ニ用ヘキ分量ト其効用ヲ持重
スル時限トハ固ヨリ一々不定ナリ大抵半ヲ及
至一ヲ要フルヲ常トス手術ノ時間ノ長キト
各人ノ感解ノ異ナルニ隨テ三倍乃至五倍ニ但
シ極メテ小量ヲ用井テ能ク知ラ奏スルコトアリ
小児ハ輕量ヲ要シ婦人ハ亦男子ヨリモ此藥ニ

感シ易シ患者亡血ノ為ニ虚脱セルモノハ其
血液循環ノ急速ナルニヨリテ此薬ニ感シ易
ケレハ謹慎シテ用ユベシ産科手術ニ之ヲ用ユル
ハ數時ニ至ル氏決シテ危篤ニ至ルヲナシ又長ク
大手術ヲ行フニモ亦然リ余曾テ肩關節ノ脱
臼ヲ療セントシテ二時ノ間此薬ヲ用井タリ
其用量モ二十ヲ下ラス○**年終**麻薬ヲ用ユ
ルニ六年齡ニ管係セサルモノナリ屢幼兒ニ此薬
ヲ用ユ然ノミナラス産レテ二月ノ小兒ニ用井
テ卓効ヲ奏セシヲアリ又老人ニモ効歟ヲトル

實

呵嚕方水。

一アリ疾患ニ因テ就裡心臓及ヒ腦髓ニ器損亡
アルモノハ之ヲ用ユルヲ禁ス小兒ニ於テハ一度
ニ此薬一二滴ノミヲ手巾ニ滴シ口鼻ヨリ稍離シ
テ接シ以テ肺中ニ吸入セシムベシ但シ斯クナ
セハ自ラ空氣ニ觸レテ其コロラルホルム分ヲ稀薄
ナラシムルナリ○**効用**ヲ實驗上ニ於テ二時期
ニ區別ス則チ興奮期ト麻醉期ト見レナリ○興奮
期ハ吸入ノ後チニ始マリ顔面赤色ヲ発シ眼光銳
ク脈頻數トナリ精神錯乱ス此症漸ク將進スレ
ハ喜悅ノ色ナシ恰モ酩酊セル状ノ如シ此度ニ

至レハ患者ノ性強暴ナルモノハ騷擾怒罵ニ或
ハ爭鬪ノ状ヲナシ又ハ暴怒シテ傍人ヲ排除
セントシ或ハ笑ニ嘲ケルモノアリ或ハ嘆嗟及
ヒ長息スルモノアリテ何レモ其人ノ平素習癖
ヲ顯ハスモノナリ。興奮期ハ其度ト其時間ト
ノ長トハ甚タ不同ナリ或ハ僅ニ興奮スルモノ
アリ或ハ全ク興奮スルヲナリシテ患者安靜ナ
ルヲアリ如シ又興奮甚ケレハ其茶効減少スル
後ナモ尚更ニ多少興奮症ヲ發シ或ハ其吸入
ヲ止ムル後ナモ尚初ノ如ク強暴ナルモノアリ或

ハ稀ニ其人神經性ニテ感觸鋭敏ナルモノハ
酩酊ノ症數時間持續スルヲアリ。○麻醉期ハ興
奮期ト確然タル分界ナシ漸次ニ知覺缺乏諸筋
弛緩手足軟弱眼瞼閉鎖シテ上竅ニ瞳孔收縮
シテ光線ニ感ズ呼吸妨ケナリ脈緩正トナリ
假令変スルニ唯其數減少スルノミ知覺意識共
ニ缺乏シ安眠スルカ如ク人事ヲ省セス全ク痛
ヲ覺ズ此症漸ク將進スレハ鼾睡状トナリ腦
出血（率中）ノ如ク脈及ニ呼吸ハ其數ト力ヲ減シ瞳
孔散大スルニ至ル此等ノ諸症ハ未タ危篤トナ

スニ足ラリシ凡若シ此上ニ聊カタリ凡此薬ヲ連
用スレハ忽チ命脉ヲ絶スルニ至ルヘシ故ニ此薬ヲ
用ユルニハ其要點ヲテ斂勝状ニ至ルヲ防クニア
リ又此麻薬ノ最モ効アルハ未タ全ク其意識ノ
瘳スルニ至ラリテ度トス然凡此度ヲ得ルヲ甚
々難ケレハ医家宜シク丁寧ニ注意スヘシコトヲ
アルホシ瞑眩ノ諸證ハ數時間ニ消退スルヲ稀
レナリ其劇キ諸症去テ後モ精神尚錯乱シ諸
筋弛緩シ感覺缺乏ス時トメハ患者就裡大手
術ヲ施セシ小兒ノ如キハ術後一二時モ安眠

ナレタル後チナラテハ十分ニ醒覺セサルヲア
リ復タ此諸症忽チ消除スルヲアリ其人知覺
恢復スルノミナラス兼テ劇キ疼痛ヲ覺エ若シ
コロラルホルハ蒸氣ヲ十分ニ吸入スレハ手術ノ
間或ハ其終リニ於テ知覺復スル凡猶惡心シ或
ハ嘔吐ヲ起スヲ屢之シテリ神經性ニテ感觸銳
敏ナル小兒及ヒ婦人ハ最モ嘔吐ヲ免シ易シ時
トメハ頭痛ヲ免シ數時間持續スルヲアリ若シ
此薬不潔ナレハ殊ニ此症ヲ免スコロラルホルヲ吸入
スルヲ多ケレハ時トメ餘症ヲ免シ久キ時月ヲ

終ニ後々漸ク消散スルヲアリ則チ之屬スルモ
ノハ嗅機損ニ感觸障礙膀胱及ヒ直腸ノ麻
痺是レナリハポルトガル氏ハ南加利福尼亞於テ此
餘症二月後尚消退セザルモノ二人ヲ驗セリト云
此等ハ痛楚ヲ防キ或ハ之ヲ輕クスルモノナレハ甚
々利益ナルモノト心得ユレバ若シ之ヲ誤用スル
カ或ハ勘辨ナク用ユレハ餘症ヲ免シテ死ニ至
ルヲアリ患者非常ニ鋭敏ナレハ此液ヲ輕重ニ
吸入スルモ麻酔毒ノ症ヲ免ス故ニ之ヲ用ユ
ルニ當テ決シテ此事件ヲ倉卒ニ省過スルヲ

ナカレ若シ之ヲ用ユルヲ大量ニ過レハ立口ニ
命ヲ損シ或ハ時間ヲ廢テ斃レ又時トメハ既ニ
弱抗抵抗ヲ免スルニ至テ死スルヲアリ其危殆
ヲ徵スル症ハ呼吸斃狀ヲナシ脈細弱顔面
紅色腫孔散大括約筋弛緩シ射温急ニ減
少スル等ニアリ此諸症ハ確然ト決定ス可
ラスト雖モ恐ラリハコロラルホルム中ニ含メル
炭酸瓦斯初メ血液中心及ヒ神圣中心ヲ犯シ
次ニ呼吸機ヲ妨ケ之カ為メニ其官能ヲ支
ハ窒息シテ遂ニ死スルニ至ルナリナカコロラルホル

ハ吸入レ危険ナル所以ハ其品ノ不潔ナルニ係ル
或ハ可熱酒ヲ含ムノ多少ニ関リ又此茶ヲ用
エル間ニ大氣ノ量十分ナラザルト殊ニ其要成
分酸素ノ缺乏ナルトニ關係スルヲ思考セ
ハ此說愈明白ナルヘシ○**救醒法**此茶ヲ過用
スルニ因ル瞑眩ノ呆毒ヲ療スルニハ勉テ速効
ヲ奏スルモノヲ施スヘシ**第一**此茶ノ後嗅ヲ
止メ**第二**指或ハ鈎ヲ以テ舌ヲ引キ出タシ會
厭ヲ開キ呼吸ヲ利クセシム**第三**戸牖ヲ
開キ或ハ扇子等ヲ以テ空中ヲ煽キ空氣

ヲ十分ニ流通セシム**第四**射ニ冷水ヲ灌ク或ハ
之數弗爲ノ高サヨリ點滴スルヲ最モ佳トス
第五氣管ノ上頸ニ管ヲ拊ミ人工呼吸ヲ施シ又
射ヲ激動シ或ハ口ニ氣ヲ吹キ入ルヘシ**第六**
脊梁及ヒ心臟ノ部ニ温ナル芥子泥或ハ鹿角
精ヲ稀クシテ之ヲ塗擦スベシ**第七**的列並
底那油ノ灌腸法ヲ行フベシ**第八**越歷的
兒尾爾華尼ヲ用ユ其法射ノ諸部ヲ針ヲ
刺シテ此針ニ越歷的兒尾爾華尼ヲ施ス若
シ又嚥下シ得ルモノハ燒酒或ハ礮砂精ヲ用ユ

ヘシ以上ノ諸法ハ勉勵シテ之ヲ用ニ假令其救
井得サルモノモ確然回生スヘカヲサルノ微ヲ認ム
ルニ非サルハ之ヲ休ムル一カ^ハ輕症ニアリテハ此
茶ノ嗅入ヲ止メ顔面及ニ胸部ニ冰水ヲ灌キ清涼
ノ空氣吸入セシメ鑽透運送ノ茶品ヲ鼻孔ニ迫ク
接ス但シ鼻ニ密接スルハ宜カラス若シ又嘔吐
ヲ催スモノハ側卧セシメテ橫膈ノ運動ヲ妨ケ
サラシメ頭ヲ曲ゲテ胃中ノ物ヲ吐出シ難カ
ラシム若シ腸胃症頑滯スルハ謨児比涅
燒酒劑ヲ喫үүлヲ最モ佳トス

