i 58-1

F
キ-48

492
Ky

No. 2143
旧 1 58-1

居家備要

壹二

卷之五 醫論 …… 五十
卷之六 雜病 …… 七十
卷之七 婦科 …… 合七

慶應義塾大學醫學圖書館

慶應義塾大学医学情報センター 昭和 47. 年 7. 月 17 日

富士川文庫

2674

居家備用目次
卷之一
題言
察疒法
脉考
北剌加剌底斯鑒視法
小児察疒法
肺労察疒法
治療定則
痔疾
顔面剌痛
喘息

卷之二
卒厥
昏冒
吐血
尿血
咯血
胸痺
呃吐
吞酸
脫腸
瘍

齦腫
加荅列布失
頭瘡
卷之三
風犬傷
耳聾
不食
痂瘥
瘭疽
胆疳
黃疽
不遂

石淋
便秘
心動悸
胯痛 平(ナイ)別似古多(ーグト)

卷之四

吃逆
咳嗽
頭痛
皮疒
痛風 正疟 脫疟 內陷
癰腫

卷之五

瘡疱
水瘡
疝
頸结腫
间歇焚疒
打撲闪挫
寒尿
痙挛
飲食不化
腰痛

卷之六

肺劳

羅斯肺労
老人肺労
泄瀉
月至疒
処女疒
至閉
卷之七
广疹
噤口 破傷風
魘疒
蓐广中瘡
衄血

煩衝熱
脛煩瞤
眼煩瞤
腸煩瞤
肺煩瞤
皮傷
小便失禁
耳痛
風脹

卷之八
宮痉 子宮衝逆
裹急後重

疔瘡
尿崩
赤痢
腐敗熱
猩々熱
敗血疒
羅斯
聖杜比去斯段斯
金瘡
内障眼

卷之九

水痘

舞蹈疒

痉疒
崖痛
労熱
癲癇
火傷
失明
眼翳
胸水
頭水
水腫
驚水疒
頑痛

凍瘡
帶下
白膿 流注
卷之十
疣
蚘
神圣疒
傷冷疒
燬衝傷冷疒
慢性傷冷疒
多汗
胸痛 一名胸燬膿

醫籍義塾圖書

居家備用

題言

医有五要一明染習二詳体質三知平素四究疒毒所附五定疒性聆稟系剤之損益治術之得失操舍五要如何耳故此昏首沒察疒之法傍加註解別附医範数言要在使学者得古未治疾疒之大法而益明其疒性耳

観当世称医者（謂置身都下以医鳴世者）大率棄五要而不省已（不詳患者宿習性質等則其所処之）茶剤不免失実患者五要之所関係如此其大率然当今凡俗潰敗医診疒之間僅不過十容扭都多何得詳患者性質名異其稟受乎

專虚飾而不恥（秦顔色正容貌処無譽方僅記飲食摂養之法而已）倨傲尊大唯利之見耳此豈医之所可行哉（有壺志不及賤遠矣既此徒之所為而医之恥不為也）

凡為医者宜以慈惠為主（人之有疾疒已如有之此為医之道也起死回生之妙柔則患者視之猶便医凶暴則患者視之猶斧鎮然則医之尊也在以慈惠為主而以温柔行之

博渉諸学　凡坤之間有形無形者益
剛柔取中　虽以慈愛為主過於
治術者皆不可不知也
剛断相済緩急地名医宮挙尓
工夫出故此三者勿有偏勝
見疒不見人　当世人之疾疒固篤豈得不怵惕感動虽然医驚動則治術乗錯
而不救医宜放心放胆従容施治治
嚴肅容儀　医威儀不嚴則患者不守其教狐疑猶豫怠用其茅或従街浚
説服種々奇茅虽幸者免死遂失排出疒毒之機者不為不多
取信患者　取信患者其益有三彼虽有不治之疒恣痛若稍覚怪
先哲之道其如是則可謂尽誠於斯道者也

遠西　暗厄里亜　律暹角釈儞説　著
日本　東奥　高野譲　長英　譯
江戸　青地盈　林宗　校

西文与漢文不同法故今提要領挾分註欲使観者易子解也

察疒法　臨疒床質問之

一ニ患者ノ年齢ヲ問フ。二ニ生来ノ常ヲ問フ。三ニ体質自然ノ強弱ヲ問フ。四ニ体質疒ニ因テ衰ルヤ否ヤヲ問フ。肺欬衝胸痛欬衝熱ノ如キ熱気アルヤニ於テ浮血ノ多少下剤発汗剤ノ用大率患者ノ年齢性質宿習ニ依ルニ発疒後ノ日数ヲ問フニニ疒ヲ深ムノ形状ヲ問フ三ニ疒ノ動静ヲ問四ニ疒苦始メニ比スレハ軽重アリヤ否ヤ又軽重アル形如何ヲ問フ医疾疒ノ形状ヲ明ニシ又患者ノ死生ヲ詳カニスルハ諸熱疒ニハ殊ニ肝要ニシ疒ノ新久ヲソステ之ニ種ニ分ツ曰熱疒曰慢性疒熱疒ハ四十日ヲ期トス之ヲ過ルヲ慢性疒ト云フ熱疒常ニ発スルノ症ハ其脈数皮膚躁煩々渇シ舌色変シ或腰痛或ハ支節痛ミ痛苦言難シ身体熱ナキ者ハ慢性疒ニ

一悪風ヲ向フニ热ヲ向フ三頭痛胞痛ヲ向フ
傷冷毒或ハ咳嗽ニ於テ体中ノ形状ヲ詳ニスルハ殊ニ肝要ナリ
如何トナレハ傷冷ナルニ热ナル（悪風救脉或ハ頭痛或ハ腰痛以テ此症ヲ見ス）ヲ兼ルキハ癒
瘡木脂及ヒ他ノ衝動剤ハ用ニ難ク咳嗽热症ヲ兼ル者ハ鎮痛
越里吉失尔害アレハ
悪風热ヲ兼ル者胃肺ナノ候ナリ之ニ内蔵劇痛ヲ兼ル者アリ
是ハ燃衝質ノナニ非サルノ徴シ
腰節殊ニ沈痛スルノ症戦慄尿ヨリ発スルノ徴
ナリ疼痛七日或ハ十日ノ後其数慄尚去ラサルハ傷冷ナニ非ス燃
衝質ノナリ峻薬ヲ以テ之ヲ防カサルハ必ラス醸膿スヘシ
一ニ安眠ヲ向フニ常ニ阿片ヲ用ユルトキハ其常ニ服スル分量幾何ヲ向フ急症等ニ此向ヲ設テ
之ヲ明ラカニスル尤モ要トス如何トナレハ阿片ヲ与ルニ此ニ従テ或ハ
単味之ヲ用ヒ或ハ加呆之ヲ投スル又其服量幾何モ此ニ従テ定ム
ヘシ

発热悪寒ヲ向フ
傷冷痛咳嗽頭痛内蔵痛ノ症ニ此症アルハ燃衝質ノ徴ナリ
菜剤飲食共ニ体ヲ衝動スル者ハ禁スヘシ
体中ノ一部ニ疼痛ノ者無ヲ向フ
諸热ナ進メ一部ノ疼痛ヲ詳カニスヘシ燃衝热脳腫内蔵ノ
燃腫ヲ発シ遂ニ不治ノ症トナルヿ多シ早ク之ヲ目繋セハ
蝶針法ヲ行ヒ又ハ発泡膏ヲ貼シ以テ之ヲ防クヘシ此外是有
無ヲ詳カニスルノ用尚多シ
热ナ中一部ノ燃腫ヲ発シ其部生活ニ妨ケナク膿ヲ醸メ害

ナキノ見ハ温煖糊剤ヲ以テ醸膿ヲ促スヘシ之ヲ涼ノ外薬ヲ用テ之ヲ消散スルニ勝レリ但シ之ヲ消散セント要セハ其患処ヨリ血ヲ浮スヘシ又之ヲ乱切スルモ可シ燃膿関節ニ附ハ発泡膏ヲ以テ之ヲ散スヘシ

戦慄ノ有無ヲ問フ発熱発汗ノ有無ヲ問フ

諸ノ燃衝ヤ通常見ルニ始メ悪風ヨリメ而メ後身体壮熱シ間汗ヲ発ス 燃衝熱或ハ一部ノ燃膿此症ヲ発スルヲ医術未熟ノ者ハ認メテ熱ナノ一種トメ吉那ヲ誤リ用ユルアリ疑惑不定ノ症ニハ悪寒ノ発作スル数発スル時刻発作スル間ノ後急遅速体中一部ノ疾ヤ有無ヲ詳ニシ又甚悪寒ハ唯標症カ将来ヤカヨク之ヲ明ニスヘシコレ尤モ肝要トス 吉奈及ヒ諸ノ衝動剤ハ熱顕著ニ発見スルニ非サレハ悪寒ノ症ニ用ユルヿ勿レ燃衝ノ症之ニ由テ大ニ増進スルヿアリ疑シキ症ニハ先ツ吐剤塩ノ綿屈世尓ヲ用テ其ヤ性明ナルヤツヘシ一二日ノ間ヤ性ヲ了解スルヿヲ得ヘシ

舌胎ノ有無色沢ヲ見食味食気ヲ問フ

此問ヲ設クルハ吐剤ヲ用ンカ為ニ飲食不化及ヒ熱ヤ初起ニハ殊ニ燃リトス 熱ヤ名定シ難ケレ共患者精力衰フル者多ク舌色ヲ以テ其ヤ性ヲシル諸ヤ通メ舌色ヲ見以テ胃ノ形状ヲ察スヘシ熱ヤニ在テハ殊ニ燃リトス

舌上乾燥黒胎アリテ精力脱シ譫語スルハ已ニ腐敗熱ニ陥ルノ候ニモシ不然ハ大ニ腐敗ニ臨ムノ兆トス 舌上滋潤周圍汚胎ナク色赤キハ患者快後ノ徴ニ

通利ノ宜ト不宜ヲ問フ

諸ゟ通メ大便ノ通利ヲ詳カニスルハ左モ肝要トス煩衝熱ハ之ヲ下ヘシ久ゟモ又便秘ヲ防クヘシ 煩衝熱中薬剤ヲ用ヒス自利スル者強ノ止ムルヿ勿レ只之ヲ静和スヘシ腐敗患者大ニ衰ル者ニモ如此法ヲ行フテ効アルヿ多シ

大便灰白ナリヤ黒色カハタ赤色ナリヤ否ヤヲ問フ

黄疸ハ便色ヲ以テ胆汁腸ニ灌カサルヲシル

便色黒クメ粘稠シ利スル毎ニ痛アルハ飲食不化ニメ腸中刺戟物アルノ徴シ 便色灰白ナルハ胆汁分泌不足ノ候シ

通利ノ多少大便ノ硬軟ヲ問フ

大便利セハ唯後重アリヤ否ヤヲ問フ

大便ノ多少通利ノ多寡ヲシルハ肝要トス直腸刺戟物アレハ下ラスメ 唯裏急後重ノ症ヲ見ハス下利大腸ノ刺戟物ニヨルヿ多クハ唯粘液ノ如キ者ヲ下ス之ヲ絞利羅甸ニ之ヲ底墨私謨斯ト云フ シ

ト云 泄瀉ニハ非ス下利ノ症ニハ大便ノ硬軟粘液ノ多少ヲ詳カニスルヲ要トス 大便軟ニメ下ルヿ之ヲ泄瀉ト云羅甸ニ之ヲ細亜尓ト云フ シ 粘液結便ヲ帯テ下ル者ハ之ヲ痢ト名ツク

脈ノ強弱遅速多少ヲ詳ニシ又結滞スルヤ否ヤヲ明カニス

脈動ハ血心ヨリ血管ニ流レ脈管ノ膨脹スルヿ心血ヲ受テ然ルヿ脈モ又動ヿ緩急遅速ニヨル

脈ヲ診メ以テ血行ノ形状体中激カノ利鋭ヲ激カハ別ニ詳ニス察スヘシ此激カノ利鋭ヲ明ニスルハ諸ゟ通メ肝要ナリ

世尓守斯人名ハ殊ニ諸ゟノ脈動ヲ命スル人ナリ曰ハク脈動ハ虚変多シ偏ニ之ヲ実トシ信スルコトナカレ

コレヲ経験スルニコノ説ノゴトシ官名歇別尓登人名曰ハク結脈ハ

血ノ心藏ヨリ出ルノ正シカラスメ発スルトコロナリ
ニ水ヲ畜ヒ或ハ瘍ヲ発シ以テ厭迫ヲナシ為メニ之ヲ発スルヲア
リ官医忽尓乎世人名ノ脉考ヲ在リ能ク脉ノ変ヲ説ク今之ヲ此下
ニ列ス又贅文ニ非ス

脉考

心縮ノ強者謂強脉 弱者謂弱脉 毎心縮射血ノ量十分者謂実脉 少者謂虚脉 心縮之数多者謂数脉少者謂緩脉 六脉以上ノ脉ヲ云フ之動正者謂正脉不正者謂不正脉結者謂結脉 脉動硬者謂硬脉 軟者謂軟脉 脉管激力急者謂速脉 緩者謂遅脉 脉緊張者謂大脉 小縮者謂小脉 血有脉管洪者謂大脉 少者謂微脉 官医歟別尓登人名諸脉ヲ命スルノ中唯遅速ノ二脉ヲ詳ニスルヲトス
小児ノ脉ヲ診スルニハ睡眠ノ間ニ診スヘシ寤レハ物ニ
感動メ脉忽チ急速ヲ見ハスカ故ニ嬰児健ナル者生ルヽノ日
ニ於テハ一密扭都ノ間ニ脉搏ツヿ百三十動ヨリ百四十動ノ
間ニアリ一月許ノ間其極百二十動ニ至ル遅キモ百八動ニ下ラストモ
言フアリ曰ク他ノ寸徴ヲ詳ニセンヿヲ要セハニツ壮健ノ時預メ之ヲ診シ明ニスヘシ其脉ヲ
伏ヲ詳ニセスンハ脉ヲ信用シ難シ寸中ノ脉
異ニスレハ心脉硬ナルハ心動脉充実運行大過ナルノ徴ニ小弱軟
ノ三脉ハ総ヘテ上ニ反スルコノ脉ハ肺腸胃ノ煩瞳ニ発スルコト多シ
タヽレコノ症ニハ寸性ヲ以ツテ泻血ヲ要トシ脉動ニアヅカラズ
脉ウゴクコト急ナレハ人コレヲ数脉ト云フ数脉ニ強硬アリ軟弱
アリ細小アリ脉動ノ間緩ナリト雖トモ其ノ動ク丁速之ヲ速脉
ト云激力大過ノ徴ナリ是故ニ緩脉ニ速脉アリ数脉ヲ以テ速脉
トセス本速脉ノ意ハ動ク形ノ急ナルニヨル動ク間ノ緩急ニ関カ
ラス動ク間ノ急ナル之ヲ数脉ト云
結脉ハ跳動スルノ間常ニ皆ク云フ間ニ三動許ノ間結滞スル而

後動ノ者アリ歟类ニ此脈自然健固ノ徴ト為ルアリ又国民ニヨリ壮健ナル者ニ此脈ヲ見ルアリ結脹ハ心ノ才ニ在リ或ハ激力ノ大過ニヨリ血心ニ
此症ニハ热ノ證当煩渇呼吸促迫不食疼痛不寐等アリ以テ其危篤ヲ察スヘシ脈ヨリ切実ニ
伏脈ヲ以テ誤テトルヿ勿レソレ伏脈ハ心ノ力弱メ血ヲ脈管ニ注射スルヿ能ワス血脈管中ニ充滞スルノ候ナリ此脈アルハ其人別ニ多血ノ症アリテ頭脳ノ脈管膨脹シ頭痛眩暈呼吸不利等ノ症ヲ兼ヌ
世医脈ヲ診スル者ニ自行表ヲ用ユヲ之ヲ肝要ノ物トセス如何トナレハ凡ソ脈ヲ診スルニハ唯一密扭都ノ間脈皷動スル数ヲ関セス専ラ其皷動スル形ニ従ヒシ拠才ニ脈数ナルアリ遅後ナルアリ結滞スルアリ之ヲ以テ一密扭度ノ間若クハ九十動若クハ百動ハ数スメ佳シ況ヤ又其上医假令自行表ヲ用ヒサルモ脈ノ二三動ヲ診メ以テ一密扭度ノ間脈動ノ数幾何カ預メ察シ得ヘキニ於テヲヤ是故ニ自行表ニ由テ脈ヲ診スヲ予ニ於テ医事ニ熟セサルノ所致トス又医始メテ患者ヲ問フ必ス感動アリ如此ナレハ其脈ヲ数ルヿ正シカラス之ヲ以テ常ニ暫時ヲヘテ以テ其脈ヲ診スル何ソ自行表ヲ要セン

小便ノ色沢濃淡塩渣ノ有無ヲ詳ニスヘシ

熱減メ才毒分泌ノ妙機見ルヘシ尿中遍ク石灰ノ塩ヲ見ハス腐敗热ハ悪臭アリテカツ血ヲ帯ルヿ多シ肺労ノ終ニモ其気臭メ其塩多シ腰痛ノ症ニハ尿ヲ見テ以テ才腎ニ在ヤ否ヤヲ定ム
処女才ハ尿色灰白ニメ淡シ　衰弱スル者尿中脂油多ク為ニ泡

沫上面ニカヘリ久シクメ沈静セス胃平ヲ失ス尿中細石ノ如キ
塩渣アリ
盗汗ノ有無又盗汗特ニ胸上ニ出ルヤ否ヤヲ問フ
煩衝熱発汗スルハ良候トス之ヲ以テ発汗ノ為ニ患者衰弱ス
ルニ非サレハ必ス之ヲ止ムルヿ勿レ
皮膚潤沢乾躁寒熱ヲ向フ
諸熱ヲ及ヒ内部ノ煩衝ニ於テ皮膚ノ状態ヲ詳ニスヘシ尤モ肝要
トス凡ソ熱ヲ二ハ蒸発気ヨリ善ナルハナシ
表発スル蒸気ノ熱ヲ利アルヿ大ニ先ツ是ニ由テ熱気ヲ泄シ
体ヲ清涼ニシ安脈ヲ促ス皮膚乾躁ハ之ニ及メ体中ノ熱気ヲ
尋当セシム汗ト尿ト其質一ニシ之ヲ以テ此分泌ノ機増進スレ
ハカノ分泌ノ機減ス発汗多キ者ハ尿少ク尿多キ者ハ汗少ナシ

寒気ノ為ニ蒸気閉塞スレハ多血ノ症起ル熱ヲ内部煩衝ノ如
キ是ニ蒸気中度ニ適スレハ身体ヲ盛ニスモシ過多ナレハ衰弱ヲ
起ス（但シ煩衝熱内部ノ煩衝ニハ多血ヲ要トス）多汗ニメ身体疲労ヲ覚ヘ脈弱キ者ハ皮
膚ノ脈管大ニ衰脱スルノ徴シ
尿ノ多少ヲ向フ
多尿ハ多汗ノ如ク身体衰脱ノ原因シ 水腫多クハ腎ノ衰弱
ニヨツテ生スヿヲ以テ水腫ニ於テ尿ノ多少ヲ詳ニシ以テ腎ノ運用
ヲ明ニスル亦モ肝要シ
睡眠ノ善悪ヲ向フ
熱ヲ多クハ睡眠ノ状ニ由テ神全質害ヲ受ルノ多少ヲ推察ス
脳ヲ患者ノ夢ヲキヽヲ血管ノ怒脹ヨリ出ルヤ否ヤヲ察スルノ
一助トス（血管怒張メ脳ヲ生スルハ即チ卒厥シ）不審ノ症ニハヨク眼中ノ形状ヲ明カニスヘ

シ瞳子甚シク収縮シ血管突起シ光体ヲミルヿ能ハス之ヲ脳
熱衝トス

呼吸ノ利不利向ノ

熱衝热呼吸不利スルハ血ノ優多ト血肺ニ逼迫激流スルニ由ル爾ナカラ泻血下利ヲカノヘカラス水腫四肢浮腫ノ症呼吸ヲ以テ水胸間ニ溢出スルノ有無ヲ定ムヘシ

短気悪寒及ヒ胸中刺痛ヲ兼ヌルハ胸肺ノ熱腫ナルヲ知ルヘシ

痰ノ有無利不利色沢気味ヲ向フ

諸咳吐痰ノ有無色沢ヲ向フ尤モ肝要シ

痰透明鹹呆粘液ニ変スルハ咳多クハ治ス久咳ノ症咳甚キハ多クハ痰ノ粘稠ニナルニヨル如此咳嗽ニハ粘痰ノ分泌ヲ促シ吐シ易カラシムヘシ尤モ利アリ　肺熱衝ニハ痰ノ色ヲ窺フヘシ其色透明ニメ吐シ易キハ良兆ニモシ血ヲ帯ルハ多クハ泻血ノ要ヲ示ス呼吸大ニ不利痰ナクメ咳スルハ患者危篤ニ臨ムノ候ニシテ身体羸痩メ咳スレハ医其痰ノ色沢ト分量トヲ計リ以テ肺中膿ノ有無ヲ明ニスヘシ　痰透明或ハ黄色ニメソノ味ヒ佳ナラス間血ヲ帯テ労熱ヲカ子或ハ甚タ羸痩スレハ以テ肺労ニ至ルヲ知ルヘシ

常ニ習染スル摂養法ヲ向フ飲食等ヲ云フ

患者ノ摂養法ヲ詳ニスレハ疾ノ性質長短ヲ定ムヘシ処方ノ善悪ヲ明カニスヘシ　熱ノ諸症ノ増進久ケ衰弱ノ原多クハコノ摂養法ニヨル○所用ノ薬剤ヲ向ヒ又其加味ヲ向フ

用処ノ薬剤ト其薬効ヲ詳ニスレハ其残苗スル疾ヲ察シ患者ノ状ヲ辨スヘシ

ノ発スルノ預漸ヲ向フ

患者感覚ナキ時ハ之ヲ其親友ニ問フヘシ此ニ由テ卒厥昏冒
痙攣ノ有無其原顛癇ニ由ルヤハタ中毒中酒ニ関ルヤヲ明ニシルヘシ
又患者已ニ此疔ヲ受ル其用ユルモノヲ推シ知ルヘシ
疔中容貌ノ変異ヲ問フ
諸疔通メ患者ノ容貌ヲ詳ニスヘキモ容貌ニ由テ頼メ疾疔ノ発スルヲシルヿ多シ他ノ諸症アリト雖メ以テ其疔発ヲ明ニシ難シ　必剥加剌底斯人名死人ノ容貌ヲ示今此ヲ下ニ出ス此法必剥加剌底斯ニ始ヿル故ニ必剥加剌底斯鑒視法ノ名アリ

比剥加剌底鑒視法

患者鼻聳ヒ眼陥リ頬凹耳寒縮皮伸テ乾燥顔色淡者若ハ鉛粉色ヲ帯ル八死近キニ在ノ正徴ニシテ之ニ加ルニ患者不審久ク或ハ衰弱シ或ハ久ク食物ヲ用ヒスメ精力故ニ脱スル者ハ其死スルヿ尚急ニ　比剥加剌底斯ニ従ヒスル医客之ヲ試ルニ誤ナシトセス
患者婦人ナレハ已上示ス処ノ外尚別ニ問ヲ設クヘシ是レ婦人ノ普クシル処ニメヨク之ニ答フヘシ又ヿ在ル者ハ医問ヲ設ケザルモ自ラ之ヲ医ニツグベシ故ニ之ヲ挙ケズ
婦人子ヲウヿサルヲ哺スルノ有無甚哺スルノ数ヲ詳ニ問フヘシ
婦人ノ疔哺乳過度ヨリ発スルヿ多シ医モシ之ヲ詳ニセザレバ小児ニ害アル薬剤ヲ投入ルヿアリ是ヲ以テ疝ニ従テ毋子ヲ為ニ哺乳ヲ禁スルモ益アリ

小児察疔法

一年齢ヲ問フ二歯ヲ生メ為ニ痛ヲ発スルヤ否ヤヲ問フ又歯ノ数ヲ問フ
下利発熱ノ症ニ之ヲ問テ疔生歯ノ為メニ起ルヤ否ヤヲ

明ニスヘシ（洋ナルヲハ生苦蒂ヲミルヘシ）

三痂瘡ヂノ有無ヲ問フ四容貌形状其齢ニ適スルヤ否ヤヲ問フ五牛痘ヲ接スルヤ否ヤヲ問フ六捻ヲ已ニ患ルヤ否ヤヲ問フ又嘗テ近隣ニ流行スルノ有無ヲ問フ

小児捻ヲ患ルキハ此問ヲ設ケ以テ大ニ益アリ何トナレハ発疹捻ノ始メ実ニ疾ヂヲ起スコト多シ

小児肢大ニ四肢羸痩シ関節肥大ナルヤ否ヤヲ問フ此症アレハ衰弱ノ甚シキ故ニメ将ニ疹瘡ヂニ至ラントスルノ徴シ又蚘虫ヨリコレヲハツスルコト才フシ蚘虫ノ蒿ヲ照シ見ルヘシ

肺労察ヂ法

左ニ記スル者ハ医肺ヂノ有無発ヂノ原因ヂノ浅深ヲ察スルノ法ニシ之ヲ以テ患者遠キニアラハ昏メ以テ之ヲ問フヘシ甚タ便シ　咳ヲ苦シムノ日数幾何

初メ之ヲ発スルノ故如何

胸内ノ狭サナリヤ胸ノ天造宜シカラサルヤ頸長キヤ如何

咽喉腔ヲ患ルヤカツ肺ヂニカヽルヤ如何

其ヂ傳遺トスルヤ否ヤ

労瘵親族ニアリヤ否ヤ

吐痰多キヤ咳始メ吐痰ヲ兼ルヤハタ乾咳ナリヤ吐痰ニ険易アリヤ如何

痰色透明ナリヤ其呆悪キヤヲ

始メ吐血ニカヽルヤ否ヤ又血ヲ帯ルヤ痰水ニ沈ムヤ否ヤ

両側ニ臥ニ宜シヤ心動悸アリヤ否ヤ

悪寒発熱アリヤ

脉急数ナリヤ一密扭都ノ間脉動ク丁幾何

便秘スルヤ

安眠ナキヤ寐テ不快情ナルヤ

多汗ナリヤ皮膚燥熱スルヤ

且テ下利アリヤ尿色濃キヤ之ヲ静定メ望アリヤ悪臭アリヤ

深ク気ヲノムニ宜シキヤ顔面両足浮腫スルヤ

羸痩甚シキ眼中ノ白膜黯赤色ナリヤ頭毛全ク脱スルヤ

食気宜シキヤ呃吐アリヤ

所用ノ薬剤如何其効如何

簾妾ニ生ヲ養フ癖アリヤ精液酒ヲ過服スルノ宿習アリヤ

患者婦人ナレハ別ニ問ヲ設ケヘシコレヲ養フ者各知処シモシ子アレハ其産ノ数ト哺乳ノ数ヲ問フヘシ

治療定則

热ナニ期アリ一曰旺盛ノ期二曰減衰ノ期旺盛ノ期ニ内薬効ナキ丁多シ是ヲ以テ内科ノ施スヘキ処唯自然ヲ候テ飲食誤用ヲ制スヘシ減衰ノ期ニハ懲テ吉奈蒲萄酒ノ如キ強壮剤ヲ用ユヘキヨク快復カヲ促ス良効アリ之ヲ始メニ用ユ丁勿レ甚タ害アリ人慢ニ以テ快復ノ期ヲ促ス丁勿レ燃衝質ノ疒恐レテ早ク之ヲ促セハ為ニ再発スル丁多シ

人ノ常トスル処各同シカラズ之ヲ以テ平体ニ定期ナク定名ナシ

久ナレバ医ノ標的トスル処唯其常ニ復スルニアリ今腸胃ナヲ挙テ之ヲ命センソレ腸胃ナレハ強壮苦味ノ剤ヲ用ユ疵ニ従テ種々ノ物ヲ加ヘ以テ其胃ヲ盛ンナラシメント要ス例スルニ

十二

患者酸敗液ニカ、リ大便不利スル者ニハ格弄勃（菜名ノ如キ健胃剤）ヲ石灰水ニ和シ之ヲ用ユ大便不利スル者ニハ「マク子シア」ヲ加ヘ之ヲ用ユ又質ニ従ヒ治法如此同シカラザル処アリ例スルニ処女ヂシトヒステリー聖都ルヒナス去私段都ヂス名等懲テ衰弱ノヂストス然ニ多血ノ者之ヲ患ルヿ多シ如此症ニハ阿魏吉奈ヲトメ先ツ其常ニ復スルヲ主トス（案スルニ浮血ヲ行ヒ清涼剤ヲ用ユ）其ヂ忽チイユモシ又之ニ及メ患者衰弱スルヤ否ハ強壮剤ニ精神錯乱ヲ鎮静スル薬剤ヲ加ヘ用ユヘシ第六十七号ノ吉竜綿屈世尓ノ如キ是ナリ凡衰弱ノ諸症ニハ先ツ体中ノ一部収斂或ハ強壮ノ剤ヲ多服スヘキ症在テ此ヂヲ発スルヤ否ヤヲ詳カニスヘシ例スルニ肺燃膿ニ因テ肺労トナル者ハ衰弱羸痩スルヿ甚シ人如此症ニ蒲萄酒幸热衝動ノ飲食ヲ与ヘ以テ其精力ヲ補ントス要スレハ時ニ肺ノ中ヂ増進メ体中ノ衰弱却テ倍加スル者アリ辛厥ニ嬰ル人殊ニ此ニヲル凡ソ肪脆内蔵ノ疾ヂモ又如此ク脳ヲ壓シ以テ之ヲ発ル者アリ辛厥ニ嬰ル人殊ニ此ニヲル凡ソ此症ハ血頭中ニ逼迫上メ為ニ体質ノ衰弱飲食ノ不化ヲ起ス如此症ニ強壮ノ薬剤衝動質ノ飲食ヲ用ユレハ血脳ニ上行スルノ勢一層ヲ甚シク却テ衰弱ヲ倍ス故ニ或ハ血ヲ瀉シ或ハ下剤ヲ投シ以テ其勢力ヲ復スヘシ　又別ニ稀カ衰脱ノ症血管膨脹メ軽此下ニ出ス観者ヲメ強壮剤ヲ用ユルニ先テ宜ク其原因ヲ究ムヘキノ要ヲシラシム　予近頃一ヂ婦ヲ療ス今此ヲ一女子齢十五休中ニアリ之ヲ予ニ告ルニ衰弱ノ所為トス飲食不化大便秘結シ眩暈ヲ患フ近隣ノ一医アルニ者之ニ強壮剤ヲ投シ又法尓杜酒一両盃ヲトリ日ニ与ルヿ四次一月余諸症之ニ由テ増進ス此症分明ニ頭内ノ血管膨脹スルノ致ス処ナリ之ヲ予之ニ命メ角法ヲ用ヒ項ノ間ヨリ

六十四麦ノ血ヲ瀉セシメ又下剤ヲ投シ稀痰ノ食物ヲ用ユレハ
七日間ニ其常ニ復ス
總テ丈ヲ癈スルニ須ク患者ノ体質ヲ詳カニスヘシ之ヲ以テ尚ヲ
設ケ丈ヲ診スルハ独リ其疾丈ヲシテラントスルニ非ス専ラ以テ
先天遺毒有無ヲ明ニセントス假令頚結腫癌腫痛風発狂
羅斯学ノ如キ遺毒アレハ小热怪丈ニモ此丈ヲ発スルヿ多シ故
ニ労瘵質ノ人感冒ニ係ラス心ヲ用テ良薬ヲ投スヘシ頚結
腫質ノ人モ又然リ打撲肉挫軽シト雖モ白腫ヲ発ス（熱ナキ者之ヲ白腫ト云フ）
癌腫質ノ人ハ軽ク乳房ヲ衝クモ其部忽チ乳癌ヲ発ス
如此ノ人自カラ軽症トメ動モスレハ即チ怠リヲナシ術モ功ヲ
奏セサルニ至ルヿアリ又稟賦此丈根在ハ如此原因ヲ俟ズ
メ尚自ラ之ヲ発スルヿアリ是故ニ胸間肢内四肢ノ軽痛モ治
法ヲ軽忽ニスルヿ勿レ危篤ノ丈其如ハ軽痛ヨリ起ル人ヨク此軽痛
ノ始ニ心ヲ用ユルヿ切ナレハ多クハ雖治ノ諸丈ヲ防クヘシ
人四十歳ノ後ハヨク一部ノ丈ニ係ル婦人ニハ殊ニ甚シトス故ニ
此時ニハ人心ヲ用テ疼痛ヲ療スヘシ
沈痛ノ症ニハ発泡硬膏疏通閉達剤（則チ剤ナリ）水銀摩擦法
（第三十四号ニ出ス）ヲ用ユ左モ要トスル
此理ニ由テ人ヨク其常トスル処ニ潜心注意スヘシ以上已ニ之ヲ
示スカ如シ（詳ナルヿハ頚結腫癌腫白癍ノ飲食不化ノ篇ヲ可見）又内薬ヲ連服シ疾丈全
治スト雖モ再発スル丈多シ神圣丈ハ殊ニ然リトス医ヨク心
ヲ此ニ用ユヘキヿ如此丈ノ快キニ乗メ内薬ヲ止メ日アラスメ其
丈ヲ発スル薬剤モ之カ為ニ唯一時ノ効ヲ奏ス患者之ヲ以テ
之ヲ再服セント欲セサル者甚多シ蓋シ如此ノ症モシ少間張

テ之ヲ久服セハ実ニ再感ノ辜ナケン遺感ニ非スヤ間歇熱神
経熱頭痛聖都比去私閉発狂顛癇等皆此類ニ
人下剤ヲ投セント要セハ先ッ始メ痔疾ノ有無ヲ詳ニシ又天
賦下剤ニ宜シカラサルヤ巨細ニ考求スヘシ腸中激力烈シキ
者ハ頓ク緩和下剤ヲ用ユヘシモシ痔疾アラハ芦薈ヲ用ルヿ
勿レ痔毒内陥シメ種々ノ疾ヲ発スルアリ如此ニハ痔疾
再発スルニ芦薈ヲ用ヒ又吐剤ヲ用ント欲セハ先ッコレヲ患者
ニツグヘシ人ノ性ニヨリ吐剤ノ為ニナヤムヿ甚シク竟ニ損害ヲ
トルヿ少カラス 患者常用飲食職業ヲ詳ニスルヲ要トス如
何トナレハ若シ此ニノ者ヨリ発スレハ長ク其飲食ヲ用ヒ久
ク其職業ヲ営ムニ及テ再感ヲ防クニ宜シカラザルヿ
精神ヨリ発スルノ丈多ク又百丈多少必ス精神ニ感ス是ヲ
以テ精神ト体質トニ心ヲ尽クスヘシ予此昏ニ神至丈ノ治方ヲアク
蓋シ是故ニ 早ク其丈ヲ知リ心強テ之ヲ制シ丈ヲ免ルヽ人多
シ慮於ニ非ス予近頃如此類ノ左顕著ナル者ヲ聞ク人ニ傭スル
者アリ其昔舎熱丈ヲ患ル者多シ午餐ニ臨テ不意ニ此熱嬰
ル語人曰此熱奈何ソ我ニ勝ツコトヲ得ンヤト而メ時売ヲ収ムルノ
期ニ逢ヘリ行他人ノ課業モ併セ勤業ヲ営ムノ間大汗出テ諸症
全ク去ル二日ヲヘテ又同時ニ甚シク戦慄シ熱症再ヒ起ル又急ニ手
餐シ了テ此時業ヲ営ムヿ初ノ如シ薬ヲ用ヒスメ其後再感セス
同舎ノ者三人同ク熱ニ嬰ルト云之ニ反メ精神自ラ病シウル
者アリ傳染丈ノ篇ニ出スル凡精神ニ疾ヲ恐ルヽヤハ其丈必ス進ム
勇気ヲ以テ如此熱丈ノ傳染ヲ防クニ利アルヤハ精神ノ丈
ヲ治スルニ利アルヲ以テ知ルヘシ商舶長営ノ西印度ニ行ルヽ

熱ナノヿヲ記スル者ニ熱ノ初発ニ恐ルヽ人ハ皆其ナニ深ト云ヘリ

亜別世ノ次才ニ従テナヲ挙クヽ專ラ探索ニ便ニスルニ

痔疾

痔疾ハ一種ノ瘍ニ其種起スル数或ハ一顆或ハ二顆定リナシ間肛門ノ内外ニ発スルアリ大率出血ヲカヌ出血ナキモノヲ皆痔ト称スル唯白キヲ泄スル者ヲ白痔ト云其始ハ皆一部ノ疣ニ似多クハ宿ナニメ常ニ此ヨリ稀液ヲ泄シ頭痛昏冒眩暈及ヒ熱ナヲ兼子肛門拘攣童滞煩熱酸痒絞急スルヲ覚ヘ或ハ又風脹呑酸等ノ如キ飲食不化ノ症ヲ先テ発スルアリ又多クハ痔辜ヲ夾ム間大ニ煩腫メ此ニ一種ノ毒ヲ醸シテ痔瘻トナル者アリ

原因　血ノ直腸ヨリ還流スルヲ遮ル者此ナ原トナル即チ硬便尠滞妊孕子宮近脱ノ如キ是也間々刺戟ノ為ニ之ヲ発スルアリ芦薈若クハ私骨(スコツヲ)車丸ヲ服シ直腸ヲ刺戟メ痔ヲ起スハ此理ニ同又裏脱ヨリ発スルアリ又直腸ノ煩腫及ヒ大腸内ノ粘滑液ノ分泌少クシテ之ヲ発スル多シ

治法　便秘之カ原因トナラサル様ニ号ノ硫黄筰下水ヲ用ユヘシ痔疾ヲサリ其部ヲ和ク但シ此ヲ択ヒ用ユルモ尚退カサルキハ才石五号ノ塗薬才外用スヘシ煩腫甚シキ者ハ大浮血尺沢血委中血ヲ浮スルヲ云フ大浮ヲ施シ患処ニ蜱針法ヲ施シ患者ヲ平ニ安シ飲食ヲ戒メ以テ痔瘻ヲ防ク

ヘシ又刺戟物此原因トナルキハ其治法前ノ如シ唯時ニ應メ才三十一号ノ阿芙蓉液ヲ加用ス裏脱ニ因テ之ヲ発セハ才七十七号ノ強

壮綿屈世尓及ヒ土骨皮ノ煎汁ヲ絶ヘス患処ニ外用スヘシ骨皮ノ煎汁ヲ製スルニハ土骨四匁ヲトリ水一楸度ニ投シニルヿ十密扭度ヿ収斂物ノ品ヲトリ患処ニ貼ス軽忽ニスルヿ勿レ尋常ノ瘍医ノ命ヲ信ズベカラスメ卒厥ヲ発スルヿ多シ

出血多ハ身ヲ労動セス静坐スヘシ清涼ノ飲食ヲ用ヒ辛熱衝動ノ茶剤ヲ禁シ外面ヨリ温ルヿ勿レ

患者久々此ノ症ニ染習シ痔疾屢々再起スル者ハ胡椒子生姜ノ如キ刺戟物性ノ者ヲ食物ニ和シ用ユレハ大ニ軽快ヲトルヿ多シ

官医窓児独人名所製ノ昆世尓弗ハ衝動剤ニシテ其ノ名高々其値貴シ良医モ良之ヲ賞用メ稜出ス処ニメ永已傑越斯屈名其方昏ヲ傳ヘリ之ヲ昏中ニ出ス処ニ同シ

新鮮為未者二十四匁

白胡椒全八匁　木香為末者十六匁　小茴香　純精蜂蜜　黒砂糖各十六匁

右調和シ梧子大ヲトリ日々用ユルヿ二三次

生姜未ト白胡椒トハ大ニ刺戟衝動性アリテ以テ一種ノ燃撚ヲ起ス是故ニ之ヲ痔疾ニ用ユレハ理ニ於テ却テ害ヲ招ケカ如シ

然ルニ之ニ良効ヲ奏スルハ何ソヤコレ大腸内面ニ滑液ノ分泌ヲ促シ痔疾ノ為ニ衰脱スル痔脈ヲ壮ニスルニ由ル

此ハ其部自然ノ分泌ヲマシニハ其部ノ運用ヲ励ニスニヨル香料ノ者ヲ疝気腸燃衝ニ用テ効アルモ又タ此故シ

燃衝スル処ニ刺戟物ヲ用ヒ屢良効ヲ取ルアリ

古人所患ノ痔疾多クハ直腸ノ単ナヨリ起レハモシ今如此キ症ニ逢ハ早ク熟煉スル瘍医ヲ招キ急ニ外羊ヲ用ヒ清滌剤即後下剤ヲ服スヘシ多ハ困難ノ諸症ヲ免ル実ニ直腸結縮スルカ如キ困難ノ症少ナシ

肛門ノ周囲ニ敗血膿性ノ燃膿ヲ生スルアリ未タ此ナヲ患サル者ニハ其害甚シトモ云ヒ此症酸痒甚タ多クハ膿ヲ泄ス左ノ如シ軟膏ヲ

用ユ

香橙膏　私百児未説度膏 上篇ニ出ス 各等分

白内ニ入レ研磨シ之ヲ患処ニヌルコト日ニ二三次又朮二号ニ出ス凝水石浸剤ヲ内服スヘシ

息肉ヲ生スルコトアリ痔ニ甚タ害アリ緑ヲ以テ結ンテ之ヲサル又焙鉄ヲ施シ或ハカヲ以テ之ヲ除モ可ナリ但シカヲ以テ之ヲサレハ除クニ時ヲ費サス痛ミ少ナク害ヲ生スルコトナシ故ニカヲ良トス冷水ヲ以テ日々患処ヲ洗ヘハ尓後再感ノ歹根ヲタタツ

痔疾ノ再発ヲ防クニハ腸中ノ衰脱ヲ復シ或ハ便秘ヲ防キ飲食ヲ約ニシ冷水ニ浴シ多血ノ者ハ大瀉血ヲ行フ大瀉血見ヲ上

顔面刺痛

此歹ハ顔神経ノ知覚敏疾ナルニ出ツ人身諸ノ遷延歹ノ中困苦之ヲ最トス幸ヒニコレヲ患ル者多カラス歹毒ノツク処多クハ頬神経ヲメ正ニ眼窩ノ下鼻孔上唇歯牙終リニ当ル間故ニ甚痛屡近テ肺耳眼目ニ及フ

原因　此歹ノ原因未タ明ナラス或人之ヲ敗血毒トス然レ𪜈此歹ニソム人未タ且ツテ癌腫ナシ故ニ此説当ラスコレ実ハ甚部ノ神経ヲ失フシ

治方　鎮痛衝動ノ膏薬ヲ外用シ耳後ニ発泡硬膏ヲ貼シ蜱針法ヲ施メ血ヲ泻シ水銀摩擦法及ヒ越列吉底児ヲ施スヘシ大ニ軽快ヲウルコトアリ但シ癌ニ従テ此諸方更ニ効アリ瀕中竜脳阿片吉那ノ如キ神経ノ主薬ヲ服スルモ尚効ヲ奏セサル者アリ頭毛ヲ刺除シ冷水ヲ以テ之ヲ洗フコト日ニ二次而メ冷水ノ内ニ頭ヲ浸スコト二三蜜扭度如此スルコト七日ノ間ニ九三四

次間近頃諸薬無効ノ症ニ人之ニ由テ良効ヲ得メリ内薬飲
食瘵淘ヲ主ル衆器ヲ清滌スルニアリ其法飲食不化ノ篇
ニ出スカ如シ近頃如此ノ一症ニ頻ニ悉鳩荅ヲ用ユ良効アルヲ告
ル人アリ予モ又之ヲ試ムルニ其効ヲ取ルヿ少カラス但シ医官
核以児利人名伊沃紗繆謨ノ越吉斯剤三四仄ヲトリ丸トナシ
日ニ用ユルヿ三四次此ノ薬剤ニ優ルヿヲ発明ス医官
華以弗東人名試ニ眼窩下面ノ神至ヲ壓メ速効ヲ得而メ此
神至ヲ切断シ以テ効ヲトルヿ多シ
学師安列人名ハ歇児撒以児地名ノ瘍科ナリ旦テ焼灸切断
ノ二法ヲ行フテ神至ヲ除キ以テ此ヲ治ス
華以弗東人名試ニ眼窩下面ノ神至ヲ壓メ速効ヲ得而メ此
華以弗東人名千七百九十八年黒沺加児列世効失斯眉名ヲ著
ス其中ニ眼窩下面ノ神至出ル処并ニ其枝末ヲ図シ正ニ切断ス
スヘキ処ヲ示ス頑固ナル者ハ術ニ非サレハ治シ難シ此ヲ以テノ独リ神
至ヲナリ之ヲ以テ越列吉底尓ヲ行テ之ヲ摩動シ以テ神至
ノ運用起発セハ良効ヲ奏スヘシ

喘息

生来此ヲ患ル者多シ其性尤モ痉攣ヲ発ス多血窄(サク)朐(ムネ)ノ人多
ク此ニ嬰ル老人小児之カ為ニ死スル頻結瞳毒アル人之ヲ患レハ其毒肺
ニ集ル之ヲ結瞳ト云フ竟ニ労瘵ニ陥ル老人ハ多クハ朐水ヲ
兼又
喘息粘痰ヲ吐スル者之ヲ痰喘ト云フ然レトモ喘息ニ痰ヲ吐セサル者ハ殆ント稀シ
弼児民華謨人名ノ医官魯別蒲蔡人名呼吸不利篇ニ喘息
ヲ分テ二種トス曰ク久喘曰ク頃喘是ニ久喘多分呼吸ヲ主ル

筋纖維痙攣拘急ニ関カル頓喘ハ神経次才ニ痙攣ヲ増
進スルニナル之ヲ以テ常ニ之ヲ称メ痙喘ト云フ之ニ四種アリ一ハ
汎ク溢レテ肺ニ入リ刺戟スルニ起ル二ハ酷烈ノ物肺ニ入リ刺戟
スルニヨル三ハ腸胃ノ酷厉物ニ関ル四ハ胸肢ノ刺戟物已ニサル
ノ後モ人ノ性質ニ由リ長ク之ニ感動メ喘息ヲ発スルニ出ツ
此区別スル所学術未熟ノ徒ニハ尤モ良トス然レ𪜈内科者干流
治術ヲ行フニ至テハ益ナシ
「徴候」喘嗽ハ呼吸不ニヲ甚シキニ至テハ将ニ窒死セントス而メ胸内拘急ヲ覚ヘ声音唖
嘶スル等ノ徴ニ患者昧ニ上リ眠リヲナスニ其症多クハ次才ニ増
進ス是ヲ以テ患者止ムヲ得ス坐メ以テ呼吸ヲ利シ又ヤ
新鮮ノ冷気ヲ吸ントス此症漸々期ニ及テ祇ニ粘痰ヲ影ク
吐クノ後ハ暫ク此患ヲ免ル其脈大率急ニメ柔小々便始メハ淡白終
濃色ヲ見ワレ多クハ塗ヲ生ス顔色発作ノ間ハ全ク灰白衰委
尚少ク浮腫スル者アリ此症ヲ発スル前多クハ四支倦怠頻ニ瞳
眠ヲ催ス頭重ク或ハ頭痛ニ飲食不化ノ症ヲ見ワスシ
「原因」暗尼里亜国ニテ喘息ノ原因ヲ或人蒸気閉塞メ肺中
ノ脈管膨脹スルニ資トス医官屈児連（人名）肺ノ形状モトヨリコト
ナルヲ其遠因トシ気管及ヒ気管未梢ノ筋蔵住痙攣拘急
シ肺自由ニ張ルヿ能ワサルヲ其近因トス医官独歇児（人名）血肺
ニ逼進急流スルヲ其近因トス医官達児印（人名）曰ク痰喘ハ肺ノ脈管衰弱スルニ起ル水脈衰
レハ殊ニ然リ之ヲ以テ汎ク気嚢ニ漏ル、者吸収管ニ入ルヿ能ワ
スト又痙喘ハ肝胆ノ亢ヨリ起リ又其他肺ヲ去ルヿ遠ト雖モ痰

痛スレハ之ヲ生スヘシト云妄説ト云ヘシ医トメ治術呼吸ヲ主ル
ノ器激力常ヲ失フ時ハ之ヲ発スルニ気管及ヒ気管末梢ノ
膜如此ナレハ殊ニ然リ外気或ハ凝結シ或ハ刺戟スヘキ性アレハ
總テ其近因トナル是故ニ地球ノ一部大阳之光線ヲ通セス夜ヲ
気為ニ凝結スレハ喘息起ル日中ト雖モ之ヲ発スルアリ但シ
外気凝結ノ度ニ従テ症ヲ発スルニ甚タ徴アリ

「治法」患者脳中痛ミアリテ呼吸不利甚タ旦ツ其質多量ナ
レハ血ヲ瀉スルコト六十四匁又ハ八十匁ニ至ルヲ而メ胸骨若ク八両肩
ノ間ニ発泡膏ヲ貼シ内薬ヲ用ユ 才六十八号ノ和喘綿屈
世尓二三食ヒヲトリ日ニ与ルコト三次又才七十七号ノ丸薬ヲ日
ニ二次与フヘシ頑固ノ症ニハ才十四号ノ亜的尓羊茶ヒヲトリ
才三十一号 阿芙容液十五滴ヲ加ヘ毎夜之ヲ与ヘ又亜的尓ヲ
盆ニ湛キ微ク温メ蒸気ヲ出シ之ヲ日ニ二次吸入スヘシ又症ノ発ス
ルニ来メ之ヲ吸モ可シ発泡膏ノ誤治セハ急ニ才百八号ノ和胸膏
ヲ胸骨上ニ貼スヘシ海葱末ニ吐根ノ末ヲ和シ以テ飲餅ノ如クナ
ラシム此方喘息或ハ久咳ヲ治スルノ良方トス此剤次才ニ口内ニ
在テ溶解スルヲ以テ功丸薬ニ優ル此方ハ医官急児(ホルテーセ)才世ノ所
作ニ同シ此治方ノ主トスル処ハ発泡膏ヲ貼メ其刺戟ヲ迎ヘ肺中激力ノ変ヲ防キ浮シ以テ体ヲ
安ンスルニアリ和胸剤ハ吐痰ヲ促スノ能アリ之ヲ以テ気管
及ヒ気管末梢内面ノ激力ヲ減スルニ宜シ 喘息ヲ患フルノ人ハ
ヨク摂生ノ法ヲ守リ腸胃変ナク飲食不化殊ニ便秘風脹等
ノ症ヲ防クヘシ胃ハ横膈膜ニ連係スルヲ以テ喘息ノ間ハ胃モ
共ニ之ヲ感スルコトアリ是故ニ飲食消化ヲ主ルノ器少シク次才

ヲ失フモ体中ノ激力ヲ增加メ以テ喘息ノ近因トナル此時ニ
於テハ横膈膜其他呼吸ヲ主ル筋大ニ之ニ感動シ其痙ヲ
持久シ其危篤ヲ二ス之ヲ以テ患者飲食不化ノ痞ヲ兼ハ吐根
ノ未又ハ筏利屈私散ノ下剤ヲ用テ先ツ胃ヲ清除シ尓後
才二号ノ凝水石剤ヲ一酒盃ヲトリ毎朝之ヲ服シ以テ便秘
ヲ防キ飲食不化ノ機ヲ絶ス但シ風脹ノ症ヲ炎ヲ生姜未ニ
氏ヲ加フヘシ又才七号加味生姜加密列浸剤一茶匕ヲ加フヘシ
喘息ヲ患ル人其腸中多少必ス燃気アリ其漏泄ヲ促ス大ニ
軽快ヲ奏スヘシヲ以テ如此法ヲ用テ之ヲ制スルハ尤モ妙トス詳
ナルヿハ風脹ノ篇ヲ見ルヘシ
醋一呆ヲトリ或ハ海葱ヲ加ヲ一札七ヲ与ルハ吐痰ヲ促シ兼テ
燃気奔滞ヲ制復シ以テ大ニ軽快ヲ起ス

遠志根ノ煎汁喘息久ヲ経タル者ニハ多ク効アリ但シソノ性ハナハダ
辛熱ナレバ幼年ノモノニハ害アリ老人ノ喘息且ツ水気ヲ夾ムモ
ノハ此菜甚タ効アリコレ吐痰ヲ促シ蒸気ヲ進メ小水ヲ利ス
ルヿ此菜ニ海葱ヲ加ルノ方アリ其製法左ノ如シ

方 遠志根煎汁（六十四匁）海葱蜜（八匁）鎮痛越衆吉失児（四匁）
忽布満鎮痛液（二匁）

右混和シ二三食ヒヲ取リ日ニ用ルヿ三次

医官幣安之ニ冷水浴法ヲ賞用ス医官蒲黎モ其種ノ喘息
其発作ノ間ニ冷水浴法ヲ行フ簡ニメ且ツ奇効アリト云フ
患者壮ナレハ冷水浴法ハ神全ノ覚力ヲ減ス故ニ良知ヲ奏ス
然レ氏精力大ニ衰ル者夫ハ水膣ニ傾ク者及ヒ老年ノ人ニハ及
テ害アリ

卬沃沙鬱浸剤（スワルテヒルセンコロイト）ニ硝石酸海葱ヲ和スル者及ヒ硫黄酸鉄（巻紅ナランカ）

近頃喘息ノ妙薬トシ賞用ス然レ𪜈考フルニ患者ノ性質同シカラス此ニ利アルノ薬彼ニ害スルアリ之ヲ以テ總テ喘息ヲ治スルノ一定法ヲ定ムルヿ難シ

患者幼ニメ多血ナレハ其治法体ヲ安シ（浮血ヲ云）蒸気ヲ進メ便秘ヲ防クニアリ中年ノ人其質未堅硬ナラサル者ハ腸胃ヲ損動シ或ハ体ヲ燃熱セシム飲食ハ心ヲ用テ愼ムヘシ總テ如此年齢ニハ滋養温補ノ飲食ヲ用ヒ食後ニ酸酒一二盃ヲ与フヘシ

此疒ヲ治スルニ医ノ要トメ勤ムヘキハ才一発作ヲ減シ再発ヲ防クニアリ之ヲ以テ壮年老人其治方各同カラス假令ヘハ清涼ノ瀉生法（按スルニ運動大過ヲ防クノ方法ヲ云下剤清涼剤ヲ投シ淡薄ノ物ヲ用ユルカ如キコレナリ）

瀉血ノ如キハ幼年ニハ体ヲ安静ナサシムルノ法ニ之ヲ老人ニ用ユレハ痙攣ヲ起シ疒ヲ促スニ類ス酒及ヒ滋養ノ食物ヲ老人ニ必用トス又ヨリ其体ヲ壮ニス幼年ノ人ニハ体ヲ燃熱セシムルヲ以テ却テ疒ヲ増進ス

老人ノ喘息ハ動脈至硬骨ノ如クニ変シ又ハ汎乙肺ノ質内若クハ胸間ノ空処ニ溢出スル等ニ由テ多クハ難治ノ症トナルヿ如此症ニ加味亜的尓精ニ剛鉄ヲ加ヘ二十滴ヨリ三十滴ヲ取リ冷水少許ヲ調和シ之ヲ三四年毎ニ用テ効ヲ得タリ

「摂養法」 凡ソ飲食不化呑酸嘈雑等ノ諸件皆喘息ノ近因トナル故ニ上章已ニ之ヲ挙ケタリ其遠因ハ則チ飲食ノ誤用ニ関ル之ヲ以テ揮発ノ水液（酒ヲ云フ）甘酒新製ノ女鞠ヲ過用シ茶及ヒ種々ノ近因トナル又餐食ヲ過シ時ナラズ食ヲ嗜ミ又

炮已私底卯（食物ノ名）脂油多キ食物生蔬鬲苣塾セル瓜菓煮
菜用ユルヿ勿レ如此食物ハ喘息ヲ患フル人ニハ消化セスメヨ
ク胃中ニ淳滞メ自ラ沸醸スモレ急ニ吐下ノ剤ヲ以テ之
ヲ除カザレハ必ス疒ヲ発ス是故ニ毒物ヲ用ユルト食物ヲ過
用スルトハ尤モ害アリ患者虚弱ナルヿハ実ニ之ニ堪ユルヿア
タワス　詳ナルヿハ風脹及ヒ飲食不化ノ篇ヲ見ルヘシ

「預防法」　周身ニ温布ヲ包ニ常ニ吐根ノ末ヲ用ヒ海葱蜜若
クハ海葱餅ヲ連服シ両肩ノ間又ハ腕上ニ打膿法ヲ施スヿ等ニ
テ喘息ノ再発ヲ防キカツ其ヲ疝ヲ減スヘシ幼年若クハ多血
ノ輩ニハ此ニ由テ其発作ノ間快ク呼吸スヘシ老人若クハ四肢
浮腫ヲ夾ムノ徒ハ打膿法ニ宜シカラス但シ血中ノ凝結スヘキ
質溶解メ水胞間ニ集ルヿハ之ヲ施スヿ能ク飲食ハ消化シ易
キ者ヲ撰ミ用ユ則チ蒸餅（リクテカ）利古底（ジング）剥参昊（食物ノ名）鳥肉焼肉等
ノ如シ又生姜少許ヲトリ酒水ニ和シ用テ以テ菜蔬ノ沸醸
則チ風気ヲ生スルヲ云

「凡ソ喘息ヲ患ル者ハ其神ヲ至貴一種他ニ異ナル処アルヲ以テヨ
ク外気ニ感動ヲ発ス純精乾燥ノ気ヲヨク呼吸スル者アリ
或ハ竜動ノ外ニハ生活シ難キ者アリ予一患者ヲ目繋スコノ
人竜動（暗尼里亜国王都名）若クハ都外ニハ七日ヨリ久ク住ムヿ能ハス
而メ蒲里私都児街ニ於テハ自由ニ呼吸ス又清曠ノ気ヲ呼吸
セント要スル者アリ又温処ニ非サレハ起居シ難キ者アリ蓋シ喘息
ニ嬰ルノ人ハ其住セント欲スル地ハ宜ク其性ノ好ム処ニ従フヘシ但
シ常ニ潤キ処ヲ良トス狭キ処ハ必ラス呼吸ニ宜シカラス才一
甚ク凝結スル片ハ（按スルニ夕時ヲ云フニ）高楼ニヲルヘシ呼吸不利甚シキ者ハ

硝石酸気ヲ以テ室内ヲ薫シ之ヲ次第ニ散満セシムヘシ大ニ軽
快ヲ覚フル又タ此症ノ発起ヲ防ク丁多シ其法上篇病室薫
篇ニ詳シ中花ハ日中ニハ清気ヲ吐テ室内ノ気ヲ潔ヨク夜ハ之ニ因
テ寝室ニオク丁勿レ其理上篇寸室薫蒸篇ノ注ニミヘタリ又ハ居
室ハ四時宜キ処ヲ撰ムヘシ未児歇輪地名ノ気ト水トハ反日ハ徳テ
喘息ニ宜シ患者此ニ至ルハ寸全ク治セリトス冬日ハ竜動ヲ食ト
ス喘息ヲ発スルナシ又的封失列島ノ名舎独莫都地名若ハ越吉斯
莫地名ハ冬ノ間住スルニ宜シキ処シ

「区別」 真ノ喘息ヲ別テハ二ツ久ヲヘテ胸中刺痛ナク且ツ拠ヲ
発セハコレ胸肺燃膓ト異ルナリ所ナリ又胸中拘急幸縮メ身ヲ起立
セント欲シ且ツ清涼ノ気ヲ好シテ以テ他ノ肺ノ異ルナル所アリ

居家備用巻之二

遠西 暗厄里亜 律暹尓釈儼説著
東奥 高野譲長英 訳
日本 江戸 青池盈林宗 正

卒厥

「大較」 卒厥ハ意ニ従テ運動スヘキ者容易ニ発スルノ為ス処シ
血脳中ニ溢出シ又ハ脳中ノ脈管ニ滞シ其脈管ヲ脹膨メ以テ之
ヲ発スル之ヲ血卒厥ト云此症水膓ニ発スルナシ云汐乙脳ニ溢出シ之ヲ発スル粘液卒厥ト

「多血卒厥」 此疔年四十五十ニ至ラサレハ発スルナ少ナシ頸短
ク知覚敏疾ナラス殊ニ肉食ニアキ酒ヲ過飲スル者常ニ此疔ニ罹
ル竜動ノ近傍此疔多キハ肉食酒飲ヲ過用スルニ出ルナ必セリ

「徴候」 知覚挙動ヲ廃シ鼾睡不寤煩悶ヲ発シ尺沢ノ脈ハ後
遅ニメ頸頷ノ脈強ク顔色赤クメ脹頑腫起メ其脈管怒脹シ瞳
子散大シ全身知覚挙動ヲ失フト雖モ精ク之ヲ診スレハ半身
痺痺スルヿ甚シ
此症ヲ発スル之ヲ卒厥ト云蓋シ之ヲ発スルノ前多分頭重クメ
眩暈シ時々頭痛鼻血ヲ発シ眼赤ク視力明ナラス耳鳴メ遠ク
鐘声ヲキクガ如ク或ハ茶沸ノ煮ルヲ聞カ如シ眩暈次第ニ増
進シ若クハ四支挙動ヲ失ヒ声音唖シ眴眄シカラス食後ハ
殊ニ眠ヲ催シ睡眠安カラズ如此症ニ多血短頸ノ人ニ発スル之ヲ
卒厥ノ前兆トス
「原因」 如此卒厥ノ原因ハ殊ニ体質多血ニメ血脳ニ逼進上衝ス
ルニ因ル又血ノ運行ヲ速ニシ脳ニ甚ク上衝セシムル者皆此ヿ
原トナル例スルニ感動大過憤怒沈酔精強用羊ノ如キ是シ
「註」 動脈血ヲ脳ニ輸ス脈管ノ形迂廻回轉シ又頸動脈ノ過ル処ニ
ハ長キ骨窩アリ皆以テ血ノ上衝沉溢ヲ遮ル又血ノ運行スル
ノ間ニハ動脈之ヲ包テ以テ其変ヲ制ス血之カ為ニ脳中ニ注流
スルヿ劇シカラサラシム然レモ脈管ノ質又々オナジカラズ且ツ骨
窩ノ形状血汎溢スルニ便ナル者アリ按スルニ如此キ卒厥及ヒ他ノ
脳ヿヲ発スルノ基シ
驚恐ハ憤怒ノ反ナレモ亟(シンス)ニ私(ウイテン)微天人名之ヲ卒厥ノ原因トス
昏酔中頓死スルコレ卒厥ノ所致ナリ常ニ酒ヲ嗜ム者卒厥ヲ
発スル多シハ不治トス連宮魯底児人名曰ク酒ノ為ニ卒厥ヲ
発スルヿ多シ酒容ノ戒トナスニ足レリ又飲食過飲放蕩耽逸
ノ為ニ死シ以テ其臭名ヲ止ムルヿ人アリ但シ之ヲ唱ルハ唯後世

如此徒ノ戒トナサン為ニ

一男子堅敦ナル履ヲ用ニ以テ卒厥ニ嬰ル其后乎不久メ又通
隣ニ卒厥ヲ患ル人アリ是血甚タ上衝スルニヨル蓋シ此等ノ患
者固ヨリ之ニソムヘキノ性アルニ
又血脳ヨリ還流スルヲ脳ノ血脳中ノ吸収管ヨリ集テ頸静脉ヨリ入リ其大幹管ニ入ル遮ル者卒厥ヲ
起スヘシ例スルニ布帛ヲ以テ頚ヲ纏ヒ頭ヲ胸下ニタレ久ク俯
屈スルカ如キ是ニ
官医抜以児里人名所著ノ没児弼篤那都弥解剖名ニ曰ク卒厥
ニ嬰リテ連死セハ暫ク生ヲ存スル者ハ半身必ス不遂ス然ルニ
血脳中ニ溢出スル処ハ不遂セサル方ニアリ假令ハ脳ノ右方ヲ壓
迫スルハ左方ノ半身不遂ニ左方ヲ壓迫スレハ右方ノ半身不
遂ヲナス但シ眼目ハ否(シカ)ラズ故ニ左方ノ脳ヲ壓迫メ右方半

身不遂スル者右眼ハ明ニメ左ハ矢フト按スルニ此説確命トハナシ難
シ予右脳ノ血管破烈メ右方ノ半身不遂スル人アリ予先年人ノ請ニ応シテ此頭
「註」卒厥ニ嬰リ速カニ死スルヲトキ之ヲ鑒視スルニ血右脳ニ夥ク溢出ス左脳ニハ腫起硬結ス
ル処アリコレ一年以前卒厥ノ形ヲ発スルノ時血溢出スル者殘
留メ如此硬結スル処ナリ之ニ由テ之ヲ見レハ脳中ノ血管破
烈スルモ必ス死スヘシトハ云ヒ難シ又溢出スル血ハ尽ク去リ難
キノ徴トスヘシ此患者一年以来頭痛眩暈昏冒ヲ苦ムト云多
血卒厥ニ三種ノ別アリ一ハ血液運行大過不正全身ノ脈管次
第緊張スルニヨルニハ唯脳中ノ血管緊満スルニヨルニ三ハ脳中ノ
脈管衰弱メ運行スルニ宜シカラス之ニ由テ血漸ク脳滞シ脈
管怒脹シ以テ脳ヲ壓迫スルニヨル老人ハ常ニコノ症ニヨル

老人ノ脳中ヲ圍スルニ脳中ノ動脈多クハ衰弱シ又脳ノ大動脈ノ破烈スル処ニ土石ノ如キ者アリ小動脈ニモ間之ヲ見ル按スルニ動脈縮張ノ機之カ為ニ宜シカラス其質モ又此カ為ニ審ナラスメ破烈シ易ク凡ソ如此ニメ若シ血影クコレカ為ニ尋滞シ若クハ血行急ナルノ因ニ逢ヒハ則卒厥ヲ発スヘシ脈管ノ破烈スル多ハ此等ノ原因ニヨル

「治法」卒厥ヲ治スルノ主治ハ頚或ハ両肩ノ間ニ角法ヲ施シ又ハス燃ルニ凡ソ頚静脈ヲ刺スニハ先ツ頚ヲ縛メテ血管ノ怒脹ヲ候ツ之ヲ以テ血脳ヨリ還流スル道路ヲ遮ルヘシ故ニ脳中ノ血管已ニ破烈スル者ニハ術ヲ施スヿ急ニト雖モ益ナシ血ノ溢出ヲ促スノ害アリ又血管破レスヘシ唯膨脹スルヰハ之カ為ニ破裂ヲ促ス

発泡膏ヲ頭上両肩ノ間ニ貼スヘシ　血ノ上衝ヲ鎮ムル捷径ノ方ハ四支ノ運動ヲ増スニハニツ手掌足心ニ灸百十一号白芥子糊剤ヲ貼シ之ヲ刺激衝動シ灸仵ノ水ニ和シ投シ又別ニ灸九十七号蔬通潅腸剤ニ芦薈五分食塩ニ食匕ヲ加ヘ潅腸メ以テ腸中ヲ疏通スヘシ身体ヲ安臥メ頭ハ血ノ上下スルニ宜シカラシメ悦ヲ冷醋ニ浸メ之ヲ頭上ニ被フ此法ヲ施スヿ速カナレハ其効ヲ取ルヿモ又大ニ後世卒厥ノ初起ニ吐剤ヲ賞用セントスコレ周身ニ血行ヲ厉シ以テ血液一部ニ脩滞スル者ヲ除クカ故ニ然ルニ吐剤ノ為ニ大ニ煩悶ヲ発シ胷中血管ノ破裂ヲ促シ或ハ血已ニ脳ニ溢出スル

者害アリ但シ吐薬ニ吸収管ノ運用ヲ増進スルノ効アレハ出血ヲ吸収スルノ効ナキニ非ストモ素人ノ得テ之ヲ用ユヘキノ方ニ非ス然ルニ沉酔ノ為ニ卒厥ヲ発セハ先ツ頻ニ湯ヲ与ヘ以テ胃中ノ物ヲ稀解シ而メ吐ヲ催起スヘキ良効アリ

「預防」　天賦卒厥ニ感スヘキ人已ニ此ノ患ニ嬰ル人ハ温布ノ足袋馬毛ノ履ヲ着ケ以テ之ヲ温ムヘシ此法足ヲ温ムルノ一奇方トス又殊ニ挙動適宜ニ処メ脉管ノ膨脹ヲ制シ急ニ酒精ヲ禁シ植物ヲ良トシ臥スルニ頭ハ体ヨリ高カラシム然レハ漫ニ之ヲ高フメ胸ヲ撓ムルヲ勿レ足ヨリ次第ニ高メ頭ニ至ルヘシ

患者上ニノスル前兆ヲ見スキハ急ニ才四十六号加味格呂蓳都丸ヲ与ヘ預ニ発泡膏ヲ貼シ足ヲ温湯ニ投スヘシ卒厥ヲ免ルヽ多シ発噎烟中ハヨク涕ヲ利シ噎ヲ起スモ又良効アリ大瀉血（上ニ注ス）ハ再ヒ血ヲ生スルノ弊アリ之ヲ以テ直ニ卒厥ヲ治スルトキニ非ス

之ヲ行フヿ勿レ　類顱ニ蜱針法ヲ施スモ又然リ必要ノ時多クハ其効ヲ失フ　耳膿法ヲ頚項ニ施シ加味格魯蓳笃丸ヲ与ヘコレ預メ卒厥ヲ防クノ一大良法トス

脳中脉管ノ膨脹ヲ防クノ外又髪ヲ剃キ毎朝冷水ヲ以テ之ヲ洗モ妙トス蓄ニ血ノ上衝ヲ減スルノミニ非ス兼テ脳中ノ脉管ヲ強クシ其膨脹ヲ制スル血脳中ノ脉管ニ滞尿スルノ原因ヲ考フルニ多クハ血ヲ運行スルノ力足ラサルノ所致ニ因ル故ニ身ヲ久ク一方ニ傾ケ又久ク睡眠ヲ貪ムル勿レ久ク臥床ニ左モ又害アリヨク此法ヲ守リ行フヘキハ假令其ノ人卒厥ノ性アルモ久ク其害ヲ免ルヘシ卒厥ハ畧昏睡ニ類然ニ昏睡ハ揮発塩ヲ鼻ニ近ツクレハ忽チ寤覚ス卒厥ハ不然又中酒昏倒ニ比スレハ顔色ノ灰白ニメ呼気冷

ニ且ツ飲食スル処モ亦同シカラス癲癇ニ比スレハ鼾声ナク拳動ノカ少ク痙攣ノ症ナシ然ルニ卒厥顛癇共ニ知覚ヲ失フ卒厥ニモ間口ヲ誕沫ヲ吐キ角弓反張咬牙其他攣急ノ諸症ヲ見ハスコトアリ之ヲ以テ之ヲ分別スルヿ甚タ難シ然レトモ患者ノ体質宿習ヲ詳セハ卒厥顛癇ノ昏睡分明ニ区別スヘシ又タ昏冒ノ症モコレニ変ス然レトモ其顔色肺状呼吸ヲ以テ之ヲ区別スヘシ

「粘液卒厥」 医官恕尓矛世曰ク血中ノ鹹液脳中ニ溢レ以テ脳ヲ壅迫シ之カ為ニ間卒厥ヲ発スト又曰卒厥ノ原因或ハ血ニ因リ或ハ鹹液ヨリ出ツ故ニ基因同シカラス然レトモ之ヲ侵スルニハ須ク両全ノ治法ヲ用ユヘシ按スルニ水腫卒厥ヲ発スルハ鹹液ノ溢出メ之ヲ発スルカ如シ

「治法」 多血卒厥ノ如シ唯瀉血ヲ禁ス又多血ノ卒厥ニハ強壮剤ヲイム此症ニハ却テ之ヲ賞用ス 蓋シ粘液卒厥ハ体質大ニ衰弱メ発スル処ニ故ニ患者大抵死ス

「発明」 多血卒厥ニ才ケルニ至テハ異ナル処ナシ先ツ多血ノ卒厥ハ血管非常ニ膨脹シ或ハ血脉管ヲ破テ脉外ニ出テ之ヲ圧ス粘液卒厥ハ汎乙溢レテ之ヲ圧閉スルニ別ニ一種ノ卒厥アリ予屢々之ヲ歴見ス此症脳ヲ圧迫スルニ非スメ脳中ノ脉管空虚ヲ生シ脳其支配ヲ失ヒ脉管ノ脹力ニ抵抗スルヿ能ハス痿閉メ以テ其運用ヲ全フセサルノ致ス所ニ脱血ノ症後多クハ如此卒厥ヲ発ス又老人此ヿ多シ又頸動脉幹等堅硬膏ノ如クニ変シ或ハ又他ヿニ因テ心血ヲ十分ニ脳ニ輸スヿ能ハサル者此症ヲ発スル

ソレ卒厥ノ脳髄壓迫ニ関カル世ノ普々説処ニ之ヲ以テ未塾ノ医理ヲ詳ニセス脳中脈管空々血ヲ補足スヘキノ痕ト虫尼動モスレハ却テ忽ニ泻血ヲ施シ以テ脳管ヲ閑カント要スルコアリ其故ニ先ツ卒厥ノ原脳管ノ麻脱ニ出ルノ有無ヲ詳ニスルハ尤モ肝要ナリ患者急ニ死ヲ致ス蓋シ此虚脱ニヨル

昏冒

「徴候」昏冒ノ症始メ心胸大ニ煩悶シ脈動呼吸忽チ微弱ニサニ絶セントシ手足ヒヘ顔面死色ノ微ヲ見ハス

「原因」昏冒ハ諸液暴泻ヨリ生スルヿ多シ血ヲ脱スルハ殊ニ甚シク又感動劇痛モ之ヲ発スヘシ蛇虫動脈浦古及ヒ大動脈坚硬骨ノ如キニ至ル者又皆血ノ循還ヲ遮リ以テ此病原ナル又間々両心耳ノ間閉障ヨリ発スルヿアリ

「治法」昏冒諸液非常ニ脱出ノ発スル者ハ直ニ患者ノ体ヲ正臥シ外気ニフレシメ醋酸或ハ揮発塩ヲトリ之ヲ顕顙ニスリ又揮発塩一茶匕ヲ水少許ニ和シ内用スル四支ハ温布ニテ摩擦シ顔面頸上ニ冷水ヲ潅キ患者蘇スル后ハ大ニ衰弱スル故ニ滋養補血ノ食物ヲ与ヘシ腦世暴以児竜牛黄ノ名 孛児根糕餅ニ酒少許ヲ加ヘ者ノ如シ疼痛ヨリ発セハ才三十一号阿芙蓉液ヲ内服セシム疼痛ヲ鎮メ再発ヲ制スル感動ニ由テ之ヲ発シ患者多血ナル者ハ才七十七号ノ強壮綿屈世尓ヲ用ユヘシ心ノ草丈ニ由テ血壅メ之ヲ発セハ身体ノ動揺ヲ證ニ血行ヲ促ス者ヲ禁スヘシ医官率児孤涅曰ク神圣ノ触覚已甚ナルヨリ発スル者ハ凡テ意思ヲ攪擾スル諸件ヲ休止スルヿ此治ノ良法トス

吐血

血冒ニ集リ之ヲ吐出スレハ此症ヲ発スル一腔肺血咳吐ニ従テ出ル者アリ之ヲ咯血ト云フ其出血ノ原ヲ知ルノ法咯血篇ニ詳シ

咳嗽ナクメ吐血シ其色紫黒ニメ原本色者ヲ見ニ多クハ紫黒色ナリ恐クハ原本ノ誤リナルヘシ故ニ之ヲ改ム多クハ紫黒ニメ淡トス按スルニ胃血ヲ吐結凝シ胃中ノ汚穢物ヲ混スルハ胃ノ正徴ニ

「原因」此症ハ常ニ月圣不調痔血ノ如キ漏泄スヘキ者壅塞メ発スル処ニ

「治法」患者多血質ナレハ尺泻ヲ刺シ血ヲ泻スルヿ六十四銖或ハ八十銖ニ至ルヿ而メ左ノ綿屈世尓ヲトリ二時毎ニ三食ヒヲ用ユル方 玫塊苍(乾者二銖)ヲトリ熱湯半桮度ヲ淹キ浸スヿ一時半又玫瑰水底ニ沈ムヲ度トスルモ佳シ而メ後緑荅精二銖刺荅泥根浸剤四銖ヲ和シ調匀ス

又吐根末二仄ヲ阿芙蓉半仄或ハ八滴ヲ和シ之ヲ与ヘテ以テ血ヲ外表ニ進ルモ妨シ又足ヲ温湯ニ投スルヿ凡テ十蜜扭度ナルヘシヨリ此効ヲ奏ス如此キ茅剤方法ヲ用ユルモ出血尚止サル者ハ綿屈世尓ノ毎剤ニ砦石六仄或ハ八仄ヲ和シ又胃ノ部ニ発泡膏ヲ貼スヘシ

燕麦粉ハ食物ニモ飲剤ニモ宜シ温メスメ用ユヘシ 吐血月圣壅塞ニ由テ発スル者ハ吐血止後一二日ヲ径テ通圣剤ヲ用ヒ以テ子宮ニ進ムヘシ詳ナルヿハ処女疗及圣水閉塞ノ篇ヲ見ルヘシ

吐血ノ原痔血ノ内陥ニ出ル者ハ芦荟ノ下剤及ヒ才四十六号ノ加味格呂葷度丸ヲ与ヘ以テ其再起ヲ促スヘシ

尿血

此疗ハ他疗ヨリ波及スル疴ニ唯一種ノ出血トス損害アルヿ少ナシ

治法宜ク其原因ヲ除クヘシ通常粘滑ノ飲剤ヲ服スレハ静止シ亜ア仁煎汁或ハ罌粟煎汁已且杏ノ乳汁ヲ和スルカ如キ是レ多血ヲ兼ル者ハ尺沢ノ血ヲ瀉シ才三号ノ蒐ア油ノ如キ疏通剤ヲ与フヘシ急ルヿ勿レ鹹味ノ下剤尿ヲ刺戟スルヿ甚シケレ故ニ用ユルヿ勿レ患者衰弱シ若クハ血尿腎肪脱ノ瘡瘍ニ由リ者ハ滋養ノ食物ヲ用ユヘシ呑ヲサレハ唯稀渋ノ食物ヲ用ユヘシ総テ胡椒塩姜ノ如キ刺戟物ハ禁スヘシ肪脱腎輸尿管ノ結石ヨリ之ヲ発セハ其各門ノ主法ヲ施スヘシ膿瘍ヨリ之ヲ発セハ尿中ニ膿ヲ帯ヲ如此キハ罌粟根煎汁ニ的列拉底那精十二滴ニ和シ用テ良効アリ

腎肪脱ノ結石ヨリ此症ヲ発スル者ニハ撃列加剌鳥未詳収濫剤ニメ奇効アリ其某四夫ヲトリ熱湯一彬度ニ浸スヿ二時沪過メ一盃ヲトリ的列拉底那精十二滴ヲ和シ用ユ

依蘭苔ヲ的列拉底那ニ和スルヿ前ノ如クニメ之ヲ腎肪脱ノ久キニ用テ近頃奇効ヲ得タリ　依蘭苔煎汁四分彬度ノ一ヲトリ日ニ三次用ユヘシ詳ナルヿハ上篇才百十七号煎剤ノ条ヲ見ルヘシ

咯血

咯血ハ口内ヨリスル者アリ上顎内ヨリ出ルモノアリ又近傍ノ空処ヨリ来ル者アリ鼻血アリ肺血アリ胃血アリ其来ル処ヲ定ムルヿ甚難シ之ヲ詳ニスルハ尤モ肝要ナル之ヲ定ムルノ法左ノ如シ

血口内ノ一部ヨリ来ルヤハ咳嗽吐痰ナク先ツ口内ヲ窺テ其出処ヲ明ニスヘシ又顎内若クハ鼻ノ空処ヨリ来ル者ハ痰ニ和メ出ツ間々肺血ノ如ク咳ヲ発シ其血肺ヨリ出ルカ如キ者アリ然レ肺血

ニ非スレハ此症甚タ少シ唯初メ衄血ヲ患ヒ或ハ鼻内傷損ヲ被
ル人ハ間之ヲ発スルアリ総テ口内ヲ見レハ血歯齦ヨリ出ルカ
如シ
血鮮紅色ニメ泡沫ヲ交ヘ多ク咳ヲ発メ痰ヲ吐シ悪寒熱症
先ツテ発シ胸上横ニ拘急ノ気アリテ煩悶スル者ハ是レ肺血ノ
正徴ニ咯吐咯血ヲ兼ネ咳嗽吐交リ起リ殆ント前后ナ
キカ如キハ肺血胃血ヲ定メ難シ但肺血ハ其出ルノ量次ク且
甚色鮮紅色唯粘調ナル泡沫ヲ交ヘ胃血ハ常ニ甚色暗紫
凝結メ胃中ノ汚物ヲ交ルヲ以テ肺血胃血ヲ定ムヘシ
又肺血胃血共ニ嗽嗽吐ヲ兼発スレハ肺血ニ在テハ吐血前
嗽嗽吐吐ヲ兼発スヲ以テ其出血ノ部ヲ察スルノ一助トスル又
胃血ニ在テハ吐血前ノ症候アリ以テ其因ヲ詳ニスヘシ

疒原胃ニアルモノハ吐血ト名ク上章故ニ之ヲ示ス疒因口内若リハ上
顎内ニアル者ハ恐ルヽニタラズ矛九十四号ニ載ル収斂嗽剤ヲ用エ
レハ治ス但シ患者多血ナレハ尺沢ノ血ヲ瀉スヘシ疒原燃瞳潰瘍
ニ関ワル者アリ又燃痛中ニ之ヲ発スル者アリ宜ク其本疒ニ原テ
治術ヲ施スヘシ
肺中ノ肺管破レテ以テ之ヲ遺傳染ノ疒トス
十六歳ヨリ三十五迄ノ間之カ疒原トナル之カ咯血ノ正症トナス
ノ脉管大サ適セサルニ出ツ之ヲ患フルヿ多シ其原多クハ肺ト諸ア
又胸窄ク肺ノ空処ニ甚タク狭クメ両肩高ク聳ル者ハ通常此
患ニ嬰ル（両肩高ク聳ハ呼吸不利久ク止ニサルノ兆シ）身体痩弱ニメ（頸長キハ是此兆シ）激力覚
カ大過疾敏諸部ノ造質細疏ナル者共ニ上ノ症ヲ患フ
又月閉多血ヨリモ之ヲ発シ強ク肺ヲ衝ハルモ又此症ヲ発ス

肺ノ脈管破レテ此ヂヲ生スルヿ多シト雖モ其極メテ多キ者ハ頸結膿毒ノ為ニ壓迫ヲ受ケ膨脹スレハ嗽嗽ニ由テモ破裂スヘキ体ヲ動揺スルヿ宜シカラサルモ又之ヲ破裂セシムヘシ非常ニ肺血ヲ吐シ或ハ肺管破裂ノ標症ヲ苦ミ死セル者ノ肺ヲ見ルニ常ニ此結膿ヲ見ル肺労篇ヲ併セ考フヘシ

「治法」凡ソ体ヲ衝動シ心ノ運用ヲ増進スル者ヲ禁スレハ其出血鎮止スヘシ是故ニ稀痰ノ食物ヲ用ヒ外面ノ温気ヲ避ケ身体挙動ヲ制ス室ハ適宜ノ冷ナルヲ良トス飲料ハ淡稀ノ大麦水ニ橙汁ヲ和シ之ヲ冷服スヘシ又強ク声音ヲ出スヿ勿レ

梅肉ノ昆世尓弗又ハ旃奈葉浸剤ノ如キ緩下剤ニ酒石英少許ヲ加ヘ効ヲ奏スル後左ノ綿屈世尓二仏二食ヒヲ服シテ体中ノ敷カヲ減シ血行ヲ鎮定ス

方　巳旦杏乳剤（四十八粒）酸味世以斯（五氏官秤ナラン）蔗餹酒醋二匙　白蜜栗舎利別（四匁）

右混和嗽劇シキ者ハ毎剤ノ内ニ阿芙蓉液五滴ヲ和シ用ユ但シ嗽嗽劇ナラサレハ之ヲ用ユルヿ勿レ

咯血ニ由テ脉大過十八ハ尺沢ヲ刺メ血五十匁ヲ瀉シ発泡膏ヲ胸上ニ敷ス毎咳毎呼吸ニ胸中ニ痛アルヿハ殊ニ之ヲ施スヘシ

医官魯並采此症ニ吐剤ヲ用ヒ効ヲ得タリ物能（ウキケン地名）ノ官医私篤尓モ肺血ニ吐根末ノ間効アルヲ発明スコレ吐根ニ破管ヲ速ニ閉ルノ功他薬ニ勝ルノ故ニ医官私篤涅斯ノ飲食不化篇ニ吐薬ニ肺管破裂ヲ起スノ弊アルヲ以テ之ヲ禁ス咯血止ムノ后ハ清冷収濇ノ剤假令ハ玫瑰浸剤一酒盞ニ緩緑荅酸六滴ヲ和シ日ニ三四次之ヲ用ユニハ胸中痛ミ或ハ呼吸不利スル者ハ

尺沢ノ血ヲ瀉シ三ハ打膿法ヲ股上ニ施シ或ハ背膂若クハ胸骨上ニ発泡硬膏ヲ連用シ四ハ全身ニ温布ヲ被ヒ五ハ労動費カヲ制シ殊ニ肺ノ労動ヲ禁シ六ニ時ニ適メ後下剤ヲ用ヒ便秘ヲ防キ飲食ヲ節ニシ肉羹ヲ如此ニメ血ノ再発ヲ防クヘシ但シ如此ナハ甚タ恐ルヘシ良医ヲ招キ其治ヲ請ニ如ハナシ

胸痃

此ナハ古人ノ未タトカサル処ニ十四年前医官歩別（ベルテン）児電始メテ之ヲ命ス此ナノ発スルヤ次ナシトセス然レトモ且テ今ニ至ル迄之ヲシル者次ナシ痃ナノツキ者ナリ身体ノ動作精神感動共ニ速ニ之ヲ発スヘシ行歩シテ俯発スル者アリ歩ヲ止ムレハ多クハ止ム然レトモ暫時ニシテ音笛スルノ后ハ閑歩坐臥共ニ安カラス其勢猛ニメ患者止ムヲ得ス身ヲ直シテ室息ヲ免シト

ス其症始メ胸骨ノ下底ニ当テ劇痛ヲ発シ壓迫ノ勢ヲ覚ヘ其痛多クハ之ヲ左脇ヨリ始リ屡延テ左肘ニ及フ煩悶劇甚呼吸不利将ニ窒セントス医官然底児吉児胸中揮ヒ甚タ縮痛スルヲ此痛ノ正徴トス　老幼共ニ此ナニ罹ル又婦人男子ニ多シ頸短ク胸狭キヒ

「原因」此ナ幼年ノ者ニハ発スルヤ必ス心若ハ胸内蒂骨ノ激力大過痃挙スルニ由ル老人ニ於テハ総テ心臓冠動脈等一部ノ缺損ヲ挟ム

「註」一二日以前此痛ニ罹リ暴卒ニ死スル者アリ予カ学師加児列斯別爺ト共ニ其屍ヲ解剖ス冠動脈質大ニ膨脹シ其空処ヲ見ス心非常ニ肥大ニメ其質柔軟シ

「治法」此ナヲ治スルニ神圣ノ覚動ヲ減シ心ノ運用ヲ和スルヲ

主トス先ツ発泡硬膏ヲ肘骨上ニ貼シ尓後石鹸膏ヲ敷シ其
疱痕急ニ愈ユルヿ勿ラシメ才二号ノ凝水石剤ヲ用テ便秘
ヲ防ク奔后左ノ丸薬ヲ二粒ヲトリ日ニ二三次服スヘシ良効アリ
方　亜鉛苍　六分　六厘　強律水　浸剤一匁　伊沃矢亜謨浸　三分　三重強
薄苛油　二十滴　右混和三十丸トナス
疒勢劇烈ナル者ハ亜的尓三十滴ニ阿芙蓉液十滴ヲ和メ急ニ与
ヘシ患者幼ニメ多血ナレハ浮血ヲカクヘカラス飲食ハ刺戟衝
動質ノ者ハ禁スヘシ則チ酒精香料ノ如キ是シ又心ヲ用テ
胃ヲ飽塡セシムルヿ勿レ食后ニハ少ク体ヲ動揺シ精神ニ
感動スル者ハ勉テ遠ク避ヘシ　便秘ハコノ疒ノ遠因ト故ニ勉テ
体ヲ動揺シ飲食ヲ節ニシ下剤ヲ用テ以テ之ヲ防ク可シ又膲
上ニ打膿法ヲ施スモ良効アリ医官達児演及ヒ歩浦里的此疒

ノ只打膿法ニテ治スルノ例ヲ示ス
患者羸瘦顔色灰白ニメ殊ニ両足夜ニ及テ瞳ル者ニハ剛欽ヲ亜
的児ニ浸ス者三十滴ヲトリ刺荅泥若クハ格侖（コロンボ）勃根ノ浸剤ニ
食ヒニ和シ用ユ殊効アリ此疒如此体質衰弱ヲ夾ムト虫尼打
膿発泡膏等ノ療治実ニ害ナシトス

霍乱

此疒ハ胆液非常ニ分泌メ厉酷矢常ノ質ヲナシ之カ為ニ
吐瀉絞腸痛ヲ起スノミナラス間身体各部痙攣ヲ兼発ス
煩渇冷汗昏冒失気四支厥冷シ脈不同ニメ細ト吃逆不止
ト此疒ノ標症ニ天殊ニ此疒ヲ発スル其疒勢劇烈ナル者ハ多
クハ十二時ノ間ニ死ス

「原因」此疒熱國ニ多ク大寒國ニ夏月ニ於テ熱ノ時之ヲ発之ヲ以テ

此ヂハ温熱ノ雰気肝ヲ刺戟衝動シ以テ非常ニ胆液ヲ分泌スルノ所致理ニ当レリ此ヂ侭腐敗ノ悪気ニ感シ或ハ蒸気内陥ヨリメ発スルヿアリ

此ヂヲ療スルニ先ツ大麦水或温湯ヲ多服セシメ以テ胆液ヲ稀淡ニシ腸中ヲ刺戟セサラシメ又此湯液ヲ取テ灌腸シ兼テ阿芙蓉液十五滴ヨリ二十滴ヲ投シ疼痛止ラシテ度トス阿芙蓉ヲ用ユルノ后チ吐ナヲヤマサルキハ燕麦水或ハ麦麩汁半彬度ニ阿芙蓉ヲ和シ水銃ヲ以テ灌腸スヘシ腸中腫起スルキハ加蜜児列苓煎汁ヲ以テ灌腸シ或ハ又十蜜扭篤ノ腹上ヲ熨シ或ハ又十蜜扭篤ノ腹上ヲ熨シ或ハ又十蜜扭篤ノ腹上ヲ熨

毒物胃中ニ入リ以テ吐セ発セハ治方中毒篇ニ示スカ如シ
姙婦ノ吐セハ常ナシ其体ノ強弱ニ関セス一般ニ之ヲ患フ之ヲ
以テ其質ニ従ヒ其因ニ従フテ治法同シカラス
脈管充実ヲカ子又ハ血脳ニ上衝スルヿ甚シキ時ハ尺沢ヨリ血
ヲ瀉シ才二号凝水石ノ如キ緩下剤ヲ毎朝飲下シ飲食ヲ節
ニスヘシ又兼テ左ノ綿屈世尓ニ食ヒヲトリ日ニ二三次用ユ
方 玫瑰浸剤 五十六匁 凝水石 二匁 加味益智浸剤 六匁
右混和
総テ次ク身体ヲ動揺スヘシ益アリ 良医ノ命ヲ俟タスメ
漫ニ吐薬ヲ用ユルヿ勿レ妄用ノ弊遂ニ随落ヲ起スヿアリ
胃中或ハ衰弱シ或ハ酸液ヲ生シ或ハ激力大過以テ吐吐ヲ発
スルハコレ則チ飲食不化ノ一症ナリ又此ナルヘシ 吐スル者胆液ノ
如クナレハ才二号中和塩或ハ才十八号後硫黄酸ヲ用ユヘシ劇痛ニ
脳ムキハ之ニ阿芙蓉液一二滴ヲ和スヘシ効アリ酒ヲ温飲シ以テ此
症ヲ発セハ稀鮮ノ菜液良効ヲ見ルニ例スルニ茶或ヒハ宵喜矛
一号瑪倔涅失亜又才廿一号亜児鮮塩一剤ヲ加ルカ如キ是ナリ
疗原明ナラサル者ハ才廿二号塩質ノ飲剤ヲトリ沸騰スルニ乗シ
用ユベシ又症ニ従ヒ之ニ大黄阿片液ヲ加ヘ又胃ノ部ニ鎮痛硬
膏ヲ貼スベシ
胃口頑結シ又ハ胃中内面ノ膜潰瘍ヲ発スル者ノ胃痛ヨリ
吐吐ヲ発スルヿ多シ如此症ニハ阿片浸剤 原本罌粟球トアリ誤シ改ム
二三氏或ハ純精阿片一氏ヲトリ亜仏仁蒭汁ヲ石灰水ニ和シ
日ニ用ユルヿ二次軽快ヲナス
吐吐ハ総テ百ノ標症ナリ此治方殊ニ其原ノ性質ニ原ク

小児ノ吐吐ハ多ク食物ノ飽塡ニ原ク之ヲ以テ其吐スルノ
物大畧酸液ニコノ症ニハ十ノ屈涅失亜次許ヲ用ユ又那篤
竜ヲ水ニ和シ少許ヲ用ユ如シ大便緑色或ハ白霊ノ如キハ吐
根未ヲ用テ軽ク吐ヲ起スヘシ良シ

呑酸　原名心火

呑酸ハ胃ノ部位焼カ如ク覚ユルニ出ツ時トメハ大煩悶シ呼吸
不利酸味ノ噯気ヲ致ス風気脹充神安カラス吧気アリ
是症総テ飲食不化ヨリ出ツ姙娠多ハ之ヲ発ス

「原因」

酸液胃痛ヲ起ス人常ニ之ヲ心火ト云フ理ニ当ルニ
非ス唯世人此酸液ハ飲食糜爛ノ主巻衰弱スルヲ以テ損物
ノ飲食スル者沸騰スルノ所致トス然ルニ此沸騰胃中ニ起ルヤ
但シハ又世ノ説ノ如ク其食物酸味ノ物ナルヲ以テ之ヲ発ス
ルヤ詳ラカナラス　蓋シ人身半ニハ固ヨリ才原ナル者アリ故ニ
物ノ変化スル酒醋ヲ醸スルカ如ク時ヲフルニ非ス学師巴児達尓曰ク胃
ノ物ヲ醸シテ変化スル他ノ酸物造ルヨリ速シ醋ヲ造ルハ其醸熟
スルノ間数月ヲ歴過ス人身ノ如キハ否ラス一盃ノ薄酒ヲノムニ一二
密扭篤ノ后チ多ク八酸味ノ噯気ヲ発スルヲ以テ胃中厳醋ノ生
スルヲ明ニスヘシ但シ其酸液他ニ異ナル処アリコレヲ以テ人或ハ之ヲ
雑メ曰ク胃中ノ酸液ハ其味モ大ニ醋ニ嘗雑ヲ患ル人モ又云フ其吐
ヲ主ル益ハ感スルモ又同シカラスト蓋シ其酸液ハ動物植物ノ
ニツアラサルヿ必セリ　以上巴尓達尓ノ説
呑酸ノ原因ヲ考フルニ一曰ク胃中内面ノ膜ヲ滋潤強護スル粘液
敗損スル者ニ曰ク辛辣香竄ノ物之ヲ刺激スル三曰ク胃中ノ
潰瘍是ナ

「治法」　呑酸ノ治法多クハ其近因ニ従テ異ニス呑酸胃中ノ酸液ニ由テ発シ便秘シ或ハ快通スト共ニ才一号ヲ広屈涅失亜才六号ヲ那篤竜才廿一号亜尓鮮塩ノ内ニ一方ヲ用テ以テ其酸液ヲ混和セシメ其痛ヲ鎮定スヘシ用法某剤ノ各条ニ示スカ如シ然ルニ内蔵大ニ之ニ感シ患者此下剤ニ脳ムキハ才廿六号白霊散或ハ石灰水ヲ用ユヘシ良効アリ胃中多少呑酸ノ才根トナルヲ以テ此某剤中ニ苦味物ヲ配シ以テ其再発ヲ防クヘシ之ヲ以テ呑酸下利ナキ者左ノ綿屈世尓ヲ吐剤后ニ用ユヘシ即効ヲ奏ス

方　才六号　那篤竜　一匁五分　硇砂精　一匁　才七号生姜加密列浸剤　三匁　清水　五十六匁　右混和

右ニ食ヒヲトリ日ニ二三次下ス患者飲剤ヲ忌嫌フキハ左ノ丸薬ヲ与フ奇効アリ

方　加密列苞浸剤　一匁　胡孛子油　八滴

右混和シ廿四丸トナシ二三粒ヲトリ日ニ二次飲下ス

泉水ハ胃中ノ酸液ヲ稀釈スル故ニ総テ軽快ヲ見ハス　吸酸灰水塩ノ剤ヲ用ヒ効ナキニハ後々ニ後緑苓酸ニヨリ酸液醸熟ヲ製スルノ効アリ用ユヘシ屡効ヲ奏ス用法才十八号ニ用出ス

飲食ノ洽飲食不化篇ニ示スカ如トシ　如此某剤ヲ用ヒ飲食ヲ厳ニスト雖モ是疝再発シ患者衰弱スル者ハコレ胃中一部ニ欠損スル処アリテ之ヲ発スルナリ此時ハ加呂墨尓苦土　凝水石ノ如キ疏通剤ヲ用ユヘシ但シ宜ク良医ノ命ヲ俟テ治ヲ施スヘシ

疔原粘滑液ノ缺乏ニ出ルハ活物ノ傑列乙　膠ノ属ヲ要トス

痛風ヲ患フル者之ヲ発スレハ加私加里児列揮発浸ニ食ヒ石灰水一酒盃ヲトリ一時半若クハ二時毎ニ之ヲ用ユ凡テ軽快ヲ起ス
（痛風防禦法ヲ見ヘシ）

呑酸妊婦ニ発スルハ才二号ノ凝水石ヲ法ノ如ク投シ才十八号ノ緩緑巻酸ヲ兼用シ予常ニ功ヲ得タリ然ヒ腸胃ノ衰弱スル者アリ壅塞スル者アリ体質ノ衰弱ナル者アリ多血ナルアリ皆之ニ従テ治法多クハ一ナラス

脱腸 ブレウク

此ヲハ股内ノ物一部脱出スルノ所致ニ其瞳起スル処柔軟之ヲオセハ収ムヘシ常ニ嘗践ニ発ス

「原因」腸中自然ノ位置ヲ乱シ以テ腸内ノ空処ヲ減スル者皆此ヲヲ発スヘシ劇笑噴噎妊娠奔走ノ如キ是ナ

暗尼里亜國蒲患古（袴ノ如キモノ）ヲ帯ルニ高クメ常ニ服ノ中央ニ及フ腸之カ為ニ壓迫スコレ脱腸ノ以テ多キ処ナ

「治法」脱腸ノ治法ハ其腸ヲ股空ニ収メ再脱ヲ防クニ在リ外科唯之ヲ収ムルノ術ヲ行フヘシ余ハ自然ノ力ヲ以テ之ヲ治ス腸ヲ収メテ復スルノ繃帯ハ腸ノ位置形状ニ従テ各同シカラス腸嘗踞或ハ陰嚢ニ下ルヒハ常ニ収腸帯ト名ク者ヲ施ス但シ之ヲ製スルニ宜シカラサレハ脱腸スル処ヲ壓スルニ偏勝不同ニメ腸之カ為ニ女ク剥（ポツ）布ト股骨ノ間ニ夾リ以テ窘迫損傷シ之ヨリ種々ノ疔ヲ起スヿアリ之ヲ以テ当今常用収腸帯ノ製ヲ収メ剥布ノ長短形状ヲ易ヘ又弾機ヲ用ヒ以テ腸ノ脱出ヲ遮リ此患ヘナカラシム

圓キ弾機ハ弾力アルヲ以テ之ヲ施シ用フルニ甚易クカツ行歩拳動モ身轉スルト雖モ剥布其

処ヲ移サス　身ヲ伸スノ間ハ収腸帯ヲ用エルニ及ハス

別ニ又草帯圣リ大ナル者ニ紐ヲ以テ腸ヲ収ムルノ治アリ

疝ニ從ヒ大黄浸剤一食已ヲ用ヒ食物ハ多ク植物ヲ以テ製シ

水液ハ稀淡ナルヲ擇用シ以テ便秘風脹ヲ防クヘシ

股脹腟起メ収ニラス必ス其部位或ハ腸中ニ疼痛ヲ起シ呕吐

発熱便秘ヲカ子神気爽快セサル者ハ脱出スル部分ノ窘迫

スル処迫将ニ燃腟セントス患者ノ命期ヲ促スノ候シ急ニ瘍

科ヲ招テ術ヲ施スヘシ若シ其窘迫急ニ除カザレバ必ラス脱疽

ニ変シ死ヲ致ス

瘍　ボイレン

瘍ハ他ノ疔ヨリ来ル一疝シ一疔トスルヿ勿レ身体毒アリテ

之ヲ発スヿ之ヲ以テ才五十八号護漠膏ヲ革布ニヌリ又才

百十二号糊剤ヲ製シ之ニ附貼シ以テ其膿ヲ促スヘシ疼痛甚シ

キ者ニハ罌粟売ノ膿煎汁ヲ以テ慈熨スヘシ

膿潰破スル后ハ唯之ヲ清潔ニスルヲ要トス舎雷護漠或ハ私百尔

未説篤膏少許ヲ貼シ以テ全治ヲ下ソベシ才二号芒硝清

涼水ヲ法ノ如ク飲服スヘシ又才サ七号加呂墨欠邪剌巴疏

通散或ハ才三十六号抜矢里屈斯散七日ノ間ニ次服スヘシ妙シ

瘍治スルノ患者衰弱甚シキ者ハ才七十七号強壮綿屈世尓ヲ

用ヒ強壮ニメ復敗除汚ノ功アリ此疝ニ良効シ又疝ニ從ヒ才サ

号硫黄疏通水ヲ用ルモ又預メ瘍ヲ防クノ奇法シ

患者別ニ才ニ脳ムノキハ瘍ハ前ノ如クニ治ヲ施シ内某ハ此疝ノ

性質ニ原ヒテ擇用スヘシ

顳腟

「原因」此才ハ歯痛泛ニ寒外傷ヨリ起ル又顎骨ノ疾才歯牙ノ腐敗前ニ之ヲ発スヘシ

「治法」歯牙腐敗ヨリ来ルキハ其歯ヲ抜キサルヘシ他ノ才因ヨリ之ヲ発セハ無果苍ヲ烘リ之ヲ附貼シ以テ其膿膿ヲ促スヘシ膿ナルノ后ハ才ハ十三号酸味含嗽剤ヲ以テ頻ニ漱クヘシ又刺巻泥根ノ浸剤ヲ水ニ和シ稀淡トナシ用ユルモ妙ニ其用法刺巻泥根ノ条ニ詳シ

加巻列布失

此才世ニ患ル者甚タ少シ其発作ノ間定期ナシ唯一ニ密扭篤許之ヲ悩ム者アリ又二三日之ヲ苦ム者アリ如此キトキハ不学ノ徒誤テ昏冒失気ノ症トス此才別ニ体中ノ疾才ヲ生スルヿ少ナシ患者思ワス仰キ臥スルノ后知覚挙動ヲ廃シ関節急ニ強直シ動スヘカラス知覚悉ク廃スト雖モ液ヲ口内ニイルレハ能ク嚥下スヘシ顔色赤ク眼瞼潤キ直視ス間咳嗽涙出ノ症アリ此才ノ去ルヿ遅速アリト雖モ皆呻吟ヲ発メ而メ籌ス

官医屈児連未タ此ニ類スル症ヲ見スト云又他ノ内科昏ニモ此ノ如シ直ニ此才ノ如キモ屈尓連卒厥ノ一種トス卒厥トハ大ニ異ナル処アリ

「原因」近因ハ拳動ヲ主ル神圣ヲ障碍スルニ成ル恐驚煩心ノ如キ神圣之ヲ感動シ深ク物ヲ考ヘ諸件ノ法ニ背クヿヲ行フ皆神圣ヲ障碍スヘシ

「治法」患者多血ノ者或ハ又顔色甚タ赤ク頚ノ血管膨脹スル者ハ尺沢ヲ刺シ或ハ頚ニ角法ヲ施シ血六十四匁若ハ八十匁ヲ瀉シ才十二号疏通綿屈世尓才九十八号鎮痛滋腸剤ヲ用ヒ才四十号

白芥子糊剤ヲ足心ニ貼スヘシ

「註」患者咬牙ヲ発セハ胃中蛕虫アリ綿屈世尔ヲスステヽ才三十号ノ按失里屈私散ヲ用ユヘシ

二時或ハ二時半毎ニ左ノ綿屈世尔ヲ二三食ヒヲトリ兼用トシ服スヘシ

方　阿魏　一匁　忽布　満鎮痛液　二匁　硇砂精　二匁

竜脳欠　四十八粁　右混和

硇砂精揮発塩若クハ竜脳醋酸ヲトリ又臭下ニツケテ嗅入セシムレハ如此キ薬剤ヲ用ユルモ患者尚薬覚セザルトキハ頭毛ヲ剃除シ左ノ膏ヲヌルヘシ

方　竜涎香油　四粁　鹿角精　四粁　迷迭香　二粁　右混和シ供用ス

軽ク越列吉天尔ヲ施スハ由テ効アリ発泡膏ハ効ナシ

古函鳥布　馬飛風

此ヂハ殊ニ小児ニ多シ哺乳ヲ止ムルノ后ニ非サレハ発スルヿ稀シ温地海岸微暖ノ候ヨク之ヲ発ス血傳ニ由リ家族殊ニスス之ヲ患ル者アリ一発ノ后ハ次ク塞気ニフルモ忽チ再発ス

「ヂ候」此ヂ始テ気管ノ上部疼痛シ之ヲ按セハ其痛ヲヽスカ如ク疼ヲ吐クヿ少シ顔色少ク変シ屢浮腫スルヿ甚シク或ハ軟或ハ強煩渇発熱神気安カラス尿ノ色初メハ濃ク色ヲソム時ニ透明清稀スル者アリヂ日ヲ経テ汚濁ヲ見ワス気管ニ黄色非常ノ一膜固着シ呼吸ノ通路ヲ防ク声音唖嘶呼吸不利ノ症之カ為ニ愈進ニ遂ニ益テ此症ヲ増進シ全ク呼吸ヲ止ルヿアリ或ハ手足浮腫スル者アリ

「原因」気寒冷ニメ濡湿ナレハ此症ヲ患フ秋冬ハ殊ニ然リトス其近因ハ気管内面ノ膜ニ黄色糊ノ如キ膿質包被メ燃腫スルノ

致ス処ノ医官援以児里且テ此糊ノ如キ者喉頭堅間ノ上部ヨリ
気管ノ未梢肺ノ小嚢ニ連ル処迄蔓延スルヲ発明ス死后屍ヲ剖
テ之ヲ見ルニ尚前ノ如ク粘液濃汁ニ交テ気管ヨリ其梢末ニ達ス
「治法」此疔毒ヲ兼テカツ其処宜シカラス此故ニ速功アルノ薬剤
ヲ用テ其死ヲ救フベシ浮血発泡膏ハ殊ニ速功アルノ法ニ　疔ノ
初発気管ノ部位ニ六ケノ水蛭ヲ附テ出血止シテ乾ク后ニ発泡
膏ヲトリ頸項ニ貼スヘシ脈強ニメ热或ハ進ム者ハ尺沢ノ浮血ヲ
要トス才三十五号吐酒石又ハ才三十七号吐石安質没酒各一剤
ヲトリ用ユヘシ怠ルヿ勿レ薬剤下剤ヲ投セシニハ才三十六号抜
失里屈斯散又才サセ号加呂尼尔郎剌巴散ヲトリ吐薬効アルノ后
半時ヲ経テ用ユヘシ又ヌ才児ニ温湯温醋ノ蒸気ヲ薫スヘシ但シ
咳嗽ヲ発セサル様ニ用心スヘシ皮膚乾燥スル者ハ催吐酒五滴
ヲトリ一時半ニ時毎ニ用ヒ兼テ才七十八号鹹味綿屈世尔ヲ与ヲ尚発
汗セサルキハ温湯浴ヲ行フヘシ効アリ「ジキタールス」ノ浸剤六七滴
ヲトリ日ニ二次用ユヌ才ニヨリ良効ヲ奏ス発泡膏ノ痕ニハ水銀膏ヲ
ヌリ長ク其稀水ヲ漏スヘシ　発泡膏ヲ用ヒ表皮ヲ去ルノ后此
水銀膏ヲ貼スレハ直チニ軽快ヲ見ワスヿアリ予之ヲ以テ之ニ専ラ
此水銀膏ヲ功アリトス
醋化世呂以斯官粉ナシ　百日咳ノ条ニ出スカ如ク此症ニモ良効アリ
新鮮ノ乳汁ニ巴旦杏ノ乳剤又ハ亜丁仁ヲ和シ以テ才児ヲ
養フヘシ用ユルニ従ヒ多ク用テ以テ其渇ヲ製スヘシ症退クノ
后ハ散那普汁ニ甘中ヲ和シ用テ再感ヲ防クヘシ居家ノ気ヲ
次才ニ軽浮乾燥ナラシムヘシ甚タ効アリトス
間老人ニ此症ヲ発スルヿアリ如此キハ此薬剤大剤多量ニ投ス

「区別」一此疒咽喉煩瞤ニ異十ル処ハ声音殆ント凡釈ノナルカ如クニメ呼吸喘噫又此疒ニハ飲食噎下シ妨害ナシ咽喉煩腫ハ飲食レ難シ

或人古呂烏布ヲ二種ニ分ツ一ハ気管内面ノ膜煩腫ニ由ル二ハ痦ニ痦葦ニ起ル者痦葦孤呂烏布ト云フ此腫ハ喘息ノ質ニメ多ク夜間ニ発ス多分間歇アリ発作ノ間ハ呼吸ニモ喘息ナク咳嗽スレモ喘息ナシ以テ煩衝孤呂烏布ニ異ル内薬良効ヲ奏ス然モ全久ノ者ハ之ヲ治スルヿ甚タ難シ此腫類ニ殊ニ功アル者ハ吐剤（吐根）アリ日ニ連用スヘシ又喘息蒴ニ出ス鎮痦剤モ良効アリ喘息止ム迄ハ連服スヘシ詳ナルヿハ喘息蒴ヲ見ルヘシ

頭瘡

此疒ハ傳染質ニ多クハ此疒ニ罹ル細カニ之ヲミレハ毛根ヨリ傳ル又クシヨリモ之ヲ傳ヘ一家族皆之ニソム毛髪アル処悉ク此毒アリ膿水多クハ酷厉ニメ頚腺モ之カ為ニ腫脹スニ種アリ一ハ膿水ヲ流スヿハ乾固膿ヲ出サス「沿法」未タ日ヲ経ザル者ハ患処ノ髪ヲ刈リ短シ瘡痂ヲサリ左ノ膏薬少許ヲトリ患処ニ貼スヘシ別ニ薬ヲ用ルニ及ハス

方　橙膏（三味）　胆八油（一味）　右磁缶ニ入レ混和シ供用ス

自葉メ薬ヲ用ヒス項上大ニ之ヲ発セハ頭毛ヲ剃除シ石鹸水ヲ濃クシ精密ニ之ヲ洗潔シ鱗痂ヲサリ膿水ヲ除テ而左ノ膏薬ヲトリ朝夕患処ニヌリ軟革ヲ以之ヲ摩擦スヘシ

方　橙膏　瀝青膏　各四匁　右磁器ニ入レ混和ス

毎朝此上ニ胆ハ油ヲヌリ而メ石鹸水ヲ温布ニ浸シ洗テ膏ヲ
サルヘシ　頭瘡一部ニ甚シク発スル処アレハ其処ノ毛根其毒
ヲ受ルヿ甚シキヿ其毛ヲサルヘシ　此膏　菜ヲ用ユル間ハ
帽袋ヲ戴クヘシヤ勢減スル者ハ上ノ橙膏胆ハ油ノ膏ヲ用
ヒ全治ニ及フ瘡痂全ク治スルノ后ハ石鹸濃浸水又ハ淡巴古
煎汁ヲ以テ此ニヌルヘシ毛生スルハヤ已ニサルノ徴シ新ニ瘡
痂ヲ結シトスル者ハ西洋墨土　汝食子緑礬精水等ヲ以テ
製ス別ニ詳シ　ヲ用ユヘシ効アリ

頸結膿質ノ人ヲ発セハ其治方甚タ難シ此時ニ一頓結膿ヲ治
スル薬剤ヲ与ヘ先ツ其毒ヲ治スヘシ輸篤竜及ヒ加味撒尔巴利
尔列煎剤等モ此ニ効アリ

橙膏ヲトリヨク頭上ニヌレハ別ニ水銀ヲ内服スルニ及ハズ
世人此ヤハ唯頭上一部ノヤトメ軽卒ニス予ニ於テハ然ラス仍テ
其人ノ平トスル処ニ注意シ殊ニ飲食消化ノ機ヲ浄ニシ弟六
十号那篤竜ヲ用テ以テ胃中ノ酸敗液ヲ防クヘシ尤モ肝
要ナル胃中宜シカラサル者ハ才廿三号吐根末ヲ用テ吐ヲ起シ
才三十六号抜矢里屈私散ヲ適宜ニ用ヒ而メ格弄勃根浸
剤三四十滴ヲトリ才六十号ノ那篤竜ニ加ヘ日々服スヘシ但シ
患者多血ナレハ才二号ニ出スヘシ芒硝水若クハ硫黄水ヲ用ユ良効
アリ

食物ハ動植二物ヨリ製スル者ヲ用ユ過食スルヿ勿レ飲料
ハ清水若クハ蒸露水ヲ良トス