g 65

F
キ−49

玉海擘要序

順藏兒玉翁、博學宏才不俟論、其志氣高邁毫不媚世、來寓浪華、三年于茲、浪華風俗視醫頗賤、待之動失禮節、翁也憂之已甚、毅肰不屈志、退而閑居、譯洋籍數十

493.1
G.Y
No.1765
10.8.65
慶應義塾大學醫學部圖書
慶應義塾大学医学情報センター
兒玉順藏 玉海擘要 冊

編、脱藁已百餘巻、諸醫家必用之書而已、蓋其志將有大所為也、如此編之出乎書肆之囑、不得止者、非甚竭其心力去覧者莫以此識評之、則可矣、雖然此編論病證條緒頗正、載藥術之確、採摭極浩博、真刀圭家之玉海也、珊瑚珠無捨不得矣云爾、

安政己未秋九月緒方章公裁識于
浪華之僑居

任庵逸人題書

玉海擥要序例

一余ガ性嬾慢加フルニ衰病益甚ダシ眼ヲ過レハ百事皆忘ル嘗テ施療日用急索ノ書一本ヲ以テ坐右ニ置ントス書肆携来テ示ス所ノ年刋増益ノ篋本冊子或ハ繁ニ過キ或ハ簡ニ失ヒ人意ニ充ル者ヲ見ズ又性因證治ヲ擧テ統紀スル者有ルヿ無シ去歳公樂地（コンラヂ）氏ノ各論ヲ譯ス議論精確。條理分覈。當今醫家ノ準則。簡ニシテ要ナル此書ノ右ニ出ル者有ルヿヲ聞ズ是ニ於テ同浴ノ笑ヲ顧ミズ遂ニ取テ以テ

テ原據トシ私布歛傑爾ノ醫學通論。扶歇蘭度ノ經驗遺訓ヲ折衷シ更ニ名物考。同補遺。藥鏡。舍密開宗。藥性論等諸書ノ性効主治製法服量ヲ藥品方劑ノ下ニ鈔録シ全部ヲ節略〆以テ袖珍本ト為シ私ニ題〆玉海擘要ト謂ヿ

一余文辭ニ嫺ハス排叙拙劣。躬自讀テ猶厭ヿ可ヲ覺ユ况ヤ他人ヲヤ然モ意達スルノ三夫ノ取捨精ヲ得。詳略體ヲ為カ如キニ至テハ余カ及ヿ所ニ非ス然ルニ此書便覽ヲ以テ主トス故ニ重複ヲ芟刪シ前後或錯置シ或相讓ル者往々之有リ自ラカヲ量ラス〆漫然削略シ以テ區々ノ治療方書ト為ス飣餖妄作ノ嘲。固ヨリ辭セサル所ナリ覽者若シ此書ノ本編。經驗遺訓ヲ讀テ後。此書ヲ閲セハ聊カ得ル所。有ランカ請フ自得ノ手簿ト〆見ハ幸甚。本編亦既ニ剞劂ニ付ス發行近キニ在リ就テ見ルベシ

一此稿幾ント成ルノ時。熟思ラク日新ノ學業今ノ世ニ〆誰カ此等ノ陋本ヲ見ル者有ンヤ兒女ノ志願

遂ゾレハ則チ忘ルヽカ如シ偶〻緒方公裁ト話次稿本ヲ出シテ此ニ及フ乃チ一見慫慂メ曰ツ然ラス此書益有リ必ス行フヘシ因テ又思ヘラク原来自ラ為ニメ苦心纂輯スル所ナレハ彼ノ遠郷僻邑余カ如キ者亦未タ無シトス可ラス抑〻掌上ノ如意珠已ノ為メニシ人ノ為メニス恵光海ノ如シ是ニ於テ上梓メ家ニ藏シ且ツ以テ同好ニ頒ツト云爾

安政己未秋七月　　順識

玉海擘要總目次

卷一

第一編　熱病

總論　單純焮衝熱
神經熱　腐敗熱
腸胃熱（膽液熱 粘液熱）　發黃熱
傳染熱　間歇熱
藥方譜

卷二
第二編　焮衝
總論　腦及腦膜焮衝
脊髓焮衝　眼焮衝（外內　眼瞼赤爛　初生眼　厄日多眼）
（聖京倔性　瘡疹諸病　梅毒　腺病性）
耳焮衝　唾腺焮衝
舌焮衝　咽喉焮衝（喉嚨水性　生膜壞疽）
甲腺焮衝　胸焮衝（肺　氣管　胸膜　假肺焮衝）
心藏大脉焮衝　横膈膜焮衝
腹膜焮衝（布蘊乙的私　腸間膜　網膜）產蓐熱
胃焮衝　腸焮衝
膵焮衝　肝焮衝（肝勞）
脾焮衝（脾勞）　腎焮衝（腎勞）
膀胱焮衝（膀胱勞）　子宮焮衝（子宮勞　頑硬腫　癌）
僂麻質（腰痛　胯痛）　聖京倔（聲嗄　常習）
羅斯（越禮的麻　剥脱　凍腫　初生兒）
藥方譜
卷三

第三編　瘡疹病

總論　痘瘡　牛痘（變性痘）

類痘（水痘　風痘　石痘）　麻疹

猩紅熱　羅度風屈

粟疹　打撲斑

蕁麻羅斯（越舍羅）　疱疹

帶羅斯　鵞口瘡

疥　癬

白屑風　頭瘡

面瘡　糾髮病

癩（白癜風　黑癜風　白癩　鱗狀癩　結節癩　赤癩）

魚鱗瘡　耶烏斯　必安斯

痒疹　類疥　酸液發疹

焮赤疹（汗疹）　皶赤皰（酒皶鼻　銅色顔）

肝斑　夏斑

母斑　痣　藥方譜

卷四

第四編　病機排泄

失血　壅滯
失血總論　衄血
口血　喀血
吐血　痔疾（血痔　粘液痔　盲痔）
尿血　崩漏
經閉
脫泄
下利（泄瀉　沕乙性　粘液性　膽液性　酸液　交血　肝崩）
乳糜利　食泄利
痢病（白痢　赤痢　善性　焮衝性　惡性　慢性）
霍亂　印度霍亂　尿崩
小便失禁　白帶下
遺精　尿閉
藥方譜
卷五
第五編　惡液病
勞瘵總論　神經勞
腰勞（脊髓勞）　小兒勞

肺勞（肺瘍　結核　氣管勞　粘液勞）

萎黃病　失茍爾陪苦口窩潰爛

物爾魯弗斑病　蒼身病

黃疸（膽石）　多脂

水腫（皮膚水腫　頭水　腦水　脊椎水腫　胸水　心囊水腫　腹水　子宮卵巢水腫）

鼓脹　腺病（瘰癧）

英吉利病　痛風

梅毒（淋疾　包皮陰頭焮衝　疳瘡　便毒　骨痛　骨腫　眼焮衝　咽喉潰瘍）

蟲病（圓蟲　蟯蟲　扁頭蟲　鏈蟲）

藥方譜

卷六

第六編　疼痛痙性病

疼痛病

頭痛　顏痛

齒痛　胃痙（嘈雜　心水）

疝（瓦私多利　膽液疝　粘液疝　風疝　蟲疝　鉛疝　植疝　聖京倔僂麻質疝　病毒轉徙疝　血疝　神經疝　依私的里疝）

成形器痙性病

嘔吐（胃覺機亢升　船暈）（惡阻　胃衰弱弛縱）

復嚼　痙喘（乾喘　濕喘）（容刺爾胸痙）

疫咳　華爾多般偓

心悸動

第七編　神經病感覺亢升擾亂痙搐症

依剌昆埵里　依私的里

通身強直　牙關緊急

癲癇　舞蹈病

幾里物爾修屈多　恐水

第八編　神經病觸器神經力抑頓衰弱症

卒中（鬱血　交感）　神經痱　半身不遂

秦漢呉　腰強直　失氣卒倒（溺死　縊死）（咽死　震死）

凍死

第九編　外神感覺盛衰病

晝盲　黒障

耳鳴錯聽耳聾

第十編　精神病

鬱憂病　癡呆

癲狂　頑愚
附録
夢中行歩　梦魔
藥方譜

[illegible]圖書

玉海擥要巻一

岡山　兒玉順順藏　編輯

熱病總論

病性　病如ッレ是多キ者有ルヿ無シ亦種類多ゾ終始諸病ヲ齊發ス故ニ證候千狀萬態。極メテ得難シトス蓋專ラ血管系ヲ侵ス所ノ病ニソ惡寒發熱シ脉駃疾。諸管旺盛シ血液疾動ソ分泌機變常ス

前候　或ハ遽ニ發ス多クハ長短時。疲倦懈惰情。意嬾慢。眠圧爽快ナラス嗜睡ソ四肢重ク項背拘強ソ欠伸

シ輕微ノ寒熱往来ソ面色慘悽。眼瞬罷勞シ小便濃濁。發汗ソ栗シ或ハ蒸氣鬱閉ソ口乾キ或ハ舌苔粘ク食欲虧テ腐敗味ヲ覺ユ

病證　寒慄（多寡輕重一ナラス）ソ膚理粟起シ皮豚凹ミ眼胞青輪ヲ畫シ肢體顫震。齒牙角戰シ脉微濇。（寒極ハ遅ニソ不齊）呼吸短促。小便蒼白。神氣懞朧タリ」凡ソ惡寒ハ或ハ總身或ハ一部ニソ灼熱ト變換シ或ハ（發熱セス或ハ惡寒セサル者アリ）瞥留熱ハ初起終期ニ發シ間歇熱ハ毎ニ恒復歸シ往来熱ハ寒戰ヲ以テ始ム○灼熱ハ初起頗ル局處ニソ和易。漸ク蔓延ソ劇甚。肌膚諸脉盈脹ソ頬顴漲紅。唇舌乾燥ソ渇シ小便火赤。脉數硬。苦煩。頭痛。感覺亢進ソ眼火閃發シ物響ヲ厭ヒ耳鳴ソ譫妄ス」熱退ケハ皮腠口舌軟潤シ小便雲翳ヲ見シ脉軟。呼吸條暢ニ。睡眠亦穏靜ナリ

經過　如ク是ニソ發汗。利尿。失血。吐下。津唾泛溢等ニ由テ分利シ熱多少速カニ去リ或ハ全終シ又ハ再發シ或ハ他病或ハ死亡ニ歸ス（良能ノ妙機健旺發揚スル者ハ舊痾ヲ驗除シ過強不齊ナル者ハ惡症ヲ將起ス熱ノ功害是ヲ以テ預メ決スヘシ）

病因　血管系病機刺衝（炎熱、沍寒、大氣害力、酷厲、饐餲ノ飲食、勞動、情欲等皆此ニ屬ス）又局處感動（劇痛、創傷、焮衝、潰瘍）通身ニ交感スル者ハ殊ニ然リ○凡ソ熱病ハ年紀。種屬稟賦ニ拘ハラスト雖モ老齡。粘液質。黒膽液質ニ較ブレハ概メ少壯。多血質。膽液質ヲ侵襲スル者居多。故ニ神經系殊ニ血管系ノ大感應機ヲ素因トス

區別　性態ニ本ツキテ實性熱（焮衝性熱）虛性熱トス○單純刺衝熱焮衝熱ハ血管系刺衝抗抵ノ強弱ニ由ルノミ（共ニ單純瞥留熱ニメ清涼法ヲ主トスレハナリ）○虛性熱ハ帝扶（テイヒユ）

私ス神經熱腐敗熱歇幾質舍（ヘキチセ）熱ニメ虛弱ヲ首性トス亦初起焮衝性ニメ神經系ニ累感ス故ニ聚成熱トス○腸胃熱聖京佷（シキンガ）熱僂麻質（レウマチ）熱瘖疹熱亦皆聚成熱ニメ其熱ハ固ヨリ一トス

帝扶私ニ係テ病證多少持續スルヲ瞥留熱トシ病勢進退スルヲ徃来熱トシ全ク起伏スルヲ間歇熱トス精論スレハ瞥留熱ニ非ス咸（ミナ）皆瞥留徃来熱トス亦同種ニ變ス（喩ヘハ間歇熱ノ瞥留徃来熱ニ於ルカ如シ）

又經過ニ急慢トシ病性ニ善惡トシ由来ニ越必（エピ）

傳染熱（英傳染熱或松剥刺地舎在散熱）トス

預後 排除ノ難易如何ハ原因ニ據リ烹熟分利ノ能否ハ熱性ト精力ニ本ツクベシ衰弱ノ老幼。過敏ノ人。妊婦産婦等ハ危嶮トス凡ソ初期ト急性ハ輕症モ慢過スルヿ勿レ況重症ヲヤ

治法 大率原因ヲ排除シ熱勢ヲ進退スルニ在リ（強弱ヲ抑揚ソ自然ニ委任スヘシ）各因。病證治スヘキ者有ト雖必ス本病ヲ主トソ諸藥ヲ配伍スヘシ（松多爾名人曰ク熱病ハ初期防焮法ニ利有リ益無キモ害無シト真然）○攝生ハ治策ト一ニシ中和清淨ノ大氣。稀薄ノ食物。緩和酸性ノ飲液ヲ必要トス（亦過度セシムルヿ勿レ）○吉利濟欠ルニ逢ハ良能ノ趨ク所ニ從ヒ病性。禀賦ニ應ソ策スヘシ（或ハ醫藥全ク無要ノ者アリ）

單純焮衝熱

病性 純粹ノ蓄留熱ニソ單純刺衝熱ハ其輕症トス一日熱ハ尤短ソ尤柔和ナリ

病證 多分俄發ス（或ハ僅ニ病使アリ）通例惡寒發熱シ（手觸ソ增加セス却テ和ナリ）脉實強。顔色盈赤。舌上白苔（或ハ淨赤、病初及ヒ輕症ハ滋

潤臭味減シ心下苦滿。噫ソ吐ス小便畜少。大便壅滯ス。總身毀傷セルカ如ク多クハ不寐。或ハ驚起シ動輒狂躁ス（重症ハ瀉血、本正ノ脂皮ヲ被ヘリ）

一日熱ハ一發作ヲ以テ一晝夜ニ分利シ或ハ啓圍ニ焮疹ヲ發ソ愈ユ（亦既ニ一二時ニソ消スル者アリ）延長熱ハ延テ三四日ニ至リ第一二、日等度ニ累減ソ一閱ス（通例病證トス）單純稽留熱ハ一日熱ノ劇盛ニソ留連スル者ヲ謂フ（其尤モ短キ者四日、重症ハ十四日ニ及フ）病證通例晚ニ進三朝ニ退ク（其他ハ究竟慢性十リ）

經過　七日九日ニソ分利ス誤テ發汗藥ヲ與フレハ神經熱。腐敗熱。內藏焮衝ヲ發ソ死ス○大都純症罕ニソ多ハ局發焮衝ヲ兼ネ聖京倔。僂麻質ヲ帶ヒ痢ト合シ皮疹ト併ス

病因　劇症ハ少壯多血ヲ素因トス冷氣冒觸。情意激發。起熱ノ飲食。動作。外傷等ヲ誘因トス

預後　純症ハ危カラス究竟內藏危嶮焮衝。壞疽。失血等ニ急死ヲ發ス

治法　防焮法ヲ主トス（諸脉ノ緊張ヲ弛ソ稠血ヲ稀クシ或ハ其量ヲ減スルニ在）

リ○輕症ハ防焮攝生（ノ三）ニソ足レリトス（通法ニ準ソ食量ヲ儉シ酸性液ヲ與ヘ居室ヲ清爽ニシ精神ヲ安静ニソ一切刺衝物ヲ排除スルニ在リ）植酸類屋施蔑爾（オッシーメル）（方蜂蜜三匁醋一匁煮テ適宜ノ稠ニ至ル○主治清涼稀釋祛痰○服量一匁二匁至）覆盆子汁、橙汁類（清涼滋潤防腐○一匁三匁至）酒石酸（清涼、右品ニ代用ス○一匁二匁至、水ニ化シ沙糖ヲ加ヘ佳美ノ飲液トス○亞爾加里土類、炭酸加里土、石灰、鉛製諸鹽、金屬酸化、石鹼、硫肝等伍用ヲ禁ス）ヲ水大麥水等ニ和ソ常飲醫藥トシ或ハ第一方ヲ與ヘ或ハ輕キ防焮法（清涼緩下劑、刺歇緬多）ヲ用フヘシ○劇症ハ瀉血ヲ主トシ中和（鹽類、第二三四方）清涼刺歇緬多（ラヘメト）（第五六方）腸胃汚物症ハ清涼下劑（第七八九方）ヲ用フヘシ○發汗ハ韃靼越黙窒（タルタエメチ）（八分氏、漸加半氏至、飲液ニ和用ス或ハ阿芙蓉等分ヲ加フ○發汗解凝）或ハ民垤列里（ミンデレリ）精（方硇砂華三匁醇精醋適宜右醋少許宛加ヘ飽充ソ毫モ滚動セサルニ至テ蒸餾水ヲ加ヘテ二十四匁トス○發汗解熱止渴○毎一時三十滴、六十滴至、接骨木花薄荷等ノ泡湯ニ點服ス○酸類、加里、炭酸亞爾加里、石灰水、土類、鹽類、金屬鹽ヲ忌ム）微温飲液（究竟微温浴、罨法）ヲ以テ和カニ進ムヘシ○衄血過甚ナラズハ鎮止ス可ラス○滋養ノ品。酒類ヲ慢用スルヿ勿レ

神經熱

病性　其熱專ラ神經系ヲ感動ス乃チ其不齊ノ刺衝及ヒ虛弱ニ在リ此ヲ以テ經過亦整齊ナラス（譫妄不寐昏睡ヲ特徵トス經過間、他證ハ變換スレ𪜈違動スルヿ無シ凡ソ因證明白ト雖モ乖戾ノ相合セサルヲ常徵トス喩ヘハ渴無クメ舌燥キ危嶮ニメ嗜好違ハス疼痛ノ因アレ𪜈患苦ヲ覺ザルハ覺機減衰ニメ口潤ヒテ大渴シ病些少ノ變化ニ大ニ驚怖シ不其病體寐メ疼痛發熱セサルハ亢盛ノ候トス）強弱（經過、疾徐、病證、劇易、覺機、盛衰）ニ從テ其名稱ヲ殊異ニス

急性神經熱　初起嫩衝性ニメ聖京傴僂麻質腸胃諸證ヲ併發シ經過間。神經性ヲ見ハス

前候　心身不安ニメ怯怖シ微惡寒メ勞倦シ脉微弱ハ或ハ嗜眠或ハ不寐或ハ鬱重或ハ時ニ爽快ナリ

病證　戰慄メ常温トナリ頭熱メ脚冷。脉細數（或ハ弱或ハ緊）（究竟虛實遲疾、定リ無シ）氣息苦煩。舌乾テ白ク尋テ赤ク振掉メ渴セス發汗或ハ僅少或ハ淋漓。小便或ハ清或ハ濁（惡症ハ平常ノ如シ）屢下利シ或ハ吐メ汚物無ク。無ヲ有トシ聞キ難キヲ聽キ精神騷擾（或ハ靜和或ハ暴戾）驚怯失意。寤覺メ眠リ抽掣強直。循衣理線。兩便失禁。究竟粟疹。紫斑ヲ發ス（大都此熱參差次序無キハ弛張熏熱分利ノ病證上ニ在リ）

經過　惡徵 搐搦卒厥。衰脫昏冒等進テ死ス○善徵 温汗

利尿（雲翳、鹽晶）重聽耳聾。耳腺焮腫。流涎粟疹等ヲ發シ究竟視力乏弱。臗股痛。麻痺。記臆罷弊等。多少陸續シ或、勞瘵水腫ヲ貽ス治癒都テ緩慢ナリ

病因　散在病ニ〆腐敗大氣汚穢。鬱升。情意抑壓。蒸氣閉塞ニ因リ他熱誤治ニ因ル（繼病）

傳染神經病　大氣居地ノ腐敗。饐餲。饑飽。軍旅等ニ因リ越必傳容ニ從テ焮衝。聖京偓瓦私多里感動。

皮疹病　赤斑疹、（粟疹）ヲ併發ス

慢性神經熱　經過緩慢ニ〆刺衝不齊。衰態ヲ見ハス

病證　寒熱微少。脉疾。微弱ニ〆不齊。勞倦。沈鬱。頭重疼痛。眩暈驚夢。舌潤淨（或、稀白ノ粘液ヲ被ヒ）小便稀澄或、黃濁。如是險證無〆危篤ニ進ム

經過　（惡徵）七八日諸證進ミ神器動亂（通例和易）〆太無力。舌燥裂。粘汗ヲ發シ或、水瀉シ遂ニ昏憒〆脉震ヒ或、遲ニ〆結促シ手足振掉〆冷ヘ爪色青ツ。鶩口瘡（青白）ヲ生ス罷極仰臥〆瘈證ヲ發シ十四日（十八日、二十日、究竟四五十日）ニ〆死ス○（善徵）二週後。口舌潤ヒ脉盈揚〆強。小便橙黃（晶垐）耳聾ヒテ流涎シ究竟鶩口瘡（焮腫）唇園ニ

疥性疹ヲ發ス**復常**神識鈍麻。毛髪脱落。脚浮腫ス

病因　資稟脆弱。敏甚。房勞。脱泄。精神怒張。冐寒。越必

傳容性。氣候變革。居室不良等ニ由ル

預後　危嶮ノ病トス惡性却テ平易ナリ○**危徵**專ラ脉度ニ在リ（不斷沈數ヲ倍シ）鄭聲。筋惕。呃逆。尿閉。下利。漏汗。內熱。外冷。或ハ起テ走ラントシ或ハ困臥ソ牀下ニ降ル

○**善徵**精力盈揚シ頭胸快暢。視力聲調。常態ニ近ツキ穏カニ眠ル等。蓋シ一證ニ拘リテ吉凶ヲ斷ス可ラス

治法　鎭運鎭痙衝動強壯劑ヲ主トス防焮藥ハ初起焮衝性經過ノ間。用フルノミ鎭運藥ハ第一方ニ宜（シ慢性ノ初期亦必用トス）**腦焮衝**ハ顳顬。耳後。項窩ニ蜞鍼。角法。冷罨法。腓蹠ニ芥子泥。脚湯。稀キ蘇魯林水（防腐淨潔）

（○蘇魯林水一匁半水七匁覆盆子舎利別一匁調和、毎一時ニ食匙）ヲ施スヘシ

下劑ハ戒愼ソ汚物アラハ衰弱ヲ恐ル、ヿ勿レ

吐劑第十十一方且ツ刺衝導泄發洩ス故ニ偉効アリ

神經藥ハ衰弱ノ多少。覺機ノ盛衰ニ從テ仔細ニ進退スヘシ○**亢盛症**（鎭運鎭痙藥ヲ主トス）**纈草**（第十二方發汗ノ性アリ擢用スヘシ○揮發衝動鎭痙發汗殺蟲）**龍腦**（第十三四五方神經系ヲ平均シ蒸氣ヲ發洩）

（ス○竄透衝動鎭痙發汗止痛消毒）**麝香**（第十六七方脉濇不齊、瘖瘆抑頓等○竄透衝動鎭痙發汗）**鹿琥精**（方鹿角精ヲ磁砕ニ内レ琥珀鹽少許宛加ヘ研和メ滚淬セサルヲ候トシ硝子壜ニ固封シ貯フ○鎭痙發汗○二十滴、六十滴至○加里酸類、酒石酸、鉄鹽ヲ忌ム）**阿芙蓉**（衝動止痛鎭痙催睡○四分瓦、一瓦至、頓服、分服、險症漸加十瓦、衝動半瓦、一瓦至、鎭痙催睡靜息麻醉一瓦、三瓦至）**或阿芙蓉丁幾**（方精製阿芙蓉二匁葡萄酒十六匁燒酒十五度者四匁右浸スヿ兩日濾過貯用、此液十滴ニ一瓦ヲ含メリ○十八滴至、慣用三十滴）分泌排泄ヲ妨ケ皮膚乾燥セハ浴湯或ハ四肢ニ蒸溻劑○**減衰症**（慢性晩期、衝動強壯藥ヲ主トス）**亞爾尼加**（衝動防腐解凝利尿發汗通經、花ハ揮發衝動、根ハ收濇止腐ノ効優レリ○第十九方）**攝爾扁答里亞**（衝動強壯發汗

防腐）**白芷**（香竄揮發衝動強壯發汗通經○第二十方）**稀酸類**（硫酸、鹽酸、消酸）**那布答類**（亞的爾、遏絶印亞的爾）**揮發羅倔鹽**（竄透衝動稀釋發汗○第二十一、二十二方）**燐**（金屬酸類同効、水適宜ニ化解ス○五滴、十五滴至）等**芥子泥**、**芫菁膏**（方越没里膏六匁烊化シ芫菁末一匁ヲ加テ煉和ス○越没里膏方阿利襪油五匁白蠟二匁文火ニ上セ烊化シ攪和メ軟膏トス）○**寒熱往来症** **幾那**（保固強壯收歛防腐）浸劑煎劑或ハ纈草ヲ伍用スヘシ第二十三方**下利** **大黃**（刺戟衝動收固強健○二四六瓦至、日ニ三四次）**舍電發謨白煎**（方鹿角屑蒸餅心各二匁水三北右煎熬メ二北ニ至リ沙糖半匁ヲ混和ス○滋養、胃弱暴瀉、失血虚憊ノ要藥トス）ニ赤酒ヲ加ヘ亞爾尼加**格綸僕**（保固強壯、

痢疾霍亂ニ殊効アリ○半匁、一匁至、浸煎劑或、百トシ八匁ノ液ヲ取リ或、桂橙皮等ヲ加ヘ用フ

藥煎汁（收濇防腐○散劑、十氐、二十氐至、浸劑、二錢沸湯六匁ニ浸シ毎一時一匙或、半錢ヲ米粥汁ニ和服ス）**明礬**（收斂○五氐、十氐至、毎一時用）**鹽酸鐵**（方 鉄屑三匁發烟消石精適宜右滴シ加テ文火ニ上セ溶化スルニ至リ仍水氣ヲ蒸散ノ鉄壺ニ內レ蓋封ノ漸ッ火ヲ增シ通紅ト為シ放冷ノ外鹽ヲ取リ速カニ硝子壜ニ收貯ス○收斂○水ニ溶シ毎半時五六滴）或、阿芙蓉ニ芳香品ヲ加ヘ的里亞加ヲ內外用シ又芳香浸劑ニ酒ヲ加ヘテ罨劑トス（下利ノ本條ヲ參看スヘシ）

漏汗 居室ヲ涼爽ニシ赤酒**硫酸酒精和劑**等

小便不利 **亞刺比亞護謨欒**（方 護謨一匁 温湯二匁、四匁或、水七匁ニ）阿芙蓉少許ヲ加ヘ或、刺歇緬多トシ或、軟化鎮痙罨法○**尿閉** 下體水腫ハ測胞子ヲ用フ

鵞口瘡 軟和蒸溺藥**蓬砂蜜**（方 一匁二匁至、蜂蜜或、舍利別一匁二匁調和ス○五十三方）第蘊魯林水。桑椹汁和用（本篇ヲ照看スヘシ）

耳腺腫 軟和或、衝動軟膏ヲ以テ化膿セシメ

耳聾 耳後ニ芫菁膏ヲ貼シ芳香蒸氣ヲ薰ス

攝生 長ク飲食ヲ稀薄ニセスノ強壯易化保固滋養ノ藥食（肉羹稀汁芳香品ニ卵黄ヲ和シ）ヲ與ヘ精神ヲ欣愉シ適意ニ散歩ノ復常ニ至ルヘシ（麥芽浴速ニ精力ヲ復ス）

〔傳染神經熱〕右ノ治法ニ準ス初起〔焮衝性聖京傴合併症〕緩性防焮法（清涼酸類、葵根煎ニ屋施蕿爾或ハ緩性鹽類ヲ加フ）泄下（清涼開達刺歇緬多）民埵列里精（或ハ硇砂）藾魯林水○〔焮衝重症〕（或ハ局發症）通局瀉血或者甘汞一二氏、（刺絡不當症、或ハ瀉後ニ用フ）○〔神經性時限〕（纈草、龍腦、亞爾尼加、藾魯林水、芫菁膏）○〔冷水灌法〕病初皮膚燥熱症ニ宜シ（滋潤及ヒ僂麻質合併症ニハ施スヿ勿レ）

〔預防〕空心冷體ニシテ長ク病室ニ居ラス（少許ノ酒ヲ飲ミ身温ヲ利トス）津唾ヲ嚥下セス不良ノ矮屋危篤ノ病者ニ對セハ醋ヲ布片ニ蘸シ口ニ當テ香臭ヲ嗅キ蕎煙ヲ吸ヒ橙皮泥菖丁香類ヲ對ミ既ニ去ラハ口鼻顔手ヲ洗ヒ衣服ヲ更フヘシ軍醫看者等。始終危地ニ居ル者ハ微温浴ニ醋ヲ和用シ臨臥淨衣ヲ換着スヘシ○〔傳染諸徵〕劇ク病像ニ感シ或ハ寒慄シ越列幾ノ衝擊ヲ覺ユ或ハ前候アル者ハ吐劑（吐後、酒、那布答類、稀硫酸）發汗劑。阿芙蓉。的里亞加〔托歇爾私散〕（方阿芙蓉吐根末各一刃覇王鹽二ヲ研和ス發汗聖藥○五氏、十一氏頓服）○芳香藥浸劑。温浴○或者冷水浴。洗滌。雪ヲ以テ摩スルヲ良トス

腐敗熱

病性　兩系（血管神經）衰弱シ血液溶崩スル熱病ニメ多クハ焮衝熱。膽液熱ノ繼病トス初起既ニ腐敗ニ走ク者ハ前候アリ（疲倦困重、譫妄、頭疼、食欲虧損、小便濃濁等）

病證　惡寒、發熱（手裏ニ徹ス）脉微數（後弱不齊）疲勞巨甚。眼昏重聽。夜間精神錯亂。面赤。頰顴鉛輪（或ハ汚垢）ヲ畫シ眼紅腫メ（或ハ硝子ノ如ク）外眥微ヤヽ下垂シ四支震動。鄭聲嘶嗄。舌上白苔。速カニ燥赤赭黒（或ハ滋潤）肉食ヲ嫌ヒ酸液ヲ好ミ心窩大ニ苦懣ス（瀉血粥狀、脂皮無ク亦溶渙ス）

經過　〔惡徵〕粘汗冷徹シ小便愈ヽ濁リ口舌唇齒赭色ニメ粘液ヲ被ヒ腹滿メ下利シ氣息。蒸氣。分泌諸液皆穢臭アリ失血（齦血、衄血、下血、尿血、血汗）斑條ヲ發シ（白赤速ニ青黒遂ニ壞疽トナル）極期。腦胸腹ニ焮衝諸證ヲ見ハシ蓐瘡ヲ生シ不斷戰慄メ呃逆シ或ハ胃管縮窄。尿閉。氣息不利。脉。精力共ニ虛脫シ仰臥メ齁鼾ス○〔善徵〕脉軟實。強。聲清。眼明。温汗。利尿（白色、結晶）若クハ下利。流涎。或ハ險極。粟疹。耳腺焮腫化膿ス（或ハ疥狀皮疹、血瘍ヲ發ス」）其發作次序無ク或ハ七日或ハ十四日（二十一日已上）ニメ分利シ四支麻痺。

水腫。聾盲。疼痛病。欠鐖。轉徙等ヲ貽後病トス

病因　急性及ヒ傳染神經熱ニ同シ（或ハ併發シ或ハ轉移ス）

預後　險易善惡亦皆然リ

治法　起因ヲ袪除ソ揮發保固防腐劑ヲ主トス（精力ヲ維持シ諸液ヲ整復スルニ在リ）大都神經熱ノ治法ヲ斟酌シ下劑必用症ハ答麻林度（清涼泄下○一弓、三弓至、煮テ八弓、十二弓ノ液ヲ取ル）（○第九方）酒石英（清涼解凝利尿○半弓、二弓至、泄下一弓、一弓半至、散劑和劑トス）等酸性ノ品ニ宜シ○初起先ヅ管系ノ刺衝ヲ抑制スヘシ輕症植酸重症鑛酸（第二十四方）收斂亞的爾（アーテル）（方硫酸燒酒三十度者各等分合和ス○二十滴、四十滴至、飲液點服○收斂防腐止渴○第二十五方）精力虛脫（脉埀）沈症越栗失爾赫篤里沃利（エリキシルヒットリオリ）（方收斂亞的爾四）（弓燒酒二十度者八弓桂薑各半弓右調和シ浸スヿ八日、濾過收貯○十滴、三十滴至、飲液二和服ス日ニ三四次○收斂衝動健胃）幾那煎第二十六方、（下症皆通用）二芳香藥ヲ伍用ス○溶崩諸症（第二十七方）○失血冷水。酒醋。明礬等。壓法（失血ノ條ニ出ツ）ヲ外用シ○腹滿或ハ下劑或ハ軟化鎭痙蒸溻劑。芫菁膏（壞疽ヲ生シ易シ）幾那加密列ニ酒醋。鎭痛液（ホフマン）ヲ加ヘテ刺戟緬多トシ罷極。冷溻法○蓐瘡屢臥置ヲ轉シ毛枕ヲ挾ミ燉赤底電（テイデン）愈創水。羅獨（ロード）

窊的爾（ワーテル）（燉衝條ニ出ス）【爛傷】雞子白。燒酒ノ塗藥。龍腦。鉛膏。

【壞疽】幾那。没藥煎（或末）ヲ施スヘシ（本條ヲ參考スヘシ）

【攝生】脂少キ肉羹稀汁ニ蔬菜橙汁。醋ヲ和用シ酸性果類ヲ與ヘ都テ清涼淨潔ヲ要トス

腸胃熱

病性 腸胃汚物ノ症狀ヲ併發ス（熱性或ハ此ヲ以テ起リ或ハ此ヲ以テ長ス）

前候 通例一二日疲倦頭疼。腰膝疼痛シ或ハ身重ク不寐ソ梦魔ニ困ミ朝タニ苦味ヲ覺エ惡心ソ食ヲ嫌ヒ心窩壓迫シ舌上汚苔。惡臭ヲ吐ク

病證 惡寒灼熱。脉浮（燉衝ヲ兼サル者ハ遲ニソ不齊）大渴ソ小便嗇少稠濁。頭劇痛ソ苦悶シ（由來ヲ心窩ニ取ル）諸證夜ヲ徹ソ張リ朝タニ弛ミ口舌速カニ粘苔ヲ被ヒ（白、黄、赭黒、腐苦、酸味ヲ生ス）噫ソ膽液。粘液或ハ饐餲ノ殘餘ヲ吐シ大便壅滯（或ハ數囬下利ソ輕快セス）皮膚或ハ燥キ或ハ濕ヒ季肋心窩實滿シ呻吟大息ソ些少ノ因ニ震戰ス

經過 【惡徵】或ハ自棄。或ハ誤治。或ハ越必傳容性ニソ發作次序無ク內熱ソ脉度不齊。上腹（一方）劇痛。下腹硬滿シ

神器錯亂ソ手震ヒ呃逆。尿閉（瘂性）大便努責シ撮空摸牀。罷極。昏暈シ泄物臭穢。汚斑（或ハ赤色或ハ鉛色）粟疹ヲ發シ讝口瘡ヲ生シ神經熱。腐敗熱ニ轉ソ死ス○**善徴**汚物停滞。忿怒等ニ發ソ速カニ排除シ或諸液増損。漸ッ整復ソ烹熱シ吐下ソ諸證休歇シ脉舒暢。皮膚口舌軟潤シ數發汗利尿シ唇邊㾦疹ヲ生ス○**汚物分利**舌苔消シ惡心ソ津唾湧出シ吐意ニ苦三四末微冷。頭痛耳鳴。下唇震ヒ煩懣スルハ**上湧**ノ候トス腰膝重ク脉結代腹滿ソ風氣ヲ洩シ腹痛ノ稀薄酷厲物ヲ通利スルハ**下注**トス

區別　膽液熱。粘液熱ノ二種トス（汚物ニ從フ亦夾雜症アリ）

膽液熱　口苦舌黄。膽液ヲ吐下シ小便撒腹蘭（サフラン）色ニメ皮膚亦黄ナリ此熱㾦衝性居多（オホシ）（其證脉實強内熱灼カ如ク渇消ス可ラス）又神經性腐敗性アリ（熱勢腐敗熱ニ比スレハ烈シ）

粘液熱　口舌膠粘液ヲ被ヒ（無味ニメ絲ニ引ヘシ）心下滿。食欲無ク風氣ヲ發洩シ粘液ヲ吐下シ小便稀澄（亦溷濁メ乳汁ノ如シ）大ニ慢性神經熱ニ類シ脉弱ニメ結代ス（粘液狀進テ罷弊シ要部ニ瀦留スル者ハ死ス）獨リ良能力（吐下、發汗）ニ由テ

分利スルノ三熱後慢性トナリ化食機ヲ妨ケ諸蟲ヲ生シ肺病ヲ貽シ惡液質（水腫、勞熱）ニ轉ス

病因　化食機ヲ妨ル諸件（胃腸鬱滯、難化饐餲、情意感動、靜坐安逸、）越必傳容病性。寒暄大變。霖雨濕霧。解凝吐下劑誤用ニ因ル○〔膽液熱〕　膽液質。忿怒苦心。濛氣熱蒸。傳染毒等。其焮衝性ハ冬春流行病性。夏時勞動。焦思羈旅等。其腐敗性ハ夏秋汚物升騰。饑饉餒食○〔粘液熱〕　濕寒ノ時令。不良ノ食飲等ニ因ル

預後　單性ニメ傳染セサル者（殊ニ膽液熱）ハ危カラス

然レ𪜈速カニ或發汗。或發疹ソ下劑効ヲ得ルヿ寡キ者ハ神經性。腐敗性ニ轉シ焮衝性ハ急性水腫。寒壞疽ニ移リ偶、轉徙化膿スル者モ亦死ス○粘液熱ハ毎常（ツネニ）危殆ナラスト雖モ慢性ニソ治シ難シトス

治法　遠因若ツハ内藏ノ症狀。熱性ニ注意ソ汚物ヲ動發シ其機既ニ滿盛ナルニ及シテ排除スルニ在リ」

先ツ少量ノ〔芒消〕（解凝稀釋發汗利尿一匁、四匁至、泄下半匁、一匁○加里、鹽酸加里、醋酸加里、炭酸加里、消酸加里、石灰水、鹽酸加爾幾、鹽酸重土ヲ忌ム消酸銀、消酸汞、醋酸鉛、醋酸汞亦伍ス可ラス）ヲ屋施茂爾（オツセメルル）ニ和用シ韃靼越黙窒（少量）〔孚鹼酒

【石】（解凝稀釋緩下○半匁、一匁至為ニ溶劑○神氣抑鬱ノ良藥○山酸、植酸、麻倔涅失亞、重土、石灰皆此鹽ヲ分析ス）亦良緩下ヲ要セハ第一方。硇砂若ハ屋施篾爾ヲ飲液ニ和ソ數與ヘシ（殊ニ粘液熱ニ適當トス）【上湧症】吐劑（貌僂屈、既患吐血、呼吸不利、胃過敏、妊婦、耆老、弱兒等ノ禁策ニ拘ハル丁勿レ○吐後加容列泡劑ヲ與ヘシ）【下注症】（【下劑液狀】苔麻林度、酒石英、芒消清涼劑ヲ適當トス）【膽】槪ノ熱ノ休歇時ニ用ヘシ○【覺動兩機亢升症】（膽液口內ヲ刺衝シ排泄巨甚ナル者）碎雀麥【沙列甫】（緩和滋養○末一匁、水少許ニ飽熟セシメ沸湯八匁或ハ十匁ヲ攪和ス○每半時、一時用ニ一食匙）亞刺比亞護謨。鹿角ニ植酸類ヲ饒多ニ加ヘテ飲液トシ又油劑（阿利襪油、亞麻仁油、甘扁桃油）ヲ與ヘ【嘔吐過甚】粟歇禮飲（第二十八方）【痙性】加容列浸（強壯驅風鎮痙發汗通經○浸六匁、一匁至取八匁十二匁液）【下利】粘滑刺歇緬多（危急症ハ阿芙蓉液ヲ內外用ス○溫和蒸溜劑ニ加ヘ胃部ニ罨蓋ス）【嫰衝】通局瀉血【硇砂揮發膏】（方硇砂精一匁阿利襪油四匁混和ス○分散疏釋止痛鎮痙導泄）【芫菁膏】（方黃蠟八匁松香諸各四匁家猪脂三匁溶和放冷ノ芫菁八匁ヲ混和ス）脚湯。手湯。全身浴【胃過敏】（內服藥ニ堪サル症）唯此外用方ノ三ニメ効ヲ得ル者居多（汚物殘留症ハ滿那、苔麻林度ヲ大麥煮汁ニ溶シ或ハ亞刺比亞護謨漿ニ芒消ヲ和用ス）

【肝胃腸病機刺衝】（通症）ハ鎮運酸性藥（嫰衝熱條植酸諸方）【大熱】

頭痛ハ清涼開達刺歇緬多（汐乙等○泄後仍熱アル者ハ硫酸ヲ冷水ニ和用ス）**終期**發汗藥（少量ノ韃靼越黙窒、接骨木花浸、民埊列里精或ハ屋施茂爾和用）**衰弱**第二十九方。其他苦味保固藥（幾那）ニ宜シ（最初大黄少許ヲ加フヘシ）**焮衝性**刺絡（後直チニ嘔吐ヲ發ス）季肋邊腫脹熱痛筑動スル者ハ蜞鍼角法。罨劑。軟膏ニ清涼解凝藥ヲ兼用シ（焮衝ヲ抑制〆本治法ヲ施ス）**腐敗性**汚物アル者ハ早免吐下劑（荅麻林度、酒石）**終期**鑛酸（病初ハ害アリ○餘ハ腐敗熱ニ準ス）**粘液熱** **硇砂**（衝動解凝疏釋○五氏、二十氏至、每一時、一時半、丸劑溶劑トシ又一ʒ、三ʒ至、和劑六ʒ、八ʒ至ニ混シ度碌布ヲ加ヘ每次一食匙ヲ用フ○硫酸、消酸加里、炭酸加里、石灰水、明

礬、蓬砂、鉛糖、水銀、剝篤亞斯、曹達、消酸銀其他鹽酸、酸化鑛鹽等ヲ忌ム）等解凝劑ヲ以テ膠粘液ヲ融釋スルニ在リ亦吐劑ニ宜シ（下利無キ者ハ吐酒石ヲ優レリトス）其間**茆根**（清涼稀釋清血利尿○半ʒ、二ʒ至、水煎或ハ伍劑トス）**蒲公英**（解凝稀釋○根一ʒ煎〆六ʒ液ヲ取ル新搾汁一ʒ、二ʒ至）煎劑或、亞爾尼加花浸（一ʒ、半ʒヲ浸テ六ʒ、八ʒノ液ヲ取ル）ニ硇砂ヲ加ヘ其他解凝劑（韃靼越黙窒）ヲ用フ○**腸内粘液**ハ大黄ニ硇砂（或ハ麻倔涅失亞）ヲ加ヘ亦刺歇緬多ヲ施スヘシ○**衰弱**巨**甚症**ハ苦味保固藥ニ兼テ粘液稀釋劑**遠志**（解凝祛痰衝動發汗利尿○浸一ʒ半ʒ取八ʒ十ʒ液）**麻爾羅歇**（解凝稀粘○半刄、一ʒ、煎浸劑トス）

亞爾尼加ヲ單用シ或ハ硇砂金硫黃（發汗祛痰解凝）（○丸散トシ毎一時、一時半、四分瓦、二瓦至、少長ニ從フ○酸類、酸化鹽、亞爾加里、炭酸亞爾加里、銕劑、含單寧諸品ヲ忌ム）ヲ加ヘ用フヘシ慢性神經熱ノ如キハ其治則ニ準ス

發黃熱一名西印度熱

病性　初起焮衝性ニソ頗ル膽液性腐敗熱ニ似タリ特皮膚ノ黃ト吐物ノ黑キヲ以テ異トス熱國ハ緩ニソ寒地ハ劇ク且ツ傳染ス

病證　三限トス第一限輕症心窩（右側）壓迫シ體痛嘔逆惡寒ソ熱シ眼淚滲テ焮赤ス重症戰慄ソ壯熱シ脉實數大渴煩悶顏紅目赤（焮衝性）概ソ胃ノ覺機非常ナルヲ通證トス（少ク按スモ劇痛ス宛モ火傷創傷アルカ如シ）嘔ソ綠色ノ穢物ヲ吐シ大便頑秘小便火赤或ハ（極黃）舌上粘苔。眼光異常。沈垂脱力多クハ不寐亦昏睡ス第二限第三二日眼白口角發黃シ速カニ總身ニ瀰亘シ脉沈細面色鉛ノ如ク舌裂黃苔或ハ自ラ衰頹ヲ知リ或ハ凝呆狂躁遂ニ深睡仰卧摸牀搐搦ソ恐水病ノ如シ第三限第五七日衰弱倍〻進ミ覺機愈〻加リ黑物ヲ

吐シ屎尿瀝青ノ如ク失血。發斑。壞疽ニ轉シ脉結促。冷汗ヲ發シ疼痛歇ミ百事ヲ辨シ飲食〆死ス

經過　通例七八日。短キ者ハ二日ニ〆死ス（第一限焮衝セサル者ハ延テ十四日ニ至ル）輕症ト雖モ復常慢カナリ諸證退キ脉強實。發汗。唇圓焮疹衄血ヲ發スルハ佳徵トス

病因　熱國鬱外ノ風土病ニ〆盛夏ニ暴行シ河海瀕岸ニ居多（オホシ）他方亦之ニ準ス

預後　男子壯健肥胖。及ヒ中和地方ノ人。肉食豪飲。炎天勞力。冷夜倦臥スル者ハ速カニ〆死ス

治法　越必埵密性ニ從フヘシ焮衝性ハ刺絡〆（第三日後ハ行フ勿レ）軟和清涼刺歇緬多ヲ施シ全發症ハ緩下劑（答麻林度、酒石英、加羅蔑爾等）ニ宜シ（傳染後ハ吐劑ニ利アリ）○胸下苦悶嘔吐ハ粘滑飲液。加容列。薄荷（揮發鎮痙健胃驅風通經○浸半匁一匁至取六匁八匁液）匁浸劑。栗歇禮飲。格綸僕。麝香。阿芙蓉等。徵温浴ヲ稱用ス又冷水灌法ヲ施ス（傳染神經熱ノ如シ）脫力腐敗症ハ幾那殊ニ硫酸規尼涅（キナエン）（解熱○少長ト病性ニ從ヒ小兒ハ四瓦、六瓦至、一日量トシ毎服四分瓦、半瓦至、大人ハ毎一時二三瓦至、沙糖、麻倔涅失亞ニ研和〆散劑トシ或ハ度碌布或ハ糊丸トシ或ハ香竄品ヲ加フ或ハ四八瓦ヲ乳糖ニ和〆齒齦ニ塗リ或ハ鎮痛液ニ和

シ心窩ニ塗擦ソ小兒服藥セサル者ニ稱用ス偉又十瓜至ヲ蠟膏ニ和ソ英垤爾麻扶私トス

効アリ亦攝扁答。酒。酸性飲液等ヲ用フヘシ

傳染疫

病性　初起焮衝熱多クハ神經熱腐敗熱ニ轉シ鼠蹊。腋腺焮衝シ皮斑ヲ發ソ速カニ壞疽トナル

病證　病初數ゞ昏冒シ精神ヲ妨ケレ氐脉變セス或ハ焮衝熱ニ似テ速カニ罷極ニ至ル多クハ初起鬱悒痞悶ソ面色瘦削シ眼目血赤。下體惡寒シ脉數弱。遂ニ微ニソ結代シ肌膚燬クカ如ク大渴引飲（自ラ水中ニ投セント欲ス）狂躁搐搦腹。肚劇痛ソ黑血ヲ下利シ紫斑ヲ發ス」第三四日。疫腫ヲ發ソ蚤咬ノ如ク或ハ小皰ヲ成シ（底面紫黑）或ハ瘍頂ニ赤疱ヲ發シ速カニ結痂ソ兇險ニ進ム（或ハ死徵トス」）腺腫ハ多分吉利濟ニソ通例第八日（或ハ第十四日）ニ分利ス」速カニ消シ或ハ硬成スル者ハ水腫ヲ發シ重症ハ壞疽ニ轉ス（或ハ一二日或ハ七日已上ニソ斃ル）

病因　傳染毒ニソ大都炎熱濕霧ノ沿海ニ流行シ大氣ニ因ル者寡クソ相觸ニ多シ患者ノ強弱老少

ノ多少ハ越必傳染性ニ由ル殊ニ怯怖ノ性。能ク傳染ス又病後經久膿瘍一掃スル者アリ

預後　暴戾ニ〆（或ハ善性アリ）肥笨多血ハ瘦瘠多液ヨリハ危シトス亦善徵ニ〆死シ劇症ニ〆藾ス

治法　預防法（神經熱條）殊ニ無畏ヲ一大肝要トス發汗〆傳染ヲ防キ又阿利襪油ヲ塗テ良◯熱性ニ從テ取捨シ藾魯林水ヲ内外用スヘシ

間歇熱

病性　一個ノ熱病ニ〆其發作暫留熱ノ一短病像トス唯發歇ノ定序ヲ異トスルノ三

前候　四肢倦重。動ハ汗出ツ常事疎嬾。不寐困夢。項背惡寒、拘強。心窩壓重實滿。或ハ酸苦。或ハ淡薄。或ハ鑛味ヲ覺エ口舌燥渴。大小便違常。既患ノ部位（創傷等）疼痛ス（蓋シ散發ト秋熱ニ居多）◯發作ヲ三限トス

病證　〔第一限〕惡寒〆欠伸シ速カニ戰慄〆疲倦シ（四支毀傷スルカ如シ）肢體震ヒ齒牙戰ヒ皮膚爪唇蒼青。脉緊ニ〆不齊。嘔噦〆吐シ呼吸屈小。小便水ノ如シ蓋シ

熱性ニ從テ長短アリ通例四分時。全時ニ至ル**第二限**發熱。頭頸ヨリソ渾身ニ布達シ唇舌燥熱。脉疾實。呼吸舒暢ソ洪數トナリ大渇ソ神器錯亂シ（眼火閃發、耳鳴、譫妄ノ如シ）一二時留連ス**第三限**肘。腋。鼠蹊。頸。掌。初テ潤ヒ温汗（酸臭）ヲ發シ脉軟ニソ整ヒ小便飽充シ（沈澱結晶）或、吐下（或、失血）シ是ニ於テ安眠ソ一関ス

經過 毎恒如是ナラス初起或、發熱セズ或、惡寒却テ熱ニ次（ツ）キ或、發汗セスソ惡寒ヲ以テ終ル

區別 帝扶私（テイヒユス）ニ由テ日發熱。間日熱。三日熱トス亦數日。數月ヲ經（ヘ）テ復歸スル者アリ

日發熱 朝（ダ）ニ發ソ午後ニ終（ハ）リ惡寒穩（カ）ニソ短ク熱勢強カラスソ長シ粘液性ニソ秋冬雨濕涼冷ノ氣候ニ流行シ經過緩慢ナリ

間日熱 隔日午後ニ發シ戰慄ソ燥熱ス膽液性ハ吐下ソ分利シ（第三四發作ニソ唇邊疱疹ヲ發スル者ハ第七發作ヲ以テ愈ユ）此熱春時ヲ常トス（亦治シ易シ）秋時ニソ健者ハ能（ッ）他熱（日發、瞀留、重複諸熱）ニ轉シ亦再感シ易シ

三日熱 晩ニ發ソ夜ヲ徹シ寒熱俱ニ穩（カ）ニソ長

ク（亦劇症アリ）其性頑固ナリ或ハ神經病等ヲ治スト雖モ

亦能ク惡液諸病ヲ發ス○又重複熱アリ其分利前。

單症トナリ能ク瞀留熱ニ轉ス○腸胃性。焮衝性ノ

合併症アリ又神經性アリ〔惡性間歇熱〕ト名ツク

昏睡。卒中。痙攣ヲ兼發シ第二三發作ニシテ死ス○

又局發感動（頭痛、齒痛、疝痛、眼焮衝等）其熱不明ナレ𪜈病證定

時ニ發歇スル者アリ〔變形間歇熱〕ト名ツク

病因　化食器。特異ニ太陽叢ノ病機刺衝ヲ素因ト

シ英傳溶性（エンデミ）（沼池沮澤地方）越必傳溶性（エピデミ）。重滯難化（粗鹵粘膩ノ食）

物易敗ノ魚類。腐敗ノ膽液。蟲病。冷氣冒觸。內藏壅塞。七

情感動。皮疹內陷等ヲ誘因トス（或云ッ傳染スル者アリト）

預後　純症ハ歸終良正ナリ〔經久〕〔常習〕ハ治シ難ク

亦能ク再感シ或ハ衰弱或ハ瞀留熱。瘧母。內藏慢性焮衝。

化膿。黃疸。水腫。勞瘵。疥性病。神經病等ニ轉ス

間歇熱ノ發作時刻ヲ合シテ瞀留熱ト比較セハ經過。

歸終。同致ニシテ變化一定スベシ帝扶私（チフス）嚴固ナレ

ハ持久シ後先進退スレハ速カニ分利シ（大ニ前跳スレハ重

複瞀留ニ）春熱ハ秋熱ヨリハ治シ易ク〔蠻養熱〕ハ三日

熱ニソ治シ難シ○**再感**間日熱ハ七日後。三日熱。日發熱ハ十四日ニ終リノ發作ト時刻ヲ同ジス

治法　大都遠因。通性。聚成ニ注意ソ發作時刻ニ著眼スルヿ勿レ故ニ少焉良能ニ委ス可キカ又ハ何等ノ法方ニ處ス可キカヲ決セズハ有ル可ラス

善性　專ラ靜養將息ソ發作前。羼生（停食等）ヲ愼三惡寒ノ間。暖衣ソ加密列浸（少量）ヲ温用シ瓦私多里狀ヲ併發ソ吐ニ傾カハ微温湯ヲ多服セシメ發熱セハ被衾ヲ薄クソ酸性ノ飲液ヲ與ヘ能ク被覆ソ快ク

發汗セシメ必ス起熱藥ヲ以テ攻ルヿ勿レ亦涼ヲ取ルヿ勿レ發作後。居室ヲ洞開メ蓄氣ヲ淨掃スベシ○**腸胃汚物**ハ解凝劑ヲ以テ動發メ吐下劑ヲ與ヘ**腹藏壅塞**ハ磠砂。孕鹸酒石。金硫黄。甘湏。解凝苦味藥（多血家ハ刺絡）**焮衝狀**ハ粟歇禮飲。磠砂ヲ以テ疏釋抑制スヘシ○發作三四ニソ治策ノ功績分明ナラズ或ハ有利病ニ非サル者ハ特効驅熱藥ヲ撰用スベシ乃チ單苦味藥**龍膽**（保固強壯健胃○散劑一刄、二刄至、日ニ一二次、浸劑、酒劑半弖、一弖至、取ニハ弖十二弖液每一時一食匙）**睡菜**（強壯健胃稀粘○越幾斯半弖、一弖、煎劑）

（一ゟ加水十二ゟ外用）**葛爾儒別涅實**（保固強壯發汗解凝利尿○散劑二刄、三刄至、煎浸一ゟ、取八ゟ液）香竄苦味藥**泥菖根**（衝動強壯溫暖驅風○散劑半ゟ、一ゟ至、浸劑半ゟ取四ゟ、六ゟ液）**亞爾鮮葉**（竄透解凝驅熱健胃○越幾斯一刄、一ゟ至、煎浸半ゟ、一ゟ至、取六ゟ八ゟ液）等。加宻列（鎮運）又苦味拔爾撒謨性收濇藥**楊皮**（收斂防腐○散劑每一時或ハ一時半、一刄、半ゟ至、煎劑一ゟ、四ゟ至、取八ゟ、二十四ゟ液每一時用一匙）**七葉樹皮**（楊皮同効○散劑二ゟ、半ゟ至、煎一ゟ三ゟ至、取八ゟ十六ゟ液加稀硫酸一ゟ二ゟ至為加酸煎）**水楊梅根**（香竄收斂強壯解熱○煎半ゟ一ゟ至、取六ゟ八ゟ液或ハ為散○扶歇蘭度貧寠ノ解熱藥トス）秀偉ノ品ハ幾那ニ〆散劑ヲ尤モ良トス硫酸規尼涅（八氏、十二氏至）ハ防熱ノ効力尤モ居

多。胃弱家ハ桂。香竄水。酒ヲ以テ與ヘ日發熱。間日熱ハ半ゟ一ゟ至。三日熱ハ二ゟ半ゟ。二ゟ至二分服ス（服シ得サル者ハ浸煎劑トシ健胃驅熱藥ヲ加ヘ或ハ舐藥トシ用フ）驅熱藥ト稱スル者。固症狀ニ從テ用フ可ト雖モ幾那類ノ効力ニ比スベキ者無シ乃チ揮發衝動香竄辛辣ノ（品實百爾油、加耶布的油、龍腦、纈草等、胡椒、亞爾尼加、白屈菜、芥子等、阿魏鑛酸）類。明礬。硫酸銕。硇鉄華。蒼鉛製劑。硇砂。金硫黄。韃靼越黙窒（少量或ハ湏劑。良藥アリ何ソ甘ン〆吐根砒危禍ヲ招ク可ンヤ吐下劑發作前ニ用ヒテ反對刺衝ニ由テ防過スル者居多）等ノ如シ又外用方ハ香

竄浴。吐酒石膏方（吐酒石一匁二匁至蠟膏或ハ 家猪脂一匁煉和シ蠶豆或ハ胡桃）

子大ヲ取リ皮膚ニ塗擦ス或ハ芫菁膏。胡蒜手關節

ルヿ日ニ二三次○胃部少腹ニ敷ス

四支結縛等ノ如シ○又精神感動（喜怒愛欲）神水符咒

ヲ以テ神經質ヲ變調メ抑頓スル者間〻之有リ

頑固症 内藏壅塞ハ右ノ解凝劑或ハ**阿魏**（衝動鎮痙解凝殺蟲通經○十瓦、三十瓦已上、丸劑或ハ乳劑トス）**失鳩答**（麻醉刺戟分解○越幾斯二瓦、二十瓦至、外用一匁、四匁至、琶布、蒸滊劑トス）**莨菪**（麻醉鎮痙解凝○越幾斯日ニ一瓦、四瓦至、葉半匁、一匁、沸湯十匁ニ浸シ毎朝ニ匙ヲ用ヒ漸〻加テ瞑眩ニ至ル根末ハ其効峻ナリ）**雙鸞菊**（麻醉鎮痛發汗利尿○越幾斯二瓦十瓦已上亦爲煎散劑）亞爾尼加花 **白屈菜**（解凝利尿○散劑半匁、一匁、亦煎劑酒劑トス越幾斯二匁至頓服）湏膏擦法。開達刺戟

緬多等ヲ用ヒ幾那ヲ以テ全効ヲ収ムヘシ

神經質衰弱刺衝 幾那ニ加容列。阿芙蓉（多量）ヲ伍用シ其他莨菪。神經劑。強壯劑。鉄劑ニ宜シ

常習症 發作前幾那。阿芙蓉。亦吐劑。精神感動。並ニ外用方。大氣變換。殊効アリ

惡性 亦幾那。阿芙蓉（發作前）浴湯。罨法。刺歇緬多兼用。芫菁膏。芥子泥。強性神經劑

再感 感冒。停滯。無要ノ排泄等ニ用意シ苦味保

固藥ヲ持長シ用テ防禦スヘシ

貽後病 各性ニ從テ施療シ（喩ヘハ壅塞ノ解凝諸剤ニ於ルカ如シ）藥驗無キ者ハ中和鹽ヲ以テ排泄シ番木鼈越幾斯（麻酔鎮痙催睡○水製二瓦、十瓦至、散末三瓦、十五瓦至）茛菪等ヲ與ヘシ（或、同病ノ患者ト同臥セシムヘシ）

玉海擘要巻一終

藥方譜

第一方

酒石鹽一ʒ

蒸餾醋（適宜飽充為㆑度）

水四ʒ

屋施蔑爾（オツシメル）（或栗鷺子舍利別）一ʒ

右調和每㆓一時二時至㆒用㆓一二食匙㆒

第二方

淨消石二ʒ三ʒ至

水五ʒ

屋施蔑爾一ʒ

右溶和加屋旋蔑爾每一時二時至用一食匙

第三方

淨消石　製造蝲蛄石（或沙糖）各半刄或一刄

右研和為散分為十六包每二時用一包

第四方

酒石英半ろ　淨消石半刄

右研和為散分為十六包每二時用一包

第五方

雀麥煮汁（剥皮者）六弓　蒸餾醋二弓

右調和為刺歇緬多

第六方

大麥煮汁或乳清加酒石英者四弓

淨消石一ろ　屋旋蔑爾一弓

右調和為刺歇緬多

第七方

芒消或瀉利鹽一弓　水八弓

栗蹩子舍利別一弓

右溶和加舍利別每一時二時至用一小骨布至得

大便通利

第八方

芒消一ろ　滿那加剌甫里産六ろ

水八ろ

右溶和每一時二時至用一小骨布至得通利

第九方

荅麻林度二ろ　乳清六ろ

右調匀每一時二時至與一小骨布至得通利

第十甲方

乙百加格安那根末半刃

右分為三包每四分時用一包至得吐

第十乙方

乙百加格安那一刃　韃靼越黙蟄一氏

右研和為散一頓服

第十一甲方

韃靼越黙蟄三氏　水一ろ半

右溶化每四分時用一食匙至得吐

第十一乙方

韃靼越黙蟄 一夂　小麥粉 一刄

右研和為散頓服

第十二方

纈草 半丂或六丂　橙皮舎利別 六丂

右浸漬沸湯六丂濾過加舎利別每一時二時至用一食匙

第十三方

龍腦 一夂三夂至　沙糖 半刄

右研和為散分為十六包每二時用一包

第十四方

龍腦 十五夂至半丂　亞刺比亞護謨

沙糖 各一丂　接骨木花水 或薄荷水 六丂

右調和為乳劑每二時服一食匙

第十五方

龍腦 半刄　亞的爾 或忽弗滿鎮痛液 半丂

右溶化每半時一時二時至用十五滴二十滴至

第十六方

麝香 好品 二四夂半刄至　沙糖 半刄

右研和為散分為八包每二時用一包

第十七方

麝香（上好）（半ヲ一ヲ至）　沙糖（二ヲ）

右精細研末化解薔薇露水八ヲ每二時與一食匙

第十八方

阿芙蓉（精製者）（一氏）　沙糖（半刄）

右研和為散臨臥頓服或他法用

第十九方

亞爾尼加（アルニカ）花（二ヲ半ヲ至）

右浸沸湯八ヲ濾過每一時二時至用一食匙

第二十方

攝爾扁答（セルペンタ）根或白芷（半ヲ六ヲ至）

右浸沸湯六ヲ濾過加忽弗滿（ホフマン）鎮痛液或亞的爾一ヲ或一ヲ半每一時二時至用一食匙

第二十一方

桂水（六ヲ）　鹿角揮發鹽（一ヲ二ヲ至）

桂舍利別（半ヲ）

右調和每時與一食匙

第二十二方

薄荷水 六ヲ 鹿角精 二ヲ

右調和每時用二一食匙一

第二十三方

幾那上好 一ヲ 攝爾扁荅根 半ヲ

橙皮舍利別 一ヲ

右幾那為二浸劑或煎劑一取二其液八ヲ一浸二攝爾扁荅根一濾過加二舍利別一每時與二一二食匙一

第二十四方

緑礬精 三ヲ 栗蹩子舍利別 三ヲ

右調和加レ水為二酸性飲液一頻〻用二一茶匙一

第二十五方

栗蹩子水 六ヲ 收斂亞的爾 一ヲ（一ヲ半至）

栗蹩子舍利別 六ヲ

右調和每二時用二一食匙一

第二十六方

幾那 三ヲ

右浸煎適宜取二一比液一加二緑礬精一ヲ半二ヲ至一每

二時用半小骨布

第二十七方

桂水八ʒ　幾那越幾斯劑半ʒ

明礬生一ʒ二ʒ至　榲桲舎利別一ʒ

右調匀每一時二時至與二食匙

第二十八方

亞爾鯡（アルセム）鹽四刄　沙糖二ʒ　水四ʒ

右溶和加桂水二ʒ每半時用三食匙臨用加新搾橙汁一食匙

第二十九方

葛爾儒別涅實越幾斯（カルドベネザエキス）二ʒ　薄荷水四ʒ

右溶和用一食匙日四回

二時用半小骨布

第二十七方

桂水八ヲ　幾那越幾斯劑半ヲ

明礬生一ヲ二ヲ至　榲桲舍利別一ヲ

右調勻毎一時二時至與二食匙

第二十八方

亞爾鮮（アルセム）鹽四刄　沙糖二ヲ　水四ヲ

右溶和加桂水二ヲ毎半時用三食匙臨用加新搾

兒玉順藏　藏版

安政六年己未初冬稟准刊行