明治十二年二月廿二日始
六月廿四日終
同

Topographische Anatomie des Halses

保西區兒童民立校

局處解剖學

頸部論

K209
F 2
キ-51

慶應義塾大学医学情報センター
昭和 47. 年 7. 月 11 日
富士川文庫
2552

491.1
Ky-1
2

No. 2854
12 K 209





之レ頸椎ノ彎突起ニ及ヘハ其ノ上ニ於テハ橈円形ヲナシ上方ニカケテハ其長径前後ニ位シ下方ニカケテハ其長径左右ニ位ス頸椎ノ頸部ノ測量ヲ上中位ニテハ前後ニ位方ニテハ故ニ左右ニ其右方ヨリモ敷衍シ而メ其右方ニ存スル前後ノ径ハ右ノ如ク其左右方ヨリモ前方ニ存スルモノハ生活ノ間ニ於テ免ルヘカラサル諸番械ヨリ之ニ由テ此庭ニ於テ免ルヘカラサル目的ノ部トス之レ此部分ニハ其重ヲ負重セサルヘカラス依テ頸ノ長短大小ハ頭ノ大小ニ関シ番械運搬存在ニハ其頸短クメ太ク頭ノ小ナルヲ要シ其ノ頸長クメ細ク但シ小児ハ此例ニカラス成人ニ至テ然ルモノヨリ如何ナル小児ハ常ニ其頸休息ニ於テ大ナルヲ要シ頸長ク細ク病理学ニ於テハ主様ヨリ前ヲ細長ノ頸ト称シ痙攣素質ニ属シ短ク太キ頸ハ平中素質ニ属スル恥ヅカシメタルル小児ニ於テハ頸ノ前方ニ横径ノ違アリ之レ法律医学ニ於テ注意スヘキ事件ヲ惹出スノ痕ヲ認ムル第二頸ノ諸部

(第二頸ノ諸部)

太キ短頸ノモノニ於テハ其諸部ヲ分ツテ甚タ困難ヨリ之レ一ハ其前分ヲ動カスニ近接シテ混合スルニ由レ二ハ其前分ヲ動カス線ノ違ハルニ克ハサルニ由ル頸部ヲ先ツ已前メ前頸部及ニ台頸部トス之ノ両部ノ界ハ僧帽筋頸ノ外縁ニ由テ又乳頭突起ヨリ直線ヲ頸骨ノ眉脚ニ引テ之ヲ定ム其



頸部ニ就テ名クル部分ニハ之ヲ論セス前頸部ヲ更ニ別テ前頸部及ヒ左右ノ側頸部トス之ヲ論セス前頸部ニ於テハ胸鎖突筋ヨリ発生シ此処ノ胸頸乳頭突起ニ達スル両側ノ胸骨乳頭部前縁ヨリ上方ニ向ヒ下時ニ由テ形成サレ其ノ頂点ハ左右ノ乳頭突起ノ外縁ヨリ僧帽筋ノ外縁ニ由テ形成セラレ全周ノ基礎ハ下方ニ向ヒ鎖骨ニ由テ形成サレ頂点ハ上方ニ向ヒ両側ノ僧帽筋ノ外縁ニ由テ形成サレ其ノ頂点ハ前頸及ヒ左右ノ側頸ヲ更ニ胸鎖乳頭部前縁ヨリ外方ニ向ヒ鎖骨ノ上縁ニ由テ形成サレ其ノ頂点ハ上方ニ向ヒ両側ノ僧帽筋ノ外縁ニ由テ形成セラレ全周ノ基礎ハ下方ニ向ヒ鎖骨ニ由テ

創傷ナク良ク治ス此ノ法ヲ頸部ニ施ス人々此ノ部ノ更ニ区別ノ三部トヲ計ス即チ Regio cervicalis 頸ノ下部ノ Regio suprasternalis 胸骨上窩ト頸胸乳頭筋前縁トノ中間部ノ Regio sternocleidomastoidea 及ビ胸骨上部ノ中間真ニ胸骨上窩ニ位スル部ヲ固有ノ Regio colli media ト云フ

此ノ部ノ上方ハ甲状軟骨ニ由テ界サレ下方ハ甲状軟骨ノ上縁ニ由テ界セラル、カ故ニ上下ノ直リ甚ノ短シ

Regio colli media ノ左右ノ前部ハ上方ハ前部ノ終ル処ニ由テ界サレ下部ハ迄ルト分界ヲ有セサル左右ノ前部ハ Isthmus glandulae thyreoideae ヲ有スル前ハ婦人ニ於テハ皆

[illegible] 其上方ニ存在スル諸前部ノ総リテ名ケ前部ヨリ初ル前部ハ甲状腺ノ大サハ甲状腺ノ大小ニ関スルモノニシテ甚タ広ク其ノ両側互ニ連ル大サ普通人ニ於テハ甲状腺ハ其大サ一定セラレ普通ノ異ナルモノニ於テハ又之前ハ甲状腺ノ腫起セルトキニ於テモ甚タ著ク肥大スル Regio suprasternalis 胸骨上窩ハ胸骨上部ノ前分ニ外科ニ於テ胸骨上窩ト名ケル部ニ相当シ最モ下方ニ位スル前分ニシテ其下界ハ胸骨

上緣ニ由テ界サレ其ノ上方ハ甲狀腺部ノ後ニ達シ始ル九枚
ニ其ノ前ノ定ニ由テ上界ヲ定メル瓦ハス又上血倒ノ前分
中甲狀腺部ヲ除クノ他其ノ上下ノ分界著明ナリト雖モ其
ノ側ノ分界ハ著明ナラス其前分ハ總テ胸鎖乳頭動ノ前
緣ニ作ル任意中ニ於テハ其下當前ヲ指ス下方ハ胸骨
上部ニ達リ上方ニ於テハ胸鎖乳頭動ノ間ニ觸シ得ル當ニ達スル長徑中央ニ於テ
頸動脈ノ搏動ヲ克ク觸知同繫シ得ヘキ故ニ之前方ニ
ありとも
ハ甲狀腺ノ峡ニ當リ長徑當ハ甲狀腺ノ峡ニ於テハ
著シキモノナク側頸前ノ下方ニ當リ之ヲ觸痩セル人ニ於テ
瘠虛脫ノモノニ於テハ著シク之ヲ頸上當ト甲狀腺ノ峡
此上方ニ經過シタル索狀ノ頸胸乳頭部ノ下位ヲ通過シ終ル
又ニ談話ニ當テ上下運動ヲナス之レ Omohyoideus
ナリ此ニ由テ側頸前ヲ上下ニ前分ト之ノ側頸前ノ下前
部ヲ頸上當ニ於テハ其搏動ノ經過ヲ見ル甚メ肥滿シタルモノニ
至テハ其搏動ヲ見ル事克ハス又甚敷通常克ク觸知スルモ甚
(第三)頸前ノ皮下動脈ナリ
如此皮下及ヒ皮下ヨリ細知同繫シ得可キ部分
メ肥滿セル人ニ於テハ之ヲ定メ難シ痩セル人ニ於テハ之ヲ定メント欲ス
ルモ皮下ノ脂肪ヲ克ク之ヲ定メ得ヘシ
又皮下ニ於テハ之ヲ定メ難シ痩セル人ニ於テハ之ヲ定メ得ヘシ
ルモ皮下ノ脂肪ヲ克ク之ヲ定メ得ヘシ
又皮下ニ於テハ之ヲ定メ難シ痩セル人ニ於テハ之ヲ定メ得ヘシ
ルモ皮下ノ脂肪ヲ克ク之ヲ定メ得ヘシ

動ト固着シ其下位ノ鞘膜トハ密着セサルカ故ニ皮声甚タ滑動性ヲ有シ長径ノ皺ヲ形成シ頸ト直ニ横径ノ頸皮前トノ固着ニ由テ形成セラレ唯シ皮声ニ皺ヲ作ルヒ仍又其ノ皺中ニ頸皮前ヲ縦割ス頸皮ハ固有行フルカ故ニ死後ニ於テハ必ス横割シ溢ク兎縦又ハ頸皮ハ固有ノ皺ヲ作レリオイデヤルニ横径番ヲ生シタルモノアリ之レ殊ニ美婦ニ於テ見ル処ナリ故ニ佛国ノ解剖家某 Collet et Dumas (Malgaigne's Surgical anatomy translated by Gaillard Thomas) ト云フ又オニノ皺ヲ別ケ多クノ人ニ於テ音骨前ニ当テ見ル頸皮ハ甚タ延長性ヲ有シ頸ヲ溢ク仰キ或ハ之ヲ側方ニ転スルト雖モ前ヲ皺ヲ形成シ得可シ之ノ皮声ノ延長性及ヒ滑動性ノ大ナルニ由テ之ヲ次前皮ニ縫着シ延長及ヒ滑動ニ当テ毫モ必要ナルモノヲ以テ皮声ニ痕細織ヲ生シ短縮シタル時ハ其前ヲ頸カニノ等ヲ其運動ヲ障碍スト雖モ皮ニノ前ハ決ノ皆ヲ被テ其声ノ者ニ於テ然ラ

b 静脈（乳頭、頸、胸骨前ノ前縦ニ当テ皮下ヲ静脈径過ヲ近見スヘシ Veins superficial external

ニ於テ左ニ連系スル但シ之ハ静脈ハ両側互ニ行ヲ近接シ胸骨上窩ノ上ニ於テ左側ハ右側ノ上方ニ行キ内側ノ右外喉頭静

脈ニ連スルヲ以テ莫佰ト名ク乳頭静脈ハ乳頭腺骨部ヨリ起リ下方ニ向ヒ外方ニ趨キテ胸腺乳頭部ノ外縁ニ於テ内頸静脈ニ注ス鎖骨上二指横徑上ニ在ル前十字頸静脈ノ発生ニ基ク脇ノ中央ニ一個ノ静脈溜ヲ作ルモノハ稀ニ存スルモノトス之ヲ名ケテ莫氏溜ト云フ



莫氏溜ハ注意スヘキ要部ニシテ前後外頸静脈及ヒ内頸静脈ノ吸収作用ニ関係ス故ニ手術ニ於テ極メテ肝要ナル部ナリ其位置ハ乳頭部ノ中央ニ在リ諸部中最モ著ク可觸ス

頸乳頭部ノ下部ナル胸骨ノ発生点ノ中間ニ三角形空隙アリ之ヲ喉頭窩ト名ク之レ実ニ内部ニ外頸静脈ヲ通過スルニ由リ故ニ之ニ部ノ聴管ヲ以テ頸部静脈発音ヲ聴診スルニ当リ経験スル人ナキニ非ス胸骨上縁ノ両側ヨリ鎖骨部ニ達スル縦径ノ数ヲ胸骨部ト名ク胸骨上縁ノ両側ヨリ鎖骨部ニ達スル縦径ノ数ヲ胸骨部ト名ク

説話運動ニ関スル者肺ヨリ音骨ニ向フモノ例ニ喉ノ如キ咀嚼運動ニ由リ又中ノ咀嚼筋ノ如キ顔面ノ運動ノ見ル特殊ニ顔面ヲ起人ニ著シキ者ニ胸骨部ノ運動ノ如キ頸ノ中央ニ対シテ硬キ骨ノ全径部ヲ

衝ニ至レバ迫急融知ス衝ハ之ノ骨ノ上ノ方ニ在リテ之ノ骨ノ起ル所ニ
相模闘争等ニ当テ頸部ヲ圧迫拉挫セラレ甚キニ至テ脊髄ノ実
他感ヲ音語運動ニ由テ頸ノ中央ニ垂線ヲ向ヲ以テ
最モ突起セルル前方ノ骨ニ当テ喉頭ヲ触骨ノ何側ニ
レノ衝ヘシ其ノ当テ喉頭ヲ触骨ノ何側ニ
音ヲ融ルハ之レ軟骨ノ仮性ノ喉嚨ナリ笑管ハ其ノ
骨上嵩ニ達シ迫融達モ衝ヘシ呼気ヲ当テ胸骨上嵩ハ浅ク
心吸気ニ当テ其嵩著ク深クナルモノナリ故ニ呼気ニ
前方ニ由テ吸気ノ仕方ニ退クヲ以テ笑管ニ手指ヲ施

実呼気ニ於ヲ施ス
其ノ聲ノ発通ハ呼気ニ当テ施スヘキヤリシ乳頭下前側方
ニ当テ蠕痩シタルモノニ於テハ聲嗄ヲ見ルヲ以テ水脈腺叢存在スルヲ
タルニ由ル又其部ニハ水脈腺叢存在スルヲ
ノヘシ之ヲ胖下腺ト謂リ見ル勿レ
也触知スヘキ頸部
前線ニ線ヲ引テハ外時動脈ノ経過ヲ示ス唇癌動脈及
唇兎手術等ニ当テ必着ケメ之ノ動脈ノ所ヲ越ヘテ顔面ニ
來ル部分ヲ圧迫セモ血ヲ防キ得ヘシ然ルニ之
ノ動脈横ニ顔面動脈ト連ス此中ヘ之ヲ圧迫セ
モ血ヲ防ケ克ス然ルニハ唇自ヲ圧迫セシメヘシ

普通頸動脈及ビ内外頸動脈ハ頸部ニ於テ其ノ搏動ヲ觸知シ得ルモノナリト雖モ尚ホ頸椎横突起ノ故ニ著シカラス上方ニ於テハ之ヲ觸知シ下方ニ於テハ估方ニ於テ觸知シ得ヘシ時メハ咽喉骨上高ノ処ヲ指ス事アリ之ヲ目撃シ得ヘシ時メハ咽喉骨上高ノ処ヲ指ス事アリ之ヲ大ナル血管ノ走行ト誤認スルコトアリ

(第四)頸前諸筋ハ頸椎ヨリ発生スルモノ即チ胸前ノ前方ニ位シ頸部ニ存スル諸筋ハ佶多ニ之ヲ論シ(九)頸皮動ハ之レ皮下諸織ト表頸筋ノ中間ニアリ之ヲ觸知スルヲ得ヘシ

金ノ頸動ヲ往過セントセシノ胸壁上前ノ皮下ヨリ発生シ頸骨

骨及ビ胸骨ノ External 方ニ向テ其ノ上ヲ越ヘ前方ニ或ル程ヲ狗メ上行ノ下肢ニ達シ頸部ニ行キ口角ニ終ル故ニ其ノ発生ノ部ハ発生点ヨリ遠ク離レタル処ニ着ク

其収縮ニ由テ頸、頸ヲ屈ス収縮ニ由テ頸、頸ヲ屈ス

閉ヲ下ス下肢ヲ章下ス下肢ヲ如キ漁夫ノ骨ヲ彼ノ弱キ部ヲ章下ス下肢ヲ疲労ヲ感シ又ハ之ヲ用ヒサルニ因ル

サルハ他ノ動脈カ部分的ニ硬化シ明ナク蓋シ此動ハ胸壁ニ起リ頸皮ノ奥曲シテ其前方ニ傳ヘ肢ニ達スルカ故ニ之ノ動ハ縮スルニ因ル

又之ニ由リ頸部ノ外動真

ヲシメ兼テ胸迫ノ時眠ニ當テ短縮メ呼吸利ヲ助ケ胸迫
ヲ除起シタル胸頂ヲ上メ空気ノ鬱入ニ便ヤラシムルカ故ニ之ノ動脈
頂ノ呼吸動ヲ兼テ靜脈及氣管ヲ壓ヘテ靜脈及氣管ヲ
ヒ胸鎖乳頭筋（両側ノ筋作用ヲ起ス時ハ頭ヲ前
セシメ其ノ頭側ニ傾ケシムルハ一側ノ及對側ニ傾カシムル之筋
佰頭ト胸骨ト固着シタルカ故ニ頭頸部ノ一方ヲ引
ヒシ頭ヲ胸骨ニ近ツケ並ニ一側ノ顔面ヲ及對側ニ傾ケ
佰屈ヲ防ク若シ一側ノ筋單縮シタル時ハ顔面ヲ及對側ニ傾ケ
所謂斜頸ヲ起ス之ニ手術ヲ行フニハ新ニ其ノ病理性ヲ
筋ヲ緊張セシムヘシ之ヲ行フニハ及對側ニ向ヲシテ顔面ヲ前

満ヲ弛ヒ兼テ其着ヲナス方ニ壓セシメ其ノ筋
胸骨固着部ト鎖骨固着部ト中間ニ頸靜脈往過又
故ニ斜頸ニ當リテハ此ノ固着部ヲ切斷シタル時ハ之ノ靜
脈ヲ傷ケルノ危險アリ之ニ由テ充分ニ引キ力ヲ弱
ノ後ニ進リ切斷スヘシ既ニ筋ヲ切リ放チテ力ヲ除ノ時ハ力ヲ
退ケシメテ新ニ收縮シタル筋ヲ皮膚上ヨリ指ヲ以テ感シ斷ト
進テ皮膚ノ創ニ達シタルトキハ其ノ前ニ空気ノ入リタル形ナ
シ若シ之ヲ認メサルトキハ其ノ前ニ空気ノ入リタル形ナ
ラシ（ベンテルヒルヒ）二腹下腺（肩胛前
ニ固着シタルトキハ其ノ腱ヲ肩ノ側ニ方ニ運動ヲ妨ケシ若シ其ノ
固着シタル肩ノ側ニ方ニ運動ヲ妨ケシ若シ其ノ
佰ヲ鎖骨ニ近ツケ並ニ力大ナラシムヘシ鎖

大ニ他ノ運動ヲ妨ケ故ニ毫タ長キ二腹ノモノヲ以テ成シ
以テ他ノ時ノ運動ノ碍害ヲ防クヘシ之ノ動ハ乳頭突起ヨリ
発生ノ靱ニ附着スルカ故ニ収縮スルトキハ下ノ脣ヲ左ニ偏絶セ
シム故ニ吸ヒ又ハ吹ク等ノ作用ヲ充分ニ行ヒ得サルヲ以テ前ノ作用ノ
外ニ頬ヲ口蓋ノ口ヲ充ス為メニ(イデンス)腸(メン)骨筋(ニヨイデンス)ハ對側ノ左ニ得ヘキ為メ両側ノ筋ヲ以テ
ス集合スルカ故ニ又ハ對筋トモ云フ外緣當
テ上方ヨリ下方ニ向テ右神至ワルトンセル管ヲ右ニ神至ノ見ル
ル腭(ガイデンス)骨筋(ヘヨイデンス)ハ両側共ニ集合ノ不
對筋ノ如キニアラスト雖モ下脣中央ノ切除
富テ左ノ両筋ノ切断セサルヲ得ス左ノ両筋ハ右ヲ前ニ前方ニ
牽引スル作用ヲ主トスルモノナリ故ニ之ノ切断ニ由テカンタリニセ筋
筋ヲ左方ニ引キ空息セシムル之レ處ノ皮膚筋短縮ノ右方ニ
處面ニ貫キ側方ノ歯ニ到達スルヲ以テ一例アリ佛国ノ外科
医(シヨン)ワルトンセル之ノ術ヲ行ヒ右ニ紅ヲ貫キ両側ノ近傍ノ皮膚ニ
シ空息ヲ起シ顔面モ青色ヲ帯ヒ身体大ニ厥冷ヲ来セシモ
ノ其ノ大ニ明所ノ術ニ其ノ右ヲ鋏(剪)出シ生命ヲ救フタリ
又肯脚右骨筋ハ外頸靜脈ト交ヌシ其ノ靜脈ノ下方
ノ胸鎖乳頭筋ニ由テ被ヒ故ニ之ノ筋ハ収縮スルトキハ靜脈
ヲ壓ノ久気ノ妨ケヲ防ク為メ之ヲ努長セシムル為ニ之ノ筋ニ血液量ヲ靜

脈ニ連ス枝ナキヤ
ハ又前ハ大ニ頸靜脈ノ還流ヲ妨ケル等ヲ
ハシトド甚ダ之前ノ外頸靜脈ト交ズル前分ハ皮膚ノ
前載生ナキカ故ニ屈ク壓迫セラル外頸
ヲ屈ク壓迫セラル外頸靜脈ハ肥厚ナル患ヒナン靜脈
於テ外頸靜脈ト連ズルカ故ニ少ノ壓迫ヲ受クルモ直ニ
モノ血液ノ外頸靜脈ヨリ及流セシムル之ノ外頸靜脈連ズル
中又舌ニ外頸靜脈ト連ズルモノアリ又多分ハ耳ノ下ニ於テ内外連
ズルモノアリ内頸靜脈球部ニ觸擇法ヲ行フ時ハ戰慄ヲ觸覺
乳頭前面ニ當テ耳ノ下ニ靜脈ノ變常鳴ヲ聲知シ得ベシ
之ノ變常鳴ハ二個ノ分岐(ふたまた)ヨリ成リ其ノ音機(はた)
恰モ羊羹(ようかん)ヲ舐(なめ)ル音ニ似タリ全閉鎖ニ基因スルモノニシテ血液ノ逆流ニ由ル

交常鳴又ニ靜脈搏動ノ起ル其ノ分岐ニ基因スルモノニシテ
ヲ觸ルヽ及ヒ外口ノ一部ヲ閉塞セシニ基因スルモノニシテ
ヲ名ク靜脈ノ壓迫ニ發スル交常鳴ハ二個ノ音響ヨリ成リ
ハ内ノ頸靜脈ノ收縮ニ由テ
ハ内ノ行ク中ニ頸動脈(頸動脈ハ頸部ノ兩側ニ各三個ノ大ナル主動脈ナリ)
頸動ノ兩側ニ各三個ノ大ナル主動脈ナリ普通頸動
脈搏動脈ナリ其ノ分布ハ下顎ニ至リ外ニ分枝ヲ與ヘ
ヲ内ニ分枝ヲ與ヘ内ニ分枝ヲ與ヘタル後ハ外ノ頸動脈ハ
ニ由リ一ノ之ノ分枝ヲ與ヘ内ニ分枝ヲ與ヘタル後ハ外ノ頸動脈ハ

普通頸動脈ノ外ニ内外動脈ノ論
法ヨリ真功確実ニ従ヒ只ニ内ニ
由ルカ如クスルモンテルナレトカロチス
ムテルナレハ並ニ其ノ基原ヨリ無差ノ枝ヲ分裂
ルヤ如ク基頭蓋内ニ入ルニ着キ屈曲立例ニ従ヒ
ハ頭蓋内ニカリ他ノ例ニ
ヨリ之ノ屈曲ヲ有スルニ
脈管ノ緊張ヲ受サル為ノ他動運動ノ如キ
迂曲ラナスト雖一ナリトモ
内ニカリテ其ノ緊張ニ当テ
動脈壁内ニカリ勃然真ノ屈曲ヲ
頭蓋内ニ当テ血往ヲ取ルニ
ハ四屈曲ヲ
屈曲ハ頭蓋内ニ
存在ノ頭ノ運動

ニ当テ之ヲ緊張セル
ニ例ノ屈曲ハ運動ニ為ニ
ルカ為メナルヲ
殊ニ真ノ壁ニ
トナル又椎動脈ニ有スル
テハ真ノ縦ニ由テカロチス
之レ法律匠ニ
ヲ被首ニ於テモ
ナリ但シ之ノ破裂
トナスヘシ椎動脈
有骨管内
ニ当テ恵ナシ故ニ頭蓋外動ヲ頸部ニ存在ス
ルカ為メ他ノ三例ノ屈曲ハ脳外ニ血取ノ刻限ヲ
数セシ但シ血管屈曲スルヨリ血限ノ歴カ
トナル又椎動脈ニ有スル屈曲モ又上例ノ理ヲ有スレ被首ニ於
テハ真ノ縦ニ由テカロチス中層ヲ外層破断スルヨリ
殺シ名称ト克ク何トナレハ宛
ヲ真外層ヲ中層破断スルヲ
ナリ但シ之ノ破裂ニ
トナスヘシ椎動脈ハ
有骨管内ニ存在セルヨリ自己ノ固
ニ於テハ所要ナラス而シテ之ノ

頸靜脈ニ切創ニ由テ損傷ヲ蒙ムルトキハ若シ主ノ動脈
ケテハイケハ必ス其ノ動脈
セル、痲傷ニ於テハ之ノ動脈ハ損傷ヲ受ケルトキ
ハンテアラハ及ヒ加ハロナスハ其ノ
負血ニ由テ昏暈ヲ發シ後ス腦ノ充血諸症ニ於テ死ノ轉
歸ニ至ルモノナリ
(第九)頸部靜脈
頸部ニ於ケル靜脈カリテ之ヲ前
後ノ二部ニ分ツ
之ヲ前ノ中ニ位スルモノヲ
頸靜脈ニ
頸靜脈ハ
頸蓋外ノ血液ヲ
及流セシムル初ノ二個ノ
頸動脈及脊骨
カ故ニ此ノ頸靜脈ヲ貫通
ヲ連合シ壓迫ニ由テ
セシムルノ裝置ヲ有ス
ル、ヲ固有ノ骨重
靜脈ニ壓迫ヲ受ケ
ヲ呈シ腦ヨリ血液ノ
屢ト見ル處ナリ
ハ之ヲ靜脈ト稱ス

頸蓋外ノ血液ヲ及流セシムル初ノ二個ノ頸靜脈
頸動及脊骨
カ故ニ此ノ頸靜脈ヲ貫通
ヲ連合シ壓迫ニ由テ
セシムルノ裝置ヲ有ス
ル、ヲ固有ノ骨重
靜脈ニ壓迫ヲ受ケ
ヲ呈シ腦ヨリ血液ノ
屢ト見ル處ナリ
ハ之ヲ靜脈ト稱ス

ノ基礎部ニ存スルカ故ニ外科ニ於テハ他ノ一ハ之ヲ靜脈
鎖下靜脈ト稱シ猶ホ之ニ名ケ靜脈ト云ヒ猶ノ上方ニカケ
骨ノ胸筋ノ位置ニ胸鎖乳頭部ノ胸頸突部部
位方ニヨリ真球狀ヲ呈シ部ノ下方ニ走リ真部ニ大ナル一個ノ或ニ
ノ靜膜アリテ血液通流ヲ防ケルノ工ノ理ニ由テ頸靜内ノ痛性
氣成物質又ハ血腔ノ等ニ由テ頭蓋内又ハ頸部ニ鬱
血ヲ起シ顏面青赤色ヲ呈シ腫起シ外頸靜脈甚ク怒張ニ
ナリ觸ケテ解スヘシ即チ頸靜脈ニ運動ナルモノカ故ニ近長セス
ト雖モ之ヲ受ケルヤ否ヤハ外頸靜脈ノ血行閉止シ肥内ノ
血液ハ只椎靜脈ノミニ由テ還ルカ故ニ外頸靜脈ニ及ホス影響
ハ甚タ大ナリ

下ノ欄ノ缺ヲ補ヘ

（第七）頸部ノ神經

（A）頸神經叢（結合）

頸神經ハ脊髓ノ混合神經ニシテ知覺運動ヲ
兼ネ頸部ニ於テ之ヲ神經叢ヲ形成シ其周圍ニ剌劇
ヲ與フルカ故ニ頸皮部ト肩部ニ分布シ又ハ橫隔膜ニ
至ル神經ハ知覺神經ニシテ知覺ヲ傳ヘ神經中純
ニ知覺神經ヲ越ヘ肺下部ニ行ク
（B）舌神經（舌咽神經）（生理學上官能部味官ニ關スル色
ニ論セリ）

舌下神經ハ近世ノ性質ニ由ルニ運動神經ニシテ

ニアラズメ混合神圣之但シ之ノ神圣ハ他ノ神圣ヨリ知覚枝ヲ收リ
舌ニ行キ舌諸部ニ巡ル前ニ真ノ知覚枝ヲ他ニ与フル之神
圣一側痲痺ニ於テハ舌ハ健康側ニ牽引セラレ病側ニ牽引セラルヽ又
平方向ヲナスト雖モ一側ノ部ヲ痲痺シタルトキハ真牽下学セラレ
動ヲ健康側ノ部ヲ短縮メ真ノ上方ニ引クカ故ニ舌
骨ヘ盖ク病側ニ傾キ舌モ共ニ下牽スルカ故ニ真牽引其
健康側ニアリテハ病側ニアリテハ
舌固有ノ横往動ノ作用ニ由リ甲ハ舌根ヲ前方ニ引テ舌ヲ
突出セシムル助ヲナシ乙ハ舌ヲ狭メ長往ヲ大ニシ助ケリ今其
一側痲痺ナルトキハ真病側ノ舌根ヲ前ニ引ク克ス舌長往大

ナルカ克ス病側ニ傾ク得ス
dl 迷行神圣 ヲ刺激スルトキハ左ノ諸部収縮ス即軟
口蓋牽上部鼻壓部喉頭収縮部甲状盖收部舌輸状
盆状部俱ニ盆状輸状部ヲ収縮ス之ノ動ヲ共ノ動ト
感動ナルヤ否ヤハ定メ難シ恐クハ副神圣ノ枝迷行神圣ト
聚合セルカ故ニ迷行神圣ノ枝ヲ刺激スルトキハ之枝刺激カ此
之諸部ヲ起スモノナラン乎ルヒエスハラリンヘエス、シユペリウル
及ヒインフエリウルニ各真作用ヲ営ムヲ以テ之ヲ断シ
声ヲ帯ル喉頭ノ他部ヲ刺激スルモ更ニ喉嚨発作ヲ起サス
喉ニ知覚神圣ヲ分布スルヲ以テ之ヲ断シ
圣トハモノメ声音嚥嚢ニ感行ヲ来スハ真ノ神圣ノ

障害ニ依リ即チ頸面ノ皮膚ニ於テ喉頭更ニ運動知
覚ノ障碍ナク尸喉声ノ如キ神経ノ壓迫ナルニ由テ
神経ヨリ來ルカ如シト雖モ元来迷行神経ヨリ來ルモノニ
迷行神経ノ副行神経ノ枝ヨリ成生スル多クノ
故ニ種々ノ壓迫ニ由テ声帯ノ運動困難トナリテ声音嘶
嗄ヲ運動動止ノ無声ナルハ迷行神経ニ成生ス
ル多行神経ノ副劇ナルハ咽頭乳頭前脊ノ縮セラルルヲ
以テナリ而シテ喉頭ノ異和又神経ノ喉頭ニ
分布スル多クノ如シ
又感神経ハ深ノ頸部ニ位シ舳違スルヲ以テ故ニ斜

ニ於テ肝臣ナラス切創ニ由テ損傷サルヲ以テ諸軟部共ニ大ニ損
傷ヲ受ルヲ以テ故ニ交感神経損傷ノ有無ヲ損明スルヲ要セス尸
創ノ第一ニ前頸部ヲ各別ニ箱逆損明シ第二神経ヲ
前頸部ノ軟部ヲ各別ニ解剖
レーレンハルト克ハス故ニ頸鞘ヲ損明スルニハ
部ヲ横明スルヲ各部ノ損明スルヲ要ス前頸部ヲ
スルニハ先ツ金線ヲ切除シ胸骨前ヨリ胸骨前ニ達スル迄作リ其
ノ両側ヲ迄平切除シ胛ノ下縁ニ沿フテ肩胛棄ニ達
セシメ其下端ヨリ両側ニ向テ頸骨ニ沿フテ肩胛棄ニ達セ
シメタル大ナル二皮弁ヲ作ル皮面ヲ切開シタル中ニ頸皮筋ヲ若

如ク或ハ之ヲ各別ニ解剖スル但シ之ヲ各別ニ解剖スルハ皮膚ヲ切見刺ヨリ克ク注意ノ利益アリ

腕ニ之ヲ他方ニ見ルニハ胸顎乳頭前ヲ見ル之ヲ前ノ中央前ニ向ヲ少許頸靜脈往過ヲ交叉シ前ヲ越ヘ顎骨角中央ニ達シ次前ニ至リ上前ニ當リ外方ヨリ内上方ニ當テ其ノ前ヲ越ヘ通過シ神至ノ上方ノモノハ大耳軟骨ニノ下方ノモノハ表頸神至ヨリ發生シ當テ五行ホル神至アリ之ヲ動ノ表頸ニモノヲ之ヲ動ノ表頸前ニ於テ之ヲ切斷セサルカ故ニ之ヲ切斷セハ尚オ下位ニ進ミテ漸々深前ニ進ムヲ要スルモノヨリ

Regio trigonalis colli (三角部)

之ヲ頭首前ニ屈シ以テ口唇ノ底面ト頸皮前ヲ除キ各他ノ表下位ニ頸鞘ヲ見ル之レ下腺ニ固着シ其ノ眼ト角ヒ固着シ前ノ他前ヨリモ長シ前ヨリモ狹シ各ノ見ル之ノ動ハ腺下腺ヲ剥脫スレハ下方ニ彎曲

皮下ヲ貫キ頬皮動脈ヲ剝脱シ尚ホ前ニ進ミ顔面静脈ニ遭ヒ之ヲ剝脱シ尚ホ前ニ進ムトキハ下唇ノ動脈ハ外ヤ上ニアリテ動脈ハ外ヤ上ニアリテ動脈ハ外ヤ上ニアリテ

舟骨各骨前面甲状靭帯 Ligamenta cuneonavicularia dorsalia

舟状骨ト楔状骨トヲ連結スル靭帯ニシテ其ノ扁平ナル線維束ヨリ成ル

舟状骨ノ背面ヨリ起リ第一楔状骨ノ背面ニ達スル三角形ノ線維束ニシテ其ノ上縁ト中間ノ上縁トハ上方ニ向ヒ行キ上縁ハ頭、動脈ト共ニ外方ヨリ内

側ノ峡ヲ以テ連系大之腺ハ通常気管上輪ノ三ヶ
ヲ被ヒ又ハ之ノ腺ハ胸骨甲状筋胸骨舌骨筋ニ由テ被
包サレ之カ故ニ病性増大シ起ケハ甚敷腫レ外方ニ向ノ
他ノ気管ヲ圧迫シ望嘉ヲ防ノ為ニ之ノ前ノ一側或ハ両側ヲ切断
スルヲ要スルコトアリ之ノ前ノ創傷ヨリ血ヲ受ケ甚タ血管ニ富ム為ニ
四個ノ動脈(両甲状腺動脈ニ両甲状腺動脈)ヨリ血ヲ受ケ甚タ出血シ易ク
且ツ此ノ腺ハ大ナル音響セシニ加ヘテ更ニ著シクメ甲
状腺動脈ヨリ血ヲ充タシ甚タ充血セシモノヲ扼ク奥横セリ上甲状腺
縫縮ヲ以テモ他側ノ両動脈ヨリ血液ヲ
受ケ故ニ真手術困難ナリト雖上一側ノ上方ノモノヲ
切ヲ見ハ真ノ十全切縫ヲ得ヘキ故ニ下方
四個ノ結紮セサルヲ得ス然ルニ下甲状動脈ハ真結紮糸
メテ困難ナリト雖モ若シ下甲状動脈ヲ結紮スルハ不
可能ニ近ケ下甲状腺ヲ造リ腺ヲ喉頭ヲ充ス喉頭ノ反対
側ニ達ケ食道上ニ於テ其ノ脈ヲ結ヒ又ハ之ヲ動脈ハ不
可能ニ近ケ下甲状腺ヲ造リ腺ヲ喉頭ヲ充ス喉頭ノ反対
側ニ達ケ食道上ニ於テ其ノ脈ヲ結ヒ又ハ之ヲ動脈ハ不
上頸椎ノ前ニ至テ食道ト交ル故ニ Oesophagus
ニ於テ之ノ脈ヲ損傷セサル様ニ注意スヘシ
(Arteria laryngea inferior) ハ甚タ小ニシテ前斜
角筋ノ痩ニ入ル於テハ胸骨上ニ著ク陥没ヲナスヲ
見ル之前ニ於テハ頸鞘ト胸骨甲状筋トヲ縫合シ頸鞘ハ
之前ニ於テ両方ニ有ノ堅靱ニシテ前ニ有ル之前ニ有ル一前鋸骨ヨリ
発シ上外方ニ向フ進ミ他側ノ同名前ノ腱ト中央ニテ結合

之ヲ横頸動ト云フ其下位ニ胸骨舌骨動及ヒ甲状胸骨
動アリテ下方ヨリ上方ニ往通ス之ノ動下位ニ腓腸層及ヒ其ノ
中ニ静脈叢ヲ作ル之静脈中甲状腺静脈ニ入リ又ハ
静脈ニ送ル此動ト共ニ Nervus hypoglossus Nervus vagus
モ亦之ニ伴フ之ノ動静脈ハ下方ニテ一ノ幹ト為リ手術ニ於テ注
意セサレハ損傷ヲ招キ若シ誤テ之ヲ損傷スルトキハ多量ノ
血液ヲ失フ故ニ之ノ手術ニ於テ気管ノ露出シ又ハ
皮下気腫ノ有無ニ注意シ止血ヲ完フセサレハ其ノ気
管ヲ切開スルノ際ニ於テ動脈ヨリ出ル血ハ気管内ニ
流入シ気管ヲ塞キ若シ之ヲ吸入スルトキハ肺炎ヲ起ス
ヘシ又ハ気腫ヲ起スカ若シ之ヲ誤テ静脈ヲ切開スルトキハ
空気塞入ノ為メニ死ヲ招クヘシ

ヲ私成スルトキハ自ラ破裂スルヲ待ツヘキモ亦危険ナキニ非ス
ヲ私成スルトキハ直ニ前中隔膜ヲ外ニ穿ツ或ハ気
管軟骨ヲメガリ又ハ陥ラシムルノ恐アルカ故ニ速カニ切開スル事
ヲ気管ノ位置ハ舌骨ノ下縁ヨリ胸骨上縁ニ至ル間ニ在リ食道ハ
気管ノ背面ニ在リ食道ハ稍左側ニ偏リ正ノ対セス
下方ニ向テ漸次右ニ向フモノハ胸骨上気管前ニ於テ入リ気管ヲ壓平
ナル大害ヲ起スカ故ニ切開セサルヘカラス
迫ヲ除クヲ克ク(第九)側頸部ニ於ケル血管ノ主ナルモノハ総頸動及ヒ
a Regio Carotidea, regio sterno-cleido-mastoidea
astoidea en dos triangulos colli. Trigonum colli anticum

モ前頸部ノ損傷ニシテ此ノ胸頸乳頭附ノ乳頭付着部
ヲ切リ放チ其ノ前ヲ緒ヒテ胸部ニ至レル迄ノ創行神至ノ貫通シ見ル之ノ創ノ血管ハ殆ント皆下ニ向ヒ
並行シ喉頭乳頭部ハ上方ヨリ斜下方ニ迄迫ニルカ故ニ其ノ
血管ノ上方ハ被ヒ下部ハ之ヲ覆ヒ為ニ縦線創
皮下五ニ外科手術ヲ施テハ看脚右骨前右骨前ト胸頸乳
頭筋ト交叉ノ部ニ於テ其ノ三角部ノ上方ノモノヲ切リ去リ三角ノ一辺
リニ至ト名ケ此ニテ時下前モ亦ニ集入シ右側ノ三角部ハ境ニ為ル
又一ニハコリノニムゴリ。イレベリラ点下縁ハ鎖骨ニ由テ形成サレタ
縁ニ看脚右骨前ノ外部ニ由ヲ見サレ内縁ハコノ三角ノ外部ニ由ヲ見サレ其上三角部ハ外縁ハコノ多
レベトノマスト イデス」上部ニ由ヲ見サレ内縁ハ看脚右骨前ノ内部
ニ由ヲ見サレ三角ニ為ル前ノ右腹ニ由ヲ見サレタル故ニ胸下部
ガ義ヲセヌカニル右ニ其ノ右側ノ創ハ胸下部ニ到リ
脈ヲ中ニ其ノ前部ニ於テ脈管ノ被包ヲ切放ニ真ノ前ニ血管
ヲ露出ス其ノ最モ前ニ位スルモノハ外頸静脈ニシテ其ノ外方ニ位
スルモノハ普通頸動脈ノ之ノ両管ノ中間ノ内方ニ奇ヲ迷行神
至徒迷モ其ノ右内方ヲ走ル交感神至ノ幹ハ長頸前ト大
至ノ幹ハ長頸前ト大前脈並頸前ノ間ヲ上ニ走ルヲ見ル
イデス之ノ如ニ帯引施線ヲ以テ外ニ其ノ両側ノ内外頸静脈ヲ通ル気ノ外外静脈ヲ集合セル見ル
「ラモヘヲイデス」ト看ト交叉ノ其ノ血管前外ニ右ヲ神至ノ枝ヲ

Arteria digitalis dorsalis pollicis

見ル血管前内外ヲ通過シ神経ト共ニ拇指ノ背面ヲ通行シ指端ニ至リ其枝ヲ分ツテ爪床ニ終ル動脈ハ掌面ニ於ケルト同ク下降シテ第一指骨間ニ入リ掌側ニ出テ掌側動脈弓ヲ構成シ且ツ第一指骨間ニ於テ背側動脈ニ吻合シテ終ル

此外分枝ヲ出シテ第一指骨間ニ於ケル諸筋ニ分布

附要ナラス且ツインテルナノ内側ニ来リシ時ニ初ノ副
副ケ茎咽喉(なかいしこう)ニ由テ其中間ヲ経過セルヲ
ho glo ssus elevator pharyngis inferior
cephalicus interior
副ケ刃一皮弁ヲ二頸皮動ケ三頸ノ外膨隆四裏ト
脂肪性ノ結締織并ノ脂肪中ニ許多水脈瞬存在ス尽
鎖骨下静脈動脈横貫肺動脈并ニ一ニノ神経叢
ヲ之ノ脂肪中ニ含ム若シ之脂肪性結締織ヲ取リ除ケハ
胸鎖乳頭筋ト僧帽筋ト骨肋交叉シ一個ノ三角ノ空隙ヲ
生ス空隙ノ下境(ヲ)ハ鎖骨(ヲ)ニ相当シ(ル)ト称ス其底面ハ頸鞘ノ背
板ヲ以テ形セラレ(ル)モ(ノ)ニシテ(ア)ル(ト)ナリ
trigonum cervicale inferior
s. cavale inferior
三角ニ於テハ頸鞘ノ沿

枚ト癒着(シ)テ(モ)ノ若シ之ノ前ヲ取リ除カントスレハ頸鞘
ヲ切断セサルヲ得ス若シ之ノ頸鞘ヲ切断シ取リ除ケハ先ツ
alenus anterior
ヲ見ルモノナリ
C胸西ノ上ヨリ之ヲ克ク検セント欲スル中ハ頸骨ヲ取リ除クヘシ
鎖骨ト胸骨トノ奥前面ノ低方ニ外頸静脈及ヒ内頸静
脈ノ結合部ヲ見ル又右方ノ内外頸静脈結合部ニ於テハ
brunei anonymi
ヲ見ル左方ノ内外頸静脈結合部ニ於テハ尤普通頸動脈ヲ見ン又左方ニ於テ尤
前ノ外方ニ若ク所ヲ尤頸骨下動脈ノ前、中、亜(つぐ)動ノ間ヲ斬ヘ
カノ肋骨ヲ越テ見ハ右側ノコンユガテーシヨンハトリユンユタカノ

キこゝヨリ發シタルトカ故ニ左側ニ比スレハ其前高ク且ツ肋骨ニ近接シタルヨリ之ノ理ニ由テ右方ノ動脈ノ左方ニ比スレハ
結紮ニ易シ又頸動ノ前面ヲ良ク中ニ於テモ右方ノ
コユナクラヒヤニハ左方ノモノニ比スレハ創傷ヲ来シ易シ若シ左右
ノ頸動ヲ許ニ比較センニハ欲シタヤハ頸骨ノ外前ヲ胸骨ノ上前
ヲ取リ除クヘシ

（第十）鎖骨下動脈ノ名論

鎖骨下動脈ハ高動脈ヨリ來ルモノニシテ左右ノ頸骨下
部ヨリ脊頭ニ至ル其ノ外ヲ思正シカラス但シ鎖骨下動脈ハ發生
其ノ方ノ脊動脈トナルヲ良トス鎖骨下動脈ヲ區別ノ

三部ヨリ成ル即チ斜角筋ノ間ニ進入スル前ヲ第一部ヨリ外ヤヤ
ヨリ上脊頭前ヲ看ヨ其ノ外ヤヤ亞前間ニ在ル部ヲ第二部トシ
一部ハ左方ノヲ一部ニ比スレハ短キモ右方ノヲ三部トス右方ノヲ
ヌノ長サ程短キモノニシテ之ノヲ一部ヲ前鋸骨下靜脈ヲ見ル次ニ橫膈神至ヲ見ヌ（これアルヲ）
ヲ見ヘ前ノ告始メノヲ一部ヲ違ヒタルモノヨリ
部ニ比スレハ甚タ短シ若シ其ノ部ニ違セント欲セハ亞前ヲ切斷セサ
ルヲ得ス右ノ三部ノ他ノ二部ヲ合ハセテ之ヲ前ハ脊動
ク術編ニ術ル且ツ之ノ動ヲ違シ易シ故ニ之ノ前ハ脊動
鎖骨動脈ノ分枝ハ猫ニト多シ右ノ一部ヨリ發スル只橫頸動

動脈及ビ横、肩胛動脈ノ如キハ第一部ヨリ発シ歩セラルヘキ第二部ヨリ発スルヲ常トス上二例ノ動脈中一例ハ第一部ヨリ発シ一部ヨリ発生セルモノアリ第二部ニ於テ動脈ノ分岐ハ第一部ニ於ケルヨリ近接シ結締織ニテ鎖骨下動脈ノ第三部ニ於テ分岐スルヨリ近接シ結締織ニテ包ケルヲ以テ動脈ノ分岐ヲ見ルヲ常トス故ニ第二部ニ於テ動脈ヲ短クメ手術台ニ於テ動脈ヲ露出セントスルニ当リ第二部ニ近接シ結締織ニテ包ケルヲ以

頸乳頭部ノ前ヲ被ヒ胸骨手柄部ニ固着スル外層
ノ中央部ヨリ左右ノ胸頸乳頭部ニ進シ其内縁ニ達シ
二枚ニ分レ一枚ハ外動ノ外部ヲ被ヒ一枚ハ其内部ヲ被ヒ胸
鎖乳頭部ノ外縁ニ至テ更ニ結合ノ一枚ト成リ前ヲ被ヒ鎖骨ニ固
着スル由テ[illegible]
面ヲ被ヒ伍方ニ進シテ[illegible]ス」ニ達シ其ノ前
頸ノ諸動骨ヨリ生ス此層ハ外層ノ如ク胸骨手柄部ニ付着ス
但シ外層ハ胸骨外縁ニ固着シ内層ハ其内縁ニ付着スルモノ
也之ヨリ両層間ニ三角形空隙存スル中ニ脂肪ヲ貯ヘ
又ハ之ヲ見ル或ハ人[illegible]
[illegible]於テハ水腫腺ヲ見ル中層ハ頸部ヨリ

両側ニ進ミ胸骨岳骨劫胸骨甲状部ノ各靭ヲ形成ス
其内ハ外層ノ胸骨乳頭部ノ靭ヲ形成スルニ異ナラス若シ此
ノ二個ノ部靭ヲ血管靭ヲ形成シ然ル後ニ結合シ而シテ大ナル血管ニ達シ
靭ヲ形成スルモノナリ如此カカレニハス反ヒカカレニハス中間ニ存
セシモノヲ被ヒ伍頸椎ノ横突起前ニ至リ消滅ス外層
ハ鎖骨ニ面着シ下頸三角ノ蓋ヲナシ中層ハ其底面
ヲナス但シ此ノ層頸骨ニ面着セスシテ行ク腕義ノ最初ヲ
俾ヘ腋窩ニ来ル腕靭ニ移ル中層ノ[illegible]ヲ[illegible]ス」
ス[illegible]於テハ[illegible]ス」故ニ之ノ部収縮
スル時ハ中層ヲ第一ノ肋ニ於テハ此ノ中層ヲ外層ノ

ノ如ク佗方ニ至リ又ハ之ヨリ下ヘ中層ヲ切リ下ケ之ヘ引下ケ切リ但シ
其ノ說信シ難シ
二、其ノ深層ハ頸椎横突起部ニ於テ消滅スルニ說信
被ル者ノ層ハ頸椎前面ニ位シ長頸前大前直頭前ノ
如キ舌骨下部ノ舌骨上部ノ腱ニ始マリ頸鞘ノ各骨上部ノ腱
ヲ(一)包覆上半現ハル景況
(其一)頸鞘ハ胸面ニ口ノ壑ノ周ヲナセルモノトスルモ下咬合ノ来由
迅撗展シ巨勢ヲ逞大ニス此時ニ当テハ外気ノ壓力勝越タル力
故ニ諸孔ヨリ胸面内ニ竄入セント欲スルヘシ若シ今頸鞘頸
骨及ヒ胸骨柄部ニ固着セサルトキハ逞力ヲ以テ外気圧入シ
血管及ヒ気管ヲ壓スヘシ故ニ亂ニ於テハ頸骨上部及ヒ胸

骨手柄部上方ニ於テ頸鞘創傷ヲ免レサル
障害ヲ起ス但シ其創口ヲ判創ヲ以テ開頸ヲ行ヘハ其ノ
障碍ヲ治スルモノトス多クノ外科家ニ於テハ「ホツサカ」イヨニテ
リト共ニ之ヲ取リ除ケ得サルカ故ニ其ノ手術ハ頸骨上部及ヒ中層
ノ方ニ於テ頸鞘創傷ヲ免レサル
ニ方今実施上ニ於テ外手術ハ危険ナルモノトス但シ
如何トナレハ「トラヘー」術ヲ施シ表層若中層ヲ切除セル
モ危険ナル呼吸障碍ヲ来サヽルモノナリ但シ之ノ手術ニ当テ
ハ勉メテ空気ノ亂入セサル様ニ注意スヘシ若シ吸気ニ当テ
創口ヨリ空気亂入セル中ハ多ハ呼出シ得サルモノナリ之ヲ防ク
縮皮ニ勉メテ空気ノ位置等ニ由テ然ノ如キ空気ノ断々吸入セル中ハ

肋骨損傷ノ如キ気胸ヲ来スニ於テクルカ如シ気胸ヲ来スニ於テクルカ如シ気胸ヲ来スニ於テクルカ如シ

ニ至テ始テ指頭ヲ除リ入ル又他ノ大頸靜脈ハ頸鞘ト癒
着セサルカ故ニ之ノ恐ナシ尤モ頸部ノ手術ニ於テ靜脈ニ危險
ナル創傷ヲ來スハ前方ノ頸、前方ト側方トノ三角ニ於テ然リ又頸骨ニ當リ
ニ於テ然リ又頸骨ニ當リ及ヒ下端ニ於テ靜脈近傍
嶮ナル創傷ヲ來スヲ以テ下肢ノ靜脈ニ於テハ創傷ヲ受ケサル
空氣ヲ吸入スルノ恐アリ又
(靜脈壁)ハ常ニ靜脈腔ヲ擴開シ
下肢ノ靜脈腔ト癒着シ常ニ其壁ヲ擴張セルモノニ於テハ
ソノ缺損ヲ充ス血液ノ流入恐アラス(其三)頸鞘ト腔下靜脈(其他)トノ
頸鞘ハ表層及ヒ中層ハ
胸骨柄前ニ付着スルカ故ニ皮膚下前ヶ頸皮前
或ハ膿腫充實又ハ頸皮前下方前ヶ頸鞘表層ノ外面ニ
セル或ハ腫充腫充積ヲ來セルモ胸空内ニ膿汁並ニ胸
膜ニ下垂スル頸鞘ノ表層ト中層間ニ(カフセルヲ)來ラス(甚タ稀ニ)
之レ其前緒織ニ之ヲ(ケレ)ヤリ若シ又(カフセルヲ)來セルモ中層ハ
頸骨ニ固着セルノ(ミ)ニ非カ故ニ膿ヲ腕ニ來ラス腕ニ至セシム
中層ト深層間ニ潜面ニ膿ヲ(カフセル)ヲ來ラス甚タ稀ニ
依テ中靜脈空ニ來ルモノナリ
(第十二)普通頸動脈結紮法ノ略論
(米)英國医員 M○○氏實驗表ニ由レハ三十一例ノ手術ヲ
施メ其二十二回ハ幸ナル功績ヲ得メ「カロチ」インナルヘシ動

腫痛ヲ発スルヿアリ又キスチンヨリ多ク加ロチヨシユユエヿヲ結ヌ
ヨセオチテエス」ノ定义ガ正方ニ於テハ下方ヨリモ容易ニ頸面
腫物例ハ甲状腺ノ癌腫、肥大或ハ血管腫等ニ加ロチヨ
ヨシユエヿエス」ノ結紮法ヲ行フトキハ克ク注意ノ真動脈ヲ損出
セサレハ克ク何トナレハ腫物ノ壓迫ニ由テ平常ノ解剖上往
往ノ変ノ真ノ直ク面方ニ壓迷サレ若ハ胸鎖乳頭筋ノ外縁
ヨリ尚オ遠カルモノ故ニ腫物ノ発生ニ着目ノ血管壓入ノ
位置ヲ探ルヘキヿヲ時ニ於テハ結紮ヲ難シ加ロチヨシユユエヿ
ヲ以テモヘイヂテエス」定义ノ正方ニ於テ結紮ニ其下方ニ於テ
ヨリ容易ナリト雖モ加ロチヨシユユエヿヲ以テヘイヂテエス」定义
結紮ヲ施スニハ真前静脈ノ損傷ヲ恐ル、ノ為メ但シ前ノ

前面静脈ニ由テ加ロチヨシユユエヿヲ以テヘイヂテエス」定义ノ
連系ヲモノヿヲ以テ動脈ヲ刺セントスルヿヲ
中ハ真手術ヲ妨ケ又前ノ鈍剔ニ由テ遠ケヘキ然
ヒ之ヲ剔ヲ放テハ更ニ副創面ヲ被ヘ結紮前ノ腫ノ軟性ヲ妨
ケ腫動脈壁ノ傳ヲ下ヒ難ヒ又ハ外科医ニ於テハ
学手術ヲ當ニノ胸鎖乳頭、副胸骨骨動ノ一部ヲ切断シ
腫、挑出ニ便ナラシムル併用ノ外科医 Chrysostome Jaboulay
氏ガ其頸椎ノ横突起ヲ
克ク之ヲ外方ヨリ触知シ得ヘシ真前ヲ切口ヲ近ク位スルカ故ニ之
ヲガロチヨシユユエヿ結紮法ノ表点ト定メ之ノ結紮ニ
La Carotidienne ノ名ヲ与ヘリ之レ昏冒シ易キ患者

ニ於テ咽喉ヲ絞ルニ克ク行ルヽハ絞縮ニ當ノ時要ス事
件ヒ又短頸ノ人ニ於テハ胸頸乳頭動ノ方向ヲ斜ニ
中ス之絞動ニ由テ喜部ヲ起シテ時要ヨリ
(第十三) Laryngoscope ニ異ナシ治療上要件
(ル) 異物ノ喉頭ニ由テハ咳嗽ニ由テ之ヲ吸出ス事ハ異物喉頭及ヒ気管内ニ入リタル
其ノ危険ヲ起スモノハ並ニ其前ヲ切開ノ之ヲ除ク事
カト雖ヒ其ノ危険甚カラサルモノハ患者ニ適宜仰臥盟前ヲ
及ヒ胸部ヲ低クシ頭ヲ高ク盟チハ善良功績ヲ見ル
アリ一例アリ英國ニ有名ナル建築家 Brunel ハ
地球上無比ノ地中鉄道ヲ英大河ナル Thames ノ底ニ造リ
其ノ造営中ニ當テ河氏ノ小児半 Groyce 日ヲ
ヲ誤テ喉頭内ニ陥入シタリ再台血ニ有名ナル外科医先
管ヲ切開メ之ヲ探リシト雖ヒ遂ニ克ハサリ散ニ頭、胸部
ノ低クシ置キ時々背ヲ打テ劇動シ其ニ委ヨノ後咳嗽ニ
由テ咯出セリ又佛國ノ Lemaire 氏ハ二十五時半
喉頭内ニ入リシモノニ襟ヲ手術ヲ施セシ遂ニ之ヲ除キ克
ハス終ニ頭及ヒ胸部ヲ低ク置キ背ヲ打テ之ヲ出セリ英國ノ
ハ氏 大道ニ手画師銀貨ヲ投ケ拳ケロニテ受ケ
ハ時 誤テ一ヲ咽頭ニ陥入セシモ甚ク苦痛
カラス又者ニ命メ体ヲ倒サマニシ之ヲ振リ出セリ Pongleris
氏ハ気道内異物ノ剔甚タシキモノヲ経験セリ一八五年

吸入ノ筒内ニ墳鬼ヲ取リ出サントスル際ノ如キ口ヨリ其矢ヲ吸出セシムル設ケ其ノ矢ヲ喉頭内ニ達セシメ遂ニ気管ヲ貫通ノ左気管枝ニ達シタリ之ニ由リ其ノ漁ノ際突然咳嗽ヲ発シ喀出血ニ由リ知タリ知佰之ヲ剖見セシニ其矢尚ホ咳嗽刺動ニ由リ運ヲ其ノ動ニ達セシモノヲ見ル之知佰ハ咳嗽ヲ喉頭及ヒ気管切開法ノ手術ニ施シ其体ニ行ヲ伴ハ輒チ其ノ矢ヲ吸出セシムル設ケ其ノ矢ヲ喉頭内ニ達セシメ

櫻桃ノ痂入セシモノニ於テモ之ヲ見タリ又異物気道内ニ入リテ
若月或ハ年間モ少ノ障碍ヲ見サリシコト往々之アリタリ」又ヒ他種物ノ口ニ由テ室息セントスルヲ防ク為ニ行フタメテヘラトシ」切皃痂裏ノ肉ヲ用ユ切皃痂裏ノ肉ヲ用ユルハ人工呼吸ヲナサシムルニ
當リ箱入シ孔ノ機カラシメン但シ共際ヲ摘入スルヲ決ノ當
常ノ気管内ノ痂壁ニ觸レ刺劇ヲ與フルニ至テ痙攣ヲ成シ殆ント死ニ至ルカ故ニ宜
ク切除セシト欲スレ痂ニ至テハ人工気管ヲ箱入スルト中ニ其ノ動ク
ニカテハ人工気管ヲ箱入スルト中ニ其ノ動ク

管内ニ入リ其ノ痂壁ニ前ノ如ク刺劇ヲ與ヘ咳嗽ヲ起スカ故
ニ手術後ハ室内ノ空気ヲ温湿ナラシムヘシ
C喉頭及ヒ気管ノ狭窄上要件
喉頭ノ顫動機能ヲ史ニ由テ来ル者ノ声傳ニ於テ声及行嚥頭
筋ノ共遠隔シタル部ニ神経ノ麻痺ヲ起ス故ニ頸部ノ瘢痕ノ牙
リスコタ為ニ他ノ種物ニ於テモ之ノ神経ヲ壓迫スルカ如キ
ニ来タスコトアリ気管打撲法ヲ行フタル後ハ室気入ラ
管ヨリ通行ノ喉頭内ヨリ通行セハ故ニ声ヲ發スル顫
動セシムルヲ充ノメノカニテカカルカ如キ手術後ハ室気ヲ
気管痙攣ヲ惹起スルヲ以テ平常ノ如シ

之レ故ニ氣息者ニ於テ正ク實損ヲ與フル處ニ由テ要
素ニ生理學試驗ノ解剖學教授ヲ行フ時大ニ聲ヲ發シ其
論說ヲ妨クルトキハ氣管ニ孔ヲ穿チテハ發音ヲ克ク
氣管ノ做ナリ故ニ氣
ナル做ナリ故ニ氣管ノ旁通創ヲ受ルトキハ空氣竄入ノ甚シ
キヘヨシヘセーコ
ル
シナラス頸骨ノ後ニ
ニ違スルコトアリ氣管横斷創ニ由テハ之ノ下方ノ切端胸迄
ニ浸入スルコトアリ之ヲ知ルニハ Dommes Coburn
カ性ヲ有スルトキハ
ノ稍ノ下方ニ結
液裏カリ其粘液裏肥大シ水様ノ容

物增加シテ腫起スルトキハ之ヲ Hyperom ト名ク其ノ
稍ノ下方ニ向テ發生スルモノニ於テハ甚タ人ノ觸レ易シト
差似ス氣管ノ軟骨輪ハ全環ニアラスシテ後方ニ於テ其
一箇所ノ缺如アリ之ヲ膜力性ヲ有シ之ニ附着シテ後締纖維ノ之ニ由テ
ヲ作ル之ノ輪ノ後方ニ於テハ此缺如アルニ三個ノ目的ヲ達スル
驚ノナリ一ハ其後方ニハ食道存在シ食塊通行スル
時膨脹シ妨ケナキ爲メナリ二ハ頭ヲ前屈スルトキハ輪ノ後
方ヲ互ニ近ノ遠クル爲メナリ三ハ頭ヲ仰カシクルトキハ輪ノ後方ヲ
克ク近接セシムルカ爲メニ頸固ノ膣物就中動脉痛
ハ氣管ヲ壓迫ノ窒息ヲ起シ又タヒラトシーヲ要スルモ
往首ハアオルタノ動脉痛ニアラヒラトシーヲ行フヲ當

時心及ビ血管ノ解剖上位置ヲ干解セサルカ故ニ如何ナル手術ヲ行フヲ知ラス為ニ徒ラニ恐怖ノ念ヲ増スノミナラス甚シキニ至テハ何ノ為ニ此世ニ生ヲ知ラス何ノ為ニ其業ヲナスヤヲ疑フニ至ル

d) 會厭軟骨ノ外科手術器械ヲ挿入スルニ当テ喉頭内ニ於ケル各機ノ運動ノ起ル方根ヲ知ラス軟骨ヲ待テ各機ノ運動ヲ知ルヲ要ス

イテ器械ノ喉頭内ニ入ル好ケ但シ咽腔ノ位置ニ於テ器械ヲ送ル食道ニ入ルモノナリ會厭軟骨ハ蓋ノ如ク

二個ノ粘膜皺壁ニ由テ結合セラレ之ヲ左右ノ披裂軟骨ニ連ル此皺壁ニ由テ左右ノ披裂軟骨ニ連ル此皺壁ニ由テ左右ノ披裂軟骨ニ連ル此皺壁ニ由テ

ノハ甲状軟骨及ヒ環状軟骨之ヲ支ノ
ブリユヲレッヲ来ス下ハ梯ノテ前ニナルモノトシ甚ク後着タルヒ
ハ多ク来ハ之ノ骨板ノ来セル凹処ノ上ニ輪側ノ喉頭
ヲ打ケブリユクレッヲ来ス頭処セリ二ハ手術ノ喉頭ヲ握
振撲傷セシモノナリ之ニ基ヒメ治セリ」横隔膜ノ急攣
痙攣ニ由ヲ忽然大ナル吸気ヲ起シタル音ノ空気ノ
特ニ鼠入メ喉頭ヲ
皆ハ胸骨ノ打撲ニ由ニハ来ハモノトナセシトモ甚タ稀
真ニハ上方ニ斜ニ存スル声靭帯ノ音ハ上方ニ
廣ク開キタルヨリ知ク空気ノ壓セラレテ発スル音ナ
ヲ知ル

（第十四）Pharyngo-Oesophagus 之部

理学及ヒ外科学上要件

咽腔ハ鼻腔及ヒ口腔ノ後口ニアリ其前方ノ上方ハ鼻
腔ニ下方ハ口腔ニ上壁ハ頭蓋底ヲ以テ後壁
ハ第一ヨリ第六頸椎ニ至ル迄ニ由テナル下方ハ食道ニ移ル食道ニ於テハ
咽腔ノ後壁ハ最上ヨリ第六頸椎ニ由テ支柱セ
テルノ椎柱ト後壁トノ間ニ脈水腺ヲ之ノ腺腫起ル
キハ嚥下困難ヲ来ス二至ルヲアリ故ニ椎柱頸部ノ病
例之骨骸骨折骨膜骨骨膜ノ傷及ヒ其ノ他ノ病ヲ咽腔ヨリ
目撃シ之ヲ触知シ得ルモノニ咽腔後壁ト椎柱ト

同ノ術後ニ腹痛ヲ由テ嘔吐困難ヲ来タシナラント其ノ
部ニ喉腺ニ咽喉ニ破壊ノ膿ノ咽頭内ニ聚入シ窒息
即死セシムルニアリ又如斯膿ノ遠ク流サニハ椎柱ヲ再
ヒテ下垂起シ生活危険タルアリ咽腔ガンニハ多分
ニ鼻腔ガレーブ、ト名クルモノアリ之ハ頭蓋底面ヨリ発
シ真ノ腔ノ咽ニ通ジタル溜斗ノ用ニ充ル部ト骨
ヲ接スルカ如シ但食道ノ咽腔ニ接シタル部ノ最モ峡窄ナル部
ニシテ異物食道内ニ入リタルトキハ多分之ノ峡窄部ニ止ルモノニシテ
而シテ困難ナル手術ヲ施シ得ヘキ場所ナリ

b) 食道ノ延長ノ部ニ憩室ヲ生スルモノアリ之ハ頭蓋底面ヨリ発
シ真ノ腔ノ咽ニ通ジタル溜斗ノ用ニ充ル部ト骨
ヲ接スルカ如シ但食道ノ咽腔ニ接シタル部ノ最モ峡窄ナル部
ニシテ異物食道内ニ入リタルトキハ多分之ノ峡窄部ニ止ルモノニシテ
而シテ困難ナル手術ヲ施シ得ヘキ場所ナリ

也手術間異物ノ部ニ止リ中ハ多少真ノ部ニ発シ或ハ
潰瘍ヲ生ズルニ由テモ異物ヲ胃内ニ挿入セント善意
者ノ為ス異物ノ膚道ヲ通ルトキハ骨ヨリ食
長シ胃ニ達セシモノヽ疾体解剖ニ由テ実損セラレアリ食
道ノ知覚運動ヲ司ル故ニ延髄ヨリ発シモ食
道ニ達スルトキハ異物ノ存スル間ハ嚥下ノ度ニ蠕動ヲ起シ
ヲ由ル食道内ニ行ケハ始メ真皿ヲ使フカ如シ之ヲ知覚神
経ノ足ラサルカ為ニ食道ノ上ヘ口腔咽腔ヨリ脱落シタ
一般ニ異物ノ更ニ障碍ヲ起サヽル久ク滞在スルアリ
金ノ如キ誤テ含シ三週間食道ニ残留シ

一ノ障害ヲ起サズメ佗ニ至ヲ吐出セシモノアリ又一男癲癇
発作中ニ五銭銀貨ヲ呑ミ爾来毎食道内ニアリ
シモノ更ニ障害ヲ起サズメ佗ニ至テ吐出セリ銃丸ノ
物食道ヲ通ニ入リテ遂ニ其硬ヲ貫通シ化膿ヲ来タシ
或ハ傍大血管ヲ損傷メ必死ノ大出血ヲ起セシアリ食道
内ニ階餅異物草芥等ノ或ハ消化性異物食物ノ骨片ガ如キ残留
セルアリ食道ハ前ニモ述タルガ如ク其自然ニ任セ蠕動及
ビ消化ノ侍ツベキ機能ヲ有タルモノナリ故
ニ其試験ガ如キ蛙ヲ鉄線ヲ以テ縛シ鶏ニ之ヲ与ヘ食道内ニ
達セル丈ケ之ヲ引キ出シ検スルニ其周囲ノ突起前
述ニ消化ス如ク見ル然レドモ人ニ於テハ食道内ノ消化及ビ嚥

解力ハ甚ダ弱キカ故ニ之ヲ自然ニ任セ置クトキハ食道ノ
壊死ニ由テ瘻ヲ起シ室息スルニ及ブ故ニ障碍ヲ起シ室息スルニ
至ル異物ヲ除去スル或ハ胃ニ壓送スル