銀海精微　一

g 47c

F 1
キ−56

2冊 1-2
490.9
Gi
1
No. 1727
12 G 47

慶應義塾大学医学情報センター
昭和 47 年 6 月 30 日
富士川文庫
1133

内府秘傳眼科銀海精微

刻銀海精微引

銀海精微二卷未知何人氏所撰著蓋余生而目善病昔直掖垣余同寅友李冲涵公出以示余曰庶幾有當於目病方技乎余檢閲見其圖象立論及荅問宗旨俱一一分

析明盡若嘗飲上池所視見者取名銀海本之道藏其爲方書信乎精矣微矣数年竄遊所至每攜之笥中茲承乏河朔因檄所屬付剞劂蓋不欲祕之自私也雖然方亦未可盡拘泥也脉證有陰陽表

裏虛實之異斟酌損益存乎其人不然拘泥古法而不通變則是編也眞古人糟粕耳至易簡妙方則古宋陽里子所授魯東門伯所修六物不俟外假而自稱絶技又是書所不載也

賜進士第中憲大夫河南等處提
刑按察司副使奉
勅兵巡河北道前吏科左給事中
北海齊一經書

銀海精微序

夫眼者乃五臟之精華如日月麗天昭明而不可掩者也其首尾赤眥屬心其滿眼白睛屬肺其烏睛圓大屬肝其上下肉胞屬脾而中間一點黒瞳如漆者腎實主之是隨五臟各有症應然論其所主則瞳子之關繫重焉何以言之目者肝之外候也肝取木腎取水水能生木子肝母腎焉有子母而能相離者哉故肝腎之氣充則精彩光明肝腎之氣乏則昏矇眩暈烏輪赤暈刺痛浮漿此肝熱也眼生清涙枯黄遶睛此

肝虛也瞳人開大淡白偏斜此腎虛也瞳人焦小或帶微黃此腎熱也一虛一實以此驗之然人肝腎之氣相依而行孰知心者神之舍又所以爲肝腎之副馬所謂一而二二而一者也何則心主血肝藏血血能生熱凡熱冲發於眼皆當清心凉肝又不可固執其水生木之說特眼者輕膜裹水照徹四方溯源反本非天一之水又果孰爲主宰乎折而論之則拘急牽颺瞳青胞白痒而清淚不赤不痛是謂之風眼烏輪突起胞硬紅腫眵淚濕漿裹熱刺痛是謂熱眼眼

昏而淚胞腫而軟上壅朦朧酸澁微赤是謂之氣眼其或風與熱并則痒而浮赤風與氣搏則痒澁昏沉血熱交聚故生淫膚粟肉紅縷偷鍼之類氣血不至故有渺視胞垂雀目盲障之形淡紫而隱紅者爲虛熱鮮紅而蠹赤者爲實熱兩眥呈露生努肉者此心熱血旺白膜紅膜如傘紙者此氣滯血凝熱症瞳人內壅白睛帶濕色浮而赤者也冷症瞳人青綠白睛枯槁氣沉而濁也眼熱經久復有風冷所乘則赤爛眼中不赤但爲痰飲所注則作痛肝氣不順而挾熱

所以羞明熱氣畜聚傷胞所以胞合此外症之大槩然而五臟不可闕一脾與肺獨無預何也曰白睛帶赤或紅筋者其熱在肺上胞下瞼或目唇間如疥點者其熱在脾脾主味也五味之秀養諸中則精神發於外肺主氣也水火升降榮衛流轉非氣孰能使之前所以五臟各有症應於此又可推矣雖然眼之爲患多生於熱其間用藥大抵以清心凉肝調血順氣爲先有如腎家惡燥設遇虚症亦不過以當歸地黄輩潤養之輕用温藥不可也况乎肺能發燥肝亦好

潤古方率用杏仁乾柿飴糖砂蜜爲佐果非潤溢之意乎至於退翳一節尤關利害凡翳起於肺肺家受熱輕則朦朧重則生翳如珍珠如碎米者易散翳狀如梅花者難消雖翳自熱生然治法先退翳而後退熱者謂熱極生翳若先去赤熱則血爲之冰而翳不能去矣其有赤眼凉藥與之過多又且滌之以水不反掌而水凝矣眼特一團水且水性清澄尤不可拘拘於點洗喜怒失節嗜慾無度窮役眼力泣涕過多凌寒冲風當暑冒月且不避烟火飲啖熱多此皆患生

於臟腑者也專事點洗可乎哉有能靜坐澄神愛護目力放懷息慮心逸日休調和飲食以養之斟酌藥餌以平之明察秋毫斷可必矣

亭畢

慶應義塾大學醫學部北里圖書

銀海精微卷之上

五輪八郭總論

人有兩眼猶如天地之有兩曜視萬物察纖毫何所不至日月有一時之晦者風雲雷雨之所致也眼之失明者四氣七情之所害也大抵目爲五臟之精華一身之要係故五臟分五輪八卦名八廓五輪肝屬木曰風輪在眼爲烏睛心屬火曰血輪在眼爲二眥脾屬土曰肉輪在眼爲上下胞瞼肺屬金曰氣輪在眼爲白仁腎屬水曰水輪在眼爲瞳人至若八廓無位有名大腸之腑爲天廓脾胃之腑爲地廓命門之腑爲火廓腎之腑爲

水廓肝之腑爲風廓小腸之腑爲雷廓膽之腑爲山廓膀胱之腑爲澤廓斯爲眼目之根本而又藉血爲之胞絡或蘊積風熱或七情之氣鬱結不散上攻眼目各隨五臟所屬而見或腫而痛羞澁多淚或生障昏暗失明其症七十有二治之須究其源因風則散之熱則清凉之氣結則調順之切不可輕用針刀鉤割偶得其愈出乎僥倖或有愼而爲者則必爲終身之患也又不宜通用凉藥恐氷其血凝而不流亦成痼疾用藥當量人之老少氣體之虛實又有腎虛者亦令人眼目無光或生冷翳宜補煖下元滋補腎水北方患者多是日冒風沙夜卧熱炕二氣交蒸故使之用凉藥北方之人故與南方之人用藥有不同也疹痘之後毒氣鬱結於肝而氣不能瀉攻發於眼目傷於瞳人者素無治法也

五輪圖式



大眥赤者心之實也
大小眥爲血輪屬心火
黑精爲風輪屬肝木
瞳人爲水輪屬腎水
白仁爲氣輪屬肺金
上下胞瞼爲肉輪屬脾土
小眥赤者心之虛也

八廓圖式



天廓屬大腸傳送肺金乾卦
火廓屬心抱陽命門經離卦
地廓屬脾胃水谷之海坤卦
水廓屬腎經會陰坎卦
山廓屬膽經清淨艮卦
風廓屬肝經養化巽卦
雷廓屬心小腸經關泉震卦
澤廓屬膀胱經津液兊卦

五輪之圖

眼中赤脉血輪心　黒睛屬腎水輪深
白睛屬肺氣輪應　肝主風輪位亦輪
更有肉輪脾藏應　兩瞼屬脾胞胃侵

八廓之圖

肝爲養化之廓

腎與眼疾豈無由　酒色過時更惜憂
莫道睛光無太故　看看膜障裹雙眸

膽爲清淨之廓

視物依稀似霧中　時時手拭兩睛瞳

要知冷淚頻頻出　此是肝虚膽氣攻

膀胱津液之廓

膀胱屬水腎爲夫　冷淚相形本臟虚
赤脉縱横輪廓内　不逢妙手豈能甦

胃名水谷之廓

飲食相干在胃中　更加積熱兩相攻
瞼胞漸腫生睛赤　不觧中宮熱不通

命門抱陽之廓

内抱眞陽是命門　眼前花發色紛紛
不能補腎調肝氣　睛腫縱横似有根

太腸傳送之廓

傳送原因是本經　肺家壅滯熱相侵
只宜太腸依次第　閉澁之時醫患睛

小腸關泉之廓

小腸腑屬關泉廓　受病先從心裏傳
兩眥皆赤生痒痛　但調經脉自然痊

腎屬會陰之廓

視物如看霜霧多　擡頭畏日事如何
急宜補腎禁房室　免使昏朦不得過

六腑　三焦　膽　胃　太腸　小腸　膀胱

五臟　心　肝　脾　肺　腎

心屬火　肝屬木　脾屬土　肺屬金　腎屬水

五行生尅

金生水　水生木　木生火　火生土　土生金

金尅木　木尅土　土尅水　水尅火　火尅金

五臟表裏

心與小腸爲表裏　肝與膽爲表裏
脾與肺爲表裏　肺與大腸爲表裏
腎與膀胱爲表裏　三焦與命門爲表裏
一說命門與心胞絡爲表裏

三陰三陽經
心是手少陰經
腎是足少陰經
肺是手太陰經
脾是足太陰經
肝是足厥陰經
三焦是手少陽經
此是三陰三陽也

小腸是手太陽經
膀胱是足太陽經
大腸是手陽明經
胃是足陽明經
膽是足少陽經
命門是手厥陰經

七情

喜　怒　憂　思　悲　恐　驚

喜傷心其氣散
憂傷肺其氣聚
悲傷心胞其氣急
驚傷膽其氣亂
汗乃心之液
唾乃肺之液
苦入心經
辛入肺經
四氣
酒色財氣

淚乃肝之液
精乃腎之液
酸入肝經
鹹入腎經
風寒暑濕

怒傷肝其氣緊
思傷脾其氣結
恐傷腎其氣怯
此乃七情是也
涎乃脾之液
此五臟之液是也
甘入脾經
過度成病

大眥赤脉付睛



赤脉穿睛之症起於大眥者心之實也此心邪之侵肝也心屬火主血肝屬木主筋筋得血灌引漸至黑睛蔓延瞳人甚則看物如同隔絹是三焦相火炎上或勞心事太過或夜觀書史或能飲酒及好食五辛煎炒熱物法宜瀉火退熱老少不同治日積月累漸脉大者宜用小鋒針挑斷毒血流出赤脉斷矣若是乍發赤脉不用挑發點以陰一陽四藥服以四順八王當歸散凉肝之劑其病無不[illegible]矣又有暴横之人赤脉灌睛者此生相也非比前症治之

問曰人之患目太眥赤脉付睛太眥常壅澀看物不準者何也答曰乃心經之實熱况心或因思慮勞神或飲食太過致使三焦發熱心火愈熾故目常赤也治之雖攻少陰經心胞陽火廓先服三黄丸瀉其心火次以洗心散去其病用連丸常鎮三黄丸點用清

涼散服用清心利小腸經降火爲主用八正散

八正散

大黄　瞿麥　木通　梔子

滑石　甘草　車前子　扁蓄

右各等分爲末每服五錢水一鍾煎或入竹葉燈心葱頭食後服

導赤散

木通　甘草　梔子　黄栢

生地黄　知母

右每服細末四五錢水一鍾入竹葉燈心草同煎食

後服

七寶洗心散

當歸　赤芍藥　大黄各一兩　麻黄二兩

荊芥五錢　黄連一兩　梔子

右爲末每服三四錢水煎食後服

三黄丸

黄連　黄芩各一兩　大黄（三兩酒浸過炒）

右爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三十丸熱水下

肝連丸

白羊子肝一副勿令着水以線結定總筋吊起高

處瀘乾血水輕輕剝去外膜可將肝置於平木板
上以竹刀劃下肝粉筋膜不用肝粉和爲丸每服
五十丸茶送下

小眥赤脈傳睛



小眥赤脈傳睛者心之虛也與大眥不同治法分或

症治之五臟之主六腑之宗且屬南方候陽象德心之
君火生土王火乃土之母脾上實則心火虛矣治先瀉
其脾土之實後補其心之虛多因夜近燈火勞傷心
經致使心虛氣弱血運不行積在小眥之間故引此
二者以爲後之學者識然此症宜喫藥不必挑剪

瀉肝散

桔梗　黃芩　大黃　芒硝
梔子　車前子

九仙散

黃芩　荊芥　甘草　赤芍藥

菊花　川芎　當歸　木通

白芷

右等分爲末每服三錢用水煎食後服

駐景九　治心腎俱虚血氣不足下元衰憊服

楮實（微炒）　枸杞子　五味子　人參各一兩

熟地（酒浸焙乾二兩）　乳香（一兩制過）　肉蓯蓉（酒浸焙乾四兩）　川椒（去目炒乾一兩）

菟絲子（淘淨去沙土酒浸一宿蒸過焙乾四兩）　一方加當歸

右爲末煉蜜爲丸梧桐子大每服三十丸空心鹽湯下

補勞人參九　治心神恍惚

人參　白茯苓　白附子　續斷

遠志　菊花　甘草

右爲末煉蜜爲丸彈子大每服一丸細嚼食後桔梗湯下日三次

補虛人參九

茯苓　人參　續斷

白附子　三錢　甘草　白殭蠶各五錢　遠志各一兩

右爲末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸細嚼桔梗湯送下

努肉攀睛



努肉攀睛者與太眥赤脉之症同然此症者脾胃熱毒脾受肝邪多是七情欝結之人或夜思尋家筵無歇或飲酒樂慾致使三焦壅熱或肥壯之人血滯於太眥努肉發端之時多痒因手擦摩努肉漸漸生侵黑睛月積月累者爲實乍發乍痛者爲虚治法實者小針爲鈎鈎起剪斷些寛二五日剪痕收滿方可點陰二陽四藥吹點餘翳漸清避風忌口齋戒可也若乍發不宜鈎剪宜服藥點以淡丹藥可也三焦心火俱炎亦能生此疾治之須鈎割後宜服瀉脾除熱飲

瀉脾除熱飲

黄芪　防風　充蔚子　桔梗
大黄　黄芩　車前子　黄連
芒硝各一兩　毎服六錢水煎服

此症脾胃積熱相火胃火旺也若經久翳厚施實爲

睛者宜鉤剪剪訖次日用退翳捲雲散調津液點之日一次三黃湯加寒劑常點用對交丹加清涼散若筋腫厚大者宜翦剪畢頭處用火烙之使其再不復生愈後仍用三黃丸收功鎮其上炎之火

三黃連　治脾胃積熱致生此疾宜服加芩藥宣連

黃連　黃芩　大黃（各一兩）

若熱甚者脉紅盛者加黃栢石膏山梔子之類水煎食後溫服

金花丸

黃連　黃栢（各四兩）　黃芩　人參（各三兩）

桔梗（三兩半）　半夏（二兩）　梔子仁（兩）

右爲末煉蜜爲丸梧桐子大每服五十九茶下

雞冠蜆肉



雞冠蜆肉者心之熱酒之毒也脾胃壅滯肝臟積熱肉翳漸漸而長侵至黑睛發來萬大形似雞冠蜆肉

壅蔽太眥皆因相火胃火鬱結致生紅肉礙澁淚出治法初發之時用小鋒針破使惡血流出以輸其肉二三日又可針一次又法可鼻孔內剪竹葉捲作小筒彈進放血或小鋒針亦可右眼右孔左眼左孔服三黃加朴硝丸如彈子大夜臥噙化以沃上焦火正爲揚湯止沸莫若去薪息火肉翳者可烙三五度其效甚速烙可用軟皮剪孔濕搽眼眶烙則不傷四弦眥肉有虛有實虛切不可用剪剪則流血汪注變爲利害或壅如桃李之狀難治

問曰眼內生虛肉形似雞冠蜆肉者何也脾胃受風熱火旺脾土燥熱也治法年少者只宜瀉脾胃本臟若脾胃衰不受寒涼者宜瀉子瀉母之法瀉本臟用三黃湯加寒涼劑泄子用瀉肺湯瀉母用八正散瀉心湯主之點用清涼散加涼藥仍服三黃丸收功若積久大者亦宜剪剪後宜烙新發小者宜挑不用烙宜用退翳捲雲散點之（一二次）

三黃丸　八正散（二方前症條下）

瀉肺湯

治肺經得脾熱白仁變生雞冠蜆肉宜服

桑白皮（一兩去皮）　地骨皮（一兩去土）　甘草（七錢）　黃芩（一兩）

桔梗（一兩）

右爲末每服三四錢水煎食後服

瀉心湯　治心熱傷脾土燥熱宜服

大黄　黄芩　桔梗

黒參　馬兜鈴　防風　知母

右等分水煎食後服

兩瞼粘睛



兩瞼粘睛者脾胃風虚冷弱邪氣聚於瞼致胞瞼風赤濕爛肝膈虚熱眵粘四眥夜睡上下胞瞼膠凝粘緊血滯不散久則漸生翳膜治法宜除一陽三陜點若發年久眼皮漸長雖不是拳毛倒睫亦可夾起眼皮使露黒睛消散血氣瞼積有瘀血可劆可洗爛瘡者洗以碧天丹每日侵晨用桑白皮入盐燻洗或太寒後不皆落桑葉名爲鐵扇子煎洗極妙或菊花葉煎湯洗亦可此乃發年久有此症初發者無此症病耳

問曰眼患年久兩瞼粘而不開明者何也答曰脾胃受風冷所傷邪氣久積不散致血氣凝滯久注不開

時自眵淚含糊治法年久宜當歸活血煎神清散主之近患蟬花散密蒙花散主之若經久不愈久注不開眼皮長者雖不是拳毛倒睫亦可夾起眼皮點用重藥片腦不用

久患虛冷

當歸活血煎

治風冷久積兩瞼粘睛服之

當歸　黃芪　沒藥　川芎（血[illegible]暈者勿用）
蒼朮　荊芥　薄荷　熟地黃
羌活　菊花　麻黃

右等分為末煉蜜為丸如彈子大每食後細嚼一丸

清茶送下日進三次

久受風邪

神清散

治風毒傷胞瞼眼生翳膜日漸細小服之

川芎　薄荷　羌活　附米
藁本　防風　荊芥　川烏
枳殼　石膏　白芷　甘草
細辛　麻黃（各等分）

右為末每服三四錢食後清茶葱白湯送下

無疼痛時

蟬花散

治肝經蘊積熱毒傷肝上攻於目赤腫多淚

羞明一切風毒傷肝並皆治之

谷精草（去土） 菊花 蟬蛻 羌活

甘草 蒺藜 草决明 防風

川芎 梔子仁 密蒙花 荊芥穗

蔓荊子 黄芩 木賊

右各等分爲末毎服二錢食後用清茶調服或荊芥湯調服

無痛有羞明時服

密蒙花散

治眼羞明怕日肝膽虚損瞳人不清服之

密蒙花 羌活 菊花 蔓荊子

青箱子 石决明 蒺藜 木賊

枸杞子

右各等分爲末毎服三錢食後清茶送下脾胃虚者加白木五分



問曰眵淚粘濃出而不絶者何也答曰此肺之虛也肺受心火之邪熱所尅金得心火而衰故眵淚而不絶也宜先服艾煎丸以去肺與太腸經天廓之邪熱後用阿膠散而補之

艾煎丸

好艾葉（醋蒸焙乾）　薄荷　當歸　地骨皮

晩蚕沙（即蚕屎）　糯米　秦艽　綿黄芪

黄栢　桔梗

右爲末煉蜜爲丸每服三十五丸食後服桑白皮湯下或薄荷湯下

阿膠散

阿膠（蛤粉炒一兩）　鼠粘子（炒一兩）　甘草（五錢）　糯米（一兩）

馬兜鈴　款冬花　紫菀（各一兩）

右爲末每服六錢水煎服



問曰人患眼白仁常淚紅壅熱眵淚出而不絶者何也答曰此肺之實熱也肺屬金金生水金旺則水溢淚本通肝亦是肺之精華肺經實熱故眵淚出而不絶也治之須用瀉肺湯泄肺經之實熱後用省味金花丸降其肺火則與大腸傳道流利而天廓目經於度無上炎之火眵淚淨明矣

瀉肺湯

地骨皮　大黃　芒硝　桔梗
甘草（各一兩）

右每服五錢水煎

省味金花丸

川黃栢（二兩）　黃芩　知母　桔梗
連翹（各一兩）　薄荷（五錢）　地骨皮

右煉蜜爲丸每服五十丸桑白皮湯下或薄荷湯下

蠅翅黑花



問曰人之患眼自有黑花芒芒如蠅翅者何也答曰此腎水衰腎乃肝之母腎水不能濟於肝木則虛熱膽乃生於肝之傍肝木焦枯膽氣不足故行動舉止則眼中神水之中蕩漾有黑影如蠅翅者治之須用猪苓散順其肝腎之邪熱次用黑參湯以凉其肝則膽經清淨之廓無邪熱之所侵後用補腎丸黑花自減

猪苓散

木猪苓一兩　車前子五錢　木通　大黃
梔子　滑石　黑狗脊　匾蓄（各兩）一
蒼朮

右爲末每服三錢塩湯下

黑參湯

黑參　黃芩　生地黃　赤芍藥
菊花　青葙子　白蒺藜

右爲末每服四錢水煎服

補腎丸

石菖蒲　枸杞子　白茯苓　人參
山藥　澤瀉　兎絲子
肉蓯蓉（各兩）

右煉蜜爲丸每服五十丸塩湯下

目暗生花



與起坐生花同

目暗生花不能久視者何也此乃腎之虛也眼雖屬於竅門乃歸腎而爲主腎虛則眼昏或貪淫樂慾酒色過度使腎臟衰備稟受天真不全精神短少致障人神水不清眼目無力故目生花不能久視治之須用還精補腎丸使陰水足無不還矣

還精補腎丸

人參　白朮　茯苓　蒺藜
羗活　木賊　菊花　防風
肉蓯蓉　密蒙花　川芎　甘草
青箱子　山藥　牛膝各一兩　兎絲子

右爲細末煉蜜爲丸或煎服亦妙

熱極眵睛



眼目熱極珠碜淚出者也此陰陽不和五臟壅熱肝膈毒風上充忽然腫痛難忍五輪振起乃五臟熱極致使也宜服救睛散次用涼膈連翹散先點清涼散

後有九一冊

救睛散

川芎　防風　羌活　甘草

木賊　石膏　薄荷　菊花

石決明

右爲末毎服三錢清茶下

涼膈連翹散

連翹　大黃　黃連兩各一　薄荷

梔子　甘草　黃芩　朴硝兩各一

右水煎服

胞肉膠凝



胞肉膠凝與兩瞼粘睛頗同兩瞼粘睛瞼之病此症胞之病瞼熱則眵粘病之淺胞熱則膠粘病之深故分作兩症治之脾胃壅熱肝膈風充胞瞼內壽肉壅起爛濕眵粘膠凝氣血壅滯不能疏散積之年久黑睛生翳朦昧不明羞明怕日治法以陰一陽四吹點有瘀血可剃洗以桑白皮鐵扇子菊花當歸防風荊芥木賊薄荷鹽花之類胞肉積久堅硬厚實者番轉烙二三度而實其肉可也

問曰眼久注不開內生虛肉眵淚膠凝者何也答曰胃中有伏熱鬱於內也治宜通脾瀉胃湯加寒劑降大涼血去風宜點重藥內肉結原實者宜剃洗至肉平淨方止堅厚者亦烙無妨烙後清涼消毒膏敷之

通脾瀉胃湯

麥門冬　茺蔚子　防風　大黃

知母　天門冬　黄芩

熱甚者加　黄栢　石膏　朴硝　梔仁

一方又加黒參

右等分爲末毎服五錢水煎食前服

胞肉生瘡



胞肉生瘡與胞肉膠凝瞼生風粟兩瞼粘睛四症大同小異此皆上胞下瞼之病然中間分折治法各有輕重深淺剃洗針烙不同胞肉生瘡者此脾胃熱毒胞肉疙瘩或風粟變而爲瘡血熱化膿腐爛腥臊流汁流膿浸漬墨睛生翳眼如珠砂之色此症雖少不可不知治用陰二陽十藥日月桑白皮煎湯入枯礬塩化畨轉眼皮以鵝翎刷洗有瘡處以血竭乳香没藥輕粉彌佗僧或有瘡處烙一二下無妨

問曰胞肉生瘡碍澁睛珠者何也答曰胃得心熱也治宜瀉心火觧胃熱用八正散三黄湯之類痛者用

沒藥散有瘡處仍用劆洗點以清凉及重藥肉虛者宜灸外用清凉消毒膏敷之

八正散（在前太眥赤脉條下）

三黄湯（在前努肉條下）

血滯疼甚服

沒藥散 治心脾胃得熱致胞肉生瘡宜服

沒藥（少）

大黄（多用）

眞血竭（破積血止痛去赤）

朴硝（多）

右照多少加減爲末毎服二三錢食後用茶清調下

瞼生風粟



瞼生風粟者瞼間積血年久致生風粟與眵粘症同眵粘者無風粟故又作一症胞者上胞也瞼者下瞼也此脾胃壅熱致令胞瞼之間漸生風粟如米甚如楊梅之狀摩擦瞳人黒睛有翳治法番轉瞼風粟逐

箇用鋒針安出針三五度亦烙更妙睛有翳者用陰三陽五藥吹點二三夜吹一次忌口動風動血之物莫與可也

問曰下臉生風粟如楊梅之狀者何也答曰脾得邪熱血滯不行致生風粟紅纍不平宜剃洗脾熱用瀉脾湯久患宜烙點用清凉可也

瀉脾湯

人參　黄芩　大黄　桔梗

白茯苓　芒硝　茺蔚子二兩　白芍藥一兩

黑參兩半　細辛　白花各一兩

右各等分加減毎服四五錢水煎服

天行赤眼



天行赤眼者謂天地流行毒氣能傳染於人一人害眼傳於一家不約大小皆傳一遍是謂天行赤眼腫痛沙澁難開或五日而愈此一候之氣其病安矣治

法此症再不可剃洗只用童子小便前黄連露宿温洗日進五遍以解惡毒之氣更用胡宣二連礬雄黄共研細調姜汁點之皆逼其惡涙其痛立止或酒調散服之二三貼無妨此症只氣候瘴毒之染雖腫痛之重終不傷黒睛瞳人也

問曰一人患眼傳於一家者何也答曰不時流行瘴毒之氣相染治宜解毒凉血清熱痛甚者服用洗肝散七寶洗心散點用清凉散加解毒但此症與內無損極甚者二七不療自愈切不可剃洗去血

（方在大眥赤脉條下）

七寶洗心散

洗肝散　治暴發赤腫不行赤眼時常眼痛宜服

大黄　梔子　防風　薄荷

當歸　川芎　羌活　甘草

右一兩爲末食後熱水調二三錢服

太患後生翳



大患後生翳者與天行赤眼同一症也何以分兩症治之天行赤眼只一候或七日愈矣雖同無生翳之患大患者初起陡然而起腫痛發來甚重沙澁難忍增寒作熱坐臥不安或通夜行至達旦羞明怕日淚出如湯鼻涕溏流兩眼腫起如桃日夜呻唫飲食無味二七不愈遂生翳如黄膿或瘡占在風輪其腦牽痛治宜治胡宜二連藥聚前研細調姜汁點用苦桃葉側栢葉菊葉柳葉薰洗服宜四順八正導赤散雖療痊可赤昏昧三個月方得復舊失於調治喪明必矣

問曰天行赤眼後生白翳者何也答曰邪氣甚傷經絡也外邪甚則傷肝肝受傷則生翳治宜四順散細辛湯點用熊膽膏翳厚者用九一丹點

四順湯　治經絡得熱大患後生翳宜服

大黄　當歸　甘草　赤芍藥

右各等分每服四五錢水煎食後服

細辛湯　治風邪傷肝致眼生翳

羌蔚子　黒參　黄芩　桔梗

大黄　車前子　木通　生地黄

甘草

右各等分水煎食後服

暴露赤眼生翳



暴露赤眼生翳者與天行赤眼同理天行赤眼者能傳染於人暴露赤眼但患於一人而無傳染之症天行者雖痛腫而无翳其暴露者痛而生翳故此有別治法即其所因量其老少虛實熱則清涼之氣結則調順之此眼縱有瘀血切不可剃洗亦不可峻補藥宜酒煎散發散內有麻黃蒼朮或大黃當歸散疏通血氣點以淡藥九一丹如翳厚珍珠散點之洗以黃連當歸防風菊花側栢葉赤芍藥薄荷荊芥之類

酒煎散

漢防已	防風	甘草	荊芥
當歸	赤芍藥	牛旁子	乾菊花

右各等分酒煎食後溫服

大黃當歸散　治眼壅腫瘀血凝滯不散攻發生翳眼

當歸（酒浸二錢）　菊花（三錢）　大黃（酒蒸）　黃芩（各一兩）

紅花（炙用） 蘇木 梔子（酒炒） 木賊

右水煎食後服

暴風客熱



暴風客熱與暴露赤眼同也暴露者肝心二經病也故赤而痛致黑睛生翳暴風客熱者肝肺二經病故白仁生虛翳四圍壅遶朝伏黑睛四入白仁紅翳壅起痛澁難開故分暴露與暴風有别之症暴者乍也驟也陡然而起治法疏通退熱凉膈瀉肝增减酒調之劑發散風熱恪云熱眼忌酒孰知酒能能血藥無酒不能及於頭自也此眼不同剩洗不可點凉藥暴客之和來之速去之亦速耳非比五臟六腑蘊積發歇不時之症同俗為傷寒眼也

問曰白仁壅起包小烏睛疼痛難開者何也此是肺經受毒風不散久則發熱攻人眼中致令白睛浮腫名曰暴風客熱宜服酒調散補肝湯用搜風煎洗眼

瀉肝散　治眼發歇不時

羗活　黄芩　黒參（各半兩）　桔梗

大黄　芒硝　地骨皮（各一兩）

右每服六錢水煎服

補肝湯

藁本（一兩）　白芷　車前子　石決明

天麻　赤芍藥　防風　細辛（各一兩）

右每服三錢茶湯調下

搜風煎　洗眼治眼中有黒花

陳皮　秦艽　防風　細辛（各一兩）

黄連　木香（各五錢）

右爲末水一鍾浸一宿去査入龍腦一錢蜜四兩漫火熬成膏點之不用蜜煎湯薫亦可又以當歸活血煎主之腫痛甚亦用雙解散酒調散發表之點用重藥加姜粉以辛散之

雙解散

防風　川芎　歸尾　赤芍藥

大黄　麻黄　薄荷　連翹

芒硝　黄芩　桔梗　石膏

滑石　荊芥　甘草　山梔

白朮（實者去之）

右等分水煎食後温服如暴發加葱三根

風甚眼痛

桑螵蛸酒調散　治眼紅痛有血翳壅腫服之

當歸　甘草　大黄　赤芍藥

菊花　蒼朮　桑螵蛸　羌活

麻黄　茺蔚子

右各等分用水煎食後加酒温服如熱甚加大黄朴硝或爲末温服酒調服三錢

痛如神祟



疼如神祟舊無根基只依痛得怪異或日痛而夜愈或夜痛而日愈如艾之灸針之刺忽來忽往無蹤無跡號曰痛如神祟豈有神祟爲禍而害眼孰知陰陽偏勝動靜氣血攻擊使然亦有信巫之地因所禱厭

痕作福而愈者有之孰知病勢將除偶因而愈曰神祟眼非也治法痛時只將艾葱熨之服酒煎散一二貼住痛點以時藥洗以歸尾白芷防風芍藥川芎生地黄止痛散血可也

問曰眼内不紅不赤不腫作痛如神祟者何也答曰陰陽升降不和氣血偏勝相攻使然或有血虗者下午痛或有氣旺太甚者上晝痛下晝痛者宜服助陽和血湯上晝痛者宜服酒調洗肝散明目流氣飲點清涼之藥又有一樣眼時時痛如針刺此是新血與舊血相攻擊治法亦同

血氣虚服

助陽和血湯　治血氣不調如神祟痛如針刺服之

蔓荊子三分　香白芷三分　柴胡　黄芪
升麻各四分　甘草炙　當歸身（酒浸）　防風各五分

右作一貼水一鍾半煎八分温服臨避風處睡可也
又并滓服

熱氣攻痛

酒調洗肝散　治眼熱氣上攻無時黒睛痛者服之

黒參　大黄　桔梗　知母
朴硝　梔子　黄芩　熱甚者加

生地歸尾之類

右爲末每服二三钱温酒調下日服二次

熱氣欝結

明目流氣飲　治氣欝眼目赤腫服之

菊花　細辛　大黄　牛蒡子

川芎　蒺藜　荊芥　玄參

甘草　蔓荊子　防風　梔子

黄芩　木賊　蒼朮　草决明

右各等分水煎食後服

痛如針刺



眼痛如針刺者即是神祟症中如艾之灸如針之刺痛同然此症皆因心臟潛伏熱毒風壅在於膈間目眩頭疼眼系常急夜卧澁痛淚出難開時時如針刺相似急服瀉心湯八正散之劑口含水嚼以雄黄散

正其頭點以時藥消散血氣洗以側栢葉防風荊芥薄荷黃連生地黃之類黑睛有星如釘之釘凹進痛如針刺點以淡藥可也

瀉心湯　方在前雜症內

入正散　方在前胞肉生瘡症內

傷寒熱病後外障



傷寒熱病外障者蓋由大病新瘥出早形骸羸瘦臟腑未實氣血尚虛陰陽偏勝未復縱口多毒五辛油膩煎炒一切熱物之類蓄積諸毒衆聚停留于內熱邪必表于外攻冲於眼眼者五臟六腑之精華其症各現於五輪此症發時赤腫淚出痛澁難開瞳人闊大黑花繚亂不能遠視此血虛也治法點以時藥洗以散風前證活血之藥不宜剩洗只平補臟腑損其有餘益其不足是爲活法也宜忌三兩月可也

問曰兩目或發腫痛者何也答曰氣血不足虛陽攻上故也此症縱有疼痛切不可服瀉藥凉藥只宜和

觧之痛腫甚者明月細辛湯熊膽丸地黄湯之類點
三七丹腦射不用又不可剃洗
風熱作痛
明月細辛湯　治熱病後患腫痛大便結羞明服
川芎　生地黄　蔓荊子　歸尾
白茯苓　藁本　荊芥　防風
麻黄根　羌活　川椒　細辛
密蒙花
右各等分食後温服日二次
熊膽丸　治肝膽得熱火和爲病用清熱觧毒

能膽一箇　石决明　車前子　澤瀉
細辛（各兩）一　乾地黄　茺蔚子　牛膽一箇
龍膽草
右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服四十九丸食後
温酒送下
地黄湯　治眼久病昏澁因發而久不愈宜服
防風　羌活　人參　白茯苓
當歸　熟地黄　黄連　黄芩
右各等分水煎温服

風牽出瞼



風牽出瞼者脾胃受風壅毒出胞瞼之間瞼受風而皮緊脾受風則肉壅此皮際肉壅風牽出瞼涙出汪汪無分四季此土陷不能隄水也水漬於瞼偎爛之狀治法先用摩風膏刮散皮外風邪塗以白斂膏消散風毒番轉瞼皮烙三五度無妨此症一年半載易治若年久肉堅難治若眼有紅筋貫上黑睛有翳有膜吹以丹藥痒塲洗以碧天丹此症大抵眼弦之病也此症大風瘷瘋之人面部所牽多受濕病症難以調治故名風牽出瞼

問曰下瞼番出久不收涙出汪汪者何也答曰脾經受風邪所傷致土壞不能隄水也治法肉堅厚者用灸烙三十五度至皮轉爲度服用夜光柳紅丸外用摩風膏摩擦之點用重藥少加凉

夜光柳紅丸　治風邪傷胞瞼致風牽出瞼不收宜服

人參　川芎　荊芥　白芷
川烏（火煨）　南星　石膏各二兩　石決明
草烏（去火毒 炮炒用）　藁本　雄黃　細辛
當歸　蒲黃　蒼朮（浸炒）　防風
薄荷　藿香　全蝎各二兩　何首烏（兩）
羌活三兩　甘松一兩
右爲末煉蜜爲丸每服三十丸茶清下

摩風膏

治胞瞼受風或疼痛諸痛處可摩可貼
木香　當歸　白芷　防風
細辛　藁本　黑附子　没藥
骨碎補（各兩）一　川烏　赤芍藥　肉桂（各兩）
猪脂　牛酥　鵝脂（各兩）四
右爲末香油八兩浸一次一日砂鍋內熬入牛酥鵝脂同熬成以手摩擦有瘡處或半身不遂用砂弓刮之使風氣散

風牽喎斜



風牽喎斜者雖與風牽出瞼同喎斜者脾胃虛房事不節脾胃有毒夜臥多痰或醉飽坐臥當風貪凉左右忽受風牽喎斜眼内赤痒時時顫動其眼血絲四起瞳人不開大視物濛濛甚至半身不遂治法急用摩風膏擦摩面部更以刮沙方所患風下邊手臂通刮或通身一刮一日一遍用太磁青碗搗碎入磁石多寡摟麵糊爲餅烘熟貼面對鼻一邊左喎貼右右喎貼左貼至擯口眼正其藥取起又可灸夾車耳門穴開口取之太陽人中承漿喎左灸右喎右灸左近患者易治若年久難治

問曰目睛斜視倒日者何也答曰肝經受風邪所牽使其筋緩縮不利治法宜灸火發散風邪以加全蝎白附子南星半夏夜光柳紅丸外用摩風膏導引發散目睛必轉

灸火穴

太陽　夾車　耳門　聽會

耳尖　風池（各一穴）

夜光柳紅丸（方在前出臉症內）

摩風膏（方亦在前症內）

被物撞破



被物撞破者並無所患有所因者三此外因也全然無事誤被物撞破或打着或跌着或撞破傷胞瞼也積血紫青撞破白仁傷其硬殼此不能爲害惟撞破黄仁風輪血灌瞳人兼冰輪混雜最爲利害之症控痛惡瞳忍澁難開治法服以酒調散熨以葱艾或専以生地黄搗爛作餅烘熱貼一日一換以散其血如無生地黄用芙蓉葉無葉用根去泥粗皮用白皮搗爛烘熱貼亦可若眼胞青黒搗生蘿蔔護貼切宜將息避風忌口動風動血之物諸般血肉莫吃新撞者易治若撞久血凝不散無痰無痛者難治也

問曰並無所患誤被物撞破或生翳者何也答曰外傷也與内無損治法初起者宜散血爲主痛甚者没藥散止之若至血散變生白翳爲不治之症也

（方在前胞肉生瘡症内）

没藥散

撞刺生翳



被物撞刺生翳者與撞破一理然刺被竹木簽刺痕傷損血灌滲遂生血翳磣澁淚出紅筋滿目此症外傷與患眼生翳不同患眼者五臟六腑之毒發出爲有根病也刺傷者外傷與內無預治法與同症同寬

一七之後痕變成翳可用輕丹少吹點忌淫慾嗔怒避風將息失於調治潰痛發腫傷於風輪釀成太患或至瞎進無治法也

血灌瞳人



血灌瞳人者因毒血灌入金井瞳人水內也猶如水

流入井中之状清濁相混時痛澁紅光滿目視物漾漾如隔綃看物若烟霧中然先患一隻後乃相牽俱損此症有三肝症血熱日積月累灌入瞳人血凝入水此關乎肝腎二經病也此血難退撞破之血鮮而熱灌雖甚退之速又有開金針失手撥著黄仁亦有瘀血灌入瞳人舉此三症治法頗同亦用大黄當歸散沒藥散墜血明目丸前被物刺破及撞刺生翳并血灌瞳人皆可服前三料藥其效甚大或生地黄芙蓉根搗爛烘貼三症通可用之或葱艾熨亦可或可方而或可圓活法而行不可拘執其方焉而獲功哉

問曰人患眼目無内患忽因物刺着胞瞼睛珠血積不散或瘀血灌入瞳人或用針悞損惡腫痛難忍或因惡拳打着睛珠脫出一二分者將何治法答曰打傷之時搗爛生地黄敷之以散其血先服止痛沒藥散後服墜翳明目丸若因傷風服除風湯若打着睛珠流出者以手掌心揉進珠亦以生地黄敷之若無生地黄用乾地黄酒浸濕搗爛亦可服止痛沒藥散

沒藥散

沒藥　血竭　大黄　朴硝

右爲末每服三錢酒調下茶下亦可

墜翳明月丸

石决明　川芎　五味子　知母

山藥（各一两）　人參　細辛

右為末煉蜜為丸清茶送下

除風湯

防風　車前子　藁本　五味五

細辛　川芎　桔梗

右每服三錢白湯送下或水煎服

血翳包睛



問曰人之患血翳遮兩睛者何也答曰皆因心經發熱肝臟虛勞受邪熱致令眼中赤澁腫痛淚出漸有赤脉通睛常時舉發久則發筋結厚遮滿烏睛如赤肉之相故名曰血翳包睛宜服瀉心湯次以修肝活

血湯

瀉心湯

黄連　黄芩　大黄　連翹
荊芥　赤芍藥　車前子　薄荷
菊花各一両

右㕮咀毎服四五錢水煎服

修肝治血湯

當歸　生地黄　赤芍（各両半）　川芎
羌活（各七錢）　黄芪　防風　黄連
大黄　薄荷　連翹　菊花

白蒺藜各一両

右毎服四五錢水煎入酒二盞温服

問曰血翳包睛者何也答曰心熱血旺也此病初患易治若至血散盡難消痛時用破血紅花散當歸龍膽湯點用清涼散

當歸龍膽湯

防風　石膏　柴胡　羌活
五味子　升麻　甘草　黄連（酒洗）
黄芪　黄芩（酒洗）　黄栢（酒洗）　當歸
龍膽草　赤芍藥（各五錢）

右㕮咀毎服五銭水煎至二碗去査入酒少許臨卧熱服忌言語

破血紅花散

當歸稍	川芎	赤芍藥	枳殼
蘇葉	連翹	黄連	黄芩
梔子	大黄	蘇木	紅花
白芷	薄荷	升麻	

右各等分水煎加酒三盞温服

瞼生偷針



問曰人之患目瞼生小節偷名偷針者何也荅曰陽明胃經之熱毒也或因食壅熱之物或飲酒太過使胃經上充於眼目故瞼背之間時發瘡毒俗名偷針此疽番轉瞼皮剃洗瘀血點用清凉散先宜服退赤散後用通精散瀉脾飲

退赤散

黃芩　黃連　白芷　當歸
赤芍藥　梔子　桑白皮　木通
桔梗　連翹　每服水煎食後服ス

通精散

防風　川芎　當歸　赤芍藥
大黃　芒硝　蒺藜　石膏
黃芩　甘草　桔梗　牙硝
黃連　羌活　滑石　荊芥
右用姜三片ヲ食後服ス

瀉脾飲

茺蔚子　防風　黃芩　玄參
梔子　石膏　大黃炙　知母
黃栢

黑翳如珠



黒睛如珠者腎肝俱勞七情鬱結之人毒風攻充熱極淚出難開疼痛甚至水輪突起黒翳如豆如珠大小不定撐起眼胞砂澁礙人眼睛難以運動寢食不安先患一隻后乃相牽俱損治法用小鋒針逐箇横穿破其黒翳中有惡水流出即平勢若拾芥瞬息痊安眼即能開設若不諳此療服涼劑點涼藥靡有其功小兒如此患者多是瘡眼其黒翳起或如小香菰之狀不宜針其治法載小兒瘡眼條下其針破翳根處宜淡丹藥吹點消磨翳根

問曰風輪生翳如珠如蠅頭如蟹眼者何也答曰肝腎二經風熱氣鬱也治法久積黒翳高者宜挑破珠頭疼者宜撥雲湯明目細辛湯主之熱甚者當歸龍膽湯主之點用二八丹調乳汁用未成此症以暴發推之

撥雲湯　治眼黒翳如珠蟹睛疼痛風氣傷肝腎二經

宜服之

黄茋（蜜炙）　細辛　生薑　乾葛

川芎（熱者除之）　柴胡　荊芥　藁本

甘草　升麻　當歸　知母

羌活　防風　黄栢

右爲末毎服六七銭水煎服

明目細辛湯　（方在傷寒熱病後症內）

當歸龍膽湯　（方在前血翳包睛症內）

蠏睛疼痛



蠏睛疼痛者如黒翳同症起於瞳人肝腎之病其翳如豆如珠蠏睛者其翳起占瞳人翳根小而苗大此乃貼膈之病膈中壅毒貼氣伏熱赤澁淚出疼痛難開羞明怕日其翳發起尖高如蠏睛一般形狀治法與前症同用小鋒針針出惡水流盡即平吹點以淡淡丹藥消其翳根其服藥不同前症宜用瀉肝補腎之劑服之空心服補腎之藥飯後服瀉肝散

瀉肝散

蟬蛻　防風　蒺藜（炒）　當歸

補腎散

密蒙花　木賊　川芎　菊花
荆芥　茯苓　石决明（煅過）　枸杞子
知母　黄栢　青塩

右各等分水煎空心服

旋螺尖起



旋螺尖起者熱積於肝脂毒纏於膈門充攻睛珠疼痛中央瞳人漸變青白色忽然凸起血絲纏遶此乃是膜入水輪二家併熱旋起尖來状若螺螄尾遂號旋螺尖證治法宜陰二陽四丹吹點或調鱔魚血點尖處若年久須有鋒針對瞳人中央針入半分放出惡水此乃取平之法紙封將息避風忌口十數日可也

服用雙解散鬱金酒調散

鬱金酒調散

黄芩　鬱金　大黄　防風
梔子　當歸　川芎　赤芍藥

龍膽草

右爲末毎服三錢温酒調下食後服二次

突起睛高



突起睛高險峻利害之症也同前旋螺尖大不伴矣皆因五臟毒風所蘊熱極充眼者内屬五臟外現五輪五臟之氣毒攻五輪之矓初起麻木疼痛汪汪淚出病勢洶湧卒暴之變莫測非精於龍木之奥旨不能措手矣諺云眼不醫不瞎正此也苟非其人殆有甚焉非徒無益而反害之治法揚湯止沸莫若去薪息火急投酒調散酒煎散宜退五臟之毒熱搗葱艾熨五輪之突起消除疼痛洗以白芷細辛當歸蒼朮麻黄防風羗活未可與點藥宜忌口葷腥將息避風治若稍遲或控膿或突出一寸高者至此之際須鋒針針出惡水疼痛方止睛高取平耳無尤之效也

酒調散

當歸　甘草　赤芍藥　菊花
羗活　桑螵蛸　茺蔚子　防風
荊芥　木賊
右各等分水煎食後加酒三盞温服

硬瞼硬睛



硬瞼硬睛者胞瞼睛珠俱木痛澁難運膈間積熱肝風上壅氣血凝滯睛瞼堅硬血旺氣虛弱之人或飲酒太腸堅結多受是症先患一眼後乃相牽俱損漸生翳膜治法初發時宜摩風膏摩去風邪散運血氣或煎生地黃當歸川芎赤芍白芷羗活薫洗日三度宜瀉肝膈之熱點以時藥若積年久瞼有瘀血宜劆洗黒睛有翳有膜可吹可點

問曰眼患經久瞼胞睛珠俱木不運者何也荅曰血氣受邪凝閉不行故也治法宜劆洗服用當歸活血煎助陽和血湯點用重藥加辛熱姜粉之類

當歸活血煎（方在前兩瞼粘睛症內）
助陽和血湯（方在前傷寒熱病症內）

白陷魚鱗



白陷魚鱗者肝肺二經積熱充壅攻上致黒睛遂生白翳如魚鱗鋪砌之狀或如棗花中有白陷發歇不時或發或聚疼痛淚出然婦人多生此病何也苦樂不由已出七情鬱結不舒毒蘊於肝肝者血之室也婦人以血爲主血傷則肝風黒仁風輪多生是翳甚至白陷釘入黄仁引血相授漸成太患額頭焦痛用摩頂膏摩擦封貼於額頂處用陰二陽四丹吹點或用青鹽黄泥固濟包煨熟研末以鴨毛蘸點於魚鱗中日一次又能除此翳耳

問曰黒睛生白翳凹入不平成陷者何也答曰肝虚血衰也故肝虚則受風風甚則作痛血衰則成陷治法點用珍珠二八丹之類

痛甚宜服沒藥散（方在血灌瞳人病内）

酒調散（方在前突起睛高病内）

羞明而不痛者宜服桑螵蛸酒調散（方在暴風客熱症内）

蟬花散

密蒙花散（二方在兩瞼粘睛症内）

花翳白陷



與棗花白陷同

人之患眼生翳如蘿蔔花或魚鱗子入陷如碎米者此肝經熱毒入腦致眼中忽然腫痛赤澁淚出不明頭痛鼻塞乃是肝風熱極腦中風熱極致使然也宜服瀉肝散加味脩肝散主之

瀉肝散

黒參　大黃　黃芩　知母
桔梗　車前子（各兩）　羗活　龍膽草
當歸　芒硝

右爲末等分水煎服

加味脩肝散

羌活　防風　桑螵蛸　梔子
薄荷　當歸　赤芍藥　甘草
麻黃　加連翹　菊花　木賊
川芎　白蒺藜　大黃　黃芩
荊芥各一兩

右爲末各等分水煎入酒溫服

蟬花散

蟬蛻　菊花　蒺藜　蔓荊子
草决明　車前子　防風　黃芩
甘草

右等溫水煎服

補腎明目丸　方在前蝉翅黑花症內

密蒙花散　方在前兩瞼粘睛症內

水蝦翳深



氷蝦翳深者黑睛上生翳如氷蝦形状因而名曰氷鰕也太柢與魚鱗白陷同也亦因肝經有熱微微小

小占在眼之風輪黒睛含糊清眵塡粘於翳之低處作時赤澁涙出眵滿矇蔽瞳人一重如鼻涕或黄或白看則如膜遮瞳一般蘸却又生日久能致損眼發歇來往治法宜陰二陽四三夜吹一次稍退宜點侵晨用菊花側栢葉黄連歸鬚桑白皮之類煎湯日洗二三次服撥雲退翳散

撥雲退翳散

楮實子　薄荷各五錢　川芎（一两五錢）　黄連

菊花　蟬蛻各五錢　瓜蔞根（生用三錢）　蔓荊子

密蒙花　蛇退各五錢　荊芥穗　香白芷

木賊　防風　甘草各五錢

右爲末煉蜜爲丸如櫻桃大每一两作十丸每服一丸一日二服

治眼引湯于後

氣障木香煎湯下

眼常昏暗菊花好茶下

眼睛無神懶視當歸湯送下

婦人血暈當歸湯下

虚弱之人十全大補湯下

玉翳浮瞞



玉翳者風充入腦積熱肝膈發歇疼痛失於調治日久積累血凝不散結成白翳遮瞞瞳人如玉色相似立名玉翳浮瞞如此之狀有進有退有紅有淚發歇未定治法用陰三陽二藥吹點一次眼淚帶藥汪汪流出如此之狀甚翳膜必能漸漸收捲渾如磨鏡塵埃去淨明必復矣若發年久無進無退不紅不痛縱有丹藥之驗刀針之利終無措手之處撥雲墜翳眼藥之聖功效不能施為縱然公侯王孫若受此疾為廢人矣雖有千金之貴天下之翳熟近莫能其出手也

問曰人之患眼翳如玉色遮瞞烏睛者何也答曰此同肝風攻充入腦積熱在於肝膈之間久乃腎虛致眼中常發熱或赤痛初則紅腫赤脉穿睛漸漸生白翳膜初起如碎米久則成片遮瞞烏睛凝結如玉色名曰玉翳遮睛治之宜服瀉肝散明目菊花散通明

補腎丸

瀉肝散　治胃中熱
歸尾　大黄　黄芩　桔梗
知母　茺蔚子　芒硝　車前子
防風　赤芍藥　梔子　連翹
薄荷
右各等分水煎服

明目菊花散
菊花　車前子　熟地黄　木賊
蒙花　薄荷　連翹　白蒺藜
右各等分每服六錢水煎服

防風　川芎　荊芥穗　甘草
右各等分水煎服

通明補腎丸
楮實子　五味子　枸杞子酪一　人參
兎絲子　肉蓯蓉　菊花　熟地黄
當歸　牛膝　知母　黄栢
青鹽各一两
右煉蜜爲丸每服五十丸空心鹽湯下

膜入水輪



膜入水輪者肝臟積熱邪在肺經此金剋木之候也故黄仁作時生瘡白色可後又發日往月來致膜漸入水輪此翳之根也如氷之得土變化異常遂生瘡不退日積月累久成大患謂之膜入水輪流汁流膿

痛澁難開右患傳左右患傳右治法宜明藥之時驗以葱艾吹以丹藥服以湯散無有不效若傷日久不痛不疼不淚不紅如釘入木如玉之有瑕玷如玳瑁之有黒點此黄仁與水輪變白定矣縱使岐黄龍木再世亦不能爲也

問曰風輪生瘡或突起愈後變成白翳久不散者何也荅曰肝木衰金氣甚也此病初患時有疼有淚治宜退血瀉肺金修肝活血無疼無淚淡白色者宜服補腎活血之劑治之

瀉肺散

當歸　黃芩（各一兩）　桔梗　麻黃
枳殼（各半兩）　秦皮　葶藶　菊花
旋覆花　生地黃　防風　白芷
甘草　玄參　梔子（各兩）　地骨皮（八錢）

右爲末每服二錢桑白皮煎湯下

脩肝活血湯

歸尾　赤芍（各一兩五錢）　川芎　羗活（各七錢）
黃芪　防風　黃連　大黃（各三錢）
薄荷　連翹　白蒺藜　菊花（各一兩）

右每服四錢水煎入酒服

風輪釘翳



釘翳根深者與膜入水輪同也此乃勞傷肝經或性燥急促之人啼哭含情之婦飲強制鬱傷於肝赤澁難開痛牽頭腦淚出羞明怕日釘翳且深接引黃仁

根深血援絡不移治法宜用退熱飲去風散血之劑或痛甚服酒調散工二貼頭痛熨以葱艾洗以防風川芎菊花歸尾白芷麻黃羌活荆芥之類量翳太小輕重吹以丹藥將息避風大忌淫慾嗔怒不疼不痛亦爲不治之症也

問曰風輪生翳如針如麻米者何也荅曰肝虛火動也此症多是性燥之人或思慮太過所致治法疼痛甚者宜服洗肝散糖煎散點用珍珠散加涼膈散方俱在前

修肝散

梔子　薄荷　防風　當歸
甘草　連翹　大黃　黃芩
蒼朮　羌活　菊花　木賊
赤芍藥　麻黃

右各等分爲末每服二錢食後蜜水調下或煎日進二三服

糖煎散

龍膽草　防風　防已　大黃
荆芥　赤芍藥　當歸　甘草
川芎

右各等分爲末水煎臨時服入砂糖少許同服

黄膜下垂



黄膜下垂者脾胃熱風結血凝氣滞膏脂窒塞血運不能通故生是疾發歇無時痛澁淚出漸生黄膜下垂發則膜舒退則膜捲胞皮下垂羞明怕日雖擧不張黄膜漸長遮瞞瞳人也甚至滿目皆黄難辨人物治法雖不是拳毛倒睫之症亦不可夾此眼皮使露黒睛黄膜氣舒發歇年久可夾乍發不宜夾治宜通脾寫胃撥雲八正之剤以對充之加片腦少許如有淚退之速無淚退之遲忌口齋戒使衰其血易於調理也又有一症黄膜從下生上爲之黄膜上充大抵治同厚者宜挑剪

問曰白睛黄赤生翳如赤膜者何也答曰脾胃得肝木克土之候也治宜省味金花丸去其黄膜後用錠砂平胃丸收功點用重藥腦不可用少許

鍼砂平胃丸　久服平胃氣去肝邪

蒼木　厚朴　陳皮　甘草

針砂

右各等分㕮咀爲末煉蜜爲丸如菉豆大每服五十丸空心米湯下

肖味金花丸　治脾胃積熱致生黄膜

梔子　黄芩　黄栢　桑白皮

地骨皮　桔梗　知母　甘草

右爲細末煉蜜爲丸茶清送下

赤膜下垂



眼胞下生赤膜垂下遮於黒睛疼痛者乃胃熱也治法紅痛甚者服欝金酒調散大黄當歸散微退後用撥雲湯生地黄散點用重藥加清凉散藥以上方倶在前

大黄當歸散　治胃中有熱生膜疼痛

當歸　赤芍藥　川芎　菊花

大黄　黄芩　杏仁　薄荷

右各等分吹咀食後水煎温服

生地黄散　治眼下赤膜發歇無時久服則不發

生地黄　黄栢　知母　防風

荊芥　升麻　乾葛　天花粉

黄芩　甘草　桑白皮　白茯苓

赤芍藥

右吹咀毎服七八錢重水煎食後服

逆順生翳



逆順生翳與赤膜下垂與黄膜下垂上充之症頗同然此順逆者五臟虛勞風熱冲於肝膈上胞陽明經毒壅血氣凝滯故生赤膜垂下謂之垂簾翳此爲順下瞼大陰肝經毒壅故翳膜下生向上謂之逆翳治

法宜服瀉脾胃之劑太抵去翳之藥隨其輕重增減用之宜忌口諸毒

問曰眼上下逆順上翳者何也荅曰肝經虛損積毒熱甚至生翳四起侵黒睛治宜明目流氣飲蟬花無比散點用珍珠散次用三七冊腫者亦可劆洗

明目流氣飲（方在前傷寒熱病症內）治脾得和熱戓逆順生翳

蟬花無比散 治風毒傷目昏暗漸生白翳遮睛

白茯苓　甘草（炙助胃）　防風（各四兩）　川芎

石決明（鹽水煮研極細）　赤芍藥（各三兩）　白蒺藜（炒去尖四兩）　蛇退（兩）

蟬蛻（去頭足翅四兩）　蒼木（一兩）　當歸（酒浸二兩）

右爲末毎服二錢食後米汁調服茶亦可忌食毒物

漏眼膿血



漏睛膿血者有其热釘翳并膜入水輪二症之利害也此症未發之時其頭先覺昏悶四肢如勞五臟多積風熱壅毒攻充於黒睛黄仁生出毒瘡灌溉水輪

控血漬爛流膿治法宜隱艾入白芷鍋内炒熱以綿裹熨於眼胞上屢換熱的散其惡血消其敗膿止其惡痛生地黄搗爛煨熨於有瘡處更妙用陰一陽四丹對於有瘡處吹或單用枯礬輕粉血竭乳香研細對着瘡處吹點亦可洗以桑白皮入塩花明礬燻洗服以墜血明目丸没藥散忌動風動血之物

墜翳明目丸（方在前血灌瞳人症内）

没藥散

没藥　大黄（蒸以用）　朴硝

右爲末毎服三錢酒調下茶亦可

飛塵入眼



飛塵入眼者此症全然無事誤被物或飛塵飛絲入眼者此外傷也只爲塵物粘在胞瞼之間粘定不出痛澁難開磣澁淚出致生障膜初患之時治法用絲綿纏耳環脚番轉上下胞瞼撥出塵物即可若初時

不諳此法必療日久必生翳膜遮睛瞳人須有丹藥吹點胞瞼内仔細番看有物粘處必定有血積成塊或肉疙瘩此是病之發縱處宜小鋒針挑撥或有刺壓處針毒血出可此爲病之根也曰外病也初起時將絲綿捲銅匙脚撚撥出壓物久者宜番轉看上下有積處剃洗至平點用清凉散服以散血退熱之劑

酒調散

當歸　甘草　大黃　赤芍藥

菊花　桔梗　蒼朮　桑螵蛸

麻黃　羌活　茺蔚子　連翹（各兩）

右爲末每服三錢酒調下

修肝散

防風　羌活　當歸　生地黃

黃芩　梔子　赤芍藥　大黃

甘草　蒺藜各一兩　右水煎服

拳毛倒睫



拳毛倒睫者此脾與肺二經之得風熱也肺爲五臟之華蓋主一身之皮毛肺虚損則皮皺而毛落也脾家多蘊濕熱致令上胞常腫大抵肝家受熱不時淚出痛痒羞明怕日赤澁難開常以手摩引致令上下胞瞼皮漸長眼漸緊故睫毛番倒裡面刺眼碍澁瞳人漸生翳膜敧頭側視不能正觀治法先宜剃洗瘀血後用竹夾夾起眼皮灸四五壯爲妙使毛生向外其疾瘳耳睛中有翳用陰二陽五丹吹點翳即消磨其夾須依口訣務令緊夾不可滋水恐潰有疤痕若脫下瘢處用光粉調香油遂早搽抹久則肉色一般

眼目光明如舊

細辛湯　治脾經腫得風熱宜服

細辛　防風　知母　茺蔚子
大黃　桔梗　羚羊角　黑參

右㕮咀毎服四五錢用水煎食後温服

防風飲子

黃連一兩　細辛　蔓荊子各二錢　葛根
防風各五錢　當歸身七錢　甘草炙　人參

右水煎食遠服避風忌口

除濕壓熱飲

細辛　蒼朮（各一兩）　防風　知母
羌蔚（各半兩）　桔梗（二兩）　大黄
梔子仁　朴硝　右水煎服

阿膠丸

阿膠（蛤粉炒）　鼠粘子（炒）　甘草　糯米（炒各一兩）
馬兜鈴　款冬花　紫菀　桔梗
右爲末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸食後細嚼薄荷湯下

密蒙花散

密蒙花　羌活　菊花　石決明
木賊　黄栢　白蒺藜　黄芩
蔓荊子　青箱子　枸杞子
右每服三錢茶送下水煎亦可

充風涙出



充風涙出者症非一也有腎虚不生肝木肝經受風

而虛損故不動也迎風而淚出也肝經虛者宜服止淚補肝散止之大止淚之法點用重藥熱淚者服川芎茶調散點用清涼散肝風者宜蒼朮止之不赤不疼淚出是謂之風淚腫痛赤澁淚出者此熱淚也若迎風而出汪汪冬月多憂月於秋却還生又不分四季皆有此冷淚也冷淚者乳香川烏丸川烏一箇草烏二箇去皮明礬一錢白麵塊一箇爲末猪膽汁爲丸如黍米大毎用一丸夜臥時放在眼之大眥頭淚止即止或灸止之又有肺臟久冷太眥有數多爲淚堂淚堂通肺腑此淚難治久流則能令目昏暗血

氣虛弱之人不腫不赤但淡紫紅者澁痛淚出是虛淚

灸法

久流冷淚灸上迎香二穴天府二穴肝兪二穴第九骨開各對寸半

止淚補肝散　治肝虛迎風淚出不止宜灸睛明二穴係太眥頭風池二穴臨泣二穴

蒺藜　當歸　熟地黃　川芎

白芍藥　木賊　防風　夏枯草（無[illegible]不用）

右各等分爲末毎服二三錢茶酒任下

蒼朮散　治風濕傷肝濕熱涙昏花

蒼朮　木賊　香附米　夏枯草
蟬蛻　甘草　蒺藜　白芷
防風　蔓荊子　川芎　姜蚕

右依各等分爲末每服二三錢茶清下酒亦可

川芎茶調散　治一切熱涙眼弦濕爛

川芎　防風　羌活　甘草
木賊　石膏（炒）　石决明（炒）　荊芥
薄荷葉　菊花各一兩

右爲末每服二三錢食後茶下

肝風積熱



肝風積熱者肝家勞苦七情欝結二三年間來來往往一發一歇遂生翳膜或聚或散赤澁涙出此症多是夜勤燈光觀書史或雕畫打銀細巧之人久累肝家積熱成風肝若受風必有腦痛不覺漸漸昏蒙治

法有翳者吹以丹藥內服瀉肝省風之劑除肝家之風熱忌口將息一年半載病根除矣其洗眼點依疼痛腫澁眼之方載在前症條下

問曰眼目逐年舉發無時者何也答曰肝經積熱也經云肝勞則氣逆肝寧則氣順氣急則發氣順則欲治宜發時痛甚者服洗肝散省風湯之類常服此數方則能除此病也點用清涼散　洗肝散（方在天行赤眼症內）

瀉肝散　治肝經積熱

黑參　大黃　黃芩　知母

桔梗　芒硝

右等分為末每服二三錢食後熱水調下日二次

省風湯　治肝熱大旺瞳人不清或細小宜服

防風　犀角　大黃　知母

玄參　黃芩　羚羊角（肝虛不用）　桔梗

右為末每服二錢水煎入燈心竹葉食後服

坐起生花



坐起生花者此是內障此症肝血衰膽腎二經虛也六陽不舉故久坐傷血起則頭暈眼花或前常見花發數般或赤或黑或白繚亂昏暗不明良久乃定瞳人開大不清此症宜補肝腎或明目固本丸不治恐久變爲青盲內障變爲五風難治之症也固本丸只生熟二地黃天麥二冬加人參也

問曰人之坐起眼前見花數般莖蕊如蠅翅者何也

肝腎二經氣乏也經云肝腎之氣充則精彩光明肝腎之氣乏則昏蒙眩暈治法宜補腎丸補肝重光丸還睛丸明目固本丸補腎明目丸隨人氣體虛實曾

减用之

補腎丸　治血氣虛弱變成內障宜服

磁石（火煅醋淬七次水飛過三兩）　肉蓯蓉（酒浸焙）　五味子

熟地黃（酒蒸焙）　枸杞子　兔絲子（酒浸蒸另研各二兩）

楮實子　覆盆子（酒浸）　車前子（酒浸）　石斛（去根一兩）

沉香（另研五分）　或加知母　黃栢（各一兩）　青鹽（另研五分）

右煉蜜丸如桐子大每服五十丸空心鹽湯下

補肝明目丸　治肝腎血虛視物不明諸眼服凉藥表裏愈後少神光

羚羊角　生地黃　肉蓯蓉　枸杞子

防風　草决明（各一两）　楮實子（五匁）　乾菊花
羗活　當歸（各二两）　羊子肝（四两煮焙）
右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心塩湯送下日午清茶下臨卧酒下不飲酒人參當歸湯下

明目固本丸　治心熱腎水不足用少睛光久服生精清心
生地黄　熟地黄　天門冬　麥門冬
枸杞子　乾菊花
右各研末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸空心塩湯下

黄昏不見



人之兩目至日落西之時漸漸不見亦係肉瞕俗謂之雞毛眼也此乃腎之虚也眼雖屬於竅門乃歸腎而為主腎虚則眼目昏或貪淫樂慾酒色過度使腎臟衰憊禀受天真不全精神短少致瞳人腎神水不

清故目之無光也治之須有還精補腎看人老少虛實斟酌藥餌以平之飲食以補之戒色斷怒使會陰水自然明矣

還精補腎丸　治内障方在目瞻生花症内

補腎明目丸　治諸内障欵變五風變化視物不明

川芎　當歸　熟地黄　菊花
山藥　知母　石菖蒲　黄栢
青塩　遠志　白蒺藜　川巴戟
五味子　白芍藥　桑螵蛸　茺蔚子
兎絲子　青箱子　密蒙花　枸杞子

肉蓯蓉　石决明

右爲末煉蜜爲丸如梧桐子大毎服四十丸空心塩湯下

十味還睛丹　治下元虚憊一切内障

防風　羌活　密蒙花　青箱子
川芎　蒺藜　甘草　白朮
木賊　兎絲子（酒浸三宿生服焙乾）

右爲末煉蜜爲丸如梧桐子大毎服二十丸空心塩湯下

瞳人乾缺



瞳人乾缺者亦係內障與外障無預但因頭疼痛而起故列外障條中按此症因夜卧不得肝藏魂肺藏魄魂魄不安精神不定而少卧勞傷於肝故金井不圓上下東西如鋸齒匾缺參差久則漸漸細小視物朦朧難辨人物相牽俱損治法宜瀉膽補腎之劑一

本無昏濛淚內有肝腎俱虛火旺也用猪肝煮熟露宿侵晨切薄蘸夜明沙細嚼此藥能通明益膽之功瞳人小者肝之實瞳人大者肝之虛此症失於醫治久久瞳多鎖緊如小針眼大內結有雲翳或黃或青或白陰者不大陽者不小遂成瞽疾耳初起時眼珠墜痛大眥微紅猶見三光者宜服五瀉湯省風湯同補腎丸及補腎明目丸久服效（方俱在前）

五瀉湯

治瞳人乾缺肝火旺及五臟虛火旺動此藥能瀉火

黃栢　知母　木通　梔子

生地黄　甘草　黒參　桔梗
黄芩　防風　熱甚加羚羊角
犀角　黄連

右㕮咀毎服六七銭用水煎食後服

痒極難忍



痒極難忍者肝經受熱膽因虛熱風邪攻充肝含熱極則肝受風之燥動木搖風動其痒發焉故諸痒屬虛虛則痒諸痛爲實實則痛黒珠痒者有眼弦痒者點以丹藥或煨姜摩擦淚通痒止或濕痒用碧天丹洗侵晨洗以鹽湯或入桑白皮防風荊芥薄荷之類

問曰眼迎風受痒者何也答曰脾肝二經受風邪也

治法痒時用三霜丸撥雲散綿裹散洗用去風藥

二霜丸　治痒極難忍用此丸即愈

姜粉　枯礬　白硼砂

右爲末口津液調和如粟大要用時捋一丸於太

背止之

綿褁散　治眼濕淚爛弦眼目

當歸　黃連各一錢　銅青七分　枯礬四分　朴硝

右各爲細末用細絹色綿縛緊每一箇約龍眼核大要用時將一箇用白湯半盞泡洗之一日二次

眼內風痒



問曰人之患眼遇風痒極者何也答曰此因肝虛合畜風熱膽經風毒上充入眼遂遇風受痒宜劆洗服藁本烏蛇湯補膽湯

藁本烏蛇湯

藁本　烏蛇　防風　白芍藥
羌活　川芎　細辛

右浸酒煎服亦可

補膽湯

前胡　馬兜苓　茯苓各二兩　柴胡
人參　桔梗　細辛　黑參

右煉蜜爲丸毎服三錢水煎服亦可

垂簾翳



問曰人之患眼生翳如珠垂簾遮睛者何也荅曰此因心火盛炎肝經風熱上攻入腦中熱毒流下注於風輪故眼赤澁淚出腫痛無時年乂烏睛白紅色故名曰垂簾翳宜服洗心散加味脩肝散

洗心散

荊芥　薄荷　連翹　麻黄
赤芍藥　梔子　黄連　大黄略一

右毎服五錢水煎服

加味脩肝散

梔子　薄荷（各三兩）　羌活一兩　當歸
大黄　連翹（各五錢）　黄芩　赤芍藥
菊花　木賊　白蒺藜　川芎（各略兩）
麻黄　甘草

右爲末每服三錢用酒調下痛用酒不痛水煎服

鶻眼凝睛



鶻眼凝睛此驟然所感非久患之症因五臟皆受熱毒致五輪振起堅硬不能轉運氣血凝滯睜然如鶻鳥之眼凝視不運之貌難辨人物因形而名曰鶻眼凝睛治法先用香油調姜粉汁於額頭臉部摩擦及頂上或摩風膏摩擦更好服以酒煎散以被蓋出汗其眼即活動而面用燈火燒之斷其風路此症多是小兒急慢驚風之症大人少有此患

桑螵蛸酒調散（方在前暴風客熱內）眼障後服

道痰消風散

陳皮　半夏　全蝎

甘草　羌活　防風　白芷

升麻　細辛　藿香　荊芥

右㕮咀各等分水煎姜三片温服

轆轤展開

轆轤展開者與鶻眼凝睛症同鶻眼凝睛者睛凝不運之貌轆轤展開而大者此膽腎之水散焉瞳人之太小隨黃仁之展縮黃仁展則瞳人小黃仁縮則瞳人大人不知瞳人能大小者非也此乃肝受風而不展轆轤則瞳人圖圓也隨肝輪而縮竟見瞳人大不

收號曰轆轤展開症風充入腦眼帶吊起此症小兒急慢驚風受之治法若前姜汁調香油摩風膏摩擦藥用蟬殼頻頻灌下乳母忌口

問曰瞳人開大不收而展縮者何也答曰肝受風痰盛也治法僻巽錠子牛黃丸石擠散礿起者宜發表小兒如此患治法亦同

僻巽錠子　治肝膽受風變成前症小兒通睛瞳人闊大並皆治之

牛膽南星（七錢）　防風　乾姜（各三錢）　白附子（五錢）
牛黃（三分）　川烏　白芷　薄荷

木香　白朮　白茯苓　人參（各五錢）
硃砂一錢　射香五分　白姜蚕（生用二十箇）　片腦五分
右將前藥俱研爲細末冬用蜜二斤甘草半斤煎作
膏稀稠得宜將次藥末和作錠子金泊爲衣小兒急
慢驚風手足搐搦金銀箔磨湯化下一錠太人破傷
風酒化下三四錠子約一錢一箇或七分一箇舉此
麻黄一斤甘草半斤用水三四碗砂鍋内煎至一鍾
之時入蜜一斤緩緩熬煉至滴水内成珠方將前藥
搜和爲丸即作錠子也

牛黄丸　能去風痰

牛黄二分　白附子　全蝎　肉桂
芎藭　石膏各一兩　白芷三分　藿香五錢
射香少許　硃砂二錢
右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服一三丸臨臥
薄荷湯下

通頂石楠散　能利膈開風痰

石楠藤　藜蘆各一兩　瓜蒂七分
右爲末米湯下一匙日二三度灌入口内去風痰

小兒通睛



小兒通睛與鶻眼凝睛轆轤展開此三症頗同然此症或因外物打着頭額或被諸般人物驚心遂成驚風之症風熱傷肝魂不應目風邪上壅黄仁不成開鎻瞳人開惟直視不辨人物致眼通睛通者黄仁水輪皆黒似無黄仁瞳人水散似無瞳人此黄仁與瞳人通混不分號曰通瞳亦風藥摩擦二法發散風邪宜服牛黄丸不須點藥只服藥然前症牛黄丸通頂石楠散亦可用也

牛黄丸　通頂石楠散　（三方俱在前症條下）

五七犀角飲

犀角　人參　茯苓　甘草

遠志（各一两）　射香（少許）　龍膽草　黄芩（各五錢）

右㕮咀水煎服

小兒疹痘



小兒痘疹者名爲百歲瘡也不論太小俱患一度疹痘入眼症有兩分痘瘡初上皮膚之際眼閉不開眼上即有痘瘡點在黑睛上易治急取益毋草煎湯燻洗日二度更以陰一陽五冊調鱔魚血點忌口及夜啼乳毋亦忌口須疹痘痊可其眼漸開眼中之痘亦隨而痊矣又有一症疹痘之後瘡痂落盡肌體肥壯眼中忽然紅澁此乃餘毒鬱結於肝而發出此症十分利害失治多能害目只用車前草擂水頻與吃下洗却肝經之熱毒洗以益毋草點以鱔魚血調藥經曰疹痘之後毒氣鬱結發肝而氣不能泄攻發於眼傷於瞳人者素無治法也

問曰小兒此症入眼者何也答曰小兒痘瘡之發五臟皆熱毒之氣壅塞停留熱氣在肝膈充入眼使疼痛淚出怕日羞明難開遂生瘡於眼内久發變爲白

膜。初覺瘡入眼中赤澁之時急將藥泄其毒外以退

將秦皮湯洗目眼

秦

紅

瀉心導赤散（宝書）

治傷寒心下不痛腹中不滿大便如

常身無寒熱漸变而神昏不語

或夢中獨語一二句目赤神焦將水与

之則嚥不与則不思形如醉人医者

不識便呼成死証名以針灸誤人

多矣殊不知熱耶傳入小陰心經也因

火上而逼肺所以神昏故名越經症

半熱洗

細辛　各兩

生地黃

赤芍藥

退翳散

真蛤粉　即猪肝散

谷精草

夜明砂

右為細末用猪肝二兩切開摻藥於內以麻扎定煮

水令將肝同藥細嚼煮肝本汁嚥諸般毒物莫吃

小兒眼生翳



小兒眼生翳者脾胃實熱所致或是胎中受毒或因乳母好食熱物皆能令小兒患眼量兒之大小疾之遠近輕重一週半載者其藥須令母吃或蛤殼灌入小兒吃可也二三歲者此是胎毒也離母之後患眼者此是小兒自受之症與母無預此藥須令小兒吃忌以油膩煎炒糖餌菓子之類不獨患眼所忌不忌多生驚症變爲疳傷亦能害月甚至不治之症其疳眼別有餘條款此乃小兒生翳症也黑睛如麻豆大如蘿蔔花與疳眼大不侔矣一倍三黃丹一倍珍珠散點用

加味脩肝散

梔子　薄荷　連翹　麻黃
赤芍藥　羌活　當歸　大黃
黃芩　菊花　木賊　白蒺藜
川芎　甘草

右水煎食後服

痘疹入眼



問曰小兒疹痘入眼者何也荅曰小兒於毋胎中受其毒必發疹痘出之時五臟倶有熱相攻或肝臟熱甚必有痘生於目内宜服

凉肝散

草决明　天花粉　甘草　赤芍藥
緑豆皮　谷精草

右爲末毎服六錢蜜水調下

問曰小兒痘疹傷眼者何也荅曰内臟虚熱上攻也治法經云切不可瀉餘毒宜用微凉劑和觧此症初起睛上紅紫澁痛可用通神散或車前草擂蜜水頻頻與吃洗去肝中之邪若至喪明睛中有翳或凹入者經云疹痘之後毒氣鬱結於肝傷於瞳治甚無治也

通神散　治小兒疹痘用此能觧毒

白菊花　菉豆皮　谷精草　石决明（假過）

右各等分爲末毎服二錢乾柿一箇米汁水一盞同煎候水乾不拘時服能服湯藥只將本方煎服亦可

救苦觀音散

桔梗　當歸　連翹　藁本
細辛　蒼朮　龍膽草　羗活
黃連　知毋　黃芩　黃栢

川芎　柴胡　防風　升麻
生地黃　紅花
右各等分煉蜜爲丸能呑者每四五十丸服小者磨服之

遥神散
菊花　谷精草　密蒙花　菉豆皮
蒼朮　石决明　甘草　黃芩
蟬退　木賊
右各等分水煎食後溫服

小兒雀目



問曰大人小兒雀目至申酉時不見物者何也答曰肝虛受邪熱所傷經絡凝滯不和陰陽不和榮衛不通夜至昏也治法宜服五膽丸蝙蝠肝散又宜服蒼蠅散猪肝散主之不用點藥虛極者諸補藥亦可增減用之

蒼蠅散

用蒼蠅翅草及花爲細末用白水煑猪肝露一宿空心煎丸又可服猪肝散

猪肝散　即退翳散（方在前小兒疹痘症內）

五膽丸

熊膽（一箇）　黃牛膽（二箇）　青魚膽（一箇）　鯉魚膽（一箇）

青羊膽（一箇）　石决明（二兩）　夜明砂（一兩）　射香（少許）

右爲末將前膽和爲丸如菉豆大每服三十丸空心茶下

蝙蝠散

蝙蝠肝（一箇）　石膏（一兩）　黃丹（半兩）　石决明（火煅）

白蒺藜（炒一兩）略　若無蝙蝠肝用羊肝加夜明砂

右將前藥研細末每服二錢米湯調下無蝙蝠肝用羊肝一塊切作四塊以藥一二錢糝肝內以麻縛定用米汁水罐内煑熟次早取出羊肝藥細嚼以煑肝汁同食效如體虛弱之人亦可服補藥爲丸尤妙

胎風赤爛



胎風赤爛者其症有三初時血露入眼洗不乾淨而生是疾遂至赤爛又有在母胎中其母不知忌口多食韲毒之物酒麵五辛之類至產生三四箇月兩眼雙赤胗粘四背紅赤濕爛此是胎毒所致此小兒在腹中飲母血血毒於兒生出方發此症也又有乳母壯盛之人抱兒供乳之際兒口未有乳頭汁脹滿其汁洒然射出充入兒眼亦能生此爛濕若充射面部則能生瘡癩大抵此三症通號曰胎風赤爛孰知内有三因之由血露不淨與乳充射宜碧天丹洗胎毒者宜瀉母服三黃丸忌口其兒亦用三黃湯燻洗

皆

點以時藥可也服宜小防風湯小承氣湯小菊花膏導赤散此数方隨冷熱用之或童子患眼者治法亦用此数方加減點用時藥

小防風湯　此数方治小兒胎風赤爛小兒眼生翳

大黃　梔子　甘草　赤芍

歸尾　防風　羗活

右等分水煎食後服

小承氣湯

大黃　薄荷　杏仁　蟬退

甘草　羗活　天麻　當歸

赤芍藥　防風　右水煎服

小菊花膏丸　治小兒風毒眼

黄連　枯黄芩　大黄　乾菊花

羗活　蒼朮　荆芥　防風

右爲細末煉蜜爲丸每服四五十丸或爲膏

小兒疳傷



小兒疳傷之症富貴之家多生是疾蓋由父毋溺愛之由也小草如萌蘗怎受風日寒露之欺且小兒五臟六腑未實氣血柔弱怎禁油膩煎炒及諸般葷腥或一週半歲纔口菓子糖甜之物及鵝鴨雞猪牛羊等肉或飯方了又哺以乳或乳方飽又與其飯此出於父毋至情富貴之家有是症爲貧賤之家豈有是患何也一食諸物不消不化先傷於脾致腹脹午後發熱至夜半方退日久頭髮稀踈轉作泄瀉頻頻瀉甚則渴至傷肝膽眼之白仁鮮紅羞明怕日漸生翳膜遮瞞黑珠或突起如黑豆如香菰之状治

法先治內後治外用雞卵入輕粉一二分史君子仁一箇半葱珠幾顆濕紙包煨與吃宜空心連吃五七彈止又宜煑羊肝露宿蘸夜明砂吃或猪肝亦可切宜忌口葷腥其白膜用陰一陽七藥調乳點前胡宣二連服側柏葉爐洗若疳傷肝膽眼珠突出或瞎盡爲不治之症不獨瞎眼甚至喪命若聲啞口乾脚手俱腫亡死八九

問曰小兒疳傷眼目疼痛羞明不開烏睛上青翳如黑珠子或白膜遮睛者何也答曰此因飲乳之際好食菓子雜物油膩及熱毒物多使脾胃生疳或瀉泄不止夜間潮熱久則疳蟲傷肝上攻眼目初覺紅澀羞明急療若烏睛上變成有黑翳如珠泄瀉不止者多是不治宜服除熱飲等方

五疳丸　治小兒疳眼面瘦皮黃羞明怕日食乳不消

綠礬（煆成塊淨）　彌陀僧（煆過）　夜明砂（各一兩）

右爲末用蒸棗肉搗前藥末爲丸如黍米大每服二三四十丸量兒之大小空心米湯下

除熱飲

大黃　知母　防風　黃芩（各一兩）

黑參　茺蔚　菊花　木賊（各二兩半）

右木煎食後服三貼用雞蛋一箇史君子仁三箇輕粉二分同研末入蛋內煨熟空心服至二十三箇即去疳蟲後服五疳丸

五疳丸

胡黃連（五錢）　牛黃（一錢）　獼陀僧（一兩）　夜明砂

緑礬（二兩）

右用棗肉為丸緑豆大空心服三十丸米湯送下

治小兒五疳

蕪荑丸

蕪荑　黃連　神曲　麥芽（炒）

右各等分為末麪糊為丸緑豆大每服十九至十五丸米湯下　五疳陳皮湯下　寒熱往來薄荷湯下

風弦赤眼



問曰人之患眼兩瞼時常赤爛者何也答曰太人患者因脾土蘊積濕熱脾土衰不能化濕故濕熱之氣相攻傳發于胞瞼之間致使羞明淚出含在胞瞼之

內此淚熱毒以致眼弦赤爛治法春夏爛者爲熱爛服用三黄湯洗用綿裹散金銭湯有瘀血宜剃洗與服瀉脾湯秋冬爛者爲冷爛又曰迎風洒淚洗用碧天丹點用重藥瞼厚剃洗之後宜火烙之小兒患者因母胎中受熱或落地之時惡露入目沐浴不淨拭之未乾却感外傷風邪使邪入目亦生此疾治之小兒服黄茋湯大人服茶調散熱甚洗金銭湯風甚洗碧天丹先剃洗後用藥

黄茋湯

黄茋　車前子　細辛　黄芩

五味子　蒼朮　黄連各兩

右各等分水煎服

茶調散（即川芎茶調散方在前充風淚出症內）

二黄湯（在努肉攀睛症內）綿裹散（在痒極難忍症內）碧天丹

金銭湯　治久年爛弦

古銭（即老銅銭生銹者佳七箇）黄連（研末二錢）白梅乾（五箇梅自落者爲白梅）

右將此三味用老酒二小盞於磁罐內煎至半盞至夜時冷可洗用不過三四日即愈日二次

爛弦火穴法

魚尾二穴　睛明二穴　上迎春（一穴）　攢竹二穴

太陽二穴

爛弦風之症因脾胃壅熱又受風濕更加吃諸毒物日積月累致成風爛胞瞼之内變成風瘡動則發痒不時因手拂拭甚則連眼眶皆爛無分春夏秋冬皆如是眵淚湍腮有不近入手之怕治法番轉眼瞼剃洗瘀血二三度或小鋒針針出瘀血亦可若因摩引有紅筋者宜老醋燒爐甘石淬七次加以陰丹量輕重搽點眼弦或吹點眼内無妨忌動風動血之物不食可也

肝風目暗疼痛



此症肝風目暗者乃是肝腎虛勞肝氣不足血虛故也不時疼痛攀發無時痛則惟眼珠墜疼頻有赤澁淚出看物依稀眼前多見花發數般或黄或白或黒見一物如見兩般形狀不諳療治恐損眼也此症實

有内外相兼病也非從治外而不治内曷濟哉内則白蒺藜散補外則陰二陽入丹調乳汁點二三夜點丁吹片腦炎加洗以生黄菊花赤芍側栢葉秦皮白芷川芎更加忌口五辛諸熱物莫吃

補肝活血散 虚者宜服

藁本　白芷　石决明　天麻
防風　細辛　羗活　黄芪
菊花　當歸　生地黄　黄連

右各等分水煎服

補腎丸 治目暗疼痛恐變成黒風内障先宜服之

澤瀉去毛　細辛去苗　兎絲子（酒浸焙乾）五味子（各一兩）
茺蔚子（焙二兩）　山薬（一兩五錢）　熟地黄（焙二兩）

右爲末研均煉蜜爲丸如梧桐子大毎服二十丸空心塩湯下

白蒺藜散

蒺藜　菊花　蔓荊子　草决明
甘草　連翹　青葙子

右各等分水煎食後温服

迎風洒涙症

問曰迎風洒涙者何也曰肝之虚也是亦腦冷迎風涙遂出拭却還生夏月即少冬月即多後若經二三年間不以冬夏皆有此疾乃涙通於肝肝爲本目乃肝之外候爲肝虚風動則涙流故迎風涙出即服補肝散治冷涙

補肝散　治冷涙

當歸　熟地黄　川芎　赤芍薬
防風　木賊　右等分水煎服

菊花散　治熱涙

菊花　川芎　木賊　香附子
夏枯草　羌活（各一兩）　草烏一銭　防風
甘草　荊芥　白芷（各五錢）
右爲末毎服三銭茶下水煎亦可

又方　治實涙

菊花　蒺藜　防風　羌活

川芎　夏枯草　木賊　甘草（各三兩）

右每服二銭湯調下水煎亦可

川芎茶調散　治熱涙方在前充風涙止症内

蒼朮止涙散

木賊　香附子　白芷　石膏

菊花　荊芥　白蒺藜　薄荷

當歸　白芍藥　川芎　蟬退

夏枯草

右爲末每服三銭食後茶清下或冷涙酒下

銀海精微卷之一終