



新刊明醫雜著

Kitasato Memorial Medical Library

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50





F  
x-4

Kitasato Memorial Medical Library

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

30 31

30



490.9  
M1-2

No. 2952  
1/2 M16-2



1728

### 明醫雜著序

予脩本草集要既板行矣或問於至曰子之本草人皆愛之然尚復有他書可行者乎予答之曰有而未成也予嘗欲著隨證治例使窮鄉下邑無名醫者可按方治病閉戶一月纂成五篇後覺漸難下手而止又見諸發熱證多端而世醫

混沌悞人遂欲分別諸譖萃為一  
書嘗著論一篇以見大意又嘗欲  
續舟溪語錄餘論等書著得醫論  
二十條及補陰枳木等九方論皆  
未及成書今方奔走仕途何暇及  
焉俟他日退休林下庶可續成諸  
書以行世也因出示之或者曰此  
雖未成書然皆切要之論人所急

欲用者吾聞仁者急於救人若登  
得二條一論以開迷悞濟困苦以  
甚美矣何況連篇累牘有如此而  
不發示人乃曰必俟他日成書  
焉無乃珍秘吝惜恐非仁人之用  
心耶予笑曰豈有是哉予乃以是  
責我請遂出之遂名曰明醫雜著  
鋟梓以傳尚俟他日續成全書以

畢予志

弘治十五年歲次壬戌夏五月既望賜進士出身亞中大夫廣東布政司左叅政慈谿王綸汝言書  
詒遠曲余入昌曰公外出日如其甚其後復歸家嘗謂人曰吾子之學固非不勤有念於醫學者則亦以是時著之  
卷用詩寫聞分送親友及入詩卷

重刊明醫雜著序

明醫雜著乃廣藩太常慈谿王公之筆也公以明經進士任今官先是博覽群書無不究其指歸而於醫方尤加意焉者蓋以爲事親養身之切務而日用之不可缺者也公每病夫此之業醫者不知臨證用藥往往混淆誤人及憲窮鄉下邑之無醫者或遭重病擁衾待死故惻然動情而有是篇之著也然是篇亦已漫而行矣弘治壬戌秋彌知南雄之保昌越明年暮春偶得是篇閱其中之所著曰醫論曰發熱論曰枳术化瘀丸論曰備用要方曰隨證治例與夫擬治嶺南諸病序次小兒痘瘡



治法無不集成乎仲景東垣河間丹溪四子之所長一以貫之而歸於內經誠醫道之大全衛生之良劑活人之至寶也因起而歎曰仁者以萬物爲一體其視天下痒癥疾痛舉切於身公之著此卽仁人之本也猶是以求則見公之心不惟欲一肖之人遂其生亦欲天下之人遂其生矣但書有獲觀者少而其窮鄉下邑是心亦何以遠暨之哉嘴因公之心有所感發而興起焉遂捐俸重鋟諸梓以廣其傳庶使公之心無遠弗届也弘治癸亥七月朔保昌縣知縣漳浦徐弼謹書

新刊明醫雜著卷之一

慈谿 節齋 主編 著

醫論二十條

或問仲景東垣河間丹溪諸書孰優學之宜何主曰宜專主內經而博觀乎四子斯無弊矣蓋醫之有內經猶儒道之六經無所不備四子之說則猶學庸誥孟爲六經之階梯不可缺一者也四子之書初無優劣但各發明一義耳仲景見內經載傷寒而其變遷反覆之詳未備也故著論立方以盡其變後人宗之傳用既久漸失其真用以通治溫暑內傷諸症遂致悞人故河間

出而始發明治溫暑之法，東垣出而始發明治內傷之法。河間之論，卽內經五運六氣之旨。東垣之說，卽內經飲食勞倦之義。仲景非不知溫暑與內傷也，特其著書未之及。河間東垣之於傷寒則遵用仲景，而莫敢違矣。至於丹溪，而出而傷寒則遵用仲景而莫敢違矣。至於丹溪，而出而又集諸醫之大成，發明陰虛發熱類乎外感，內傷及濕熱相火爲病甚多，隨證著論亦不過闡內經之要旨，補前賢之未備耳。故曰外感法仲景，內傷法東垣。東垣熱病用河間雜病用丹溪，一以貫之歸於內經。斯醫道之大全矣。

或問仲景藥方藥品甚少，及東垣用藥多至二十

餘味。丹溪云：予每治病，用東垣之藥，効仲景處方，庶品味數少，則藥力專精。丹溪何以不法東垣而効仲景耶？曰：明察藥性，莫如東垣，蓋所謂聖於醫者也。故在東垣，則可多他人而効，其多斯亂雜矣。東垣如韓信，將兵多多益善。丹溪不過能將十萬，故不敢效其多。

或問人言東南氣熱，可服寒藥；西北氣寒，須服溫藥。然今東南之俗，胡椒薑桂，人常食之，不見生病，而北京士夫畏食胡椒辛熱之物，何也？曰：東南雖熱，然地卑多濕，辛熱食藥，亦能劫濕。西北雖寒，然地高多燥，辛熱食藥，却能助燥，故耳。治

病用藥者宜識此意

丹溪先生治病不出乎氣血痰三者故用藥之要有三氣用四君子湯血用四物湯痰用二陳湯又云久病屬鬱立治鬱之方曰越鞠丸蓋氣血痰三病多兼鬱者或鬱久而生病或病久而生鬱或誤藥雜亂而成鬱故予每用此三方治病時以鬱法參之氣病兼鬱則用四君子加開鬱藥血病痰病皆然故四法者治病用藥之大要也

丹溪又云氣病則治氣血病則治血兼痰則行痰兼鬱則開鬱斯言盡之矣近世治病多不知分

氣血但見虛病便用參芪屬氣虛者固宜矣若是血虛豈不助氣而反耗陰血耶此謂血病治氣則血愈虛耗甚而至於氣血俱虛者也故治病用藥須要分別氣血明白不可混淆此第一義也

或問人有積塊布氣心腹痛等證者雖多服之附子薑桂等熱藥而不發藥毒不生他病然本病日深者何也曰諸積諸痛喜溫而惡寒熱藥與病情相合積久成鬱而寒邪深矣鬱熱既深則見寒愈逆見熱愈喜兩熱相從故不生他病所謂亢則害承廻制火極而似水者也然真氣

被食陰血乾枯病目深痼而不可爲矣世人不識但見投熱不熱悞認爲沈寒痼冷而益投之至死不誤悲夫然則治之當如何曰當用從治法內經曰熱因寒用寒因熱用伏其所主先其所因者是也


凡治諸病時常審察有無飲食傷積但見胃膈飽悶或噫氣嘸酸腹痛腸泄惡食少食便問曾何飲食審知傷積卽便先調脾胃消導飲食然後用本病之藥或於本病藥內加入消導飲食藥若不知審此則藥雖對證而不妙蓋人以脾胃爲主胃氣自傷則不能運化藥味以成功也亦

有食後卽藥或藥後卽睡或服藥太多者謂之傷藥要須識此吾妻常病胎漏忽日血大崩盡暈去服水便而醒少頃復暈急煎服荆芥隨醒隨暈服止血止暈之藥不妨忽然嘔此予以其章使藥汁滿於胃腸也卽以手探吐之未後吐出米飯及蘿蔔搥許詢問適方午飯後著悶少頃卽崩不止予悟曰因方飽食胃氣不行故崩甚血既大崩胃氣益虛而不能運化宜乎崩量不止而血藥無効也急宜調理脾胃遂用白朮五錢陳皮麥芽各三錢煎服之服未半而暈止毋服而崩止遂專理脾胃服十數服胃氣始還

然後加血藥服之而安。若不審知食帶而專用  
無崩血葷之藥，豈不悞哉！書此以例其餘。  
凡婦人產後陰血虛，陽無所依而浮散於外，故多  
發熱。治法用四物湯補陰血而以炙乾薑之苦  
溫從治。以其浮散使歸，依於陰。然產後脾胃虛  
多，有過服飲食傷滯而發熱者，誤作血虛則不  
効矣。但遇產後發熱者，須審問服何飲食，有無  
傷積胃膈，飽悶，嗳氣噦食，泄瀉等證，只作傷食  
治之。若發熱而飲食自調者，方用補血正法。  
凡傷寒時氣太，病熱退之後，先服參芪甘溫之藥。  
一二服以扶元氣，隨後便服滋血生津潤燥之

藥。蓋太病後汗液外耗，水數內竭，必有小便赤，  
澁大便秘結等證，須識此意，預藥防之。

凡泄瀉病誤服參耆等甘溫之藥，則病不能愈，而  
或變爲黃疸。蓋泄屬濕，甘溫之藥能生濕熱，故  
束助病邪，久則濕熱甚，而爲疸矣。惟用苦溫苦  
寒之藥以治之，則愈。苦寒瀉濕熱，苦溫除濕寒，  
也。泄止後脾胃虛弱，可用參芪等藥以補之。  
凡酒色過度，損傷肺腎真陰，咳嗽吐痰，衄血，吐血，  
咯血，咯血等證，誤服參芪等甘溫之藥，則病日  
增。服之過多，則死不可治。蓋甘溫助氣，氣鬱陽  
陽旺，則陰愈消，前煩病證乃陰血虛，而陽火旺。



宜服苦甘寒之藥以生血降火世人不識往往服參耆以爲補元見服此而死者多矣

南方人稱發熱爲勞發蓋謂勞苦而發熱卽東垣

內傷之旨也此病輕者丁二發自愈重者用東垣法補之重甚者可加熱附子人若因勞力辛

苦而發熱切不可誤依外感輕易發汗也

東垣論飲食勞倦爲內傷不足之症治用補中益氣湯，迥迥集中又論不足之中又當分別飲食，傷爲有餘勞倦傷爲不足予謂傷飲食而留積，不化以致宿食鬱熱熱發於外此爲有餘之證法當消導東垣自有枳木丸等治法具於飲食

門矣其補中益氣方論却謂人因傷則失飽致損脾胃非有積滯者也故只宜用補藥蓋脾胃全賴飲食之養今因飢飽不時失其所養則脾胃虛矣又胃主四肢若勞力辛苦傷其四肢則根本竭矣或事因飲食不調或事因勞力過度或飲食不調之後加之勞也或勞力過度之後繼以不調故皆謂之內傷元氣不足之證而宜用補藥也但須於此四者之間審察明白略爲加減則無不効矣

內傷發熱是陽氣自傷不能升達降下陰氣而爲

內熱乃陽氣也故其脉大而無力屬肺脾

陰虛發熱是陰血自傷不能制火陽氣升騰而爲內熱乃陽旺也故其脉數而無力屬心經經曰脉大而無力爲陽虛脉數而無力爲陰虛無力爲虛有力爲實

傷寒發熱是寒邪入衛與陽氣交爭而爲外熱陽氣主外爲寒所傷而失其職故爲熱其脉緊而有力是外之寒邪傷衛也治主外

傷暑發熱是火邪傷心元氣耗散而邪熱入客於中故發爲熱汗大泄無氣以動其脉虛遲而無力是外之熱邪傷榮也治主內

病有感有傷有中感者在皮毛爲輕傷者兼肌肉

稍重中者入臟腑最重寒有感寒傷寒中寒風有感風傷風中風暑有感暑傷暑中暑當分輕重表裏治各不同又如中濕中氣中毒皆云中中者中也謂邪直入於中也故爲重病

凡治心腹疼痛但是新病須問魯服何飲食因何傷感有無積滯便與和中消導之藥若日數已多曾多服過辛溫燥熱之藥嘔吐不納胃膈飽悶口舌乾燥大小便澁難則內有鬱熱矣或原有舊病因感而發綿延日久見證如前者俱用開鬱行氣降火潤燥之藥如川芎香附炒山梔黃連薑汁之類甚者再加芒硝組治心腹久痛

須於溫散藥內加苦寒鹹寒之藥溫治其標寒治其本也

昔有久云我但卧病即於胃前不時手寫死字則百般思慮俱息此心便得安靜勝於服藥此真無上妙方也蓋病而不謹則死必至達此理者必能清心克己凡百謹慎而病可獲痊否則雖有良藥無救也世人遇病而猶恣情任性以自戕賊者是固不知畏死者矣又有一等明知畏死而怕人知覺諱而不言或病已重而猶強作輕淺態度以欺人者斯又知畏死而反以取死尤可笑哉

發熱論

世間發熱證類傷寒者數種治各不同外感內傷乃人關鍵張仲景論傷寒傷風此外感也因風寒之邪感於外自表入裏故宜發表以解散之此麻黃桂枝之義也以其感於冬春之時寒冷之月即時發病故謂之傷寒而藥用辛熱以勝寒若時非寒冷則藥當有變矣如春溫之月則當變以辛涼之藥如夏暑之月則當變以苦寒之藥故云冬傷寒不卽病至春變溫至夏變熱而其治法必因時而有異也又有二種冬溫之病謂之非其時而有其氣蓋冬寒時也而反

病溫焉此天時不正陽氣反泄用藥不可溫熱  
又有二種時行寒疫却在溫暖之時時本溫暖  
而寒反爲病此亦天時不正陰氣反逆用藥不  
可寒涼又有一種天行溫疫熱病多發於春夏  
之間沿門闔境相同者此天地之萬氣當隨時  
令氣運氣而施治宜用劉河間辛涼甘瀉寒之  
藥以清熱解毒已上諸證皆外感天地之邪者  
也若夫飲食勞倦內傷元氣此則真陽下陷內  
生虛熱故東垣發補中益氣之論用人參黃芪  
等甘溫之藥大補其氣而提其下陷此用氣藥  
以補氣之不足者也又若勞心好色內傷真陰

陰血既傷則陽氣偏勝而變爲火矣是爲陰虛  
火旺第察之證故丹溪發陽有餘陰不足之論  
用四物湯加黃柏知母補其陰而火自降此用  
血藥以補血之不足者也益氣補陰皆內傷證  
也一則因陽氣之下陷而補其氣以升提之一  
則因陽火之上升而滋其陰以降下之一升一  
降迥然不同矣又有夏月傷暑之病雖屬外感  
却類內傷與傷寒大異蓋寒傷形寒邪客表有  
餘之證故宜汗之暑傷氣元氣爲熱所傷而耗  
散不足之證故宜補之東垣所謂清暑兼氣者  
是也又有因時暑熱而過食冷物以傷其內或

過取涼風以傷其外此則非暑傷入乃因暑而  
自致之之病治宜辛熱解表或辛溫理中之藥  
亦與傷寒治法相類者也凡此數證外形相似  
而實有不同治法多端而不可惑謬故必審其  
果爲傷寒傷風及寒疫也則用仲景法果爲溫  
病熱病及溫疫也則用河間法果爲氣虛也則  
用東垣法果爲陰虛也則用丹溪法如是則庶  
無差悞以害人性命矣今人但見發熱之證一  
皆認作傷寒外感率用汗藥以發其表汗後不解  
又用表藥以涼其肌設是虛證豈不死哉間  
有頗知發熱屬虛而用補藥則又不知氣血之

分或氣病而補血或血病而補氣誤人多矣故  
外感之與內傷寒病之與熱病氣虛之與血虛  
如冰炭相反治之若差則輕病必重重病必死  
矣可不畏哉可不謹哉予每欲會此數證合爲  
一書便界限荆然而治法照若以惠斯人而未  
遑也故略發其槩以爲後日張本云

補陰九論

人之二身陰常不足陽常有餘况節慾者少過慾  
者多精血既虧相火必旺火旺則陰愈消而勞  
瘵咳嗽咯血吐血等證作矣故宜當補其陰使  
陰與陽齊則水能制火而水升火降斯無病矣

故丹溪先生發明補陰之說，謂車前補左尺，腎水也。古方滋補藥，皆兼補右尺，相火本知在尺，壓置右尺原旺，若车右平補，依舊火勝於水，只補其左，制其右，庶得水火相平也。右尺相火固不可衰，若果相火衰者，方宜補火，但此之人火旺太過，至於中年，慾心雖減，然少年斲喪既多，焉得復實？及至老年，天真漸絕，只有孤陽，故補陰之藥，自少至老，不可缺也。丹溪先生發明先聖之旨，以正千載之訛。其功甚哉！今立補陰名方。

備加減法於後。

黃柏去皮酒拌炒

知母去台皮酒拌炒

忘歲

敗龜板附灸透各三兩

熟地黃

酒拌蒸忌鐵

瑣陽酥炙乾

枸杞子

各二兩

五味子一兩

天門冬

去心二兩

白芍藥酒炒二兩


乾薑

炮紫色三錢寒月加至五錢

右爲極細末，煉淨蜜和入猪脊髓三條和藥未杵極勻，丸如梧桐子大，每服八十九丸，空心淡鹽湯送下，寒月可用溫酒。

○若有夢遺精滑病者，加牡蠣殼、白朮各一兩。

山茱萸去核椿根白皮炒過七錢



- 若有赤白濁病者加白术白茯苓各一兩半  
山梔仁黃連各炒各五錢
- 若脚軟弱無力者加牛膝酒洗二兩  
虎胫骨醋炙透防已酒洗木瓜各五錢
- 若有病氣病者加蒼朮鹽水炒一黃連生姜炒  
山梔仁炒各五錢川芎一兩吳茱萸炒青皮去殼各五錢
- 若脾虛弱畏寒易泄者加白朮三兩  
陳皮一兩乾薑炒加至七錢
- 若眼目昏暗者加當歸酒洗川芎菊花各一  
柴胡黃連酒炒各五錢烏犀角各五錢荊子防風各三錢
- 若兼氣虛之人加人參黃芪蜜炙各二兩

○若左尺既虛右尺亦微命明火裏陽事不舉  
加黑附子小便浸炮去皮各七錢肉桂去皮各五錢沈香五錢

立枳术丸論

人之一身脾胃爲主胃主氣脾陰主血胃司納受脾司運化一納一運化生精氣津液上升糟粕下降斯無病矣人惟飲食不節起居不時損傷脾胃胃損則不能納脾損則不能化脾胃俱損納化皆難元氣斯弱而邪陽侵而飽悶痞積關格吐逆腹痛泄痢等證作矣况人於飲食竟能一下一節調一或有傷脾胃便損飲食減常元氣漸虛矣故索古製枳木之丸東垣發脾胃之


論使人常以調理脾胃爲主後人舞爲醫中王道厥有旨哉近世論治脾胃者不外陰陽氣血而率皆理胃所用之藥又皆辛溫燥熱劫火消陰之劑遂致胃火益旺脾陰愈傷清純冲和之氣變爲燥熱胃脘乾枯大腸燥結脾臟漸絕而死期迫矣殊不知脾胃獨土屬濕位居長夏故濕熱之病十居七八况土旺四季寒熱溫涼各隨其時豈可偏用辛熱之劑哉今舉枳术丸方立加減法於後

白术二兩

枳實一兩炒

○右爲細末荷葉包飯燒取出杵爛和藥杵勺

- 丸如蒙豆大每服五六十九清米湯下此法一補之消取飲食緩化不令有傷東垣加陳皮二兩木枳橘丸治老幼元氣衰弱飲食少進久服令人多食而不傷  
○若元氣素弱飲食難化食多則腹內不和疼  
○痛泄瀉此虛寒也加入參白芍藥炒神曲炒大麥芽炒桔梗各一兩縮砂木香各五錢  
○若素有痰火胃膈鬱塞疎酸噎氣及紫有吞酸吐酸之證或有酒積瀉結痛此皆濕熱也加薄連姜附白芍藥酒炒陳皮各一石膏生甘草各五錢縮砂木香各二錢川芎四錢



- 若傷食飽悶痞塞不消加神曲大麥芽山楂  
子各一有食積痞塊在腹者再加黃連厚朴  
俱姜製各積堅者再加蓬木醋布昆布各二  
五錢共一兩
- 若傷冷食不消腹痛瘰疬加半夏姜製一兩  
縮砂乾薑各炒神曲大麥芽各五錢
- 若人性多氣惱夾氣傷食氣滯不通加川芎  
香附米炒各一兩木香黃連姜炒各五錢
- 若胃膈不利人過服辛香燥熱之藥以致上  
焦受傷胃脘乾燥嘔吐噎膈反胃加黃連炒  
山梔仁炒各五錢白芍藥當歸各一兩
- 桔梗生甘草石膏各五錢

- 胃膈頑痰膠結及大便燥秘再加芒硝五錢
- 若素有瘀者加半夏姜炒橘紅白茯苓各一  
黃芩炒黃連姜炒各五錢
- 若人能食好食但食後反飽難化此胃火旺  
脾陰虛也加白芍藥酒炒一人參七錢石膏  
一兩生甘草五錢黃連炒香附米炒木香各四  
分火燬若年高人脾虛血燥易飢易飽大便燥難加  
白芍藥當歸各一人參七錢朴麻甘草炙各四錢  
而山楂子大麥芽桃仁去皮尖另研各五錢  
乘此若人常服藥也

痰者病名也人之一身氣血清順則津液流通而  
痰之有惟夫氣血濁逆則津液不達，薰蒸成聚，  
而變爲痰焉痰之本水也原於腎，痰之動源也  
主於脾。古人用二陳湯爲治痰通用者所以實  
脾燥濕治其標也然以之而治濕痰寒痰痰飲  
痰涎則固是矣若失痰因及上肺氣不清或嗽  
時作及若痰鬱痰結成粘塊凝滯喉間吐喀難  
出此等之痰皆因火邪炎上薰於上焦肺氣被  
鬱故其津液之隨氣而外者爲火薰蒸凝濁鬱  
結而成歲月積久根深帶固故名老名鬱而其  
原則火邪也病在上焦心肺之分咽喉之間殊

中焦脾胃濕痰冷痰飲痰涎之比故湯藥難  
治亦非半夏茯苓蒼朮枳殼南星等藥所能治  
也惟在開其鬱降其火清潤肺金而消化凝結  
之痰緩以治之庶可効今製一方于後

天門冬去心一兩 黃芩酒炒一兩 海粉另研  
瓜蒌仁取肉另研一兩 橘紅去白一兩 桔梗去盧  
香附米半升淡鹽水浸炒五錢 連翹五錢 青黛另研  
芒硝二錢別研

右爲極細末煉蜜入生薑汁少許和藥末杵  
極勻丸如小龍眼大噙化一丸或嚼爛清湯  
細嚥之或丸爲細丸如黍米大淡薑湯送下

○清暑益元湯  
人參一錢 黃芪一錢 麥門冬一錢 黃連炒五分  
黃柏三分 白朮二錢 白芍藥一錢 芍草炙五分  
陳皮一錢 白茯苓一錢 香薷七分 知母七分  
生薑三片 水一盞半煎七分，食前溫服  
夏秋暑熱，因熟過，致惡寒發熱，冒膈餓心，飲食不進，或兼嘔吐泄瀉，此內外俱傷，寒冷也。  
○溫中化滯湯  
人參一錢 白朮一錢半 乾薑一錢炒  
甘草炙五分 厚朴水炒一錢 姜 陳皮一錢

五六十九  
○此等老痰大率飲酒之人多有之，酒氣上升而爲火肺，與胃脘皆受火邪，故欬滯而成此方。用天門冬、黃芩、泄肺火也；海粉、芒硝、鹹以軟堅，也；瓜萎仁潤肺消痰，香附米開欬降氣，連翹開結降火，青黛解鬱火，故皆不用辛燥之藥。

備用要方

夏月傷暑發熱，汗大泄無氣力，脈虛細，而遲，此暑傷元氣也。服後方。

暑證

羌活一錢

枳實一錢

白茯苓一錢

生薑三片水一盞煎七分食前溫服  
夏暑若在途中常服以壯元氣清熱驅暑服之克

中暑霍亂泄痢痢疾等證

○却暑清健湯  
人參一錢二分麥門冬一錢五味子十粒  
白朮三分五分白芍藥一錢甘草五分

知母七分白芍藥一錢黃芩三分

陳皮七分白芍藥一錢甘草五分

生薑二片水一盞半煎七分食前溫服  
人遇勞倦辛苦用力過多卽服後方一二三服免

內傷發熱之病此方主於補氣

○解暑補氣湯

黃芪一錢半人參一錢甘草五分

本五味子二十粒麥門冬一錢陳皮一錢

白朮一錢

勞倦甚加熟附子四五分

生薑二斤太棗二枚水一盞半煎七分食前溫服

人遇勞心思慮損傷精神頭面眩昏心虛氣短驚  
怪煩熱卽服後方補血爲主

○清暑補血湯



人參一錢二分五味子十五粒  
當歸一錢  
炒麥門冬一錢去心  
白芍藥炒一錢  
七楂子炒五分  
茯神一錢去心  
酸棗仁一錢炒  
生地黃酒洗五分  
甘草五分炙  
陳皮五分  
川芎五分

生薑三片水一盞半煎七分食前溫服

隨證治例

泄瀉

泄本屬濕然多因飲食不節致傷脾胃而作須看時令分寒熱新久而施治治法補脾消食燥濕利小便亦有升提下陷之氣用風藥以勝濕亦有久泄腸胃虛滑不禁者宜取泄之

主方 桑考藥湯

白朮二錢  
甘草一錢半  
白芍藥炒一錢

枳上三味泄必用之藥陳皮一錢中灸甘草去皮五分

○若傷食泄黃或食積加神曲大麥芽山楂子各一錢炒黃連七分以消之腹中痞飽悶再


加厚朴枳實木香各五分生本益火丸

○若小便赤澀短少加澤瀉猪苓木通各一錢

以分利之夏月再加茵陳土分炒頭施仲分

○若口渴引飲加乾葛一錢人參麥門冬各一錢

升麻四分烏梅肉二箇



○蒼木澤瀉  
○葛石膏各一錢  
○通各五分  
○若飲酒便泄此酒積熱瀉也加炒黃連  
○乾葛各一錢水香五分神曲麥芽各八分  
○若寒月溏泄清冷腹痛或傷生冷飲食加神  
曲麥芽乾薑各一錢砂益智木香各二分  
○若久泄胃氣下陷服利小便之藥而不効宜  
加入參黃芪各一錢補中氣升麻柴胡各四  
分以升提之再加羌活防風藁本白芷等風藥  
各三分助風以平之更加炙乾薑五分以固之

○若久瀉脾虛弱食少難化加炙黃耆人參  
各一錢  
○神曲麥芽各一錢木香  
○若久瀉腸胃虛滑不禁加肉豆蔻  
○赤石脂各一錢煨木香炙乾薑各五分

刺疾

刺是濕熱及食積三者別赤白青黃黑五色以屬  
五臟白都濕熱傷氣分赤者濕熱傷血分赤白  
相雜氣血俱傷黃者食積治法濕腸胃之濕熱  
開鬱結之氣消化積滯通因通用其初只是下  
之下後未愈隨證調之病稍久者不可下胃虛  
故也刺多屬熱亦有虛與寒者虛者宜補寒者

宜溫年老及虛弱人不宜下

主方芩連芍藥湯

附黃芩炒二錢半

黃連炒一錢半

白芍藥炒二錢半

附黃芩炒三味煎末

木香

枳殼炒各一錢半

附檳榔二錢

炙甘草三分

枳殼炒各一錢半

○若腹痛加當歸一錢半縮砂一錢再加木香

芍藥各五分

○若後重加滑石炒半錢一錢再加枳殼檳榔各五

芍藥生用再加五分黃芩用條實者亦加五

○若白痢加白朮白茯苓炒滑石陳皮各一錢

初欲下之再加大黃五錢兼食積加山楂子

枳實各一錢

○若紅痢加當歸川芎桃仁各一錢初欲下之

再加大黃五錢

附大黃一錢必大黃

○若紅白相雜加當歸川芎桃仁各一錢以理

血滑石陳皮蒼术各一錢半以理氣有食積亦加

山楂枳實

○若白痢久弱胃氣虛或下後未愈減芩連芍

藥各七分加白朮半錢黃芪茯苓陳皮各一

錢縮砂五分去檳榔枳殼再加炙乾薑五分

○若紅痢久胃弱血虛或下後未愈減芩連各

分加當歸川芎熟地黃阿膠珠陳皮各一錢

白木一錢半

○若色赤黑相雜此濕勝也及小便赤澁無少  
加木通澤瀉茯苓各一錢山梔仁炒五分以分利之

○若血痢加當歸川芎生地黃桃仁炒槐花各  
錢久不愈減芩連各七分去檳榔枳殼再加  
阿膠珠炒側柏葉各一錢半炒黑乾薑一錢

白木半錢陳皮一錢半以升提之

○若嘔吐食不得下加軟石膏半錢陳皮一錢  
山楂仁炒五分人生薑汁緩呷之以瀉胃口熱

○有二種氣血虛而痢者用四物湯加入參白  
朮陳皮黃連黃芩阿膠之類以補之而痢自  
止

○有一樣寒痢用黃連木香酒炒芍藥當歸炒  
百乾薑縮砂厚朴肉桂之類

○若得痢而誤服溫熱止瀉之藥則雖稍久亦  
當宜用前法以正之不後方調之  
○君得痢便用前正法下之而未愈又用前謂  
一理法治之而久不愈此屬虛寒而滑脫可於  
膝前虛補寒溫二條擇用更加龍骨赤石脂罌  
粟殼烏梅肉等收瀉之藥

瘡疾

瘡是風暑之邪有一日一發有二日一發有三日一發有間一日連二日發有日與夜各發有汗有無許有上半日發有下半日發有發於夜者治法邪從外入宜發散之然以扶持胃氣爲本又須分副陽分陰分而用藥邪瘡及新發者可散可截虛瘡及久者宜補氣血若過服截藥致傷脾胃則必延綿不休

主方 柴胡二木湯

柴胡去苗白朮各一錢半蒼朮泔浸一錢  
已上三味唐乾葛一分陳皮七分牛草炭五分

- 若一日一發及午前發者邪在陽分加枯黃芩茯苓半夏各一錢熱甚頭痛再加川芎芍藥石膏各一錢口渴加石膏知母麥門冬各一錢
- 若間日或二日一發午後或夜發者邪入陰分加川芎當歸酒炒芍藥熟地黃酒炒知母各一錢酒洗紅花酒炒黃柏升麻各四錢提陽分方可截之
- 若間一日連發二日或日夜各發者氣血俱病加入參黃芪白朮芩各一錢以補氣川芎當歸白芍藥熟地黃各一錢以補血
- 若陽瘡多汗用黃芪人參白朮以數之無汗

○柴胡蒼朮白朮黃芩乾葛以發之  
○若陰瘡多汗用當歸白芍藥熟地黃黃耆黃柏以飲之無汗柴胡蒼朮川芎紅花升麻以發之故曰有汗者要無汗扶正爲主無汗者要有汗散邪爲主

○若病人胃氣弱飲食少或服截藥傷脾胃而少食者加入參半錢酒炒芍藥大率味各一  
○若傷食痞悶或有食積者加神曲麥芽枳實炒各二錢炒黃連五錢  
○若痰盛如畫製半夏南星枳實炒各一錢黃芩  
○黃連各六分

○若欲截之加檳榔黃芩青皮常山各一錢

○烏梅肉二箇

○若日久虛瘡寒熱不多或無寒而但微熱者

○邪氣已無只用四君子令四物湯加柴胡黃芩黃芪陳皮以滋補氣血

○**聲咳**謂有聲肺氣傷而不清嗽謂有痰肺濕動而生痰咳嗽者因傷肺氣而動脾濕也病本雖分六氣五臟之殊而其要皆主於肺蓋肺主氣而聲出也治法須分新久虛實新病風寒則散之火熱則清之濕熱則瀉之久病便屬虛屬脾氣虛

- 則補氣血虛則補血兼欬則開欬滋之潤之飲  
乏降之則治虛之法也
- 辰主方 杏仁五味子湯  
杏仁去皮尖 白茯苓各一 橘紅七分  
五味子 桔梗 茯苓甘草各五分
- 春多上升之氣宜潤肺抑肝加川芎芍藥半  
夏各一錢 麥門冬炒黃芩知母各五分
- 春若傷風致成鼻流清涕宜辛涼解散加防  
風薄荷紫蘇炒黃芩麥門冬各十錢
- 夏多火熱炎上最重宜清金降火加桑白皮  
知母炒黃芩麥門冬石膏各一錢

- 秋多濕熱傷肺宜清熱瀉濕加蒼朮桑白皮  
各一錢 防風黃芩山梔炒各五分
- 冬多風寒外感宜解表行瘀加麻黃桂枝半  
夏生乾薑防風各一錢 肺經素有熱者再加  
酒炒黃芩知母各五分 若發熱頭痛鼻塞聲重  
再加藁本川芎前胡柴胡各一錢
- 若有痰加半夏枳殼風痰再加南星 姜汁炒  
燥咽乾勿用半夏南星宜加知母 宜水拌炒
- 貝母瓜蔞仁黃芩

○若膏火浮於肺而火邪在中宜開藥消痰用

○上半日效者胃中有火加貝母石膏黃連五  
更效者全上半身南歸北吸喉嚨木片

○黃芩效者火浮於肺不可正用寒涼藥宜加

○五味子五倍子訶子皮斂而降之

○若效數久肺虛滋氣補血加入參黃芪阿膠

當歸生薑天門冬效冬柏馬兜鈴酒為藥之

類肺熱喘效去人參用沙參此兼補血氣也

○桂半後效者屬陰虛卽勞嗽也宜補陰降火

加川芎當歸芍藥熟地黃黃柏知母竹瀝薑

汁天門冬瓜萎仁貝母此專補陰血也

○若火鬱嗽謂痰鬱火邪在中宜開藥消痰用  
訶子皮便香附瓜萎仁半夏曲海石青黛黃  
芩芩為末蜜調爲丸噙化仍服前補陰降火湯  
或藥失治則成勞

○若痰積食積化效者用香附瓜萎仁貝母  
海石青黛半夏曲軟石膏山楂子枳實薑炒  
黃連爲末蜜調噙化

○若勞嗽見血加阿膠當歸芍藥天門冬知母  
貝母桑白皮亦於前肺虛陰虛二條擇用大  
低咳嗽見血多是肺受熱邪氣得熱而變爲  
火火盛而陰血不得安寧從火上升故治宜

瀉火滋陰忌用入參等甘溫補氣之藥然亦有氣虛而欬血者則宜用人參黃芪欬冬花等藥但此等證不多耳

○因咳而有痰者欬爲重其治在肺因痰而致欬者痰爲重主治在脾但是食積成痰痰氣上升以致欬嗽只治其痰消其積而欬自止不必用肺藥以治欬也

痰飲

痰屬濕乃津液所化因風寒濕熱之感或七情飲食所傷以致氣逆液濁變爲痰飲或吐啞口出或癰滯脅膈或胃聚腸胃或客於經絡四肢隨

氣升降遍身上下無處不到其爲病也爲喘爲欬爲惡心嘔吐爲痞膈壅塞關格異病爲泄爲眩暈爲憎雜怔忡驚悸爲癲狂爲寒熱爲痛腫或胃間轆轤有聲或背心一點常如冰冷或四肢麻痺不仁皆痰所致百病中多有兼痰者世所不知也痰有新久輕重之殊新而輕者形色清白稀薄氣味亦淡久而重者薰濁稠粘凝結欬之難出漸成惡味酸辣腥臊苦甚甚至帶血而出治法痰生於脾胃宜實脾燥濕又隨氣而升宜順氣爲先分導次之又氣升屬火順氣在於降火熱痰則清之濕痰則燥之風痰則散之

欝痰則開之，頑痰則軟之，食積則消之，在上者吐之，在中者下之，又中氣虛者宜固，中氣以運痰，若攻之太重，則胃氣虛而痰愈盛矣。

主方出二陳湯

橘紅

半夏

湯泡

白茯苓

甘草

生薑

右方總治一身之痰，如要下行，加引下藥上

粗行，加引上藥

○濕痰多軟，如身體倦怠之類，加蒼白米四

○寒痰在裏，脅中倍加半夏甚者，加麻黃細辛

烏頭之類，痰厥頭痛亦倍半夏

○風痰，加南星枳殼白附子天麻薑蟲猪牙皂

角之類氣虛者，更加竹瀝氣實，加荆瀝俱用

薑汁

○熱痰加黃芩黃連，痰因火盛，遂上降火為先

○加白朮黃芩軟石膏黃連之類，取運槽難者

火動其痰也，亦加山梔子黃連黃芩

○血虛有痰者，加天門冬知母瓜蔞仁香附米竹瀝薑汁，帶血者，再加黃芩白芍藥桑白皮

○血滯不行，中焦有痰者，取竹瀝加生薑紫蘇自然汗，吃三五銀盞，必胃中煩燥不寧後愈。○氣虛有痰者，加入參白朮，脾虛者宜補中氣以運痰，降下加白朮白芍藥神曲麥芽兼

用升痰提起

- 內傷挾痰加人參黃芪白朮之類薑汁傳送或加竹瀝尤妙
- 食積痰加神曲麥芽山楂炒黃連枳實以消乏甚者必用攻之宜丸藥兼血虛者用補藥送下中焦有痰者食積也胃氣亦賴所養未不便虛若攻之盡則虛矣黃芩黃芩
- 老痰用海石半夏瓜蔞仁香附米連翹之類
- 五倍子佐化藥大治頑痰宜丸藥喉中有物略不出嚥不下此痰結也用藥化之加鹹藥軟堅之類宜瓜蔞仁杏仁海石桔梗連翹

易生而多

○癰在腸下非白芥子不能達

○癰在皮裏膜外非姜汁竹瀝不可及在四肢

○非竹瀝不開在經絡中亦用竹瀝必在火上

薑韭汁膈間有癰或癲狂或健忘或癰俱用

竹瀝與荆瀝同功氣虛少食用竹瀝氣實能

食用荆瀝

○凡人身上中下有塊是癰也問其平日好食

何物肚水後方用藥

○凡人頭面頸頰身半有結核不痛不紅不作

膿者皆癰注也宜隨處用藥消之

○滾痰丸攻瀉腸胃痰積及小兒食積痰急驚

風痰盛者最要藥常宜合備但須量人虛

實而用之

擬治嶺南諸病

春秋時月人感山嵐瘴霧毒氣發寒熱，胃膈飽悶，不思飲食此毒從氣鼻口入內也治當清上焦，解內毒行氣降痰不宜發汗

升麻苦木湯

黃連

一錢姜水洗

黃芩

一錢酒拌炒

升麻

一錢

生甘草

七分蒼术浸鹽水炒

木香

一錢

厚朴

一錢姜水炒

枳實

一錢

半夏

一錢湯洗七次

桔梗一錢 柴胡一錢 川芎一錢 木通一錢

生薑五片水一盞半煎七分食前熱服渣煎

四分繼服

寒溫不節汙身脫衣巾感冒風寒之氣氣閉發熱頭疼此傷寒類也但道南氣溫易出汗故多類瘡重則寒熱不退輕則爲瘡南方氣升故嶺南人得此病者卒皆胃滿痰涎壅塞飲食不進與北方傷寒只傷表而裏自和者不同治當解表清熱降氣行痰此方用於寒涼時月及雖在溫暖時而感冒風寒者

○柴胡荳木湯

羌活一錢五分蒼朮一錢 柴胡一錢

黃芩一錢

橘紅一錢

半夏一錢湯洗

枳實一錢水二升草炙

川芎一錢

生薑五片水一盞半煎七分食前溫服渣煎

四分隨服取汙出止服

○瘡瘍時瘡寒熱往來

○柴胡知母湯

柴胡一錢半 知母一錢半

蒼朮一錢游浸

黃芩一錢酒炒

乾葛一錢

陳皮一錢

半夏一錢半

川芎一錢

苡草七分炙

生薑三大片烏梅肉二箇水一盞半煎七分

食前清晨服渣スカスカ前四分午前服

○瘧久者ナガシテ加入人參一錢半當歸一錢汗多者去

蒼朮換白朮加酒炒白芍藥各一錢半

後變成痢疾瘧後之痢從瘧治故用補脾胃藥

○黃連木香湯

黃連一錢炒

水香一錢

縮砂一錢

黃芩一錢炒

橘皮一錢

白朮一錢半

白芍藥二錢炒

甘草五分炙

當歸一錢酒洗

生薑三片水二盞煎七分食前熱服

溫暑之症民病天行瘟疫熱病治宜清熱解毒兼

治內外

正升膏本

樂局一號

○清暑消毒飲

枯黃芩一錢

知母一錢酒炒

石膏一錢半

升麻一錢

黃連五分酒炒

生甘草七分

羌活二錢

白芍藥一錢半

生地黃五分

人參一錢半

乾葛一錢

生薑三片水一盞半煎

七分食前熱服

渣スカスカ煎

○若脅痛癰癧瘻癰瘻者加枳實半夏錢各一

生薑汁四五匙

○若脾胃不實加白朮一錢半

時氣發熱變爲黃病所謂瘟瘡也宜治內瀉濕熱

○茵陳鴻黃湯


○茵陳一錢 黃連一錢 姜水炒  
白朮一錢 白茯苓一錢 去皮 厚朴一錢 姜水  
木通一錢 去皮 木香七分 茵芍藥一錢半  
黃乾葛一錢半 人參一錢

生姜三太斤水二盞煎七分食前溫服渣煎

四分繼服

序次丹溪小兒痘瘡治法  
小兒瘡疹大抵與傷寒相似發熱煩躁臉赤唇紅  
身痛頭疼乍寒乍熱噴嚏呵吹嗽喘癰癰始發  
之時有因傷風傷寒而得有時氣傳染而得有

因傷食嘔吐而得有因跌撲驚恐畜血而得或  
爲眉眼驚搐如風之證或口舌咽喉肚腹疼痛  
或煩躁狂悶昏睡或自汗或下痢或發熱或不  
發熱證候多端卒未易辨亦須以耳冷骭冷足  
冷驗之蓋瘡疹屬陽腎藏無症耳與骭足俱屬  
於腎故腎之所部獨冷又不若視其耳後有紅  
脈赤縷爲眞於此可以稽驗矣調護之法首尾  
俱不可汗下但溫涼之劑兼而濟之解毒和中  
安表而已虛者益之實者損之冷者溫之熟者  
平之是爲權度借喻而言亦如痘火籠蒸之法  
但欲其鬆耳蓋毒發於表如苟妄汗則發衛一




虛重令開泄轉增瘡爛由是風邪乘間變證者  
有之毒根於裏如苟妄下則內氣一虛毒不能  
出而返入焉由是土不勝水變黑歸腎身體振  
寒耳聰反熱眼合肚脹其瘡黑鴟十無一生汗  
下二說古人深戒以也觀之瘡疹症狀雖與傷  
寒相似而其治法實與傷寒不同傷寒從裏入  
裏瘡疹所發從裏出表故也如欲解肌乾葛紫  
蘇可也其或氣實煩燥熱熾太便秘結則與犀  
角地黃湯或人參敗毒散又或紫草飲多服亦  
能利之故雖云大便不通者少與大黃尤宜仔  
細斟酌之若小便赤少者分利小便則熱氣有

所滲而出凡熱不可驟退但輕解之若無熱則  
瘡又不能發也

凡瘡疹春夏為順秋冬為逆○瘡疹分人清  
濁就形氣上取更怯○凡已發未發並與紫  
蘇飲但覺身熱證似傷寒若未見瘡見疑似  
赤明且先與惺惺散參蘇飲或人參羌活輩  
熱甚則與升麻葛根湯人參敗毒散若一見  
紅點便忌葛根湯恐發得表虛也○凡痘瘡  
初欲出時身發熱鼻尖冷呵欠嗽欬面赤方  
是痘出之候便宜服升麻葛根湯加山楂木  
力子其瘡稀疎而渴愈○凡痘初出時或未

見時宜服後方多者令少重者令輕方以絲瓜近帶三寸連瓜子皮燒灰存性爲末沙糖拌乾吃入朱砂末亦可又方朱砂爲末蜜水調服多者可減少者可無○凡痘瘡發熱之時便以薏苡子爲末蜜調貼額門上免有患眼之疾○凡初出之際須看齧前若稠密急宜消毒飲加山楂黃芩酒洗紫草減食加入參○初出之時色白者便大補氣血參木葛升麻乾葛甘草木香丁香酒洗當歸白芍藥若大便渴加訶子肉豆蔻○初起時自汗不妨蓋湯熱薰蒸而然故也○有初起煩躁

譖語狂渴引飲若飲水則後來脣不脣急以涼藥解其標如益元散之類亦可用○凡瘡已出可少與化毒湯○出不快者加味四聖散紫草飲子紫草木香湯紫草木香湯或快班散絲瓜湯○出太甚者人參敗毒散犀角地黃湯○疎則無毒密則有毒宜涼藥解之雖敷貼亦不妨無害取之患者火色白靜者作寒看○齊勇者燥者煥發者作熱看黑屬血熱涼血爲主○白疕氣虛補氣爲主○守黑陷而外白起得透者則相兼而治○凡瘡痘分表裏虛實吐瀉少食爲裏虛不吐瀉



能食爲裏實，裏實而補則結，雖毒陷伏倒屬  
爲表虛，灰白者亦表虛或用燒人屎、紅活綻  
凸爲表實，表實而復補表則要滑爛不結痂。  
○痘瘡分氣虛血虛用補藥氣虛者人參白  
术加解毒藥血虛者四物湯中加解毒藥○  
痘瘡分氣血虛實多帶氣血不足虛則黃芪  
生血活血之劑助之略佐以風藥實則白芍  
藥爲君黃芩亦爲君佐亦白芷連翹續斷之  
類○調解之法活血調氣安表和中輕清消  
毒溫涼之劑兼而治之二者得兼而已溫如  
當歸黃芪木香輩涼如前胡乾葛升麻輩佐

乏以川芎白芍藥枳殼桔梗羌活木通紫草  
之屬則可以調適矣○黑陷二種因氣虛而  
毒氣不能盡出者酒炒黃芪紫草人參輩○  
黑陷甚者亦用燒人屎蜜水調服出子和方  
○痒瘍者於形色脉上分虛實實則脉有力  
氣壯虛則無力虛痒以實表之劑加涼血藥  
實痒如大便不通者以大黃寒涼之藥少與  
乏下其結糞○氣怯輕者用淡蜜水調滑石  
末以羽潤瘍上○瘍乾者宜退火止用輕劑  
荆芥升麻葛根之類○濕者用漏濕乃肌表  
間濕宜用風藥白芷防風之類○上引用并

麻葛根下引用檳榔牛膝，助以貝母忍冬草，白芷爪蓼之類。○若咽喉痛者，大如聖散，鼠粘子湯。○喘滿氣壅者，麻黃黃芩湯。○煩渴者，甘草散，烏梅湯。

○下痢嘔逆者，木香理中湯。○顏色正者，知上治將欲成就，却色淡者宜助血藥用，當歸川芎酒洗，芍藥之類或加紅花。○將成就之際，却紫色者，屬熱用涼藥解其毒，升麻葛根酒炒黃連黃芩及連翹之類，甚者犀角大解豆毒。○金白色，將驕時如豆壳者，蓋因初起時飲水多，其屬不齊，俗呼倒驕，不好但服實。

表之劑，消息他大小便，如大便秘，通大便，小便秘，通小便。

○小便赤澁者，大連翹湯，牛膝飲。


○小便赤澁者，大連翹湯，牛膝飲。

○太便秘結，內煩外熱者，小柴胡湯，加枳殼，最當。或少少四順清涼。

○瘡疹用藥固有權度，大小二便不可不通。其太便自所下，黃黑則毒氣已成不必多與。湯劑但少用化毒湯可也，或不用亦可。若小大二便一，或閉焉，則腸胃壅遏，脉結凝滯，毒氣無從發泄，眼閉，掣脛，肌肉黧黑，不旋踵而告變矣。陷入者，加味四聖散，更以胡荽酒，薄。

傳其身厚傳其足噴其衣服併以厚綿蓋之若猶未也獨聖散入木香煎湯若其瘡已黑乃可用錢氏宣風散加青皮主之錢氏云黑陷青紫者百祥丸下之不黑者謹勿下余知其所下者漏膀胱之邪也又云下後身熱氣溫欲飲水者可治水穀不消或寒戰者爲逆余知其脾強者土可以治水也百祥丸太峻當以宣風散代之漏後溫脾則用人參茯苓白朮等分厚朴木香甘草各半爲妙蓋瘡發肌肉陽明主之脾土一溫胃氣隨暢獨不可漏膳也泄之腎水乎此錢氏不刊之秘旨也

○其瘡瘍者一日內虛泄二日外傷風冷三日變黑歸腎○近時小兒痘瘡止宗陳文中木香散異攻散殊不知彼時立方之時爲運氣在寒水司天時令又值嚴冬太寒爲因寒靜退痘瘡不紅綻故用辛熱之劑發之今人不分時令寒熱一槩施治誤人多矣時值溫熱山野農家貧賤之人其或偶中也丹溪痘瘡治法最爲明備近世通用陳文中木香異攻散方乃一偏之術若痘瘡虛怯淡白色瘡瘍此屬虛寒宜用陳文中方若發熱壯盛瘡勇紅紫色躁痒此屬熱毒急宜涼血解



毒自陳文中方盛行後屬虛寒者率得生屬  
熱毒者悉不救痘是胎毒古人治法只解毒  
然氣血虛則送毒氣不出及不能成就故陳  
文中之法亦于載妙訣補前人之未備者但  
溫補之法既行而解毒之旨遂隱故較得一  
邊又害了一邊今必詳究丹溪二法通用斯  
無弊也

○痘瘡屬虛寒者直可延至十數日後方死  
屬毒盛轉紫色者不過七八日蓋痘是胎毒  
一直內出外一二十日方出齊毒氣尚在內出  
至六日則當盡發於表七八九日成膿而結

癰疾若毒氣盛不能盡出過六日毒反內入  
臟腑故須於六日以前毒氣該出之時急服  
涼血解毒之藥以驅出之六日以後醫無及  
矣故其死最急若虛弱毒氣少者只是氣血  
不足不能貫體成就故綿延日久而後死此  
虛實輕重之分也○痘瘡多者是毒氣多便  
先宜解毒然多則恐氣血周貫不足故隨後  
亦宜兼補藥以助成膿血

喘與脹二症相因必皆小便不利喘則必生脹脹  
則必生喘但要識得標本先後先喘而後脹者

續醫論

十五條

弘治十六年七月先傳

舟中著

主於肺先脹而後喘者主於脾何則肺金司降外主皮毛經曰肺朝百脉通調水道下輸膀胱又曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣是小便之行由於肺氣之降下而輸化也若肺受邪而上喘則失降下之令故小便漸短以致水溢皮膚而生腫滿焉此則喘爲本而腫爲標治當清金降氣爲主而行水次之脾土濕濕外主肌肉土能尅水若脾土受傷不能制水則水濕不行浸漬肌肉水既上溢則邪反侵肺氣不得降而生喘矣此則腫爲本而喘爲標治當實脾行水爲主而清金次之苟肺症而用燥脾

之藥則金得燥而喘愈加脾病而用清金之藥則脾得寒而脹愈甚矣近世治喘脹者但知實脾行水而不知分別肺脾二症予故爲發明之氣虛補氣用四君子湯血虛補血用四物湯虛甚者俱加熟附子蓋四君四物皆和平寬緩之劑須得附子健悍之性行之方能成功附子熟藥本不可輕用但當病則雖在暑熱時月亦可用也予嘗治一僕人五月間病熟口渴唇乾舌語診其脈虛細而遲用四君子湯加黃耆當歸芍藥熟附子進一服熟愈甚狂言狂走或因附子差矣脉之如舊仍增附子進一大服遂汗出而

熱退脈還四至矣又嘗治一婦人亦夏間病熱初用平調氣血兼清熱和解之劑服二三服不應熱愈盛舌上焦黑脣間如火漱水不嚥診其脉兩手皆虛微而右手微甚六七日內譁語撮空循衣摸床諸惡證俱見後用四物湯加黃耆人參白朮陳皮麥門冬知母熟附子服之下午時汗出而熱退次日復熱再服一服又退又一次日復發知其虛極也遂連進十服皆加附子脉始復而病安

飲食過傷變爲異常急暴之證人多不識嘗有一壯年人忽得暴疾如中風口不能言目不識人

四肢不舉急投蘇合香丸不效予偶遇聞之因詢其由曰適方陪客飲食後忽得此症遂教以煎生薑淡鹽湯多飲探吐之吐出飲食數椀即時病愈又一婦人先傷飲食損胃後夜飯早卧因喜復起少穿衣服覺虛冷少頃忽得厥逆晝迷不省予曰此必有食也令煎薑鹽湯吐之吐出夜飯遂醒後服白朮陳皮半夏麥芽湯調理而愈大抵此等證多因飲食醉飽之後或感風寒或著氣惱而得飲食壅塞胃氣不行內傷持重若誤作中風中氣證而用驅風解表衍氣散氣之藥則置氣重傷死在旦夕嘗見人有率暴

病多依中風中氣用藥須臾不較莫知其由。內經雖有暴病暴死之證但恐多有因於愈者前輩不曾明言故人不識耳今後遇有此等急證須要審問明白若方飲食醉飽或累傷飲食重復受傷但覺脅脢有食滯者只依食治之久頭痛病略感風寒便發寒月須重綿廈帕包裹者此屬鬱熱本熱而標寒世人不識卒用辛溫解散之藥暫時得効誤認爲寒殊不知因其本有鬱熱毛發常疎故風寒易入外寒束其內熱閉逆而爲痛辛熱之藥雖能開通閉逆散其標之寒邪然以熱濶熱病本益深惡寒愈甚矣唯

當瀉火涼血爲主而佐以辛溫散表之劑以除法治之則病可愈而根可除也

眼赤腫痛古方用藥内外不同在內湯散用苦寒辛涼之藥以瀉其邪故點藥莫要於冰片而冰片大氣古方用燒酒洗眼或用乾薑末生薑汁點眼者皆此意也蓋赤眼是火邪內炎上攻於目故內治用苦寒之藥是治其本如鍋底之去薪也然火邪既客於目從內出外若外用寒涼以阻逆之則鬱火內攻不得散矣故點藥用辛熱而

法眼用熱湯是火鬱則發因而散之從治法也  
世人不知水片爲刲藥而誤認爲寒常點眼  
致積熱入目而昏暗聾翳故云眼不點不瞎  
者此也又不知外治忌寒涼而妄將冷水冷物  
冷藥挹洗當致昏聾者有之耳鳴或鳴甚如蟬或左或右或時閉塞世人多  
作腎虛治不効殊不知此是痰火上升鬱於耳  
中而爲鳴鬱其則壅閉矣遇此症但審其平昔  
飲酒厚味上焦素有痰火只作清痰降火治之  
太批此證多因先有痰火在上又感惱怒而得  
怒則氣上少陽之火客於耳也故腎虛而鳴者

其鳴不甚其人必多惱當見勞快之證  
鼻塞不聞香臭或但遇寒月多塞或略感風寒便  
塞不時舉發者世俗皆以爲肺寒而用解表通  
利辛溫之藥不效殊不知此是肺經素有火邪  
火鬱甚則喜得熱而惡見寒故遇寒便塞遇熱  
便發也治法清肺降火爲主而佐以通氣之劑  
若如常鼻塞不聞香臭者再審其平素只作肺  
熱治之清金湯火消痰或丸藥噙化或末藥輕  
調緩服又服無不効矣此予所親見而治驗者  
其平素原無鼻塞舊證一時偶感風寒而致鼻  
塞聲重或流清涕者自作風寒治

牙床腫痛齒痛動搖或黑爛脫落世人皆依腎虛治殊不知此屬陽明濕熱蓋齒雖屬腎而生於牙床上下床屬陽明太陽與胃猶木生於土也腸胃傷於美酒厚味膏梁甘滑之物以致濕熱上攻則牙床不清而爲腫爲痛或出血或生蟲由是齒不得安而動搖黑爛脫落也治宜泻陽明之濕熱則牙床清寧而齒自安固矣小便不禁或頻數古方多以爲寒而用溫通之藥殊不知屬熱者多蓋膀胱火邪妄動水不得寧故不能禁而頻數來也故年老人多頻數者是膀胱血少陽火偏旺也治法當補膀胱陰血渴

火邪爲主而佐以收澀之劑如牡蠣山茱萸五味子之類不可用溫藥也病本屬熱故宜瀉火因水不足故火動而致小便多小便既多水益虛矣故宜補血補血漏火治其本也收之磁之治其標也

男子陰痿不起古方多云命門火衰精氣虛冷固有之矣然亦有鬱久甚而致痿者經云壯火食氣譬如人在夏暑而倦怠廢弱遇冬寒而堅強也予嘗親見一二人腎經鬱久而有此證者服黃柏知母清火堅腎之藥而効故須審察不可偏認作火衰也

夢遺精滑，此人多作腎虛治，而用補腎滋精之藥，不效殊不知此。證多屬脾胃飲酒厚味，痰火濕熱之人，多有之。蓋腎藏精，精之所生，由脾胃飲食化生，而輸歸於腎。今脾胃傷於濃厚濕熱內，齎中氣濁而不清，則其所化生之精，既有濁氣，則腎主秘藏，陰靜則寧。今所輸之精，既有濁氣，則邪火動於腎中，而水不得寧，靜故遺而滑也。此證與白濁同。丹溪論白濁爲胃中濁氣下流，滲入膀胱，而云無人知此也。其有色心太重，妄想適用，而致遺滑者，自從心腎治，但兼脾胃者，多要當審察。


婦之女子，經脈不行，多有脾胃損傷，而致者，不可便認作經閉血死輕用經通破血之藥，遇有此證，便須審其脾胃如何。若因飲食勞倦，損傷脾胃，少食惡食，泄瀉疼痛，或因誤服汗下攻尅藥，傷其中氣，以致血少，而不行者，只宜補養脾胃，用白朮爲君，茯苓芍藥爲臣佐，以黃芪甘草陳皮，麥芽川芎，當歸柴胡等藥，脾旺則能生血，而經自行矣。又有飲食積滯，致損脾胃者，亦宜消積補脾，若脾胃無病，果有血塊凝結方，宜行血，通經。

婦人平產多在三箇月及五月七月除跌蹠損傷

不拘外。若前次三箇月而墮則下次必如期復然。蓋先於此時受傷故後至期必應乘其虛也。遇有半產者。產後須多服養氣血固胎元之藥。以補其虛損。下次有胎先於兩箇半月後即服固胎藥十數服。以防三月之墮。至四箇半月後再服八九服。防過五月又至六箇半月後再服以防七月及至九箇月內服丹溪達生散十數服可保無虞。其有連墮數次胎元損甚者。服藥須多。久則可以蓄方。用四物湯加入參白朮陳皮茯苓草阿膠艾葉條等。多氣加香附縮砂有瘀加姜製半夏調理。妊娠在於清熱養血條。

實黃芩爲安胎聖藥。清熱故也。暑月宜加用之。  
左養胎全在脾胃。臣舊鐘懸於梁。梁軟則鐘下墜。析則墮矣。故白朮補脾爲安胎君藥。若因氣惱致胎不安者。宜用川芎陳皮茯苓草。多加縮砂少佐木香以行氣。

東垣丹溪治病多自製方。蓋二公深明本草藥性。洞究內經要方。稟法故能自製。自宋以來局方盛行。人皆遵用。不敢輕率。自爲局方論證治病。雖多差謬。丹溪曾論辨之。然方皆名醫所製。其君臣佐使輕重緩急大小多寡之法則。不差也。近因東垣丹溪之書大行。世醫見其不用古方。



也率皆效。嘸治病，輒自製方。然藥性不明，變方之法莫究。鹵莽亂雜，反致生無甚有。變謬多端，遂難識治。且失藥之氣味，厚薄不同。如五味子之味厚，故東垣方少者五六粒，多者十數粒。今世醫或用二三錢石膏，味淡薄，故白虎湯用半兩。李氏醫不敢多用，補土治土，劑宜輕少。今不論論上下，率用大劑，在散湯液，各有攸宜。今不論緩急，率用湯煎。如此類者多矣。今之醫者若非熟讀本草，深究內經，而輕自製方，鮮不悞人也。或問：「今人有言東垣之法宜用於北，丹溪之法可行於南。如何？」曰：「東垣北醫也，羅謙甫傳嘸法以

聞於江浙、丹溪、南醫也。劉宗厚壯其學，以鳴於陝西。果如其言，則本草內經皆神農黃帝岐伯之說，亦止宜施於北方耶？夫五方所生異病，及治之異宜，內經異法方宜論五常正太論已詳言之矣。又如北方多寒，南方多熱，江湖多濕，嶺南多瘴，謂其得此氣多，故亦多生此病，非謂北病無熱，南病無寒也。至於治寒以熱治熱以寒，則五方皆同。豈有南北之異耶？但人之臟腑火各居二天之六氣，熱居三分又半，故天下之病熱多，而寒少。觀內經至真大論病機一章可見，又濕熱相火致病甚多。自王太僕注文灑沒以

致局方偏用溫溫之藥，故丹溪出而闡內經之旨，辨局方之偏論，濕熱相火之病以補前人之未備耳。後人不識見其多用芩連拖稻等苦寒之藥，遂以爲宜用於南淺矣哉？續隨證治例。

暑病

夏至日後病熱爲暑者，相火行令也。夏月人感受自口齒而入，傷心包絡之經，其脉虛或浮大而散，或弦細芤遲，蓋熱傷氣則氣消，而脉虛弱，其爲症汗煩則喘渴，靜則多言，身熱而煩心痛，大渴引飲，頭疼自汗，倦怠少氣，或下血發黃，生霍亂吐利，痰滯嘔逆，腹痛瀉痢，此則非暑傷人，乃因暑而自致之病也。以其因暑而得，故亦謂之暑病，然治法不同。

- 若行人或農夫於日中勞役，得之都是，動而得之陽證也。其病必苦頭痛，發躁熱，惡熱，拘之，肌膚大熱，必大渴，引飲汗大壯，無氣以動，乃天熱外傷元氣也。宜清暑益氣，用香薷羹，連扁豆入參黃芪五味知母石膏之類。

○暑熱發渴脈虛宜用人參白虎湯人參一錢知母二錢石膏半兩甘草一錢入粳米煎

竹葉石膏湯亦好

石膏一兩

半夏二錢

甘草二錢人參一錢麥門冬半兩竹葉

○東垣清暑益氣湯治長夏濕熱蒸蒸感之

四肢困倦精神少，冒溼氣促支節痛或氣高

而喘身熱而煩心下痞悶小便黃數大便溏

而頻或痢或渴不思飲食自汗體重黃芪升

麻葛各一錢人參白朮神曲陳皮各五分

炙甘草黃柏麥門冬當歸各三分葛根澤瀉

青皮五味各三分

○治夏病屬陰虛元氣不足宜補中益氣湯去柴胡朴麻加炒黃柏白芍藥，拔痰者加半夏陳皮

○若暑熱之時無病之人或避暑熱納涼於深堂大廈涼臺冷館太扇風車得之者是靜而得之陰證也其病必頭痛惡寒身形拘急肢節疼痛而煩心肌膚大熱無汗此為陰寒所逼使周身陽氣不得伸越宜用辛溫之劑以解表散寒用厚朴紫蘇乾菖蒲香薷桔梗木之類若外既受寒內復傷水生冷戾果之類前藥再加乾薑縮砂神曲之類此非治暑

也治因暑而致之病也

○若外不受寒止是內傷水冷物腹痛泄瀉或霍亂吐逆宜縮脾飲砂仁草茱萸草扁豆乾薑烏梅或理中湯加神曲麥芽縮砂蒼朮此專治內溫中消食也

○若吐瀉脉沈微甚者不可用涼藥可用附子大順散熱附子甘草乾薑杏仁桂或附子理中湯加炒芍藥

○夏月多食冷物及過飲茶水致傷脾胃吐瀉霍亂故以治暑藥多用溫脾消食治濕利小便之藥醫者要識此意

○若既傷暑熱復傷生冷外熱內寒宜先治其內溫中消食次治其外清暑補氣而以理脾爲主於前陰陽二條內相兼取用東垣清暑益氣湯已兼此意其用黃耆朴麻人參白朮甘草麥門冬當歸五味黃柏葛根是清暑補氣也蒼朮神曲陳皮澤瀉青皮是治內補脾氣也

勞瘵

男子三十前後色慾過度損傷精血必生陰虛火動之病睡中盜汗午後發熱哈哈咳嗽倦怠無力飲食少進甚則痰涎帶血咯唾出血或咳血

吐血衄血身熱脈流數肌肉消瘦此名勞瘵最難治輕者用藥數十服重者期以歲年然必須病人變命堅心定志絕房室息妄想戒慾恣飲食以自培其根否則雖服良藥無用也此病治之於蚤則易若到肌肉消爍沈困著床尺脉流取細數則難爲矣又此病大忌服人參若曾服過多者亦難治今製一方于後治色慾證先見潮熱盜汗咳嗽倦怠趁早服之入參白芍

主方 補陰漏火湯

川芎一錢熟地黃一錢白芍藥炒一錢當歸三分黃柏七分蜜水知母一錢蜜水

生地黃酒洗甘草五分灸天門冬一錢去心及皮白朮一錢三分陳皮七分乾薑三分炒生薑二斤水煎空心溫服

○若咳嗽盛加桑白皮馬兜鈴瓜蔞仁各七分五味子十粒

○若痰盛加姜製半夏貝母瓜蔞仁各一錢  
○若盜汗多加牡蠣酸棗仁各七分浮小麥一撮  
○若潮熱盛加桑白皮沙參地骨皮各七分  
○若夢遺精滑加牡蠣龍骨山茱萸各七分  
○若赤白濁加白茯苓一錢黃連三分  
○若兼衄血咳血出於肺也加桑白皮一錢

○黃芩山梔各五分炒

○若兼嗽血痰血出於脾也加桑白皮貝母黃連瓜蔞仁各七分

○若兼嘔吐血出於胃也加山梔黃連乾薑蒲黃炒各一錢韭汁半錢盜薑汁少許

○若兼咯唾血出於腎也加桔梗玄參側柏葉炒各一錢

○若先見血證或吐衄盛大者宜先治血治法輕少者涼血止血盛大者先消瘀血次止血涼血蓋血來多必有瘀於腎臟者不先消化之則止之涼之不應也葛可久十藥神書方

可次第換用方內唯獨參湯止可用於大吐血後昏倦脉微細氣虛者氣雖虛而復有火可加天門冬五錢若如前所云陰虛火動潮熱盜汗咳嗽脈數不可用也說見李草集要人參條下明白

○此病屬火太便多燥然須節調飲食勿令泄渴若胃氣復壞泄瀉稀溏則前頭寒涼之藥難用矣急宜服藥理脾胃用白朮茯苓陳皮半夏神曲麥芽甘草等藥俟胃氣復然後用前本病藥

○收功保後可合補陰丸常服之及用葛可久方

新刊明醫雜著一卷終

余曉得是書見其論證既方多有獨得之妙而深契內經之旨小而通其變以致於大約而極其要以盡乎詳其於醫門亦得一貫之道者也余欲試諸人首久矣有一年少來告曰叔父自前年得痢疾至于今春轉增危篤百藥不應以死自分無乃別有治救之術耶余授此方并其加減法與之兩貼而愈即止藥後數日復作連進得安或有不過如前再作連進四服而安又有八十歲老婦亦得此疾數貼而應止藥則復作連進得安或有不過一二服而愈屢試之其効神速如鼓應桴他藥皆



然其製方之妙可謂聖矣然是書之出未父人所罕見而藥又無名藥無其名則人有未達之疑余故或因其性或因其材而名之至於人所罕見則宜諱擇以廣其傳此則非吾力所及故今因洪察訪涵之赴湖南住所也授此方以寄綏城倅洪公欽仲而告之曰公爲字民之官宜體我聖上好生之德使是方盛行于世民無札瘥夭閼者非在於公乎夫貴古而賤今喜遠而忽近者凡人之心莫不皆然此方之作在國朝弘治之歲其不爲人所賤而忽之者幾希矣雖然不本其源不達其流狃於習熟見聞膠寧舊常徒以此之先後

爲優劣而輕重之者庸人之見也非吾欽仲之所宜爲也庖犧之易只寓於畫經三聖而有象有象又有辭易道以立至於程朱兩夫子出而後其精微之隱遂大明于世安知農黃之道亦有待於是人乎其母以後人而忽之哉嘉靖辛亥仲夏箕城後人進士趙戾書

右之本文字點共加吟味刊之

千時正保旃蒙作噩仲夏吉辰  
癸卯歲次己未仲夏吉辰  
孫其興行文  
附註

附註



Kirasato Memorial Medical Library