

8
013-2

阿蘭陀外療集
一

阿蘭陀外療集卷之一

8 冊
494.2
Or-2
1

No
3209
19013-2



富士川文庫
3044

Faint handwritten text in vertical columns, likely bleed-through from the reverse side of the page.



富士川文庫

3044

瘰癧疽一陽症ハ癰症腫大瘡之色赤而潤色付強振有傷
 之如熱氣有于瘡之威勢恐見ハ陽症也設熱疼痛而
 病人患ハ瘡之症膿トスル也又膿而毛膿トスル也
 也世俗ハ恐テ醫師ハ不恐膿安愈安能膿テ口閉熱
 外治詐テ能治也阿蘭陀及云エシクハバシリエシ
 口ハ瘡ノ木綿押其中程ニキクハクハバシリエシ
 塗テ瘡之上ハ白ハ早膿口閉後ハ木綿ヲホ
 上ノ瘡ニキクハクハバシリエシハハハハハハハハハハ
 瘰癧去愈也上ノ瘡ニキクハクハバシリエシハハハハハハハハハハ
 瘰癧去愈也上ノ瘡ニキクハクハバシリエシハハハハハハハハハハ

阿蘭陀外科正傳卷之上



第廿四文庫

3044



阿蘭陀外科正傳卷之上

富澤川家藏本

癰疽一陽症ハ癰症腫大瘡之色赤而潤色付強振付傷寒亦

之如熱氣有テ瘡之威勢恐見ハ陽症也發熱疼痛而

病人患ハ瘡之症膿トスル也又未膿而毛膿トスル故

也世俗ハ恐テ醫師ハ不恐膿安愈安能膿テ口閉熱

ヲ去痛ヲ止養生之方大事有名醫之業不有不可用

只外治許テ能治也阿蘭陀ハ云エシテラストテヤ

キ口ニシテ本綿押其中程ニキシクモトバシリユン

ツ塗テ瘡之上付ベ早膿口閉後ハ木綿ヲホ

ツリテノイナヤハ右之バトリユンヲ塗テ口ニ指

込其上ニシテフラストテヤハルマヲ木綿押打也次

弟膿去愈也上ハ平愈也每月膏茶モノイ子ヤモ

替ニ膿ヲ出也若能膿モ皮厚口閉難ハ切也瘡之大

替ニ膿ヲ出也若能膿モ皮厚口閉難ハ切也瘡之大

小隨口之小大有又針毛大小有切開後治療右同前
 熱氣強痛甚臣不可用內茶熱氣強痛甚ハ膿安可膿
 驗也能膿口閉急時ハ熱氣毛去痛毛止也竹之折二
 出癰疽陰症治入急時ハ熱氣毛去痛毛止也竹之折二
 癰疽陰症ハ初發瘡長不知粟粒之如而不腫不赤不痛身
 熱有様而瘡之生所毛余り不熱患事毛有七八日之
 後二身之草卧急様而腫上ト云長不畜瘡之根廣シ
 マラ不腐毛不進身寒心放放上而示瘡之上衣ヲ
 腫毛十ク飲食不進身寒心放放上而示瘡之上衣ヲ
 キセタハ如薄物有膿臭難成起卧言語聲弱而難長
 諸瘡之色黒面色青黃痕入不毛高獨語口燥舌強
 凡此症有ハ純陰之症ト云也百人一人毛生者稀也
 患症之極也而蘭院カ云此症極テ大事也多分ハ不
 可治先治療之方ハ膿膏茶ヲ付膿毛口閉膿出者ハ

百一快氣ヲ得者有瘡愈云氏生命之程難計膏茶ハ
 先子シフラスト夕ラア又又ヨマルクウリヨ木綿
 押付ヨ膿テ口閉時ハ膿拔シノイ千ヤニ塗指其上
 右之夕ラア又又ヨマルクウリヨ打合瘡之色能成
 腫上膿之色毛能成時ハ良右之陽症之茶テ可治若
 膏茶テ膿兼時ハ工ンフラストムスラキニフス又
 鉛ヲ薄押水銀ヲ塗テ膏茶之上蓋毛其上木綿ヲ卷
 付置也ウミテ口閉急時ハ治方同癰腐膿出六口
 廣切明其内ヲリヨヒツトルヨウルンヲ入テ其
 上工ンフラストムスラキニフスヲ可打三日程而
 死母喰破出肉去テ赤肉成ル時イシク工ンフトケ
 ステイフンヲホツリ木綿塗毛入其上工ンフトケ
 トムスラキニフスヲ可打能膿出也膿去愈肉上毛
 暗工ンフラストムスラキニフスヲ可打能膿出也膿去愈肉上毛
 瘡之迫ニキンク工ンフトムスラキニフスヲ可打能膿出也膿去愈肉上毛

塗良黑膿之出之阿蘭陀之治方ハ實症之治方也若
 脉弱食不進瘡之勢弱病人草臥及大事膿焦色有
 黑時阿蘭陀之治方可難名醫之内某ヲ能用テ膿之
 色真食ヲ進脈之出力出時可治口傳有大吏之病症也
 石疽治方之事
 石疽ト云ハ瘡之色ハ身之色而硬石之如右切テ毛
 豆腐トドヲ切テ如手膿モ血モ汁モ莫ク云也阿蘭
 陀力曰早治時ハ切取也切様又事有正肉ト瘡肉ト
 之切カハイテ能見分可切若正肉ヲ切時ハ血走難止
 一將程終テ後膏取テハキ取共跡ヲ切切後ハ金
 瘡之療治ス令面頭ニ出癰ハ不可切瘡ヲ切方ハ人
 之身之立サマニ切横ニス午カハ二切則ハ血走テ
 難止或難愈也猶口傳有是ハ乳房出癰也治方大極同前但
 乳癰治方之事

針之方口傳有
 乳岩治方又ハイテホルスト云
 夫乳岩乳房久塊有次第又成後胸濁水出膿難或膿
 而膿不出瘡之口取付次第口廣成木爪之腐如而硬
 岩穴之如閑故此ヲ乳岩ト云傳云四拾歳以上之女
 婦難治且大事也アノシドノ油一又ヤシヲ之油一
 又土介白痛ヲ見合又ハシク工ン上之加減ニ而煉
 合乳塗付也毎日如是則ハ乳塊次第和成濁水之如
 物或膿カ又乳味力ニ成テ出漸長愈也急治更難
 附骨疽治方了ホトア下アカクテ下云
 附骨之症正ニ了付外股ニ出也氣血不足而弱弱人
 八疔之大小三小腹毛掛或陰囊毛掛也世俗此症有
 皆風毒腫ト云然氏實此風毒不有風毒ハ皮肉之内
 有故腫上附骨之症脊ニ然有煩其内ニ腫上事十
 初發ハ風ヲ引名如寒然有煩其内ニ腫上事十
 筋骨

痛身ヲ勤莫不成此時ハ脚氣之如見故内外治療其
 遠終肉之腐爛入自口関難治之成也天莫也而蘭陀
 曰内外療治遠則一世之間廢人ト成先初癸之時ハ
 能肉菜ヲ用ハヤカテ愈疽成素ト此症初癸寒有
 腫上腫ト肉ト之境モ無俚ニ腫身軀手足強癰瘻而
 痛骨ニ付者又危又腫急所モ不熱不赤膿兼者危或
 口関テ後出膿水之如香臭痛不止腫モ不純日且羸
 瘦飲食不進口燥不止者必死萬一此症無者雖危可
 治而蘭陀カ云此症腫上兼膿又遲能腫上膿様ニ
 可療治○カモノリニ父ノリ口ウトニ父マバ文
 又ニハ根ニフレイルカニホウモニ父マバ文
 濃煎出查ヲ去テハシナヘニケレハ○ハレイ
 十リイ子右ニ色之粉ヲ右之濃煎水入糊之如煉附
 骨之所ヲ能披覺テ下エニクエニテハシリコシラ
 錢程塗其上右之煎菜ヲ木綿押テ付也但此菜アツ

ク而可付能腫上膿也口之所ヲ能見分可鍼口関テ
 後ハ常之癰ニ同治方也右煉菜ヲ付木綿ハ五六寸
 四方ニスレバ
 多骨疽之治方
 此症ハ一切之腫物或灸瘡久不愈腐爛膿水常出百
 葉モ無驗者必内ニ朽骨有者也此朽骨不出則ハ如
 何治民不可在驗朽骨出而可愈而蘭陀カ云此症久
 難愈瘡也先療方風之不入所ニ片ヲ指込テ火ヲ燈
 死肉ヲ去碎ル骨ヲ抜出本骨ニ成急時本骨之上ニ
 付急腐ヲ骨コソケニテ能ク腐肉ヲ去菜ヲ可付先
 死肉ヲ可去菜方○ヒツトトヨウハスアハ○
 一色未而瘡ニ可付肉胸朽骨見也此菜ヲ付肉是解
 ハ風之不入所ニ片ヲ指込テ火ヲ燈
 甲ルカイ○イリヨウス○ソイヲ右三味等分細末

本骨振掛去土木綿之灰ワリクセ^{ウス}置也其上ホ
 リ木綿工ノヲ入トガラクイヤカ又ホク工
 子イフワカリ塗テ入共上ヲ木綿ニテ卷置也ホ
 ツリ之膏茶ハ一日一度宛可年替也
 脱疽治方 此症ハ多分ハ手足之指生其症初ハ粟粒之如成物
 出程無脚膿汚濁水出其形如燥兒女色赤其臭更難
 向鼻無程黑色成次第ニ指之根ニ至年足之甲ニテ
 腐入也拒之筋目リ切落痛如刺針脈強食進氣色能
 人ハ可法若不食而氣色惡人ハ不可法而蘭陀力曰
 此症先茶ヲ付テ指先之腸持ヲワリ惡血ヲ可出付
 茶之方〇ケニブル〇ヘイブル〇タニラソイル

右三味ヲスリ合糊之如而木綿ニ付テ濕指ヲ卷一
 日一度宛付替四五日之内ニ指之先右云取ヲ立四五
 分程ワリ惡血ヲ出其後イニク工ニトバジリヨ
 シ木綿ニ押テ可付日隨テ如本書可茶替也
 石榴瘡治方 此症ハ肘之夾一寸程上癸物也初ハ粟粒之如一ツ
 出根ハ大而色赤硬石之如而後六皮破赤石榴之皮
 ヲムキタル如粒々ト而幾數尺石折点氷流難愈物
 也阿蘭陀力云此症初癸之腫立様三ツカ或工ニフ
 可茶付工ニフカトカラテイヤカ或工ニフ
 又トテヤバルマカヲ可付年久胸廣クハヲラ
 ヲニツトルヨルニヲ付惡肉惡血ヲ去右ニ色之
 膏茶何成凡付テ漸々可愈也
 緩疽治方 此症ハ腫如所所境ナク瘡頭不尖無色不硬風毒腫

十ト之類也阿蘭陀カ日工ニフラストムツラキニ
 フスツ木綿ニ押テ其上中程イニクエニトハシリ
 工ニ下菜ニ置テ付ヨ膿名時針テ口ヲ閉其後癰
 之治方同シ
 肺癰治方
 肺癰之症ハ風ヲ引名如振付熱有テ嗽出テ後風去
 然モ可メ嗽不止繁々嗽テ胸中痛痰ニ血夾之膿出
 痰之香甚臭物也早不治死阿蘭陀カ云膿ヲ能吐盡
 ハ愈也治方ラアテキス千イ十ハ十月刻サレスハ
 レイラ五十月シニワリニ寸程切レキノムカニト
 ム八十日スリ碎ラアテキスレイテレイ四十日
 細刻右ニ水三升入ニ升ニ變查ヲ去其汁ヲ唐金鋸
 二八湯氣之不出様ニ口ヲ能塗微火ニテ二時程煎
 上ケ咽渴毎日湯菜之代ニ用此菜用間ニ七八日ニ
 一度宛テリマカヲ宛用テ良又方セイニホウム

膈

三十日自カツヘレヘ子レス六十日フレイルツニホ
 リヤカヲ用テ吉外付菜ハ胸之痛折ニラウリイ子
 之油ヲ塗付其上工ニフラストムスラキニフスラ
 付或工ニウラストノリ口ヲトカヲ木綿ニ押テ胸
 可付一月ニ度程宛下ニ菜ヲ用下ニ菜ハ工キス
 夕ラアキトム○カトウリユム下ニ菜也
 腸癰之治方
 腸癰上云ハ内癰也臍之穴ニ生ス或ハ腹之邊ニ
 癰也硬ト腹モ硬内穴宛痛煩也膿臍ヨ出云有是
 惡シ大便ニ下ルハ苦大便能出盡ハ愈也阿蘭陀カ
 云此症下ニ苦フ口ウリスカモサリ撮メリ
 口ウ十一撮テハルハアハハイア子イニア
 下撮右五味末而水替入煎ニシテ查ヲ去ヲラ
 口アア口ニヲ加不熱不冷ニ温水突テ肛門ヨリ

突入也三日一度宛可用此下... 黄粉而好酒... 黄牙特之用也... 内癰... 在是... 一工... 燈右... 子... 子胸之痛所... 口... 八日... 二不... 色... 一月...

女ヲクリカニキリ少三イラ... 宛井中之煎湯... 導之方奥ニ記右之茶... 脊骨之端... 日リ... 膿ヲ可取針... 茶之頭... 用心也...

肺癰鍼穴圖



此圖... 肺癰... 針... 灸... 穴...

但療治之手立盡名時如此可針于一治事可有腸
 癱之症治療此阿蘭陀之傳二莫此由申上ル者也
 懸癱之事
 此症ハ蟻之尸渡ニ發物也阿蘭陀力曰治療大槩常
 之癱ニ可同ト
 疥癩治方ハルバスト云又云アアセス
 此症者外科之内之急病也朝ニ發而夕死者有又一
 月半月而死モ有大槩先五臟之疔有○心之疔ヲ火
 焔疔云唇手之内指之筋之節間ニ生初癩之疔ハ
 一點之泡之如成物出其色赤黃也痛痒不定重時ハ
 寒熱有○肝之疔ヲ紫燕疔ト云手足腰筋骨之間生
 紫ヲ包急如次之疔ヲ破テ血水流三日過テ筋ヲ貫骨
 シ爛ニ痛甚シ○脾之疔ヲ黃敷疔ト云初癩ハ泡之
 如而黃色也其色取ハ赤口腰目之下目蓋胞額米喰
 生ニテリ痒カリ強ル重時ハ吐逆身手足強リ痛ム

寒熱有○肺之疔ヲ白疔ト云初癩ニ如泡之而白
 瘡之頭硬而白水流痒而瘡安ニ重敷ハ腮換咽痛焦
 身之毛立肌熱痰ニ交膿ヲ鼻息急也○腎之疔ヲ黒
 厭面疔ト云初癩ニ如泡之色紫而痛皮膚日リ肉内
 通硬而痛如刺鍼微骨髓手足青紫也心胸驚騷憂鬱
 而如沈力目之人見尖出發所先手中胸腹腰膝衰何
 肉和成取ニ癩石五臟之疔大槩也此外之疔之數多
 雖其名換ルト其毒氣行モ不異故略之阿蘭陀之曰
 此症極テ大事也早不治腐忽骨髓通一時羊疔ヲ年
 死事在或速死莫比早不治必死ヲウモイ十ト云木
 葉ヲ酒浸火ヲ煎出白砂ヲ入用ニ日之晩ニテリヤ
 カヲ少用三日之晩ニ尺澤之穴ヨリ血ヲ茶碗一盃
 程取是疔瘡也但石煎汁一日二度程用下戸ハ水煎
 用若不治則イニクエニ下アツトストカア二日ヲ
 瘡上可塗一度付不瘡二度可付若五七日過疔腐廣

成、此狀右の形用、症イニクニトスニカニヲトシテ可付
或、多ク多トイテイシ又、可付右之アウセイト云ハハイタリヤニ有ニスリカニカニトシテ可付
此、症、少、少、三、尺、澤、之、圖、口、傳、



瘰癧 治方 カンカラト云
此症 耳根或首胸腋ニ発塊在硬寒熱在ニ有瘰癧之
名狀 雖多ト治方 無安事 阿蘭陀之云 初冬ニ瘰癧ト
槎ニ見立名 收ハ切ワツテ迹ヲ全瘡之療治スニ若

舌之チキニ出タルモ切ワルニシ若久瘰癧手黒身出タル
六ヲヲリヨニツトルヨウルニヲ切タル迹ニ可塗惡
肉去後ハ全瘡之療治同前但ニツトルヨウルニハ
先切其迹ニ可付也
流注 治方 數日有瘰癧ハ
此症者 身体手足何之所毛出瘰癧之如硬塊在或去
或爰ヨリ彼ニ移リ行モ在又出後其經ヲ便何方
此方 出タル在阿蘭陀カ曰アムンドト油ヲ少実用ハ
外ニキ出也 其時ハ何之腫物ト見定其仍病体治療
可施 壯盛之人十ヲハ下ヲ可用也
火丹 治方 モルボシス忌ヲトシテ云
此症ハ 偏体ニ村雲之如走出少高ニ有也 世俗走草
云物也 村雲之如上粟粒之如由瘡痒熱在黄色而
濁水流潰爛痛モ在此症不可嚴阿蘭カ曰ハアリタ
了リヤ瘰コククアリイアリヤ同フウリマイ十振右三

色更朝夕二度ニ用尺澤之穴ヨリ血ヲ取良
 大痲風工ルハヤ上云不也
 此症ハ癩瘡ニ以實者非癩瘡初發ニ先痲木不仁而
 疹之如赤細成物出久時ハ潰爛出浮腫無膿先土品
 在一ハ肉死ト云痲木不仁而切毛燒毛痛不覺一者
 血死ト云潰爛濁水流指筋節々ヨリ切落骨死ト
 云ハ鼻腐落或目損毛有又面紫色腫毛在偏体小瘡
 出毛有或眉毛落或足心穴閑毛在是ハ五敗之症ト
 云難治早ハ可也阿蘭陀カ曰腐肉ヲ去正肉求可治
 茶方ニル夕ウリヨソヒルマアト去右燒酒ハ茶碗
 一程浸其燒酒ヲ可付甚シミテ上ハ皮ハ念也其迹ニ
 ヲウリヨヒツト口ヨウロシテ刷毛ヲ可引惡肉忒
 去也其迹ニエントラストテヤハルマヲ付テ愈也
 内茶之方ラアテキス十イ十臍ヒイヒボウハ膏力
 ツヒヘ子レス膏フレイルリシ膏右水鼻入

骨槽風治方アケイ十ト云
 此症ハ初發耳前頰臂頸筋骨痛久時漸々腫寒熱癰
 之如口首ス夕之難閑食事難成初發如何ニ硬後口
 閑難愈能不治則食無而死阿蘭陀カ曰此症能見介
 可治切テ療モ有不切而治モ在先王ニフラスト夕
 ラアヌスツマルクウリヨリ木綿ニ伸テ可付二目
 三月過テ膏茶ハ水銀ヲ少押テ可見痛強所可有
 其時右之膏茶ニ水銀ヲ少押テ可打口可閑所ハ少
 温而其金ハ不温其温成所ニ針ヲ刺口可閑膿出
 膿出後常之腫物之治方也右之膏茶ニ水銀ヲ不入
 前ハベリニ成モ有不純而痛強膿兼夕ル時水銀ヲ
 可加内茶ハ大痲風之茶用食
 鵝掌風ハ夕ラコハ口ヲフト云
 此症ハ手足之裏ニ出石榴瘡之是也阿蘭陀カ曰此

右ニ記大痲風之療治同前也
 凍風治方カキイ化ニテルフウト云
 此症ハ雪切之良也腐而難愈阿蘭陀力云此症ハ并
 ニエシテテヤルテイヤフ付可治
 鶴膝風治方靴テイ此キト云
 此症ハ足之ハギト股ト瘦細成膝計ハ腫痛也難治
 之症也阿蘭陀力由常ト肉食ヲ過鶏鶩ツクニ野
 手此分不香猪鹿雀等ト患ニ治方曰力大リ振ノリ
 口ウト同口テア口ニ同アフマニテ同テレト同フ
 ルヘイ十同フ之夕ヒ子零右六味水七八升入煎
 後フラシタヒ一度宛如此ハ温テヲヲリヨカモ
 温洗更一月一度宛如此ハ温テヲヲリヨカモ
 リ○ヨシリヨヒヒリヒイ○ヲヲリヨカモ
 ○イニクエニトテヤルテイヤ右四色合能々摺塗
 付其上エニフラストムスラキニフス木綿伸可打

煎茶之性盡先時ハ又新拵煎温石之如油膏茶可付
 不洽云更ナシ
 腎囊風治方スマルテニト云
 此症ハ陰莖之衣痒成難絶強捻オドスル時ハ鱗立
 愈兼ヲ云也阿蘭陀力曰此症ハイニクエニテノイ
 テレイトニ折付テ良
 囊癰治方クウ少ト少ト用云
 此症ハ陰莖之衣ニ癰也阿蘭陀力曰同赤膿前ナラ
 エニフラストムスラキニフス○エニフラストメ
 リ口ウト○エニフラストマヤキ口ニクエス右三
 色合木綿伸テキニ可付膿テ口可成所見六并ニク
 エニテハシリコニ下系付上右之膏茶可付口
 可開口開後ハ常之癰同若石之系テ口開兼時ハ金
 玉ヲ脇工押除針ヲ可刺其後治療何モ固口傳有
 人面瘡治方菓子イオウクハ云

此症ハ勝之頭ニ人之面之如目鼻口之形出瘡ヲ云
 而蘭陀カ云此症ハ大事也工ニフラストテヤキ口ニ
 コムコムスウ木綿俵付口之開之テ折々可替付膿
 名時針之取リ見計口ヲ開膿ヲ換盡其後工ニフラス
 ストテヤハルマヲ打テ可愈口傳ハ良ニ云
 眼胞菌治方工ララタル言ニ云
 此症ハ目蓋ニ出来腫皮ヲ公キ危如赤成難愈ヲ云
 世俗目菌ト云是也而蘭陀所曰此症ハ鷄子白ヲ取
 茶碗ニ入カキ交ハ泡立也其中明ヲ赤ノ少入又交
 者泡立ヲ木綿之切ヲ三重四重石之子白ノ泡浸
 目蓋カマセ卧也但寐可又可付也
 白禿瘡治方ハアブルムト云
 此症ハ小兒之頭出白雲瘡ト云也而蘭陀カ曰イニ
 シ工ニテアツトストカアヒヨニシ塗付テ良也
 痘瘡治方工ニトコホツクト云

此症ハ痘瘡也阿蘭陀カ云痘出難時ハ羊之糞之汁
 一合程シホリ出コロウクスラリエニタリヌ七分
 ペイタラバウラ女抹而右ラ乳味合服痘出也乳味
 人乳ヲモ新牛之乳ニ或羊乳ヲ三合程用行ニ不
 苦又云痘惡ニ六犯味ニラリ工ニタリヌ粉而交痘惡
 取ニ可付其上羊之内油可付痒リ出ニ右之付菓至
 良也
 痲疹治方工ニスルト云
 而蘭陀カ曰此症良石之痘瘡之藥用テ良付系ニ不
 可入
 腫物初發ニ疼痛止法
 先初發ニ工ニク工ニタハシリコシラ腫物惣体塗
 付其上ニ工ニフラストムスラキニフスラ木綿俵
 可付若不止則ハシリコシラ兔之油ヲ等分合腫物塗
 付其上ニ工ニフラストムスラキニフスラ木綿俵
 付其上ニ工ニフラストムスラキニフスラ木綿俵

葱白ヲ熟灰埋ムニテ刻摺碎石之ハシリユニ兔油
 右三味合塗付右之如ムスラキニフス可打也
 右中傳曰此ムスラキニフス膏者悉惡血ヲ去
 風ヲ防故多上膏打也右之療治ヲ痛止腫物和成膿
 莫速也膿ハ時ハ針ヲ可刺所ヲ見立口ヲ開ニ又云
 針ヲ嫌者六口ツフトウリヨ手口ヲ開ルカ良然凡
 是手ハ甚痛者也針ヲ口ヲ開ル特痛無愈莫早口開
 テ後ハツリテメイケマシ拵イニクエニタテケス
 テイフンヲ木綿之ホツリ右之イケマ塗指入其
 上エシフラストムツラキニフス又木綿ニ伸可打
 一日二度更打替メイケマ可拵替文云若右之テ
 ケステイヒンテ膿拔兼時ハ凡及ヲテケステイヒ
 加メイケマ塗指入全上膏系ハ右同前膿去愈肉能
 上各時ハメケマヲ指急上ニフラストテヤ公マヲ
 可付也諸瘡凡右之ムスラキハシリヨ手不治莫ナシ

最仍其病体治療之手段見立第一肝要也
 走草治方
 此症火急ニハ速死事有甚大事也テリヤカラ六七
 分水ヲ用衣ヲ厚着暖卧可汗付茶之方エニシテ
 アルフンカンフヲトシラリヨ口ヲアツ石ニ色
 合草塗付其上醋下水ト等分合温木綿浸大掩シナリ
 木綿之温ナル内可付此症大便結莫有大黄カ暹暹
 團之又トツクカヲ用可下軟草只大麥末ヲ監紙ニ
 塗草當テ良
 標疽治方
 此症イニクエニトハシリユニラ塗付其上ムツラ
 ニフス又木綿伸テ可付又云大末白蜜ヲ煉合膏
 之如而付モ良右之茶ヲ不治則又黄下ヲ用テ可下
 其後テリヤカヲ用テ可汗但下ヲ用莫ハ甚強痛難
 絶ニ可用右之療治テ不治云一十三

疱瘡カセ此時之藥方不効者ハ
 井シクエシタアノカニフラトシラ可塗或ハ
 又方唐之土炭口オア口ニ委之フルカオベイ
 ト心夏右煉合付テ良方ハ未だ未だ其効有
 筋延カセマサ此時藥方ハ子筋延カセ縮カセ時ハ
 腫物ヲモ金瘡ヲモ愈ソコ子筋延カセ縮カセ時ハ
 先下地ヲ火ニ温油ヲ付テ可治イシクエシタテ
 ヤルテイヤ又塗合若此藥時ハラリヨヨレイ
 カウロシ〇ヘイルヘツテ右兵色合蠟ヲ加テイシ
 クエシテノ如而可塗付若中爪之如瘦テ筋伸カセ
 マス肉耗テ瘦タニテヤルテイヤ置ラシテ今テ
 染ラシト口今テ染タクス今テヨヨリヨカモノ
 リオヲリヨロウリイ子回ラリヨホウス同
 土之油ヲリヨリヨスコツセイ同ラリヨテレシ
 ライ十日フランタヒ子染右蠟ヲ加煉合下葉付テ

其上エシフラストヲシコロシヨシテ木綿ニ伸テ
 可付蒸葉之方マニバ振ラアテキスリテイマ蒸
 カモノリ振ノリロウト之花コハヒモニリイ
 子蠶石煎湯氣ヲ痛所ヲムシテ右之如葉可付也
 頸筋引ツル時治方ハ不効者ハ其方ニ置ル
 百蘭院カ曰フラシクイ子ヲ温テ頸ニ塗テ研
 付テ吉着不治則テヤルテイマ琥珀之油ヲ加テ
 ヲシリヨテレシテイオ〇ヲシヨスコツセイ右
 四色合温テ頸ニ塗付木綿ヲ卷翼也
 腰之迫筋結特治方
 イシクエシタホリホウリカオアロシカヲハ
 リヨレリロウロシ右兵色之内何成長可塗丈シハ
 リヨ子シヤアモ良右ハ熱ヨリ發腰痛ニ良是テ
 モ不治則テリヤカ湯ヲ用テ衣厚着可取汗也
 腰冷痛脱ハヲシリヨカモノヨリ〇チヤルテイマ右

合塗付其上木綿手三重四重程卷温ニ又エニフ
 不トノリ口ウト付テモ良又アノント之油ヲ付
 口良有之葉ヲ着不浴取ハスニツセイアレリヨ
 口ニ月カモノリ父ヲリエニ夕リス又アルトミ
 イヤ。マステキス灸右末而油ニ灸蠟ヲ能加減ニ入
 煉合腰ニ塗付テ良
 轉筋治亦
 ヲメ子イフム○ヲナリヨ十アカラ○カモノリ右
 五色之内何成氏轉筋ニ塗付テ掌ヲ摺込能包置也
 常々足袋ノリヤスヲフミ不冷様ニ包置ハ足冷テ
 轉筋無者也
 眼赤筋張カヌミ灸取方
 口アト口ホアト○トウヤ右トウヤヲ末花之
 水ニ入摺夾置居テ也其上澄ヲ目ニ露ニ露程落

入テ良又云花之水珍珠分トウチヤ分右三色末而
 花之水夾カキ互其上澄ヲニニ滴モ入又乳味ニ花
 水カ前水カ夾合目ニ可指男之旨云男子之吞乳汁
 女之目ニ女子之吞乳汁ヲ可使也
 眼目腫痛取浴方
 カ夕アリイテスニ分末而小粉ヲ加醋ヲ煉テ灸
 程ニ而耳之後髮際ニ付テ木綿ヲ蓋而夕汁出返
 置其後葉ヲ取テ其折ニベントラサテ當テ血ヲ抜
 其迹ニ阿蘭陀之葉ノ葉ヲ付其上ニイニクエント
 アルフンカシフヲトシテ付テ可愈ス
 古オケ爛念ニ取治方
 是ハハリニ之蜜清汁ヲ洗テ良又至ハラノ花蜜
 清之汁モ良又カ子ヲ下ラシ夕アゴ蠶疔煎查
 シ去其汁ニ百葉ヲ加カキ交合テ良幾度モ含替テ
 耳痛治方

耳之中風カ水カ今痛六アノンド之油カモノリ之
 油ヲ加耳ニ可指若耳之内熱氣有ハ口ウチ之油ニ
 アノンド之油加耳可指○
 車鳴不聞收ハ頭ヲ能包テ可過冷夏惡葱白ヲツキ
 シホリ其汁トアノンド之油ト等分合耳之奧工ニ
 之露入耳之口トク度木綿ヲ抽込置也一月二度宛
 拍替也夜間長可置又辛大根ヲ三ホリ汁ヲアノン
 ト之油ニ合右之如可指又云ヘトウニカ○フコウ
 リスノリコウテ○フコウ、スカ、ノリ○カ、ン、テ○
 ルバ各一枚フウリカ右六味細刻木綿帛ニ入煎温
 十ル内耳可當俗冷則ハ又温テ可當
 月代フヨソク短法方
 小粉鷄子白醋カ右ニ味焯合乳香末カ加交合月代
 フヨ、ク折付ルフヨ、キ強壯ハ右之煉茅ヲ膏之如木
 綿ニ伸テ下付

口中臭特治方
 此症二色在息之臭ト齒莖之臭ト在鼻之息ト大苜
 蒲之根之蜜漬リカ之青皮之蜜漬此ニ色ヲ常ニ
 菓子可用又方白硫ヲ蜜煉酢カ施用又方リコシ之
 醋ト蜜合用又方小茴香ヲコシヘイトト之志入菓子
 用テ良齒莖臭ニフウシトウシ子ヲカイ節々而
 良
 胸腹痛治方
 無何胸腹痛云テリマカカカ四カ介水立茴香之油ヲ
 四土滴加用テ著物カ厚而厚可汗又方大苜蒲之根
 乾又末而四土分湯用
 胸痰咳結時法方
 ソコスレイヤコレイトハ是カ女宛含其汁カ女宛
 可含又駒引草花蜜漬カ用良猶小兒之痰良老人之
 痰咳外工吐兼ハ太事其照トイ下工ツハ変マルバ

十有ラアテキススルテイ交コソリイ夕交右四味
 水兼入煎口ニテ糟ヲ去ラシイ十膏ホハニテ
 背カツヘレヘ子ニス背右之煎味木煎水兼
 成時ニ查去其沫白蜜ヲ猪ク可程入一沸而一度
 可宛再四土度ヲ用又方痰罕結名眩焼酒ヲ茶碗
 程入其内火ヲ燃而氷砂糖ヲ入解返燃火之燃内サシ
 手交合如ク用テ良又方性背イトナ子膏又茴香
 背ラアテキススイリヤス罌コ口ハ脊右水兼入薑煎
 可テ查去其沫白蜜自ク可入一沸而少ツ用一月四
 土度用也痰罕結時胸付茶ハイシクエントテヤ
 テイマ火ヲント口ハツテ少ヲリヨカモナリ少
 右ニ色火之上ニ温コ口ウクスラリエン夕リス未
 少木香之末少入煉合胸塗付其木綿ヲ温付テ可
 置隔之茶之事常々湯水多吞胸冷テ隔成ハ胃脾之
 冷名故也其者チリハカ八九分モ再一度用衣厚而

可汗又常々之食物ニテタル肉豆蔻丁香石三味未
 常之食物少宛加テ食而良又方カ子イラ罌ヲシイ
 ニヨヨリアカラ交ラカペイルト口クケンフル
 交フウリ日アアカラホウト日ス口ア夕交
 カル夕モニ交カフラン又良香又右極末而粥砂糖
 少加吞沫而一度右之上分ヨ一又間可用朝夕一日
 ニ度宛用テ良ホ方スカア夕振フウリ少多テ振
 口ニヨリ日右末刻袋入フト如平目而葡萄酒水等
 分合右之袋ヲ入一拂而取上沫ニホリ出其袋之茶
 氏腹當温也袋冷時ハ又右之如温幾度腹當テ良又
 云飲酒過度而隔ト成脾胃熱有テ此症為者口ウサ
 之花之蜜漬之汁ヲ取テ夕交ハ夕リ日ニツト
 ルヨウルンヲ三滴入交合用良示里糖漿ニツト
 吐血治方
 此症ホクスフ口ツトトミイラ自スハルヤセイラ

文キ少血交ホウルス
 七介車前草水カ醋ヲ可用朝夕ニ度宛毎日用強醋
 十ヲ六水入和而用或酢ヲ嫌者六黑野午之心血取
 様ハ黒野午幼時玉ヲ取毎日草ヲ喰テ葡萄酒ヲ吞
 別之物不食ニ歳成時咽高突テ其疵且其出血ヲ鉢
 受テ小壺入居セテ其澄水ヲ捨其壺又空入可置能
 カタマニル物也其堅ルヲ可使又方三イラ女ハ下
 五介ヨリ九介迄醋手毛車前水ヲ毛用也血止ヲ女
 未而加毛良ニ
 血鼻留様之変
 此症ニ先血止石ヲ首掛セテ吉又方ホウルス
 女入交合不綿切塗テ鼻指入其上強酢冷水ヲ合木
 綿浸頭毛頸毛可巻又如何毛頭之上冷水ヲ夕々々

湯通十ドヲ落掛テ良又方兔之腹勝テ白毛在ヲ按
 取テ未鼻ニ吹入又方車前水ヲフルト又方又夕
 車前水交合木綿浸額ニ鼻毛付テ良
 下血止様之方
 下血ニ先大黃未而八九介水ヲ用其後テリヤカラ
 五六分湯ヲ毛水ヲ毛用温可汗又法金子ヲ燒テ粥
 漬テ又燒テ粥漬如此三度而共粥ヲ可用此茶用後
 口少少之蜜漬ヲ度々可用也内又清而脾胃ヲ補氣
 シ清也常々之菓子六マニイラ之蜜漬物用良
 朝夕之食物肉豆蔻之未加可用又方騾鱗血不黃
 合一度五分ヨリ九分之間人之老若虛實ヲ見一月
 一度宛吞汁ハ粥カ鶏子水煮汁ヲ可用或麻角ヲヤ
 入リテヲ口シ水漬其水ヲ用佳也又麻角之未大麥
 之湯カ粥カ漬用佳也又腹下取之菜之所食下血之

菜在見合可用不断之食物小鳥以良下也鷲惡生莫
多可忌多不可食... 腹中下時之菜方... 先不黃之禾土六分朝寤心湯用可下其晚...
枳椇皮ヲ火入氣力以養... 又車前實土石末以一日五分...
朝夕用テ此茶ハ下血毛吉喉渴時床角ヲ水ニ
須臾居セ其上澄ヲ用又赤ヲ以テ煮テ用吉
天判水浸其汁ヲ用佳或湯浸之良又鷄子ヲ硬煮不
所用テ吉合本... 大便秘結治方... 先不便秘結只下ヲ可用ルイハアルホ及ラシイナ少
ワルマ此程右ラシイナフルニラ水テ煮ワルコ之
解特ルイハアルホ及ラシイナフルニラ水テ煮ワルコ之
ニ其汁ヲ可用不黄一味水四五分湯ヲ之燒酒ヲ
用テ下也... 同蜜道之方... 石三色銅入火之上等煉オクエシト之加減硬時
鉢ホ下カ此之油ヲ塗其上入自然硬ギリウ也之杯
之如成ヲ指程丸穴指入若ナク無時ハ嵐之糞入
与煉... 淋症聖薬... 可通聖目琥珀之油ヲ四分程用煉酒用也亦方肉豆
寇可ヲクワリカニキリ六分右末又テレテイナナ
加○是程七一日本宛可用示方ア二イシ○ニヲリ
車前子石煎查ヲ去其汁明瓦四分程白磁火入能
スマシテ水突ニ入祿之口日ヲ内突入右口日ヲ
不出様スベシ

淋症聖薬... 可通聖目琥珀之油ヲ四分程用煉酒用也亦方肉豆
寇可ヲクワリカニキリ六分右末又テレテイナナ
加○是程七一日本宛可用示方ア二イシ○ニヲリ
車前子石煎查ヲ去其汁明瓦四分程白磁火入能
スマシテ水突ニ入祿之口日ヲ内突入右口日ヲ
不出様スベシ

石淋之茶方
 此症ハ先大便結夏惡シ瀉而吉木黄杯ヲ少用下吉
 又亦カシヤヘストラ之ハ有黒砂糖如物ヲ取看
 湯ヲ解立中少加用食後苦アナシトラ也六ツ宛用
 良亦方ヲクリカニ切アコイ鳥聖裏左阿戸罌ヲラ
 ベテニ反テバルハ日右四味未石淋結尿四五介宛
 芥之煎汁ヲ用湯ヲ元水ヲ用又琥珀之未芥煎汁
 取用同油ニ良又ルイバアルホ交ケ子アルバイニ
 同カ子イラ日也イニヘニイクル同アニイニ更リ
 キイアルツベ交ヲラベテ罌ケンフル更テリヤカ
 交ヲウリ罌ムスカア夕券マヌテキヌ反石細未焼
 酒丹入カキ立琉璃德利入日朝德利之口ヲ蟻ヲ塞
 毎日一度宛德利ヲ振五日可干也日造テ其上又萄
 萄酒ヲ五合ハ口ヲ右之如十余日干其後コニ查
 去其汁ヲ能ヌマニ石淋作特リニ可用ハ頗小便通

又腰湯之茶之事
 二ルハ黍カニソリ振ヒツト口
 下リ同セ子イワル同石煎夕ライ入腰之常処返
 浸様而過也小腹付茶ヲリヨコリカモヨカモノ
 リ石腰湯後此油ヲ腰小腹可塗也方カモノリチヤ
 ルテイヤ石合塗付テ吉ヌコリヒヨシ無特ハ此茶
 手良又云小便秘澁之時ハ冷テ不通ハヲリヨハ
 クシイ子四五滴維之水煮之汁カ葡萄酒ヲ可用無
 糖汁ヲ用此也無糖ハ琥珀末六七分末而芥
 煎汁ヲ用此也無糖ハ琥珀末六七分末而芥
 用又熟テ不通ハ手ハバ之末又湯ヲ用又便下後
 石之茶用又ト口ムスナク少用大便和下物也
 暹邏ヨリ出サヤ長豆之事也内之玉ハリテ用黒砂
 糖之如物サヤ内ツカヲ包テ有取出水也取用若
 右之茶不通ハカニソリニルハラアテキヌ可ルテ
 石煎腰湯ヲス

也腰付柔油也。トリヨウロカカマヨリカホツホ
ウリヨカ右之内何耳毛塗付亦良又冷ヨリ出名六
テヤルテイヤカ毛ヨリセ子イフル出介魚肝ハテ
レソシテイ十之油女入右合腰塗付合ト也
下痔之系之夏。瘡氣魚特カニフラ上テ付置也
無ハセロウテ女イ夕ラキヨ多花之油少右セ
イラ女加煉合棒腦灰入流交合付テ良
照肝治方。腮肝近六口中ア口ニカカモヨリ何テ
云温指木綿又卷右之油ヲ付其指テ脱肝ヲ内合也
小兒之脱肛良瘡久脱肛テ冷名云口ウテ撮アルト
ミシイマ撮フ口ウリ下アルテアトアソフル日ヲ
リハ少右葡萄酒相合テ煮其汁ヲ湯矢浸脱肛ヲ
温押入也。温程幾度ニ夕テ良又赤口トウテ石榴花
松脂明瓦石等介合未而右之洗茶テ夕テテ温此茶
付其后押入也

溺水療治之方

先水溺者在ハ大成桶之上。横寢セ腹ヲ為持伏テ静
漸桶ヲ勤シ水ヲ吐吞也。水出氣付時アセトウテ之
油茶碗可程可吞。腹中在程之水出也。其後トクト令
寐卧。温テ維水煮之汁ヲリテ夕リス肉薑葱十トヲ
加テ吞外。溺者治方。口傳有テ。下テ。下テ。下テ。
口中瘡之系方。ハイロ口アア。セ口フリ。セ。セ口
口ニヨウ。口ニエテ。フテ。セ。右合口中。切塗テ可也。
金瘡。イニセ。イ。不。イ。ト。云。示。ク。ワ。ヌ。ト。毛。片。云。十。リ
手履血走者先血ヲ止。昔血止。示。ハ。イ。シ。之。未。可
付其後。切口ヲ可縫。切口在ハ三。所。止。寸。在。ハ。二。所。程
見合可縫。縫目余近則。内。膿。口。モ。リ。出。難。又。遠。以。疵。之
肉穿難肉不掛。様皮ヲ掛テ可縫。縫テ。示。ト。キ。木。綿。子
ケス。テ。イ。フ。ン。テ。付。テ。切。口。ハ。少。其。上。カ。ラ。寸。テ。イ。ヤ
木綿伸テ可打七八日。過テ系テ可切。冬ハ九月十日程

金

遺予可切毎月二度宛上下之膏菜可替付其後
 ハルシウ打也能念テ皮ヲ生也縫糸紅之糸也切針
 手發之若疵深返イハリシカ温疵之内入其上
 右之如可治若疵骨掛名特ハアルハイリヤフス
 ノイラ右小介合骨振掛其上右之如法亦同前也又
 云久疵手胸換名ハアケフホク付テ奮テ除テ疵之
 内清ク成特テ下子イホクハハルマ付愈下疵之
 返サテイヤ木綿伸付其後テヤハルマ付愈下疵之
 腸赤身在ハイ左テレイヒカカシラ付也赤
 之去瘡肉上膿氣ナキ時ハケレジヨカラ付也赤
 腹疵之事腸出名特ハ野午之油乳味ヲ能加減温
 勝塗ハ腸自然入也手手強不可挿入午之乳味無
 湯ヲ能加減而腸ヲ温令腸入後可縫次ホツリシ
 疵之口疔置其上テハスイニ可打ホツリシハ二
 度宛朝夕付膏菜三日一度ホ易也ホツリハ菜ラ

不可付若疵之口細而腸難入時疵之口之上之方立
 一二寸ヲ見合切了ケテ腸ニ可入切様口之上之内
 カクリヲ入見テ可切腸付菜ハ右野午之乳又湯行
 テモ良腸入之可縫縫様ハ新切疔疵之下カト本疵
 四カト之所新疵之方可縫其後ホツリテ有其上テ
 シ下イマ可打立之疵惣掛テ可ホツリテ膏菜マ
 付替更同前金瘡療治ハ風之不入斬テハ妊婦ヲ
 切可忌其忌思也腹腸ハ切名ハ難生物也

瘡治癒
 瘡死



瘡ヲ以置時疵手外ホツリ不出様又不動様可置大疵
 小收モ同前上膏菜ヲ極之疵又膏菜一枚ヲ二切セ
 様可切三切ハ時ハ疵多口ヲ惡也
 鐵疵之瘡疵深入者時先止血付テホ止其後可

夕火ヲ入疵之深ヲ考其深ナ程不ツリヲ梅ノイ茶ニ
 テケ下テイコヲ塗疵指入其力ヲ可テイヤ下打
 ヲイ茶ハ一度宛指唇上膏茶ハ三日一度易也
 瘡肉上久スヤハルニ可打也
 皮切命リ名特ハテケステイ也ラ木綿伸テ可付膿
 去瘡肉上テヤハハト下付
 半足切落名特先血止後ハウトテキステイコヲ付
 蛆口可打一具一度宛付易方良六七日遣テ切口瘡
 肉上可瘡位見特枯死之未功口振掛共上テヤ下
 リコヲ可打切落名又縫莫莫事也少テモ皮掛名ハ
 可縫切名先ヲ筋骨少モ不違様見計切コ能合三所
 テ所見合可縫コイリコヲ温疵之内入ハツリテケ
 下テイコヲ疵之口付其上テコハテ下打其上木
 綿テ卷置ソエ木ヲ結付可卷少モ不効様而置也右
 油一具二度宛可付テ干ステイコ同前上膏茶ハ三日

三コ五日テモ打替テ良
 矢疵之事矢之根止カ或竹木折込名特ハ膏座
 疵十ヲハ毛引抜テ取五七日遣疵之内腫塞
 名時ハ所不スヲ疵之深ナ程細断刻糸ヲ卷疵之
 内指入三時四時程可置ステ次第フクニ九隨疵
 内廣成也其時又テ出毛引テ内コモリ名物
 扱出ホツリニイコエコトケテケステ
 思三ハシリコ右合ヒヒリテ加能合ホツリヲ
 疵之深程搦石之葉又塗疵之内指入其上テコステ
 三コ可替打竹木之先内女是殘名ハ右之葉手出也
 日可替打竹木之先内女是殘名ハ右之葉手出也
 鉄炮疵之葉ニ右之矢疵突疵同前若玉肉之内止名
 子手扱テ取出ニ若骨止リ名ハ右之如而可取若日
 敷経疵之内コ名ハ右之不テ不可指玉出後治方
 同前下テコト云ハ海在是也石腸之如磯ニ浪打寧

一レテ在也惣而金瘡療治之及弟仁掛様膿相肉色
 瘡時介重々中傳又云金瘡初ハ先血付テ血ヲ止テ
 ケステイテホツリ浸テ下系付其上テヤハルマ
 下系付テ良又云若疵ヨリ血多走難止服ホウヘイ
 シテ疵之口付其上木綿ヲ三重四重々々ニ酢水等
 介合浸切只押當上ラ包可置又亦ホツリ沃也梅醋
 又血碓交ホウルスアルソ同カストトイル日夕
 イラシケラ夕同ニステキス又右未疵之口付其上
 鷄子白如中傳而ホツリ浸疵之上押當其上木綿テ
 可卷其上血留石ヲ為撮テ吉
 筋切各時ハテケステイテイツヒリユウ
 又テレノンテイテ右合ホツリ浸切只抽込共
 上テヤハルニテ打其外六口サアアラ塗付テ吉也

險地高上墜墮而打各所不知而痛ハミイラカヨウ
 之ニイラカ服用而氣付テ後又澤之穴ヨリ血ヲ取
 合腫各毛ミイラシ灰宛可用又云身骨不痛皮肉腫
 タルハ下口サアアラ可塗或ラ、当コロヘイテ吉其
 上テニスイテラ木綿伸テ付久而青墨身出各六
 下ハ右之油有上テニスイテコウナクテ良
 手足之筋違各時ハ本之如引合モミ付テ下口サア
 日ヲ塗其上テニスイテ可折療治之及弟仁掛様骨
 折各取之治方同一切之骨筋違各治方同前何テモ
 女不動様ホヘ
 墜墮折傷之方ハ若疵皮肉破損也大而骨折各ハ能
 毛合骨之折目女モ不違様合薄木綿テニスイテ
 シ付卷其上薄板テ四方ヨリ包其上木綿テ取テ旋
 付テ枕カ行テ和成物持腸誥テ女モ不動様而可
 置十二三日程道示静女上テ女其押可見大形骨ヲ

牛名様上リ下口寸ア只塗其上テ今スイヲ
 木綿伸テ付卷其上右之板引卷立可置十二日一
 度口寸ア只塗膏可替方月程過テ大形可瘡
 其特枕大ド之様成物ヲ取ノケテ治方右之如不令
 寸口治方之事生付名異口ハ當歳子十ニ口之
 多切取寸口之成唐鳥之羽節之内腸之内寸口之
 威拵切合テ鳥之肉モ口肉温成内押合縫付テケ
 下テ付共上力ヲ可テヤヲ可折口之内日
 リソイニ口寸ア只塗是古又用新モ不
 若然此右カ吉此療治ハ阿蘭陀之國言ハ外秘本道
 其外某師餘多寧合療治スル也

牛莫 全瘡腫物禁忌之物 海草類 貝類

鶏 同食而好物之事
 小鳥 鷄子 鳶 鴨 麻 羊 牛 赤トル
 野菜 血ヲ不取物吉益ヲ生ハ惡シ一切腫物同

右此一流雖委秘無余心多年御懇望付從
 先師愛取之書極意無二之方不殘一毛令
 相傳者也如彰神文死胡之節火中可有候
 猶按之通可守相者也仍件

九易肥之前國住人河口良醫鹿

春益

藥品手交野山人

新

濃易宇多須佐人

伊藤玄澄

良仙

阿易富昂之佐人

山口源左衛門

良勝

濃易加納佐人

今奥易田村郡佐

富岡春悅

義通

同佐

同名春孝

義覺

藤山新作殿

延享三 丙寅年

八月日

庚子三月庚午

渡部守多 漢位

伊藤玄澄

阿部富昌 之任人

山口深文 任衛

八月日

渡部 綱任人

今泉 昌日 村 郎 任

高田 春 院

新山 讓 非 類

為 是

同位

同 名 春 院 實



