


阿蘭陀外療秘傳

阿蘭陀外療秘傳

夫人向ノ體中ニウモル血ノ名四ツ有リ一ニサングニ
 コレヲ三ニヘレマ四ニハニレニコニヤ此四ツ也サング
 血ハ善キ血ノ一也性熱ニメ温也コレヲ血ハ血ノ上澄薄
 血也性ハ熱ニメ燥也ヘレマハ血中ニアル水也性寒ニ
 湿也湿痰ノ腫物ハ是ヨリ発スレニコニヤ血ハ血ノ泥
 也性寒ニメ燥也然ルニ右ノ血何レモ體中ニ過不及ナク
 相應スル片ハ無病也右四種ノ血ヲ損スルモノハ風寒暑
 湿飲食或ハ房事ヲ過シ或金瘡打撲或遠行ナドレテ血氣
 凝滯スル故ニ瘡腫物ト成リ諸病ヲ発ス能其原ヲ尋子テ
 可療治

△熱寒風疹見様并諸腫物治法

●ヘレビリ血ハ熱ヲ云是ヨリ生スル腫物ハ色赤ク甚痛強
 急ニ腫物腫上ル也治方初突相散ラス茶ヲ可貼性寒燥ニ



富士川文庫

3043



メ 飲ル茶ヲ用エ寒ヲ以テ熱ヲ解シ燥ヲ以テ身ヲ強クシ
テ 飲ルヲ以テ惡血ヲ散ラシ押ス

主方

ヲ、リヨビヨウラス

ヲ、リヨソラトロン

ヲ、リヨロウザ

ヲ、リヨロウリイニ

右 四味合温メ塗付其上ニエニフラストテベシイブニヲ
ホ綿ニ伸付其上ヲ卷置一日ニニ度宛付替ル痛止リ腫モ
引也若シ痛不止腫不引キハ治方ヲ替ル

ヲ、リヨロンフレイカウロン

ヲ、リヨロウザ

ヲ、リヨカモイリ

ヲ、リヨソラトロン

ヲ、リヨロウソイマヨ

ヲ、リヨヒヨウラス

右 六味合温メ塗付其上ニエニフラストテベシイブニニ
エニフラストムスラギニブスヲ等分ニ合セ右ノ如ク付
是ニテ敬ルカ膿ムカヲ見テ若シ可膿ハ右ノ茶ヲ除ケテ
早ク膿スル茶ヲ可貼下地ニエニフラストムスラギニブスヲ
腫物ノ上ニ塗付其上ニエニフラストムスラギニブスヲ
大ニ伸テ付右ノ如ク卷置バー一夜ノ向ニ膿ニ成ル也膿又

ラバ早ク針ヲ刺シテ膿ヲ出し針アトニハメイチマヲ刺

ス也メイチマ付茶ハエングエントアホストロウラムヲ

塗付テ刺入蓋ニムスラギニブスタ付ル也若シ腫物ノ口

廣ク瘡ナドノ類ニハホツシヲ指エ此アホストロウラム

ヲ浸レ疵一杯ニ刺入テ蓋ハ前ニ同シ内高下ナキ様ニメ

愈内ノ八九方目ヨリ愈膏茶ヲ付ル也愈膏茶ニハ

デミニイヨ

テマホンポリコス

デマパルマ

デマキロン

アトストン

カラザテイマ

ウエツト

スタニコロスト

右ノ内何ニテモ見合可付熱大腫ハ膿ノ色白赤ニメ粘キ物ニ

○ヒリウハハ身色ニメ痛少自然ニ腫上ル也治方ハ温散

スベシ茶熱ニメ燥茶也熱ヲ以テ寒血ヲ温解シ燥ヲ以テ

身ヲ強クシテ湿ヲ除ク故ニ自ら散ル也

主方

ヲ、リヨガラアブ

ヲ、リヨシナアモシ

ヲ、リヨテレメンテイナ

ヲ、リヨシクテイマ

ヲ、リヨカモメイリ
右六味温メ塗付其上ニ
伸貼其上ヲ卷置也是モ一日ニ一度ツ、付替ル也若シ
不散メ可膿ハ下地ニエングエンドバジリコムヲ塗り付
其上ニエシフラストムスラキニブスラ貼也膿タル片ハ
早ク口ヲ開クベシ焼針平針口ツプトウリヨシ此三ノ内ヲ
見合ニ為ベシ冷ヨリ生スル腫物針ヲメ血ノ走ルベキト
思フ腫物ニハ何時モ焼針ヨシ又針モ焼針モ嫌フ腫物ハ
口ツプトウリヨシ付テ良シ此口ツプトウリヨシニテ痛ミ
出ルモノ也故ニ銀ノ焼反ヲ少加テ付ル也口開キ膿出タ
ラバメイチマヲ刺ベシ熱腫同前也腫ノ色ハ白クシテ粘
リナシ

○ヘンテ伝ハ風ヨリ癸ル腫物ヲ云是モ冷ノ血ヨリ出ル
其子細ハ冷テ血順ル能ハズ虚シタル処ニ風邪入テ痛
サナス此驗アリ腫物白ク透トフリ光有リ金物ニテ打テ
見ルニ風ノ吹音アリ押テ見ルニ脈へモ風ノ吹當ルマウ

ニ有リ病人モ身ニ覺ル也膿タルマウニテ不膿急ニ針
ヲ刺ベカラズ散ラシテ見ルベシ是非不散メ膿タラバ前
ニ云処ノ口ツプトウリヨシ付テ口ヲ開ベシ焼針モ不苦
此腫物初ニ痛アラバ痛ヲ止ル葉ヲ可付
ヲ、リヨロサアト
ヲ、リヨア子テイ子
ヲ、リヨカモメイリ

右四味合温メ塗り付痛止ラバ即強キ灰汁ニテ洗ヒテ葉
ヲ付ベシ
ヲ、リヨルウダ
ヲ、リヨシリヨウロン代サルフレ、アラ

右四味合温メ塗り付其上ニエシフラストゲリジウンヲ木
綿ニ伸付テ温散ス
ヲ、リヨシクテイマ

イルバアルボ 粉ニニ匙 湯ニ入一夜置翌朝白砂糖ヲ
三分入揮セ温メ用テ風氣下ルモノ也膿ノ色ハ雞子白
ノ様ナルモノ也

○へレマ広ハ湿痰ノ腫物ヲ云寒ト湿ト交合出ルモノ也
 印ハ和ニノ色白ク押テ見ルニ冷也強ク押テ見レハ凹ク
 成リ指跡ツキテ少時不復又此ニ熱ノ血交ル時ハ熱モ有
 ル也色モ少付腫上リ膿ム也湿痰ノ腫物散リモセズ膿モ
 セズメ堅ク成テ有ハ必シク掛ル也初発瘡治ハ水ト醋ト
 合シ海綿ニ浸シ蓋ヒ具上ラ木綿ニテ巻置也其後ハ灰汁
 カ燭硝ノ水カニ海綿ヲ浸シ付ル右何レモ湿痰ヲ燥ス茶
 也海綿十キ時ハ羅紗ノ切レテ潮ニ浸シ置テ海綿ノ代ニ用
 此腫物若シ大ニ成ル時ハ
 フハリヨロガアト
 ワアトロロウザ 各ホ分
 ソルフラ 少
 右合海綿ニ浸付ル腫物タハ上極タル時ハ
 フハリヨロアルドジイマ
 フハリヨロウリイニヨ
 ワアトロロウガアト
 右合付ル右ニ同シ又
 フハリヨロウザ
 ソウト 少

チハリヨロサアド 大
 アルウヘ 少
 フリハ又ム 少
 右合セ甘ル又
 ポウデポスタ
 右醋ヲ入煎シ白蜜ヲ加エ粘ノ如ク腫物片向可散ハ
 大豆粉 大
 ソルフラ 中
 右合不断草ノ汁ニテ和シ付ル腫物可膿ハ強ク膿ム茶ヲ
 可自又
 唐葵相
 右煎ジツメ豕肉油寒中ノ糞合セ付ル膿ム印ニハ少ク堅
 クナリテ痛出ホメキ出ル是ヲ以テ膿ムト知ル也膿タル
 時ハ焼針ヲ立其後治方曰前此腫物堅ク成テ何レモ療治
 不成時ハマレシユンマシイ口広腫物ノ療治ニメヨシ
 ○アツプステイニ広ハ瘡ノ一也腐タル血損シタル血ヨ
 花ノ酢 大
 カルシス
 牛肉油
 唐鳩屎 中
 白蜜 中
 葱白
 唐鳩屎 中
 葱白

リ莞ル初ハ粟米ホドニ生シ痒クシテ右痛出大ニ腫レ廣
 カル瘡治ハ廻リニテヘンシイブンスニアトストンニテモ付
 マワシ悪血ノ不寄マウニセキテ瘡上ニイソグエンドバ
 ジリコムヲ塗リ其上ニエソフラストムスラキニブスラ
 本綿ニ伸貼ス赤シ付タル所ニ千ホノト粟米ノ如ク吹出
 ル也吹出タラバ上ヲ平針ニテ十文字ニ断破リ血ヲ取テ
 バジリコムヲ莞糸ニ塗リ付其上ニ右ムスラギニブスラ
 貼スル也バジリコム計ニテ胸リ兼ルハイソグエントア
 ホストロウルクムトハシリコムト等分ニ合セ莞糸ニ塗付
 其上ハ右同前也瘡ニ膿多竹ノ根ノ走り廻タル如クアル
 ヲソロクト切テ取ル也諸悪肉出バアソウウストンヲ
 付ル崩テ行ハ焼金ヲ當ル但古ニ當ル也新ニハ不可當初
 メヨリ瘡ノ廻リニロウガノ油ヲ塗テヨシ瘡疽ノ初莞見
 誤テ押柔ヲ付レバ忽々人ヲ害スベシ一毫モ寒冷ノ菜ヲ
 不可付唯外上底ニ少モ不沉マウニスル也此ノ如ク
 療スル片ハ亦疽ナリト雖モ瘡ニナルベシ誤テ寒冷ノ菜
 ヲ付レハ瘡瘍タリト云ヒ疽ニナルベシ

○初カ
 ハ初カ
 ノ初カ

初カ
 初カ
 初カ

初カ
 初カ
 初カ

内ニ莞ス
 色黒キ
 ハ不治
 瘡也疽
 フ可用

○身ム
 悪ム
 トロウ
 付ル但

付ル但アルテリマト
 カラズ膿潰テ右治方何レモ同前
 ガンケレナハ身中何レノ処ニテモ痒レ軟テ覺ナキ

莞換シ惣
 シ惣身直
 ハ也黒色ハ
 ハアボス
 一ニブスラ
 忍ニ針スベ

下也此子細ハ心ノ臟ヨリ血ヲ惣身ニ配ル此血筋冷テ癸
スル也譬ハ雪ノ踏ミ冷堅ル欲腫物ニ強ク押テ付
ル欲結過ス欲如此ノ類ニテカシケレナニ或ル又心血ハ
順リ行ケル其処大瘳スル故ニ痺ルモ有リ或大毒葉ヲ付
ル欲或金瘡打身何レニテモ痺レ不覺一有リ瘳ノガニケ
レナハ紫色ニメ痛モ覺エズ是久ク積バ不引メ黒ク成也
エズケヨメトテ其所腫リ死ル也寒ノガニケレナハ不覺
白シテ指テモ不覺其処シタルク計覺ル也療治ハ温ル葉
ヲ付ル

主方

ヲ、リヨロン。プレイカウロン。 ヲ、リヨムスアダ。
ヲ、リヨロウリイニヨ。 ヲ、リヨムスアダ。
右合セ温メ付テ其上ニ。 エンフラストメリロウドラ付ル
或ケリシウンラシココシヨムモ宜シ瘳ノカンケレナノ治
方ハ先針ニテ断破リ覺アル処迄切取り血ヲ出シテ水塩
醋ニ味ヲ合セ温メ洗テインクエンドアホストロウルムヲ
ホツシニ塗リ付其上ニ。 エンフラストデベンスイブシヤ

付ル也ガニケレナノ色直テ痛有バデベンスイブシヤ計ヲ
付ル右ノ痺レ早く療治シテモ葉ニテ不治ハ胸行処ヲ切
取り跡ヲ金瘡療治スベシ不然ハ何迄モ腫リ行也

○ハナリシヨ云腫物ハ瘰癧ノ一也指先凡ト肉トノ旬ヨ
リ生ス其終捨置バ筋骨迄腫入モノ也少ニテモ膿ム心有
ハ早ク針ニテ断破リテ宜シ初癸ニハシムル性ノ葉ヲ付
テ惡血ノ不奇ヤウニスベシ強キ醋ヲ沸シ指ヲ小半時程
浸シ置宜シ又ヤ、リヨロサアト雞子黃車前水合セ木綿
ニ浸シ付テモ良シ其ニテモ痛不止片ハバジリコムヲ下
地ニ塗リ其上ニムスラギニブスラ付ル膿タル片ハ燒針
ヨシ口伺テ后ハ何ノ療治ト云ル同前也若シ筋骨迄ニ腫
入テ有ハ燒酒ヲ瘳メ。 エンダエケビシマコムヲ
少シ入挿セ能洗ヒ。 アボストロウルムバジリコム等分
ニ合ホツシニ浸シ付其上ニムスラギニブスラ付ル也惡
肉大抵流レタラバ。 デイケステボンヲホツシニ塗テ付ル
若シ骨ノ上ニ。 肉掛リ兼レバ燒酒白蜜。 雞子黃共ニ三味

合セ熱沸メ洗ヒ清メシメリヲ拭ヒ取テ付菜ニ鹿角白燒
雞子黃白共ニ合ホツシニ浸シ付ル其上ニハカラサテイ
マヲ付ル也冬ハ二日程置夏ハ朝晩付替ル也又胸有ル時
ハ膏ナド碎テ出ル也蜜燒酒ニテ洗ヒ見ルニ膏ニ肉不掛
ハ又膏ヲコソギ能々洗テ雞ヲ殺シ肉ヲ細ニ塗付其上ニ
雞ノ皮ヲ蓋テ卷也冬ハ二三日モ置夏ハ一日一夜置テ肉
不掛ト云フナシ肉掛リテ後ハ右ノ洗ヒ汁ニエケビシマ
コムヲ少入擇セ洗テ付菜ニハアボストロウルムヲ少シ
テイケステイホンニ加味シ付風引ヌマウニ卷テ置也此
時ノ大夏ハ一切愈ル菜ヲ不付唯惡汁ヲ抜キ肉ヲ上ル治
方宜シ愈サント思フ牛ハデマホンポリコヌヲ付何ノ胸
膏ニ付タリ也如此ニ療スル也ハナリシヨハ痛強キモノ
也甚痛ムキハ大黃等ノ下劑ヲ用テ良シ

○ア子ウリヅマハ心經腫ノ一也心ノ臟ヨリ血ヲ惣身
ニ配ル其血筋ニ生スル腫物ヲ云此筋ヲアルテリマハ是
ニモ内癸外癸有リ外癸ト云ハ切ル欽突ク欽打カシタル

上ハ治スレモ其筋不治ニ因テ血其所ニ積滯メ出ルヲ云
内癸ト云ハ力ヲ強ク出シ血筋痛ム一有テ其筋ニ血滯リ
ア子ウリヅマト成ル一有リ是ヲ内癸ト云何レモ心經成
故ニ膿ガハ前ニ針ナド立レバ血不止メ死スル也此腫物
痛ナク膿モセズ血漸々ニ溜リ積ニ上皮薄ク成テ漿破レ
血出ル片ハ難治膿ナレバ易治見方進キモノ也相見ルニ
膿ムマウニ和ニメ色モ不變少シ踊ルヤウ成ル心モ有リ
此ハ内ヨリ出スルヲ云右ノ腫物不破前ニ付ル菜ハ強キ
押菜宜シ性ハ寒燥ニメ強クシムル菜也

主方

側栢葉實^{トニ}

血竭

柘榴皮

雞子白

右四味合セ付ル也又

車前水

蓮葉水

柘榴皮

側栢葉實^{トニ}

右四味合付ル如何ニモ冷テシムル菜ナレバ宜シ其子細
雪ヲ童子テ置替^{トニ}シテ愈タト云一有リ若シ破テ血出

出ル時ハ心ノ臟ノ血筋ノ水上ニヲ糸ニ蟻ヲ引針ニサシ
血筋ノ下ヲ通シ上ニハ木綿ヲ疊ニ置テ結シメテ血筋ノ
彼心経腫ノ所ヲ新破リ出シ其跡ニホツシニ
アセベン大乳香中丹卷少
右三味粉ニメ合セホツシニ付新破タル所一杯ニ押シ込
其上ニハ雞子白同壳倒栢ノ實共ニ粉ニメ合セ付其上ヲ
木綿ニ醋ヲ浸シ付取ヨリ膿ノ出ル迄其終ニメ置其後膿
少シ宛腸ヨリ出ル時右ノ糸ハ其終置腸ヨリ拭ヒ取り雞
子ト醋ニ浸タル木綿ハ日々ニ付替下ニ付タル糸ハ自ラ
落ル迄置自ラ落ル時ハ愈肉上リ惡物少モ不残也其時愈
茶ヲ付テ愈ス其後件ノシメテ置タル糸ヲ取ル也切疵ノ
血ヲ如何ニ止メテモ不止時モ心経ヲ見定テ如此止ルモ
是不切ニハ成マシ

○コレラ云腫物ハ血ノ上澄ヨリ生ス皮膚ノ上ニ浮テ出
ル草小瘡ノ類也アマリ腫上ラズ燥熱ノ血ヨリ発ル也併
濕ト交出ルモ甚多シ湿ヲ扱ム時ハ火ニテ焙リ見ルニ甚
痒シ又風邪ヲ兼ル片ハ痛ムリ針ヲサスガ如シ寒ニメ少
温少吸少散ス性ノ茶ヨシ故ニイニングエンドアルボンカ
ンフラアドイニングエンドヲリウン此ニ味合セ付テ
良シ若シ膿氣深キハアボストロウレンヲ少完加工付ル
不愈ト云一ナシ

○アカフゾ云腫物ハ水腫物ノ一也ボウルス云筋ヨリ汗
出ル穴有リ是ヨリ水少宛出皮ノ間ニ溜リ積テ腫物ニ或
冷タル処ニ積ル印ハ和ニメ色不變押テ見ルニ應ヘズ押
スニ逃ルマウニ有テ痛ナシ打テ見ルニ水ヲ入タル物ヲ
打ツマウニ有リ夜燈ヲ病人ノ側ニ置テスカシテ見レバ
スキ通リ見ユル也是ハ大抵老人ニ多ク有リ冷テ痰ノ多
故ニ出素ルモノ也惣身節々或陰囊ニモ出ル風或水交出
何ニテモ勝ル方ヲ其各ニ定ム風腫物ヨリ水腫物ハ一多
膿上ル治方大小便ヨリ下シテ良シ付茶ハ熱ニメ燥ス茶
良シ是ニテ散ル也コトイニヨラ煎シ海綿ニ浸シ付ル又

イノンドノ油ニテコミイニヨラ煎シ付ル也

膏茶

イラ草ノ實ニ匙

辛子ニ匙

ソルフラニ匙

カル石ニ匙

薰陸ニ匙

セイラ少

アセトウナ少

少

右イングエンドニメ付ル又

夕ブノ實粉ニ匙

胡椒ニ匙

夕ブノ實油

セイラ

右イングエンドニメ付ル内菜ニ土茯苓ヲ煎シ用テ吉

一小児ニ右ノ如キ腫物出来ル一有リ是ハ生ル、時扱ヒ

様強クシテ筋切レ又ハ血滯リテ薄血ナル故ニ水腫物

ノ揉ニ出来ル也殊ニ血水也若クハ又胎内ニテ出来テ

生ルモ有リ印ハ和ニメ色不變不痛又高キヨリ墜打撲

ナドヨリ出来ル一有リ其時ハ色變リ痛モ有ハ血ニ付

テ也是深キ時ハ痛上ニ有浅キ時ハ和ニ不痛付茶ニハ

散美良シ右ノ美モ良シ又カモメイリノ油ヲ塗り其上

ソルフラヲ擦ル又蝸牛壳ニ搗碎キ乳香ヲ粉ニメ加

付ル又ラレイガン三十匙ソウト五匙白蜜入テイグ

エンドニメ付ル大抵ハ散ルモノ也若シ不散ハ針ニテ

破リ血ヲ出ス其後ハ一切腫物口倒タル時ノ治法也湿

ニノ寒ナル血ヨリ出ル故ニ換ニメ燥ナル茶良シ

○アルニマハテ陰囊ニ出来ル有リ此類種々有ト云凡大

抵ハ血ヨリ発ルモノ也ホメキ換スルニハ押茶宜シ譬ハ

花ノ醋寒性ノ草ノ汁何ニテモ合付ル又雞子白ニ車前中

ノ汁合付ル其レヨリ散シ茶付ル也如何ニモ不脹マウニ

シテ散シタルガ宜シ若又可膿ハ膿ム茶ヲ可付膿タル時

ハ口ヲ拭ケ如帯治法ニメ宜シ大熱故ガングレナニ成シテ

療レ冷タル時ハ換ノガニケレナニメ療メ宜シ又風ヨリ

発ル腫物水ヨリ発ル腫物ノ治法ハ右ニ記ス可考水腫ヨ

リ発ル腫物ハ針ニテ刺シ水ヲ出シ雞子白ヲ付テ宜シ畢

ヲ持或力事ナドシテ小腹ノ薄皮陰囊ニ入腫物ニ成リ又

皮切テ腹腸囊ニ陥リ腫物ニ成ルモ有此腫物ハ押見ルニ
 逃ルヤウニメ和ラカニ成ウツフキニ寢テ押入レバ引込ム
 又起テ勤キ勞スレバ本ノ如ク出ルモノ也ウモルヨリ出
 ル物ハ押テモ不去此治法ハ腹腸ヲ引入テ調テ其跡ニ腸
 ノ末又マウニ葷丸ニ膏茶ヲ付テ囊ヲメ入引上置ベシ馬
 ニ乗ル力事等ヲ禁ス

○マレンコンマヨリ出ル腫物ハ紫色也是血ノ泥ヨリ出
 湿痰ニ交リ出ルモアリ又別ノ腫物ナリ此強キ押シ菜
 ニテ押し堅ル故ニ堅ク成テ紫色ニナルモ有リ其堅ク成
 テ不痛マレンコンマヨリ出ルハ茄色ニメ堅シ又湿痰ニ
 交リ出ルハ身ノ色ニメ探リ見ルニ冷押テ見指テ見ルニ
 覚アル時ハ療治有リ覺ナキ時ハ療治ナシ右癩生ハ多ク
 寢ル下惡シ食物ハ熱温ノ物能血ノ生スルモノ宜シ惡キ
 物ハ煎物焼物相茶等惡シ付茶ハ和カナル散茶良シ

唐葵根煎雞ノ肉油ト合テ付テ吉

主方

又

メリロウト 十五匙 テヤキセン 十匙

牛肉油 十匙 雞肉油 十匙

アヒルノ肉ノ油 十匙 白蠟 十匙

右加減白蠟ニテ能イングエニドニメ付ル唐葵根ニルメ

イラノ仁煎加テモ付ル膿ム一ハ無レ凡若可膿ハ膿茶ヲ

可付 唐葵根 百草根 子バア

右三味煎シ漉テ小麦粉麻人豕油右合テ付ル膿々ラバ口

ヲ備如常治スベシ

○カンゴロウ腫物アリ是ハ血ノ泥ノ焦レタルヨリ出
 来ルモノ也腫テ堅ク圓クメ色薄黒キモノ也早ク廣ガリ
 ホメキ痛モノ也初出ル片ハ小ク大豆粒ホドニ出テ廻リ
 モ廣ク坐取り廻リニ蟹ノ足ノ如ク血溜タル筋出見ル又
 不見時モアリ大事ノモノ也治法ハ切破リ廻リニ焼金ヲ
 當テヨシ然凡アマリキツキ故ニ茶ヲ付テ癩生メ吉茶性

ハ少シ押テ散ル茶付テ良シ
ヲ、リヨロサアド 九五匙
粉錫 九匙

右合付ル又

車前草モ汁

右合付テ良シ是ハ下シテ用テ良シ

○カンダラスハ腫物アリ是モ疔ノ類也イヨク腐レタル
血ヨリ生ス其印如何ニモ焦テ赤ク堅ク腫痛アリ内外ホ
メキ外ハ痒クシテ出来ルモノ也初ハ大豆粒程ニ出テ早
大ニ成也廻リハ粟米ノ如ク出来ル也潰テ后痛ム也カン
フニエノ印モ如此大夏ノ疔ハ青筋アル也右ノ腫物出来
ルマ初ハ熱氣アリテ食不進吐逆シ内熱有テ患フモノ也
茶性ハ少押テ散ル茶ヲ可付

主方

耳柘榴 右皮實共ニ割り剉テ醋ニテ煎シ于ノ粉ニシ腫物ノ廻リ

ニ付テ腫物ノ上ニハ雞子黄ニ塩ヲ少シ交合木綿ニ伸テ
付ル痛止其後膿茶ヲ可付

膿シ茶方

唐葵根

右ニ味煎其汁ニ爵金小麦粉右合付テ廻リニ花ノ水ヲ木
綿ニ浸レ付ル也膿タル時口ヲ削テ如常療スル也膿タル
毒ヲ吸拔妙茶ニハ雞ニテモ鳩ニテモ殺シ身ノ湿ナル内
ニ切テ付レバ毒皆鳥ニ付ク也

小葵葉

○ゼイルメス伝ハ下疳瘡ノ一也洗茶ヲメ エングエンド
アルフシカンフアード付テ吉洗茶ハタルシイヲレイガ
ンアギリモウニマアルトミジイマタンテマアセンフロ
フメンテクキリシイマ右煎シ洗テ吉若シ膏茶付テモ治
シ兼バ ヲ、リヨイヘリコンニトウセス粉ニメ加エホツシ
ニ浸メ可付膿気多クシテ膿止リ兼ルハ花ノ水ニ丹若粉
少シ入水ノ色青ミザス様ニメアツウストンカンフラ
各少入様セ此ニテ洗ヘバ胸止リ膿モ止ル也其時愈茶可

付也

Handwritten Japanese text in vertical columns, including characters like 〇 and 〱.

