

阿蘭陀外科書

494.2
OT-3

No. 102



494.5
02-3



富士川文庫
3052



煉膏 全大温

一蠟十毫 一松脂七毫 一麻油二十毫 夏冬加減 右三味ヲ少煉後五

一品ヲ投

一雞油五毫 一牛油五毫 一ホルトカル五毫 一鹿油五毫

右五品ヲ入ヨク煉

一乳香五毫 一テレノシ十

右二品布ニテ漉テ前ノ膏中投煉サス

効止痛軟筋金瘡二六雞卵黃一々二膏半分入和調木

綿平メイ千ヤニツケ貼疵止痛生肌肉虚人瘰生肉也

痛強肉不流時綿メイ千ヤニツケ貼

癩明膏 平カラナテイ。

一蠟三錢 一丹三錢 一广油夏四寸 冬五寸餘 一椰子油十錢 一且磬五錢

一明磬細末 一托骨一錢 一ホルトカル少

右蠟丹油ヨク煉色変時五味ヲ入拌布漉ニシテ告

効一切濕毒腐爛膿血綿メイ千ヤ或ハホツメイ千ヤ木

綿ニツケテ貼去毒生肉

玉和膏 大温 ハシリコン 麒麟膏三寸ト云

一黄蠟五目 一十ヤン五目 一松脂五目 一鹿油五目 一雞油七目 ホルトカ

一广油夏六寸 冬七寸 右蠟千ヤン脂油ヲ投加減ヲウカ、イ

一麒麟血細末三錢五分 一象牙細末二錢五分 右二味為末拌漉布袋

効一切膿物ヤワテカニ膿ヲスウ能生肉綿或木綿ニツケ

貼膿表工浮則直傳亦可

金脂膏 大温 コルタアト

一黄蠟五錢 一松脂五錢 一椰子油十錢 一牛油十錢 一鹿油十錢

一ホルトカル五錢 一雞油十錢 一广油夏五寸 冬六寸

右蠟脂广油同入能煉後五品入以布漉乳香十錢 没十錢

効癩疔諸腫物止痛或散若不散則ヒキアケテ膿トス

打撲木綿ニツケ散瘀血止痛金瘡止痛生肌石木綿

一ツケテ貼疵口ニハ平メイ千ヤニツケ傳之

一肉切膏 一温 アホス...

一黃蠟四寸多 一松脂寸多 一牛油寸多 一雞油寸多 一鹿油寸多

一ホルトカル殘寸多 一椰子油寸多 一广油夏寸多 冬六寸多

右蠟脂广油煉以布漉

一綠青細末 寸多 一乳香細末 寸多 一且馨細末 寸多 一明馨細末 寸多 一酢少

一ヒイト口細末

右為末同入煉冷任使

効一切腫物去腐肉生肉膿口不破時木綿ニツケ傳

白明膏 冷 フラン

一白蠟寸多 一椰子油寸多 一猪油寸多 一唐油寸多

一竜腦一寸多 一广香寸多 一广油夏寸多 冬寸多

右蠟油一ツ投煉合以布漉入餘品拌冷

効火燒瘡下疳濕腫爛膿汁多出用フ諸腫物生肉シ

生シ去血熱

辰砂膏 冷 テミヤニン

一蠟四寸 一丹四寸 一椰子油寸多 一猪油寸多 一辰砂寸多

一麒麟血細末 七寸 一广油夏四寸 冬五寸 一鹿油寸多

右蠟油以布漉丹辰砂麒麟血為極末投煉

効腫物去熱乾水汁多出

石膏膏 大寒

一蠟寸多 右以布漉 一石膏細末 寸多 一广油夏寸多 冬四寸多

一黃蘗細末 一麒麟血細末 一爵金細末 一竜胆細末

一唐土細末 一朱砂少

右同投煉冷

効傳火灼瘡止痛癰回腫甚熱痛スルヲ散凡諸瘡開膏ニ用

痛散膏 平

一蠟四日 一椰子油十七日 一猪油十七日 一大風子十七日 一雞油十日

一朱砂四日 一胡广油夏三十日 冬四十日 一馬油十日

右蠟广油猪油同煉後投三品以布渡入朱冷効諸瘡止痛散腫傳打撲去痛或傳脫肛痛腫或小

瘡類 和膏

右水五合煎取二合去滓

一不イシトノ汁大茶碗十五 一小茴香汁茶碗三

一ハ夕カ麥十日 一カシマ麥十日

右水五合煎取二合去滓

右入鍋煎減半後入广油五合再煎段減時

一椰子油茶碗三杯入煎段減時 一蠟三三入以布 一乳香十日

効塗風毒風濕痛止身中痛入和散筋縮身強ニスリツケニ和散無名腫貼テ止痛散腫

平和膏 平

一黃膏藥 一白膏藥

各十分文合仕使

効諸腫物散腫痛生肉愈腫口開後綿ツケ於其上紙
或木綿又リ傳之疔瘡吸膿愈

黃胃膏 平

一白明膏 一黃胃散

諸濕瘡或痛癢汁浸出者傳之

黃胃散

一黃藥 一猪胆

右製法黃栢猪膽三四回又リ乾火以變黑色為度

為末仕使

効煎證以散和广油傳之

一仙人膏 一温

一蠟三目 一松脂三目 一椰子油三目 一广油三十日夏冬加減アリ

一煙艸汁五合 一仙人草汁五合

右入鍋中煎置以布漉明礬粉五合煉日後以

効治諸腫物久不愈膿汁出

鈔膏 寒

一蠟四目 一唐土四目 一鈔燒返五 一广油夏四目冬五目

効去血熱止痛傳下疔瘡
附鉛燒及法入土釜燒解硫黃粉少入
拌黒クナルニテヤクナリ

一白膏藥 一濕和膏

一白蠟五 一硫黃五 一唐土五 一椰子油三 一尸油見合

右蠟及油煉漉冷入二品

効去濕氣生肉

萬應膏

一芍藥五 一大黃五 一白芷五 一尸油夏四十日 冬二十日

右三味一七日油浸以武火煎去滓丹百目

効愈諸腫物治灸毒諸腫物綠膏藥用之

藥種萬應膏 温

一當歸四 一白芷同 一白及同 一烏藥同 一桂同

一白斂同 一連翹同 一赤芍藥同 一木鼈子同

一皂角同 一黃芩同 一苦辛同 一大黃同 一川烏同

一中烏同 一杏仁同 一槐木同 一桃木同 一桑木同

一丸葉柳同 一沒藥末音 一乳香末五多二味後

一束木同 一小兒髮一多五分

右尸油三百目右之藥中刻之七一七日浸後以微

火煎去滓丹百五十目入煉夏百九十目入煉法口授

筋延之油

一椰子油三 一尸油三 一イノントノ葉三 一コエントノ葉三

一青木葉三 一小葵根三

右煎以布漉再投鍋中

一椰子油三十分

一テレンメ二十

一黄璫三十分

一石三品同入煉

一効筋縮不伸治

膏藥カフ洗藥

一椶皮五分

水三合煎二合去滓

一肉流目

一胡礬

即燒明ハシ

諸瘡愈後生肉突起者同萬應膏或白明膏和傳

一疝洗藥

一奈銀粉考

一麒麟血三分

一黄栢中

一大荆芥中

一甘草少

一散藥

一天花粉考

一麒麟血三分

一何仙藥一分

一竹虫糞五分

一石膏二分

一蛇骨考

一黄栢三分

一朱砂一分

一竜腦二分

一甘草二分

石為末和油傳之

引藥之方

一ノシトノ葉

一ヒニシノ葉

一三七草葉

一青木葉

一大山椒ノ葉

一コヒキノ葉

一瘰癧疔疽瘡癬

一瘰癧也属六府主表浮高起易膿易潰易斂其皮薄

淺之太夕不傷筋骨易治症十リ

一疽八沮十リ屬五藏主裏毒肉攻陰血重濁力夕十多

ハ沉十リ故傷筋骨蝕皮堅平ニ根深難治症也

一瘡ハ腫物ノ縫名十リ痛ハ皮膚ノ間発熱夕浮ニ

根小也大十ル七二三寸ニ不過也

一凡壯年氣血勝毒煩十リ年衰毒勝氣血險也食積

熱夕リ生或風寒暑濕ノキニヤフレ或ハ房勞或氣

鬱勞倦夕リ生脈浮數、癰十リ沉數ハ疽十リ諸瘡

中夕、背疽疔瘡ノ最為急證ソノ初発スルトキ先熱

夕後惡寒或始痒夕痛夕不痛夕惡候トス背疽初生

形如黍粟大終ニ覺ル時用艾灼之則隨火毒不散惡

毒膿上ク口破ル夕速十リ

一純陽ノ初起心炊腫身熱夕兼有微寒瘡頂高突起

腫似鸞弓七日間多炊腫痛凡二七日イ夕リ腫成潰

テ腫消飲食知味二便調不口渴精神爽了痛從腫

出減腐肉漸退新肉自生テ肌自斂也純陰初起瘡

不紅不腫不知痛熱微ニ七日後自體倦劣瘡根平

大ニシテ項不高根無活色無光腐テ陷軟而不成

膿血流出臭穢身体不使口粘語瘡變紫黑面色青

黃精神昏憤口渴舌強痰喘壅塞スルモノハ寢テ

惡症トス

一灸法凡瘡初起疔ヲ除ク外ミ十用艾テ灸大小ニ
夕カワテ灸蒜薄片瘡上ニシテ灸ス一柱コトニ換フ或蒜
搗泥瘡上ニシキテ灸ス

一惡症身熱甚大渴下利小便赤膿血色薄腫痛甚吊
睛顔色青或赤呼吸短一身無力食不進服藥即吐詬
声カレ手足冷者

一諸腫物指ニテ按スニ陷テ不後起モノハ膿ナシニ按テ
即起ルモノハ膿アリ針ヲ以テ可破タシ氣腫ハ有
血ミ多リニ不可針可慎也腫物タシクハレ上リ疼ツ

リシヌリツケ膿シスイ生肉ヲアタ

一瘡八九分肉アカリ木綿コルタアトハヤメ紙フ十萬能膏

中平生平ナル時平和膏ハカリ附イヤス

一肉拳スキ肉流付或ハ痒出白明膏ツケ痒止血熱サ

ル肌皮ヲ堅スルニ萬能膏ツケ愈ス

一初瘡乾熱アルニコトニヨリ茨花油野菊油又リ付ルフ

アリ疽治法口授

一疔治法其證甚速朝癸夕死隨癸隨死三五日或一月

或半月ニシテ死スルアリ

一火焰疔其證形唇口手掌指節間紅黃小泡生痛痒

異常寒熱交發頭暈眼花心中煩燥言語昏憤
一紫^三灸^三疔無紫泡次日破血流出三日後筋串骨爛疼
痛苦楚甚時眼紅目味指甲純青舌強神昏黃鼓疔
黃泡光亮相潤四邊紅色味干口角腮頰眼胞上下
大陽正面處甚時惡心嘔吐肢體疼痛寒熱煩渴而
噦
一白丹疔白泡生項硬根突破脂水流痛痒驟發安腐
安陷甚時腮損咽焦肌熱咳膿痰吐鼻掀氣急
一黑靨疔耳竅自腹腰腎軟肉間生黑斑紫泡毒串疔
主手掌節間形似小線無寒熱紅絲從手疔上攻甚

時紅絲至心而疔名雖有數多究竟濫名而已

一治法瘡頭木綿^{アホス}_{ハシリ}合瘡頭裡^ニ貼瘡堅^ニ木綿黃
膏又^リ二重^ニツケ^メク^リ血熱腫アルニ石膏々々
ケテ至六七日膿血多吸出痛止血熱去腫減六石
膏々不貼腫物口木綿玉和膏厚クツケ其上又木綿
平和膏ツケ毒氣吸出痛止腫減肉舉^ニ平^ニナルトモ萬
能膏ツケ中白明膏^少ツケ皮ヨクイユ
一風毒何レモ肌肉ノ間風邪滯テ生寒熱甚
一風腫熱アリテイタミテ
一風濕肉ノ内^ニ硬リ身ノ色ト同クシテアリ

一風毒腫身ノ色ト同ク、腫肉ノ内、甚痛散セザルハ
遂ニ膿トナル

一附、風骨祖肉厚キ處生入骨付テ膿クサル處、虚諸十

一霍勝風氣血ノ虚ニシテ膝ハカリ大ニ腫ル症ナリ

一痛風四時ノ氣侵サレ発遍身骨節走注ス

一治法初発熱痛イシト油一日三四度ソロク塗付テ千

ラス、或痛散膏塗ワケ和ケテ千ラスヘシコレニテ不

散則ハ平和膏千ラス痛甚強ニハ黄膏藥貼以指頭

按痛処ソノ上黄膏藥付膿ヲナストキハ鍼ヲサシ

木綿メキヤニ玉和膏又リ上膏ニ右黄膏ツケ日

日膿ツクレハメイキヤヲ止木綿玉和又リ此貼上膏ハ

平和膏ツケ愈ス膚肉斂テ萬能膏ツケ跡ノカタニ

リ散ナリ

一痰腫痰頸項間或臂或遍身核生以指按之ヨク上下

色紅トラスイメマス不膿痰聚テ不散モ一々不腫シテ

痰痛身色

一治方初痛散膏スリ付散不散メイキヤハイノシト油

又リテ痛ヤム是ニテ不散トキハ平和膏攤付日久不

散腫木綿コルタアトシ攤ツケ是ニテ温散スル事アリ

痛強膿ナル寸ハ口開様アホス木綿又リ腫項和ナル處

エツケ益膏藥黃膏又リツケ膿水段々出痛止口玉
和膏綿軟木綿攤付上ニ平和ニ重ニツケ膿尽萬應膏
ハカリ付痒アレハ白明膏右ノ上ニ少引付ケ平愈ス
一氣腫、頸項或ハ缺盆ノ邊肉薄処ニ生頸無腫色不變痛
日久則ハ膿アリ

一治方初微痛漸盛平和膏又リツケ散亦藥種萬能膏
付散力タノ如ニシテ不散腫痛スルニ黃膏金脂膏付温
散スルヲアリ不散シテ膿ナル時木綿ヲホスハシリユン
等分合付フ夕膏藥ハシリニ計メイキヤニ又リ付上膏
藥平和膏又リ付肉平ニ成テ方能膏白明膏少ヒキ

ツケ愈ス

一癭瘤治法筋血肉氣骨五瘤不可破痛アルトキ痛和
散膏付テ治亦止

一膿瘤痰瘤肉堅シテ以指按之轉展シテ肉ヲハナレタル
如シ先頂ニ灸シテ口開ヤウニナル寸平針立ル丁アル針口
木綿亦アホス攤付上膏藥フノ力應膏中黃膏攤付
段々膿血出膿血無時口膏藥玉和膏木綿攤附蓋
膏萬應膏計攤附愈ス

一乳病乳腫乳結核吹乳癰乳房忽壅テ腫痛色赤焮
痛腫潰稠膿湧出シテ愈乳頭乳巖房肉初色如常小

核結レテ不痛歳月積漸大堅破壊シテ如柘榴血水
滴瀝不治症也

一治法初痛イノント油力痛散膏一日三四度ツ、塗ツケ是
ニシノ不散ハ平和膏紙ニツケテ三五日内可散不散日
腫痛膿シナサント入其時木綿塊程黃膏ツケ温サ
ニスルアリ若不温散漸々大クナリテ膿ツナスナリ木綿
黃膏スリツケ其上又紙縁萬應膏付中黃膏付膿十
リテ口難破開ハ指ニテ按テ中ノ和ナル處工木綿ア
ホス攤付テ口破膿日、出ルナリ膿減テ口藥玉和膏
シ木綿攤付テ肉舉リ蓋膏ニ平和膏縁萬應膏紙

ツケテ治皮愈カスルニ蓋膏ノ中工白明膏少引テ
イヤス木綿攤付テ

一乳房不痛ノ堅リアルニ藥種萬應膏木綿ニナリ付テ
聚散シ痛止痛若ニ痛散膏塗上石膏藥附テ愈

一疔初起腫痛白痢膏可貼皮爛汁多出白明膏付
テ腫減濕毒去テ治入毒氣深腐ヒ口カルニ辰砂膏
木綿ツケテ貼腐止毒去テ愈腐裏入ルニ平和膏
綿ツケテ腫痛スルニ痛散膏紙ニナリ卷付痛散シ

腫減シ腐止テ白明膏ニテ愈

一袋下疔瘡膿多出洗藥一日二三度洗内散藥胡麻油テ

加減ヨク合一日三度ツ鳥羽ニテ内工入テ愈を内藥服用
輕貼藥ハカリニテ治皮膚ノ爛汁出ニ白明膏ニテ藥方
黃胃散黃蘗粉等分合附イニカヌルニ輕粉少シ加
一楊梅瘡初痛汁多出ニ白明膏カ辰砂膏推ツケテ痛
サル毒氣去テ愈三味萬應膏推中辰砂膏引付治
一便毒初起痛散膏ニテ痛止テ散若不痛散ハ木綿黃膏
攤付膿成ニキ針立膿出針口木綿ホツシメイキヤニ玉
和膏塗附口ニサシ入膿シ拔上膏藥ハ如右膿盡テメ
キヤ止木綿ニ玉和膏計口貼上平和膏綠萬應膏附
膿尽痛止腫減萬應膏ハカリ附愈アトノシコリヌルニハ

萬應痛散膏攤附疔ニハ白明膏萬應膏ノ中ニヌリノテ
愈ヌ

一懸癧初起紅赤ノモハ輕紫色坚硬而痛牽臂腰者重

一治法初起平和膏攤付中痛散膏スリキニ痛強ニハ

木綿黃膏ヌリテ温散ス若不散而膿成ハ口藥アホス

木綿付上復木綿黃膏ツケ口開則木綿玉和膏ツケ

上平和膏附膿水日ニ出ルニテ如右膿アレハシリコン

ニハ愈腫痛散ハ萬應膏付

一瘡癧囊癧治法同前

一痔初起痒汁多出ニハ白明膏カ黃胃膏ニテ治瘰癧痛ニハ

痛散膏ツケテ散又イノシト油痛止膏ニテ痛ヤムカ久夕

一十リ痛ニハ平和膏攤附散膿十ルニハ黃膏藥木綿スリ

又木綿癰明膏ツケ下へ貼口開膿出痛止時平和膏

白ツケ治アトカタキニハ萬應膏ニテ散ス

一脱肛初起腫痛綿平和膏散等分合攤付又イノシト油合ニ

ニス若痛不止ハ苗ハ膏綿付治

一洗藥蓮葉水煎シテ一日ニ三度洗

一又方唐柿葉白草三ツニツ分加

合右脱肛内イリ痛止妙ナリ

一療瘡治方初癩痒痛ニハ痛散膏附痛甚ハ平和膏攤

テ不散則黃膏木綿ヌリ附膿十リ口開久シ口膏

藥癰明等分合木綿カ綿ツケテ毒吸上膏藥ニハ平和

膏ツケテ膿尽トキ平和膏ハカリ木綿攤付愈ス萬應

膏白明膏ヲ攤紙ツケテ散ス

一脱疽初起形如粟米後其皮膚熱如紅枣爛腐ヤ治

同前

Vertical columns of handwritten Japanese text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The characters are small and densely packed.

人
金
三
ノ
古
信
和
語