

阿蘭陀外科法

陰集

一

-37

F
才-26

494
Or - 16

No. 3246
12 037



富士川文庫

3064

病門目錄

癰疽初 癰疽生死之辨四 心疽井疽仲 肺癰 肺瘻六
腹癰七 囊癰 水疝八 懸癌九 腦疽十 鬚疽十一 疮疽
紅糸疔十二 脫疽十三 附骨疽十四 流注毒風毒風腫風濕十六
瘰癧 瘰核結核十七 罂粟瘤十八 乳病 乳岩十九 揚梅瘡二十 便毒
下疳瘡廿一 婦人瘡瘍廿二 石淋廿三 痿漏廿五 脱肛廿七 水腫
脹滿廿九 走馬牙疳三十 喉病三十一 小兒大人眼三十二 鼻病三十三 牙齒
舌病三十四 癪風三十五 鵝掌風三十六 痒瘡 穎癬三十七 痘毒三十八 痛風
蝦蟆瘡三十九 痞瘡四十 腫瘍四十一 耳痛四十二 冻瘡四十三
灸瘡四十四 湯火傷四十五 打撲四十六 諸虫獸咬傷四十七

已上

阿蘭陀新傳橘林先生外科法

集解

陰集弟一

得龍子岩、永運、房先生校正
榮休先生曰夫阿蘭陀外科之術往昔先輩雖傳授勒
行之似難得於其妙恐不定主意謂欲因弔今舉其為
綱領者一二以示門子夫依宜入室

癰疽

癰疽ノ治法古今諸流ノ説一ナシナリ然ニ其術心シ要
シテ功ヲ積ムハ真理シ極ムレ
癰ハ壅ナリ六腑ニ屬シ陽症ナリ其病暴ニメ患アル脈浮

テ浅シ蓋シ陽氣ハ輕ノ清ム浮テ高ク起ル故ニ腫レ易ク
膿ミ易シ腐リ易シ收リ易シ

疽ハ坦ナリ立臍ニ属メ陰症ナリ其病緩ニメ患アル所沉
テ深シ蓋シ陰血ハ重ク濁ル故ニ筋ラ傷リ骨ラ蝕シ其後
外ニアラハル

夫レ癰瘍癰ノ病ハ都テ外科ノ主ル所其旨趣ラサクラ
ス其是非ラ知テスメ其理ラ明メ得ルトアル（カラス凡人
身陰陽五藏六腑百骸營血衛氣日々周リ流レテ輒
向既十キ時ハ無事ナリ是ニ及スル時ハ百病生ス又表ニ發
スレハ諸腫瘍ト為ル

癰疽癰背ノ生スル一朝一夕之故ニアラ又或ハ水火ノ升降

正シカラス七情ノ氣鬱滯シ六淫相テカヌニ因リ或ハ膏梁厚
味ノ飲食ラ過シ臍熱シ起シ臍府ラ熏蒸スル故ナリ其候或
半年或一年天氣ノ陰晦ニアヘハ身清晴ナラス或ハ頭痛
眩暈シテ飲食味ハニナク或ハ眠ルトナラス脊中コリ又ハシニ
レ或ハ發熱惡寒シテ氣鬱ツトウシノ淨カラス或ハ神
勞倦シ飲食少ク又ハ讐言ラ癰スル疣タハ脊骨ノ通りた
右太陽膀胱經風門肺俞膏肓肝膽ノ腎俞等ナリ
凡癰疽癰背等ノ大瘡ラ見ニハ先ツ心ラ定ナテ瘡ノ
ノ形ラ見入病ミ始メヨクノ日數ラ向ニ又病人ノ虛實
老壯ラ考エ見ルニシツノモノ相處スル片ハ善ニ忘セ
サル時ハ惡症ナリ次ニ病ノ根元何レノ臍腑ニ癰リ其

生スル所何レノ部位ニ掛ルトニムア事ラ考エ又氣候ノ順逆精神ノ有無其人ノ氣血盛衰其ノ瘡虛實ラヰトメ是ラ治スル時ハ多ハ鋸リナカル可レモ脾腎ラ傷損可

故モナノメ寒涼ノ奇ラ用ニ脾胃
ヲ損スルト類ニ專和解ノ刺宣ニ

阿蘭陀人ノ曰瘡疽巨フハ陰陽ノ別ナリ又人身周流ノ氣血清濁ノ凝滯メ諸瘍生ス治モ亦是ニ從テ論スル所、氣血ノミナリ蓋シ阿蘭人陰陽ノ說ハ異ナリ五行モ金ラ除テ四行トス其說ニ曰金ハ声音ラ主トルト雖外ノ五行ラカラサレハ音ナシ故ニ水火木土ノ四行ニコモルト也四行ノ竊詣又血ラ四
得靈謂血ラ四ツニ分ル論本書ニ缺ク又純陽純
ツニ別テ治方カラ為ス予家傳テ以テ神之別傳トス又純陽純
陰ニ二症アリ陰陽相半スルノ症アリ是又詳セヨ凡初癰

ノ形チ粟粒ノ如レ漸ノ大ニメ大豆粒ノ如レ時ニハ痒、夏時ニハ痛、
其色赤シ又大ニ成テ伏盆ノ如クニニ心先ツカツアラスマラ用

ユニレ但シロ明迄用エ

古記仕樹書此疣カツラスニ古有リ共ニ其後卫ニラ
土集余ニ集ム癰表蒸温和蒸也

ニ其後卫ニラ

ラストテヤキロンコムコムスラ貼ス如是スルトキハ腫レ高ノ起ル指
以テ腫上ラ押スニクオミ其伏カヘルトキハ内ニ膿アリト知ルニ真
伸ヘ貼シ上ニハテヤキロンコムコムスラ毛綿ニ厚ク伸ヘ貼ス但ニ氣
ブスラ加工交合ス又田舡ミニ毛綿ラ以テ卷キ置ノヘシモ此タミ毛綿
キヲ貯スル時ヨリ用ニテ別メ宜ニキナリ是後膿ニ有ル一ラ知ハ針ニツケ但ニ針口ナイサリハムスラ

キニラスラ蓋フ此ムスラキハ疽又羊陽ノ症ニ用エシ金ハラムステレモ良シ如是ニメ毎日膿ラ

排スヘレ若シ腐内努肉アラハシリコニベレシ。メアルラ交
セ合セ貼ヌス腐肉努肉樹リテ毒氣深ノ用ルニ依リテ臭
氣アラハ右ノ内エイケニシヤコンラ火シ加ヘナイチヤニヌリ貼
ス右ノ如クシテ漸クニ腐肉努肉モ去リ膿木モ減セハテウナ
トドラヒテ歎メ愈スレラウノントニイケニシヤコンラカエテ
志宜シ但シ終リヒテ平メイナノ方ヨシ大極会元正月元ギトキハ
ジリラシラガラウナシトニイケニシヤラ合メイチヤヌリテヨシ棠休先生日
初メ先ツ火蒜ヲ隔テ、瘡頭ニ灸スレ病人アツキヲラ覺
エハカツブラスバモニラ用エレスアツガラスニハ直ニ灸
ラス其後ムスラキニアスニ紅花小茴香ノ末ラヒセ合セ厚
タ毛綿ニ伸ヘ瘡止ニ貼ス又頻リニカツブラスバ用エルトキ
ハ温散スヘレ两三日モ如是シテ瘡勢アラ退カスハ治法前
ノ如クスヘ

疽ノ治法モ大抵ハ癰ニ同フシテ少シ異ナリ。疽ノ症ナル氣
齋メ飲食進ニス脊強リ皮膚燥キテ炭紙ノ如クノ腫レ平脂ニ
メ紫黒ヲ帶ニ押テ痛ニ斯痒カラス時ニ痛時ニ痒キモア
リ但ニ先ツカツブラスニラ用エ又直ニ灸モ良但シ熱キラ覓立ニテ
如是スレ色モ変シ腫増サハ針ヲ刺スヘシ針ヲ刺スニ極陰ノ症
ハ腫物表エアラハアラハテ两三日内見合シニカト膿ニナラストモ
刺スヘシ膏ハシリコンニヘレシヒタルラ加工針口ニ附ケ但シ膿内
ヒシヒタルラ交合セテツクヘシヒトリ燒金ヲアテ、平メイキヤハシリシニ上ニテヤキロシゴムスムスラキニ
フス等分ミ交合メ毛綿ニ伸ヘ益ア又日々カツブラスヘシ用ヒテ
腫物発氣ラ含クス但シ陰氣カツブラスヘシ温刺取テ漢テ後モイヨリ強烈膿ニ刺スヒテ如是スレト

惡臭甚レク腫色紫黒ラ帶ニ痏水流レ出ルモノハ極陰毒氣甚
トスハシリコシイケニシヤコシ交合メ瘡口ミ貼レスラウメントラ
ホツシニ浸レ貼シ龍謂北ノラウシト教方
テノ家カニモ有リ撰ニ用ニ上ミテヤキロコムスムスラ
ノギニブスニ色交合メ蓋フヘシ加此治ラ施ノ瘡形滋ラ生レ但其
テモカツアラスニトコム食進ミニ使其ニ通メ安卧ラ得平愈入其外
スハ止ムヘカラスナリ此治法多メ端ナリト雖元書ラ以テ尽シカクナレ尚口傳ラ受クレ
治法多メ端ナリト雖元書ラ以テ尽シカクナレ尚口傳ラ受クレ

癰疽生死之辨

瘡形嵩ノ起ル者ハ善症ナリ

瘡形平陷ナル者ハ惡症ナリ

潰テ後子氣分昂タタル者ハ治シ易シ

腫高ノ如燃熱スル者ハ膿リ湯ク正肉ニ生レ易シ

元氣善クシテ善症元多シト雖凡膿半惡臭ラナレ近ツギ
カタク飲食无進ニス大使渴レ小便澑レ小便澑レ者ハ死ス
瘡色赭肝ノ如ク紫色ニ膿汁カワク者ハ死ス
仰卧不ルト能ス痛ニ痒ラ知ラサル者ハ陰症ニメ治シ難シ形
容肉脱シ目ニ神ナクウツトリトル者ハ必ス死ス
陽病ニ陰色ラ見シ手足ノ血青色ニ陰病ニ陽色ラ見ハシ腮アキナ
顴ニ紅色アリ此ノニツノ者治シ難シ

瘡中腐肉尽キ生肉揚ルト雖毛此ノ生肉ハ内ニ水ヲ含ム形板片ノ如ク
ニシテ片板トハ板ノ片ケタル如シ真ノ正肉チニレ真ノ飲食進ニサル者ハ
善キ生肉ハイチツク或ハサノロノ如クニ見ルナリ

必ス痘症イツルモノナリ

身熱レ脉細身熱ノ脉ハ弦數ナルカ煩ナリ細ラ見スハ惡症

唇青ク反目珠直視スル者必死

衣ヲ摘テ床ヲ探リ遺尿禁セス撮宮スル者、死ス

汗出テ珠ノ如リ流レタル者、死

右ノ類ノ惡症十キ者ハ治スルナリ惡症少ク善症アル
者ハ治法養生ニテ生元死モアルシ

心疽 井疽

心疽、中庭膿中ノ部位井疽ハ鷓尾巨臘ノ部分ニ生ス考
別ニスル者ハ其ノ出所ヲ異ニスル故ノミ也其病因ハ心火忘
リニ転ア陰分ノ精液ノ汁虛レ損スル故ノミ也ニ生入生元
ノ初ソ嫩濡ニメ色赤ク腫レ高キハ治スヘシ又堅硬ニシテ
色紫黒ク腫高カラサル者ハ治セス又動氣強ク衣ニ
徹ス心者元余且暮ニアリヌタ腫ノ形辛大豆ノ如ク漸々大

哉ハ皮色常ノ如リ頻リニ痛テ嘗エ又按スニ癙疖ノ如
クニソ麻ニ徹已ス如是者ハ潰テ後ナ膿水流レ出テ止ス
メ死ス治ベカラズ

阿蘭陀人ノ曰此ノ症治法先ツタマラアトスコトリケリヨム
ラモ綿ニ伸ヘ腫上ニ貼シ板鉛ヲ板鉛ハナマリラ板ノ以テ蓋ニモ綿
ラ捲ギテ是ラ消散スルナリ若シ散ラスンハ溫散ノ刺宣タニアヌスガ散剤
シリコンラ塗リ針口刺シ膿ラ出スヘシ膿大半出テ後ハチ
リコンテキステナイニアホスナロウロシニ品各等分ニヤバ
ケメイチャニスリ瘡口刺し上ニテヤバルルテヤナシホリ

コスオホテントー類ヲ以テ見合セ蓋フ。毛宣ミ、毛綿ニテ卷
クヘシ腐肉アラハハシリフニヘレシタアルヲ。加工腐肉ヲ流
ス如是スレ元腐肉流レス紫黒色ニナラハ焼金ヲアツル其外
ノハ枯瘍疽ノ治法ニ同シ此症ノ甚シキ者ハ腐肉メ、レ流テ止
ム。斯疼痛至テ強ク大便溏泄ニ小便秘滯シ且ツ発スル疔
腑ニ近キ者共ニ治シ難シ慎ムテ輕易ニスヘカラス。此治法ハ症ニヨリ
見合セアルヘシ散
レハヨケレヒモロラ同
キテハ多ハ治セサルニ

肺癰 肺痿

肺癰ハ金ニ火刑ヲ受ルノ症ナリ夫レ人身ニ風寒、ラ感シ未
メ発散スルヲラ經ス其邪肺中ニ留リ停リテ此ノ患ラ
為ス。其候毛聳ヘテ風ラ惡ミ咳中々膿血痰交リ吐キ

其氣甚臭穢声重ク胸膈陰痛シ頸コハリテ轉側シカク
鼻清涕ラ流シ甚シキハ胸脹脹滿シテ呼吸利セス飲食
減少シ寒熱往來承密ヤセラトロワ音声弱咽中腫シ痛ム
又肺癰ノ症元大抵是ニ似タリ治法專ラ肺金ヲ清フスヘシ
此病百死ニメ一生ノ症ナリ宜ク詳ニ治ラ施スヘシ阿蘭陀火
ノ内治内茶之古
別書ニ元是テ以テ効ナクシハニ茶方別
書ニアル方ラ用ユヘシ若シ腫
外ニ現レ出テ皮色変シ肋骨四五枚ノ間焮痛メトエカソキハ膿
管金銀ニテコレハタル
管ナリ茶ニシイラ以テ刺シ入レ膿ラ導クヘシ如是シテ膿漸
マクノ減テハ洗茱ラ以テ洗ヒ灌クヘシ洗茱ノ方別書
ニ元肺癰洗良是ニテ毎日
洗フ1兩度ツメヒイルラサレ綿ヲ蓋ヒ上ニエシラストメ

リコラウトヲ附ルス一兩日ラ經テフレムステレキル或ハテアハル或
ハテシスイフシノ類ヲ見合セ貼ス針ロ肉上ラハ刺シ葉脚刺葉
ラノイナニスリテ刺ス一シ棠休先生ノ曰肺癰ト肺瘻ノ
症ハ至テムツカレキ者ナリ其人ノ稟賦ノ強キト弱キト腫
瘻ノ處ト賣トラ詳ミシテ治ラ施スヘシを云輕易ニスカラ
ス其理ラキリナスシテ治ラ論スルハ眼無クノ遠キ往キ
足ナリシテ高ニ登ルニ似タリ慎ムヘシ

腹癰

腹癰ハ情慾ラ過レテ火灼シ脾虛ナ成ル其初ナ惡寒欬
嗽ナ脣血邊漫腫瘡ハジスナシテ色赤キハ陽症トス治シ易
シ腫ハ形チ堅硬ミナ色ナリ時ニ痛ミハ痛ベサルラ陰症

トス毒深シ俱ニ先ツテヤコミニヨラ反ガツブラス温鑿
ニテ温ムヘシ如此スレハ散ナリ若レ散テズシハ腫ノ勢ナシ減セス
増長已ハテヤキロシコウゴムスムスラキニラスフレムステレキル
ノ三呂各等分ニ合セ瘻上ラ蓋フ但シ瘻ノ正中ニハバレリ
コンラ平メイナニスリ貼シ引楊クシ如是シテ潰膿セ
ノ治法癰疽ニ同シ若治テ誤ヒハ毒淹ホリテ漏症トナル
ナリ臭氣甚出ツ此時ハテウナントニイケニシヤコシラ加工洗フ
或ハ形チ翻花ノ如キ者生シタマテ臭氣ソヨキ者ハ燒金ラ
アテ、燒キ取り其後トヘシリコシニベシシタアルテ少シ加工
交合已平ナリナニスリ貼スヘシ膚肉脱シテ正肉生セ、金
銀花ノ蜜十錢枯粉立合ラ交合シ骨ニ愈肉八九分滿

ルトキテヤハルテ貼シ皮肉ヲ収ムヘシ

囊瘻 水疝

囊瘻ハ陰氣ノ虚湿熱囊中ニ流レ注テ成ル其初メ羈丸
赤ク腫レ疼、痛惡寒、レ發熱レ大便祕シ小便滯リ或ハ飲食
進ス其症ヘナリ内治ハ陰ラ滋ホシ湿ラ渗ラヌノ劑ラ
投シ外末先ツテヤコミイニヨラ附是又湿ラモラスナリ消散
スベシ若ル腫レ硬ノノ焮痛レテ小使用ツル者ハラ、リヨソ
クスヨラクリヨセ子エフル各等分交セ合シ滾湯ラ以テ
十四五滴用ユ或ハテトテソリス子ラ用テトヲハ煎汁ソクス子ハ琥珀ニ如是シテ
小便通スト雖凡水腫未タ消セスシハカツフ拉斯別書ニアル
囊腫薦ラ用之レ是ニテ消セス別書ニ元
囊ニ亞ノ矣、ラ以テ蒸スーン加

是ニテ散セスハムスマラキニブステヤキロニ^囊コムスノ類ラ貼ノ引
上クレ若膿ミツイエハシリコシラメイチヤニスリ附腐肉臭氣
アラウノントラ以テ洗ニ或ハシリコンニレシニクアルラ加
エメイナヤニスリ瘡口ニサスヒニフレムステレエキルラ附ニ文
翠丸扁リ筋ニキツリ疼痛囊ニヘリ忍ニカクナク外皮破
ル、者ハ洗ニ別書ニアクラ用工膿アラハシリコシラメイチニスリ
キ附ケ蓋膏葉ラ附ル毎日如是ス或ハラウノントニテ洗ニ
スメイチヤニシクレ瘡口ニ刺ヘシ又一種水疝アリ陰囊大キニ
腫レ痛ニ色光ルト雖モ熱已ナル者内ニ必ス水アリ其疣工針ヲ
蠅アヌリテキ刺レ破リ水ラ出シ針口ニ膿管ラ膿金銀ホニテコシラヘシ管ナリ是ラ龍井掘ト云臺語ニイリ云刺
水氣ニシクレノ症、他ノ症ト異ニサレハ瘡口用テ易レ其ラフラシトイシカシフルラ毛綿ニ浸シ

卷クヘシ或ハ生姜汁ラ熱湯ニ和シ毛綿ミシテ卷キ置クヘシ右ノ如クシテ後腫勢漸ク退キ膿水ナキトキハ龜井龜ラニキテ愈ス

懸瘻

懸瘻ハ湿熱結ヒ聚リテナル其初メ前陰後陰之間海底ノ穴會陰ニ生レ大サ蓮子ノ如ク漸ク久ナ桃李ノ如ク赤リ腫レ痛ミ痒ミコモ起リ甚シキ時ハ惡寒、発熱シ口渴キ咽ロテニ太便道ヲ破リ陰囊ニル内治ハテトラソリス子ラヨアシトロラナ四立箇程ツ一一度ニ温湯ニ點シ服スニ外ニハメリロウトテヤコミニヨタラアヌコフナリタリヨムノ類經撰ニ用エ是ニテ温散スルナリ若レ散ラスシハ隔蒜灸

カリマラスマ別書ニアル
発表蒸テ用エ。是ニテ退瘻ス痛ラ為サハムスラキニアステヤキロジコムゴムスエンフラストハシリュン以上三品各等分予リ合シ附ル三五日ラ經テ内ニ膿アルト考ヘ知ラノ華針テ以テキリ破リ膿水ラ出入其後治法瘻疽ニ同レ此ノ症多シハ虛損ヨリ生ス内葉別書アル甚艱ノ方ラ用アヌ神フヘシ

脳疽

脳疽ハ世俗ニ對口瘡ト称スル是ニ俗ニ云癌ト云病因ニツアリ湿然コモコモ葉ナ外ヨリ受テ外ヨリ生スルモノ淺シ氣血立藏ニ蘊結メ内ヨリ生スル者ハ深シ外ヨリ無クル者其患ニ初発ヨリ頭アリテ督脉經ノ正穴ニ生スルモノ多レ

三四日ノ間焮腫腫物ハヒテ外ハ
ハレス是善症疼痛ノ寒熱往來有テロ乾キ

腫物ハヒテ外ハ
ハレス是善症

瘡色赤ノ根脚分レ時ニ竊ミ入ハ痛ミ止ミ膿ミ易ク潰

易ク飲食立チ居トモ常ノ如クナルハ陽症ニメ正氣毒氣

ニ勝ツ故ニ治レ易シス内ヨリ生スル者ハ其源深ク毒氣

發スル所ノ秋初ノ杏仁ノ如クスハ木棗子ニ似クリ腫色

紫紅ニト白泡ラ蒂ニ氣蔚マトメ飲食味ニナク疼痛

恐ニカクナリ瘡乾キテ滑カナラス是陰症ニメ正氣毒

氣ニ異ル故ヘ危シ能陰陽虛寢ラ考ヘ治ラ施スヘシツ

初ハ蒜ラクナテ、灸シ膏ハムスラキニラスラ貼シケバ

別書ニ

温熱蒸

テスニ温ナ散スヘシ如是スレニニ五日内

瘡紫減ニセス遺爛ラ催サハ又タ隔蒜灸ラスエ

ハシタコシラ平メイナヤニ金瘡上ニ附ニテヤキロシコムスム

スラキニフス各等分ニ合シ是ラ蓋フ又カツワヌスニア

別書
発表ラ以テ温ム如是レテ膿ミ成ルラ知ハ針ヲ以テ腫頭

ラ穿チ破リ膿ラ出ス又陰症ノ腫物腐多クシテ根脚

走散スルモノハ燒金ラ以テヤキ或ハカリ取りハシリコシ

ミレシニタルラ加工附ケ蓋膏葉ハ同前如是メ腐肉

尽キハシリコシニテキステイニラ加ヘ平メイナヤニ伸ヘ

貼シ愈スヘ大抵六七分ホト愈テ後ラウナントニテ洗

次第ノ
膏

ヒ平メイナヤニメルロサアロンラ浸シ附ケフレムステレキ

ルラ貼シ收ムヘシ頭邊ハ都テ脣ニ近シ骨ニ油附ルト肉掛

テス油膏ラ大忌ム此トキハ無油クテキスティイニラ用エ

一シ無油ノテキスニカアリ諸腫物候レ若シ先醫誤テ
油氣ヲ用テ内骨ニツカスニハカリヤスラ用テ骨ノ油ヲ
去ル一シ二卷水集ニ出ル者無油テキステカリヤス共ニ出

鬚癰 痘

鬚癰ノ生スルヤ性情暴急ノ人房懲ラ過シ血虛相火動レ
肝氣凝リ結ニテ成ル其癰スル所足ノ少陽膽經ニカ
ル其初大寒、熱コモイ作り頭目クルナキ疼痛脳ニ徹ス甚
シキ時ハ耳目鬚癰ニ連リテ睡ル、外ヨリ初癰ニ毎リニ
針灸スヘカラス先大蒜ラ隔テ、灸テスエタラヌスコドリ
クリヨムラ貼ノ冷散ス尚效シアラスニハムストラキラヌニ紅
花末ラチリセテ附ケ温散ス如是ノ元効シアラス睡

勢増アハムスラキテヤキロジコムゴムス高茅分ニ交合シ貼メ
引掲クシ如是ニメ後ナ膿アルフトラ知テハ針三行切破リ膿
テ出シメイチャハシリコシラヌリ針ロニ刺シ上ニテヤハルクフ
ムスモニキルノ類ラ蓋フ其外治法瘡痕ニ同シ阿蘭陀人ノ
内治ノ方アリ別書ニ出ス二卷土集ニ出

瘡 痘

紅糸疔 紅絲疔凡云

疔疽、四時節候大寒、热肅殺ノ瞬息或ハ臟腑ノ乖逆
其邪毒感スルニ因テ成ル又飲食之毒ナリ是外科大
迅速ノ症ナリ朝ニ癰ナタニ死レタニ癰ナ朝ニ死久生スル所
従テ名状タシント雖モ多々面部四肢ニアリ生スル形一ツナ
ラス粟米ノ如ク又ハ大豆ニ似クリ、瘡色赤ノス、紫黒シ

帶ニ其ノ腫凸キアリ凹キアリ寒熱往來咽乾キ或、四肢麻木メ痛痒定ニラス重キ症ハ頭目暈憤心煩発躁シ讐言妄語レ胸脇ニ疼痛シテ氣息急速ス捷法ヲ以テ頑瘧ラ吐スヘシ或リ頭痛シ寒癥發熱シ其状傷寒、似タリ夫内茱三十表ラ同キ汗ラ発スヘン外治ハ蒜ヲ隔テ、腫頭ニ灸スルトホヒ江ムスラギニラスニ乳香紅花小茴香ノ末ヲ増シ加工合ナモ綿ニ伸ヘ附ヘシ或ハ症ニヨリ例ノ如ク平ナイチヤニシリコンラスリ附上ニテヤハリテマホニホリコスガラサデイヤノ類ニラ撰ニ用テ是ラ蓋フ既膿トナラハ針ヲシ膿ヲ出シ其アトニ白膿ノ堅キモノ有ハ拔キザリ其後瘡肉エハリコンテキステイニ各等余メイナヤニ金リサシ蓋膏菜前ノ通川譲。

紅糸疔ノ症熱甚クノ紫黒ノ筋脉縱横ニ散乱ルアリノ別ニ治方アリ但ニ第一第二筋ノ者ハ其傳フル所禁穴ラ除キ平針ニテ切り破リ毒熱血ヲ出シ針口ニ腐リ藥ヲ附ケ余毒ヲ取ルヘシ疔ノ生スル所ハ治法常ノ如若治スルト達ソケレハ毒氣腹ニ入リ人ヲ昏乱レヘヌトキ

小花ス

都ニ疔毒起発ノ後心ヲ用エレ危急二三日ノ内ニアリ既ニ熟サリ瘡モツイ工膿水剗化セハ治法諸腫物ニ同シ

脫疽

脫疽ヲ生スルハ平常厚味膏朶ヲ食入ル人其ノ食毒

臘臘ラ薰蒸シ或ハ房事ラ過コレ盛火虛腎テ消癆シ或
房術ニ丹石諸藥ノ熱刃ヲ用テ精汁ヲ造ラシ熱毒
ヲ臘臘ニ蘊結シ終ニ熱火ノ病ヲ生ス其毒久シグ骨髓ニ積
ニシテ此ノ症ヲ為ス其患手足ノ指頭ニ主ス蓋レ指ハセ臘ノ
枝幹ナリ得竜梅丸ニ指ハセ臘ノ技幹ニ全身上骨ノ端ナリ上許ノ病熱大毒
久々立臘シム毒氣膏髓エシニミ居テ其處ニ乘メ骨端ノ手足指頭ニ充
ス半ナヒ朝一タノ病ニテス其源召ケハ初發指頭紅赤シノ如ク黒氣漫漫シ皮
人ヲ殺ノ速ル

裏ヨリ相傳一テ肘又ハ脚ニ至リ疼痛烈火ヲ以テ燒ノカ如
治法ニツ文ラ以テ直ニ灸スル一數壯コノユルマ否ヤラ
問ニ熟ツキヲ覓一スニ、利刀ヲ以テ毒ノ深キ疔ヲ切り割
久ヘシ尚イヨハ黒色減已ス腐勢止スンハ指ノ節ノ疔腐
肉ト正肉トノ界目ヲ能ノ考工利ガラ以テ切り落スシ

其跡工燒金ラアテ、イケニシヤコシラ平メイチャニ塗貼レテニ
スイフンラ以テ蓋アヘレ是ニテ大畧膿、ラ烏サハニシカニテキ
入テイニ各等分ニセ合シ貼スヘシ或毒氣傳フルト深ク黒
腐止ニシテ肘脚ニ至ラハ利刀ヲ以テ堅ニ切り割リ毒盡
ラモラシテ勢ニラ減レ切ロエナイチャニイケニシヤコシラ塗リ
貼ス又醋ト燒耐ラ等分ニ交合ノ漫毛綿ヲ浸シ卷キ置温
クシ如是ニモ尚痛ミ退カス正肉ヲ追フテ黒ク腐リ行
カハヌ利刀ヲ以テ正肉ト腐肉トノ間ヲ考ヘ細キ毛綿ヲ
以テ堅ク縛リ邪肉ヲ切り取ルニシ骨ハ鋸ヲ以テ引切ルナリ血
出テハ燒金ニテ燒キ留メハシリコシニイケニシヤコシラ少レ加工
ニセ合シ貼ス毎日如是シテ黒腐止ニ正肉騰ル者ハテラナシ

トニメルロアアロシラニセ合レ温ナ洗スヘシ腐肉アテハシリ
シシヘレニタルラ加工貼スヘシ腐肉サテテキスティ
ヒラ平メイナヤニ塗リ貼スヘシワナントイケビシヤヨシ合
方洗ニ茉リハ愈ルニテスヘシ肌肉能ク整フニ凡此症甚危
急ナリ毒氣盛ニミノ黒腐止ス辛ニ生スル者ハ魚際ヲ過キ
足ニ生スル者ハ踝骨ヲ經ル者百死一生ニアタリ病ナリ詳ニ

附骨疽

附骨疽ハ瘡寒骨ニ附クノ病ナリ或ハ諸瘡腫久ク愈々
不其毒ク骨ニ入モ亦死患ラ為ス其因一ツナラス夏秋ノ
比暑ラサケトテ令胤ニ露ワニ卧シ寒、湿ノ氣内ラ襲ニ或
ハ房事ノ後單ノ薄キモノラ着テ寒、冷ノ氣虚ニ乘シ

裏入り或打撲傷損ナ瘀血久シ散シセス留結ナ痛、テナ
スナリ、甚シキ者ハ屈伸轉側スルトアクワス久ニカシテ瘡
寢シテ陽トナリ寒化メ熱ナル熱甚シク骨髓ヲ絡ニ蒸シ腐
爛スルナリ或ハ癌疔結毒ノ類鹿工治シ誤リテ瘡ス湿毒芽
毒筋骨ニツテ腐爛年ラ歟トイヘ凡効ラ收ムルト能ワス
其症或ハ瘡ミ或ハ痒其形凸ニ腫レテ是ラ押エハ硬キト
石ノ如ク或ハ痛ミ甚シクナ外色ハ常帯ノ如ク其皮平カラ
、皺ラ推ス如ク或ハ皮色淡シク紅黃ハ常帯ニ凡此瘡多ク
脛股ニ生シ行歩ラリベク外ハ先ツカツフテス別書ニアリ
温和同結ラ用テ温散スヘシ若效十クシハ外ノ温散ノ剂ラ
考工用ユヘ膏茅毛同瓶如是シテ高腫レ消セ又痛也

ガラス内ニ膿アルヲ知テハ輕キ症ハ針ヲ刺ナ膿ヲ出レ大低
後ノ風毒腫ノ治法ニシメカウ重キ症ハ利刀ヲ以テ切り
同ク一骨ニ至リ毛綿ノホツシヲ以テ其切口ニ埋ミ入サ置
毛綿ヲ上ニ置キ又巻木綿ミテ巻搏ルニ次ノ日ニ至テ右ノ
ホツシ芋ヲ取り除ケ腐ノ淺溝ヲ量リ見ルナリモシ腐
リ浅クノ小骨糊コロケ道具ヲ以テ腐骨膏ヲ能ク糊除ケコムイホ
リヨム得龍謂師ニ尋ルシレスゴムヲニ子リカケ平メイチヤラ敷キハ脂ノ脂ノ類ナシカ
又ス得龍接スシ薬物ナトノ日本ニモワタニテ相冊ナトノ通ニモ右切目ニ入レ埋ミ塞クナリ上膏
茱ニテヘニススイフシラ貼シ毛綿ミテ捲キ置キ毎日換フニ
如是シ膏肉尽キハラワナントラリテ洗ヒ乾シ膏生肌散
テ附ニ新肉生ヒハラワナシトニメルロサアロシラ四步一交
セ温メ平メイチヤニスリ附ケ痊スヘシ

流注毒 風毒 風腫 風湿

是ノ血症當屬于テ一類トス

俗ニ風毒風腫風湿ト稱スル是ニ流注毒ナリ輕キラ風腫風湿
ト云ヒ重キラ風毒腫ト云フ其形チ初メ浸シトメ腫レ皮
ノ色変セズ患フル度一ツナラス或ハ肩膀コロ肘ニ至リ或ハ
臂眼股胫人面或ハ胸腹又股背皆生ス其形盃キラ覆ヘル
如ク相並フモノ共ニ此類ナリ凡是ラ患フル者多ハ體虛メ
勤労スル輩或ハ婦人産後ノ惡露瘀血經絡ニ留滞ナ生ス
治法ニツ寒熱虛實ニ表裏邪正新久ラ別ナ足ナ内ニ木香
流氣飲五積散ノ類症ニ隨テ撰ヒ用エヘン外ニハ先ツ乳
麵散ラ貼メ温散スヘシ若シ應セタハカツララス別書ニア
ル温散

テ用エレ尙効レアテスシハ腫レ退カズ外皮強ク硬ノナルヘ
其時ハテヤキロンコムゴムスムスラキニテス各等分交合ノ貼
シ引揚クヘシ如是ニト膿ニ成ルト知テハ針ニテ刺シ破リ膿ヲ
出シハシリコムラメイテヤニスリサス若シ膏肉アラハヘシニタ
アルラ少シ加フ蓋膏茱ニスバル、ナンテアハル、ラホテント
フレムステ止キルノ類見合セ用エ膿水久シク乾カサル者
ハラワナントラ水突道具名ニ盛リ膿口ヨリ靜ニ突キ入レ洗フ
ヘシ如是ナ後ラワナント汁及ニ膿汁ヲ悉ク推レ出モ
真跡え治法前ノ如ノス或ハ膿水ノ色黃ニメ雨水ノ如キ
者ハ腐リ骨ミ入ルノ候ナリ考ヘ治スヘシ凡此症ハ深ソシ沉
膿ムモナリ故ニ表ノ皮内厚クメ針ヲ刺ス一津ケレハ

膿ノ流注ラス能々腫上ラ、按メ針ヲサスヘキ疣ノ肉ノ厚キ
薄キヲ考フルト尤專要ナリ未タ治術ニ熟セル筆多ハ
衆ニテ針ヲ用ヒス且又針ヲ刺ト雖モ深カラス故ニ膿疣
ニ不至故ニ膿ナントハ得針ヲ刺スヘキ時節ヲ誤リ次第
ニ膿タレ骨ヲ壞リ肉ヲ傷リ元氣ヲトロヘテ潰ハサルニ
至ル悲ニカナ凡初メヨリニ七日或ハ十九日ニ至リテハ大條
テ知ルハ外科ノ專要トスラ用テ忽ミスヘカラス

瘰癧るいじやく 痰癧たんじやく 爽核きょうかく 結核けいかく 同類どうるい 氣腫きしゆ 第二陽瘡だいにようじやう 神じん
厚味ノ毒經給ニ釀シ結ホレ血氣ヲ壅塞メ成ル其根臓腑

ニアリ癩ハ累々トメ珠ヲ成シツラナル心癪ハ歷ナリ治セ
入年ラ歴ニ疼痛核結核同レ種類之俗ニ氣體ト云モ同シ又
瘡毒上外メ是ニ似タルアリ湿疹ノ症ナリ其ノ患ニ耳ノ
前後項頸胸腋ノ間ニ生入其形千累々トメ珠ヲ貫スク
如ク三五枚連リ出テ形梅李ノ如ク大小定ラス馬刀癩ハ
長レ謂ハ、馬刀具ニ似タルラ以テナリ瘡ノ色淡白堅硬又
微熱久シノメ長大色モ赤キニ變シ痛ラ為ス是ラ患フ
人常ニ自ラ心神ラ安レ氣力ヲ養ニ蔚スヘカラス内治
ハ蔚ラ解シ熱ラ清フシ風ラ去リ毒ラ消シ氣血ヲ順流
スルノ効ラ用ニ外ニハ溫熱ノ刺ラ以テ表氣ハ開キ血脉
ラ行テスヘシメリロウトテヤコニイニヨ或ハムスラキラス
ニ小茴香ラ加フルノ類撰ニ用エヌ祕灸ラス一傳有陽集
消已ス腫レサトテヤキロンコムスラキニラス谷等分ニ
交合シ毛綿ニ伸ヘ貼ル引揚クヘシ如是メ内ニ膿アルト知ハ
鍼ヲ刺ノ破リ膿ヲ出シハシリコシニヘシヒタルラ少シ加エ
交合令シガイチャニスリ切リロエ刺シ上ニムスラキラス蓋
膿ヤワヤク減テハラウナントニテ洗ヒ愈ス
又一種生スル初大豆ノ如ク或ハ桃李ノ如ク三五年ラ經ル
ト雖元消散ニス漸ク腫矢ニテ堅キ一石ノ如ク氣蔚々ト
メ清潤大ナラス肢體羸瘦スル者ニ発スル所定ニラヌ多
治シ難シツタテアヌスコメリクリヨムニ樟腦ヲ加工附ケ
テ消散スヘシスコムアモニマクシコムウルハアヌシコムサカニ

是三品一コム別書目ニアリ
コムト大脂ノ物名又代革アリ

以上三品各等分醋ヲ以テ燥ヤマセ貼スルモノ又佳
之或ハ年日ラ歴テ瘡ノ色紫赤キニテ、神セハ膿アルニ似テ
動脈アル者ハ慎テ針ヲ刺ヘカラス誤テ刺シ破レハ大血流ニ先ス

癰 瘤

癰瘤ハ瘀血湿熱経絡ニ壅リ滯トテ成ル癰ハ腫レ下ニ垂
蒂根小ニト形チ櫻桃ノ子、如ク瘤ハ身黑色ニト腫レ高
カラス痛ニ痒ニナシ立瘡六瘤其外カラ状多シ雖トモ
外治ニ有リテ異ナルトナレツ根小ニノ頭テ大キニ下エ垂
ル、者ハ燒系ヲ以テ燒根ヲ括リ日々密シク拂ルトニ六
スレハ燒根自然ニ腐脱ス其痕工枯巻ラヌリタアヌ
スコメリクリヨムラ貼ナ愈スシ或ハ其形チ根脚大ニテ
指ニテ推シ極ムルニ指ニ隨テノホミ指ヲ引久其尽、浮ニ腫ル、
者ハ其皮ヲ二三歩許リ十文字ニ切リニラキ竹ノ籠ニテ四方
（披キ見ルニ内ニ竹紙ノ如キ者アリテ一物ヲ包ム其根ヲ引
揚ケ見ニ筋アリテ离レス其筋ニ糸ヲ掛ケテ緊レク括リ得竈
真筋筋脉ヲ括ル事ノ血筋ヲトヒナラシコス瘤ノ類數ス多シニヒニ瘡六瘤ハ右状諸書ニ出ス又
外粉瘤黒粉瘤髮瘤蠶虫瘤蛆瘤ト瓦瘤アリ此立瘡六瘤其外諸瘤ノ内石瘤筋
瘤血瘤ノ類卒尔ニ切リ破リヘカラス切リキハ血走リテ人ヲ殺ス甚ラソレヘシ肉瘤
疼痛脹瘤ノ類ハクルシカラスト雖モ先ツ多ク膿リ第ニテ被クヘシ
其上ノ方ヲ切り披キハシリコシニ丹券ノ焼キ片シラ少シ加
エメイチヤニ又リ貼ス一日一夜程シテ一物脱ビハ痕工ニキスニテイ
ニニレレニタルヲ加工貼スヘシ其後正肉七八分騰ラヒラウ
シトヲ以テ洗ニ整フニレス其根ヲカク其形チ堅ク腫レテ
高カラサル者ハチラアヌスコメリクリ鳥草ニスリ貼入其上

板釘リラ以テ水銀ラスリ附ケ膏薬ノ上ラ蓋ニ毛綿ヲ以
テキ置ケシ是ミテ大倅散收ス

乳病 乳岩

夫乳房ハ陽明胃經ニ屬ス乳頭ハ厥陰肝經ニ屬ス其病因
一ツナラス或産後ニ乳汁速ニ出テスナ脉絡クノ凝リ帶リテ
通セス或憂愁思慮ラ過メ鬱結レテ肝脾ラ傷リ脾病
ムトキハ眉元亦病ム乳房乳頭ハ肝眉又ハ嬰兒乳ラ呑シテ乳
經ニカルニ候頭ラ咬ミ傷リ歯ノ跡終ニ結ホレ聚腫レ塊ニナリ其寒
熱ヨモコモ作り煩渴疼痛甚シキ者共ニ乳麵散宜ニ消
散スルナリ尚腫消セス痛ニ退カスンハムスラキニテステヤ
キヨンコムコムス各等令ニ交セ貯ス又カツフラス別書ニラル
発毒薰

ラ用ユヘシ如夏メ膿ト成ハ鉢ニテ披キ破リ膿又出シ後人治法
瘡疽ト同シ

乳岩元亦憂愁思慮ラ破リ思慮脾ラ傷リ累慮夾セス頭
フ旋遂ス或ハ中年後夫ナキ婦人ニ夏マテ得ハ未治シカモレ
初ナ大豆ノ如ク漸大ニシテ棋子ノ如ク半年一年ノ後長大ニ
為リ痛ミ甚シキ者ニラアヌスコナリノリヨンエニアラスト
テヤキニホリコス類ヲ附消散スニシ数日如是ニテ散ラスニハ附
茱テスヘシ方別書水集如是ニメ瘡上爛ル者ハイシエシトテヤホシ
ホリコスラ綿ナイナヤニスリ貼スヘシ阿蘭陀人治法別書ニ
出ス大條乳岩ノ治法内消テ以テ專粟より既ニ破レ遺テ
臭氣甚シノ肉ラ穿テ岩穴ノ凹凸丸如ク或ハ紫赤枯槁

如ノ或ハ疼痛心肺ニ連リ血水ラ流スモノハニ臘共ニ裏一枚ア
カラス津液ラシケテ尽キナ元ス初メ結聚小核ノ間ニ治ス
ヘン潰爛シテハ百死ニ生モナレ榮休先生ノ曰乳岩ノ症半年
一年ノ内末ノ破レサル内ニ花患門ニ条スヘシ壯敷ハ病人ノ
鹿寧ニ順フ重キハ毒ラ減シ輕キハ消散ス屡試ムニ甚
タ効レアリ依テ門十三示スト云々

楊梅瘡

楊梅瘡ハ天行ノ濕毒ニ感シ深ミ或色慾ニラケル人淫穢
ノ毒氣肝腎ノ二經ニタクワヘ或人脾腎肝ノ内風湿熱
ヨリ生、或ハ婦人陰戸ニ淫水惡濁ノ熱毒アルニ交レハ直
男子ノ腎中ニ惑ナ成ルトニ有便毒骨毒ノ類皆是ヨリ始

テル又下痢便毒骨毒ノ楊梅瘡ラ発スル者内ニ

内某別ニ傳アリ

外ニ外貼別傳アリ或上三回ラ貼スヘン但レ此ノ内外ノ方春秋夏ノ
三時ニ用ニ冬月用ユルトナカレ若シ止ムト得スメ用ハ病室

ニ炭火等ラ置キ溫暖ナラレメ必ス寒涼ナラレムヘカラス

謂絞

張等ラハツリテ又梅瘡結毒頭頂ニ発シ膏爛年久シノ者惡肉等
アラハ切リ去ルヘシ後ラウナントラ平ナイチニ浸シ貼スヘシ頭

脳ノ患ハ油類ラ用エル一ラ禁ス少ス用エル一ナカレ

得龍謂是ハ油ラ
骨之禁少スル故ナリ

肉厚ノ骨
遠久不苦

便毒

騎馬癌
驥馬癌
脾馬癌
同ニ得竜謂俗ニヨコ子ト云此別名ラ
横瘡
上云瘡ハ小腹下ノ病ト云云也
橫瘡也
毒上云者同ニ血癌毒非別物

便毒ハ俗ニヨコ子ト云フナリ両膀ノ縫ニ合セ小腹ノ下陰毛ノ

傍ラニ生ス其因ハ精血コモコモ交リ感房ニ入テ強ニ精ラ

固ナテ洩ラサス或ハ慾念ステニ萌サレテ元停テ遂ケス故ニ
精血走動メ肝經ニ滞リ是ノ患ラ為ス其初皮色変セス微
痛ナ寒、熱交起リ腫レ堅カラサル者ハ軽レ或腫レ硬クレテ色
赤ク痛ニ甚シノ惡寒癥烈シ咽カラキニ便秘紫スル者ハ重
シ治法滯リラ散シ瘀血ラ行ランニ便テ通利シ外ニハムス
テキニラス貼ス四日ラ經テ効シアラサル者ハテヤキロシコム
コムスラ貼サリ揚クヘシ膿三十ラハ針ラ刺シ破リ膿血ラ出シ
メイチャニハレリフンラヌリテ刺シ上ニエニアラストリ類櫻ニ
用エヌテキスティニベヒジメアルラ加工貼ナ上ニニアラス
ノ類ラ貼スルモヨシ如是シテ膿血漸ク乾ク者ハ洗塗ラ前法
用テ愈スヘレ

灰初発ニ治法ラ誤リ二三年ニ及ヒ愈スシハ父大腐爛ツヨク
臭氣アリ色紫黒ラ帶テ瘡口魚ロニ似タル者ハ氣血虛ス
ル故ナリ足症内ニ峻神ノ刺ラ用ヒ外ニハラウナムト
イケニシヤコシラ加工洗フヘシ尚腐肉尽スシハ膽卷燒キ片
シラ如ヘ蓋シラホテントノ類ニアリ

下疳瘡

下疳ハ肝腎ニ經ノ湿熱ナリ其源呂クアリ淫邪慾火鬱
滯リテ成リ或ハ淫慾ノ念萌シ動テ閑物拳ルト雖ニ泄
サス其敗精濁血中途ニ流レ澤リテ成リ或ハ歸人ノ陰
黑渾カラサルニ蟠合シテ瘀精濁氣ニ觸ヒテ成リ或ハ房
術雜行シテ湿熱淫火相攻ムルニ因ニ成ル各症ニ隨ヒ治

スニシ内ニ清湿相火ノ刺解毒生肌ノ方テ用工

竜胆浮肝湯仙遺稿第五
宝丹類隨症可施ナリ

阿蘭陀丸ノ内治方數多シ雖七日本ニ用ニ難キトナレハ是ラ

初ナ白泡テ生シ微シノ痒ノ微シノ痛ム或ハ紫黒ラ、帶フル者ハ

アルホンカシフテアトニ龍腦ノ油ラ少シ加工平メイチヤニスリ貼レ

テヤホンホリコスラ蓋フ如是メ治ニスシハ洗茱ラ用エ

脚書ニ
病氣

其後

水氣ヲ能ク洗ニ去リ腐肉筋肉アラハカシフテアルニ銅垢少

ビレシニタル少シ加工交合シ敷クヘシ

又初ナ陰莖ノ頭ラニ紅色指ラ以テ點スル如ク瘡ラ生スル者

アリ是ニハ先ツアルホンカシフテアルニヘレビタアル少シ龍

腦ノ油少以上三呂ニセ合シ貼ス腐爛ツヨク汚水タリ流シ

出テハヨク拭ニサリテ附ニシ如是ニナモ治ニス腐リニカ

テ瘻ス一斗

ハレリコシカシフテアル六錢ベレシジタルカ交合シ平メ

イナヤニスリ貼スヘレ尚臭氣ツヨク腐爛ヤニサル者ハラシ

トヨシカシフルラ以テ洗ニ清ナ置キハシリコシニレシニタル

ラ交合レ貼ス腐肉サリ正肉騰ラハ加減アンフテアルラ以

テ瘻ス一斗

又初メ皮内ニ瘡アリテ外見ハ疣目ノ如クニタルハ茱力内ニ

徹シカタニレ如是キ者ハス洗ニ茱ラ用エ

脚書ニ
病氣

腫レ尚消ニサ

ハ皮ノ内ニ水氣アルナリ其皮ノ色ラ考ヘ切リ披キ

得竜謂
切披キ

前ノ洗茱ラ以テ洗ニ淨メ水氣ラ拭ニ取りカシワラ

アル十錢龍腦五分膽卷燒片一分輕秘一分以上四味交

合シ平メイテヤニ塗リ貼スニシ如是ニ四五日ナ尚効シナ

キハ蠟系ラ以テ疣目ノ如キ者ヲ拔リ落スヘシ小キ者ハ
鉗ヲ以テ断切り其痕工加減カンフラヤル又ツテリトシ
猿臂一箇切り抜キ内ノ白液ヲ用ユ龍脳一分丑厘輕粉立厘磁器ニ入レ擣リ
交モ平ノナイチヤニ塗リ貼ステヤハルト或ハテヤホンオリフ
スノ類イラ毛綿ニ紹ヘ捲ク如是ニメ努力肉尺、キ正肉疊
ハカシフラアルニ竜脳ノ油ヲ火レ加工付テ皮膚ヲ整フヘシ
又初十陰頃ニ鐘搢ノ如ク水ヲ含ム者アリマツ消散スヘ燒
耐立十錢樟腦一錢半以上ニ呂微火ニテ温ナ平メイチヤ
或ハ毛綿ニ浸シ患フル所ラ捲ク如是、一日一夜ラ經テ
腫レ消セサル者ニハ薰葉別書ニアル病腫薰ラ用エニ薰葉ニテ元腫尚
消セス痛止ヌシハ平針ラ以テ淺ク刺ス立六所血木テ校

出レ加熱アキリアルラ附ヘシ尚痛ミ退カス办シナキモノハ
カンフラアル十錢綠青一錢半鉛ノ燒片、シ一錢能ク交合レ附ニシ
又此症年ラ經テ愈ス無毒深ク腐爛甚キ者ハ小便道エ全
或銀三寸持エケル管ラ刺シ置キ針ニテ陰頭工十文字ニ糸ヲ
通シ徐々Hニキレメ自然ニ括リ落スヘシ其後燒金ラアテ膏
茱ラ附ル又洗茱別書ニアル病三洗テ用テヨクノアテニ温ノ水氣挾ニサ
リシシリコシイケニシヤアホストロウロニ以上三回ニ合レ貼ス膏肉
サリ正肉アカラハカシフラアルラ貼ナ瘡スヘシ或ハ疣目ノ如キ
者並ニ出ルモ治法同シ

婦人陰器ニ下疳瘡ラ生スル其症色タアリ治法ハ異不

苦入也。婦人陰瘡

ノ下痢瘡ニ同シ或ハ痒ノ或ハ痛ミ、惡寒、発熱シテ小便澣リ
苦ム者ニ洗茱別書テリ数方ラ用ヒテ洗ニ温メ加減カシフラアル
ラ貼スヘシ大瘡冒子下痢瘡ニ同シ

石淋得竜謂淋疾ノ症品々アリテ内茱/主所口別傳アリ/石淋ノ
一症ハ專ラ外治ノ事ナル故、石淋門ノシ出ルナラン

石淋ハ膀胱ノ湿熱或ハ水穀ノ微垢水道ニ傳工送リ漸ク滯リテ
砂石ノ如キニリ莖中ニ挿ミ小便通セス腹中張リ腫莖并ニ腫
廻リ痛ミ、例乱ノ死スルト須臾ニアル者ハ治法先指ヲ以テ穀
道ノ前、陰莖ノ後エラ押ナ見ニ石ノ如キモノ指下ニアリ是ヲ
取ルニハ病人ヲ仰キ伏サセニ足ヲ揚ケ一身ヲ忘リニ動カサス
瘡切ラ以テ豎ツニ切り披キ道具ヲ以テ砂石ヲ取リ出シ
早速甚速之を繕合セ血留ムヘシ血止茱別書麻門
止出

久蓋膏内茱別書ニ
アリ/臺言ラモ綿ニ伸ヘ貼シ、蓋ミ毛綿ニテ
捲ラクヘレ大ニ風ニアツルヲラ忌ム

又淋疾久ナ陰莖ノ内膿水凝リテ砂石ノ如クニリ塞キ痛
ムモノアリ是又平針ヲ以テ切り披キ小便道口ノ砂石ヲ出
レ血ヲ止メ元後ニキスティヒノ類ヲ以テ治スヘシ尚内茱ラ

用エヘシ内茱別書ニ
アリ/臺言

痔漏

痔ハ大腸ニ湿熱ラ積ミ或ハ厚味炙肉ヲ過食シ或ハ酒色、
テケリテ腸胃日傷ミラ受ケ瘀血濁氣肛門ニ流注シ或久
シ座スルニ依リテ氣血凝滞メ成ル。症男女老少ラ
別ナス皆ナ患フ但シ内痔アリ外痔アリ内痔ハ肛門ニ

結腫ラ生レ形大豆ノ如ク又東ノ如ク數シキ者、三五枚相連ル
ナリ外痔ハ肛外ニ生ス初メ微痒微痛レ漸次ニメ形子桃李
ノ如ク菱角ノ如ク柿核ノ如ク石榴ノ如ク雞冠ノ如ク蜂
窠ノ如ク蓮花ノ如ク其形テツナラス或痛ミ或痒ク又
黄水ラ流ス痛ミ甚レク秘結セハ内革ニテ大使ラ通スニ
エレキニエルホニアト別書是ラ主ル外ニハイニクエントカシフラア
ト大テ、リヨリヤウロシ中ワラニセニ少知ス代ニ以上三品、セ
合シ綿ニ壅リ瘡上ニ貼ス又蒸苦別書ニ記胡巻用ラ用エヘシ其後ハ
膏苦油苦見合用エ是外痔ノ治法ナリ
内痔ハ初メツ指ヲ以テ肛門ノ内ラ痔ノ在能ラ搜リ
潔干清キニ其ハノオ法ニ應シテ铁名ヨリ鐵金ラ入ル得竜謂鐵ノ管ノ内
鉄管熱ノ氣カニレキリ具法ニ從フ
シ入レ其管ノ内ヨリ燒金ラ入能ノ痔ノ頭ニアツルト、數次
メ後又分寸ラ考エ刺シ糸ラ以テカンラアト十錢龍腦
油一錢五分ラヨロサアロン五錢以上三毫ニセ合セ温メ又リ
肛門ノ内エ刺シ入レ如是ニテ後膿水イテハ水突ニテ洗ア
得竜謂洗苦ニテウムシト見合シ被スヘシ例ノ如ク其間ニアルホンカフアトニアルテ
少シ加工ナイニ壅リ刺ス又アルホンカシアトニイケニシ
シ各等分交合シメイチヤニスリ刺モ可ナリ又菱角ノ如ク柿
ノ核ノ如ク高起スル者ハ痔根ラ蠶系ニテ括リ漸々ニ緊シ結
ヒ自然ニ断ニ切ル可シ或燒金ラ以テ痔根ヲ燒キ或ハ挾
テ功力取ルヘシ血出ル者ハアルホンカシラアトニ枯巻ラ少

レ加エメイチヤニ又塗リ貼スヘシ

漏症ハ初ナ肛門ノ傍ラニ微シク腫レ時々鍼ミテ刺ガ如ノ痛
ミ又是ラ毎シ挿ムニ内ニ竹ノ根ノ如キ堅キ者アリテ次第ニ
潰工爛レテ歲ラ經レ圧瘻ス或ハ痔瘻治ラ誤リテモ漏症
ト成ルトリ治法内ニハ大腸ラ滋潤レテ大便ラ疎通スル創
ラ用ニ外ニハ大蒜ラ隔テ、灸メハシリシニレシニタルラ加
エニ合シ歸ニスリ附テ上ニメフアヌスコメリノヨシラ以テ
蓋フ瘡根ラ爛ラスレ如是ノモ瘡塊タマサル者ハ圓燒金
ス以テ毎ク瘡頭ラ焼キ茱ラ貼スル一前ノ如クス瘡塊漸
ク腐レ流ル者ハアルロサアロニテ肌肉ラ生レ餘ハ同前又年
久シノ命タニ数タクノ出来レ黃水ラ出シテヤマナル者ハ
ハラワクシントニ洗瘻ス

脱肛

脱肛ハ肺大腸ノ氣ノ虛脱ナリ或ハ腎元ノ虛冷或酒色過
度ニメ腸胃傷レラ受ケ此ノ患ラ成ス胃女老少皆アリ内治
ハ多端外治ハツツ蒸サホル肚一蒸別書ニアヨン能ク温クテ後附茅リ
別書ニア三テラサクヘシ若シ効シナキモリハ別書ニア肚一蒸ラ用テ按摩メ

治レ收ムヘレ

水腫 脹滿

水腫ハ病因一ツナラス大抵中氣、虛弱ニナ外六氣ノ邪、感ニ
テ此ノ病ラナス能虚實ラ考エ治ラ施スヘレ腰上腫ル、者ハ
テリヤアカ阿蘭陀ノ棟葉
ナシ真ナルラ櫻用又ハメテルタマート同棟葉ナリ蠻人長嵩ハ
持渡ルト云ニ甚メコナリ莘ラ毎服一錢白湯ニテ用エ又腫脹ヨリ以下ニアル者ハラ、
リヨソノス子或ハテトラソノス子或ハラ、ヨリヨマニアル者ハラ、
リヨソノス子或ハテトラカトリレイ阿蘭陀棟葉
キルニアト同莘ラ症ニ隨テ擇ニ用
或ハエケスケナラカトリレイ阿蘭陀棟葉
キルニアト同莘ラ用エヘニセ
五、レ外ニハ洗莘リ別書ニアル
通水洗引キ莘別書ニアル
水腫引茎莘ラ用エヘニセ
治ノ方ノテリヤアカ蠻人近来持渡リ甚メ多ニ京大坂ノ莘店ニモタマニアト雖モニカ
別書ニ記スコトノ正真丸シ能々櫻ニ用エシヌナテルタマニアト或ハエケスケナラカトリレイモ
アシスアリヨシナスナシスアリヨシナステトラソノス子ラマリヨセチフル莘リ其傳アリ書中

三出筋木レ体ニ内治本朝唐土
ラクヤカナルニガス偏竜子證スヘシ
書看外ニハエシ通水薰脹滿ハニツ蒸莘ヲ小腹當田テ頻リニ薰
スヘシ別書外ニハエシフラストテヤコミイヨテニシスイフン等分ニ合
ニ歎ラカナル草ニ伸ヘ脅ド上ニ貼シモ綿ヲ捲キ置クヘレ如是ニメ小
便ラ通スルナリ内ニハ前ニ出ス内茱類ラ見合已用エ又一方アリ別書
土集水又水腫脹滿ノ水ラ按ク奇術別ニ傳アリ阳集ニ見ユ
走馬牙病

走馬牙病ハ俗ニ歯クサト云甚メ迅速ナル一馬ノ走ル如云
意ナリ治法遲延ニスヘカラス是小兒痘疹ノ餘毒退カス或
ハ諸病ノ熱毒甚シキヨリ此症ラナス初ノ牙齒ノ爛班レ漸
潰工腐リテ紫黒色ニ成其惡臭近ツキカガナレ甚シキハ
歯龈内脱落シ又日アラスノ唇ノ肉穿テ破ル者ハ治セス

ニリ内ニハ寒、涼ノ茱ラ用テ熱ラ淳レ清レ毒ラ消ス外
ニハ毒ラ消レ弊カラクシキ膚リラ止ムルノ茱ミ用ユニツ附茱
別書ニアル
牙癧附茱ラ用ニ又含茱別書ニ方アリ
又附茱リ一
方又吹喉散茱ラ、撰ニ用ユニシ

喉病 骨硬附

喉痺ハ急卒ノ症ナリ其發スルヤ咽喉ノ通道卒然トメ
腫レ滿テ呼吸喘促ス甚シキハ眩ナキ卧シテ人事ラ知テス
治法急ニ破針ラ以テ腫上ラ切り破リ惡血ラ出シ取り管
テ以テ吹喉散ラ喉中エ吹キ入ルレシ其後ハ花水等ニテ漱
カセテ治スヘシ得竜謂是急喉痺ニシテ古集ヨリ馬喉痺ナト、名所甚急症ナリ
血ラ此ノ愈又丹巻ノ末ハ至テキニレ、其外喉病四ツアリ曰ク草乳餅、雖又蠍草開
喉子舌張其外喉目ノカタト雖ミテノ喉痺ノ付状アリ曰ク草乳餅、雖又蠍草開
喉子舌張其外喉目ノカタト雖ミテノ喉痺ノ付状アリ曰ク草乳餅、雖又蠍草開
治法入嘴喉爛ハ痛ミテ飲食通シ難シ声啞スル

者食病ニモアリ又多ハ瘡毒ナリ其母ア考ニ揚梅
瘡毒、齧結ノ患ラナス者ハ土伏苓剝茅三宣ニ得龍謂立室丹又外
ニ吹茱別書ニ有
四味吹茱冥ニ是ニテ膚ヤ、ラスハ別書ニアル
三味吹茱ラ用ニ
又誤テ魚骨等ナラ呑ミ叶ヒモ出ス嚙トモ下ラスシハツ燈
シ大ラヌテ口中ラ照シ見古押エニト舌ララナヘ能考エ魚骨
ハサミ出スヘシ若レ魚骨見エスハサミ出レカタクハ服茱スヘシ
別書ニ二方何ニテモ吉シ
アリ

ス竹木屑咽ニ立ナ痛ニ忍ニカタク如是何トモ仕カクキハ毛
綿ノ糸数條蠅ラ拿リ咽道ノ形ナノ如ク斜ニ撓ワメ咽
ヘナレ从ミ外ヨリ推シ下ラストキハ其ヘ、手盡隨テ抜ケ下ル
ナリ其痕ラ直ニ東前水ラ以テ漱スヰ整フヘ

小兒大人眼目 防痘疹篋毒入眼

眼ハ立臍ノ精華ニナ諸陽升ツテ照明ラニス其病ツナ
ラス各クチ治スヘレ斗ハ先洗芋別書ニ有
三味臺言方ヲ以テ洗瀉
ヘシ赤腫疼痛スル者頃ニ愈ユ又眼中腫レ痛ムモノハ蒸芋
リ別書ニ有
眼腫魚 方ヲ以テ蒸温ナ又洗芋リ別書ニ有
二味臺言 方ミテ洗ヒ治ス

ヘシ

又眼中ニ歛羽障アリテ黒白分タアル者ハ掛芋別書ニ有
二味臺言二カラ
用エ其後醫障尚流シ去ラスニハ別ニ奇術アリ内治ハ夫
タ症ニ隨テニ丈アルヘシ奇術陽集云

又小兒痘疹ノ餘毒眼中ニ流注ノ腫レ痛ミ明ラ失ウシト
欲止ル者ラ治スル奇方別書ニ記ス生集云

鳴病

鳴病ハ俗ニハナメナトニフ是肺氣不足風熱上外レ或ハ
飲食厚味ノ繙毒相襲ブニ因リ或ハ七情鬱滯メ瘧肉ラ
生シ久シテ愈サレハ鳴冗ラ聞テ塞キテ香臭ラ知ラサルニ
至ルヘツ銅ノ管管ノ竹ノ竹ノ管可ナラガス病疾門ニ演ルレ荐ヘ鳴中ニ入管ノ中
ヨリ燒金ラ以テ瘧肉ノ頭ラ燒クヘシ又乳香ラ燒キテ其
氣ラ嗅カスヘシ如是ニソ瘧肉爛レ潰エル片ナルロサアロン
ニ枯柵ラ加工刺レヌルヘシ又瘧肉長ク鳴ノ外エ無レ下ル
者ハ蠅糞ニア拂リ若シ或ハ鉄ラ以テ切リ若スヘシ又附
葉アリ別書ニ記ス 土集云

牙齒病ノ因一ツナラス火アリ 風アリ虫アリ 四日熱アリト
齧アリ内治火ニハ涼シ風ニハ散し虫ニハ殺し胃熱ニハ涼シ
氣爵ニ解シ夫タノ業ヲ用ヒ外ニ風大ニテ痛モノハスモ
リトサアリスアルモニヤシラ以テキッシ浸シ痛ム歯ノ上
ニ貼シ暫クロラ用テ居レハ痛立所ニ止ムナリ

又歯ノ諸痛ラ治スル方又氣爵牙痛免牙痛ラ治スル方又
虫牙痛ラ治スル薑葉三方別書ニ記ス撰用スヘシ 土集出
又一種鑽齒ト云フ者アリ其患ニ牙根ニ別ニ尖リタル歯ア
リテ銀肉ヲ穿テ出ツ其色紫ナリ或ハ痛ミ或ハ痒ク
或ハ膿水ヲ流ス是ラ治スルニ平針ラ以テ銀肉ヲ搔キ
破リ鑽齒ヲ取ルレ其後テ焼酎ヲホツシニ浸シ針ノ跡

ラ拭フヘシ數次スレハ血留リテ愈ユ

人齒ヲ造ルニハ蠶ニ火ミテ溫メ斷肉ニアテ歯ノ形ナ及断肉
ノ凹ラウツル取り別ニ鯨魚ノ牙ヲ以テ右ノ蠶齒ノ形
チノ如クニ是ラ造リ木賊ニテ能磨シテ摸シ歯ノ中央
左右ニ各一穴ヲ穿テ針金ヲ以テ左右ノ生歯ニ結ニツ

ナケナリ

得竜 謂今代之甚細ラスル者甚奇ナリ或リ象耳蠶者ノ義ア
リキ本ニウエルホ其妙ニ不リ今尔法ラ見ルニ甚ク拙ケレル則ナリ

童同ヨリ傳
ル初故記

某ニ口十 口瘡

舌瘡糜爛ハ冒門ノ熱毒ナリ大人小兒トモニ含ミ業リ

別書ニ有

前味方宜シ古瘡ハ心氣也勞シテ久大盛ニ因テ生ス

初舌ノ傍古ノ頭ニ粟粒ノ如キ者ヲ生シ漸ク古ノ形

厚ク大ニナルトラ覧工具後黒ク腐レテ遺エタリヒナリ
若日久シノ痊工ス古根腐リヘル者ハ治セス宜シノ思慮
ラ遠サケ禁忌ルテ守リ内ニハ大ニ神十ニ火ラ清スツサ
茱ラ用ユヘシ外ニハ貼茱副書有生集四味、貼茱重古ハ大人小兒トモニア
リ。是レ古下ニ又古ノ如キ者生スル病ニナリ先ツ古ノ兩傍横ニ針ラ刺レ惡血ラ出レ吹喉散ラ吹キ入レス吹茱
副書有生集二味、貼茱ラ用正ヘシ附茱吹茱含茱敷方別方別書土集ニ撰用

癪風

癪風ハ紫白一二種アリ共ニ氣血凝ニ帶リテ風湿相
ニ冒ニ或ハ醉テ後ナ雨露ニ侵サレ癥ラ成ス佳内
白癪風ハ多メシ治レカタレ内治ハシイニテリヤアカ

ノ者ニハニ泉一義體實卧スニ偏ニテ熱湯ラ以テ送リ下ス如是ニシテ汗
ラ取ル。二日次ニ浮茱ラ用ユ浮茱ノ法卫ケヌタラガオ
尼尼正者ニ泉一義體實製輕粉ニ蓬ニ正先エヌスノラニ輕粉ラ包ミ
大豆ノ大ヰサニカシ温湯ニテ送リトス齒ニアツルノ勿レ
夜分服メ次ノ日食物ラ絶ツヘシ又後三日過テ又服ズ
ノ前法ノ如クス服茱ノ間大ニ草茱辛辨ノ物ラ忌ム
先師曰口傳ノ證得竜溪右ノ内茱ニニテシイニテリヤアカハ前ニ出
ル只ノテリヤアカト云者ノ如クニヤワラカニ神托ノモノニ
アラス是モ彼ノ地ニ製衣スル煉茱ニメ持テ渡ルアキ稀サ
ルモノナリ且又深茱ノ法トニフモノノ内アケヌタラカ
トリコシハ知ス分量ノ所ニ七厘实症ノ者ハ一爻ト足

トキハ是ニ又補茉ホノ類ニアラス又輕粉ノスルトキニ於テア
殊更厘毛ラアラソヒテ和人ノ性質ニカタシケノ用工ニキ
茉剤ニアラス勿論癰風ナトノ輕淺ノ患宜シノ外ヨリ
治ラ施スミシカス洗茉附茉別書ニ出ス考工治スヘニ但
制輕粉ハ茉智ラエルムル法ナレハ他ノ茉方中ニ於テ據ナ
ク用ニハ此法ニ隨フテ用ユヘン依ス記ス

阿蘭陀輕粉ラ制スル法

楓樟ラニツ割リ核ラサリ輕粉ヲ少ニヨラス紙ニ包ミ
楓樟ノ内エ入レモトノ如クロラ合レ麪粉糊ラ以テ土器ノ
内ヌ封ニ入レ又土器ラ蓋ニ上ラ泥土能タ封シ炭火ミテ燒
ノ水時火氣去テ用

：鵝掌風

鵝掌風ハ手足裡及ニ手足ノ血ニ発ス是寒涼ノ邪凝リ滯
行或火熱血燥ニヨリ皮膚枯レ厚クナリ破レ裂ケテ創ス
初ナハ紫白ノ斑點ラ発シ久シノメ皮膚裂チ痒久忍ニカ
チ是シ白屑ラ起ス洗茉宜レ別書ニ元洗フ後ニハ能ク
水氣ラナリカンフラアトニヘレシシアルラ加工附ケ上ラムス
テヒキルラ貼スヘニスフラントイシカンフルラ温メ洗ヒアキスト
ロウロシニケニシヤコシラ加工貼スルモヨレ或ハ瘡風ノ甲ニヒテ
ハカンフニラアトニ鉛ノ燒キ及シラ加工貼ス又附茉ホノカア
リ別書土集本部ニ有

疣瘡ハ髪ヲ剃ルノ後于風邪毛竅ヲ襲フテ成ル初白團
班剥テ発シ鱗片ノ如ク屑ヲ生ス日ラ經テ痂ラムスニ頭ヲ
ニ滿ルニ至ル久シクノ愈エサレハ膿ノ孔ヲ生シ中ニ火薬キ魯ヲ
生ス痒クシテ痛マス或ハ腫レテ膿水ヲ流ス年月ラ經
又レハ治レカタメ内治ハ風ラ解シ熱ヲ涼アスルノ剃ラ用
ヒ外ニハ先茱別書ニ有
ニ味壹方ニ宜シ又附ケ茱別書ニ有
ニ味壹方ニ宜シ又ノ
デントインカンフル或ハアーノワメリクリヨン芋ミア洗ヒ或
ハアルホジカンフラアトニベヒシヒタルラ加工或ハアボスト
胃ロニ或ハ仙人膏ノ類ヲ撰ヒ貼スヘシ瘻テ後子毛髮
生セシハ絶スハシリコンラ塗ルヘシ毛髮生スルト奇十
頑癬ノ類年久治レカタメカキ者治亦同前

是ニテ三十二病門ハ旧記ノ下ナリ既後ノ十一ヶ條ハニヤ旧
記入當流口傳聞カキノ内ヨリ日用ノ治法ラ罕シ歟者
ナリ都テ四十三類トズ是新弟一巻蔵集ノ次序ナリ
先次弟ヲ以テ考フレハ見易スカラシム

痘毒

口傳ニ曰痘瘡或ハ水痘ナトノ毒ヨリニナリテ膿ミタル者
カンフラアトハシリコシテレエキルノニ呂各合ノ子リ但レ
是ラ三種
膏トテア紙木綿芋ニ伸ヘ附ル又堅クメ紅粉ヲ梨子ノノ汁
芋分ラレベモ附ル和ラカニメ能愈シテアトナレ始終既始
ラナスヘシ

又痘瘡ノ餘毒眼中エ流し入り腫痛スル者點茱シ用

ユニレ方別書ニアリ

得竜謂先一條
書中ヨリ寔

痛風

口傳ニ曰惡血ノ滯リタル人必斯尤病ラ作ス風邪ニ感シ濕熱
ラ兼子請ルナリ又表部閉塞レテ尤症ラナス得竜謂是レ偏
ル故ニ其痛ミタケガチレ音ナ氣血風湿ラ疾火ナス既シキ者ハ真病ニ筋助骨ニ宿
虎ナトノ咬ム如ク骨節ラ寒ナ痛ム白虎歷節風ナトニテ真病ニ筋助骨ニ宿
リ節タラノクリ所々ニ痛ム也サレテ腫レハ見工ス痛ムト
強キ故ニ白虎歷節風トスノ治法乳麵散ラ熱湯ニテ
鮮キ痛所ニ附ケ但レ生姜汁ラ加エテイヨノ良シサテ
上引サキ紙ヲ附ル痛ミ速カニ止ムナリ然症日數ヲ經テ
腰物ナトノ如ク脹ミ又破ル者ニアラス唯骨節ノ間ニ走リ
テ痛ムハカリナリ右ノ乳麵散有功奇妙ノ事也

蝦蟆瘧

得竜謂即正宗云疾腮ナリ久温ノ後天時正レカラス感癰傳
深ス止者アリト鷗鷺溫トモニアフ同レ俗ニ江ノハサンココナニ
温病疫病ノ内ナリワケテ云ヘハ咽ノ下腫ルラロジニ頬
ノ腫ルテカドト云アフ同レ物也

口傳曰此ノ疾ハ肝腎ニ經ニ風熱ラ受ケテ厥ル発スル所耳
ノ下ヨリウナニカケ腫ル也蝦蟆ノ首ノ如レ故ニ名附
餘ノ所ハ無キ者ナリ得龍謂入門ニ此ラ
髮癰ト云アト云ア治法最初ニハフラントイ
ニカンフル紅花小茴香ラ加工シル方得竜謂是榮休先人加味ナリ
元末ハアラントイニニ高ア念ミ引ク
ヘレ夫ニテ元散ラスハエシフラストコニイニヨラ貼ス或ハムス
ラキニスニ紅茴香ラ加工子リ合ナカナシレテ貼スヘシ若又根ツ
ヨクハハツハスラスヘシ但レ荆防ノ入ル方ヨシ外ヨリ氣ラム
ツル葉ハアレ、耳中或ハ口中ヨリロチアクアリ其トキ
ハ大吉スナリ

癰疽

得竜謂當流ニテ指ノ病トス俗ニ称スルトヨレツハラミミト云類
入門ノ瘰疽ト云フハ指ノ病ニアラス曰ク一名蛇瘻ト云フ
瘻瘻ノ地ニタクアリ先ツ黒ラアラワレ後テ肉アラハジテ牛
皮ノ如ク硬クナ小サキハ粟ノ如ク豆ノ如ク甚シキハ
梅李ノ如レ生スル旅定ニラス或ハ脣或ハ口中或ハ腹脇外
足ノ指ノ向ニ癰ス赤黑白青ノ色變ナ常ナラス根深ノ
ノ肌ニ入膳日ニ走リ樹腫ノ筋脉ヲツラスキ肉ラタニラシ
骨ラアラハ血ヲ出ス一多ク痛ニシテハ元気スト病源ノ
詭ハ腕疽ニ似タリ曰此病ヲ得ル者ハ指ヲ切壳ル其毒
ノ臓ニ入テシテ恐ルトス此症ラ正宗ニテ考フハ
甲疽代指ノ類也高ニ當田脈ノ瘻疽ニアラス當流ニテ
瘰疽トキハ指ノ病ニテ俗ニ云ツマハラミノトキ流疽
甚タ口旱疽ナリ俗ニ云通シヨキ多ナリ

口傳曰丸ノ腫物半足ノ指ニ生ス形子腕疽ト邊ニ色赤ク無
垂レテシテ指ノ先キ透キ通リ腫レテ艶アルニ治方ムスラ
キカラスラ貶レテ其ハ上ラフラントインカシフルラ不錦ニ浸
ル卷ノ一ス輕キ症ニハカシフル許リニテ元良シス先ニ茅リ
得ニテ養生

等アリ色ツギ大板暖ムト思ハ鉢ヲ刺スシ骨ニ難ニ出来サル故

廉瘻 得竜謂廉ハ腔瘻ニメハキラスル所足ハキ

口瘻ニ曰是レ眸冒ノ温熱ニ因テ癰シ居前ノ温氣ト雨露ノ

氣ニ感シテ癰ス

得竜謂ハキ瘻ハ未瘻ノ類也其ノ論ノ如レ但レ少ニ心得アリ既

既タタクハ歩行ナトテ足胫ニ風冷ラ帶古ラ其ハ、熱キ湯ミ入大縫ナトノ火ニテ急ニア
クシテ又ハ湯熱風呂大縫ナトノ熱氣ラ帶ニタル足ラ歩行ナトメ急ニ寒冷ノ急ニア
ウクトメスカエミ茅出テ夫ヨリ熱ラ癰ソコイカキ瘻ラ生ス春未ノ暖氣ニヨリ
東ハ世俗ノナラヒニツワノ葉油昂等ラ卷キテ温暖シ帶レハ治スルノアリホ
得ニテ養生

又治施可レ

其形チ腫物ナトノ如ク形チラナレテハ出テス而ル痒ク

搔キ破レハシクワ汁出テ口ラ成シ或ハ小瘻ノ如ク吹キ出

シテ元イツモ明キテサレテ深クモナク一二歩ノ向ニメ

肌肉ノ間ラ走ルスノ未瘻トモ云但シ雁ノ未丸時分ノ

氣候ニ感シテ出ル者故ナリ治法ヲウナントニテ先ニ
ハシリコシテレエキルカンフラアトニ味棟リ合シ竜子曰今云綿
ニ伸テ附ルス附葉色々別書ニ出ス栗崎流毛奇方アリ

耳痛 停耳

口傳二曰腎氣足テラスノ腎經ニ風熱ラ感シテ生病ラ
生ス治法寃早ニ痛テ膿ニナラナルトキハフラトキンカ
フルラニ三露ツ、耳ノ中エヘル、又膿十ナラハヘリコシラ
ヨヨリニ附テサレヘルヘヌ立倍子ラ黒マキニレ未ノ油ニ
テナキニ三露落テ附ノマウニトロトヘルニ治スル一音妙
カノスラ、リヨアヘントロラニ三露ヘルヘ神効アリ

凍瘡

凍風瘡モ曰ニ俗ニ亦ハ
雪ヤク霜ハレ等ノイニ

口傳二曰冬ニ寒皮膚ラコラレ血氣メク拉斯寒極ツテ熱
寒ル腐レタルニ及フ甚シキハ指モ落ルナリ治法生姜
タ煎レラウノントカシフル各少ツ、加丘ニシヘレ得竜謂是
モハレ治き若レ上破レタ、レテ膿ラ成サハテキスティイヒラ貼スヌキ
テ甚シキハ瘡疽ノ治法同シ竜子曰是レ俗ニ云
雪ヤケノ治法ナリ

灸瘡

口傳二曰灸瘡ハテキスティイヒラメイナヤニスリ附上ニテ
ヘニスイフニラ蓋フ又灸火ノ毒ラ拔クニハテレエキルラ貼ス
ヘシ竜子謂灸後其トテヒキルラヨレハ灸瘡ニナラス火ホトウクモナクイホウス
コロヨクメ毒ラヌクモナリ

湯火傷

口傳二曰治法テキステイヒカンフラアト各茅翁ニ合メ綿

伸ヘテ貼ス若レ皮上ニ水フケレナトアラハラニセツクミテ

切り破リ膏茉ラ貼スヘス遍身ニ破フリタルハ膏茉ラ

遍身ニ六附カクナレ両頭夫竜子曰附子ヲ兩頭夫ト云エモ
日乃異物ナリ光ニ氣薰ニ云 取リ又葉ト

各等分ニ黒ヤキニシ捻リカケサテツヨクト痛ハ黒ヤキヲ捻

リカケタメ上エテキスカンフラ合方ノ刺ヲ附ル友山先生白

名古屋玄意ノ秘方牡蠣ラネメ胡麻油ニテトキ附ル妙ナリ

回春ニハ香色ニアフリコカストアリ竜子曰酒ノカスノ黒燒ナ
燒附子ナリ附ル妙ナリ 金瘡書

中三曰竜子曰此并 燒所深ノ火毒皮肉ニ入黒色アルハ平針ニ

皮肉ヲ搔キ破リ黒血ヲ出シハシリコンニヘレシヒナルテ少

少加人平メイチヤニ塗リ自ケ蓋膏茉テヘシスイフシラ附ケ

黒血ヲ去ルヘシ黑色サリテ後ハインケエントアトストン欣カシ

オアマト欣ラ附テ愈スヘス茉方品々別書ニ見エ土集三出

打撲

口傳ニ曰高キヨリ或ハゴロヒ或ハクジケ或ハ物ニウケレタル

茅ニ先ツ焼耐ニラ、リヨロサアロンラ、リヨレリヨウロン

ノ類ヲ三歩加エ強クアクト、ナホツレ或タヽミ木綿ノ類ニ

ヒクシレ痛所ラ巻キ置クヘス指ナトラ坤レ屈ケルホト

ノカロキハ引ナラレテヘシスイフシラキヘス袋折レナラハ

折レタル所ラトクト引合セ骨能ノ合ニタルカ合ハサルカラ

手ニロサアロンレリヨウロンノ内ラ見合セヌリラキテ膏茉

ラ貼ス又服ニモスルヘス強キキ身ニハ右ノ如クシ丸上ラ

ラ貼ス又服ニモスルヘス強キキ身ニハ右ノ如クシ丸上ラ

醋木綿三テ卷キ竹ノ葉カ柳ノ枝ノ實ニテ卷キ其上木綿
ヲ強クスヘシを日々如此療治スヘレ師說曰撲ナ身ニハ
フラントイシカンフルラ用ユヘカラス意味ハ身ト云ノ者内
ヨリ傷レ出ル物ニアラサレハ樟腮ノ香氣ツヨク肉裏ラ
クル刺アシ打身ハ兔角寒、冷ノ刺ラ以テ瘀血ノ熱ラス
スレムレ得竜謂赤身其て、療治セハ寒冷ラ用ニテ無熱ラサニシ瘀血ノ集ルラフセ
意ラ以テ新古輕重ノ後リ集リケル瘀血ラ消散スルニ温熱ノ刺ト宣ニ獨此
見合アル可キカ内外某方アリ別書ニ出ス

諸虫獸咬傷

口傳ニ曰真蛇ノ喰ナル其毒内攻スルトキハ人ラ殺ス急
ニ真喰口ラ針ニテ切り破リ毒血ラ出シ其ハ跡ラ燒附ラ
タキラセ針口白クナナル程ナテアラニカニラアトニ丹巻

火燒キ返シラ加工貼ノ毒氣ラ拔ヘレ

崩毒諸虫六毒治法元右ニ同レ又鳥賊ノ墨入塗リノ痛
ク去ル友山先生ノ曰夷堅志ニ往山寺ノ僧蛇ニ破テニ百葉
効シアラザリシニ白芷ノ末ニ丹巻ト麝香ラ少レソ、加エ
テ摺リ塗リノ水出テ愈ナリトニハ方極テ効ア

獸物ニ喰レタルニモ右ノ如ク燒耐ニテ能ク洗ニテキステヒ
ラホツレニ付ケ貼レ膏茱テヘシスイフシ良シ但シ強ク
喰レタルハテキヌテイニ雞十黃白共ニ大ニ交セ合シ右
ノ如クニ附ル風大傷云同斯ニ又無甚レク腫レ強ク久醋
木綿ニテ卷キラクヘレス骨ニアナリチラハゆナレノテ

キスティイヒラ貼スヘレ
童子日是^ミ骨油ヲ又亂ノ咬毛ニ荆防
忌ム故ナ

童子曰是^{アシテ}骨油ヲ又胤ノ咬毛ニ荆防
忌ム故ナリ

敗主母散ニ見田ラ大ニ加工テタナク用エヘシ景帝不日巨大修即時人屎ヲ以テ患上ニ塗リ又以一握条其上敷壯患者覺熱痛徹底惡血走リ山凹ス凹し盡ルラ皮ト刀清血出ルトキハ止血内ニハ消毒剤宜し右ノ方救人三人甚シ驗アリ

第一卷 陰集四十三類終

時寬政十年五月廿一高木魯安寫

予故嘗行西山間。因與其游者一通音。或以酒
飲之。豁然忘形。無不醉。因以是號。蓋其醉
也。猶牛氣。以是名也。每以爲可。人有問者。

