



494.2  
OT-17  
2

多木道彦著  
楠林先生正派外科法 卷一

阿蘭陀流  
外科法

陰集

第一

No. 19



富士川文庫

3066

阿蘭陀新傳 楠林先生正流外科法 仕掛 陰集序一



末第得龜子岩永道房甫 謹寫

榮休先生曰夫阿蘭陀外科之術徃昔先輩雖傳授勤行之似難得於其妙恐不定主意謂欲因弔今舉其為綱領者一二以示門子夫依之宜入室

○瘻疽

瘻疽ノ治法古今諸流ノ說マチノクナリ然レ凡其術心ヲ要シテ功ヲ積マバ其理ヲ極ムベシ

「癌ハ瘻<sup>ヤウ</sup><sub>ヤウ</sub>ナリ六腑ニ属メ陽症ナリ其病暴ニメ患フル所浮テ淺シ  
蓋シ陽氣ハ軽ク清ム浮テ高ク起ル故ニ腫レ易ク膿ミ易ク腐リ  
易ク收リ易シ

「疽ハ疽<sup>バク</sup><sub>バク</sub>ナリ五臟ニ属メ陰症ナリ其病緩ニメ患フル所沉シテ深シ  
蓋シ陰血ハ重ク濁ル故ニ筋ラ傷リ骨ラ蝕シ其後外ニアラワル  
「夫」癌疽瘻瘍ノ病ハ都テ外科ノ主ル所其肯趣ラサグラズ其是  
非ラ知ラズシテ其理ラ明メ得ルトアルベカラズ凡人身陰陽五臟六  
腑百骸榮血衛氣日々周リ流ヒテシバラクモ間断ナキ時ハ無夏ナ  
リ是レニ及スル時ハ百病生ズ又表エ發スレハ諸腫瘍ト爲ル

「癌疽發背ノ生ズル一朝一夕ノ故ニアラズ或ハ水火ノ升降正シカラズ

七情ノ氣鬱滯シ六淫相ラカスニ因リ或ハ膏粱厚味ノ飲食ラス  
ゴシテ脾胃ニ湿熱ラ起シ臟腑ラ薰蒸スルエエナリ其候或ハ半年或ハ  
一年天氣ノ陰晦ニアヘ心身清晴ナラズ或ハ頭痛眩暉シテ飲食味亡  
ナク或ハ眠乞ナラズ脊中スハリヌハシビレ或ハ發熱惡寒シテ氣鬱  
ツトウシク溌カラズ或ハ心神勞倦シ飲食少クナクスハ譖語ス発スル  
所多クハ脊骨ノ通リ左右太陽膀胱ノ經風門肺俞膏肓月肝膽  
ノ俞脾俞腎俞等ナリ

「瓦癰疽發背等ノ大瘻ラ見ルニハ先ツ心ヲ定メテ瘻ノ形ヲ見ヌ病ミ  
始メヨリノ日數ラ問ニ又病人ノ虛實老壯ラ考エ見ルベシ此ノ三ツノモノ  
相應スルトキハ善シ相應ゼザレハ惡シ症ナリ次ニ病ノ根元何レノ臟

腑ニ發リ其生ズル所何レノ部位ニ掛ルト云フヲ考エ又氣候ノ順逆精神ノ有無其人ノ氣血ノ盛衰其瘡ノ虛實ヲ辨メコレラ治スル時ハ多クハ錯リナカルベシ左脾胃ヲ傷損スベカラズ故モナクシテ寒涼ノ剤ラ用ニ脾胃ヲ損シ  
スルノ類ナリ專  
ラ和解ノ剤ニ宣シ

「阿蘭陀人曰瘻疽ト云フハ陰陽ノ別ナリ又人身周流ノ氣血清濁凝滯メ諸瘍生ス治モ亦是ニ從テ論スル所ハ氣血ノミナリ蓋シ阿蘭陀人陰陽ノ說ハ異ナリ五行モ金ラ除テ四行トス其說曰金ハ聲音ラ主トナリ五行ノ臺語ハ医卒ニ出ス又血ラ四ツニ分テ別ニ治方ヲ為ス得竜齶血ラ四ツニ分家傳ラ以テ補又純陽ノ症アリ純陰ノ症アリ陰陽相半スルノ症アリ之別傳トス

### 是又詳カニスベシ

「凡初發ノ形チ粟米ノ如ク漸々大豆粒ノ如ク時々痒ノ時々ハ痛ニ時々ハ痛ニ其色赤シ又大ニリテ伏盆ノ如クニナル先ツカヅラスマラ用ユシ但シロ明ノ迄用ユ古仕掛ノ書ニ此所ニカヅラスニニ方アリ共ニ水集ノ本ニ集ニ表蒸温熱蒸是ナリ其後エニラストデヤキロニコムゴムスラ貼ス如是スルトキハ腫レ高ク起リ指ヲ以テ腫上ヲ押スニシホミ其マカエルトキハ内ニ膿アリト知ベシ其マカエラズニバ膿ナキナリ再びアシグエントバジリコニラ平メイチヤニ伸ベ貼シ上ヨリヤキロニコムゴムスラモ綿ニ厚ク伸ベ貼ス但シ氣ラケント思ハズラギ又疊ミモ綿ラ以テ巻キ置ケシ在此タミモ綿ハ寂テスラ加エ交セ合スヨリ用テ別メ良シ是ノ後膿有ルトラ知ラバ針ニテ切り破フリ膿ラ出シメ

イチャニシリコシラ伸ベ針口ニ付ケ但シ針ロサクハコスラギニテスラ  
セシメイチヤニスベシ  
蓋フベシ此ガスラギハ痘カ又羊陽ノ症ニ如是ニメ毎日膿ヲ排スベシ若シ腐肉  
努肉アラバジリコシニレシ用キシ余テレキステレキル良シタルラ交セ合セ貼ス又腐肉努肉  
カ、リテ毒氣深ク閑ヅルニ依リテ臭氣アラバ右ノ内エイケヒ  
ヤコシラウシ加工メイチヤニヌリ貼ス右ノ如クシテ漸々腐肉努  
肉モ去リ膿水モ減少セバウメントラ以テ歛サメ愈スベシラウメ  
ニトニイケビシヤコシラ加工テノを良シ但シ終リマテ平メイチヤノ方ヨシ大  
抵愈比ニリ正肉モ上ルギトキハジリ  
ヨラ引キラウメニトニイケヒシヤコシ  
ラ合メイチヤニヌリテヨシ

榮作先生曰初メ先ツ天蒜ラ隔テ、瘡頭ニ灸スベシ病人アツキ  
コラ覺エバガツラスマハツハ  
ストモ用ニシヌアツカラズニバ直キニ灸ラム

其後コスラギニラスニ紐花小茴香ノホラ交ゼ合シ厚ク毛綿ニ伸ベ  
瘡上ニ貼シ又頻リカツラスマラ用ユルトキハ温散スベシ兩三日モ如  
是シテ瘡勢ナラ退カズシバ治法前ノ如クスベシ

疽ノ治法モ大抵ハ瘡ニ同フシテウシノ異ナリ疽ノ症タル氣尠メ  
飲食進マズ脊強ワリ皮膚燥キテ淡紙ノ如ク腫レ平陷ニシテ  
紫黒ラ帶ビ按シテ痛マズ痒カラズ時々ハ痛痒キモアリ俱ニ先ツ  
カツラスマラ用ユヌ直キ灸モ良シ但シ昼夜  
三度ス如是スレドモ色モ變  
シ腫レ増サバ針ラ刺スベシ針刺スニ極陰ノ症ニハ腫物表エアラハ  
レテ兩三ノ内見合セシカト膿ニナラズトモ刺スベシ膏ハジリコン  
キレシヒメアルラ加工針口ニ付ケ但シ腐肉アラバ瘡切ニテ切リトリ焼金  
ラアテ平メイチヤニハジリコシニレシヒタアル

ニ味ラ交合上ニテヤキロシコムコムスムスラギニラス等分ニ交セ合セ  
モ綿ニ伸ベ蓋フ又日日カツブラスマラ用テ腫物ニ陽氣ラ含マ  
スベシ但シ瘡疽ノカツフルスマハ極温刺ラ以テ如此スレドモノハ惡臭甚シク  
瘡色紫黒ラ帶ビ穢水流レ出ルモノハ極陰毒氣甚シトスバジリ  
コニキイケビシヤコシラ加工瘡口ニ貼シヌヲウメントラホツシニ浸タシ  
貼シ龍謂此ノラウメント數方予ガ上ニテヤキロシコムゴムスムスラギニブ  
スノニ色ラ交セ蓋ブベシ如此治ラ施メ瘡形滋ラ生ジ但シ此比ニモカツフルス  
マトコムコムス止々カラス食進ミニ便共ニ通メ安卧ラ得平愈ス其外治法  
多端ナリト雖ビ書曰ラ以テ尽シガタシ尚口傳ラ受クベシ  
瘡疽ノ生ト死ラ知ルハ

瘡形高シ起ル者ハ善ニ症ナリ

瘡形平福ナル者ハ惡ニ症ナリ

潰テ後チ氣分昂タタル者ハ治シ易シ

腫高ク焮熱スル者ハ腐リ易ク正肉ラ生シ易シ

元氣善クシテ善症モ多シトイエドモ膿汁惡臭ラナシテ近ヅ

キガタク飲食モス、マズ大便濁シ小便淡ブル者ハ死ス

瘡色猪肝ノ如ク紫色ニメ膿汁カワク者ハ死ス

仰卧スルト能ズ痛ミ痒ミラ知ラザル者ハ瘡疽ニメ治シ難シ

形容肉脱シ目ニ神ナクウツトリトス弊者ハ必ス死ス

陽病ニ陰色ラ見シ手足ノツメ青色ニ陰病ニ陽色ラ見ハシ

腮顎ニ紅色アリ此ニツノ者治シ難シ

瘡中腐肉尽キ生肉揚ルトイエドモ

此ノ生肉ハ内ニ形板片ノ如クニ  
水ヲ含ムガ如シ形板片ノ如クニ

飲

シテ

片板トハ生肉ノ善キハイチゴザクロノ如クニ  
見ユ此ノ生肉ハ板ノ片ゲタル如シ真ノ正肉テナシ

其食進マザル者ハ必ズ

壹ニ症イヅルモノナリ

身熱シテ脉細ニ

身熱ノ脉ハ弦數ナルガ  
頗ナリ細ラ見スハ惡シ

唇青日ノ及リ目ノ珠直視ス

ル者ハ必スト死ス

衣ヲ指テ床ヲ探リ遺尿禁ゼス撮空スル者ハ死ス

汙出テ珠ノ如ク流レザル者ハ死ス

右ノ類ノ惡症ナキ者ハ治スルナリ惡症少ナク善ニ症モアルモノハ

治法養生コテ生モト死モアルベシ

二

○心疽 井疽

心疽ハ中庭膿中ノ部位井疽ハ鳩尾巨闕ノ部分ニ生ス名ラ  
別スル者ハ其ノ出所ラ異ニスル故ノミナリ其ハ病因ハ心火忘リニ  
動テ陰分ノ精液ノ汁虛シ損スル故ニ生ス生ズルノ初メ嫩<sup>ツウナ</sup>  
ヤワカ色赤ク腫レ高メハ治スベシ又堅硬<sup>ケンカウ</sup>  
カタシニシテ色紫黒ク腫高カラザル  
者ハ治セズ又動氣強ク衣ニ徹スル者モ命且暮ニ有リヌ腫ノ形  
チ大豆ノ如ク漸々大ナリ皮ノ色常ノ如ク頻リニ痛ラ覺エ  
又按スニ熟シ柿ノ如クニシテ底ニ徹セバ如是者ハ潰テ後膿水  
流レ出テ止マズト死ス治スベカラズ

阿蘭陀人曰此ノ症治法ハ先ツメラアヌスコメリクリヨムラモ

綿ニ伸べ腫上ニ貼シ板鉗<sub>板鉗ハナマリラ板ノ以テ蓋ニモ綿ラ捲キ</sub>テ是ラ消散スルナリ若シ散ラズニバ温散ノ剤宜シ<sub>タラヌスハムスラギニテスヨシ且ツカツフラスマラスベシ。別書如是シテ散ラズニバ</sub><sub>冷散ノ剤ナリ</sub>温<sub>温</sub>和<sub>和</sub>熱<sub>熱</sub>如是シテ散ラズニバ症ニヨリテ膿ムラ見極メ針ニテ破リメイチヤニジリコニラ塗リ針口ミ刺シ膿ラ出スベシ膿大半<sub>半</sub>出テ後<sub>ハジリ</sub>コニラキス<sub>テ</sub>イジアホストロウロン三呂谷等分ニ交ゼ合セ<sub>タ</sub>イチヤニヌリ瘡口ニ刺シ上ニアハラニテアホニホリコスオホテニトノ類ラ以テ見合セ蓋フ左疊ニモ綿ニテ巻クベシ腐肉アラハジリコンニ<sub>アレシピタルラ</sub>加工腐肉ラ流ス如是スレビ腐肉流レズ紫黒色ニナラバ燒金ラアル其外ハ大抵瘡疽<sub>疽</sub>治法ニ同シ此ノ<sub>止</sub>症ノ甚シキ者ハ腐肉タドレ流レテ止マス疼痛至テ強ク大便溏泄シ小便秘滯シ且ツ発スル所臓腑ニ近キ者俱ニ治シガタシ慎シテ輕易ニスベカラズ<sub>此ノ治方</sub><sub>ハ症ニヨリ</sub>観合アルベシ散レハヨケレ共<sub>ラ開キテハタクハ治セズ</sub>

## 三

## ○肺瘡

## 肺痿

肺瘡ハ金ニ火刑ラ受ルノ<sub>止</sub>症ナリ夫レ人自身ニ風寒ラ感ジ未ダ發散スルヲラ經ズ其邪肺中ニ留リ停リテ是ノ患ラ為ス其候モ聾ヘテ風ラ惡ミ咳ノ中ニ膿血痰入り吐キ其氣甚臭徽声重ク胸膈<sub>隔</sub>痛シ頂コワリテ轉側シガタノ鼻清涕ラ流シ甚シキハ胸脇脹滿シテ呼吸利セズ飲食減少シ寒

熱往来シ形容ヤセラトロウ音声カレ咽ノ中腫レ痛ム

又肺瘻ノ症モ大抵是レニ似タリ治法モツバラ肺金ラ清フスベ

シ此ノ病百ト死ニメ一生ノ症ナリ宜ク詳カニ治ラ施スベシ

人内治ハ内茱方別書ニアル是ラ用テ効ナクハ予ガ家方別書ニ骨月茱方アリ是ラ用ユベ

シ若腫レ外ニ現レ出テ皮色変シ肋骨四五枚ノ間焮痛メタエガタ

キハ膿アルベシ若シ膿アルラ知ラバ針ラ以テ肋骨ノ間刺シ破リ

膿管金銀ニテコシラヘタル  
管ナリ壺ニヒイハ云ラサシヘレ膿ラ導ビシ如是シテ膿漸ヤク

減ラバ洗藥ラ以洗ヒ灌グベシ洗茱ノ方別アリ是レニテ毎日洗フ一兩度

ツシテニイルラサシ綿ラ蓋ニ上ニ立シラストメリロウトラ付ル又

一兩日ラ經テラレムステレギル或ハニアハルマ或ハニスイブシノ類

ラ見合セ點ス針口肉上ラバ刺シ茱別書ニア  
肺刺茱ライテヤニヌリテ刺

スベシ榮休先生曰肺瘻肺瘻ノ症ハ至テムツカシキ者ナリ其

人ノ**癟**ウツノ強キト弱キト腫瘍ノ虛ト實トラ詳カニシテ以テ

治ラ施スベシ尤輕易ニスベカラズ其理ラキワメズシテ治ラ論ズハ

眼無ノシテ遠キ足無ノシテ高キニ登ルニ似タリ慎ムベシ

#### 四 ○腹瘻

一腹瘻ハ情慾ラ過シテ火鬱シ脾虛メ成ル其初メ惡寒欬嗽シテ

腑ノ四邊漫腫瘍ハレズシテシテ色赤キラ陽症トス治シ易スシ腫ノ形

堅硬ニシテ色ナク時ニ痛ニ或ハ痛マサルラ陰症トス毒深シ俱ニ先ツ

司ヤコミイヨラ附ケ又カツフラスマ。<sup>温</sup><sub>和蒸</sub>ミテ温ベシ如此スレバ散ルナリ  
若シ散ラズニバ腫ノ勢に減ニゼズ增長ゼバテヤキロシコムゴムスラギニテ  
スラレムステレエギルノ三品各等分三六入せ合シ瘡上ニ蓋フ但シ瘡ノ正中  
ハジシリコシラ平メイチヤニスリ引キ揚グベシ如是シテ潰膿セバ後ノ治  
法瘡疽同ジ若シ治ラ誤マレバ毒淹ホリテ漏症トナルナリ臭氣甚  
出ヅ此時少ウメントニエケビシヤコシラ加工洗フ或ハ形チ翻サ化ノ如キ  
者生ジタドレテ臭氣強キ者ハ燒キ金ラアテ、燒キ取り其アトハ  
ジリコシニエシタアルラ少シ加工六入せ合シ平メイチヤニスリ貼スベシ腐肉  
脱シテ正肉生ゼ、釜銀芒ノ蜜<sup>十夷</sup><sub>五分</sub>枯<sup>五分</sup>卷ラ交せ合シ付久シ愈肉八九  
分滿ルトキテヤハラマラ貼メ皮肉ラ収ムベシ

五 ○ 襲瘡 水仙

裹瘡ハ陰氣ノ虛濕熟囊中ニ流レ注デ成ル其初メ<sup>ゴウク</sup>罩<sup>キヤシ</sup>丸赤ク  
腫レ疼痛惡寒シ發熱メ大便秘シ小便淡ブリ或ハ飲食進マズ其  
症マチマチナリ内治ハ陰ラ滋ホシ湿ラ滲ラスノ剤ラ投ジ外ニハ先ツ  
ヤコミイヨラ付ケ是又湿ラモラシテ消散スルナリ若シ腫レ硬ク焮痛  
シテ小便閑ヅルモノハラ、リヨソクス子ラ、リヨゼ子エブル各等分六入セ  
合セ滾湯ヲ以テ十四五滴用ユ或ヒトランクス子ラ用テトラハ煎汁ソ  
如是シテ小便通ズトイエトモ水腫未ダ消ゼズバカツフラヌマ。<sup>別書ニアル</sup>  
ラ用ユベシ是レミテ消セズバ。別書有<sup>裏ニシテ</sup>ラ以テ蒸スベシ如是シテモ散ジゼズバ  
スラギラスニヤキロシコムコムスノ類ラ貼メ引キ上グベシ若シ膿ミツイエ

ハジリコシラメイチヤニヌリ付ケ腐肉臭氣アラバヨウメントラ以テ洗  
ヒ或ハジリコシラレシビタルラ加工メイチヤニヌリ瘡口ニサス上ニオレムステ  
ヒエギルラ付ル又罩丸縮マリ筋ニキツリ疼痛囊ニ入忍ビガダソ外  
皮破ブル者ハ洗茱別書ニアル  
裏瘡洗ラ用ニ膿アラバハジリコシラメイチ  
ヤニヌリテ付ケ蓋膏月茱ラ付ル毎日如是或ハヨウメントミテ洗  
ニヌメイチヤニタシ瘡口ニ刺スベシ

又一種水疝アリ陥囊大キニ腫レ痛ニ色光ルトイエビ熱ゼザルモノ  
内必ス水アリ其所工針ラ刺ス破ブリテ水ラ出シ針口ニ膿管金銀鉈ヲ  
ラヌリテサシ水氣ラニクベシ此ノ症ハ他ノ腫瘍ト異ナリ膿管金銀鉈等ニテ  
コシラエタル管是ラ龜井桶ト云ラ刺サレバ瘡口閉デ易シ其上ラズラ  
フ蠻語ニイルト云蹠ラヌル

ントインカニタルラモ綿ニタシ巻クベシ或ハ生姜姜汁ラ熱湯ニ和シ  
毛綿ニタシ巻キ置クモヨシ右ノ如クシテ後腫勢漸ク退キ膿  
水無キトキハ龜井桶ラヌキ去リ愈ス

## 六 ○懸瘻

懸瘻ハ濕熱結レ聚リテナル其初ノ前陰後陰ノ間海底ノ穴會陰  
ニ生メ大サ蓮子ノ如ク漸ク大ニメ桃李ノ如ク赤ク腫レ痛ニ痒ニモ  
起リ甚シキトキハ惡寒發熱シロ喝キ咽カラビ大便道ラ破フリ陰  
囊ヘル内治ハヨトラソクス子ヨリヨアマンドロラ十四五滴程ヅ、一度  
ニ温湯ニ點ジ服スベシ外ニハタラヌスコメリノク

リヨムノ類ラ撰ニ用ユ是ニテ温散スルナリ若シ散ラズシハ隔蒜灸  
カツフラスマラ別書ニアル  
發表蒸用ユ是レミテモ退カズ痛ヲ為サバコスラギ  
ニデスヨヤキロニコムコムスエニテラストバジリコン以上三品各等分ニテリ  
合セ付ル三五日ラ經テ内ニ膿アルト考エ知ラバ平針ラ以テ切り破  
リ膿水ラ出ス其後ノ治法瘡疽同ジ此ノ症多クハ虛損ヨリ生ス  
内茱別書ニアル攝糞ノ方ラ用テ補フベシ

七 ○ 脳疽

「脳疽ハ垂ニ對口瘡ト称スル是レナリ俗ニクビ切  
瘡トテア病因ニツアリ湿熱  
コモゴモ蒸々外ヨリ受テ外ヨリ生ルモノ淺シ氣血五臟ニ溫結メ  
内ヨリ生ルモノハ深シ外ヨリ熏ケル者其患初發ヨリ頭アリテ  
督脈脉經ノ正穴ニ生スル者多シ三四日ノ間焮腫腫物ハレテ外ハ  
火是善惡リ疼痛  
シ寒熱往来アリテ口乾キ瘡色赤ク根脚分レ時ニ痛ニ又痛ニ止  
ミ膿ミ易ク潰易ク飲食立チ居トモ常ノ如クナルハ陽症ニ正氣  
毒氣ニ勝ツユエニ治シ安シ又内ヨリ成ル者ハ其源深ク毒氣發スル所ノ  
形初メ杏仁ノ如クスハ木橐子ニ似タリ腫色紫紅メ白泡ラ帶ビ氣  
齒々トメ飲食味ナク疼痛忍ビガタク瘡乾キテ滑カナラズ是レ陰症  
ニ正氣毒氣ニ負クユエニアヤウシ能ク陰陽虚實ラ考エテ治法ラ  
施スベシマツ初メ蒜ラヘダテ、灸シ膏ムスラギニテ貼ニカツフラ  
スマ別書ニアラシテ温メ散ラスベシ如是スレビ三五日ノ内瘡勢減ニゼズ

潰爛ラ催サバ又ツヨク隔蒜灸ラスエハシリコニラ平メイチヤニヌリ  
瘡上ニ付ケヌヨヤキロニラムゴムスラギニテス各等分交ゼ合セ是ラ  
蓋フスガツプラスマ別書ニアル  
發表蒸ラ以テ温ム如是シテ膿成ルラ知ラバ針  
ラ以テ腫頭ラ穿牙ナ破リ膿ラ出ス又隕症ノ腫物腐肉多クシ  
テ根脚走散スルモノハ燒金ラ以テ燒キ或ハ坊リ取リヨシリコニヘ  
ヒニタルラ加工付ケ蓋膏茱ハ同前如是シテ腐肉尽キバ翁リ  
ヨシリキスティピラ加工平メイチヤニ伸ベ貼又愈スベシ大抵六七分ホ  
ド愈テ後ラウムトミテ洗ニ平メイチヤヌルロアロニラ浸シ付ケ  
フレムステレギルラ貼テ収ムシ頭辺ハ都テ骨ニ近シ骨ニ油ラ付バ  
肉カラズ油膏ラ大ニ忌ム此トキハ無油ノデキスティビラ用ユシ無油  
ノデキ  
スラ用テ骨ノ油ラ去バ無油ノデキスティイビカリヤス共ニセ巻水集ニ炭ス

八 ○ 鬚疽

○ 鬚疽ノ生ズルヤ性情暴急ノ人房慾ラ過シ血虛相火動ジ肝氣凝  
リ結ニテ成ル其發スル所足ノ少陽膽經ニカル其初メ寒熱コモゴモ  
作リ頭目クルメキ疼痛脳ニ徹ス甚キトキハ耳目鬚髮ニ連リテ腫  
ハ外ヨリ初発妄リニ針灸ラスベカラズ先ハツ大蒜ラ隔テ、灸ラスエ  
タヌスコメリクリヨムラ貼メ冷散ス尚ラ効シアラズニバムスラギニテス  
紅花ノ末ラ子ナリマゼテ付ケ温散ス如是シテモ効シアラズ腫勢  
妄

増サバヌスラギミテスデヤキロニコムスニ呂等分ニ交ゼ合シ貼ノ引キ  
揚グベシ如是ニメ後膿アルヲ知ラ針ミテ切り破ブリ膿ヲ出シメイ  
チヤバジリコンラヌリ針口ニサシ上ニデヤパルマフレムステレギルノ類ヲ蓋  
フ其外治法瘻疽同ジ阿蘭陀内治ノ方アリ別書ニ出ス。五卷土集

## 九 ○ 痘疽

紅糸疔

紅線疔トモ

疔疽ハ四時節候ノ寒熱肅殺ノ瞬息或ハ臟腑ノ乖逆其邪  
毒感ズルニ因テ成ル又飲食ノ毒ナリ是レ外科を迅速ノ症ナリ  
朝ニ發イタニ死シタニ發メ朝ニ死ス生スル所ニ從テ名状タシトイエ  
モ多クハ面部四肢ニアリ生スル形一ツナラズ或ハ粟米ノ如ク又ハ大豆

ニ似タリ瘡色赤ク又ハ紫黒ラ帶ブ其ノ腫凸キアリ凹キアリ寒

熱往来咽乾キ或ハ四肢麻木ノ痛ニ痒ニ定マラズ重キニ症ハ頭目  
暈憤心煩發躁シ譴言ニ女語シ胸膈ニ痰端シテ氣息急速ス捷  
法ラ以テ頑痰ラ吐スベシ或ハ頭痛ニ惡寒發熱メ其状傷寒ニ似タリ  
汗ニ内某ニテ表ラ開キ汙ラ発スヘシ外治ハ蒜ラ隔テ腫頭ニ灸スルト  
六七壯ニスラギミテスニ乳香紅花小茴香ノホラ増シ加工合メモ綿ニ伸  
ベ付久シ或ハ症ヨリ例ノ如ク平イイチヤバジリコンラヌリ付ケ上ニデヤ  
パルマデヤホニホリコスガラサデイヤノ類ラ撰ニ用テ是ラ蓋フ既ニ膿  
トナラバ針ラサシ膿ラ出シ其アトニ白膿ノ堅キモノ有ラバ拔キ去リ

其後瘡口エバジリコンデキスティイビ各等分メイチヤミヌリサシ蓋膏

前ノ通リ

紅糸疔ノ症熱甚ノ紫黑ノ筋脉縱横ニ散乱スアリ別ニ治方  
アリ但シ一筋ニ二筋ノ者ハ其ノ傳フル所禁穴ヲ除キ平針ニテ切リ破リ  
毒熱ノ血ヲ出シ針口ニ腐リ茱ラ付ケ余毒ヲ取ルベシ疔ノ生ル所ハ治  
法常ノ如シ若シ治スルト遅ソケレハ毒氣腹入乍キハ人ヲ昏乱シ心ミ入  
乍キハ死ス

都テ疔毒起發ノ後心ヲ用ユシ危急二三日ノ内ニアリ既ニ然去リ瘡  
モツイエ膿水剝化セバ治法諸腫物ニ同シ

十 ○ 脱疽

脱疽タ生スルハ平常厚味膏肓梁ラ食スル人其ノ食毒臟腑ラ  
薰蒸シ或ハ房事ヲ過コシ虛火虚腎水<sub>火</sub>ヲ消燬シ或ハ房術ニ丹石  
諸茱ノ熱剤ヲ用テ精汁ヲ渋ラシ熟毒ラ臟腑ニ蘊蓄メ終ニ熟火  
ノ病ヲ生ズ其毒久シ骨髓ニ積ニテ此ノ上症ラ爲ス其患手足ノ指頭  
生ズ蓋ニ指ハ五臟ノ枝幹ナリ得龍按スルニ指ハ五臟ノ枝幹ニシテ全身ノ骨ノ  
骨髓エシニコニ居テ其虛ニ乘ノ骨端ノ手足指頭ニ癸スルナリ病熱火毒久々五臟ニツニ毒氣  
六朝一タノ病ニラズ其源フカケバ人ヲ殺スノ速ナルト宜ナリ  
ノ如ク黒氣浸漫シ皮裏ヨリ相傳ヘテ肘又ハ脚ニ至テ疼痛烈火ヲ以  
テ燒クガ如シ治法先艾ラ以テ直ニ灸スルト數壯コタユルヤ否ヤラ問ニテ  
熱スルラ覺エズニバ利刀ヲ以テ毒ノ深キ所ラ切り割クベシ尚イヨク  
黑色減ゼズ腐勢止マズニバ指ノ節ノ所腐肉ト正肉トノ界目ヲ能

ク考エ利カラ以テ切り落スベシ其跡工焼金ラアテ、イケビシヤコニラ平  
メイチヤニ塗リ貼シテベニスイブンラ以テ蓋フベシ是ニテ大畠膿ラ為サ  
バジリコニテキステイビ合等分交セ合セ貼スベシ或ハ毒氣傳フルト深  
ク黒腐止マズシテ肘脚ニ至ラバ又利カラ以テ豎テニ切り割リ毒血ラモ  
ラシテ勢ニラ減シ切ロエメイチヤニイケビシヤコニラ塗リ貼ス又醋ト燒耐  
オ等分ミ交ゼ温メモ綿浸シ巻キ置クベシ如是ニモ尚痛ミ退カズ正  
肉ラ追フテ黒ク腐リ行カバ又利カラ以テ正肉ト腐肉トノ間ラ考エ  
細キモ綿ラ以テ堅ク縛リ邪肉ラ切り取ルベシ骨ハ鋸ラ以テ引キカル  
ナリ血出デバ燒金ニテ燒キ苗メバジリコニミイケビシヤコニラ少シ加工交ゼ合  
シ貼ス毎日如是シテ黒腐止ミ正肉騰ル者ハラウメントメルロサアロンラ

十一

○附骨疽

附骨疽ハ陰寒、骨ニ附クノ病ナリ、或ハ諸腫瘍久シク愈エス、其  
毒骨入ルモ亦此患ラ爲ス其因ツナラズ、夏秋ノ比暑ラサケント  
テ冷ル所ニ露ワニ卧シ寒、湿ノ氣内ラ襲ヒ或ハ房事ノ後罩ヘ薄

キモノラ着テ寒冷ノ氣虛ニ乘メ裏エリ或ハ打撲傷損メ瘀血久シク散ニゼズ留結メ癰ラナスナリ甚キ者ハ屈伸轉側スルアメワズ久シクシテ陰臺シテ陽トナリ寒化メ熱トナル熱甚シク骨髓ラ絡ニ蒸メ癰爛スルナリ或ハ癰疔結毒ノ類鹿エ治シ誤リテ瘡ズ湿毒藥毒筋肋骨ミヘツテ癰爛年ラ超ユトイエビ効ラ收ムト能ワズ其症或ハ痛ミ或ハ痒ク其形凸ニ腫レテ是ラ按セバ硬キノ如ク或ハ痛甚シクシテ外色ハ常ノ如ク其皮平カニメ敲ラ推ス如ク或ハ皮色淡クシ紅黄ラ帶ブ凡此瘡多ク脛股ニ生シ行歩ラサマタグ外治ハ先ヅカツフ拉斯マ別書ニアル  
温和開結ラ用ニテ温散スベシ若シ効シナクニバ外ノ温散ノ剤ラ考エ用ニシ膏葉モ同斷如是シテ尚腫レ消セズ痛心ヨカラズ

内ニ膿アルラ知ラバ輕キ症ハ針ラ刺メ膿ラ出シ大抵後ノ風毒腫ノ治法ニシタガウ重キ止症ハ利刀ラ以テ切り閑ノイ骨ニ至リモ綿ノホツシラ以テ其切リロニ埋ミ入レ疊ミモ綿ラ上置キス卷キモ綿ミテ巻キ縛レベシ次ノ日ニ至テ右ノホツシ等ラ取り除ケ膿ノ浅深ニ量リ見ナリ若シ腐リ淺ノバ骨捌道具ノ名ラ以テ腐骨ラ能クノく捌ゲ除ケゴムイホリヨム得龍謂師尋ルニシレズゴムラニ子リカケ平メイチヤラ敷キヌスボニスハ脂ノノナハ脂ノ類ナラニカ  
リ紀列相列ナドノ海アルウニウタ云フモノ別ニ考アリラ切目ニヒ埋ミ塞クナリ上膏葉ニシスイブシラ貼ケモ綿ミテ捲キ置キ毎日換フベジ如是シテ癰肉尽キバラウメントメルロザアロニラ四歩一交ゼ温メ平メラ付クベシ新肉生ゼバラウメントメルロザアロニラ四歩一交ゼ温メ平メ

イチャニスリ付ケ症スベシ

十二

○流注毒 風毒 風腫 風濕

是ノ四症當流於テ一類トス

俗ニ風毒風腫風湿ト稱スル是レ流注毒ナリ輕キラ風腫風湿ト云  
ニ重キラ風毒腫ト云フ其形初メ浸々トメ腫レ皮ノ色寢々ゼズ患フル  
背一ツナラズ或ハ肩膊ヨリ肘ニ至リ或ハ臀腿股脛ノ間或ハ胸腹又  
腸背皆生ズ其形盃ラ覆ヘル如ク相並フモノ共ニ此ノ類ナリ凡は患  
フル者多ハ體虛メ勤労スル輩或ハ婦人產後ノ惡露瘀血經絡留滯  
スルヨリ生ズ治法先ツ寒熱虛實表裏邪正新久ラ別チ定メ内ハ木  
香流氣飲五積散ノ類症ニ隨テ撰ジ用ユベシ外ニハ先<sup>水</sup>乳麵散ラ貶メ

温散スベシ若シ應セズニ分カツラスマ

別書ニル  
溫和蒸

ラ用ユ尚効シアラズ

○腫レ

退カズ外ノ皮強ク硬クナルベシ其時ハ<sup>ニ</sup>デヤキロニコムゴムスニスラギニブス各等  
分交ゼ合セ貼イ引キ揚グベシ如是ニ膿成ルト知ラバ針ニテ刺シヤブリ膿  
ラ出ニジリコシラメイチヤニスリサス若シ腐肉アラバペシビタルラ少シ  
加蓋膏葉ニハスバルマナニデヤバルマホテントフレムステレギルノ類見  
合スベシ膿水久シク乾カザル者<sup>ノ</sup>ウメントラ水突<sup>道具名</sup>盛リ膿口ヨリ  
靜ニ突キヘレ洗フベシ如是シテ後ラウメント汁及ニ膿汁ラ悉ク推シ出  
シ其跡ノ治法前ノ如クス或ハ膿水ノ色黃ニメ雨水ノ如キ者ハ腐リ  
骨ヘルノ候ナリ考エ治スベシ凡ソ此ノ症ハ深ク況ミ膿モノナリ故ニ  
表ノ皮肉厚クシテ針ヲ刺ス<sup>ト</sup>浅ケハ膿ノ所ニ至ラズ能ク腫上ヲ按

メ針ヲ刺スベキ所ノ内ノ厚キ薄キヲ考フルト専要ナリ未タ治術  
ニ熟セザル輩多クハ累レテ針ヲ用ヒズ且又針ヲ刺ストイエドモ深カラザレ  
バ膿所ニ至ラズ故ニ膿ナシト心得テ針ヲ刺スベキ時節ヲ誤リ、次第ニ  
膿ミタレ骨ヲ壞リ肉ヲ傷リ元氣ヲドロエテ清ハサルニ至ル悲ニカナ  
凡初ノヨリニセ日或ハ十八九日ニ至テハ大抵内ニ膿アリト知ルベシ期  
ニ違フベカラズ且ツ膿ノ有ル無シラ知ルハ外科ノ專要トス心ヲ用テ  
忽ニスベラス

## 十三

## ○瘍瘻

瘍核

結核

同類

氣腫

募ニ陽集ニ補フ

瘍瘻ハ外風寒及ビ四時不正ノ氣ニ感シ内飲食膏梁厚味

毒經絡ニ釀シ結ホレ血氣ヲ壅塞ノ成ル其根臟腑ニアリ瘍ハ累々  
トメ珠ヲ成シソラナル心瘻ハ歴ナリ治セズ年ヲ歷<sup>フ</sup>ルナリ瘍核結核  
同ジ種類ナリ俗ニ氣腫ト云フモ同シ又瘡毒上升メ是レニ似ルアリ溫  
痰ノ症ナリ其ノ患ニ耳ノ前後項頸胸腋ノ間ニ生ズ其形累々トメ  
珠ヲ貫ヌク如ク三五枚連ナリ出テ形梅李ノ如ク大小定マラズ長キ  
ラ馬刀瘍トス謂フ心ハ馬刀貝ニ似タル以テナリ瘡ノ色淡白堅硬メ  
微熱ス久シクシテ長大色モ赤キ壹ジ痛ラ爲ス是ラ患フル人常ニ  
自ラ心神ヲ安ニシ氣力ヲ養ナニ尙スベカラ内治ハ尙ラ解ニ熱ヲ清  
フシ風ヲ去リ毒ヲ消シ氣血ヲ順流スルノ剂ヲ用ヒ外ハ溫熱ノ剂ヲ  
以テ表氣ヲ開キ血脉ヲ行ラスベシアリロウトデヤコミイヨ或ハムスラギ

テスニ小茴香ラ加フルノ類撰ジ用ユ又秘々ラスベシ傳アリ  
陽集出如是シテ尚

消セズ腫レマサバ、テヤキロシコムゴムスムスラギミテス各等分ニ交ゼ合ゼモ

綿ニ伸ベ貼ノ引キ揚グベシ如是シテ内ニ膿アルト知ラバ鍼ラ刺メ破ブリ

膿ラ出シハジリコニペレシピタルラ少シ加工爻入ゼ合セイイチヤニヌリ切リ

口エサシ上云スラギラスラ蓋ワ膿ヤウヤク減ラバウメントニトニテ洗

愈ス又一種生ズル初メ大豆ノ如ク或ハ桃李ノ如ク三五年ラ経ルトイ

エトモ消散セズ漸ノ腫レ大ニメ堅キノ石ノ如ク氣鬪ヲトメ清潔ナ

ラズ肢體羸瘦スル者ナリ發スル所定マラズ多クハ治シガタシ先ツ

タラアヌスコノクリヨニ樟腦ラ加工付ケテ消散スベシヌドニアモヤシ

ゴムカルハアヌシゴムサカヘイニ是ノ三品ノゴム別書ニアリ  
ゴムトハ脂ノ惣名又代某有以上三品各等分醋ラ

以テ煉リ交ゼ貼スルモノス佳ナリ或ハ年月ラ一歷テ瘡色紫赤手ミテ

按セハ膿有ル似テ動脈アル者ハ慎テ針ラ刺スベカラズ誤テ刺シ

破レバ大ニ血流レテト先ス

## 十四 ○ 瘰 瘤

癰瘤ハ瘀血濕熱經絡ニ壅リ滯リ成ル癰ハ腫レ下ニ垂レ蒂根  
小ニメ形チ櫻桃ノ子ノ如ク瘤ハ身ノ色シ腫レ高カラズ痛ミ痒ミ  
ナシ五癰六瘤其外名形多シトイエドモ外治ニ有リテハ異ナルナシ  
先ツ根小ニメ頭ラ大キニ下エ垂ル者ハ蠅糸ラ以テ癰根ラ括リ日日  
蜜密シシ搏ル五六日スレバ癰根自然ニ腐脱ス其痕エ枯萎ラヌリタラ

アヌスコメリクリヨンラ貼メ愈スベシ或ハ其形チ根脚大シ指ニテ推シ誠ム  
ルニ指隨テクボニ指ラニケバ其マ、浮ミ腫ル、者ハ其皮ラ二三歩許リ  
十文字ニ切リヒラキ竹ノ崑ニテ四方工披キ見ルニ内行紙ノ如キ者  
得龍按元  
有テ一物ヲ包ム其根ヲ引キ揚ケ見ル筋アリテ離レズ其筋ニ糸ヲ挾  
是ノ筋脉  
ヲ括ルモノハ  
血筋ヲトム  
ケテ緊シク括リ 得龍按スルニ瘤ノ類教ズ多シ五癰六瘤ハ名状諸書ニ出ス又外ニ  
粉瘤黒破瘤黒粉瘤髮瘤蛔虫瘤虱瘤アリ此ノ五癰ニハ瘤其  
外諸瘤ノ内石瘤筋瘤血瘤ノ類卒ニ切り披クカラズ切ルトキハ血走リテ人ラ殺ス  
ルナラン  
甚ラソルシ肉瘤痰瘤膿瘤ノ類ハ苦シカラズトイエドモ先ツ灸カ痛リ某ニテ披クベシ 其上  
ノ方ラ切り披キバジリコニ丹若ノ焼キ片シラ少シ加工メイチヤニリ貼  
ス一日一夜程シテ一物脱セバ痕エテキスティビミペレシゴタルラ加工  
貼スベシ其後正肉七八分騰ラバウメントラ以テ洗ニ整フベシ又其根  
フカク其形チ堅ク腫レテ高カラザル者分タアヌスコメリクリヨンラ  
十五 ○乳病 乳岩

草ニユリ貼シ其上ニ板鉈ラ以テ水銀ラ塗リ付ケ膏葉ノ上ラ蓋  
ニ毛綿ヲ以テマキ置クベシ是ニテ大抵散収ス

夫乳房ハ陽明胃經ニ屬ス乳頭ハ厥陰肝經ニ屬ス其病因一ツニ  
アラズ或ハ産後ニ乳汁速ニ出デズシテ脉絡凝リ滯リテ通ゼズ或ハ  
憂愁思慮ラ過メ鬱結肝脾ラ傷リ脾病ムトキハ曾モ亦病ム乳頭  
ハ肝胃ノ經カル至或ハ賁女兒乳ラ呑シトメ乳頭ラ咬ミ傷リ齒ノ跡終ニ結ホレ  
裹リ腫レ塊マナリ其寒熱コモゴモ作り煩渴疼痛甚シキ者共  
乳麵散宣シ消散スルナリ尚腫消セズ痛ミ退カズバクスラギテス

テヤキロシコムコムス各等分ミ父セ合セ貼ス又カツフラスマ別書ニアル  
發表未ラ

キ用ニシ如是メ膿ト成ラバ針ニテ披キ破リ膿ラ出シ後ノ治法癌

疽ト同ジ

乳岩モ亦憂愁肝ラ傷リ思慮脾ラ傷リ暴慮夬セズ願フ所  
遂ゲズ或中年後夫ナキ婦人是ラ得レハ尤治シガタシ初メ大豆ノ  
如ク漸大ニメ棋子ノ如ク半年一年ノ後長大ニ爲リ痛ミ甚シキ者  
アラヌスコノリクリヨニエララストデヤホニホリコスノ類ラ付ケ消散  
スベシ數日如是ニメ散ラズニバ付茱ラスベシ水集出膏ナリ如是シテノ瘡上爛ハ  
モノナニグエニドテヤホニホリコスラ綿ノイチヤニラリ貼スベシ紅毛人治法  
別書ニ出ス大抵乳岩ノ治法内消ラ以テノ專要トス既ニ破レ潰テ臭  
氣甚シク肉ラ穿テ岩穴ノ凹凸ナル如クノ或ハ紫赤柘榴ノ如クニナリ疼痛  
心肺ニ連リ血水ラ流スモノハ五臟共ニ衰エ救フベカラズ津液ラシダ  
尽メ死ス初發結聚小核ノ間ニ治スベシ潰爛シテハ百死ニ生モ無シ  
榮休先生ノ曰乳岩ノ正半年一年ノ内未タ破レザル内ニ花患門ニ  
灸スベシ壯數ハ病人ノ虛實ニ順フ重キハ毒ラ減ジ輕キハ消散ス屡  
誠ムルニ甚タ効シアリ依ク門子ニ示スト云

## 十六 ○楊梅瘡

楊梅瘡ハ天行ノ濕毒ニ感ジ染ミ或ハ色慾ニケル人溼癥ノ毒氣  
肝腎ノニ經ニタクワエ或ハ肝腎脾ノ内風湿熱ヨリ生ジ或ハ婦人陰戻

溼水惡濁ノ熱毒アルニ交レバ直ニ男女子ノ腎月中ニ感メ成ル下疳便毒骨  
毒ノ類皆ナ是ヨリ始マル又下疳便毒骨毒ノ楊梅瘡ヲ發スルモアリ  
内ニハ内葉別用ヒ外ニハ外貼別用或同上ラ貼スベシ但ニ此ノ内外ノ方春夏秋  
ノ三時用ユベシ冬月用ユルトナカレ若シ止ムト得ズメ用ヒバ病空炭火等  
ラ置キ溫暖ナラシメ必ズ寒涼ナラシムベカラズ得龍謂紙帳等ラバツリ  
テ炭火ラ入ハノ類可ニ  
又梅瘡結毒頭頑癰シ腐爛年久シキ者ハ惡肉等アラバ切ル去ルベシ  
後ラウメントラ平メイチヤニ浸シ貼スベシ頭脳ノ患ハ油類ラ用ユルト禁  
ズ必ス用ユルトナカレ得龍謂是油ラ骨ニ禁ズル  
故ナリ肉淺ク骨遠クハ不苦

十七 ○便毒

騎馬瘡 橋馬瘡 同ジ得龍謂俗ニヨコ子ト云フハ此ノ別名ラ横痃

ト云痃ハ小腹下ノ病ト云痃ノ横痃心カヌ疝毒ト云フモノ同シ血症ノ毒ナリ別物ニアヌ

便毒ハ俗ニヨコ子ト云フナリ兩膀ノ縫ニ合セ小腹ノ下陰モノ傍ラニ生ス其  
因ハ精血コモゴモ交リ或房ニ入テ強テ精ラ固メテ洩ラサズ或ハ慾念ミスデニ  
萌ガシテモ停テ遂ゲズ故ニ精血走動メ肝経ニ滯リ是ノ患ラ爲ス其初メ  
皮色変ゼズ微痛メ寒熱交起リ腫レ堅カラサル者ハ輕シ或ハ腫レ堅ク  
シテ色赤ク痛ニ甚シノ惡寒發熱シ咽カワキニ便秘洪スル者ハ重シ治  
法滯リラ散シ瘀血ラ行ラシニ便ラ通利シ外ハムスラキニラス貼ス四  
五日ラ經テ効シアラザル者ハデヤキロンコムゴムスラ貼シテ引アグベシ膿  
ナラハ針ラ刺シ破リ膿血ラ出シメイチヤビシリコニラヌリテ刺シ上ニエシ  
フラストノ類撰ニ用ユヌテキスティイニペレシヒタルラ加工貼メ上ニエシフラス  
トノ類ラ貼スルモヨシ如是シテ膿血漸ク乾ク者ハ洗茱ラ前法如ク用テ愈スベシ

又初發ニ治法ヲ誤リニ三年ニ及ビ愈スニバ必ズ腐爛ツヨク臭氣アリ  
色紫黒ラ帶ビテ瘡孔臭口ニ似ル者ハ氣血虛スル故ナリ是症内ニハ  
峻補ノ劑ヲ用ヒ外ニハラウメントニイケビシヤコンラ加工洗フベシ尚腐肉モ  
尽キズニバ膽巻燒キ片ヲ加フ蓋ニハラホテントノ類佳シ別論アリ

## 十八 ○下痺瘡

下痺ハ肝腎二經ノ湿熱ナリ其源色々アリ淫邪慾火鬱シ滯リテ  
成リ或ハ淫慾ノ念萌シ動テ陽物舉ルトイエドモ泄サズ其ノ敗精濁  
血中途ニ流レ滯リテ成リ或ハ婦人ノ陰器淨カラザルニ構合シテ瘀精  
濁氣ニ觸レテ成リ或ハ房術雜行シテ湿熱淫火相攻ムルニ因テ成ル

各症ニ隨テ治スベシ内ニハ清湿消火ノ剤解毒生肌ノ方ラ用ユ龍膽鴻肝  
湯五寶  
丹ノ類 各症ニ從フ阿蘭陀人ノ内治方數多シトイエドモ日本人ニ用ヒ  
ガタキ方ナレバ是ラ闕ク

初メ白泡ラ生ジ微シクノ微シク痛ニ或ハ紫黒ラ帶ブル者ハアルホン  
カニフラアドニ龍脳ノ油ヲ少シ加工平ノイチヤミリ貼シデヤホンホリコス  
ラ蓋フ如是ニ治セズニ洗葉ヲ用別書ニシテ其後水氣ヲ能シ拭ヒ去リ  
腐肉努肉アラバ寒カニフラアルニ銅垢少シレシビタル少シラ加工交ゼ合シ  
敷クベシ

又初メ陰茎ノ頭ラニ紅色指ラ以テ點ズルガ如ク瘡ラ生ズル者アリ是レ  
ハ先ツアルホンカニフラアルニペレシビタル少シ龍脳ノ油少以上三品マゼ合

燐

セ貼ス若シ腐肉<sup>燐</sup>ッヨク汚水多ク流レ出テバヨクヨク拭ヒ去リテ付ヘシ  
如是ニモ治ゼス腐リユカババジリコニ五夷カシラアル六夷ベシビタル  
一分交ゼ合セ平メイチヤニトリ貼スベシ尚臭氣ツヨク腐爛止マサル者  
アラントインカシラルラ以テ洗ヒ清メ置キバジリコニペシビタルラ交  
ゼ合セ貼ス腐肉去リ正肉騰ラバ加減カシララアルラ以テ痊スベシ  
又初メ皮内ニ瘡アリテ外見ハ疣<sup>イボ</sup>目ノ如クニアルハ藥力内ニ敵シガタシ  
如是キ者ハ先洗ヒ藥ラ用ユシ別書ニアル<sup>二洗</sup>腫レ尚消セザルハ皮内ニ水  
氣アルナリ其皮ノ色ラ考エ切り披キ得龍謂切リ披前ノ洗藥<sup>二洗</sup>ラ  
以テ洗ヒ淨メ水氣ラ拭ヒ取リカシフラアル十夷竜脳五分膽卷燒片  
一分輕粉一分以上四味六爻セ合シ平メイチヤニ塗リ貼スベシ如是四五  
日ノ尚効シ無シハ蠅糸ラ以テ疣<sup>イボ</sup>目ノ如キ者ラ括リ落スベシ小キ者ハ  
鉄ヲ以断チ切り其痕エ加減カシラカヌツテリトシ猿臂一箇<sup>切り</sup>披  
液<sup>ラ</sup>竜脳一分五厘輕粉五厘磁器ニ入レ摺リ文ゼ平メイチヤニ塗  
リテ貼シデヤハルマ或ハデヤホニホリコスノ類ラモ綿ニ伸ベ捲クシ如  
是ニヌ肉尺キ正肉アガラバカシフラアル三竜脳ノ油ラ少シ加工付  
テ皮膚ラ整フベシ

又初メ陰頭鐘撓ノ如ク水ラ含ム者アリ先ヅ消散スベシ燒耐五十  
錢樟腦一夷羊以上ニ品微火ニテ温メ平メイチヤ或ハ毛綿浸シ患フ  
ル所ラ捲クシ如是一日一夜ラ經テ腫レ消セザル者ハ蒸茱<sup>別書ニアル</sup>  
ラ用ユベシ蒸茱ニテモ腫尚消セズ痛ミ止マズンバ平針ラ以テ浅ノ刺

ス丁五六所血水ヲ校リ出シ加減カニフラアルヲ付ベシ尚痛ミ退カズ効シナキモノハカニフラアル十曳錄青一曳羊鉢ノ焼キ片シニ曳能ク交セ合付ベシ

又此症年ラ經テ愈エズ然毒深ク腐肉爛甚シキ者ハ小便道工金或銀ミテ拵エタル管ラ刺シ置針ミテ陰頭エ十文字ニ糸ラ通シ徐々トニキシメ自然拵リ落スベシ其後燒キ金ラアテ膏茉ラ付ル又洗茉別書有  
病三洗ラ用テ能タアラニ温ノ水氣ラ拭ニ去リハシリコニイケビシヤコニアボストロウロニ以上三呂交ゼ合シ貼ス腐肉去リ正肉アガラバカニフラアルラ貼メ痊スベシ或火疣目ノ如キ者並ビ出ルモ治法同シ

十九

○婦人陰瘡

婦人陰器ニ下疳瘡ラ生ズル其症色タアリ治法男子ノ下疳瘡同ジ或火痒ク或ハ痛ミ惡寒發熱シテ小便涩リ苦ムモノハ洗葉別書數ラ用テ洗ニ温ノ加減カニフラアルラ貼スベシ大抵男子下疳瘡ト同ジ

二十

○石麻

得寵謂麻疾ノ症色タアリテ内茅ノ主ル所別傳アリ石淋

ノニ症ハ専ラ外科ノ事ナリ故ニ石麻門而耳出牛ナラシ石麻ハ膀胱ノ湿熱或ハ水穀ノ微垢水道ニ傳エ送リ漸ク滯リテ砂石ノ如クナリ茎中ニ挾ミ小便通ゼス腹中張リ陰茎并ニ腰ノ

廻リ痛ミ悶乱メ死スルト須更ニアル者ハ治法先ヅ指ラ以テ穀道ノ前陰茎ノ後エラ按メ見ルニ石ノ如々モノ指下ニアリ是ラ取ルニ病入ラ仰キ伏サセ兩足ラ揚ゲ一身ラ忘リニ動カサズ瘡功ラ以テ堅ツ

其 功リ披キ道具ラ以テ破石ラ取リ出シ早速甚所ラ縫ニ合ゼ血ラ苗ムベシ血止茱ノ方別書出血門蓋膏茱ハデビスイブシラ毛綿ニ伸ベ貼シ疊ミ毛綿ニマキラシベシ大ニ風ニアツルラ忌ム

又麻疾久シクシテ陰茎ノ内膿液凝リテ破石ノ如クニナリ塞キ痛モノアリ是又平針ラ以テ切り披キ小便道口ノ破石ラ出シ血ヲ止メテ後テキスティビノ類ラ以テ治スベシ尚内茱ラ用ユベシ内茱方別書アル臺方

## 二十一 ○痔漏

痔ハ大腸ニ湿熱ラ積ミ或ハ厚味灸肉ラ過食シ或ハ酒色ニラケリテ腸胃傷レラ受ケ瘀血濁氣肛門ニ流注シ或ハ久シク座スルニ依リテ氣血凝滯メ成ル此病男女老少ラ別タズ皆ナ患フ但シ内痔アリ外痔アリ内痔ハ肛門内ニ結腫ラ出ズ形大豆ノ如ク又棗ノ如シ甚シキ者ハ三五枚相連ルナリ外痔ハ肛外ニ生ズ初メ微ク又微ク痛ミ流ス痛ミ甚シク秘結セハ内茱ミテ大便ラ通スベシエキセエルホニアト別書ニアルホニアト別書ニアル是ラ主ドル外ハインシエントカシフラアト大ラリヨレリヤウロン中ワウビセン

知レ代ニ以上三品交セ合シ綿ミリ瘡上ニ貼ス又蒸茱別書ニアルラ用ユシ胡巻ラ用ユ

姜角別書ニアル柿核別書ニアル石楠別書ニアル蜂窠別書ニアル連花別書ニアル

其後ハ膏茉油茉見合セ用ユ是外痔ノ治法ナリ

内痔ハ初ニ先ヅ指ヲ以テ肛門ノ内痔ノ在ル所ヲ搜リ深々浅キヲ考エ  
其ノ寸法ニ應ジテ鉄箇得龍謂鉄箇ノ内ヨリ焼金ラヘルトキハ鉄ノ管然メ  
受ケガタシ竹ノ外皮ヲケリウスクシテ其ノ法従フベシラコシラエ油茉ラヌリテ肛門ノ内エ刺シ入レ其管ノ内ヨリ燒キ金ラ入  
能ク痔ノ頭ニ當ルト數次メ後又分寸ラ考エ刺糸ノナイナ以テカシラアト  
十麦龍脳ノ油一麦五分ラリヨロザアロン五麦以上三品交ゼ合セ温メスリ  
但シ鉄ノ管モ此油宜シ肛門ノ内エ刺シ入如是ニシテ後膿出デバ水突ニテ洗フ得龍謂  
ラウノニトニ見合加洗茉ハ減スベシ例ノ如シ其間ニアルホンカシフラアトニペレシビタルラ少シ加工メイチ  
ヤニ塗リ刺スヌアルホンカシフラアトニイケビシヤコニ各等分交セ合シメ  
イチヤニヌリ刺スモ可ナリス萎角用ノ如ク柿ノ核ノ如ク高起スルモノ

ハ痔根ラ蛹糸ニテ括リ漸々ニ緊シソ結ビ自然ニ断チ切バシ或ハ  
焼キ金ラ以テ痔頂ラ焼キ或ハ鉄ニテ切り取ルシ血出ル者ハアルホ  
ニカニラアドニ枯巻ラ少シ加工メイチヤニ塗リ貼スベシ

漏症ハ初メ肛門ノ傍ラニ微シク腫レ時々針ニテ刺スガ如ク痛ミ又  
是ラ按シ誠ムル内ニ行ノ根ノ如キ堅キモノアリテ次第ニ潰エ爛レテ  
大腸ラ滋潤シテ大便ラ疎通スル剤ラ用ヒ外ハ大蒜ラ隔テ、瘡上  
灸シバジリコシペレシタルラ加工六爻ゼ合シ綿ニヌリ付ケ上ニタラアヌ  
スコメリクリヨンラ以テ蓋ヒ瘡根ラ爛ラスベシ如是メモ瘡塊タレザ  
ハ圓燒金ラ以テ毎々瘡頭ラ焼キ茉ラ貼スルト前ノ如クス瘡塊

漸ノ癰レ流ル、者ハメロザアロニミテ 肌肉ラ生シ餘ハ同前ス年久シ  
愈エズ穴數多ク出來黄水ラ出シテ止マザル者ハ瘡切ラ以テ穴ラ  
一所ニ切り披キ焼キ金ラアテメロサアロニ十キベレシビタルニキ以上  
ニ豆呑父ゼ合シ平メイチヤニ塗リ貼シ上ニラレムステレギルラ蓋フヌラ  
ウシトラ以テ水穴ニテ日ラ隔テ、洗フ刲瘡肉去リ正肉生ゼバラウス  
トメロザアロニ各等分交ゼ合セ温メイチヤニスリ瘡口エ刺シヘレ  
正肉滿ツル者ハラウシトニテ洗フ瘡スベシ

## 二二 ○ 脱肛

脱肛ハ肺大腸ノ氣ノ虛脱ナリ或ハ腎元ノ虛冷或ハ酒色過度  
ノ腸胃傷レラ受ケ此ノ患ラ成ス男女老少皆有リ内治ハ多  
端外治ハ先ツ蒸茱別書ニアルヨシ能ク温メテ後貼ケ茱別書ニアル  
ニラサムベシ若シ効シナキモノハ別書ノラ用テ按摩メ治シスムベシ

## 二三 ○ 水腫 脹滿

水腫ハ病因一ツナラズ大抵中氣虛弱ニメ外六氣ノ邪感シシテ此ノ  
病ラナス能ノ虚實ラ考エテ治ラ施スベシ腰以上腫ルモノハリ  
ヤアカ阿蘭陀ノ煉リ茱ナリ直ナルヲ撰用又ハメルダアト同ノ煉リ茱ナリ蠻人長崎エ等ヲ  
毎服一钱、白湯ニテ用ユ、腫脹腰ヨリ以下ニ有ルモノハラリヨゾソス  
子或ヒトラソクスコ、或ハラリヨゼ子一ブル或ハエケヌタラカトリ

レイ 阿蘭陀ノ煉リ茱等ラニ症ニ隨テ撰ニ用ユベシ外ニハ洗茱 別書ニア  
ル通水洗  
引キ茱 別書ニア  
水腫引茱 等ラ用ユベシ 此ノ内治ハ方ノアリヤアカハ  
蠻人近來持渡リ甚ダ多シ京大坂ノ茱ニモ  
多ナアリトイエモ予ガ別書ミ記ストク正直ハ少ナシ能キエラミ用ユベシ又アルタト  
或ニケスカラカトリレイモニ呂モニ阿蘭陀國調合ノ煉リ茱ミテリヤアカト同品ノ  
モノナレモ長崎エモ持チ渡ルス クナシスラリヨクノス子テトランクス子テラリヨセ子  
モフル等ハ當流ニ其傳アリテ書中ニ出ス誠々シ但シ内治ハ本朝唐土ハラダマヤカナルニカ  
ズ得龍說ナリ、

脹滿ハ先ヅ蒸茱ラ、小腹ニ當テ頻リ蒸スベシ 方別書ニア  
三味通水蒸外ニハエ  
ヨララストテヤフミイヨテベニスイフ各 等分交ゼ合セ軟ラカナル草ニ  
伸ベ膝ノ上貼シモ綿ラ捲キ置クベシ如是メ小便ラ通ズルナリ内ニ  
前ニ出ス内茱類ラ見合セ用ユヌ一方アリ 別書ニア  
土人水腫門 又水腫脹滿ノ水  
ラ抜ク奇術別ニ傳アリ 陽集ニ見エ

## 廿四 ○走馬牙瘡

走馬牙瘡ハ俗ニ歯クサト云フ、甚ダ迅速ナルコト馬ノ走ルが如シト云、意  
ナリ治法遲延ミスヘカラズ是レ小兒痘瘡疹ノ餘毒退カズ或ハ諸病ノ  
熱毒甚キニ因リテ此ノ症ラナス初メ牙齒ノ根爛班シ漸ク潰エ腐  
リテ紫黑色ニナリ其惡臭近ヅキガタシ甚シキハ牙齒齦肉脱落  
スズヨアラボシテ唇ノ肉穿牙チ破ブル、者ハ治セズ先ヅ内ニ寒涼茱  
ラ用テ、熱ラ渾シ心ラ清シ毒ラ消シ外ニハ毒ラ消シ勢ニラソシキ、瘡  
リラ止ムルノ茱ラ用ユ先ヅ付茱 別書ニア  
牙瘡付茱 ラ用ユヌ含茱 別書ニア  
ス附茱ニカアリ  
又吹喉散等ラ撰ニ用ユベシ

喉痺ハ急卒ノ症ナリ、其發スルヤ、咽喉ノ通道卒然トメ、腫レ滿チ  
呼吸喘促、甚シキハ眩メキ卧シテ人事ラ、知ラズ治法急ニ破針ヲ  
以テ腫上ラ切リ破ブリ悪血ラ出シ取り管臣ラ以テ吹喉散ラ喉中  
工吹キ入ルベシ其後ハ花ノ水等ニテ漱ガセテ治スベシ得龍謂是急喉  
婢ミシテ古來ヨリ  
淨眼先生曰咽  
穴工入冬キホド  
牛房ノ根ヨ  
皮ヲケツリ木  
文蠍糸ノ如ク  
シテ湯熱シ  
テヨクタダキ  
ヤハラゲカヘ  
用テモヨシ  
走馬喉痺ナトト名ツク甚急症ナリインギヤブルラ上治トス若シ破ブリガタキアラ  
胡巻ハ赤ラ吹キ入ルベシ痰血ラ吐メ愈ス丹巻ノ赤ハ至テキビシ、其外喉病品々アリ  
曰ク單乳蛾雙乳蛾單閉喉雙閉喉子舌脹其外喉風ノ名目多シトイエトモミナ  
喉痺ノコメ状ラ異ニス患モ走馬喉痺ト名ツクルヨリ緩ルシ夫々治法アルベシ

又咽喉爛レ痛ミテ飲食通ジガタク聲啞スルモノ餘火モアリ  
又多クハ瘡毒ナリ其因ラ考エテ分ナチ治スベシ楊梅瘡毒尠結  
メ患ラナスモノハ土茯苓剤等ニ宣シ得龍謂五寶丹又  
結毒紫金丹ノ類外ハ吹藥ラ

別書ニアル  
四味吹葉ヨロシ是ミテノ瘡リ止ラズハ別書三味吹葉ラ用ユ

又誤テ奥骨等ラ呑ミ吐ケトモ出デス嚙メドモ下ラズニバ先ヅ  
燈シ火ラ以テ口中ラ照シ見舌押エ口見也ニテ舌ラサエ能ク考エ奥  
骨ラハサミ出スベシ若シ奥骨見エズハサミ出シガタクハ服葉スベ  
シ別書ニアルニ方

又竹木屑咽ニ立チ痛ミ忍ビガタク如何トモ仕ガタキハモ綿ノ糸小  
數條、蠅ラ塗リ咽道ノ形ノ如ク斜メ撓ワメ咽エサシ込ミ外ヨリ  
推シ下ロストキハ其マ、手ニ隨ツテ抜ケ下ルナリ其痕ラ直ニ車前  
水ラ以テ漱スギ整フベシ

精華

眼ハ五臟ノ華蓋ニメ諸陽升ツテ、照明ラナス其病一ツナラズ、各分

チ治スベシ、外ハ先ツ洗茱別書土集ミ有ル三味ノ方カタラ以テ洗ヒ灑グベシ、赤

腫、疼痛スル者頗ニ愈ニ又眼中腫レ、痛モノハ蒸茱別書土集ミ有ル三味ノ方カタ

ノ方、ラ以テ蒸シ温メ又洗茱別書土集ミ有ル三味ノ方カタニテ洗ヒ治スベシ

又眼中ニ翳障アリテ、黑白ラ分サザルモノハ搾ケ茱別書土集ミ有ル三味ノ

方ラ用ユ其後翳障尚流レ去ラズニバ別ニ奇術アリ内治ハ夫々症

隨ツテユ夫アルベシ  
奇術陽集土集ニ出

又小兒痘疹ノ餘毒眼中ニ流注メ腫レ、痛ニ明ラ失ワント、欲スルモノ

ラ治スル奇方別書土集ニ記ス  
土集土集ニ出

## 廿七 ○ 鼻上病

鼻痔ハ俗ニハナタケト云フ是レ肺氣不足風熱上升シ或ハ飲食  
厚味ノ溫主母相襲フニ因リ或ハ七情鬱滯ノ火肉ラ生シ久シク  
愈エザレバ鼻ノ穴ラ閉デ塞キテ杳矣ラ知ラザルミ至ル先ツ銅ノ  
管是ス痔疾門ト同シクラ持ラエ鼻中ニ入管ノ中ヨリ燒金ラ以テ燒  
肉頭ラ燒クベシ又乳香ラ燒キテ其氣ラ嗅ガスベシ如是ニシテ燒肉  
爛レ潰ユトキアルロサアロンニ枯若ラ加工刺シ塗ルベシ又燒肉長ク  
鼻ノ外エ垂レ下ル者蠟糸ニテ括リニ落シ或ハ鉢ラ以テ切り落ス  
ベシ又付ケ茱アリ別書土集ニ記ス  
土集土集ニ出

廿八 ○ 牙齒

牙齒病ノ因一ツナラズ火アリ風アリ虫アリ冒熱アリ氣齶アリ内治火ニハ涼シ風ニハ散シ虫ニハ殺シ冒熱ニハ浮シ氣齶ニハ解シ夫クノ茱ラ用ニ外ニハ風火ニテ痛ムモノハスヒリトサアリスアルモニヤアシラ以テホツシニ浸シ痛ム齒ノ上ニ貼シ暫クロラ閉チ居レハ痛立所ニ止ナリ

ス齒ノ諸痛ヲ治スル方又氣齶牙痛虫牙痛ヲ治スル方又虫牙痛ラ治スル臺茱三方別書ミ記ス撰ニ用ユベシ 土集ニ出

又一種鑽齒ト云フ者アリ其患牙根ニ別ニ尖リタル齒アリテ銀肉ヲ穿チ出ヅ其色紫系ナリ或ハ痛ミ或ハ痒ク或ハ膿水ヲ流ス是ヲ

治スルニハ平針ヲ以テ銀肉ヲ搔キ破ブリ鑽齒ヲ取ベシ其後焼耐ニテホツシヲ浸シ針ノ跡ヲ拭フ一數次スレバ血出リテ愈エ

入齒ヲ造ルニハ蠅ラ火ニテ温メ斷肉ニアテ齒ノ形チ及断肉ノ凸ラウツシ取り別ニ鯨糞ノ牙ヲ以テ右ノ蠅齒ノ形ノ如クニ是ヲ造リ木賊ニテ能キ琢磨シ摸シ齒ノ中央左右ニ各一穴ヲ穿チ針金ヲ以テ左右ノ生齒ニ結ビツナグナリ得龍謂今ノ代此細エラスル者甚タニウユル等其妙云フヘカラズ今此法ヲ見ルニ甚ダ拙ケレハ則チ是レ臺國ヨリ傳フノ初矣故記ス

廿九 ○ 舌病

舌瘡糜爛ハ心冒日ノ熱毒ナリ大人小兒トモニ含ミ茱

別書ニアル  
前ノ三味方 宜シ

舌疽心氣虛勞シテ虛火熾盛因テ生ズ初メ舌ノ傍舌ノ頭ラ  
粟粒ノ如キ者ラ生ジ漸ク舌ノ形厚大ニナルヲ覓エ其後黒ク腐  
レテ潰エタドヒルナリ若シ日久シク瘡エズ舌根腐リ入ル者ハ治ゼス宜  
シク思慮ラ遠ザケ禁忌ラマモリ内ニハ大志ラ補ナニ火ラ清フスル  
ノ茱ラ用ユベシ外ニハ貼ケ茱ラ用ユベシ別書土集ニアル  
四味ノ貼ケ茱

重舌大人小兒トモニ有リ是レ舌下ニ又舌ノ如キ者ラ生ズ半病ニテリ  
先ヅ舌ノ兩傍エ横ニ針ラ刺シ惡血ラ出シ吹喉散ラ吹キ入レス薑茱  
ラ別書ヨニアル  
二味含茱用ユベシ附薑吹茱含茱數方別方別書土集ニ出撰用

### 三十 ○ 癪風

癪風ハ紫白ニ種アリ共ニ氣血凝リ滯リテ風濕相ニ冒日シ或ハ醉テ  
後テ雨路ニ侵サレ此ノ症ラ成ス其内白殿風ハ多ク治シガタシ内治ハ  
ヘシイニテリヤアカ一  
七分實上症  
者ハ一  
體實ノ臥スニ臨シテ熱湯ラ以テ送リ下ス如  
是ニシテ汙ラ取ル三日次ニ泻藥ラ用ユシ泻茱ノ法 卫ニスタラカ  
トリコソ七分實上症  
者ハ一  
五厘實上症  
者ハ一分制衣輕粉五厘實上症  
者ハ一分此エケスマラニ輕粉ラ包ミ大豆  
大キサニ九シ溫湯ニテ送リ下斯齒ニアツルト勿レ夜分服次ノ日  
食物ラ絶ヅベシ又後三日ラ過キテ又服スルト前法ノ如クス服茱ノ  
間大ニ葷茱辛棘ノ物ラ忌ム先師ノ曰 口傳ノ說得龍記ス右内茱  
ニ云フヘシイニテリヤアカハ前ニ出ルタハテリヤアカト云フモノ、如クニヤワラ  
カニ補挖ノモノニアラズ是レモ彼ノ地ニ製スル煉リ茱ニメ持テ渡ルトモ

稀ナルモノナリ且又洩藥ノ法ト云フモノ、内卫テスカラカトリコシ知ズ  
分量ノ所ニセリ實症ノ者ハ一分トアルトキハ是又補茅ノ類アラズ  
又輕粉ノスルドキニ於テラヤ殊更厘モラアラソヒテ和人ノ性質ニカ  
ログシク用ユベキ藥劑ニアラズ勿論癥風ナドノ輕淺ノ患宜シク外ヨ  
リ治ラ施スニシカズ洗茅付茅別書ニ出ス餘ハ考エ治スベシ但シ  
製輕粉ハ茅勢ラユル法ナレバ他ノ茅方中ニ於テ據ナク用ヒバ此法  
隨フテ用ユベシ依テ記ス

### 阿蘭陀輕粉ヲ製スル法

搘擣ラニツニ割リ枝ラ去リ輕粉ヲ多少ニヨラス紙ニ包ミ搘  
擣ノ内エ入レ故トノ如クロラ合シ麪粉ノ糊ラ以テ土器ノ内エ封シ

ハレス土器ラ蓋ニ上ラ泥土ニテ能ク封ジ炭火ニテ焼ケ六時火  
氣ラ去リテ用

## 卅一 ○ 鵝掌風

鵝掌風ハ手足裡及び手足ノ爪ニ發ス是レ寒涼ノ邪凝リ滯ホリ  
或ハ火熱血燥ヨリ皮膚枯レ厚クナリ破ブレ裂ケテ愈ズ初メ繁  
白ノ班點ラ發シスクシテ皮膚烈ケ痒キト忍ビガタシ是ラ搔ケ  
白屑ラ起ス洗茅ニ宣シ別書ニアル  
土集本部洗フ後ハ能ク水氣ラ去リカニテ  
ラアトミヘシビタルラ加工付ケ上ニラレムステエギルラ貼ズベシヌブル  
ニドインカニフルラ温メ洗ヒアボストロウロシニイケビシヤコシラ加貼スル

モヨシ或ハ瘡丸ノ甲ニヘラバカシフラアトニ鉛ノ焼キ返シラ加工貼ス又

附藥ノ方有リ別書ニアル  
丸部

卅二 ○ 燒瘡 頑癬

燒瘡ハ髮ヲ剃ルノ後風邪毛竅ラ襲フテ成ル初メ舶圃班剥ヨリ剥ニシケルラコシ鮮人如キ屑ラ生ス日ラ經テヒ加ラムスニ満頭至ル久シク愈エザベ膿ノ孔ラ生ジ中ニ細カキ虫ラ生ス痒クシテ痛マス或ハ腫レテ膿水ラ流ス年月ラ經レバ治シガダシ内治ハ風ラ解シ熱ラ涼フスノ剤ラ用ヒ外ハ先ツ洗ヒ茱別書ニアルニ宜シ又付ケ藥別書ニアルニ宜シヌブランドインカシフル或ハアシワメリクリヨン等ニテ洗ヒ或ハアルホン髪ラ生スルヲ奇ナリ

頑癬ノ類年久シク治シガタキ者治法同前

是マテ三十二病門ハ旧記ノマナリ此後ノ十一ヶ條ハ予旧記ノ當流口傳聞ガキノ内ヨリ日用ノ治法ラ写シ出ス者也都テ四十三類トス是新亮一巻陰集ノ次序ナリ此次亮ラ以テ考フレハ見易スカラシム

卅三 ○ 痘毒

口傳曰痘瘡或ハ水痘ナドノ生母ヨリニリテ膿ミタル者ハカシフラ  
アト、バジリコンテレギル三色各合メ子アリ但シ今ハ是ラ三輝膏ト云ア紙木綿等ニ伸  
ベ付ルス堅タ紅粉ラ梨子ノ汁ニ等分ラシ六入せ付ル和ラカニノ能ク  
愈シテアトナシ始終此ノ治ラナスベシ

又痘瘡ノ餘毒眼中工流レヘリ腫痛スル者點藥ホラ用ユベシ方別

書ニ有リ得龍謂此假一徐ハ仕掛ノ書中ノ内ヨリ写入

卅四 ○ 痛風

口傳曰惡血ノ滯リタル人必ス此ノ病ラナス又風邪ニ感シ湿熱ラ

兼子諸クナルリ表部閉塞シテ此ノ症ラナス得龍謂是遍身骨筋走  
皆ナ氣血風濕痰火ノナス所甚ダシキモノハ虎ナドノ其病筋筋骨ニ宿リ節々  
咬ム如ク骨筋ラ穿チ痛ム白虎歴節風ナド、云

ラクドリ所々ニ痛ムナリサシテ、腫レハ見エズ痛ム、強キ故ニ白虎

歴節風ト云フ治法乳麵散ラ熱湯ミテ解キ痛所ニ付ケ但  
シ生姜汁ラ加工テノイヨク良シ扱上ニ引サキ紙ラ付ケル痛ミ  
速カニ止ムナリ此症日數ラ経テモ腫物ナドノ如ク膿ミ又破ル、  
者ニアラズ唯骨筋ノ間ラ走リテ、痛ムバカリナリ右ノ乳麵散  
ニ方ノ功竒々妙々ナリ

卅五 ○ 蜜蠻溫

得龍謂即正宗ニ云非腮ナリ冬温ノ後天時正シカラズ感發  
傳染丸モノアリト鷄鷄溫ト云アモ同ジ俗ニ江戸分サバコト云温病  
疫病ノ内ナリツケテ云エバ咽ノ下腫ル、ラロジト云ヒ頬ノ腫ル  
ラガマト云フ同シモノナリ

口傳曰此ノ症ハ肝腎月ニ經ニ風熱ヲ受ケテ成ル發スル所耳ノ  
下ヨリウナジニカケ腫ルナリ蝕巣温ノ首ノ如シ故ニ名ヅク餘ノ  
所ニハ無キモノナリ 得龍謂入門ト云此レ治法最初ニハフラニドイニカシフル  
紅荳小茴香ラ加エタル方ラ 得龍謂是レ榮休先生ノ加味ナリ 元來アランドインニ品ラヘルノミ引クベシ夫  
ニテモ散ラズバニフラストコミニヨラ貼ス或ハムスラギヂスニ紅荳  
小茴香ラホメ加エ子リ合ノカタクシテ貼ス若ヌ根ツヨクバハツ  
バスラスベシ但シ刑防ノ入方ヨシ外ヨリ氣ラ閑ヅル茱ハアシ、耳  
中或ハロ中ヨリロアクアリ其トキハ大吉又ナリ

卅六

○癰疽

得龍謂當流ニテ指ノ病トス俗ニ称スルト同シツマバラミト云  
フノ類ナリ入門ノ癰疽ト云フハ指ノ病ニアラズ白ク一名蛇瘴

ト云フ烟瘴ノ地ニ多ク有リ先ツ點ラアラワシ後肉アラワレテ牛  
ノ唇ノ如ク黒ク硬クシテ小サキハ粟ノ如ク豆ノ如ク甚シキハ梅ノ如ク  
李ノ如シ生ズル所定ニラズ或ハ臂或ハロ中或ハ腹脇又手足ノ指  
ノ間ニ発ス赤黒青白ノ色ニ變ニ常ナラズ根深クシテ肌ニ入臂脇ニ走リ  
撻腫ノ筋脉ラツラヌキ肉ラヌシ骨ラアラワシ血ラ出スヘタク癰  
ニハ先ストス病源ノ説ハ脱疽ニ似タリ曰此病ラ得ル者ハ指ラキリ去ル  
其毒ノ臟ニラシラ恐ルト又此症ラ正宗ニテ考レバ甲ノ疽代指ノ類  
ナリトモニ當流ノ癰疽アラズ當流ニテ癰疽ト云フハ指ノ病ニテ俗  
云ツツマバラミノ類脱疽ヨリ甚ダカロキ症ナリ俗ニ通ジヨキタナラ

口傳曰此ノ腫物手足ノ指ニ生ズ形ニ脱疽ト違ニ色赤ク然甚  
シクシテ指ノ先キ透キ通リ腫ニテ艶アルナリ治法ムスラギヂス  
ラ貼シテ其上ラブランドインカニフルラ木綿ニタシ巻クベシス輕キ  
症ニハカニフル許リニテモ良シス洗ヒ桑等アリ

荆芥薯蕷ノ  
桑葉加エシナリ

## ○臍瘡

得龍謂臍ハ脛臍ミメハキラスル所足ノハギニ生ズ  
俗ニキ瘡ト云ア是ナリ一ノ來瘡モ同ジ

口傳曰是レ脾胃ノ湿熱ニ因テ發シス居所ノ濕氣雨露ノ氣ニ  
感ジテ發ス得龍謂ハキ瘡爲來瘡ノ類在此ノ論ノ如シ但シ少シ心得アリ此ノ類  
ノ発スノ九月秋冷ノ比ヨリ出ツを春ニ至リテ生スルモアレドモ多ク歩  
行ナドラシテ足胫ニ風冷ラ帶ナガラ其マヨ熱湯入リ火燒ナドノ火ニ急ニ冷セバ必スカユミ等出テ  
スハ湯風呂火燒ナドノ熱氣ヲ帶ビタル足ラサ行ナドメ急ニ冷セバ治スルアリ此得ニテ養生スペシ  
夫ヨリノ熱ラ起シテコマカキ瘡ラ生ズ春来ノ暖氣至テ或ハ俗ノナラヒツワノ  
葉油紙等ヲ巻キテ溫暖ラ帶ブレバ治スルアリ此得ニテ養生スペシ

其形チ腫物ナドノ如ク形ラナシテハ出テズ惡シノカユク搔キ破フハ  
タリ汁出デロラナシ或ハ小瘡ナドノ如ク吹キ出シテ穴イクソモ明  
キテサシテ深クモナソニニ走ノ間ニシテ肌肉ノ間ラ走ル又雁來  
瘡トモ云但シ雁鳥ノ來ル時分ノ氣候ニ感シテ出ル故ナリ治法  
ハラウメントニテ洗ヒバジリコンニレエギルカニラアトニ色子リ合シ

得龍謂今ハ綿ニ伸テ付ル又付薬色々別書ミ出ス粟崎流モ奇  
三輝膏ト云

## 卅八 ○耳痛停耳

口傳曰腎氣定マラズメ腎經ニ風熱ラ感ジテ此病ラ生ズ治法寂  
早ニ痛ミテ膿成ラサルトキハブランドインカシフルラニ三露ヅ、耳  
中エ入ル、又膿トナラババジリコシラコヨリニ付ケテサシ入ルベシス五倍  
子ラ黒燒キニシホメ、油ミテトキニ三露落テ付クヤウニトクト入ルニ  
治スルアリ奇妙ナリヌラ、リヨアマンドロラニ三露入ルベシ神効アリ

口傳曰冬寒皮膚ラコラシ血氣メク拉斯寒ニ極ツテ然ニ爰シ  
腐レタダルニ及ブ甚シキハ指モ落ルナリ治法生姜ヲ煎ジラウ  
シトカシフル各少ヅ加エテヒノベシ得龍謂是シモ若シ上破レタドレテ  
膿ラナサバデキスティビラ貼ス又至テ甚シキハ燒疽ノ治法ニ同ジ  
法作方得龍謂是俗ニ云フ  
雪ヤケノ治法ナリ

四十

○灸瘡

口傳曰灸瘡ニハキスティビラメイチヤニヌリ付ケ上ニデシスイ  
ブンラ蓋フヌ灸火ノ毒ラ拔クニハテレギルラ貼スベシ得龍謂灸後其  
灸瘡ニナラズ火ボウトリモナク  
イボワズコロヨク火毒ラヌクナリ

四十一

○湯火傷

口傳曰治法デキスティビカシフラアト各等分ニ合メ綿ニ伸ベ貼  
ス若シ皮上ニ水ブクレナドアラバラセツタミテ切り破ブリ膏藥ヲ貼  
ベシ又遍身ラ破ブリ毛ハ膏藥ラ遍身ニハ付ケガタシ兩頭尖ラ  
得龍謂附子ラ兩頭尖トエドモ一取り艾葉ト各等分ニ黒ヤキニシ捻リ  
カケ扱ツヨク痛マバ黒燒ヲ捻リカケタル上エデキスカシラ合方ノ剂  
ラ付ル友山先生ノ曰名古屋玄意ノ秘方ニ牡蠣ラホメ胡麻ノ油  
ミテトキ付ル妙ナリ回春ニハ香色ニアブリコカストアリ得龍謂酒カスヲ黒  
焼ヌ焼酎ニテ煉勘  
金瘡書中ニ曰得竜此ノ所燒所深ク火毒皮肉ニ入黑色有ルハ平針ニテ皮  
肉ヲ搔キ破リ黑血ラ出シバジリコソベレシビタルラ少シ加工平メイチヤ

塗リ付ケ蓋膏茱萸デニスイブンラ付ケ黒血ラ去ルベシ黒色去リテ  
後ハイングエントアトストン欽カニラアト欽ラ付ケテ愈スベシ又藥方  
色々別書ニ見ユ 土集ニ出

四十二

○打身

口傳曰高ヨリ或ハコロビ或ハクジケ或ハ物ニウタレタル等ニ先づ焼酌  
ラ、リヨロザアロニラ、ソヨレリヨウロシノ類ラ三歩一加工強クアタ、メホツシ  
タ、ミ木綿ノ類ニタシ痛所ヲ巻キ置クベシス指ナドラ押シ屈ケル  
ホドノカロキハ引キナラシテデニスイブンラ付クベシス袋折レナラバ  
折レタル所ヲトクト引合セ骨能ク合ニタルカ合ハザルカラチラ以テ  
ウカニ引合セ置キテベニスヒブンラ貼スベシ尤但シトヨロザアロン  
レリヨウロシノ内ラ見合ヌリ置テ膏茱萸ラ貼ス又脇ニモヌバシ  
又強キ打身ハ右ノ如クシタル上ラ醋木綿ニテ巻キ竹ノ簀力  
柳ノ枝ノ簀ニテ巻キ其上巻キ木綿ラ強クスベシ尤日々如此療  
治スベシ師說曰撲チ身ニハブラントインカシフルラ用ニベカラズ意味  
打身ト云フ者内ヨリ傷レ出ル物ニアラザレハ樟腦ノ香氣強ク  
肉裏ラクブル剤アシ、打身ハ兔角寒冷ノ剤ラ以テ瘀血ノ熱ラ  
ス、シムベシ得龍謂打身其マ、治療セバ左寒冷ラ用ニテ血熱ラサマシ瘀血ヲ集マ  
ララフセグ一日二日ノ後ハ集マリタル瘀血ヲ消散スルニ温熱ノ剤宣シ猶此意  
ラ以テ新古輕重内外藥方アリ別書ニ出又金瘡ノ書曰手足ヲ打  
違フ一品タマアリ繪圖ノ如クノ術ニ引キ直シ法ノ如クス

## ○諸虫歎咬傷

曰傳曰真蛇マムシノ喰ミタル其毒内攻スルトキハ人ラ殺ス急ニ其喰  
口ラ針ニテ切リ破ブリ毒血ラ出シ其跡ラ燒酎ラタギラセ針口  
白シナル程タデアラニカニフラアトニ丹巻ラノ燒キ返シラ加工貼シテ  
毒氣ラ抜クベシ

**胤毒**諸虫毒治法モ右ニ同ジス烏賊ウカイノ墨ラ塗リテ痛ラ去ル  
友山先生ノ曰夷堅志ニ徑山寺ノ僧蛇ニ破ラレ百藥効シアラザリ  
シ白芷ホウジノ末ニ丹巻ラノ香ラ少シツ、加工テ摺リ塗リタルニ惡水出テ  
愈エリト云此ノ方ラ極メテ効アリ

獸物ラ喰レタルニモ右ノ如ク燒酎ニテ能クノ洗ヒテキステイトビラ

ホツシニ付テ貼シ上膏藥カサヤクテベシスイブン良シ但シ強クシ喰レタル  
デキステイビニ玉子ノ黃白トモ大ニ交セ合シ右ノ如クニ付ル風犬傷  
モ同断ナリ又然甚シク腫レ強クバ醋毛綿ニテ巻キ置クベシス骨ラ  
アタリタラバ油ナシノデキステイヒラ貼スベシ得童謂是骨ラスユニスナリ又胤ノ咬ミ  
タル荆防敗毒散ニ貝母ラ大ニ加エテタク用ユベシ

西醫之傳染病言其源流

口ア寄生虫病

白ノ子症

鴉片吸食

安乃他格農病發此病者多由產女

以迄於死或因之而死或因之而病又崩死

也因絕子以至兩乳之滿刀插之處半身不隨

半身不隨刀插之處半身不隨刀插之處

