

新訂
增補

和蘭藥鏡



499.2

OT
6

No 3238

12 0 28-1



富士川文庫

3346

新訂增補和蘭藥鏡標目

卷十六

百藥煎

百藥煎
越列幾斯劑
附巴豆

巴豆油

椰子油

爹爾水

模榦

模榦核

模榦

血竭

紫紳

紫紳

丁幾劑

駢鱗血

收斂攝血丸

石榴

没食子

收斂沒石散

樺

秦皮

檀香

白檀

黃檀

紫檀

乳香

阿沒勒

阿黃涼解欬

落葉松耳

檉柳

新訂增補和蘭藥鏡卷十六

孫齊先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

百藥煎 一名阿煎藥 カテ旨ウカテスカ旨ウ 羅 ヤパニセアルデ蘭
榜葛刺等印度地方ニ產スルミモサカテスト云ル

灌木ヲ水ニ煎熬ノ越幾斯劑トシ曝乾スル者ナリ。

樹高三五尺皮厚ク鱗甲狀赭色木材堅固表園白色
裏淡赭或黯赭或黑色枝ニ刺アリ葉合歡狀花五出

萼五齒樣莢ヲ結ヒ仁ヲ收ム製法樹皮及表園白材
火去中心ヲ取り碎片ト爲シ磁罐ニ入レ水ヲ加煮減

ノ三分、一ト濾テ汁ヲ取り煎熬メ凝固シ暴乾ノ塊片ト爲ス。或其濾汁ヲ冷定メ大陽ニ暴シ數攪稠厚ナルニ至リ毛布ニ牛屎ノ焼灰ヲ摺ケ是ニ其稠汁ヲ展ケ稍乾ハ絲ニテ切リ分テ方形ト爲シ又大陽ニ暴乾ス是百藥煎ナリ。木材黑色多ケレハ此藥黒色ヲ帶テ下品トス。○印度地方アレカカテスト名ル樹アリ其實味收濁ス。是ヲ搾汁ヲ取テ暴乾シ或煎熬乾固シ一種ノ百藥煎ヲ製スト云。按ニアレカ櫟樹其實ハ檳榔子ナリ。華云此藥往古此樹ヲ覈知セス或調合藥トシ或土質ノ類トス故ニ日本ノ名アリ然此物水ニ溶化シ火ニ焚消スル故ニ謫質ニメ土質ニ非ス且日本ニ產セス麻刺拔爾。琵琶

牛坎巴牙等印度沿海諸地ニ產ス。○上品ハ乾固疏脆破碎シ易ク粗慥黓赤色裏面帶赤赭色或帶白ノ條理間錯ノ者アリ香臭ナク味收濁メ甘苦ヲ帶其質細密ニメ輕虛ナラス。舌ニ粘著セス盡溶化シ水酒醋及水ヲ雜タル稀キ燒酒ニ溶解メ塗渣少シ是皆謫質ノ徵トス或匙ニ入火上ニ置ハ焚テ渣灰少シ下品ハ右ノ諸液ニ溶メ塗渣八分一生ス是製法忽略ニメ土灰等ノ汚物雜リ若バ姦商他物ヲ雜ル者ナリ或火ニ投シ凝固メ焚消セス水酒等ニ溶化セス里土類出ルハ偽品トス。○榕按和製并漢說ノ百藥煎ハ五倍子ニテ製ス。

時珍綱目說如シ。洋舶輸ス者ハ五倍子製ニ非^フ左ノ譯說ノ如レ但清舶ノ品亦恐ハ五倍子製ニ非ス○藥鋪樂只亭清雅云、阿煎藥五品アリ、即サラタ圓様小圓樣角樣麻刺拔爾ナリ。サラタハ又縮様ト稱メ上品ナリ洋舶ヨリ輸ス。清舶ニ此品ナシ皆扁形ニメ縮紋アリ○圓樣ハ中品トス。清舶齊來ル。形圓ノ外面稈橐或薺糠著者アリ稈橐著ヲ好品トシ薺糠著者是ニ次ク○小圓樣ハ圓樣ノ小ナル者ニ非ス別種ナリ下品ニメ滋味強ク外面灰色裏白色。形小圓ク大李ノ如シ文化八

年冬始テ清舶齊來ル○角樣ハ多分下品トス。方形一寸許布紋アリ是亦清舶輸^ス又一種小角樣ト呼者アリ方形半寸許寛政二年始テ清舶輸ス○麻刺拔爾ハ藥鋪訛テ^スルハ云ト云。文政四年洋舶始テ齊來ル。橢圓大小塊ヲ爲シ大ナルハ長一尺濶六七寸重^ナ三百二十錢。小ナルハ重^ナ四五錢。皆藥鋪ニテ破碎シ一斤^ス分販タ○和製ノ品ハ藥鋪^ス菊屋ト云。往時菊屋某創製ス。今泉州堺酢屋清兵衛日野屋與兵衛是ヲ製ス。五倍子ニ好茶末ヲ和シ蕨粉糊ニテ煉ル者ニメ阿煎

藥ノ偽品ナリ藥用ニ堪ヘス
試効秀偉ノ收濇藥ニノ拔爾撒謨様ノ効ヲ兼ヌ。諸
管纖維弛弱ノ發スル諸病。脫泄失血等。收固シ治ス
ヘキ諸症ヲ治ス。○胃腸虛弱ノ經久下利。努責利。赤
利。婦人崩漏。尿道弛虛ノ久淋白帶下。小便淋瀝不利
及尿崩ヲ治ス。○虛症ノ失血殊ニ吐血嘔血。尿血ヲ
治ス。○冒寒傷冷毒ニ因テ肺虛衰シ淹滯セル欬嗽。
聲嘎等ハ亞刺比亞趨謨ヲ等分ニ加ヘ沙糖四倍ヲ
研和ノ錠トシ口中ニ溶シ用フ。○遷延ノ下利赤痢
ハ此藥半錢ヲ取テ稠厚ノ米粥汁ニ加服ノ効多シ

殊老人赤痢ニ良。○粘液性ノ荏苒タル咽喉焮腫ハ
此藥ヲ漱劑トシ。經久無毒ノ淋疾。白帶下ハ此藥ヲ
適宜ノ液ニ溶シ水銃ニテ尿道ニ注輸ノ捷効アリ
○服量細末トシ十氏呂ツ一刃ヘテ一服トシ泡劑
ハ二錢ヲ沸湯六弓ニ泡出シ服ス或煎劑ニ加用フ
○此藥越幾斯劑。丁幾劑トシ右ノ諸病ニ良効アリ
百藥煎越幾斯劑

製法

百藥煎細末

細末七

水

二十七

右硝子壇ニ内其口ヲ蓋閉シ煖處ニ置浸ス三日放
冷靜定メ塗渣生スルニ至リ紙ニテ上清ヲ濾取硝

子器ニ内、微火上ニテ水氣ヲ蒸散シ凝固セシム

百藥煎丁幾劑

製法 百藥煎 揭碎者
一弓 燒酒 十五度者
二六弓

右硝子壠ニ内其口ヲ蓋閉シ煖處ニ置浸^キ一三日。濾

テ溝ヲ去リ固封シ貯フ。服量一錢ヨリ二錢ニ至ル

百藥煎越列幾劑

製法
百藥煎越幾斯劑

吉訥謨細末三弓桂細末

本草綱目

新樂人赤玫瑰舍利別
十四錢

卷之三

右合和丸
煉膏上

苦ノ口中潰爛ニシ

謨弗刺加斯篤里

痛下利。赤痢。嘔吐。

ヲ消シ催眠發汗

百藥煎錠

製法

製法	百藥煎	越幾斯劑	三	沙糖	十二
亞刺比亞	アラビア	幾斯	二	大	一
亞	ア	斯	二	沙	一
譏謨	アヅム	劑	三	糖	十二
三	弓	二	弓	大	一
沙	トトロ	沙	トトロ	沙	トトロ
糖	トトロ	糖	トトロ	糖	トトロ

右熟研合和シ玫瑰水適宜ヲ加テ錠十爲ス。冒寒傷
冷毒。肺氣管ノ諸症。欬嗽吐血等ヲ治ス。
涅密

外敷 出血ヲ止。口中齦齶腐爛ヲ愈シ疼ヲ止ム ○ 水

銀劑ヲ過用メ吐涎甚キ症。遷延粘液性ノ咽喉焮腫

ニ外敷シ或水。葡萄酒若ハ燒酒ニ水ヲ加ヘ稀シ此藥

ヲ浸メ含漱劑トス ○ 潰瘍弛虛ノ愈難ク及出血シ

易キ症ニ此末ヲ摻シ或洗藥。水銃劑トシ腐壞ヲ遏

水棉樣肉ヲ祛ク

依
叔
華
伍

巴豆油

附巴豆

「オナムコロニス」

巴豆ヲ搾器ニテ搾リ油ヲ取ル黃色辛味香氣微シ

試効 内服。外敷共峻下ノ捷効アリ大抵一滴ノ四分

一。若ハ半滴ヲ内服ノ四分時中ニ快瀉ス。胃腸ニ停止メ腹痛スル遑ナシ故ニ瀉下ノ捷効ヲ要スル症ノ一良藥トス。頑固ノ大便閉或腸ノ運營弛弱怠慢及麻痺ノ大便壅滯スル症。或水腫停水若ハ粘液滯積或血液頭腦ニ攻衝ノ壅鬱シ或睡癡。巔狂等ノ瀉下スヘキ症ニ用。又絛蟲ヲ驅泄スルニ速効アリ。服量一滴ヨリ二滴下テ甘美ノ舍利別等ニ點服シ或此油十滴ヲ亞刺比亞^{アラビア}薑謨^{アラビカ}ト沙糖ニ和シ分テ四十個トシ小錠若ハ丸藥トシ一時毎ニ一個宛服シ或症ニ隨數個ヲ一服トス ○ 此油六滴許ヲ阿利襪

油若ハ亞麻油一弓ニ研和シ腹部或云臍部ニ擦テ能瀉下ス。小兒服藥ヲ嫌者ニ尤良。又能蟲ヲ下ス。

巴豆

ガラ大チギリムガラナモウカ羅

錫蘭馬路古麻刺拔爾共印度地方支那等ニ產スル灌木樹名コロトンチギリム羅ノ實ナリ。其樹枝蘭ノ葉長橢滑澤鋸齒梗アリ一株ニ雄花雌花生シ穗

ヲ爲ス。雄花ハ上梢ニ生シ八瓣十六雄蕊雌蕊ナシニメ萼ナシ雌花ハ下部ニ生シ瓣ナク三雌蕊雄蕊ナシニメ

萼アリ第二十 實ノ皮三稜様裏ノ仁巴豆味辛辣嚼ハ口舌咽喉辛熱焚ガ如シ○樹材根花葉皆味辛辣瀉

下ス 試効

巴豆性焚熱酷厲毒アリ吐下ノ峻藥トシ

往昔多ク用フ然止吐瀉腹痛烈ノ眼眩ニ堪^ス或胃腸燃衝ヲ發スル者多キ故ニ晚近用ル罕ナリ但峻捷ノ瀉下ヲ要スル急劇ノ諸症或水腫急脹ノ停水ノ滌除シ或頑固ノ粘液病及絳蟲ヲ驅泄スルニ服用フ量適宜ヲ用ヒテ間捷効ヲ取ルアツ。或巴豆ヲ熱灰ニ煨シ或醋ニ煮テ其毒ヲ減シ或緩和ノ琶布ニ和シ用フ但醫家總テ妨害ナキ峻下劑ヲ擇用ル故今多ハ此藥ヲ用ヒ不施安叔又外敷取之黃金色和甘

椰子油 オレウム・パルミテ羅

椰子ノ仁ヲ取水ニ浸シ搾取ル油ナリ黃金色味甘。

焦香アリ或云董菜稠厚ニメ酪ノ如シ水ニ滴メ浮ム。

灌敗スレハ白色トナリ佳香脱ス。亞墨利加洲亞

弗利加洲及印度地方ニ產ス或獸脂ニ姜黃及香料ヲ浸シ偽製スル者アリ

試効腹肚硬腫臍脹ニ此油ヲ擦シ布片ヲ蓋貼ス大人小兒病ノ緩急ヲ論セス良効ヲ稱ス○痛風肢節痛ニ外服外敷シ痔痛ニ塗テ痛ヲ止ム○董菜舍利別名ヲ和シ用テ欬嗽喘急ヲ寛解ス

依叔伍
淑華

爹爾水 アクビキスリギイダ 羅

製法

爹爾

製法次出

水

十二比

右調和シ暫攪流シ靜定二十四時爹爾盡ク沈ニ至テ上清ヲ取硝子罐ニ收メ貯フ

依

又法

爹爾

一比

雨水

二比

右壺ニ入鍊匙ニテ攪流スルト八分時靜定二十四時其水黃色トナリ爹爾自ラ水ト分ニ至テ上清ヲ取濾過シ硝子罐ニ入固封シ貯フ

施

試効

蘇亦齊歐羅巴ニテ痘瘡流行スレハ每朝此水

蘇亦齊歐羅巴

國名ニテ痘瘡流行スレハ每朝此水

半七ヨリ一七ハテ小兒ニ與テ痘瘡ヲ免ル或云是
ヲ服スレハ必ス善性ノ輕痘ヲ發ス。故ニ痘流行ス
レハ小兒ノ齡ニ隨ハ大小ノ盞ヲ用ヒ每朝每夜與テ痘
流行止ハニ至ル。或痘中是ヲ服メ効アル說多シ○或
云一家小兒四人其兩兒ハ種痘ス。一兒ハ自然ニ痘
ヲ發ス皆善痘ヲ濟了ル。一兒ハ朝夕爹爾水ヲ服メ
痘發セス故ニ其父是ニ種痘シ且爹爾水ヲ服セシ
ム然正痘發セス。二個月ヲ經テ復是ニ種痘シ爹爾
水ヲ與ス是ニ由テ甚夕輕痘ヲ發セリ○或云往年
惡痘流行一都下ノ兒救活セル者殆ト稀ナリ然ニ

爹爾水ヲ服スル兒ハ痘ヲ免レ或傳染スル者モ初
ニ此水ヲ與フハ皆輕痘ヲ發メ死スル者ナシ○爹
爾水ハ胃虛人諸症ニ內服メ殊効ヲ稱シ胃人頑弛
セル健運力ヲ回復シ飲食ヲ進ム○經久胸肺病喘
急胸水等ヲ治ス○利尿ノ効アリテ結石病ヲ治ス
○頑固淹滯人神經病經久ノ黴毒諸症疥癬ニ屢殊
効ヲ得○服量三四弓宛一服トシ大抵日一比ヲ服
ス○外敷ノ腫瘍ヲ軟化シ膿熟メ潰破セシム創傷
潰瘍ニ貼メ排膿淨刷シ綿絮ヲ浸シ齲齒ニ挿テ疼
テ止ム○松櫟類ニ一種ノ酸性ヲ稟舍ス是火力ニ

由テ爹爾ニ混ニ且、揮發竈透ノ油氣ト共ニ水液ニ和メ精微ノ質ヲ成ス。是ヲ以テ粘稠ヲ稀釋シ凝結ヲ疏解シ小便ヲ利シ蒸氣ヲ發シ腐敗ヲ遏ム是ヲ以テ右ノ諸病ニ偉功アリ。

爹爾

ピキス・リクイダ

羅

諸ノ軟ニメ粘稠流動

スル者ナリ

製法 地ヲ堀リ大甕若ハ桶ヲ埋メ銅鍊版若ハ扁石ニ數孔ヲ穿テ是ヲ蓋トシ其周圍泥土ヲ以テ竈ヲ造リ頂ヲ圓シ是ニ一氣孔ヲ穿チ煙氣ヲ散ス其甕蓋上ニ松櫟等ノ割片ヲ縱ニ積重子火ヲ

點メ焚セハ其材ノ津液ト華爾斯溶解ノ稀液ト固ナリ。次ニ粘稠ノ華爾斯トナリ。共甕中ニ流滴シ其材盡炭灰トナル。其液即爹爾也。香竈苦味諸黑色。是煙氣華爾斯熏焦スレハナリ。其上面ニ稀油浮ム是亦黃爹爾也。曰。右ノ爹爾ハ炭灰等物ノ汚物アル故ニ濾淨潔也。其法。桶ニ鍊網ヲ張リ。火碍橐ヲ疊敷シ是亦爹爾也。注天透漏セシメ淨除ス。首ナカニ繩夫繩斷也。出吳郎爾也。蓋ハ住ス攬煮ニ凝固セシム是即瀝土リ。硬固ニメ碎截

瀝

ピキス

蘭

爹爾

テ

鍋ニ入火ニ上手ヲ

スレハ細屑遊散シ光澤仄ル。上品トス。柔ニメ粘ル。ハ下品トス。火ニ溶ク多煮沸スルハ鹿惡人爹爾ニテ製スル者トス。○詣ヲ蒸餾ノ油出。是拔爾撒謨ノ効アリ。是天拔爾撒謨詣曰ノ。○天造爹爾アリ。萬嶋亞細亞洲。嶋名巖石罅隙中火流出ス。舶ヲ塗ルニ用フ試効外敷メ軟化解凝化膿。外効爹爾外敷ト同シ外科多硬膏ノ料ニ用フ。尋常華爾斯。ハルス。是亦松樹類ノ幹ヨリ自然ニ流固スル者ハ橙皮色邊透亮。香氣格碌波尼亞ノ如シ尋常華爾斯。ハルス。是亦松樹類ノ幹ヨリ自然ニ流

滴シ或鑽刻メ取ル。其汚物ヲ淨揀セル者亦橙皮色ヲ爲ス。或水ニ煮天麻布囊ニ内絞瀝ス者ハ黃色若ハ白色ナリ。或是ヲ格碌波尼亞。名トス。格碌波尼亞。ハルス。尋常華爾斯ヲ煮テ製ス。赭色透亮。硬固疏脆。火ニ温メ若ハ指間ニ摩メ香氣生ス。或華爾斯ヲ蒸餾メ的列竝油ヲ取タル滓ヲ以テ製ス。或云華爾斯ニ水ヲ加ヘ火ニ溶メ赤色透亮トナリ。的列竝ノ香氣消スル者ヲ格碌波尼亞トス。黃華爾斯。ハルス。ハニニ此樹未詳。其幹ヨリ流滴スル華爾斯ナリ。藤黃ノ如ク手ニ染著セス。○右

ノ華爾斯類。性功總テ諸ト同シ

涅
拔
僕
依
羅
淑
華
施
叔

楨榦

「ククリン」和 「セイドニア」
○ 暖持同種實圓キヲ楨榦トシ 稍長キヲ楨榦トシ多ク藥用トス

試効 性收斂清涼ス。實ノ絞汁清涼滋潤強壯シ生氣ヲ活潑ス。壯熱病。腐敗熱。神經熱等ノ輕キ衝動強壯藥トス。○ 楨榦膏。楨榦舍利別。甘美清爽ニノ滋養潤補シ胃腸ヲ強健シ。惡心嘔吐ヲ止。飲食消化ヲ進メ諸脫泄。吐血。勞歎。下利。血痢。膽液病等殊効ヲ奏ス。

楨榦膏

「クリーベル・ベルメラード」

蘭

製法

楨榦ヲ取テ皮ト沙穰ヲ去リ姜擦子ニテ擦

シ布ニ包、絞、濾テ汁ヲ取、靜定メ沈渣ヲ去、上清三七ヲ取、又其皮ト沙穰ヲ水ニ煮テ其汁一比ヲ取、絞汁ト合シ沙糖三比ヲ攪和シ文火ニ上手ヲ住ス攪セ徐々ニ煮テ水氣ヲ蒸散シ稠厚トナルニ至テ放冷シ硝子壠ニ貯、固封シ貯フ

又法 楨榦肉擦屑ノ絞汁一斤。其皮及沙穰ノ煮汁一麥酒盞_{二合}許。楨榦肉右汁ノ四分ノ三分ヲ加、煮テ肉軟ナルヲ候ヒ粗毛篩ニ内、磨ノ瀧シ其汁ニ沙

糖一匕ヲ攪和シ文火ニ上手ヲ住メス攪セ煮テ稠厚トナルニ至リ放冷シ硝子壠ニ内貯フ

楡榔膏複方 「エーベーン・ゲコンヘイ」

製法 楡榔膏三弓 桂末 亞刺比亞謨各四錢

楡榔舍利別 次出 適宜

右調和シ煉膏トス

楡榔舍利別

「ミハセドニラム・ロ・ロ・シローブ・ハシ・クエーベーン」蘭

製法 楡榔絞汁ノ沈渣ヲ去テ上清ヲ濾テ十六弓ヲ取リ沙糖二匕半ヲ攪和シ慢火ニ上水氣ヲ蒸散シ舍利別ノ稠ト爲ス (涅)

○楡榔絞汁ハ能鍊屑ト合和ス。故ニ鍊屑ヲ加テ丁幾劑トシ用テ輕衝動強壯シ諸管縱緩粘液留飲壅滯ノ症。或神經感觸甚メ藥劑ニ堪サル症ハ此劑ヲ服メ收固強壯シ或經久淋疾。收濤劑。拔爾撒謨劑。驗ナキ症ヲ治シ總テ鍊劑ヲ用テ強壯スヘキ諸病ニ秀偉大効アリ服用量三十滴ヨリ六十滴ニ至ル。

楡榔加鍊丁幾劑

「エスルキテ・ア・ル・テス・セイドニア・タ・ロ」蘭

製法

鍊粉一弓 楡榔汁三弓

桂精

十六弓

右鍊粉ヲ楡榔汁ニ和シ數日浸シ時々攪滾シ鍊鍋

ニ煮テ半ヲ減シ濾テ上清ヲ取り放冷ノ桂精ヲ攪

匀シ硝子壠ニ内封シ貯フ

楨楂核

〔セミタセイド〕核ノ皮多ク粘液ヲ含リ是ヲ

水八倍ニ浸シ絞ハ粘液トナル○收濁清涼シ内服メ酷厲液ヲ緩和シ吐血。肺傷。及歎嗽ヲ治ス○止痛愈創ノ良藥トス。咽喉簽痛。口中齦頸剥爛腫痛。鶩口瘡ニ含漱シ或塗敷ス○皮膚剝傷。唇ノ燥裂。乳頭ノ毀傷及痔痛ニ塗テ焮腫ヲ緩解シ速ニ治ス○焮腫眼ニ捷効アリ玫瑰水ニ加。眼ニ點ス○腸。酷厲液アリテ裏面剥爛シ腸痛。血痢。努責痢ヲ發スル症ハ是

ヲ吉利詞爹兒トシ施メ治ス○右ノ諸症後方甚。驗アリ

楨楂拔爾撒謨

楨楂核粘汁

一弓

阿利禱油 或甘扁桃油

白蜜

二弓

右調和ス。阿利禱油 四錢

又方

楨楂核汁

一弓

阿利禱油 醋 各六錢

右調和ス。乳頭坼裂。唇燥揭等ニ塗テ尤良

〔施叔漸涅〕

絲下論女疾見圓寶

血竭 駢鱗血

〔サングイス。ダラコニス。ローラード蘭〕

〔形状〕

三種アリ。第一種ガラミウス。ロタングト名クル

蔓木薜藤一種ノ實ヲ以テ製ス。其蔓柔撓ニメ遍^ム、尖刺アリ蔓延ノ曲ニ傍樹ニ糾繆シ樹ヲ伐サレハ其蔓ヲ採^ル能ハス是ニ圓實ヲ結、熟スレハ血紅色ノ華爾^ス滲出ス是ヲ取テ血竭ヲ製ス依云眞品ハ是斯^ト以テ製ス。印度地方ニ產ス○第二種ハルミス・ダラコト名^クル樹ノ實ヲ以テ製ス樹高^{一丈五六尺}幹太^サ腕ノ如シ枝莖叢生シ遍^ム尖刺アリ中心白髓アリ食ハシ葉ハルム樹柳樹・桃榔樹・檳榔葉ノ如ク羽狀ニメ蘆ノ如シ長^{六七尺}梗ニ刺アリ花六瓣。六雄蕊。一雌蕊第六綱第一目萼六出。圓實ヲ結、攢簇ス。赭赤色。鱗甲狀松毬ノ如ク

榛子ヨリ大ニノ肉及^ヒ核アリ味甚收濬ス熟スレハ肉ヨリ血赤ノ華爾^ス液滲出ス是ヲ取テ血竭ヲ製ス。此樹亦印度地方ニ產ス○第三種ダラカーナ・ダラコト名^クル樹皮ノ華爾^スヲ取テ製ス。樹高^{中等ノ}松櫛ノ如ク幹巨^ク差勾屈シ頂ニ至テ八九枝ヲ分チ各二三尺許。繖狀ヲ爲シ其頂又各三四枝ヲ分チ厚ク龍舌草ノ如ク數葉相抱テ開展シ繖ヲ爲シ澗一母横徑許。長^{一尺半許}末尖テ刺ノ如シ葉脊壘起シ梗ニ刺アリ花枝頂ニ生ス。六瓣。六雄蕊。一雌蕊第六

綱第
一目 莓ナク圓實ヲ結ヒ大ナル櫻實ノ如シ葡萄様ニ攢簇ス淡黃色。酸味ヲ帶フ。幹材堅固。皮粗糙坼裂ス。枝柔テノ液多シ此樹。カナリア亞嶋洲アフリカ二產此一種葉羽狀花蛾形ニノ莢ヲ結者アリ。南亞墨利加洲ニ產ス

血竭製法 第一種第二種ノ血竭製法ハ濶大人磁孟ニ半水ヲ入鍊網ヲ載セ此樹實適宜ヲ取テ網上ニ置蓋ヲ覆ヒ火上ニ置ハ沸湯ノ蒸氣ニテ其實融解シ血赤色ノ華爾斯液滲出ス是ヲ取集テ小圓塊ト爲シ此樹葉ニ裹乾固ス或實ヲ搗爛シ若ハ布囊ニ

内搾テ其華爾斯ヲ取小圓塊ト爲ス或實ヲ水ニ煮テ其汁ヲ火ニ上セ水氣ヲ蒸散ノ凝固シ製ス或其華爾斯ニ右ノ滓ヲ雜テ大塊ト爲者アリ是下品ニノ藥用ニ堪ス○或云實ノ據フ取搗碎キ搾テ華爾斯ヲ取溫テ小圓塊ト爲シ葉ニ裹ミ或其搗タル核ヲ水ニ煮テ上面ニ浮ム華爾斯ヲ取餅塊ト爲シ或右ノ滓ヲ搗雜ル者アリ○第三種ハ夏月血赤色光澤アル華爾斯其樹幹ヨリ滴瀝ス或其皮ヲ鑽刻ノ取ル是ヲ其樹葉ニ裹榛子大ノ圓塊ト爲シ販ク榕按以渡ノ小粽樣ト呼フ者或汚物ヲ雜テ餅樣ノ大塊

ト爲者アリ下品ニノ薬用堪ス按ニ藥鋪挽蘇
門答刺ノ東濱渤海ノ南地共亞細亞洲多ク上品ヲ
產ス○和蘭藥局ノ品ハ皆第一種。第二種ノ樹實ニ
テ製スル者ナリ。樹皮ヨリ取者ハ和蘭ニ輸入罕ナ
リ○上品ハ圓或圓長。大胡桃若バ肉豆蔻ノ如ク黒
血赤色光澤アリ質固ク疏脆。研末スレハ朱砂ノ如
ク香味ナク火ニ投ノ焰ヲ發シ蘇合香ノ氣アリ水
ニ溶化セス燒酒油類ハ盡溶化ス或云其質華爾斯
以テ大塊ノ者ハ下品トス。扁圓ノ塊秤量一二弓アル
者ハ血竭ニ趨謨類ヲ加蘇木ヲ雜テ赤色トシ僞。

者ナリ火ニ投ノ焰ナク膨起ノ焼化ス
試効性收濇乾燥シ止血ノ峻藥トス内服ノ劇キ脱
血。下血吐血。虛脫ノ下利等ヲ治ス○枯礬ヲ加用テ
收濇ノ峻劑トス。稀涼ノ血液ヲ收回ノ稠粘トシ諸
脱泄過多。婦人崩漏。下血等ニ捷効アリ但血过多
虛脫ノ症ニ用ヘシ壯實多血ニメ發スル症ハ先刺
絡下劑等ヲ施メ効ナキ者ニ用ヘシ。後方尤良。

收斂攝血丸

半
血竭末一錢

適宜

枯礬末三錢

右調和メニニ氏ヲ一丸トシ朝夕五丸宛服ス。劇症ハ半時ニ一丸或二丸宛與フ斯○血竭ハ收濇ノ偉効アレ。正晚近人醫家多々ハ阿煎藥。吉諏謫等ヲ以テ代用シ尤良効アリトス。○外敷ノ創傷潰瘍ヲ乾愈シ揩齒藥ニ加テ齒ヲ固メ斷ノ弛弱ヲ治ス依淑涅
斯叔華

紫紳 ギムミラカ 羅 ゴムラカ 蘭

形狀 印度地方ノコロトンラシヘル樹名ニ生スル白蟻 アリ 體赤色其枝條ヲ刺蝕メ滲出セル謫華爾斯 ス或云華爾斯質液ノ凝固セル者ナリ蟻其華爾斯ヲ以テ窠

ヲ造リ卵ヲ蕃息スル。宛蜜蜂ノ蟻ノ如シ。○是ニ三種アリ其一ハ枝條長一指許ノ周圍ニ著テ黯赤色ナリ其二ハ右ノ枝條ニ著者ヲ取テ汚物ヲ去。黃赤色ノ小粒ト爲者ナリ。其三ハ顆粒ヲ溶ノ版様ノ扁片ト爲者ナリ或一種耳形ヲ爲ス者アリ。○紫紳ハ亞爾箇兒ニ溶化シ火ニ投ノ佳香アリ硬脆ニノ赤色ヲ帶微透亮。嚼テ津唾紫赤ニ染ム。暹羅琶牛印海國名殊錫蘭南海產ハ上好ニタ美赤色淨潔ナリ。封印蠟ヲ製シ漆トシ器械ヲ塗ニ用フ植學啓原出試効緩性ノ收濇藥トス。漱藥トメ咽喉弛腫。斷ノ虛

脆出血ヲ治シ搖齒ヲ固ム○失禁兒陪苦口中諸症

ハ丁幾劑トシ通用ス

紫紳丁幾劑

紫紳四錢
桔梗一錢

右硝子罐ニ入山薺菜精八弓ヲ加、緩處ニ置テ紅色トナルニ至テ濾過シ數滴外水ニ和シ含漱藥トス然此藥ニ比スレハ沒藥及沒藥丁幾劑尤効アル故近來用フ稀ナリ

依淑伍

其三

石榴根ガラ大多山

羅根ガラナト

蘭

試効根皮ハ條蟲ノ一經驗藥トシ殊効ヲ稱ス。細末

トシ小兒ハ一刀。大人ハ二刀。宛四分時毎ニ服ス或此皮ニ弓ヲ水煎シ濾テ十二弓ト爲シ適意ニ飲服ス○實ノ皮。收斂清涼ノ一良藥。トス收濁藥適應ノ諸病。凝體諸管ノ弛弱ノ發スル下利。血利月經過多崩漏。諸脫泄ノ諸症ニ内服シ。又苦味收濁ノ幾那ニ代用シ間歇熱ノ治ス○咽喉焮腫。懸壅垂弛腫。口中斷頸潰爛。及脱肛等ニ此皮ノ水煎若ハ泡劑ヲ漱藥。蒸湯劑シ治ス○實ヲ舍利別トシ實ノ絞汁ニテ製如水ヲ加テ適意ノ酸味トシ冷服メ熱病ノ清涼飲トシ用テ煩渴方止。燥涸ヲ潤シ清涼解熱ノ効ヲ

稱ス○此皮水煎。泡劑。浸劑トシ用。或散劑トシ一錢
テテ用。舍利別ハ四錢。宛用フ○石榴花性効實ノ
皮壳ト同メ差緩ナリ。淑依福
齋譜。文獻。本草。水經。通志。附錄。卷
沒食子。カルエタレシナ。羅。カルノイテニ。蘭。
形狀 榔ノ一種ヘルヌエイケ。名ルクス。イン
類ノ葉及花葉人梗ニ生ス。膜翅類。蜂類。四ノ其雌蟲人尾尖一鉤アリ
種ノ蜚蛾。人生ス。膜翅アリ。其雌蟲人尾尖一鉤アリ
是虫以葉及嫩枝莖梗ヲ刺蝕シ其孔ニ一小卵ヲ
生シ津液是ニ滋溢シ漸盈脹ノ一塊腫トナリ。其卵

ヲ包容ス。是即没食子ノ基趾ニメ卵ノ子宮ニ在カ
如シ。其小塊日增息シ漸硬固トナリ。卵孵化メ蟲ト
ナリ。小蛹ヲ作り翅ヲ生シ其壳ニ蛀孔ヲ穿テ飛去
ル。是没食子ノ蛀孔ナリ。然て蟲其裏ニ在テ死スレ
ハ蛀孔ナシ。亞列波_{亞細亞}得里步利_{亞弗利加}等都
兒格人地方。煖國人產ヲ上好トス。歐羅巴洲亦產ス
レ。下品ニメ藥用ニ堪ス。○沒食子ハ形圓大鵠卵
ノ如ク大小輕重一ナラス。疣瘡及微痏アリ。是其附
著セル梗痕ナリ多ハ蛀孔アリ。香氣ナシ味甚收濬
ス。樹ニ在キハ赤色ヲ帶ヒ乾ハ赭色トナル。或黃赭

灰白或青綠黑色ヲ帶フ上品ハ大メ硬固充實シ重
ク赭黑ニメ青色ヲ帶或黃黑色疣瘡様ノ稜起アリ
蛀孔ナシ其裏多ク腐蝕シ或濕氣ニテ敗壞スル者ハ
ハ輕虛ニメ蛀孔多ク性効亦弱。能充實スル者ハ
自青色ヲ帶フ故ニ姦商間青色ニ染販者アリ
○榕按ニ没食子和產ナシ性効五倍子ノ如シ闊
ルニ逢ハ代用スヘシ。舍密家沒食子ヲ乾餾メ輕
軟白綿ノ如土者ヲ製シ是ヲ沒食酸ト名ケ溫泉
等ノ金屬質ヲ試ニ用フ。曾テ試ニ五倍子ヲ乾餾
メ輕軟ノ白絮ヲ得タリ是ヲ以テ鑛泉ヲ試ム。沒

食酸ト差異ナシ其說略植學啓原ニ舉ク
試効多沒食酸 凡植物ノ收濬性ハ皆此酸ヲ含ムニ因ル ニ由テ性甚

收濬ス。下利諸脫血等。收濬藥的當ノ症ニ用フ。○體
中各部弛弱人諸症。頑固ノ下利。婦人崩漏。白帶下等
ハ鍶性ノ藥添加用。天効多且喻。ハ後方々如シ

收斂沒石散

血石末

沒食子

木

各一弓

右合和ノ散劑ト指環ニ抄宛舍利別ニ加。一時
毎ニ服ス。○聞歇熱飲食消化シ難ク酸敗液多キ症
此藥ヲ以テ幾那ニ代用メ熱ヲ増發セス良功ヲ
奏シ且胃虛罷ノ酸敗液ヲ生スル故ニ胃ノ纖維ヲ

收固強壯ノ熱毒ヲ驅逐セシム。但初發ニ用レハ胃腸ヲ壅塞シ病毒ヲ閉滯ス。故ニ能熱毒ヲ驅除メ後用ヘシ服量末トニ半錢亦可用也○外敷メ虛弱ノ潰瘍寒壞疽等ニ此藥四錢ヲ水煎メ十二弓ヲ取り服メ大効ヲ稱ス○此末ヲ家猪脂ニ研和メ軟膏トシ盲痔ノ劇痛孕婦人痔痛脱肛等ニ擦テ甚験アリ又槲皮主治ノ諸症ヲ治ス

穴依叔

外敷法附用法此藥當入瓶中置之風寒時取

樟

カバノキ

和ベカラ

羅ベル

ケンボーム

蘭

試効春月新芽生スル頃幹ノ上部ニ一孔ヲ穿チ管

ヲ挿シ壇ヲ接シ置ハ水ノ如キ津液滲溜ス是ヲ細頸硝子壇ニ入頸テ充シメ其上ニ新鮮ノ阿利禪油ヲ上口テ充テ固封シ冷處ニ貯ハ大氣竄透セス一年モ損敗セス○此液淡味ニメ其氣微嫌ヘシ枝ヲ伐テ出ル液ハ微酸ヲ帶フ此液日九比或十七出ト云○内服メ小便ヲ利シ血中汚液ヲ淨除シ微瀉利人効アリ水腫及黃疸ニ治驗多シ○此液石鹼質アリテ能鬱毒ヲ疏解シ皮表ニ驅發ノ瘡疹ト爲ス。故痛風傷冷毒痛肢節拘急不遂或神思鬱憂病勞瘵等ニ効ヲ稱ス○疥癬類汚穢瘡瘍總テ瘙痒諸惡

瘡ヲ驅發メ治シ面部小皰汚斑ヲ消ス○石淋結石ヲ挫泄スル一良藥トス毎日一盞宛服ス○失苟兒陪苦ヲ治シ漱藥トメ斷頸ノ潰爛ヲ淨刷ス○此液殺蟲ノ効ヲ稱ス毎日服メ多ク蟲ヲ下ス葉ヲ越幾斯劑トシ服シ或此樹皮ヲ黑灰トシ小兒ノ臍ニ貼メ蛇ヲ下ス○木材皮葉皆水煎シ内服外敷メ鬱毒ヲ驅發シ汚血ヲ淨刷スル。此液ノ如シ○嫩葉ハ殊黃疸ニ効アリ。一老婦數黃疸ヲ患ヒ毎發卒ニ心下苦悶惡心嘔吐發熱右脇下刺痛シ終ニ下利ス。每次排ノ嫩芽ヲ麥酒ニ煮テ服シ治ス。然モ無幾復發ス。

因テ軟化ノ吉利詞^{ハナレル}爹兒ヲ施シ。阿利襪油十醋ヲ合メ胃部ト右脇下ヲ蒸湯シ。毎日甘扁桃油ヲ與ヘテ勉テ摩急ヲ縱弛シ拘痛ヲ緩解ス。是ニ由テ大便幾多人結石ヲ通メ全愈セリ。是膽若^クハ總管ニ結石窒塞ノ摩急セル者緩解ノ通泄スルナリ○或云葉ヲ炒テ末トシ水ヲ加テ灰汁十滴顫顫^ハ擦スセハ鬚髭ヲ生セス○樽桶ハ止血藥トス創口出血痔血等ニ外敷シ衄血ハ其末ヲ鼻中ニ容テ治ス

淑物

羅叔

秦皮

アラキシエス

羅

モセンボームエス

蘭

試効樹ノ裏皮。白色乾_ハ、黃色_ヲ帶入味苦。收濇ス。汗ヲ發シ小便ヲ利シ間歇熱ニ偉効ヲ稱シ是ヲ以テ幾那ニ代用ス。煎劑泡劑トシ或散劑トス○木材性收濇末トシ貼ノ創ヲ愈シ出血ヲ止ム或云煎劑トシ用テ黴毒ヲ治スルト朴窟福烏鵲_{ホウク}ノ如シ○或云此樹ヨリ出ル汁蝮蛇咬ノ解毒藥トシ大効アリ。是ヲ外服シ葉ヲ創ニ貼ス○或云綠枝ヲ取り焙_ハ津液其端ヨリ流出ス是ヲ耳中ニ滴メ傷冷毒ノ耳聾ニ速効アリ○子ハ小便ヲ利シ水腫ヲ治ス。或云此子每朝半錢ヲ葡萄酒一盞ニ加服ノ速ニ小便ヲ利

シ水腫黃疸ニ試効多シ

伍 液

檀香

サニダルム 羅サンデルホウト 蘭

野○按ニ檀ハ總名ナリ。印度サニダム_{サニダーナコ}大シト名_ク。漢人是ヲ音譯ノ旃檀。櫟檀。真檀ト稱ス

白檀 サンダムアルム_{サニダーテ}羅

黃檀

サンダムシトリヌム_{サニデルホウト}蘭

產地

二種アリ一種ハ印度地方。殊ニ地木兒_{モレ}鳴ニ夥

々產シ。

又馬路古諸嶋_{共印度地}方南海嶋

瓜哇邊ノ嶋ニ產ス

一種ハ亞墨利加洲ニ產ス

林樹人吸_ハ煙草ト

形狀 印度地方ノ樹ハ高胡桃樹ノ如ク數枝ヲ分。葉

十字様ニ對生シ。梨葉ノ如ク綠色。長四指横徑許。濶三指橫徑許。老樹葉黃色ヲ帶フ。花單瓣。鐘樣四出。黯紫色。八雄蕊。一雌蕊。實ハ櫻子及老利兒實ノ如シ初綠熟ノ青黑色。味淡ナリ。○亞墨利加地方ノ產ハ樹大約一丈五尺許。枝ヲ分チ。葉橢圓。末微尖リ。黯綠光澤。長三母橫徑。葉本花攢簇ノ車輪狀ヲ爲シ芳香愛蜜スヘシ。六瓣。五雄蕊或云六雄蕊。一雌蕊。萼六出。子圓。微稜アリ。紫色。二室アリ。卵圓ノ仁ヲ收ム。○樹幹ノ中心ハ黃檀トシ。表材ハ白檀トス。本草啓蒙云黄色。白檀ト呼

七 檀ナリ。外黃ニノ外白ノ者アリ。白キハシラタト呼下ス。○黃檀ハ重實ノ光澤淡黃或曇黃色或微赤理ヲ帶フ。味微苦。佳香アリ。摩擦シ若ハ截ハ芬香ニメ薔薇麝香。拘繩ノ香氣ヲ合スル如シ。或云根亦香トス。或黃色。鷄子黃ノ如ク微赤ノ脉理ヲ帶テ烈香アルヲ上品トス。○白檀ハ白色重實ニメ微香氣アリ。ヒ香生ス。○或云地木兒嶋ノ嫩木ハ白色ニメ香氣アリ。ナシ年ヲ經ニ隨ヒ中心黃色トナル。或云地木兒嶋ノ北地ハ多ク黃檀ヲ產シ支那及印度諸國ニ輸ス。

○或云瓜哇嶠ノ產ハ皆白檀ニメ下品多シ。

試効 白檀黃檀共ニ用フ。黃檀尤効アリ○血液ヲ稀釋シ汗ヲ發ス泡劑トシ用ヒテ冒寒、傷冷毒ヲ解散ス。黴毒ニ水煎トシ用ヒテ汗ヲ發シ小便ヲ利シ其諸症ヲ治ス。或云杜松○頭腦ヲ健運シ精氣ヲ活潑シ頭旋眩冒心動悸ヲ治ス○稠血ヲ稀釋シ脾病依剥昆塙兒ニ効ヲ稱ス○一錢半ヨリ二錢ヲ取煎劑トス。或末トシ一錢ヲ用フ○此藥佳香ヲ賞シ多ク香料ニ用フ○水ニテ黃檀ヲ蒸餾シ油ヲ取ル。冷レハ稠厚トナリ香氣龍涎香ノ如シ。燒酒ニテ蒸餾スレ

八佳香ノ華爾斯出フ。皆香料ニ用フ

紫檀

チタニ印度地方通稱
印度人音譯紫檀

穀羅滿塙兒等印度沿海地方ニ產スル一種ノ樹ニ

メ檀木類ト異ナリ性收濁止血藥トシ或下利血痢

等諸失血ニ内服外敷ス

依叔僕華

赤道東南諸島大森林中所生

乳香增ベスチキースチクス 羅

猶也皆入

不識矣

形狀

乳香樹ビスタシアレンチスク灌木多枝柔撓

柳枝翠如シ。皮灰白。伐ザレハ中等ノ樹トナリ葉兩

對。甘草葉ノ如玉冬月凋々ス硬固黯綠。梢十葉ナシ
 莖帶赤。佳香。味收濇微酸。或葉ニ小囊生シ裏ヨリ蛾
 飛散ス。葉本細花攢簇メ穗ヲ成シ苔ノ如シ淡紫或
 赤色ヲ帶フ。子大豌豆ノ如シ初綠熟ノ紫赤終ニ黑
 色。酸味ヲ帶フ。或云花ハ子ノ結ハ油多シ核黑色微
 長。裏白仁アリ。○此樹印度南海西阿嶋ニ多生シ上
 品乳香ヲ輸ス。又意太里亞伊斯巴尼亞西齊里亞蘭
 牛鐸古福。撈察波爾杜瓦爾ニ產ス。○樹幹ヲ鑽刻メ
 華爾斯流滴シ顆粒ヲ成ス。或云葉ヨリ大小一大ラ
 ス。上品ハ乾固疏脆ニテ破碎シ易ク汚物ヲ雜ヘス
 試効性收濇。酷厲毒ヲ緩和シ疼痛ヲ止メ吐血。赤痢。
 下利ヲ治シ健胃ノ効アリ。○冒寒傷冷毒ノ咽喉胸
 肺諸症。痰欬等ヲ治ス。○痛風傷冷毒痛。齒痛ヲ治シ
 口中斷頸ノ潰瘍ヲ淨刷メ乾愈ス。嚼テ齒斷ヲ固メ
 口臭ヲ去ル。○末トシ一刀宛飲液ニテ送下ス。或是
 ヲ火ニ投メ薰藥トス。依物。叔華。叔物。淑。

阿沒勒

「カッシア」カッシア・ヒスチラ・羅

產地

阨日多黑地元皮亞

共二亞弗利百兒西亞亞辣比

亞西里亞

瓜哇麻刺拔爾

加洲國名細亞二產ス。亞墨利加

洲ノ安知列諸嶼ニ夥產スレ

臣國名皆下品トス

形狀

此樹是亦幹枝葉共

胡桃樹ノ如シ葉

橢圓ニメ尖リ滑澤。大抵一莖五對著。或六
葉ノ如ク或莖梢刺トナル花薔薇様。五瓣黃色。數多
攢束シ或長穗一尺半許懸垂ス。十雄蕊。一雌蕊第十
綱第十一目。花後莢生ス。圓長一二尺許。最大ナルハ三四尺許。
太拇指許。或直或勾。橫理及兩縫際アリ。初綠漸熟メ

硬固赭黑。周歲凋落セス數個懸垂ス。是阿沒勒ナリ。
其莢ヲ割レハ膜様ノ横隔數房ヲ爲シ各黑赭色ノ髓
アリ是ヲ藥用トス。髓中核アリ扁圓微尖。點赭色○
新鮮上好ノ莢ハ黑赭。滑澤充實ノ重ク。蛀刺ナク振
テ響鳴ナシ。鳴者ハ髓枯燥シ或腐敗ス。髓ハ腐敗シ
易キ故ニ新鮮ノ品ヲ擇ヘシ○上好ノ莢ヲ割ハ髓
粘潤黑色。光澤アリ軟ニノ流動セス乾枯セス味甘
毫モ酸味ナク澁敗セス黴臭ナシ○姦商陳久乾枯
ノ莢ヲ水ニ浸シ膨脹メ響鳴ヲ止販ク者アリ故ニ
割テ驗スヘシ○其髓ヲ取ニハ莢ヲ溫湯ニ浸シ髓

ヲ取テ鉢ニ入木杵ニテ搗爛シ毛布ニ入沸湯少許
加テ匙ニテ徐々ニ押擦テ透漏セシメ適宜ノ稠ト
爲ス。但是ヲ煮テ製スルノ勿レ其味變敗ス。或沙糖
ヲ加、舍利別ト爲セハ貯テ速ニ腐敗ス。

試効 體味微甘清爽粘滑。輕瀉下シ小便ヲ利シ血ノ
運行大過ヲ抑制シ煥熱ヲ涼解シ。膽液腐敗ノ酷厲
毒ヲ疏滌シ煥衝性ノ熱病ニ用テ清涼緩下ノ良藥
トス。性効答末林度〔名〕ノ如シ。又腎膀胱ノ病ニ効多
シ○服量一弓ヨリ二弓ニ至ル。或他藥ニ加用フ。小
兒ハ一錢ヨリ三錢ヲ與フ。或溫湯若ハ煎劑ニ溶用

或瀉下吉利詞〔スヤウ〕爹兒〔テイユル〕トシ良効ヲ稱ス。但是ヲ用テ腹
痛風氣痞悶スル者ハ適宜ノ香竄藥或中和鹽類ヲ
加ヘシ○或云此藥性梅李肉ノ如シ熱國人ハ毎日
食前ニ一匙宛用テ燥涸ヲ滋潤ス○胃腸熱ノ膽液
酷厲毒ヲ滌除スルニ是ヲ下劑ニ加テ殊効アリ喻
ハ後方ノ如シ

阿黃涼解飲

阿沒勒髓

答末林度

各一弓

蘇甘沒扭謨〔名〕

八錢

右調和メ煉膏トシ瀉下ノ多少ニ隨ヒ半時若ハ四

分時毎ニ一卵匙宛用フ

華淑叔
窓依伍

大黃

落葉松耳

「エブリコ」通稱

「アガリコス」羅蘭

○榕按半蝦夷產落葉松ノ柄ナリ藥鋪「エブリコ」

ト呼販久西說云大者人頭ノ如ク小者拳ノ如ク上面白黃緒ノ輪紋アリ下面遍針眼アリ上品ハ裏雪白輕虛味苦辛嘔スヘシ外膜ヲ去曝乾ス極細末ト爲ニハ亞刺比亞^{アラビア}藪謨漿或糊漿^{ハグマ}加搗テ泥ト爲シ乾固ノ研末ス

試効性收濁粘液留飲膽液ヲ瀉下ニ小便ヲ利シ經

閉ヲ通ス○痛風傷冷毒痛ノ諸症及冒寒傷冷毒ノ粘液沬^{ウツ}ヒ頭胸ニ壅塞スル諸症ヲ治シ神思鬱憂病脾病黃疸ノ汚液ヲ疏滌ス○散劑ハ半錢ヨリ一錢用ヒテ瀉下ス或泡劑浸劑トシ或越幾斯劑トシ二刀マテ用フ但速ニ瀉下セス惡心腹痛スルトアル故ニ桂丁香乾姜益智等ノ香竈藥ヲ加用ベシ○或云此藥漏汗ヲ止ニ殊効ヲ稱ス勞瘵様ノ消耗汗モ止ム功ナキ症ハ幾那ニ乳汁ヲ兼用メ良

叔依伍

檉柳

一名御柳

「タマリヌクス」^{タマリス}吉ス
ガルリカ羅「タマリスボーム」蘭

試効樹皮及根ヲ用フ。材及葉亦効アリ性收濁ス。汚液ヲ淨刷シ小便ヲ利シ風氣ヲ驅散ス○内藏壅塞諸症。痞氣鬱塞脾病白帶下。水腫。黃疸ヲ治ス○疥癬。乾癬。禿瘡等總テ皮膚ノ諸症ヲ治ス。水煎外服ス○含漱劑トシ齒斷潰爛ヲ治ス○或云此材ヲ水煎シ

徽毒ヲ治スルコ刹窟福鳥篤ノ如シ

依僕伍物

新訂增補和蘭藥鏡卷十六

終

新訂增補和蘭藥鏡標目

卷十七

木賊

拳參

拳參健胃丸 黃參收斂丸 拳參越幾斯
劑 拳參丁幾劑

麥奴

蘭草

蘭橙解疑飲

山箭菜

附沙蘿蔔 山箭菜精 同上複方
山箭菜舍利別 同上複方 昆設爾弗

碎米薺

碎米薺昆設爾弗

水萬能

艾根

艾葉

石松 石松驅尿飲

柳葉菜

大蓼

大蒜

蒜橙驅水飲

忽布

忽布越幾斯劑

微麥粉治

參參

參參丁參清

木娘

參參對胃丸 貴參丸

參十五

前記解和蘭藥鏡註

新訂增補和蘭藥鏡卷十七

擗齋先生譯述

男

宇田川

榕

榕菴校補

木賊

「エグイセテム」

羅

「パールデスター」

蘭

○榕按「エグイセテム」ハ統名ナリ此類七種アリ其第二種ハ闇荊「エグイセテム」第六種ハ木賊「エグイセテム」レ羅「タリ」西說云性効問荊ハ緩ニメ木賊ハ峻ナリ又木材及鉛錫等ノ器械ヲ琢磨スルニ用フ麻黃節^セ菜亦此類ニ屬ス本草綱目啓蒙云今梓人用者ハ鹽湯ヲ以テ略煮過シ乾シタル者

故ニ藥用ニ堪、ス生草ヲ乾シ用フ。シ
試効此藥往古多々用フ。唯晚近久廢セリ。然ニ近時
勿能獨乙都入大學師連忽蹠人是ヲ質験メ利尿ノ
峻藥トシ和蘭ノ醫家是ニ從テ試用シ逾世ニ唱明
セリ。此種類皆利尿ノ功アレ。尼問莉ハ性緩木賊
峻ナリ。過用スレハ尿血ヲ發ス。戒慎メ用フ。シ○此
藥血ノ運行及神經ヲ觸動セヌメ小便ヲ驅泄シ性
收濇ノ保固強壯ノ効アリ。水煎スレハ收濇苦味ア
ルヲ以テ知ルヘシ。尚施用ノ標準ヲ左ニ舉ク。第一腎
藏衰弱メ小便分泌ノ機力減損シ發スル水腫。小便

閉ニ用フ。第二腎中、血管虛弱ノ能血ト尿ヲ分泌セ
ス。尿血ヲ發シ小便帶黑色ノ血ヲ雜ル症ヲ治ス。第三
腎ノ分泌力及尿道諸器通利ノ機力共ニ減損シ若
ハ廢弛スル症ニ用フ。此藥啻ニ小便ノ分泌ヲ增進
スルノミナラス。尿道諸器ノ纖維ヲ收固シ小便ノ
健輸カヲ獎起スレハナリ。第四腎。輸尿管。膀胱ニ粘
液沙石等壅積スルヲ驅泄スルニ用フ。是ヲ用レハ
小便分泌甚増進メ其壅滯セル汚物通利シ腎膀胱
ノ結石ヲ防制ス。第五表發ノ蒸氣壅塞スル症或發
汗過多ノ症ニ用フ。蒸氣壅塞ノ症ニ用レハ小便ヲ

利ノ蒸氣ニ換ヘ内鬱セル。病毒汚液ヲ排泄ス。故ニ瘡瘍内攻。遷延傷冷毒痛。痛風等ニ効多シ。發汗過多ニメ虛罷セル症ニ用レハ小便ノ分泌ヲ増進メ皮表ノ分泌ヲ減損シ其津液ヲ引テ小便ニ導泄シ汗自テ止ム。**第六** 蒸氣管及喰收管ノ機力虛衰ノ沴乙様ノ水液壅滯シ發スル水腫ハ効驗他藥ニ超越セリ。殊ニ瘡瘍内攻。麻疹。赤斑瘡羅斯人後發スル皮水。水滯留スル症及内部ノ諸水腫ニ治驗多シ。但脳水腫ハ効ナシ。**第七** 凡煥衝ナキ諸病自テ其毒分泌メ小便ニ排泄スヘキ症。殊ニ其小便少キ症ニ用フ〇

此草或散劑トシ用フ然ニ水煎劑ヲ尤佳トス。二錢ヨリ三錢下テ水十弓ニ煮テ濾過シ小兒ハ一時毎二一二匙。大人ハ半茶碗。宛與フ〇此藥ヲ禁スヘキ症第一煥衝諸症。殊ニ腎煥衝ニ害アリ。**第二** 小便過多。尿崩。尿血等。**第三** 尿道諸器ノ膿瘍。硬結腫。癌腫等。第四患者大ニ虛脫シ或諸液脫泄過多。虛憊羸瘦人症。勞瘵様ノ脫汗。虛脫ノ下利等ハ是ヲ禁ス〇或云此藥收濇利尿。効ヲ以テ外諸部ノ潰瘍。創傷。吐血下利赤痢。下血。崩漏。白帶下。乾欬等ニ泡劑煎劑トシ與、テ良驗ヲ稱ス。搗貼ノ諸創ヲ愈シ神經傷ヲ治

又
淑
叔
叔
叔

拳參

ナイブ
テルキト
タルトノ
ルオ和

日スドルタ羅

線重樓ト呼フ然レ陳久ニノ藥用ニ堪^ス

試効根ヲ用フ。性効篤爾。面室刺ト同シ。○秀偉ノ
收濇藥トス。諸管纖維弛緩ノ虛罷セル諸病殊遷延。
溶崩下利。水瀉失血。稀液脫泄ノ諸症ヲ治ス。○尿道
ノ滑液剝脱ノ小便淋痛及經久無毒ノ淋疾白帶下
ヲ治ス。○間歇熱。腐敗熱ニ此藥ヲ對症ノ劑ニ加用。
テ偉功ヲ稱ス。或云健質亞那ゲンチナ名。○加日三錢。宛用テ

那幾十殆力尅

拳參根細末一錢

右研和シ三氏ヲ一丸トシ桂末ヲ衣トシ一時毎ニ

後方良験アリモ不競ト十二月十六日

黃參收斂丸

拳參根。越幾斯劑

大黃
一錢

百藥煎

石榴花末
一錢

右研和ノ王瓜ヲ一丸トシ石松粉ヲ衣トシ半時毎ニ四丸宛服シ或症ニ隨増減ス

服量 散劑ハ一錢ヨリ三錢ニ至ル。或煎劑ニ加、或苦味越幾斯劑ニ加テ丸藥トシ或越幾斯劑トシ用フ
 ○煎劑ハ根一弓水煎ノ十二弓或十六弓ヲ取用フ
 拳參根越幾斯劑製法 健質亞那越幾斯劑名ト同シ
 拳參根丁幾劑根ノ細末ヲ取十五度燒酒八倍ヲ加
 硝子壠ニ入固封シ煖處ニ置キ浸ド八日。渣ヲ去貯
 フ○此根外敷ノ斷ノ腐爛ヲ治ス。咽喉潰瘍ハ漱藥
 トシ尤効アリ

依福家涅

麥奴

セカレ・コルヌム羅 ムードルコレーン

デホールンデ・ロゲ ハーバースポーレン蘭

雨濕多キ年ハ穀類殊裸麥ノ穗中黑青色ニノ裏青白ノ禾粒生ス長四五分濶一二分許圓或方ニノ勾屈シ偏面隆起シ柔ニメ味辛ヲ帶嫌惡スヘシ乾ハ氣味消散ス

性毒アリ過服シ或長服スレハ寒戰恶心嘔吐瀉下。腹痛昏睡顏色黯赤譖妄痙攣癱麻羸瘦或各部乾枯死壞或腐敗溶崩ヲ兼ル危險ノ惡症ヲ發ス

試効獨乙都和蘭波羅泥亞歐羅巴等ノ產婆是ヲ用

テ臨產痛ヲ催起スル一良藥トス。然レ應當ノ症ヲ
的識セス。妄ニ過用シ多害ヲ致故ニ世人是ヲ忌避
シ久廢棄セリ。然ニ近來北亞墨利加洲ノ内科及拂
郎斯諸厄利亞獨レ都和蘭ノ產科專ラ是ヲ經試シ
臨產痛ヲ誘發シ子宮牽縮ノ努力ヲ進メ分娩力ヲ
扶ニ從來未曾有ノ殊効ヲ顯知セリ。然レ經驗未久
カラサル故ニ尚逾試用ノ其性効ヲ確知ゼントス。
乃從來質験セル標準ヲ左ニ舉ク

第一尋常平順ノ分娩ト雖モ全體若ハ子宮虛弱ニ
メ臨產ノ陣痛微弱怠慢ナル症ハ是ヲ用フ。但子宮

口開ナ一達爾姪兒西洋錢ノ名。○十文錢ヨリ差大。ノ大若ハ尚多
ク開ニ至テ用ヘシ否サレハ徒ニ分娩ノ努力ヲ誘
發シ子宮ノ全圍頸口牽縮メ胎兒ノ墜下ヲ阻遏シ
終ニ子宮破裂ノ危険ニ至ル**第二**分娩ノ努力緩慢
ニメ陣痛ナキ症ニ用體稟強實ニメ粘液質ノ人或
耽滯虛耗ノ者間此症アリ**第三**死胎下サル症ニ用
ス。既ニ死胎ノ常候ヲ見ス氏ハ此藥ヲ用テ子宮牽
縮ノ努力ヲ獎起シ死胎ヲ下ノ母體ヲ救ヘシ**第四**
臨產中胞衣早ク離脱スルニ由テ崩血スル症ニ用
ス。胞衣子宮口ニ生著スル症ニ非キハ此藥ヲ與テ

子宮牽縮スル片ハ胞衣自ラ壓塞メ脱血速ニ止ム
第五 分娩後ノ脱血胞衣ノ一處離レ若ハ全ク離脱
スレ由子宮ノ牽縮力緩慢或自餘牽縮シ難キ妨患
アルニ由テ發スル症ニ用フ是ニ因テ子宮ノ牽縮
力増進シ胞衣自ラ離脱シ且驅出ノ子宮遍
ク縮收シ危篤ノ諸症ヲ免シム第六胞衣ヲ下スニ
用ス諸病自然ノ良能ニ因リ療術ヲ假スメ治スル
者多シト雖モ產婦ヘ特醫術ヲ以テ胞衣ヲ下スヘキ
症アルト毎ニ產科ノ知所ナリ其症中此藥ヲ試用
テ良驗ヲ得ヘシ第七臨產中子宮口能開キ胎膜破

ル片ハ催生ノ爲ニ此藥ヲ用ヘシ○此藥ヲ禁スル
症第一 子宮口閉塞スル者第二產婦多血ニノ血多
ク子宮ニ運輸スル症ハ瘀血適宜ニ通泄ノ後此藥
ヲ用ヘシ第三子宮ニ一種ノ膜囊アリテ胞衣ヲ包
容スル者第四纖維様ノ膜ニテ胞衣ト子宮連結ス
ル者第五神經諸症。痙攣擣掣。胃痙攣急。嘔吐アル症
第六傷冷毒痛。子宮痙アル症第七漿水甚少ナキ症
第八子宮焮衝アル症第九子宮下墜反覆。若ハ位置
枉斜ノ症第十盃(膀骨腸骨)甚狭窄殊ニ其骨ノ接合
窄小ナル者第十一體稟薄弱感觸已甚キ者第十二

全體甚弛緩ノ惡液質ノ者第十五胎兒畸形若ハ頭

水アル者第一、第三、第四、第九、第十、第十三、ノ
症ハ皆産科手術ニテ探知ヘキ者

服量 散劑シ六氏ヨリ半錢マテ一服トス ○ 泡劑
ハ二錢ヲ沸湯ニ泡出シ濾テ四弓ヲ取り。四分時コト毎ニ
一匙宛服ス ○ 煎劑ハ一錢ヨリ二錢マテ水煎シ濾
テ三弓若バ四弓ヲ取り。八分時或四分時毎ニ一匙
宛服ス

蘭草

アデバカラノ和正ウパトタムカン
ナヒス羅ノアルケンスコロイド蘭

試効 莖葉穗ヲ用フ。味苦辛○虛弱ヲ強健シ諸藏壅

塞殊肝膽脾ノ鬱結硬腫ヲ疏解シ依剥ホ昆坪兒經閉
ヲ治ス○黃疸及水腫ニ甚騷アリ殊胃腸酸敗液ア
ル症ニ良。橙皮酒石鹽ヲ加テ尤効アリ喻ハ後方ノ
如シ

山益蘭橙解凝飲

蘭草 穂

二弓

葛斯加栗刺

一弓

蘭草 穗

二弓

酒石鹽

四刀

右水適宜ヲ加慢火ニテ徐ニニ煮減ノ十四弓ト爲

シ濾テ滓ヲ去リ後藥ヲ加フ

右調和シ一時毎ニ一茶碗宛服ス依○間歇熱ニ此

橙皮舍利別

鏡

酒石鹽

四刀

藥ノ對症ノ劑ニ加水煎シ服ノ効ヲ稱ス○失苟兒
陪苦ボイクノ良藥トス。是ヨリ發スル脚腫潰瘍。其他瘡
瘍。疥癬。赤疹。癰痒。腐爛ノ創傷。腐骨疽等ニ內服外敷
ノ排膿淨刷シ乾愈ス

山	爺	菜	シワサビ	和	ヨクレアリ	アヌヒ
附	沙	蘿	ナリス	羅	「ル」ブルブ	ラード
	蘿	葛	コク	「ル」	モラシ	蘭
			レア	リア		
			リス	アル		
			チカヌ	モラ		
			スロ	シ		
リ	ク	ス	メル	ペー	ル	
ス	タ	ト	ラデイ	ブル	タル	
タ	ル	ル	ス	タ	ト	
蘭			ミイ	ラ	パ	
				ス	ヌ	ス

○榕按ニヨクレアリア藥用ノ者二種アリ其一
種ハコクレアリアオヒシナリスト名ク圖說ヲ

按スルニ花葉ノ形狀氣味。山箭菜ト同メ根細シ
和產ノ根肥大ナル者ニ似ス是土性ニ係ル所ト
ス今菜舗販者ハ甲斐駿河等山澗ノ地ニ出是ヲ
菜園ニ移植レハ莖葉甚長茂メ根漸瘦細終ニ鬚
根ナリ辛味減スルヲ以テ知ヘシ然ニ葉頗辛
味アリ鹽醃賞スヘシ此藥專ラ莖葉ノ辛味ヲ稱
シ用ル故ニ菜舗山箭菜根ヲ藥用トスヘシ隨
地得易クメ便利トス○其一種ハヨクレアリア
アルモテシアト名ク先輩沙蘿蔔ニ充ツ花葉ノ
形狀能似テ根之形穩當ナラス蓋其類ナリ。和蘭

ニ其根ヲ用ヒ性功全^ア山^シ箭菜ト同シト云。故ニ是^モ亦菜
舗^ノ山^シ箭菜根ヲ以テ藥用ニ充^ア^フヘシ

舗ノ山嵛菜根ヲ以テ藥用ニ充ヘシ
試効山嵛菜氣味辛辣竄透メ鼻ヲ刺戟ス鑽透ノ揮
發油ヲ含ム故ニ燒酒ニ浸メ精氣出_レ水ヨリ多シ
○溫煖開達稀釋利尿清血ノ効アリ失苟兒陪苦ヲ
治スル聖藥トス性効沙蘿葡萄同シ纖維縱緩諸液
稠粘ニメ壅塞ヲ兼ル諸症ハ殊ニ捷効アリ○此藥
能小便ヲ利シ水腫粘液腫萎黃病黃疸ヲ治ス○脾
病依剝昆塹兒ノ一良藥トス能外藏ノ惡液ヲ疏解
メ排泄ス○寒粘液質ノ人ニ適應ス熱性乾燥ノ症

ニ用レハ血液ヲ衝動シ煥熱ヲ誘發ス故ニ此藥
清涼藥ヲ兼用スルトアリ○生葉ヲ嚼服シ或其絞
汁ヲ呑塗名ニ加服シ或毘設爾弗舍利別トシ或燒
酒ニ浸シ或燒酒ニテ蒸餾メ精ヲ取或麥酒若ハ乳
汁ニ浸シ服ス但右ノ諸劑新ニ製シ用ヘシ日ヲ經
少揮發精消散メ効ナシ○煎劑ハ効ナシ氣味蒸散
メ苦味ヲ帶レハナリ○左ノ製劑皆前說ノ諸病ニ
通用メ良驗ヲ稱ス一錢半之量隨意入服

山荳菜精

山嵛菜 花アル生
草安四弓

沙蘿蔔根

一
七

スミテ左スコタハアヒレ

羅

燒酒十五度者
五比

右二味燒酒ニ浸シ蒸餾メ其精十度トナルニ至テ

休ム服量半錢ヨリ一錢半マテ對症ノ劑ニ加服ス

敷藥水二錢ヨリ一弓ニ至ル

山箭菜精複方 ア久。アンテスコルブチカ。シデンハミセレヒシア。スコルブチカ。涅

十山箭菜 花アル生草 ハミセレヒシア。スコルブチカ。 薄荷 乾者

撒爾非亞

名各三弓

麥酒

三比

肉豆蔻

四錢

橙皮

六弓

蒸餾水

九比

右五味剉搗碎キ浸^ス三日。蒸餾メ精六比ヲ取^ス服

量一二匙宛與^ス一日三四次

山箭菜舍利別

セイロブス。アンテスコルブチクス。羅

山箭菜

絞汁

沙蘿蔔根

擦屑

碎米薺

各二弓

沙糖

十二弓

右攪和シ重湯ニテ水氣ヲ蒸散メ舍利別ノ稠トシ又左ノ劑ヲ製メ合和ス

健質亞那

一弓

幾那

茜草

鏡各四錢

右細剉ニ水適宜^ス加^ス煮テ濾過シ十二弓ト爲シ沙糖一比半ヲ攪和シ文火ニ上^ス水氣ヲ蒸散メ舍利別ノ稠ト爲ス。右二劑放冷メ能合和^ス服量日四匙ヨ

リ八匙ニ至ル。○此合劑一弓ニ升汞一二氏ヲ加、經久ノ黴毒諸症ニ用テ殊効ヲ稱ス。

山箭菜舍利別複方

セイロブス・アンテ
スコルブチクス 涼

山箭菜

生草
十比

沙蘿蔔根

十三比

人碎米薺

生草
五比

桂末

六弓

橙實熟者皮共

二十度者
一比

細剉ム

燒酒

二十度者
二比

蒸餾水

八比

右格爾弗ニ入文火ニテ蒸餾シ精液五比ヲ取り沙糖十比ヲ攪和シ重湯ニテ水氣ヲ蒸散ノ舍利別ノ稠ト爲ス。○或此劑一弓ニ升汞半氏ヨリ一氏ヲテ

研和シ經久ノ黴毒諸症ニ用テ殊効ヲ稱ス。服量日一弓ヨリ二弓ニ至ル。

山箭菜昆設爾弗

スコルブチカ

朱山箭菜

生葉
三六弓

沙蘿蔔根

ハカル

人碎米薺

生葉
各一弓

沙蘿蔔根

ハカル

右搗爛シ沙糖二比半、醋六弓ヲ加、攪和ス。服量日一

二匙宛用。

ノ監敷開塗麻林木泉散血入故次

外敷失荀兒陪苦ノ齒齦腐爛出血潰瘍等ニ此草ノ

絞汁ヲ擦シ或山箭菜精ヲ漱藥トシ治ス。

沙蘿蔔根巨ク白色多液蘿蔔ニ似テ氣味悍烈辛辣。

姜擦子ニ擦レハ竄透メ眼ヲ刺戟シ肌膚ニ貼スレハ
發泡ス。乾ハ氣味消散ス。此根及山嵛菜。廚房ニ供シ
辛葷調味ニ用フ。煮食スレハ微甘ヲ帶。蕪菁根ノ氣
アリ試効根。溫煖。開達。稀釋。利尿。清血ノ効アリ。失苟
兒陪苦ノ聖藥上ス。性効山嵛菜ト同シ。絞汁ヲ舍利
別トシ或麥酒ニ浸シ服シ或此根一比。山嵛菜葉碎
米薺葉各三握。搗碎キ麥酒若ハ葡萄酒ニ浸シ二三
盞。宛服ス○水腫。粘液腫ニ用テ能少便ヲ利シ結石
ヲ碎キ腎痛ヲ治ス。根ノ絞汁ニ沙糖ヲ和シ服ス或
舍利別丁ジ或碎米薺葉ヲ加麦酒ニ浸シ日二三盞

宛服ス○喘急。頑固ノ欬嗽。疫欬。粘液壅滯ノ聲啞ス
ル症ニ用テ膠痰ヲ稀釋シ咯出セシメ治ス。根ノ絞
汁ニ沙糖ヲ和シ舍利別ノ如シ服ス○腹部ノ壅塞
ヲ開達シ寒粘液壅滯メ食進ヘス消化シ難キ遷延
ノ諸症ヲ治ス○遷延ノ痛風。傷冷毒痛。歷節痛ニ此
根ヲ乳汁ニ煮テ服シ温覆發汗スレハ劇痛解散ス。
或細剉ミ每朝一匙宛。杜松實煎湯六弓ヲ以テ送下
スル。一月許。劇痛漸休ム。失苟兒陪苦モ亦是ヲ服メ
治ス○傷冷毒痛。頭痛。昏睡。粘液性ノ睡瘡等ハ根ノ
擦屑四錢許ヲ頭部。項窩。蹠等ニ貼シ發泡ノ効アリ

醋。白芥子。蒸餅母 名 ヲ加テ尤良。齒痛ハ其齒ニ貼メ

治ス

叔
施
物
儀
涅

碎米薺

オランダガラシ和 ラチャム。ア久チクム羅

シキムブムナス左
ルートルケルス蘭

試効

清血利尿稀釋ノ良藥トス。失苟兒陪苦ニ殊効

ヲ稱ス。沙蘿葡萄及結爾斯 補 ニ比スレハ性緩ナリ。蔬菜トシ食ノ能少便ヲ利ス或呼塙ニ加服ノ清血藥トス。絞汁ヲ服メ効力山薺菜ノ如シ。○失苟兒陪苦ニ碎米薺草 生 山薺菜葉 生 各十握。沙蘿葡萄根一比。麥酒一桶 六斗八升 浸メ毎日適意ニ服メ治ス。又方。碎米薺絞

桶

升

許

碎米薺昆設爾弗

製法

山薺菜昆設爾弗ト同シ

密
施
叔
淑

水萬苔

カハチサ和ベカニンガヘロニカベカスコイム蘭

試効生草微苦辛石鹼質^ス含粘液稠血^ヲ稀釋シ清

血利尿ノ効ア稱シ失苟兒陪苦ノ一良藥トス性効
碎米薺ノ如シ生絞汁ヲ服シ或山箭菜碎米薺絞汁
ヲ加服シ或水煎シ用ス○小便ヲ利シ凝血ヲ疏シ
經閉ヲ通シ水腫小便閉及黃疸處女病ヲ治シ脊藏
壅塞ヲ開達ス○脚痛風及疥癬等皮上諸症此絞汁
毎日二三弓宛服ノ血液ヲ淨刷シ病毒ヲ小便ニ驅
泄シ治込消石ヲ加服ノ脚腫ヲ消ス○肺ノ粘液ヲ
稀釋シ欬嗽ヲ治ス○條蟲ニ良効アリ一處女條蟲

ヲ患^テ多年水萬苔山箭菜ノ絞汁ヲ乳清^名ニ加服
スルヲ一月餘諸症大ニ輕快ヲ得經久ノ蟲症竟全
治セリ○焮腫羅斯小疱赤疹焮熱ノ搔痒甚キ症及
顏面汚斑汗漸ニ絞汁ヲ擦テ治ス○痔痛及婦人產
後陰處腫痛等ニ此草ヲ水煎ノ蒸湯シ速治^{依物四}
淑叔

艾根

ヨモギ和アルテミシア・ヒルガリ
ス羅ベイクトゲメ子アルセム蘭

冬春葉未生セサル頃鬚根ヲ取リ土沙ヲ洗ヒ文火
上ニテ速乾シ硝子壠ニ入^レ固封シ貯フ舊根ハ効ナ
シ毎年新ニ採^ルヘシ

試効 根鎮痙ノ一薬トス。巔癇ノ發作前ニ用フ。發過定期ナキ症ハ發作後速ニ用フ。患者ヲ床蓐ニ安臥セシメ其齡ニ隨ヒ根末半錢ヨリ一錢マテ一服トシ稀キ麥酒少許ヲ溫テ送下シ又溫麥酒少許ヲ與ヘ臥床ニ在テ發汗セシムヘシ。但甚厚被シ或爐ヲ設ケ熱蒸ノ發汗セシムルハ害アリ又神思ヲ勞擾セシムル勿レ。右ノ如クノ漸次ニ服量ヲ増加全功ヲ得レハ久服ヲ要セス。但焫衝ノ諸症アル者ハ防焫衝ノ治法刺絡下等ヲ施シ焫衝治ノ後此藥ヲ用フ。婦人月經アル時ハ通經後ニ用ベシ。○頑固ノ癇症

ニ用ヒテ速効ヲ見スアリ或同症ト雖毫モ驗ナキ者アリ。然氏其病久キ經ス或甚神思ヲ勞擾セス或腦質ノ資稟異常ノ原由ナク脳ノ諸器畸形或石發過次序アリテ頻數發シ或小女十二歳ヨリ十五歳始テ月更アル頃ノ患者ハ此藥多ク効アリ。蟲ヨリ發スル症ハ殊治驗多シ○高年ノ人及夜中發スル痛ハ効少ク或害アリ○或云大ニ神思ヲ勞動メ發スル呃逆衆藥効ナキ症ニ此根ヲ用ヒ速効メ得タリ。緩性ノ通經藥トシ治驗多シ○艾葉疏解強壯ノ効アリ。緩性ノ通經藥一ス鏡卷十四艾葉ア依参考スヘシ

石松

ヒカゲノカツラ和イコボガム
カラハムロタルフスカラウ蘭

○榕按ニ此草深山幽谷ノ石上ニ生ス。闕ニ逢ハ蒲黃若ハ松黃松花ヲ代用スヘシ共花ノ薬粉ニ
薈メ性効同シ。○本綱啓蒙云。山中地ニヒテ生ス
蔓五七尺枝多ク分ル葉土馬驥ニ似テ黃綠色四
月枝梢毎ニ穗ヲ生ス玉柏ニ異ナラス。正
是ヲ採用フ其質精微ニ^{スギコケ}硫黃華或蠟ノ如ク蒸餾
スハ油及酸精出^スハ爾斯ノ如シ燭火ニ接スレ

試効

此草夏月花穗生シ花瓣ナク黃色ノ薬粉多シ
アリ。蒸氣ヲ發シ小便ヲ利ス。○近來小便不利ニ此
粉又用テ偉効ヲ稱ス。殊傷冷毒。痔疾。小兒生齒等ニ
發スル小便不利惡良。多後方ノ如以製シ用フ

石松驅尿飲

石松粉

四錢

過爾托亞舍利別名

三弓

右沸湯四弓ニ攪和シ半時若ハ一時毎ニ一匙完服
ス。○肺傷勞欬久欬ヲ治シ吐血下利ヲ止赤痢腹痛
ヲ祛ク。○此粉ヲ赤葡萄酒ニ和シ服メ下利赤痢ヲ
治シ齒ノ弛弱ヲ固ム。○癰瘍搗掣。小兒癰症。風氣腹

痛ヲ治シ總テ神經諸症ヲ鎮定ス○服量一刃ヨリ半錢ニ至ル。或泡劑煎劑トシ用フ○外敷メ痛風ノ劇痛ヲ寛解シ創傷ヲ愈シ出血ヲ止ム○皮膚剝脱ヲ愈シ乳頭坼裂。小兒頭瘡。疥癬。癩痒。或潰瘍ノ濕爛ニ是ヲ摻メ速ニ乾愈ス○小兒頭瘡。疥癬。癩痒。或潰瘍ノ汚液漏泄過多ニメ乾愈スヘキ症ニ外敷メ治ス○丸薬ノ衣トメ能乾キ且蠟様ノ粘質アルヲ以テ丸薬ノ嫌ヘキ臭味ヲ消ス 依_{華叔伍} 淑僕

柳葉菜

アカバナ和_{アリカリアリシマニア} ピル

アリカリアリムサリカリアロ 皇ルペルル

試効 莖葉花根皆用フ○緩性ノ收濁藥トス。經久ノ下利赤痢下血吐血婦人月經過多等ヲ治ス。虛弱ノ症ハ殊ニ良驗アリ○淹滯益下利ヘ先下劑ヲ與テ胃腸ノ汚液ヲ淨掃シ此藥ヲ末トシ一錢若ハ其餘日兩次用フ○虛症ノ下利赤痢ニ此末ヲ試用イ十人皆的効ヲ得タリ。大抵初下劑ヲ與テ後此末一錢或四刀宛朝夕用力。其病未久ヲ經ス或胃腸虛罷ノ症ハ大抵三四日ニメ治ス。經久頑滯メ諸藥驗ナキ症ハ三週中ニ治ス。或病毒ヲ驅除スレ正胃腸ノ虛

弱ニ因テ下利甚尠タル症ハ皆此藥適應ス。此症ハ幾那亦効アリ○或云遷延ノ下利赤痢ニ此草根ヲ水煎シ用ヒ或莖葉花ヲ末トシ用ヒテ皆治驗多シ○或云此藥ハ痢疾ニ効アルト他ノ緩和劑ニ優レリ未トシ一時若ハ一時半毎ニ一刀宛與^ク或煎劑トシ用○或云此藥險重虛憊ノ下利ヲ治スト雖モ惡液質ノ人及膿樣ノ敗液多キ症ハ是ヲ禁ス。然モ乾葉ハ收濬ノ味微ナル故ニ用ヒテ妨ケス。痢疾亦用ヒテ閉澁ノ害ナシ○勞瘵ノ血液烊崩下利ニ用ヒテ其脫泄ヲ靜止シ呼吸塞難苦悶等ヲ寛解ス○外敷ノ創ヲ

愈シ血ヲ止メ。焫腫眼ヲ消散ス

括伍依羅

大蓼

仙人草和^{ヨヒス}ゲレ^ヲチスエレ^{クタ}ゲレ^ヲチス。

ケレ^ヲチス蘭

試効葉及花ヲ用フ此草酷厲侵蝕毒アリ過服スレハ大眩暈シ咽喉胃腸焫衝ノ吐瀉腹痛。搐搦昏冒ノ死ス○斯篤爾窟^ル人其他先哲此藥ヲ歷試ノ解凝驅散ノ峻藥トシ結爾殘斯密涅刺列金硫黃^{共ニ}優^サテ殊効ヲ推稱セリ。其經驗說ニ云、徽毒夜分劇痛スル諸症(筋膜痛等)徽毒頑滯經久メ頭痛等。總テ歷年沈痼

ノ黴毒諸症。其他鬱毒潛伏メ發スル頭痛。硬結腫。脣骨疽。癌瘡。惡厲淹滯ノ疥癬。浸淫腐蝕ノ潰瘍。等ニ内服メ大効ヲ稱ス。○黴毒ノ潰瘍。脣骨疽ハ此葉ヲ泡劑トシ内服ノ効多シ。○一婢黴毒諸症ヲ患。五個月。白帶下殊甚。且大ナル骨腫ヲ發シ夜中劇痛ニ堪ヘス。白頭翁等ヲ用テ功ナシ。因テ大蓼葉ヲ濃泡劑トシ與テ全治セリ。○一處女面部頸胸多ク潰瘍ヲ發シ臭穢ノ敗血漿流泄ス亦白頭翁等ヲ用テ驗ナシ。終ニ大蓼葉ノ泡劑ヲ與ヘ且其末ヲ外敷メ全愈セリ。其他斯ノ如キ試說多シ。○婦人神思鬱憂病。

頑固ニメ治セヌ。聚藥功ナキ症。此葉ノ泡劑ヲ長服メ治スル者多シ。○頑固ノ痛風。傷冷毒ノ諸症或熱。病毒。瘡毒等排泄セスノ肢節上潛結シ腫痛。瘰急等ヲ發スル者ハ此藥治驗多シ。○或云潰爛ノ乳癌失壩答。功ナキ症ニ此藥ヲ與テ諸惡症寛解シ殆治スル者アリ。其他癌樣ノ潰瘍ニ試功多シ。服量葉花或ヲ泡劑トシ四弓。宛日兩三次。若ハ四次用フ。○或葉ヲ越幾斯劑トシ。製法失壩答。越幾日一二氏。若ハ三氏ヲ沙糖ニ和シ服ス。○或葉ノ末三氏。宛日兩三次沙糖一倍量ヲ和シ用ヒ漸服量ヲ增加ヘシ。曾テ

害アル症ヲ見ス

外敷 大蓼及女萎

「ボタルバンヅル」和「ケレドチスヒ」効

同シ生葉ヲ貼メ發泡藥トス○疥癬ニ此草ヲ剗搗

テ阿利襪油〔名〕少許ヲ和シ患部ニ擦レハ煥熱腫痛メ後速ニ乾愈ス○潰瘍中ノ水棉様肉敗穢ノ胼胝

様肉ヲ消化シ或癌樣ノ潰瘍或腐骨疽ヲ兼ル症ニ葉ヲ搗キ貼メ排膿淨刷ノ殊効ヲ得ル「斯篤爾窟布廉幾人名」試說多シ或云乳癌潰爛ノ水棉様肉アル症ニ乾葉ノ末ヲ摻メ全愈セリ

〔施淑〕

大蒜

「ブニンニク」和「アルタムサ」

試効

球根味辛熱刺戟侵蝕シ不佳ノ葷臭阿魏ノ如

シ肌膚ニ貼メ煥腫發泡ス○酷厲揮發ノ油ヲ含ミ内服スレハ其氣速ニ全身ニ普達シ錯透開達稀釋疏解排泄メ汗ヲ發シ小便方利ス此根乾バ油氣消メ効力脫失ス過用スレハ血液ヲ衝動シ煥熱ノ酷厲液ス生ス資稟脆弱觸動過易ク或惡液壅鬱ノ各部ス刺戟シ或多血壯熱煥熱ア心症ヘ用ヒ害アリ。總テ寒性粘液質ノ人虛冷ノ症ニ良○殺蟲ノ一良藥トス蛻蟲燒蟲ヲ殺シ殊ニ條蟲ヲ驅泄ス根ノ扁

切二三片ヲ取テ嚼碎カ又空心ニ嚥下シ或水ニ浸メ服シ或細剉ミ水若ハ乳汁ニテ送下シ或乳汁ニ煮テ服シ或細剉ミ飲食ニ摻ケ用フ。諸藥効ナキ症ニ用ヒテ蟲ヲ驅泄シ太那設黙謨^{セツモクム}_補等ノ苦味殺蟲藥ニ勝^リ殊効ヲ得ル多シ○小兒ノ蟲症ハ此根ヲ搗爛シ一弓ヲ取テ乳汁十二弓ニ浸シ空心ニ二弓ヨリ四弓マテ服ス或乳汁ニ煮テ沙糖ヲ加甘美トシ一二盞完與テ蟲ヲ殺シ大便ニ驅泄^レ或此根ヲ水ニ煮テ搗爛シ泥トシ臍及胃部ニ貼メ亦蟲ヲ下ス○殺蟲劑ヲ服メ腹痛劇ク搐搦ヲ發スル者ハ其部

ニ石腦油ヲ擦シ或大蒜^{アーレ}鮮^{ゼン}_名牛膽ヲ麥粉ニ和シ餅ト爲シ溫^メテ布ニ夾ミ患處ニ貼スレハ速ニ治ス○條蟲ハ此根一二個ヲ細剉毎日空心ニ茶湯或冷水ニテ送下ス數日連服スレハ其臭氣鑽透ノ蟲ヲ刺戟シ且腸ノ蠕動機ヲ増發シ條蟲腸ニ吸貼スルト能^ズメ自^ラ大便ニ下ル○或云大蒜ヲ與^ル七日中二三次或四次其後下劑ヲ與^ルハ蟲下リ治スル者アリ或每朝大蒜二三個ヲ與^ル十日ニメ條蟲ア下ス者アリ○一男子條蟲ノ諸症ヲ患^ル多年大蒜ヲ服スルト六個月一旦夥^ク其死塊ヲ下メ治ス此類

ノ試說多シ但是ヲ服スレハ時々下劑ヲ兼用イ蟲ヲ驅除スヘシ○蟻蟲ハ此根ヲ搗テ湯ニ浸シ其蒸氣ヲ以テ數回肛門ヲ薰スレハ蟲死メ通泄ス○此藥利尿發汗ノ効ニ由テ水腫小便閉ヲ治シ殊ニ粘液性ノ水腫ニ用ヒ停水留飲ヲ驅逐ス一男子五十歳許體稟粘液質ニノ水腫ニ罹リ小便通セス。左ノ剤ヲ服メ治ス。此方停水留飲滯積ノ諸症ニ治驗多シ

葫橙驅水飲

大蒜根 二個 洋芹生草 一握 橙皮 二錢

右剎、葡萄酒十六弓ニ浸シ一小茶碗宛服スル一日

三次○胸水ニ用ヒ小便ヲ利シ污水ヲ驅逐シ治ス
○腎痛ヲ祛キ結石ヲ通ス○遷延ノ傷冷毒痛及痛風ニ用ヒ其毒ヲ泄泄シ治ス○頑固ノ間歇熱。三日熱ニ殊効ヲ稱ス。或云此根朝夕一個宛服シ毎日一個宛增加テ第五日ハ朝夕五個宛服シ是ヨリ朝夕一個宛減シ服了ハ即治ス。治後暫朝夕一個宛服ノ良或云每朝一根宛増服メ五個ニ至ハ其熱發作セスメ治ス○適宜半服スレハ胃腸ノ粘液ヲ消化シ食ヲ進メ傳深疫氣ヲ攘フ。此根搗爛シ燒酒ニ浸服ス尤良。燒酒ハ能其効力ヲ浸出ス○胃虛冷ニメ粘

液壅滯ノ諸症。寧急ノ症。腹痛殊ニ粘液風氣鬱蓄ノ腹痛ヲ治ス。或根ヲ水煎メ吉利詞^{ヨリ}爹兒トシ或煮テ搗爛シ温ナルヲ腹部ニ貼メ速効アリ。○此藥鎮痙ノ効アリ。子宮衝逆寧急ノ諸症ヲ鎮靜ス或搗テ臭氣ヲ嗅シメテ治ス。○寒粘液性ノ久欬。粘痰多キ欬嗽。痰涎壅塞ノ喘急ニ用テ痰ヲ疏豁シ咯易カラシム。此根ヲ浸劑泡劑トシ或煎服ス。○寒粘液性ノ失鶴兒陪苦^{ハシク}ヲ治ス。殊ニ船中及海邊ノ患者ニ効アリ。根搗爛シ燒酒ニ浸シ滓ヲ去服ス。○齒痛ハ根ヲ搗テ患處ニ貼シ或熱灰ニ煨ノ貼シ若^ハハ齒痛ノ外部

ニ貼スレハ煥赤發泡ノ治ス。傷冷毒ノ齒痛ハ殊良。○煥衝ナキ傷冷毒ノ耳聾及粘液壅塞ヨリ發ス聾ハ此根ヲ搗爛シ絞汁ヲ紙ニ浸シ毎日耳孔ニ挿テ耳孔煥腫スルニ至レハ治ス。○寒粘液腫及疣瘻魚目。胼胝様硬肉ニ此根ヲ搗貼スレハ漸軟化シ除ク。瘰癧腺腫或寒壞疽亦効アリ。○乾癬類總テ惡厲ノ皮膚病ハ此根ノ絞汁ヲ蜜ニ研和シ外敷メ治ス。○蒜葱韭ノ類。大蒜ニ比スレハ皆性緩ナリ。大蒜ハ性尤雄悍ニノ峻効アリ。○葱根ハ性緩ニノ揮發鹽多シ。煮ハ緩和人粘液多々メ軟化解凝ノ効アリ。表發

ノ蒸氣及汗ヲ發シ小便ヲ利シ大便ヲ滑シ粘液壅
滯ノ喘急水腫。腎痛結石ヲ治ム。煨葱ハ外敷ノ軟化
解凝藥トシ。琶布^{パッブ}トシ。腫瘍ニ貼メ。膿ヲ釀シ疼ヲ止
メ。潰瘍ヲ潰破シ。便毒ヲ軟化ス。或食鹽ヲ研和シ貼
メ火傷ヲ療シ。頭痛ニ貼メ。寛解ス。
依^イ叔^ツ福^フ淑^ス施^シ

忽布 ホツブ 置立ス。立ミ且ス羅。ホツブ。ホペ蘭。○葎草ノ一種カラハナサウ江戸花戸ホツベヨロイト呼フ
形狀 忽布ハ蔓草。カラハナサウノ漢ナリ。蔓粗糙毛草多シ
傍木ニ糾繆ス。葉梗アリテ對生シ粗糙三五又。葡萄
葉ノ如シ鋸齒アリ。一株圓葉者アリ。此草雌雄二種アリ。雄

種ハ蔓梢ノ葉本ニ花攢簇シ瓣ナク五雄蕊。萼中ニ
生ス萼五 實ヲ結ハス。雌種ハ花一瓣。又ナク攢簇ス
二雌蕊第二十二 綱第五目 羨。薄膜鱗狀ニ重被メ小頭ヲ爲シ
苦味香氣アリ鱗間黃赤ノ小圓仁アリ。春月羨ヲ採
乾シ貯テ藥用トス。

粘液膽液壅滯ノ驅逐シ汗及蒸氣ヲ泄ス○水煎シ用ヒテ疏解開達ノ効。諸苦味解凝藥ノ如ク肝脾等壅塞ノ開通シ黃疸。神思鬱憂病失荀兒陪苦ノ治シ蛇蟲ノ殺ス○水腫ニ用ヒテ小便ヲ利シ又通經ノ良藥トス○腺腫瘰癧。拘僂病及疥癬浸淫瘡ニ良効ヲ稱ス○遷延痛風。傷冷毒痛ノ發作ニ用ヒテ劇痛ヲ解散ス○間歇熱ニ用ヒテ驅熱ノ一藥トス服量散劑ハ半錢ヨリ二錢ニ至ル○煎劑ハ一弓。水適宜ヲ加ヘ煮テ八弓若ハ十二弓ト爲シ服ス。泡劑水量亦同シ○エキス越幾斯劑ハ一刀ヨリ二刀ヘテ丸藥トシ或對症ノ

劑ニ加用フ○丁幾劑ハ日半錢ヨリ二錢ヲ服ス

忽布越幾斯劑製法

實乾者剉
二比

水十九

右蓋閉

シ煖處ニ置浸スエキス十二時文火ニ煮エキス半時放冷ノ濾シ絞テ液ヲ取靜定メ沈渣ヲ去リ文火ニ上水氣ア蒸散ノ越幾斯劑ノ稠トスエキス其類效如土之美忽布丁幾劑製法實乾者剉一弓燒酒十五度者エキス右硝子壇ニ入固封シ浸六日滓ヲ去リ貯フ○葉亦右ノ諸病ニ効アリ或莖葉ノ絞汁ヲ舍利別トシ用ス○嫩苗ノ新芽ハ利尿ノ峻効アリ汚血ヲ淨掃シ惡液ヲ小便ニ驅泄ス煎劑泡劑トシ服ス○花ハ

止痛ノ効ヲ稱ス○忽布(ホウブ)ハ外敷メ効多シ或蒸渴藥
トシ肢節腫瘍ノ疼痛ヲ祛キ。手足ノ浮腫ヲ散シ或
咽喉焮腫ニ漱藥トシ或痛風打撲傷。攔挫脫臼ノ腫
痛。寒粘液腫。惡性潰瘍等ニ乾實(カニシ)ラ濃煎劑トシ蒸渴
シ若ハ搗テ溫メ貼シ或葉ヲ琶布トシ外敷メ皆良
驗アリ○忽布(ホウブ)ハ麥酒ヲ泡釀メ其酸敗ヲ防止シ美
好ノ苦味ヲ生スルニ用フ
淑叔
施依

新訂增補和蘭藥鏡卷十七 終

新訂增補和蘭藥鏡標目

卷十八

- | | | |
|--------|----------|-------|
| 海棉 | 海棉黑灰製法 | 排膿乾愈膏 |
| 洋芹 | 洋芹驅水飲 | 洋芹排毒飲 |
| 胡蘿蔔 | 胡蘿蔔根越幾斯劑 | 洋芹子 |
| 蕪菁 | 蕪菁消毒飲 | 胡蘿蔔子 |
| 馬兜鈴 | 蕪菁子 | 蕪菁子搾油 |
| 香附子 | 附三稜 | 延胡索 |
| 鈴蘭 | 甘松香 | |
| 松蘿 | 迷迭香 | 迷迭香精 |
| | 迷迭香油 | |
| 車前葉山慈姑 | | |

車前 車前水

益母草

翻白草

龍葵

玄參

謂三絲

花菖蒲

金雀花
蓼

墨記草

蓖麻子

蓖麻油

黃耆

黃耆煎

羊蹄

土大黃

新訂增補和蘭藥鏡卷十八

捧齋先生譯述

男 宇田川 榮 榮菴校補

海棉 俗
稱

一名水棉

スポンギイ

スポンギア

羅

蘭

試効

腺腫瘍瘻ノ特効藥トス

黑灰トシ 每服一刀或

其餘服ノ腺ノ凝結ヲ疏散シ大効ヲ稱ス。海棉ヲ蒸
餾スレハ揮發鹽及油多ク出ツ。解凝ノ効力專ラ此

鹽ニ在リ然ニ患者衰弱。肺虛脆ニノ感觸甚キ症ニ

多ク用レハ動スレハ危懼スヘキ諸症ア發ス○扶

歇蘭度人療瘻ニ海棉ヲ用テ奇効ヲ稱ス。其方海棉

ノ細剗ミ土鍋ニテ炒炙シ。黒灰ト爲一弓ヲ取磁罐ニ入水一比ヲ加、火ニ上ヒ煮沸メ火ヲ下シ蓋閉シ浸^ス六時濾テ滓ヲ去リ適宜ノ香竈露水ヲ和シ一時毎ニ一食匙宛服ス或症ニ隨ヒ苦味越幾斯劑若^{エキス}ハ催眠劑ヲ加フ○海棉ニ著ク沙石^{海棉石ト名シ}ヲ研末シ服メ下利ヲ止、淋疾及石淋ヲ治ス○或云瘰癧ニ海棉黑灰及海棉石ヲ外服シ家猪脂ニ老利兒油ヲ和シ其腫ニ擦メ能消散ス。其腫新^タニ發ノ小ナル者ハ毛布ニテ頻ニ患部ヲ摩ノ是ヲ擦シ數甘汞ヲ加ル輕下劑ヲ用ヘシ

海棉黑灰製法

トス^スタ^{トス}ロ^ロア^ア。海棉ヲ陶壺ニ内蓋閉シ

燒テ黒灰トシ細末ノ貯フ。但シ一頓ニ多ク燒^ス勿レ
外面焦^ステ中心燒サレハナリ。黑灰ハ揮發鹽多^シノ金屬ヲ侵蝕ス。故ニ銅鍊器ニテ研末スル^ト勿レ

○外科海棉ヲ以テ膿血ヲ拭乾^シ或^シ潰瘍瘻瘡ニ挿^シ容ノ邊爛^ヲ潤^シ愈サラシメ或^シ蒸湯劑洗藥等ノ藥液ヲ含^シメテ焮腫潰瘍創傷ニ施シ或^シ劇キ出血ニ貼^シ止血ノ効^ヲ稱ス○潰瘍ニ外敷メ排膿愈合ノ奇効アリ左ニ其經驗說ヲ舉ク

○一婦人三十四歲形貌強健無病ノ如ク且^シ微毒失

苟兒陪苦等ノ候ナク月經調順胃腸壅滯ナシ。然ニ右脚ノ脛骨内踝ソ上部一潰瘍ヲ生シ瘻サル。四年形橢圓大掌ノ如シ瘻圍ノ皮剥脱シ水様ノ血滲漏ス。内服外敷ノ諸藥寸効ナク逾增長シ衆醫危險トス。予是ヲ診ニ瘻圍惡性ノ焮腫ヲ兼漸々蔓延メ足跗踵膝ニ及ヒ殆ト熱壞疽ニ庶幾シ瘻底灰白膠固ノ痴生シ焮痛甚シ。因テ熱壞疽ヲ防ク琶布ヲ全脚ニ貼シ化膿劑ヲ潰瘍ニ貼メ焮腫漸消シ痴脫シ臭氣甚キ酷厲ノ敗血漿夥々流泄ス。因テ尋常ノ清血劑ノ内服外敷シ勉テ其酷厲毒ヲ淨掃シ又打膿

法ヲ施ノ其毒ヲ排泄シ且縛帶ヲ全脚ニ施ノ膝上ニ至リ適宜ニ肌皮ヲ按定ノ血脉ノ張力ヲ扶持シ是ヲ以テ血液壅滯ナク循環セシメ其敗血漿ヲ減セントス。然レバ尚善膿ヲ釀セス。瘻圍逾硬固或皮剥脱シ或痴ヲ生シ三個月ノ後稀膿大ニ潰泄スルヲ以テ壓布及縛帶ヲ更丁日兩次棉撒絲若バ絹ヲ貼スレハ稀膿ニテ流散シ瘻底脂肉様ノ痴生シ瘻邊逾侵蝕ノ腐爛シ瘻逾濶大トナリ其痴牢著シ外敷藥ヲ以テ脱除シ難ク逾良膿ヲ生スルト能ズ予曾テ海棉ヲ潰瘍ニ施シ試ニ多稀膿ヲ喰收ノ腐爛ヲ

淨刷シ愈ト大ニ棉撒絲ニ勝リ是ニ因テ上好ノ海
棉柔軟淡黃ノ者ヲ取り厚一指許ニシ漬瘍ノ形ニ
隨切テ扁圓ト爲シ瘍邊ヲ蓋フ許ニシ溫湯ニテ能
洗ヒ搾テ盡水氣ヲ去リ貼シ右ノ如ク製ノ數個貯
貼ノ取出ンタル海棉ヲ再用ント欲セハ是ヲ數淘
洗シ雨水ニ浸ス二日貼スルニ臨テ又洗ヒ絞テ水
氣ヲ去リ四襲ノ壓布オモミヲ置キ縛帶ノ半幅ヲ重子適
用ノヘシ四襲ノ壓布ヲ置キ縛帶ノ半幅ヲ重子適
宜ニ縛定ノ膝上ニ至ル。翌日是ヲ見ハ縛帶壓布共
ニ乾キ海棉ニ稀膿ヲ喰收ノ膨脹シ瘍底ニ牢著セ
ル痴碎テ揚起ス第三次ノ縛帶ニ海棉ヲ取ハ痴ノ
碎片盡ク。脫除シ瘍底紅肉ヲ現シ宛モ新創ノ如シ其

後瘍漸ク肉ヲ生シ膿汁減シ邊圍皮ヲ生ス。因テ壓
布ニ石灰水ヲ濕シ貼ス。第七日ニ至テ良膿凝固ノ
海棉ニ粘著シ瘍平坦トナリ是ニ於テ海棉ヲ去リ
愈創ノ軟膏ヲ貼ス然ニ乾愈セス復夥ク敗血漿滲
漏ス。因テ速ニ海棉ヲ貼シ縛帶ヲ解サルト立日ニ
メ再良膿生シ其後八日中ニ瘍圍表被ヲ生ス。然ニ
海棉瘍底ニ膠著シ石灰水ニテ沾ス。雖モ去易カ
ラス。故ニ海棉ヲ換サルト二日或三日ニノ良膿能
ク排泄ス。又左ノ軟膏ヲ海棉ニ塗リ貼ス

排膿乾愈膏

密陀膏

八两
等分煉和ス

家猪脂阿利欖油密陀醋各

一两
名トリミドウ膏

金密陀

鉛粉
キラク

各一两

赤降汞

一钱

赤石脂

キシロチ

各一两

右煉和ノ軟膏ト是ヲ貼メ縛帶ト更サル一二日。又血液ノ膠粘ヲ稀釋シ大小便ノ利セシ爲ニ消石ヲ與、丁口二錢ヨリ漸加、三錢ニ至テ膿減シ腫消シ皮肉滋盈シ經久危險ノ潰瘍速ニ全愈セリ。○海棉ノ大効アルト右ノ如ナレニ壓布及縛帶ヲ施メ適宜ニ海棉ヲ妥貼シ漸次ニ瘡口ヲ收約スルニ非ハ全功ナシ。喻ハ創ノ出血ニ槲耳等丸貼スレニ壓布

ス以テ其血管口ヲ壓定セサレハ功ナキカ如シ。又縛帶ヲ輕忽ニシ緩急適度ヲ得サレハ却テ血液ノ循環ヲ妨碍シ危險ニ至ル。○ツ子ニ每常歷試スル所ナリ。翌年春末右ノ婦人右脚ノ潰瘍再發シ加之左脰ノ内側士潰瘍ヲ生シ共劇痛耐忍難ク酷厲侵蝕ノ淡赤液滲出。右脚ノ數處表皮剥脱メ厚痂被ヒ痂脫スベシ。深々潰爛ス又右脰ノ外側ニ潰瘍ヲ生シ瘡底皆脂肉様ノ痂ヲ被フ。此症究竟施療ヲ怠リ調養疎慢ニメ蘊毒頓ニ崩潰シ危險前症ニ倍スルナリ。是モ於テ復予ヲ延テ診治ヲ請フ。予意ニ此症危

陰固ヨリ論ナシ然ニ尚又海棉ヲ試逾其特効ヲ確證スル爲ニ海棉及壓布縛帶ヲ施下總テ前症ノ如シ毎日海棉ヲ換縛帶ヲ施下三週ニメ瘡底脂肉様痴脫シ赤肉ヲ現入然ニ劇痛增加ノ晝夜睡寐ヲ得ス。故ニ屢々阿芙蓉液ヲ與テ安眠セシム瘡底深ト雖モ良膿生シ新創ノ如ニ凡て創傷ハ毎日縛帶ヲ更施セハ其愈ヲ妨ク故ニ此潰瘍亦四五日毎ニ海棉及縛帶ヲ更施シ患者ヲ勞擾セス是ヨリ漸良肉生シ瘡口完收メ全愈スルヲ前症ノ如シ○熱國及酷暑ノ候ハ毎日縛帶ヲ更施サレハ潰瘍腐敗ヲ恐ル或

腐敗ノ候アレハ全縛帶ニ防腐ノ藥液ヲ沾シ施アリ○海棉ノ毛絮質ハ張力アリテ自潰瘍内ニ充張シ瘡中ノ開哆セル細管口ニ接合シ稀涼酷厲ノ敗液ヲ吸收ス其液中ニ混スル拔爾撒謨性ノ良膿愈創メトガ膠粘油ノ如ク稠厚ナル故ニ其毛絮ニ吸性アリハ自瘡中ニ留テ能瘡ヲ愈シ肉ヲ生ス尋常棉撒絲ハ其効ナシ是海棉ノ排膿愈合ノ殊効アル所以ナツ但縛帶ヲ更施ス毎ニ新タ海棉ヲ換貼スレハ効力殊ニ速ナリ再三貼スル者ヲ乾シ用レハ全質硬脆ニノ毛絮挫折シ張力ナク却テ瘡

内ヲ刺戟シ害アリ。是故ニ若海棉甚厚ノ削斷シ用
氏ハ其削面ヲ瘡ニ貼スルヲ勿ニ既ニ愈合ノ處モ

復潰爛スレハナリ

叔昆施

洋荺

オランダゼリ和アヒムベトロセリヌムロマーテルセリイヨーテ

ルセリ

イ蘭

○榕按ニ當歸并花戶清正人參ト呼者。共ニ洋荺
ノ一種ニメ性功同シ

共ニ原名アヒムガラヘヲ
レニスアヒムパムストレ

羅

エツペセルレ、イゼル

キ蘭

試効根微辛甘葉溫煖開壅發汗利尿通經ノ効ア

リ○肝脾壅塞ヲ疏解シ經閉ヲ通シ產後腹痛ヲ治
ス○胸肺粘痰ヲ疏豁ス○水腫小便ヲ驅泄シ汗ヲ
發ス煎劑泡劑杏シ用フ○水腫小便不利ニ此草ヲ
剉葱ヲ加煎服メ多功ヲ稱ス○一男子小便閉後方
ヲ與テ小便利汗發シ粘痰略出メ治ス

洋荺驅水飲

莖葉

水

煎

水

洋荺根

生者

五分

水

煎

水

撒爾非亞

名

四錢

右水適宜大加煮濾テ十四弓ヲ取リ蜂蜜一弓半ヲ
攪和シ半時毎ニ一茶碗宛服ス○根大傷冷毒痛ニ

用テ汚液ヲ小便ニ驅逐シ治ス○傷冷毒痛石淋及間歇熱ニ左ノ方治驗多シ

洋芹排毒飲

洋芹根一弓半答末林度一弓茴香一錢右水適宜ヲ加慢火ニ煮濾テ十弓ト爲シ後藥ヲ加消石精製者或甘消石精一錢舍利別出一弓六右調和シ服ス

洋芹子味苦辛香氣アリ水腫ニ用テ小便ヲ利ス○洋芹水ハ輕キ利尿藥トス四弓ヨリ十弓ヲテ對症ノ利尿劑ニ加用ス
洋芹水製法子一比水適宜ヲ

加蒸餾メ露水一比ヲ取ル○子ノ蒸餾油稠厚ニノ酪ノ如シ香氣竄透シ內服外能小便ヲ利ス。又能蟲ヲ殺ス頭ニ塗テ髮蟲ヲ祛ム○子ノ末外敷ノ蟲ヲ殺ス其油ノ如シ○熱性臍液質ノ人。癇症。神經病。睡瘡。頭旋眩暈。眼病等ハ此藥害アリ○生草ノ蒸餾水内服ノ利尿ノ効ヲ稱ス故ニ黃疸ヲ治ス○齶口瘻外敷腐爛久潰瘍ニ生草若干ハ根ヲ搗テ琶布上シ貼シ或燒酒少許ヲ和シ若バ煎餅心ヲ和シ貼ス或生絞汁ヲ塗リ或茴香胡荽子等外加蒸漏藥上芝治ス○抑撲傷。悶挫轉筋ニ生草ヲ搗半酒ニ煮元琶布上

キ久欬。冒寒傷冷毒等。總テ酷厲毒ノ刺戟シ發スル
胸肺諸症ノ一良藥トス。根ヲ越幾斯劑トシ或、切片
ニ沙糖適宜ヲ加、稍煮テ用ヒ或、麥酒ニ煮テ濾シ一
茶碗宛服ス。對症ノ諸藥ヲ久服メ効ナキ症若ハ勞
欬ノ初發ト雖モ是ヲ連服シ攝生ヲ慎守メ治スル
者多シ○肝ノ壅塞ヲ疏散シ黃疸ヲ治ス○鶴口瘡
ニ殊効ヲ稱ス。根水煎ノ服シ或、生絞汁ニ蜜ヲ和シ
患部ニ塗ル○驅蟲ノ一藥トス能、蛇蟲條蟲蛲蟲ヲ
驅泄ス。小兒毎朝或云空心ニ生根ヲ剉與レハ蟲ヲ
下ス○癌瘡甚惡厲ナラス或、甚久ヲ經サル症ハ生

シ貼メ腫痛ヲ消シ凝血ヲ散外治ス或云硬結腫ヲ
疏解ス全才失鳩答。水銀劑ニ超過禁。生草及根
搗天芭布トシ婦人乳房ニ貼メ乳汁ヲ乾涸ス○蜂
虻等ノ刺咬ニ根ヲ搗キ貼メ痛ヲ止メ速ニ治ス施
家福漢依
物叔物
新陳氣血量加減輕重之處
病害利潤
坐草入蒸臘水
胡蘿蔔
タ羅ペーンカラーダウクスダウクスカロウトシ蘭
胡蘿蔔ソ一種ダウクスケレ未根燥火蟲
チクニ性効胡蘿蔔ト同シ
試効根多ク糖質ヲ含ミ味甘滋養潤燥稀釋疏解ノ
効力川勞瘵様ノ症虛入小兒食メ消化シ易シ○劇

根ノ擦屑ヲ煮テ琶布トシ貼メ排膿淨刷シ劇痛ヲ止メ良膿ヲ釀シ瘡闌ノ硬肉ヲ軟^ラゲ腐蝕ヲ減シ危険ニ至ラス甚キ苦痛ナク多年性命ヲ保續シ或罕ニ治スル者アル等。近時經驗說多シ。

[胡蘿蔔根越幾斯劑]

[製法] 胡蘿蔔根 剁^{ハサウエ}二十七 沸湯 十七

右鉢ニ入蓋閉シ煖處ニ置浸^ス十二時ニノ火ニ上煮^ル半時放冷シ濾過ノ液ヲ取り又其滓ヲ絞テ液ヲ取合メ靜定シ沈渣ヲ去リ火ニ上^セ水氣ヲ蒸散メ越^{エキ}幾斯劑ノ稠ト爲ス。(涅)

[胡蘿蔔子]利尿發汗驅風健胃ノ効アリ○風氣痞悶腹痛ヲ解散シ淋疾尿道諸症。小便不利石淋ヲ治ス末トシ半錢宛服シ或水煎之用或對症ノ劑ニ加用○淋疾小便不利等ハ胡蘿蔔子。洋芥子各ニ亞刺比亞^{アゴボム}錢研末シ一時半毎ニ一指環宛服ス施
涅羅^{ラバ}蘭^{ラベ}根^ル小便利^ス○欬嗽喘急咽喉簽痛聲嘎小便燥痛等ニ絞汁或煮沐^シ沙糖^ミ和^ミ或舍利別下^シ服メ

屈雪堂集

清ス ○ 頑固ノ欬嗽及小兒勞欬呼吸不利ニ此汁ス
用テ治驗多シ ○ 小兒疫欬ハ根ノ煮汁ニ沙糖ヲ加
甘美琳酒與テ効多シ ○ 下利。努責痢ハ根ノ煮汁ニ
燕乳汁。扁桃油(或ア利)ヲ和シ吉利詞爹兒^{キリス}ナル
シ施メ治
ス ○ 欅嗽喘急胃寒、傷冷冷毒ノ諸症。殊ニ鶩口瘡ニ後
方甚験アリ奉為扶腫半升ニ水服取良也ハ
燕膏消毒飲^{ヨウカクシキソウイン}
燕膏根煮汁^{ヨウカクガクス}八弓^{ハコ} 亞刺比亞^{アラビア} 蔣謨^{アラビア} 二錢
雞癩沙糖^{ヨウタマシタフ}一弓^{ハコ} 治風寒。止渴不寐蘇氣。止渴又
右調和シ適意ニ服ス風寒胃火候^{ハコ} ○ 風寒初開

又方

蕪菁根煮汁

五
三

白蜜

醋各一
弔

右調和ス。鷺口瘡ハ是ヲ含敷ノ尤良○痛風劇痛ニ
根ヲ乳汁ニ煎熬メ膏藥人如シ貼メ治ス○鷺口瘡
咽喉簽痛等ハ根ノ絞汁或、煮汁ヲ漱藥トシ或、沙糖
ヲ加、含漱亦治ス○手足凍瘡皯蹠ハ根ノ切片ヲ熱
灰ニ煨シ或、煮テ貼シ或、煮汁ニテ蒸漏メ治スハ
蕪菁子發汗驅風ノ効アリ古賢痘疹ヲ驅發汗ニ
此子ヲ搗テ半錢ヨリ一錢ベテ用ヒ或、大麥煎ヲ加
搗テ乳劑ヒ用ヒ効ヲ稱ス **蕪菁子搾油** リイ蘭緩
和滑利久効アリ諸中毒ニ内服メ能^ム解毒ヲ和解シ

腹痛ヲ止ム○疝痛ニ此油一二匙燒酒少許加服ノ
治ス○努責痢。腸痛。大便燥結等ニ此油ヲ吉利詞參
兒トシ施メ治ス。輕キ火傷ハ是ヲ擦メ發泡セス焮
痛速ニ止ム但新鮮油ヲ用ヘシ陳久者分腐敗シ
酷厲ニメ大害アリ○油ノ滓ハ甚軟化シ緩解ノ効
アリ乳房結腫等ニ貼メ速ニ疏散ス 施叔
アリ乳房結腫等ニ貼メ速ニ疏散ス 施叔

馬兜鈴

アリストロシニア羅オーステ
ルムシイボルナルトウ蘭

長根圓根アリ圓根尤良 按ニ圓根和產未詳 上品ハ重實硬固

塊節様裏黃色味苦シ

正

白蓮

細

一

三

試効根解凝稀釋ノ効ヲ稱ス。神經ヲ衝動シ凝血粘
液ヲ稀釋メ驅泄ス○婦人經閉。產後惡露壅滯。血塊
ヲ下ス○粘液病。萎黃病。處女病ヲ治ス○喘急肺癆
等ニ用テ粘痰汚液ヲ淨刷ス○痛風脚痛等ニ久服
メ凝血ヲ疏釋シ惡液ヲ排泄立治ス。寒粘液過多ノ
脚痛風ハ此根ヲ燒酒ニ浸シ蒸餾メ精タ取リ沙糖
ヲ加服ス○服量末トシ半錢ヨリ二錢ニ至ル。或泡
煎劑十シ或越幾斯劑トシ一刀宛用ヒ或丁幾劑
トシ五六六十滴服ス○潰瘍瘻瘡腐骨疽等ニ此末ヲ
摻シ縛帶火施メ排膿淨刷シ侵蝕ヲ遏メ。疥癬等ノ

皮膚病ヲ治ス

依
叔
伍

延胡索

アラギクスカボサアリストロホルタルトルバステルトホルタルデガリガイシ蘭

試効

根解凝。滌汚。發汗利尿通經ノ効アリ○心腹痛
疝痛ヲ治ス○子宮ノ凝血ヲ疏解シ經閉ヲ通シ血
塊胞衣死胎ヲ下ス○胸肺ノ粘液ヲ滌刷メ排除ス
○小兒蟲症ニ此末一刀宛用テ蟲ヲ下ス○黃疸及
疥癬ニ根末一錢適宜ノ飲液ニテ送下シ溫覆發汗
メ治ス○服量散劑トシ半錢ヨリ一錢ニ至ル。或水

香附子

セイペリスロンデタルデセイペルガラス蘭

附三稜

セイペリスロンデタルデセイペルガラス蘭

甘草

ラス蘭○ニ品性功同シ但シ但シ

試効

根香氣アリ微辛神經ヲ開達シ精氣ヲ活潑シ
胃ヲ健運シ風氣ヲ驅散シ汚液ヲ淨刷シ粘液ヲ稀
釋ス○風氣腹痛。疝痛。頭旋眩冒及粘液鬱塞。粘液腫

萎黃病處女病ヲ治ス○子宮病ニ良驗ヲ稱ス○煎劑トシ或末トシ一錢アテ服ス

淑物
叔度

江戸花戸ロウト呼ヒ栽培ス

試効 新鮮葉花穂佳香竄透龍腦様味辛苦性効默栗薩ノ如シ○精神ヲ活潑シ微刺戟ノ生氣ヲ揮發甘之頭腦粘液壅滯ノ諸症ヲ治ス○萎黃病處女病ニ泡劑トシ小兒瘰癧ニ煎劑トシ用テ試効多シ○頭腦神經胃ノ健運シ驅風止痛鎮痙ノ一藥トス○飲食消化シ難ク風氣痞悶胃腸攣痛ヲ治ス○失氣昏憂病傷冷毒痛經閉白帶下等諸藥効ナキ症間殊効アリ但娠衝壯熱アル症ハ的當セス葉ヲ煎劑泡劑

或精劑及油トシ用フ○諸管弛弱血液運行怠慢ノ壅塞セル諸症經閉三日熱ハ葉及花穂ヲ葡萄酒ニ浸シ服メ治ス○葉花ヲ蒸漏劑トシ施ノ肢節神經ヲ健運シ麻痺不遂ヲ治シ寒壞疽ヲ防キ寒粘液腫ヲ消ス○末トシ鼻中ニ吹テ嚏藥也又迷迭香精花ハ香氣速ニ消スル故ニ生花ヲ燒酒ニ浸シ蒸餾ノ精劑ト爲ハ香氣能竄透ス製法試効眩目ニ出ツ冒衝逆等常用ノ良藥トス又迷迭香油試効メ諸症ヲ治ス○外敷メ溫壯衝動シ肢節諸筋ノ弛緩癆痺寒粘液腫ヲ治ス痛風傷冷毒痛ハ患部ニ擦ス水ヲ

和シ眼ニ點ノ視力乏弱ヲ治ス　患瘡ニ散ル本ト

迷迭香油葉ヲ水ニ浸シ蒸餾ノ香竄峻効ノ油ヲ取

製法試効○睡癥失氣昏冒衝逆擣掣痙攣ヲ治ム服

名ニ出ツ○睡癥失氣昏冒衝逆擣掣痙攣ヲ治ム服

量一滴ヨリ三滴下テ沙糖ニ研和シ服ス○琶布或

蒸湯劑ニ加テ外用シ筋纖維ヲ刺戟メ健運シ癥ノ

麻痺ヲ醒覺シ死肌ヲ防護シ寒粘液ヲ疏解シ打撲

傷ノ凝血ヲ驅散ス○施依物

松蘿

「ザルオガセ和」公スクス
アルボニアロ「ボームモス」蘭

試効槲樹ニ生シ白色ヲ帶ル者尤効アリ○性收濁

和胸劑ニ加服ノ欬嗽ヲ治ス○肺癆ノ欬嗽脹樣ノ
痰ヲ咯症ニ良驗アリ朝夕一錢宛乳汁ニ煮テ服シ
或沙糖等分ヲ加研末シ朝夕一小刀尖宛適意ノ肉
羹汁若ハ乳汁ニテ送下ス。幾那ニ比スレハ氣味不
佳ナラス○諸失血嘔吐下利血痢ニ煎眼久尤良○
外敷メ止血藥トス創傷出血衄血ヲ治シ斷頸脣爛
ヲ愈シ齒ヲ固メ小兒ノ脣狼瘍窟腫ニ末ヲ摻メ
乾愈ス○僕括

車前葉山慈姑　ガタコ「ガタクリ」和テシスカニヌス
エケトミロ「ホンドス」タニ「蘭

試効 乾根ヲ搗碎キ乳汁ニ煮食ノ味佳ク滋潤榮養

強壯シ老人精力虛乏ヲ補益シ或煮テ食料トス大抵沙列布鏡 効アル諸症ヲ治ス○乾根ノ粉末ヲ乳

汁ニ和シ或水ニ煮テ糊ノ如シ小兒ニ與テ蛇蟲ヲ殺シ或條蟲ヲ下ス○疝腹痛ニ根末一錢咲塹名

和シ服ノ治ス○小兒癇症擣擊等ニ此末ヲ鈴蘭花水ニ加與テ良効多シ漱

車前 アランタゴ 羅 ラキブレ子 蘭 ヤニスギ 鮮 スイ 末 スミ 跛及一小口尖頭蘇齋ハ麻利不

試効 根葉子共ニ收濬清涼淨汚ノ効アリ根殊ニ効

多シ血液ヲ稠厚シ創ヲ愈シ下利血痢吐血婦人月經過多白帶下ヲ治ス根若クハ葉共ニ水煎シ服ス○久嗽欬血肺癆下利等ハ生根ニ水ヲ加搗テ汁ヲ取リ沙糖入加或舍利別メ服ノ良効ヲ稱ス○或云春月ノ間歇熱ハ此根ヲ用テ良驗アリ秋發スル症ハ治シ易カラス○口中潰瘍咽喉焮腫ハ根葉ヲ水煎ノ漱藥トシ焮腫眼ハ是ヲ洗藥トシ或打撲傷肌膚剝爛焮腫火傷等ハ生葉ヲ搗爛シ貼メ治ス

車前水 葉ノ蒸 館水 ハ 焙熱ヲ清涼シ汚液ヲ淨刷ス眼疾不洗藥トシ用ノ○車前子一錢許末トシ或 水服ノ

下利ヲ治ス

依
叔
伍
物

益母草

茺蔚

コラミヌカルテアカロ

ハルトゲハパシ蘭

試効此草稀釋鑽透鎮痙強壯ノ効アリ。子宮衝逆。總
チ子宮病諸症。心腹痛。心下牽脹。心動悸。或粘液留飲
壅滯シ胃ノ運營ヲ妨碍メ擊急痛ヲ發シ。或肢節牽
引拘攣ノ諸症ニ試効ノ良藥トス。泡瀉トシ用。

叔
物

翻白草

ガハラザイユ

和 ポテンチルラ

ポテンチ

・

セリナガンセリキ

・

ガンセコロイド蘭

試効根及葉或子性清涼收濇ス先哲蒲爾華歇人間
歌熟往來熱ニ質驗シ効力卓偉。幾那ニ減セストス
水煎用。或生絞汁ヲ與フ○下利赤痢。吐血。月經過
多白帶下ヲ治ス○黃疸水腫及石淋ニ良驗ヲ稱ス
○外敷メ焮腫ヲ消シ又止血愈創ノ一藥トス○斷
頸腐爛ニ漱藥トシ鰥血ハ葉ノ絞汁ヲ布ニ浸シ鼻
孔ニ挿シ。乳房結腫ハ絞汁ニ醋ト食鹽ヲ和シ貼メ
治ス○牛馬ノ背皮鞍傷剥爛ニ乾葉ノ末ヲ摻メ速
ニ乾愈シ新皮ノ生ス叔
物

玄參

〔スクロヒラリニア〕スクロヒラリニアノドサロ
〔ペキスユイム〕ロートスペーンコロイドススクロ

ニ草ヘルコロペルコロイドス久口蘭

試効

根葉亦用ノ、腺腫瘰癧結核、惡性硬腫、焮熱、大皰、頸

腺腫ヲ治ス。煎劑ヲ外服シ或琵布パウボシ貼シ或根ヲ

搗碎物搦祭亞石鹼ヲ研和シ貼ノ消散ス○痔疾盲

痔腫痛ニ煎劑ヲ内服シ或蒸湯藥トシ或軟膏トシ

貼ス○疣瘻、魚目、根葉ヲ搗、貼ノ消散ス○潰瘍ヲ淨

刷シ腐肉ヲ祛キ疥癬乾癬白禿瘡、惡性浸淫瘡、污穢

瘡疹ヲ治ス。煎劑トシ外服シ且洗湯藥トス○根末

トシ服メ殺蟲ノ効アリ

〔伍〕〔淑度〕

大穴昔蘭華根入門

龍葵

〔イヌホウヅキ〕和ソラヌムニグリムソラ
〔ヌム・ヒルガ〕羅スワルテナクトシカード蘭

試効

此草酷厲ノ麻痺毒アリ過服スレハ昏睡搐掣

等ノ危症ヲ發ス然氏良菪ニ比スレハ性緩ナリ○

催眠鎮痛ノ効アリ。大ニ汗ヲ發シ大小便ヲ驅泄シ

水腫ヲ治ス○偏瘫ニ聞大効アリ一婦人半身不遂

ヲ患ヒ是ヲ用テ回復セリ○腐蝕ノ潰瘍、頑固ノ疼

痛、癌樣惡厲瘡ニ乾葉一氏ヲ水一弓ニ浸シ或泡劑

トシ服メ汗丸發シ大小便ヲ利ノ竟ニ治ス○經久

潰瘍稀涼酷厲液多ク漏泄メ治セサル症ニ此葉四

分氏ノ一宛用テ治験ヲ得タリ○癌ニ用テ全愈セサレ。氏良芳ニ比スレハ緩和ニノ劇痛等ノ惡症ヲ寛解スルニ良効ヲ稱ス。但多血ノ症ハ刺絡シ吐劑若ハ下劑ヲ投シ夜分臥床ニ此藥初一氏宛與テ大便利セサル者ハ下劑ヲ與ヘ。其後漸加テ五六氏宛用ニ至テ發汗大小便通利ノ排泄ナキキハ此藥ヲ休ヘシ○外敷メ焫衝羅斯咽喉痛或癌樣硬結腫或侵蝕潰瘍或惡性乾癬類。癰瘡炮疹等ヲ治ス。此藥ヲ搗テ溫貼シ或琶布トシ貼ノ止痛消散或排膿淨汚ノ殊効ヲ奏ス○熱毒頭痛ニ葉ヲ搗貼シ或葉ノ絞汁

ニ醋少許加、患處ニ擦メ験アリ

施叔物

金雀花

ユニアシタ通名

ゲニスカスパルチウムス

蘭

形狀

灌木五六尺許

丈許

或云一幹莖叢生柔撓細枝多シ

葉狹尖一葉或三葉宛著キ味苦不佳。蛾形美黃ノ小

花枝條ニ生ス十雄蕊一雌蕊第十七編第三目長莢ヲ結ヒ

黃色滑澤ノ子ヲ收ム。仁味甘シ○一種ゲニスターテ

ンキトリムアケルブレムアリ。莖枝矮地ニ偃シ葉多シ花。

枝梢ニ簇生ス。効用同前。又花ヲ採テ黃色染料トス

試効苦味解凝藥トス。莖梢葉花子仁共ニ小便ヲ利

シ水腫ヲ治ス。或云腹水百方効ナキ症ニ濃煎劑十
弓ニ白芥子四錢ヲ和シ朝夕服ノ治ス。又水腫ニ此
根ヲ泡劑トシ服ノ治ス○腎痛結石ヲ碎キ小便ニ
驅泄ス○莖葉花實ヲ燒ケハ亞兒加利鹽多ク出ツ。
其淋灰鹽ヲ取用テ能小便ヲ利シ水腫ヲ治ス。其他
一切草木ノ燒灰及淋灰鹽亦利尿ノ効アリ列印設
酒ニ加能飽和セシメ水腫ニ用テ偉効ヲ稱ス○花
ノ燒灰ヲ水葡萄酒等分ノ液ニ浸シ上清ヲ取り水
腫及惡液腫様ノ症ニ用テ小便ヲ利シ粘液ヲ通シ
腎膀胱ノ結石ヲ碎キ驅泄ス○花葉莖子ヲ水煎シ

服ノ肝脾腎膀胱ノ壅塞ヲ疏通ス

度叔華依

花菖蒲

イリス イリスノストラ イリスヒル
ガヒロ リスリスオーハセ卫蘭

榕按ニ燕子花同種根性功同

シ花碧紫藤花色白條等アリ

試効春月葉生ナル前ニ根ヲ採藥用トス○乾根生

ハ性緩 比スレ溫煖開達清血淨汚ノ一藥トス。小便ヲ驅

泄シ水腫皮水及喘急ニ殊効ヲ稱ス。水煎シ用或散

剉トシ半錢ヨリ一錢ニ至ル。或鼻中ニ吹テ嚏藥ト

ス○生根味辛辣咽喉ヲ刺戟シ利尿瀉下ノ峻藥ト
シ或吐ス。壯實ノ水腫ニ用テ小便ヲ驅泄シ停水ヲ

滌除ス生絞汁ヲ取瀘テ沈渣ヲ去リニ錢ヨリ一ヲ
マテ服ス。但孕婦小兒虛人ハ是ヲ禁ス。動スレハ腹
痛寧急ヲ發スル故ニ桂末等香竄藥。酒石英等ヲ加
或肉羹汁。葡萄酒ニ和シ用ヲ或舍利別トシニ錢許
服ス。但生根ヲ水煎スレハ性緩ナリ○外敷ノ皮膚
汚斑ヲ消シ潰瘍ヲ淨刷ス伍度
淑叔

蓼タデ 食用品。日本口ビヘル「ボキゴスマムヒドロ
ルベヘルシキヨロイド」ブランデンデペル
シキコロイド「シケル」
ブル蘭ブル蘭

試効葉及穗。溫煖開達利尿疏解驅泄ノ一藥トス。內
藏壅塞水腫。黃疸ヲ治ス。水煎或乾末シ或對症ノ劑
ニ加、或肉羹汁ニ煮テ用フ又殺蟲ノ効ヲ稱ス○水
煎シ吉利詞キリス爹兒テルトシ施メ努責痢赤痢ヲ治ス○露
水莖葉穗ニ水水ヲ加、蒸餾ス膀胱ノ粘液ヲ驅リ石淋ヲ治シ蟲ヲ
殺ス。或云黴毒及癩ニ試効アリ
外敷熾熱ナキ痛風ニ葉ヲ搗キ或燒酒少許ヲ和シ
患部ニ貼メ疼ヲ止。病毒ヲ疏散ス。骭股痛風ハ初發
ニ施メ特効アリ○寒腫。硬腫ヲ消シ排膿防腐愈創
ノ効ヲ以テ經久。潰瘍創傷潰爛ヲ淨掃シ菌肉腐肉

ヲ除キ瘻瘍頑癬侵蝕瘡惡厲禿瘡打撲青斑等ニ葉

ヲ搗テ琶布トシ或硝砂ヲ加或散剤ヲ摻シ或水煎

蒸湯ノ治ス

度

墨記草

ハノ字タデ俗稱ペルシカリア羅ゲハイルデドイセ
ンドコイロサクテペルシキコロイド蘭

試効葉穗微收濇愈創清血軟化ノ効ア火下利赤痢
腸剝爛膿血ヲ兼ル症ヲ治ス○瘡疹小皰等皮膚不
潔ヲ祛ク葉ヲ煎劑トシ或花ヲ舍利別トシ服ス○
條蟲ノ有無疑シキ症ハ此花ノ舍利別四五錢ヲ與

ニ蟲アレハ白色細屑大便ニ雜下ル○外敷ノ毒螫
刺咬ヲ治シ創傷ヲ愈シ寒壞疽ノ侵蝕ヲ防ニ大効

ヲ稱ス

僕
淑
度
叔

蓖麻子

リシヌスコムミ子リシヌスヒルガレセム

試効斑紋アル壳皮及薄膜ニ峻瀉ノ酷厲毒アリ皮

膜ヲ去仁ノミ用レハ瀉下ノ効微ナシ故皮膜ヲ連
用テ峻下藥トシ或吐瀉ス。往古腐敗膽液粘穢留飲
等ヲ滌除スルニ用フ然正感觸ニ易キ人ハ胃腸熾
衝劇腹痛擣掣等ヲ發スル故晚近是ヲ廢シ稀ニ峻

瀉スヘキ壯實ノ症ニ用フ或巴豆油ヲ以テ代用ス
蓖麻油新鮮搾油ハ性緩和ニノ毒ナク内服メ攣急
 ノ緩メ大便ヲ滑利ス。内藏攣衝劇痛牽縮。燥屎硬結
 等頑固。大便閉ニ的當ノ通藥トシ殊。腸攣衝劇痛痴
 腹痛。瘻癥。貌僂窟。吐糞病ノ諸藥功ナキ症ヲ治ス○
 吐糞病。膽液結石ノ劇嘔吐呃逆ヲ兼患者虛憊ノ下
 剤用。難キ症ニ是ヲ與テ攣急緩弛シ大便通利メ諸
 症寛解シ或全治ス此油一時毎ニ一匙宛與○赤痢
 ニ用テ努責ヲ鎮メ大便ヲ利ス。往年赤痢大流行シ
 此油半時毎ニ四錢宛用テ能通利シ大効ヲ得タリ

或吐劑ヲ與テ後此油ヲ用テ効多シ○淋疾ニ用テ
 潤下シ疼ヲ緩メ小便ヲ利シ腎膀胱ノ諸症石淋ヲ
 治ス○殺蟲ノ一藥トシ服外蟲ヲ驅泄ス。扁桃油。阿
 利襪油。亦大便閉蟲症等右ノ諸病ニ効ナレ。凡蓖麻
 油ハ緩下ノ効アル故尤適應ス○攣急ヨリ發スル
 嘔吐。吐血。嘔血ヲ鎮メ呃逆ヲ止ム○膽液過多ノ諸
 症。煥衝性ノ熱病。誓留熱ノ大便ヲ滑利スルニ用フ。
 但胃腸ニ膽液腐敗毒鬱積ノ壯熱増發スル症川答
 末林度名中和鹽類ヲ的當トス○此油ハ緩和久効
 多キ故ニ諸管纖維弛緩粘液質ノ人ハ適應セス○

金屬毒。礫石等ノ中毒ニ用テ劇キ腹痛苦悶ヲ寛解シ捷効ヲ奏ス。服量一錢ヨリ二三弘。宛屢用テ大便利スルヲ度ト。又小兒ハ一錢ヨリ二錢。テ一服トス。○夜分臨臥ニ一錢許服スレハ翌朝微利ス。大便燥硬秘結腹痛等ハ半時毎ニ四錢。宛服シ。小兒ハ二錢。宛與フ。初生兒ハ一卵匙。宛與テ胎屎ヲ下ス。外敷。蓖麻油ニ錫末白降汞。名ヲ研和シ癌瘡ノ潰爛腐蝕甚キ症ニ貼ノ劇痛ヲ祛キ惡症ヲ寛解。殊効ヲ稱ス。或腫瘍ノ化膿ヲ進メ惡厲。疥癬。禿瘡。頑固。浸淫瘡。小兒惡性ノ頭瘡ヲ治シ。光菁發泡後潰爛甚キ。

ヲ愈ス

蓖麻油製法

鏡卷三出

皮及膜ヲ去。製スヘシ。搾油ハ溢敗

シ易シト雖モ味佳ク。焦臭ナクノ煮油ニ勝リ。上品ハ清潔透亮ニメ香味ナシ。尋常藥鋪ノ品ハ淡黃稠厚微辛ヲ帶フ。陳久瀆敗スレハ大毒アリ。新鮮油ヲ擇ヘシ。眞品ハ能亞爾箇兒名ニ溶化スルヲ以テ偽品及他油ト駁辨スヘシ。施叔依 福 出東洋醫文一書

黃耆

アストラガルス。エキスカドス。羅。

試効根及子ヲ用ス。味微甘。收濁ス。水煎シ用テ下利。

赤痢ヲ治シ小便ヲ利ス○或徽毒諸症ニ左ノ方多

ク良驗ヲ稱ス

[黃耆煎] 黃耆 根 一弔

右水適宜ヲ加煮テ濾過シニヒヲ取リ朝夕一ヒ宛服ス○漱藥トノ斷頸ノ腐爛ヲ淨刷シ治ス○末トシ經久潰瘍及創傷ニ摻メ排膿淨刷シ乾愈ス

依物
叔

羊蹄

ヲハ左ムアキ左ム「リメクスアキ左ム「リメクス・キリス・ラス・ロ・バチシ・リデル・ラル・ト・ル・蘭

試効 **根葉** 或莖 收濁強壯清血愈創ノ一藥トス。血液酷厲毒ヲ驅除シ纖維縱緩ヲ收固メ治スヘキ諸病ニ

用フ○疥癬乾癬禿瘡頑固惡瘡潰爛浸淫瘡皮上汚穢不潔小皰赤疹等ニ大効ヲ稱ス根水煎或散劑トシ或絞汁ヲ服シ或山半勞根土木香根ヲ加煎服ス○根煎劑若バ散劑トシ服メ失荀兒陪苦ヲ治シ小便ヲ利メ黃疸ヲ療ス○水煎含漱メ齒痛ヲ止ム○根若ハ葉ヲ搗テ乳汁ヲ煉和メ軟膏トシ前說ノ瘡瘍ニ皮ヲ去搗テ乳汁ヲ外敷シ或水煎メ洗藥トシ或生根貼メ殊効ヲ稱ス或此根ニ土木香根ヲ加搗テ乳汁若ハ家猪脂ヲ和シ煮テ濾過シ硫黃花少許ヲ加貼

土大黃

ラバ左ムアタキムロメクスア
タチキムロ

○

榕按ニ土大黃ハ莖葉花共大黃ニ似テ根瀉下ノ効ナク性收濁ス藥鋪ニ真ノ大黃及官園大黃ト呼者亦然リ故ニ是ヲ代用メ効同シ

試効

根及葉性收濁苦味清血淨污愈創ノ効アリ

外服メ失苟兒陪苦ノ諸症青斑肢節強硬潰瘍ヲ治スル一良藥トシ性効大約羊蹄ノ如シ○下利赤痢月經過多或痛風傷冷毒痛ヲ治ス○根若ハ葉生乾ヨ論セス水煎シ或大麥煎ニ煮テ沙糖ヲ加服シ或

舍利別トシ與或根葉ノ生絞汁ニ沙糖若ハ蜜ヲ加服ス○咽喉口顎ノ潰瘍腐爛扁桃腺懸壅垂ノ腫脹及歯痛ハ右ノ諸劑ヲ含漱劑トシ治ス○潰瘍浸淫瘡疥癬乾癬或羅斯焮腫喉焮腫或面部小炮赤疹等ニ外敷外敷ノ治ス○外敷ハ根葉絞汁若ハ煎劑ヲ洗藥蒸湯藥含漱藥トシ或醋少許ヲ加施シ或絞汁ニ家猪脂ヲ和シ軟膏トス

物叔

新訂增補和蘭藥鏡卷十八 終

青藜閣藏版書目錄

江戸後草芽門二丁目

須原室伊 八

四書集註

道香點素讀本
大字最勝堂板

全冊

朱子心學錄

明朝金谿王冀輯

全冊

同集註

朱錫所校正
龜先生覆詳

半冊

大學章句纂釋

古賀繩里先生著

全冊

周易古註

魏王弼注
昔韓康伯注

全冊

四書便講

佐藤直方先生著

全冊

同正文

穀山先生校正
明朝方密之著

全冊

女誠

後漢曹世叔著
忠珍先生新注

全冊

物理小識

明朝方密之著

全冊

棠陰比事

明朝桂萬榮著

全冊

文子全書

入江南溟先生校
舍冊

全冊

七經孟子考文補遺

山井西先生撰
物叔達先生補

全冊

七經孟子考文補遺

山井西先生撰
物叔達先生補

孝經會通

明朝沈淮著

全冊

易經詩經春秋禮記孝經孟子ノ
七種ヲ合刻ス全部三十二冊

新定儀禮圖

高田矣儒臣
村松先生著

二帖

鹽鐵論

漢朝桓寬撰

明朝程榮校

金言

關尹子

白昇真純被

全冊

大清廣輿全圖

水戸赤水先生校
彩色箱入一枚

唐土ノ地圖世ニ行ル、者善本有トナリ依テ
先生多年研究シテ此一大圖ヲ製ス水陸道程
山川ノ疆界日景星度ノ遠近ヲ量リ以テ
天下ノ形勢ヲ知テシム

歷代州郡沿革地圖 水戸赤水先生著

大清國海陸道程圖 禹貢九州圖 折本一帖

周職方氏圖

戰國七雄圖

西漢州郡圖

三國州郡圖

唐十五道圖

亞細亞小東洋圖

秦三十六郡圖

西晉南北朝圖

大明十三省圖

尋常ノ地圖ト異ニテ毎圖分度ヲ量リ方
尺餘ノ紙面ニ歷代ノ變化沿革ヲ微細ニ著シ
席上ノ一奇觀ニ備フ尤凡讀史家涉獵ニ附
六成敗事跡ヲ探索スルノ勞キ力ランタ
五彩ヲ施シ覽之テ瞭然タラシム

禮記玉制地理圖說

赤水先生著

全冊

相傳ア管相公編輯シ玉に延喜帝へ奉ラセ玉ア
所ノ書ナリ上ハ六經下ハ諸子百家ノ書ニリ
二部ヲ分ツ學者善ク熟讀シテ誠ニ身ヲ脩メ國ヲ
要語格言ヲ擇出シ君道政事文學武備禮注官
制刑法祥瑞祭祀人倫人事風俗ニ至リ士商
二部ヲ分ツ學者善ク熟讀シテ誠ニ身ヲ脩メ國ヲ
治ル一助ハ云モ更ナリ博物多識茲先事モ少ナシ
五彩ヲ施シ覽之テ瞭然タラシム

博覽古言 古名管轄抄

林道春先生謹解 全冊

撈海一得 鈴木瀧州先生著

全冊

國字ノ隨筆ニテ雅俗ノ書誠不才子學問ヲハサ
クニ甚益有故ニ博物家王坐石ニ置ベキ書也

明朝樂事 尾張南齋先生譜

全冊

明朝樂事 明朝田汝成著

全冊

和漢月令大同小異有云博覽家考證一歲ヘニ音也

行書類纂

漢南齋先生撰輯 東陽闡先生編次

全冊

方秋庄詩鈔 清朝吳孟舉選

天民雨先生校

全冊

范石湖宋三家律詩

元氏雨先生校

全冊

楊成齋詩鈔

陸放翁

宋三家律詩

全冊

北禪詩草

大典禪師著

全冊

北禪文草

大典禪師著

全冊

伽陀

大典禪師著

全冊

小雲接手簡

大典禪師著

全冊

增訂宋詩稿

天民先生著

全冊

小刺

全冊

增訂宋詩稿

天民先生著

全冊

金詩選

柳灣先生校

全冊

清朝張二銘選

小刺

全冊

金詩選

柳灣先生校

全冊

米菴先生百絕

金罰

全冊

宋詩語二編

山松雨先生輯

全冊

樂志論

米菴先生書

全冊

范石湖三大家妙絕

市河寛齊先生撰

全冊

楊成齋

三大家妙絕

全冊

范石湖

三大家妙絕

全冊

冷齋詩話

宋朝僧惠崇著

全唐詩逸

市河寛齋先生輯

小刻全一冊

隨園詩鈔

市河寛齋先生撰

金冊

洪公嘗テ東坡山谷ト交リヨ。清淡佳謡喜ベク
驚ベシ一度此書ヲ覽テ愈快ト賞歎セ。九十六

清朝康熙帝ノ全唐詩一百卷ニ遺送シ尤所
トナビシラ彼土馳走博ノ知不足齋叢書等第
三十帙目ニ再刻。道光三年翁廣平廿六跋。書
シ極テ賞歎ス今又其マ。翻刻スル者也。

小倉山房詩鈔一千五百首ノ中ヨリ初學三解
シ易キ詩四百餘首ヲ抜萃セシモノナリ。隨園
清初ノ詩風ヲ一變セシ乾隆年間詩人大家ナリ
當今詩志又君子此詩鈔必入讀ヘキ書ナリ

寛齋先生遺稿 三亥先生編次 金冊

先生ハ近世ノ詩宗ニノ當時流行タル詩風ノ轍

祖ナリ妙作至テ多ニ曩ニ數種刻成テ盛ニ
行ハル此編ハ中年ヨリ晩年ニ至ルマテ數千首

ノ中ヨリ鈔錄入奇趣絕調ハ一讀ミテ知ルベシ

作詩志穀 山本北山先生著 金冊

唐宋明ノ詩作異ナルヲ論テ附錄三組

南郭ノ詩文章、謬誤ヲ舉ケ示セシ書ナリ

佩文齋兩韻便覽

天民先生著

懷中折水全帖

清ノ彭元瑞著詩韻異同辨二本。佩文韻府等ヨリ
一字平仄而用ノ字ヲ選ミ訣ヲ附レ實ニ簡便ニメ
集會且ツ旅遊ノ懷寶ニ備フ。

作詩字例

芝水先生著

小刻全冊

上六朝ヨリ下モ元明ニ至ル諸名家全集ヨリ佳
章秀句ヲ精選シ且出附ノ記詩入宝鑑等之書也

孝經樓詩話

北山先生著

金冊

先生非常ノ論ヲ發。唐宋詩學。負篤ヲ辨折
矣。更ナリ作詩立意。聚要等サト。遠考謹三益。ナリ

唐詩平仄考

盧玄淳先生著

小本全冊

四聲世々變アリ然レバ近體唐ヲ以テリトレス
平仄ヲ險トシテ天然ノ聲音コニ有フヲ知ラサルヲ
憂ヒ又近世大家ヒ平仄泥字宇義ヲ誤レナリ有
ニヨリテ其作例ノアリ辨折ノ正路ヲ教導シ五フ

幼學詩韻

桂林先生校閱

全冊

世ニ韵礎ノ書多シトイエ。童蒙ニ便ナス此書
ハ手近キ題ヲアソブ四季半ニ雜ト部ヲ分ケ廣ク
エテ至テ作リヨキ韵ヲ題コトニ出ニ次ニ轉句
押ヲトシノ字ヲモノノ詩語碎金詩學小成頃語詩
傳ナド。書タ見テ字ヲトリ合ス。六易ク一首ヲ
作り得ラルベキ詩道教育ノ書ナリ。

幼學詩韻續

蘅園先生校閱

全冊

前件ニカルス詩韻日々盛行ス然トイエ。是
諸君子詩題。其ヨ韻字ノカラザルコトヲ患フ依
先書ニ洩タル題ヲ設ケ韻ヲ附シ不足ヲ補フ

詩學小成

十葉先生著

小刻全冊

此書ハ時令ノ門部ヲ分ケ小贈答印事等ノ題
テヨアゲテ該字ヲ附シ韵體ヲ属シ又轉句及ヒ平仄
ヲ記ス。初學師傳ノクトモ作詩ノ自在ヲナスベニ
詩作セニ良材ト云。此書ナリ。

頓悟詩傳

葉玄之先生著

小刻全冊

初ニ詩題十餘種ヲ出ス。字ヨリ三十字ニ至ル
且成語熟字坤名異稱等ノ部類ヲ分ケ都
詩作セニ良材ト云。此書ナリ。

四聲韻選

芸閣先生著

小刻全冊

李太白杜子美ノ平韻仄韻ノ作例ヲ鈔出シ
附録ニ兩韵ノ字義ヲ述ハ。

西域聞見錄

清七十一椿園著

金冊

清康熙雍正乾隆ノ間西域回部ノ諸大國
ヲ従々平定シ咸ク版圖ニ入り内地トナリ
ヨミハス且ツ其諸部ノ山川人物風俗物產
等ヲモ詳ラカニシルス

初學文軌

大典禪師著

全二冊

尺牘筌

鈴木瀧州先生著

小一本

禪師積年、精研ヲ以テ漢文ノ心雅ヲ舉ゲ示ス
和習ノ淳俗ヲ脱出スルノ諄タ教授シ玉フ書也

作文志穀

北山先生著

小一冊

尺牘彙材

淡園先生著

小一本

和漢諸尺牘中ヨリ初學日用ニ便丸語ヲ採稿、
和解ヲ附ス語ヲ求ルニ甚速ナリ

文草小成

芸閣先生著

小一冊

東漸地名箋

增補小判

全二冊

諸大家ノ良材ヲ選ミ叙懷存問錢別慶賀時候其余
數ヶ条ノ部門ヲ分子大成ノ國字ヲ附ス且舊式ト
和俗漢雅ノ作例ヲ對照ノ變化自在妙用ヲ知ラム

漢文ヲ如譯ノ覆文ノ法ヲ示シ和文ヲ漢譯死活勢ヲ悟
ラム回街談巷説ノ戲作ノ作文難事ナラサム知ラム
便宜有誠香炷ヲ燒テ限トシ席上ニ頓作セシム今
ソ成文二篇ヲ舉テ一章ノ機軸ヲ知ラム實作文
捷往ラ直筆頭花ノ生シ妙用神ノ如シ

文藻行潦

北山先生著

小一冊

含餽紀事

台州先生戲作

全二冊

日本兒童ノ云傳ノ舊説ヲ漢文三面白ク繕リ俗譯
ノ附々切心漢語作文ノ例則ニモ十九ベギナリ

經史摘語 鈴木瀧州先生著 全三冊
經史ヲ主トシ諸子百家衆流ノ書ニ至ルマテ悉々
撮撮ニテ其出所ヲレルト専ラ作文家ノ咄嗟ノ辨
ゼタメ伊呂波引ニエテ探討レ易カラム博物ノ
君子セ必遺忘ニ備フ全書ナリ

紀効新書

明朝戚南塘著

全二冊

騎士用本

鶴重秀先生著

全二冊

日本兒童ノ云傳ノ舊説ヲ漢文三面白ク繕リ俗譯
ノ附々切心漢語作文ノ例則ニモ十九ベギナリ

單騎西要略製作辨

村井昌弘先生著

全二冊

騎士用本

鶴重秀先生著

全二冊

日本兒童ノ云傳ノ舊説ヲ漢文三面白ク繕リ俗譯
ノ附々切心漢語作文ノ例則ニモ十九ベギナリ

西洋火攻神器說 明朝何汝賓著 全二冊
西洋火攻神器說 平子龍先生校訂合刻
其器ノ形状ヲ圖シ大小銃筒ノ鑄造彈丸ノ輕重
火藥ノ煉造法ヨリシテ放チヤウニ至ルマテ具ニ
其製作秘術ヲ載ス

國字解

平子龍先生補闕

全二冊

中古甲冑製作辨

柳原香山先生著

全二冊

日本心得ヲ初トシ往昔ヨリ世ニ行乞所新刀鎗其
余鐵工評書誤多説或失漏多更等ノ真義著ス
此製器ノ天工ヨリ慶長ノ頃迄中古戰國時用ハ矣
ラ避々坐作進退ニ武威顯ル所ノ利用ヲ宗トシ
干民武器ノ悉ニ變セヒ等圖式ノ加々懸解

同
巨炮二攻守戰ノ三法アル事ヲ論レソマビアカニ
其器ノ形状ヲ圖シ大小銃筒ノ鑄造彈丸ノ輕重
火藥ノ煉造法ヨリシテ放チヤウニ至ルマテ具ニ
其製作秘術ヲ載ス

大典禪師著

全二冊

尺牘筌

鈴木瀧州先生著

全二冊

和漢諸尺牘中ヨリ初學日用ニ便丸語ヲ採稿、
和解ヲ附ス語ヲ求ルニ甚速ナリ

王羲之 樂毅論 曹娥碑 合刻 小楷

中書楷訣

明朝姜立綱著

全冊

永字ノ八法ヲ初トメ體勢運筆ノ妙要ヲ集列ス書ヲ嗜ムノ君子常ニ机上ニ安置シテ其結體骨格ヲ練磨シ玉ハ、自ラ其妙處ヲ會得シテ墨道ノ佳境ニ入ベシ

米元章蕭閒堂記

行書

全冊

米家書訣

市河三丈先生輯

金冊

米元章ノ家法ヲ始ト前賢論書ノ名言活句ヲ先生悉ク自ラ歷試シテ精確至當ナルヲ蒐輯シ且ツ李陽冰翰林密論用筆法二十四條ヲ增補シテツイニ附錄ス實三書家希代ノ寶鑑ナリ

清三家書論

市河米菴先生輯校

金冊

清朝王虛舟ノ論書臘語朱開雲方書學捷要梁同書ノ書論ヲアツムイツレ近世ノ奇書ナリ抑歷代編述ノ書論多端ニシテ初學望洋トシテ解シガタセエノ書論ハ前賢ノ秘訣ヲ發揮シ且ツ三家自得ノ妙說アヘテ繁ヲケヅリ簡ニツラ寶三書學ノ捷徑ドスベシ書ナリ

草書禮部韻

宗高宗御書

金冊

歷代名碑古帖ノ真贋摹搨ノ精粗悉ク前賢ノ譜論ヲ集録シ折衷スニ自己ノ卓見ヲ以テス亦古今法帖ノ總目ヲ載ス實二書ノ鴻寶トナスベキ書ナリ

金聲巧聯

明朝徐公仁輯

小刻

歷朝詩書諸百家集中ニ就テ舊說ヲ脫し新意秀逸ノ句ヲ精撫シ部門ヲ立テ大略

米菴墨談

市河三丈先生著

全冊

執筆ヲサトシテ撥燈ヲシメス其法楊董王三家ノ真跡ヲ推舉シ諸体ノ論シテハ秦漢ヨリ明清ニイタル古碑名帖及ヒ真蹟ヲ品評シテソノ賞鑑ノ精微ナルト全ク毫末ヲ剖析ス談次繪事ニ及ヒ兼テ落款式數十条ヲエラミ又花押ヲシメス筆墨楮絹ニイタルマデ明辨詳密故舉スペカラズ書家ノ龜鑑トスルノミナラズ好事ノ君子亦此書ヲ覽テ千載ノ奇遇ト云

略可法

市河米菴先生著

全冊

宋元以来諸名家ノ真跡等ニ就テ額聯扇面豎物横物五種ノ体裁サマく異ナルモノヲ先生年來臨摹シオカレタルヲ縮寫集刻シテ臨池ノ一助トス書家ノ机案ニボセ座右モ闕クベカラサル必用ノ書ナリ書學ノ君子一覽シタマワハ更ニ一段ノ好處ヲ得ベシ

襄ニ著述ヒラレシ墨談ノ遺集ニシテ第三隸八分飛白體勢ヲ分解シ勞棄及ヒ印々泥錐畫沙ノ字義ヲ分明ナラシム且ツ淳化停雲戲鴻帖等ノ異同ヲ校シ漢唐以采ノ碑文撰書ノ体格ヲ廣ノ集々篆隸運筆ノ奧秘ヲ探リ其餘筆墨硯紙文房諸具ノ論ニ涉リ旁ラ古銅器玉器ノ真偽及ビ銅玉ノ色追々辨ジ古圖ヲ縮寫ノ詳ニ其名称ヲ多只臨池ノ模範タクノミナラス好事ノ諸君一タロ披閱セバ手ラスツバカラズ弁心書ナリ

皇國州名歌

光菴先生撰并書

全一帖

此墨帖ハ日本州名ヲ七言長篇ニ綴リ楷行二體ニテ大字ニ書シ童蒙ニ便ナラシム只書學ニ益アルノミニ非斯常ニ此篇ヲ熟讀スル時ハ凡ソ五畿七道ノ形勢ヲ居ナカラ知シムベレ

來ニ異同ヲ別ニ悉ク舉グ

試毫帖

市河米菴先生書

全一帖

先生平生筆工ニ命シテ楷筆行草筆ヲ製スルゴトニソノ筆ヲ試ミテ諸体ノ書セラヒシ筆乞請テ刺セミナリ其後乘舶入張秋琴江芸閣等末ニ詩跋ヲ附シテ又彼邦ヘ持歸リ侍講學士梁同書モ又跋文ヲ附シ並ニ書論一帖ノ先生ニ寄ス今發行セル三家書論ノ中ニ其書論ヲ全ク刺セリ實ニ希代ノ珍事ナリ

敝帚帖

市河米菴先生書

全一冊

平日諸君子工贈答セラレシ雅俗ノ書慣ラ其マ・門生集又刻スルモノニテ書簡ノ手本トスルニ便ナリ

墨場必携

米菴先生輯

全一冊

唐宋明清諸名家ノ詩文集中ニヨリ凡天地日月ヨリ山林人物花果鳥虫ニイタルマテアラユル画題ノ妙句二三字ヨリ十四字ニ至ルモノヲ鈔出し且銘識間雅ノ語及ニ對聯ノ佳句數百條ヲ載セテ常ニ懷中セラレシモノヲ乞請テ達ニ公梓ス墨場ニ走フ諸君ニ一覽シテ必携ノ處ナラサルヲ知リ。

三體千字文

米菴先生書

全一冊

此墨帖楷ハ顏魯公ノ体ニヨリ行ハ趙撲、休ニヨリ草ハ懷素ノ体ニヨリ且ツ諸家ノ千文ヲ書セシテ考究シソノ字ノ体ヲ辨シ

陽寒論類方

清朝徐靈胎著

全一冊

此書方ヲ以テ類ヲ分十症ヲ以テ方ニ係ケ加減消息ニ至ルマテ精當簡核ニシテ傷寒論ノ津梁タルノミニアラズ實ニ忘ラ見テ治ヲホトコスノ模範ナリ吳江ノ徐先生權奇英發ノ才ヲ以テ八十餘年ノ工夫ヲコラシ著述セル所ニメ近世未曾有ノ珍書ナリ

經穴彙解

南陽原先生著

全八冊

往昔ヨリ俞穴ノ書夥レトイヘトモソノ説支離顛倒有テ定所明カナラズ因テ先生素問甲乙千金外臺ヲハジメトノ明清ノ諸書ニ至ルマテ世々經絡俞穴ノ説アル書ヲ搜羅レ又本邦古今諸家ノ説ヲ執捨シ同身寸ノ非ノ照レ異同ヲ辨别シアヤマリヲ訂次テ十二經脈任督三脈奇經ニイタルマテ圖ヲモツテ示ス或ハ脚氣入所四花患門ノ俞穴マデモ盡クツマビラカニ説示サタク古今ノ規則タル寶鑒ナリ

難經經釋

清朝徐靈胎著

全一冊

難經ノ書ハ古來ヨリ内經ノ精要ニ本ギテ其蘊奧ヲ發ストス今テ此書ハソノ素問靈樞ノ義ト相乖クトコラ辨駁シ定ノテ素越人ノ作トセバ據テ經文ヲモツテ經文ヲ釋シ經文ノ證スベヨナキハシ、仲景氏ノ書ヲ引テ一語モ舊注ヲ襲ハズ深文奧義片言半句ニ燦然トシテ得失ヲ摭ヒ鉢錠ヲ校入ルヲ微妙ラキハム古久未發ノ書ニテ難經指南車ナリ

三言直指篇

南陽原先生補訂

全一冊

此書ハ古河三喜翁ノ著ス所原先生ノ家ニ藏ノテ歷試極メテ多レ且記スル國字ヲ以テシ卷冊浩ナラズ披尋甚矣便ニシ單方ノ最モ簡要ナリ三喜翁ハ甲斐德本翁ナニニ称セラル弘治年中明ニ渡テ醫術ニ掌アラニ二十年帰朝ノ後道三翁ノ師ト尤高名ノ良醫也是ヲ以テコノ書醫家帳秘名文見タク

和蘭醫範提綱 宇田川襟齋先生著 全部三冊

西洋解剖術ノ説ニヨツテ人身内景諸臟象器ノ實驗ヲ講明シソノ形質官能ノ秘蘊ヲ開發シア同好ノ髦士ヲ誘導シ從來摸索ノ聲爭ヲマヌガレテ内景ノ真面目ヲサトフシム尚マタゾノ諸器ノ虛實變故ニヨリテ諸病ノ原由ヲトキシメシマタ某ノ器械損敗入レバ某ノ患病ヲ誤ト蓋エニヲ推究シ刀圭家ヲシナソノ方法技術ヲホドクスノ端緒ヲ啓發シテ捷徑簡便ニソノ要旨ヲ領解セシムコレミナ往藉ハイマダ載ヒザルトコロニメ實ニ醫家内景究理ノ摸範ト称ス。キノ書ナリ。

瘡醫新書

杉田玄白先生起業 大槻玄澤先生翻譯

西醫内外科ノ名哲老楞佐協乙速的盧ノ著述ナリ。初學入門ノ規則ヨリ百般ノ治術療法トヨヒ縛帶諸式使用ノ器械等凡ソ外科ニ關係スルモノノ説ソノ圖

醫事小言

南陽原先生著 全一冊

國字ヲ以テ醫學脉論ノ經事察色聲キノ見分等マテ委ク。解不病因病名ヲ古事考ヘ經驗有良方ヲモアノ療治ノ數宜シ家ノ祕方ヲモ附シテラム。

此圖六醫範提綱ニ就ア成形ア對照シ内景解剖ノ精微ヲ著シ粲然トノ重三其真面目ヲ机案ニ展觀シテ賴ニ領會易カラム且本邦銅版ノ魁首ニシテ海內此圖元比モノナリ。

叢桂偶記

南陽原先生著 全二冊

諸書ニ出ル仲景ノ事跡ヲ參訂シ廣東人參伊吹艾等ノ考ヘ神農祭ノ説瘡瘍ハ史島ソノ餘和漢ノ羣籍ヲ搜索シ後世ノ書トノエ止醫謂之裨益アルモアノ採テ尚ヲ附案レテ考證三章ハ蓋アフ甚卓見ノ隨筆ナリ。

遠西醫方名物考

宇田川襟齋先生著 全部三十六冊

テコトクク載セテ遺漏ナシ千古未發玄妙ヲツクセシ宇宙第一ノ奇書ナリ因テ杉田大槻二老先生多年ツトノテ神思ヲ焦勞シ譯定、効全ノ落成ス總目二百五十篇卷五十冊ニ及ア數百年、今此書流行スル丁先生ヒトエニ濟世ノ志シソノ厚キコト諸君子熟覽シテ其仁術ノ偉ナルコトヲ深察シタマラベシ篇中判成タルヲ世ニ公ニス其目左方ニ開列ス尙ウ殘篇日ヲ達ヒ年ヲ積テ刺成ス

誘導編 全四冊發凡 創瘻編 全四冊 近則

手術編

全三冊發凡

骨傷脫臼編

全五冊 近則

癰狗傷考

南陽原先生著 全一冊

病犬ニ癰レタル藥方炎法創法禁忌治驗ニ至ル追其術ノ皆外附人「毒蛇諸虫毒鼠咬等」即妙ノ方法ヲ舉ク急救回生ノ珍書ナリ

傷寒考

山田圓南先生著 全二冊

傷寒論ノ疑義ヲ考證シ諸傳記サル而ノ張仲景ノ事跡ヲ舉ル奇書ナリ

新訂增補和蘭藥鏡

擗齋先生著

全冊未定

岩草

南陽原先生著

小刻
全冊

西洋說三據テ藥品ノ効能ヲ載スルトイ也
其藥品ハ皆和漢ニアリテ本邦尋常ノ藥

舗ニ貯モノ或ハ園圃ニ栽培レ又ハ山野ニ採

リテ用エベキモノニテ擇ニテ醫家日用施

藥ノ考據ニ備フルモノナリ舊板和蘭藥鏡

既ニ刊行スト雖モイマ又其繁冗ヲハブトテ

切要ナル効能ヲ簡便ニ記エ是ニ西洋ニ近

來經驗發明セル奇効新說ヲ增補レ再し

樟ニ上テ八行ス世ニ救療濟生ニ端ラヒラキ

和漢古今ノ闕典ヲ補ムキ未曾有ノ本草書也

遠西醫方名物考補遺

擗齋先生著

冊數未定

每篇以三冊為第一帙

先ニ發兌セシ名物考ニ遺漏セル西洋ノ藥
品ヲ載テ其性質効用ヲ詳ニ説クノ前則
本ト同ニク利漢古今未タ曾テ説カ光品
物専藥アモ集タル譯述ノ書ナリ

西音發微

長柳圓先生遺教
大楳玄幹先生著

全冊

本邦五十音ヲ辨シ和音唐音各識音
ニ通シ語譯ノ必的スル説ナニヒニ蘭亨韻
韻ノ法萬國音韻通曉セリハレ等ヲ
ツブサニ著述ス蘭書讀法譯文ノ意味
先哲イマダ發セサルトコロノ公論ノ書也
コトニ國學家ニ於テモ字音ノ疑惑ヲ解
スベキ書ナリ

東都書林青藜閣發行醫書豫顯目錄

和蘭西範提綱

捲首宇田川先生著

全三冊

理學入門 植學啓原

雷川裕庵先生著

全三冊

同 内象銅版圖

同上

全二帖 舍密開宗

同上

全二冊

增補和蘭藥鏡

同上

全六冊 醫療正始

同上

全五冊

遠西醫方名物考

同上

全九冊 要術知新

同上

全六冊

同 補遺

同上

全九冊 要術知新

同上

全六冊

瘍醫新書

久澤大觀先生著

全四冊

西音發微

同上

全二冊

書賈

青藜閣

江戸淺草茅町二十日

須原屋伊八

吉

吉

吉

吉

吉

新編圖書

全圖改道卷之六

全圖

同上

重刊卷之六

全圖

新編圖書

全圖改道卷之六

全圖

新編圖書

全圖改道卷之六

全圖

新編圖書

全圖改道卷之六

全圖

新編圖書

全圖改道卷之六

全圖

