


證治準繩


五之二


Kitasato Memorial Medical Library



F 12  
シ-109

3 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 JEA 2 (B) 3 1級 4 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30





490.9  
Sh-14  
13

No.3676  
1951.2.2



富士川文庫

1950

汗總論

素問云，陽氣有餘爲身熱無汗，陰氣有餘爲多汗。身寒，陰陽有餘則無汗而寒。又云，飲食飽甚，汗出於胃驚而奪精；汗出於心持重遠行，汗出於腎疾走恐懼；汗出於肝搖體勞苦；汗出於脾。凡眠熟而汗出醒則條者曰盜汗，亦曰寢汗，不分寤寐不由發表而自然汗出者曰自汗。若勞役因動汗出非自汗也。傷寒脉緩，白朮桂枝黃芩散發之；汗出於衛，傷寒脉緩，白朮桂枝

止之汗出於榮 往來寒熱弦柴胡連翹和之  
汗出於少陽 體若燔炭地骨皮秦艽解之汗  
出於三焦 厥而抑鬱柴胡麻黃發之汗出於  
血 熱聚於胃大黃芒硝下之汗出於足陽明  
陰毒大汗附子乾薑溫之汗出於三陽

自汗

頭汗

手足汗

無汗

心之所藏在內者爲血發於外者爲汗汗者乃  
心之液而自汗之證未有不由心腎俱虛而得  
之故陰陽虛必腠理發熱自汗此固陰陽偏勝  
而致又有傷風中暑病濕兼以驚怖房室勞極  
則歷節腸癰瘍飲產蓐等證亦能令人自汗仲  
景謂肉極則自津脫腠理開汗大出巢氏云虛  
勞病若陽氣偏虛則津發泄爲汗又云心藏熱  
則腠理開腠理開則汗出諸家言汗出之義本

約如此。嘗因是而究之。汗者津之過也。津與氣同類。氣之所至。津卽有之。以故知內經之言心爲汗者大矣。哉蓋心是主陽之藏陽。乃火也。氣也。故五藏六府表裏之陽皆心藏主之。以行其變化。是故津者隨其陽氣所在之處而生。亦隨其火擾所在之處泄出。爲汗。其汗盡。由心出也。不然。何內經言風言勞動。言陽陰相爭者。其汗各由其所在藏府而出之乎。然五藏六府又必以十二經脉榮衛爲要。因經脉是司其出入。行

氣之隧道。榮行脈中。以滋陰血。衛行脈外。以固陽氣。陽氣固。則腠理肥。玄府密。而藏府經脈榮衛通貫。若一內之藏府。與表之經脈離居。則兩者出入之機皆廢。於是邪在於內。則玄府不密。而汗從府藏出。邪在外。則腠理不固。而汗從經脉出。所以自汗之由不可勝計。至若藏府之陰拒格。衛氣浮散於外。無所依從。或胃氣虛衰。水穀氣脫散者。或肺氣微弱。不能宣行。榮衛而津脫者。如是。自汗雖病重。而尚有可治。獨三陽之

絕汗出者則不可治矣。陰虛陽必湊，故發熱自汗當歸六黃湯加地骨皮。陽虛陰必乘，故發厥自汗，黃芪建中湯甚者加附子或芪附湯。滑伯仁治一婦暑月身冷，自汗口乾，煩燥欲卧，泥水中脉浮而數，按之豁然虛散。曰：素問云：脈至而從按之不鼓，諸陽皆然。此爲陰盛格陽得之。飲食生冷坐卧當風以真武湯冷飲之，進汗止再進，三進全安。陰陽俱虛，熱不甚寒，不甚秋，多秋冬用桂枝，春夏用黃芪，脉證無錯。

者亦用桂枝，脉證有熱者亦用黃芪，或身溫如常，而汗出冷者或身體冷而汗亦冷，別無他病並屬本證。戴復菴用黃芪建中湯加浮麥少許煎黃芪六一湯或玉屏風散，平人氣象論云：尺濶脉滑謂之多汗。王註謂尺膚濶而尺脉滑也。膚濶者榮血內涸，又針經云：腠理發泄汗出，腠濶是謂津脫。津脫者腠理開，汗大泄。按此二經論，自汗多而血涸，津脫者，東垣周衛湯雖曰治濕勝自汗，內有血藥實潤劑，也可以治。

此濕勝自汗以東垣法治之東垣曰西南坤土也在人則爲脾胃陽之汗以天地之雨名之濕主淋淫驟注者濕勝也陰滋其濕爲露爲雨此陰寒隔熱火也隔者解也陰濕寒下行地之氣也仲景云汗多則亡陽陽去則陰勝也重虛則表陽虛極矣甚爲寒中濕勝則音聲如從甕中出若中水也相蒙有言土音如居深甕裏言其壅也遠也不出也其爲濕也審矣又知此二者亦爲陰寒內經云氣虛則外寒雖見熱中蒸

蒸爲汗終傳大寒知始爲熱中者表虛無陽不在外寒終傳爲寒中者多成渾寒矣夫色以候天脉以候地形者乃候地之陰陽也故以脉氣候之皆有形之可見者也治張芸夫四月天寒陰雨寒濕相雜因官事飲食失節勞役所傷病解之後汗出不止沾濡數日惡寒重添厚衣心胸悶躁時躁熱頭目昏憒壅塞食少減此乃胃外陰火熾甚與夫雨之濕氣挾熱兩氣相合令濕熱大作汗出不休兼見風邪以助東方甲

乙以風藥去其濕以甘藥瀉其熱。活勝濕湯主之。有痰證冷汗自出者宜七氣湯或理氣降痰湯。痰去則汗自止。火氣上蒸胃中之濕亦能作汗。可用涼膈散。有氣不順而自汗不止須理氣使榮衛調和。小建中湯加木香。素問帝曰。有病身熱解惰汗出如浴惡風少氣此爲何病。岐伯曰。病名酒風。帝曰。治之奈何。岐伯曰。以澤瀉木各十分。麋銜五分合以三指撮爲後飲。麋銜一名薇銜俗名吳風草。又云飲酒中風則爲漏。

風漏風之狀或多汗常不可單衣食。則汗出甚。則身汗喘息惡風。衣裳濡口乾善渴不能勞事。河間以白朮散主之。此卽酒風也。凡五藏風皆自汗惡風。因飲食汗出日久心中虛風虛邪令人半身不遂見偏風癱痺之病先除其汗慄。悍之氣按而收之。安胃湯。有病後多汗服正元散諸重劑不愈。唯八珍散宜之。有別處無汗獨心孔一片有汗思慮多則汗亦多。病在心宜養心血用獵猪心一箇破開帶血入人參當。

歸二兩，縫之，煮熟去藥，止喫。猪心以艾湯調  
茯苓末服之。若服藥汗仍出者，有熱牡蠣散  
無熱小建中湯加熟附子一錢，不去皮，或正元  
散仍以溫粉撲之。大汗不止，宜於諸藥中入煅  
牡蠣粉二十錢半，并吞。朱砂丹或草硃丹，常自汗  
出經年累月者，多用黑錫丹。久病及大病新愈  
汗出者，亦可用此。若不宜熟補，須交濟其陰陽。  
自愈當以靈砂丹主之。凡此皆爲無他病而獨  
汗出者，設非謂有兼病者也。若服諸藥，欲止

汗，固表而並無効驗藥，愈澀而汗愈不收，止可  
理心血。蓋汗乃心之液，心無所養，不能攝血，故  
溢而爲汗。宜大補黃芪湯加酸棗仁，有微熱者，  
更加石斛，兼下靈砂丹。汗出如膠之粘，如珠  
之凝，及淋漓如雨，揩拭不逮者，難治。

診

肺脉更而散者，當病灌汗。至今不復散發也。

重汗

陰陽俱虛，枯燥頭汗亡津液也。熱入血  
室，頭汗傷濕，額上汗因下之，微喘者死。胃上熱

自汗

自汗

自汗

自汗

熏額汗發黃頭汗小便不利而渴此瘀血在裏也心下懊悶頭汗傷寒結胸無太熱以水結在胸脇間頭汗往來寒熱頭汗海藏云頭汗出劑頸而還益證也額上偏多何謂也曰首者六陽之所會也故熱熏蒸而汗出也額上偏多以部分左頰屬肝右頰屬肺鼻屬中州頤屬腎額屬心三焦之火涸其腎水溝渠之餘迫而上入於心之分故發爲頭汗而額上偏多者屬心之部而爲血證也飲酒飲食頭汗出者亦血證也

至於雜證相火迫腎水上行入於心爲盜汗或自汗傳而爲頭汗出者或心下痞者俱同血證例治之無問傷寒雜病酒積下之而心下痞者血證也何以然曰下之亡陰亡陰者則損脾胃而亡血氣在胸中以亡其血陷之於心之分也故心下痞世人以爲血病用氣藥導之則痞病愈甚而又下之故變而爲中滿鼓脹非其治也然則當作何治曰獨益中州脾土以血藥治之其法無以加矣頭汗出胸脇滿小便不利往

自汗  
卷之五  
百五  
來寒熱心煩嘔而不渴。柴胡桂薑湯。身微熱表虛頭汗出不已。或因醫者發汗以致表虛者。

黃芪湯

手足汗 一男子手足汗，醫用芩連柴并補劑，皆不効。又足汗常多，後以八物半芩爲君，白附川烏佐使，其汗即無。治脚汗，白礬乾葛各等分爲末，每半兩水三碗煎，十數沸洗。日一次，五日自然無汗。

陰汗

別見

無汗

經云：奪血者無汗，奪汗者無血。東垣云：真氣已虧，胃中火盛，汗出不休。胃中真氣已竭，若陰火已衰，無汗反燥。乃陰中之陽，陽中之陽俱衰，四時無汗。其形不久，濕痕燥旺，理之常也。其形不久者，秋氣主殺，生氣乃竭，生氣者胃之穀氣也。乃春少陽生化之氣也。丹溪云：盛夏浴食無汗爲表實，治謝老夏月無汗久嗽，用半夏紫蘇二味爲末，入莎末枕流末琥珀灰蛤粉之屬，仁陷末神曲，以括蔓穰桃仁泥半兩爲丸，先服三

拘湯三貼却服此丸子

半夏半升不令寒人知未料  
更水火通乎此表實合搗生夏月地氣天火與用  
之以保身也入春生細辛散之解也  
也其頭不火未得虛生蘇生寒火生寒生  
頭則寒四散無我其深不火散無寒却  
根散則火口更無我反散火散中  
云其處自火散中火相平也不有旨中真  
而散  
酒云事血去無我拿大寒生也

盜汗

衛氣至夜行於陰或遇天之六淫在於表或遇  
人氣興衰所變如天之五邪六淫者相乘於裏  
或藏府經脉之陰陽自相勝負則皆有以致陽  
氣之不足然而非惟寒濕燥同其陰者能傷其  
陽而已至若風火熱同其陽者則亦傷之而相  
火出腎肝表裏四經者尤甚夫火與元氣不兩  
立故火盛陽衰衛與陽一也陽衰則衛虛所  
虛之衛行陰當瞑目之時則更無氣以固其表

故腠理開，津液泄，而爲汗。迨寤則目張其行，陰之氣復散於表，則汗止矣。夫如是者，謂之盜汗。卽內經之寢汗也。內經謂腎病者，腹大脛腫，喘咳，寢汗，憎風。又歲水太過甚，則土氣乘之者病亦若是。註曰：腎邪攻肺，心內微心液爲汗。故寢汗。仲景傷寒論中，名盜汗。謂陽明病當作裏實，而脉浮者必盜汗。又三陽合病目合，則汗成無已。謂傷寒盜汗非若雜病者之責。其陽虛而已。是由邪在半表半裏使然也。何者？若邪氣一切

在裏，干於衛，則自汗出。此則邪氣侵行於裏外，連於表邪，及睡，則衛氣行於裏，乘表中，陽氣不緻，津液得泄，而爲盜汗。亦非若自汗有爲之虛者，有爲之實者，其於盜汗悉當和表而已。今觀仲景二論，似若不同。究其微旨，則一而已矣。何則？內經論其源，則心腎者，乃陰陽之主所以論汗，必自心之陽論。寢必自腎之陰。仲景之云，從其邪之所在之陰陽，便成盜汗。是指陰陽之流者耳。抑究其源流，悉是衛氣之爲用。衛氣者由

穀氣之所化，肺藏之所布，然天眞之陽必得是而後充大無是則衰微故生氣通天論所言陽氣者如蒼天之氣順之則陽固與陽因而上衛外者之類皆指衛氣也所以王註以衛氣合天地之陽氣若失成無巳之釋仲景者固善矣抑亦未爲至當。虛勞雜病之人豈可獨責其陽虛而不有陰虛之可責者乎予每察雜病之溢汗有冷有熱豈無其故哉因熱邪乘陰虛而發者所出之汗必熱因寒邪乘陽虛而發者所出之

汗必冷其汗冷之義卽內經所謂陰勝則身寒汗出身上清也非獨爲自汗雖盜汗亦然其溫汗之義殆以所乘之熱將同於傷寒鬱熱在表裏而汗者也雖然邪乘之重者亢則害承乃制兼化水爲冷者有之相火出於腎挾水化而爲冷者有之此又不可不審也蓋成無巳曰金匱要畧敍雜病云平人脉虛弱微細善盜汗又以巢氏病源以虛勞之人盜汗有陽虛所致因卽謂雜病之盜汗悉由於陽虛也且以金匱要畧

言之脉虛弱者乃陽氣之虛細弱者乃陰氣之虛何獨舉陽而遺其陰亦智士之一失也然虛勞之病或得於大病後陰氣未復遺熱尚留或得之勞役七情色慾之火衰耗陰精或得之飲食藥味積成內熱皆有以傷損陰血衰憊形氣陰氣既虛不能配陽於是陽氣內蒸外爲盜汗灼而不已陽能久存而不破散乎 當歸六黃湯治盜汗之聖藥 宜潤劑者六黃湯 宜燥劑者正氣湯 無內熱者防風散白朮散 肝


火當歸龍蒼丸 虛者黃芩連翹湯 實者三黃連翹湯 身熱加地骨皮柴胡黃芩秦艽  
肝虛加酸棗仁 肝實加龍膽草 右尺實大黃檗知母 煩心黃連生地黃當歸辰砂麥門冬 脾虛人參白朮白芍藥乾山藥白扁豆浮麥亦可用山藥一味爲末臨卧酒調下三錢  
經霜桑葉末茶調服 荚豉微炒酒漬服 外用五倍子或何首烏爲末津唾調填臍中以帛縛定 藏府盜汗皆屬腎經云腎病者寢汗出 盆汗

憤風是也。運氣盜汗皆屬寒水。經云歲水太過寒氣流行甚則勞汗出。憤風又云太陽所至爲寢汗症是也。

多卧不得卧

卧不安內附


靈樞大惑論云衛氣不得入於陰常留於陽。要於陽則陽氣滿。陽氣滿則陽蹻盛。不得入於陰則陰氣虛。故目不瞑矣。衛氣留於陰不得行於陽。留於陰則陰氣盛。陰氣盛則陰蹻滿。不得入於陽則陽氣虛。故目閉也。寒熱論云足太陽有通項入於腦者。正屬目。本名曰眼系。頭目苦痛。取之在項中兩筋間入腦乃別。陰蹻陽蹻。陰陽相交。陽入陰。陰出陽。交於目。銳背陽氣盛。則



多病不見  
卷之五  
目錄  
賾目陰氣盛則瞑目。四十六難曰老人臥而不寐少壯寐而不寤者何也然經言少壯者血氣盛肌肉滑氣道通榮衛之行不失於常故晝日精夜不寤老人血氣衰肌肉不滑榮衛之道濶故晝日不能精夜不寐也故知老人不得寐也。海藏云膽虛不眠寒也酸棗仁炒爲末竹葉湯調服。膽實多睡熱也酸棗仁生爲末薑茶汁調服。

素問帝曰人有卧而有所不安者何也岐伯曰

藏有所傷及精有所倚則卧不安故人不能懸其病也。差活勝濕湯治臥而多驚邪在少陽厥陰也。諸水病者故不得卧。因則驚驚則欬甚也。



不得卧


靈樞邪客篇帝問曰夫邪氣之客人也或令人目不瞑不卧出者何氣使然伯高曰五穀入於胃也其糟粕津液宗氣分爲二隧故宗氣積於胸中出於喉嚨以貫心脈而行乎吸焉營氣者泌其津液注之於脈化以爲血以榮四末內注五藏六府以應刻數焉衛氣者出其慄氣之慄疾而先行於四末分肉皮膚之間而不休者也晝日行於陽夜行於陰常從足少陰之分間行

於五藏六府。今厥氣客於五藏六府。則衛氣獨衛其外。行於陽。不得入於陰。行於陽。則陽氣盛。陽氣盛。則陽躋陷。陷當作溝不得入於陰。陰虛故目不瞑。黃帝曰。善。治之奈何。伯高曰。補其不足。不足者浮其有餘。調其虛實。以通其道而去其邪。飲以半夏湯一劑。陰陽已通。其卧安。黃帝曰。善。此所謂決瀆壅塞。經絡大通。陰陽和得者也。願聞其方。伯高曰。其湯方以流水千里以外者八升。揚之萬籩。取其清五升。煮之。炊以葦薪。火沸。置林

米一升。秋米北人謂之黃米。可以釀酒。治半夏五金盜。炊令竭。爲一升半去其滓。飲汁一小杯。日二稍益。以知爲度。故其病新發者覆杯則吐。汗出則已矣久者三飲而已也。素問逆調論。陽明者胃脉也。胃者六府之海。其氣亦下行。陽明逆不得從其道。故不得卧。也下經曰。胃不和。則卧不安。此之謂也。金匱。虛勞虛煩。不得眠。酸棗湯主之。本事方。鼈甲丸。聖惠方。治骨蒸煩心。不得眠。用酸棗仁一兩水一大盞半研絞取汁。下米二

合煮粥候熟下地黃汁一合更煮過不計時服之。胡治治振悸不得眠人參白朮茯苓甘草生薑酸棗仁六物煮服以上皆補肝之劑半夏湯溫膽湯治太病後虛煩不得眠井內經半夏湯皆去飲之劑戴云不寐有十種有病後牛黃治煩不得眠。戴云不寐有十種有病後虛煩及年高人陽衰不寐有痰在膽經神不歸舍亦令不寐虛者六君子湯加炒酸棗仁炙黃芪各一錢痰者宜溫膽湯減竹茹一半加南星炒酸棗仁各一錢下青靈丹大抵驚悸健忘。

怔忡失志心風不寐皆是膽涎沃心以致心氣不足若用涼心之劑大過則心火愈微痰涎愈盛病愈不減惟當以理痰氣爲第一義導痰湯加石菖蒲半錢喘不得卧上法以喘法治之厥不得卧以脚氣法治之




多卧

靈樞大惑篇黃帝曰人之多卧者何氣使然岐伯曰此人腸胃大而皮膚濕而分肉不解焉腸胃大則衛氣留久皮膚濕則分肉不解其行遲夫衛氣者晝日常行於陽夜行於陰故陽氣盡則臥陰氣盡則寤故腸胃大則衛氣行留久皮膚濕分肉不解則行遲留於陰也久其氣不精則欲瞑故多卧矣其腸胃小皮膚滑以緩分肉解利衛氣之行於陽也久故少瞑焉黃帝曰其

非常經也卒然多臥者何氣使然岐伯曰邪氣留於上焦上焦閉而不通已食若飲湯衛氣留久於陰而不行故卒然多臥焉 運氣多睡皆屬內熱經云陽明司天之政初之氣陰始凝氣始肅病中熱善眠是也 酸棗仁一兩生用臘茶二兩以生薑汁塗灸微焦搗羅爲末每服二錢水七分盞煎六分溫服無時灸法無名指第二節尖一壯屈手指取之

怠惰嗜卧

東垣云脉緩怠惰嗜卧四肢不收或大便泄瀉此濕勝從平胃散又云怠惰嗜卧有濕胃虛不能食或沉困或泄瀉加蒼朮白朮自汗加白朮入則困倦精神昏冒而欲睡者脾虛弱也六君子湯加神麴麥芽山楂之屬 四肢嬾惰人參補氣湯 丹溪云脾胃受濕沉困無力怠惰嗜卧者半夏白朮肥人是氣虛宜人參二朮半夏甘草又云是濕蒼木茯苓滑石黑瘦人是熟黃芩白朮飲食



太過轉運不調枳實白朮 按人之虛實寒熱當審脉證定之豈可以肥瘦爲準學者無以辭害意可也


人體因脾肺不和而益加營氣虛也六經之氣皆因之而生寒熱之變亦因之而生平陽燥火云涼潤皆因之而生陰寒之變

## 身重

素問示從容論有云肝虛腎虛脾虛皆令人體重煩冤 運氣身重有五 一曰濕乃濕制腎虛而重經云太陰所至爲身重又云太陰之復體重身滿又云歲土太過濕氣流行民病體重煩冤又云土鬱之發民病身重是也 二曰濕熱經云少陽司天之政四之氣炎暑間化其病滿身重是也 三曰寒濕經云太陰司夫之政三之氣感於寒濕民病身重是也 四曰風乃

木制脾虛而重經云歲木太過風氣流行民病體重煩冤又云歲土不及風乃大行民病體重煩冤又云厥陰在泉風淫所勝病身體皆重是也五曰金乃燥制肝虛而重經云歲金太過燥氣流行民病體重煩冤是也東垣云身體者濕也補中益氣湯加五苓散去桂主之潔古云起卧不能謂之濕身重是也小柴胡湯黃芪芍藥湯仲景云風濕脉浮身重汗出惡風者防已黃芪湯主之潔古云夏月中風濕身者防已黃芪湯主之

重如山不能轉側除風勝濕去熱之藥治之仲景云腎著之病其人身體重腰中冷如坐水中形如水狀反不渴小便自利飲食如故病屬下焦身勞汗出表裏冷濕久久得之腰以下冷痛腹重如帶五千錢甘薑苓术湯主之脾胃虛弱元氣不能榮於心肺四肢沉重食後昏悶參术湯主之針灸身重有二法其一取脾經云脾病者身重肉痿取其經太陰陽明少陰血者又云脾足太陰之脉是動則病腹脹身體




皆重視盛虛熱寒陷下取之也。其二取腎經云，腎病者身重，寢汗出，憎風，取其經少陰太陽血者是也。

不能食

饑不能食

惡食

心下不痞滿，自不能食也。東垣云，胃中元氣盛，則能食；而不傷過時，而不饑。脾胃俱旺，則能食；而肥，脾胃俱虛，則不能食；而瘦，故不能食。皆作虛論。若傷食惡食，自有本門，不在此例。病人脈緩怠惰，四肢重著，或大便泄瀉，此濕勝也。從平胃散加味。病人脈弦氣弱，自汗，四肢發熱，或大便泄瀉，皮毛枯槁，髮脫，從黃芪建中湯加味。病人脉虛氣弱，脾胃不和，從四君子六




君子湯加味。有痰從二陳湯加味兼下人參半夏丸。虛而有痰用人參四兩半夏一兩薑汁浸一宿曝乾爲末麪糊丸食後生薑湯下。痰積痞隔食不得下皂莢燒存性研末酒調下。丁錢七和中湯七珍散六神湯錢氏異攻散皆四君子加減例開胃進食之正劑也。羅謙甫云脾胃弱而飲食難任者不可一槩用克伐之劑宜錢氏異攻散補之自然能食設或嗜食太過傷脾而痞滿嘔逆藿用枳實丸。

一服慎勿多服。婁全善嘗治翁氏久瘧食少汗多先用補劑加黃連枳實月餘食反不進汗亦不止因悟謙甫此言遂減去枳連純用補劑又令粥多於藥而食進又於原方內加附子三分半一服而愈寬中進食丸和中丸木香枳术丸木香乾薑枳术丸皆有行氣之劑氣滯者宜之許學士云有人全不進食服補脾藥皆不効予授二神丸服之頓能進食此病不可全作脾氣治蓋腎氣怯弱真元衰削是以不

能消化飲食。譬之鼎鑊之中置諸水穀，下無火力。終日米不熟，其何能化？黃魯直嘗記服兔絲子淘淨酒浸曝乾，日挑數匙以酒下之。十日外飲噉如湯沃雪，亦知此理也。今按治法，虛則補其母，不能食者戊己虛也。火乃土之母，故以破故紙補腎爲癸水，以肉荳蔻厚腸胃爲戊土。戊癸化火同爲補土母之藥也。楊仁齋云：脾胃之氣交通，則水穀自然转化。瑞竹堂方謂二神丸雖兼補脾胃，但無斡旋，往往常加木香以順。

其氣便之。斡旋空虛，倉廩倉廩空虛，則能受物。屢用見効，其殆使之交通之力歟？嚴用和云：人之有生，不善攝養，房勞過度，真陽衰虛，坎水不溫，不能上蒸脾土。沖和失布，中州不運，是致飲食不進，胸膈痞塞，或不食而脹滿，或食而不消。大腑溏泄，古人云：補腎不如補脾。予謂補脾不如補腎。腎氣若壯，丹田火盛，上蒸脾土，脾土溫和，中焦自治，膈開能食矣。薛新甫云：予嘗病脾胃，服補劑及針灸，脾俞等穴不應，幾殆。吾



鄉盧丹谷先生令予服八味丸飲食果進三五料而平予兄年踰四十貌豐氣弱遇風則眩勞則口舌生瘡胸常有痰目常赤澁又一人脾虛發腫皆以八味丸而愈按此皆補腎之驗戴復菴云脾運食而傳於肺脾氣不足故不喜食宜啓脾丸煮朴丸若脾虛而不進食者理中湯鹿茸橘皮煎丸若脾虛寒而不進食者理中湯未効附子理中湯加砂仁半錢或丁香煮散心腎虛致脾氣不足以運者鹿茸橘皮煎丸脾

交於心下交於腎者也

饑不能食靈樞大惑篇黃帝曰人之善饑而不嘗食者何氣使然岐伯曰精氣并於脾熱氣留於胃胃熱則消穀消穀故善饑胃氣逆上則胃脘寒故不嘗食也運氣饑不欲食皆屬濕邪傷腎經云太陰司天濕淫所勝民病心如懸饑不欲食治以苦熱是也針灸饑不欲食有二法其一瀆胃經云胃者水穀之海其腧上在氣衝下至三車水穀之海不足則饑不受穀審

守其脈調其虛實是也。其一取腎經云腎足少陰之脉是動則病饑不欲食心如懸若饑狀視盛虛熱寒陷下取之也。

**惡食** 經云太陰所謂惡聞食臭者胃無氣故惡食臭也用大劑人參補之。丹溪云惡食者胸中有物導痰補脾二陳加二术查芎湯失笑丸治虛痞惡食。

瘡

瘡者邪入陰部也經云邪搏陰則爲瘡又云邪入於陰搏則爲瘡然有二證一曰舌瘡乃中風舌不轉運之類是也一曰喉瘡乃勞嗽失音之類是也蓋舌瘡但舌本不能轉運言語而喉咽音聲則如故也喉瘡但喉中聲嘶而舌本則能轉運言語也。

舌瘡

經云心脉濇甚爲瘡又云心脉搏堅而長當病舌卷不能言。婁全善云人舌短言語

不辨乃痰涎閉塞舌本之脉而然嘗治一中年男子傷寒身熱師與傷寒藥五貼日後變神昏而瘡遂作體虛有痰治之人參五錢黃芪白朮當歸陳皮各一錢煎湯入竹瀝薑汁飲之十二日其舌始能語得一字又服之半月舌漸能轉運言語熱除而瘡蓋足少陰脈挾舌本脾足太陰之脈連舌本手少陰別繫舌本故此三脉虛則痰涎乘虛閉塞其脈道而舌不能轉運言語也若此三脉亡血則舌無血營養而瘡經云刺

足少陰脈重虛出益爲舌難以言又云刺舌中脉太過血出不止爲瘡治當以前方加補血藥也又嘗治一男子五十餘歲嗜酒吐血補許後不食舌不能語但渴飲水脈畧數與歸芎芍地各一兩木參各二兩陳皮一兩半甘草一錢入竹瀝童便薑汁至二十餘貼能言若此三脉風熱中之則其脉弛縱故舌亦弛縱不能轉運而瘡風寒客之則其脉縮急故舌強舌卷而瘡治在中風半身不收求之也丹溪治一男子


三十五歲因連日勞倦，發喊，發爲瘡疾。醫與瘡藥三發後，變爲發熱舌短言語不辨。喉間痰吼，有聲。診其脉洪數似滑，遂以獨參湯加竹瀝兩蚶殼許，兩服後吐膠痰三塊。舌本正而言可辨，餘證未退，遂煎人參黃芪湯服半月，而諸證皆退。粥食調補兩月方能起立。針灸瘡有二法：其一取脾經云脾足太陰之脈是動則病舌本強視盛虛熱寒陷下取之也。其一取心經云手太陰之別名曰通里去腕一寸五分，分別而

上行入於心中繫舌本虛則不能言取之掌後一寸是也。

**喉瘡** 靈樞經憂恚無言篇。黃帝問於少師曰：人之卒然憂恚而言無音者何道之塞？何氣出行使音不彰？願聞其方。少師答曰：咽喉者水穀之道也；喉嚨者氣之所以上卡者也；會厭者聲音之戶也；口唇者音聲之竅也；舌者音聲之機也；懸雍垂者音聲之關也；頑頬者分氣之所泄也；橫骨者神氣所使，主發舌者也。故人鼻洞涕

出不收者，頑穎不開，分氣失也。是故厭小而疾薄，則發氣疾。其開闔利，其出氣易，其厭大而厚，則開闔難。其氣出遲，故重言也。人卒然無音者，寒氣客於厭，則厭不能發。發不能下，至其開闔，不致，故無音。黃帝曰：「刺之奈何？」岐伯曰：「足之少陰上繫於舌絡，於橫骨終於會厭，兩瀉其血脉，濁氣乃辟。」會厭之脉上絡任脈，取之天突，其厭乃發也。雜病篇：厭氣走喉，而不能言，手足清大便不利，取足少陰。丹溪治俞繼道遺精誤。

服參芪及升浮劑，遂氣壅於上焦，而瘡聲不出。用香附童便浸透爲末，調服，而疎通上焦，以治瘡。又用蛤粉青黛爲君，黃檗知母香附佐之，爲丸，而填補下焦，以治遺十餘日，良愈。出聲音，方訶子炮去核，木通各一兩，甘草半兩，用水三升煎至升半，人生薑地黃汁一合，再煎數沸，放溫分六服。食後日作半料。河間訶子湯。訶子折逆氣，破結氣，木通，通利機竅，桔梗，通利肺氣，童便降火潤肺，故諸方通用之。發聲散開。



瘡

准編三

卷七

結瘡。肘後方陳皮五兩水三升煮取一升去  
查頓服泄滯氣下痰千金云風寒之氣客於  
中滯而不發故瘡不能言宜服發表之藥不必  
治瘡。以紫梗荆芥根一兩研汁入酒相和溫  
眼半盞服無時又方用蕤荷根二兩絞汁酒一  
大盞和勻溫服半盞無時此皆治風冷失音。  
冬月寒痰指咽喉不利語聲不出經云寒氣客  
於會厭卒然而啞是也玉粉丸主之。肺間邪  
氣胸中積血作痛失音蛤蚧丸暴嗽失音宜

潤燥通聲膏。咳嗽聲嘶者此血虛受熱也用  
青黛蛤粉蜜調服之。槐花瓦上炒令香熟於  
地上出火毒二更後牀上仰卧隨意服治熱而  
朱音又音杏仁三分去皮尖炒另研如泥桂一分  
和取杏核大綿裹含細細嚥之日五夜三又方  
以桂末着舌下嚥津妙此治寒而失音。孫兆  
口訣云內侍曹都使新造一宅落成遷入經半  
月飲酒大醉卧起失音不能語孫用補心氣薯  
蕷丸以細辛川芎治濕十日其病漸減二十日

全愈。曹既安，見上問誰醫。孫兆元郎中上乃召問曰：「曹何疾也？」對曰：「凡新宅壁土皆濕地亦陰，多人乍來，陰氣未散。曹心氣素虛，飲酒至醉，毛竅皆開，集濕之氣從而入乘心經。心經既虛，而濕氣又乘之，所以不能語。臣先用薯蕷丸，使心氣壯，然後以川芎細辛又去濕氣，所以能語也。」運氣瘡有二：一曰熱助心實經云少陰之復暴瘡，治以苦寒是也；二曰寒攻心虛經云歲火不及寒，乃太行民病暴瘡，治以鹹溫是也。

狐惑聲啞，其證默默欲眠，目不能閉，起居不安，是也。針灸瘡有三法：其一取足少陰篇首所引二段經文是也；其二取足陽明經云足陽明之別名曰豐隆，去踝八寸，別走太陰下絡，喉嗌，其病氣逆則喉痺，卒瘡，取之所別是也。婁全善治一男子四十九歲，久病痰嗽，忽一日感風寒，食酒肉，遂厥氣走喉，病暴瘡，與灸足陽明豐隆二穴各三壯，足少陰照海穴各一壯，其聲立出，信哉聖經之言也！仍用黃芩降火爲君。

杏仁陳皮桔梗瀉厥氣爲臣訶子泄逆甘草和元氣爲佐服之良愈其三取手陽明經云暴瘡氣哽取扶突與舌本出血舌本廉泉穴也

妊娠瘡

素問黃帝曰人之重身九月而瘡此

爲何也岐伯曰胞之絡脉絕也帝曰何以言之岐伯曰胞絡者繫於腎少陰之脈貫腎繫舌本故不能言帝曰治之奈何岐伯曰無治也當十月復氣王註云少陰腎脈也不榮養故不能言

產後瘡

陳氏云產後不語因心氣虛而不能

古則舌強不能言語者宜服七珍散餘當推其所因而治之薛新甫曰經云大腸之脉散舌下又云脾之脉是動則病舌本強不能言又云腎之別脉上入於心繫舌本虛則不能言竊謂前證若心腎氣虛用七珍散腎虛風熱地黃飲大腸風熱加味道遙散加防風白芷蟬經風熱秦艽升麻湯肝經風熱柴胡清肝散加防風白芷脾氣鬱結加味歸脾湯加升麻肝木太過小柴胡加釣藤鈎脾受土侮六君加升麻白

芷釣藤鈎肝脾血虛用佛手散脾氣虛用四君子氣血俱虛八珍湯加不應用獨參湯急加附子補其氣而生其血若徑用血藥則誤矣郭氏論人心有七孔三毛產後虛弱多致停積敗血閉於心竅神志不能明了心氣通於舌心氣閉塞則舌亦強矣故令不語但服七珍散胡氏孤鳳丹散治產後明目不語用白礬細研每服一錢熱水調下

消癰

口燥咽乾

渴而多飲爲上消經謂膈消 消穀善饑爲中消謂中消渴而便數有膏爲下消經謂腎消 劉河間嘗

著二消論謂五藏六府四肢皆稟氣於脾胃行其津液以濡潤養之然消渴之病本濕寒之陰氣極衰燥熱之陽氣太盛故也治當補腎水陰寒之虛而瀉心火陽熱之實除腸胃燥熱之甚濟身中津液之衰使道路散而不結津液生而不枯氣血和而不澀則病自已矣沉消渴者因

飲食服餌之失宜，腸胃乾涸而氣不得宣平，或精神過違其度，而耗亂之，或因太病陰氣損而血液衰虛，陽慄慄而燥熱鬱甚之所成也。若飲水多而小便多，曰消渴。若飲食多不甚渴，小便數而消瘦者，名曰消中。若渴而飲水不絕，腿消瘦而小便有脂液者，名曰醫消。一皆以燥熱太甚，三焦腸胃之腠理怫鬱結滯痏密壅滯，復多飲於中，終不能浸潤於外，榮養百骸，故渴不止，小便多出，或數洩也。張戴人亦著二消之說。

從火斷謂火能消物，燔木則爲炭，燔金則爲爐，燔石則爲灰，煎海水則爲鹽，鼎水則乾人之心，腎爲君火，三焦膽爲相火，得其平則烹煉飲食糟粕去焉，不得其平則燔灼藏府而津液耗焉。夫心火甚於上，爲膈膜之消，甚於中爲腸胃之消，甚於下爲膏液之消，甚於外爲肌肉之消，甚不已則消及於肺，中甚不已則消及於脾，下甚不已則消及於肝，腎外甚不已則消及於筋骨，四藏皆消盡，則心始自焚而死矣。故治消渴

一證調之而不下則小潤小濡固不能終，卷上之勢下之而不調亦旋飲旋消，終不能沃膈膜之乾下之調之而不減滋味不戒嗜慾不節喜怒則病已而復作能從此三者消渴亦不足憂矣。然而二大公備引內經諸條言消渴者表白三消所由來之病源皆燥熱也雖是心移寒於肺爲肺消者火與寒皆來乘肺外爲寒所薄氣不得施內爲火所燶故然太陽寒水司夫甚則渴飲者水行凌火火氣內鬱二者因屬外之

寒邪則已鬱成內之燥熱也或曰夫寒與熱反若永炭之不同爐而今之燥熱由外寒所鬱也將用涼以治內熱必致外寒增而愈鬱用溫以散外寒必致內熱增而愈渴治之奈何曰先治其急處方之要備在本經謂處方而治者必明病之標本達藥之所能通氣之所宜而無加害者可以制其方也所謂標本者先病而爲本後病而爲標此爲病之本末也標本相傳先當救其急也又六氣爲本三陰三陽爲標假若胃熱

者熱爲本，胃爲標也。處方者當除胃中之熱，是治其本也。故六氣乃以甚者爲邪，衰者爲正。法當瀉甚，補衰以平爲期。養正除邪，乃天之道也。爲政之理也。捕賊之義也。卽此觀之，處方之要殆盡此矣。若太陽言夫寒水之勝，心火受鬱，內熱已甚，卽當治內熱爲急。內熱未甚，卽當散寒解鬱爲急。如宣明論立方著，內經諸證條下者，其治漏風而渴，用牡蠣白朮防風先治漏風爲急也。若心移寒於肺爲肺消者，則以心火乘肺。

傷其氣血爲急所移之寒非正當其邪也。故用黃芪人參熟地黃五味子桑白皮麥門冬枸杞子，先救氣血之衰，故不用寒藥瀉內熱也。若心移熱於肺，傳爲膈消者，則以肺熱爲急，用麥門冬治肺中伏火止渴爲君。天花粉知母瀉熱爲臣，甘草五味子生地黃葛根人參生津益氣爲佐。然心火上炎於肺者，必由心有事焉不得其正，以致其藏氣血之虛，故厥陽之火上逆也。所以用茯神安心定志，養精神竹葉以涼之，用麥

門冬之屬以安其宅則火有所歸息矣因是三條消渴之方便見河間處方酌量標本緩急輕重之宜通藏府切當之藥者如此可謂深得仲景處方之法者也仲景云男子消渴小便反多飲一斗而小便一斗腎氣丸主之脉浮小便不利微熱消渴者與渴欲飲水水火卽吐者皆以五苓散利之脉浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之兼口乾舌燥者白虎湯加人參主之卽此便見表裏分經因病用藥豈非萬世之

準則哉坎三乾水也氣也卽小而井大而海也兌三坤水也形也卽微而露大而雨也一陽下陷於一陰爲坎坎以氣潛行乎萬物之中爲受命之根本故潤萬物莫如水一陰上徹於二陽爲兌兌以形普施於萬物之上爲資生之利澤故說萬物者莫說乎澤明此一水以悟消渴消中消腎三消之義治之而兼明導引之說又有水火者焉三焦爲無形之火內熱爍而津液枯以五行有形之水制之者兌澤也權可也吾

身自有上池真水亦氣也亦無形也天一之所生也以無形之水沃無形之火又常而可久者是爲真水火升降既濟而自不渴矣

**上消**者上焦受病逆調論云心移熱於肺傳爲膈消是也舌上赤裂大渴引飲少食太便如常小便清利知其燥在上焦治宜流濕潤燥以白虎加人參湯主之能食而渴爲實熱人參石膏湯加減地骨皮散不能食而渴爲虛熱白术散門冬飲子有汗而渴者以辛潤之無

汗而渴者以苦堅之太陽經渴其脉浮無汗者五苓散滑石之類主之太陽無汗而渴不宣麻洪大而渴者宜服之陽明經渴其脉長有汗者白虎湯涼膈散之類主之陽明汗多而渴不宜服五浮而渴者宜服之少陽經渴其脉弦而呕者小柴胡湯加括腹之類主之太陰經渴其脉細不欲飲縱飲思湯不思水者四君子理中湯之類主之少陰經渴其脉沉細自利者猪苓湯三黄丸之類主之厥陰經渴其脉微引飲者宜少

少與之ノ 小便不利而渴知內有熱也五苓散  
猪苓散泄之ノ 小便自利而渴知內有濕也甘  
露飲門冬飲潤之ノ 大便自利而渴先用白芍  
白朮各炒爲末調服後隨證用藥ノ 大便不利  
而渴止渴潤燥湯ノ 上焦渴小便自利白虎湯  
中焦渴大小便俱不利調胃承氣湯ノ 下焦  
渴小便赤澀大便不利承氣湯ノ 戴院使云  
心消之病往往因嗜欲過度食慾辛熱以致煩  
渴引飲既多小便亦多當抑心火使之下降自

然不渴宜半夏瀉心湯半夏瀉心湯所宜用非去乾薑加括薑  
乾葛如其數吞猪肚丸或酒煮黃連丸仍佐獨  
味黃連湯多煎候冷遇渴恣飲久而自愈若因  
用心過度致心火炎上而渴者宜黃耆六一湯  
加蓮肉遠志各一錢吞玄兔丹仍以大麥煎湯  
間下靈砂丹ノ 渴欲飲水不止仲景以文蛤一  
味搗爲散沸湯和服方十七經驗方用大牡蠣  
於臘月或端午日黃泥裹燶通赤放冷取出爲  
末用鱈魚煎湯下一錢七蓋二藥性收潤最能

回津綱目以爲鹹更非也三因方用糯米旋炒作糜桑根白皮厚者切細等分每服一兩水一椀煮至半椀渴卽飲之夫水穀之氣上蒸於肺而化爲津以溉一身此金能生水之義一藥固肺藥也而又淡滲故取之保命集用蜜煎生薑湯大器慎注時時呷之法曰心肺之病莫厭煩而少飲經云補上治上宜以緩又云辛以潤之開腠理致津液肺氣下流故火氣降而燥衰矣有食非苗而渴者亦辛潤之意也丹溪云消渴飲繅絲湯

能引清氣上朝於口予謂蠶與馬同屬牛也心也作爾成爛退藏之際故能抑心火而止渴焉飲多停積有化水丹又有神仙減水法 東垣治張芸夫病消渴舌上赤裂飲水無度小便數製方名曰生津甘露飲子內經云熱淫所勝佐以甘苦以甘瀉之熱則傷氣氣傷則無潤折

熟補氣非甘寒之劑不能故以石膏之甘寒爲君王太僕云壯水之主以制陽光故以藥連梔子知母之苦寒瀉熟補水爲臣以當歸杏仁麥

門冬全蝎連翹白葵花蘭香甘草甘寒和血潤燥爲佐升麻柴胡苦平行陽明少陽二經草澄茄白荳蔻木香藿香反佐以取之又用桔梗爲舟楫使浮而不下也爲末湯浸蒸餅和成劑曬乾杵碎如黃米大每於掌內舐之津液送下不令藥過病處也 許學士治一卒病渴日飲水三斗不食已三月心中煩悶此心中有伏熱與火府丹每服五十丸溫水下日二次日渴止又次日食進此方本治淋用以治渴效信乎藥貴

變通用之 經云少陽司天之政三之氣炎暑至民病渴又云少陰之復渴而欲飲又云少陽之復嗌絡焦槁渴引水漿是熟助心盛而渴治以諸寒劑世之所知也 經云太陽司天寒氣下臨心火上蒸嗌乾善渴又云太陽司天寒淫所勝民病嗌乾渴而欲飲又云寒水太過上臨太陽民病渴而妄冒是寒攻心虛而渴治以諸食者必發脣疽背瘡不能食者必傳中滿鼓脹

聖濟總錄皆爲必死不治之證，潔古分而治之。  
能食而渴者，白虎加人參湯主之。不能食而渴者，錢氏白朮散倍加葛根主之。上下既平不復傳下消矣。或曰：未傳瘡疽者何也？此火邪勝也。其瘡痛甚而不潰，或潰赤水者是也。經曰：有形而不痛者，陽之類也；急攻其陽，無攻其陰。治在下焦元氣得強者生，失強者死。未傳中滿者何也？以寒治熱，雖方士不能廢繩墨而更其道也。然藏府有遠近，心肺位近，宜制大其服；腎肝位

遠，宜制大其服。皆適其所至，所爲故知過與不及，皆誅罰無過之地也。如膈消中消，制之太急，速過病所久而成中滿之疾，正謂上熱未除，中寒復生者，非藥之罪，失其緩急之宜也。處方之際，宜加審焉。雖爲一條而分經止渴，中下亦同例當參故焉。

**中消**者，胃也。渴而多飲，善食而瘦，自汗，大便硬，小便頻數，赤黃熱能消穀，知熱在中焦也。宜下之，以調胃承氣湯又三黃丸主之。胃熱則善消，水穀可飲，甘辛降火之劑用，黃連末、生地、白

藕各自然汁牛乳各一升熬成膏和黃連末一斤丸如桐子大每服二十五丸少呷白湯下日進十服消渴中消自古只治燥止渴誤矣三陽結謂之消二陽者陽明也手陽明大腸主津液所生病熱則目黃口乾是津液不足也足陽明主益所生病熱則消穀善饑血中伏火是血不足也結者津液不足結而不潤皆燥熱爲病也此因數食甘美而多肥故其氣上溢轉爲消渴治之以蘭除陳氣也不可服蜜桑芳草石藥

其氣悍烈能助熱燥也越人云邪在太府則脈不和陽脉不和則氣更之氣留之則陽脉盛矣陽脉太盛則陰氣不得榮也故肌肉皮膚消削是也利血益氣湯主之戴云消脾緣脾經燥熱食物易化皆爲小便轉食轉饑然脾消又有三日消中曰寒中曰熱中宜用蓮茗飲加生地黃乾葛各一錢或烏金散或止用蓮茗飲順利散參蒲丸加味錢氏白术散和血益氣湯清涼飲子甘露膏黃連猪肚

丸 爛金丸 天門冬丸 猪腎齊苓湯，內經言大腸移熱於胃善食而瘦謂之食慾胃移熱於膽亦曰食慾食慾者謂食移易而過不生肌膚亦易饑也東垣云善食而瘦者胃伏火邪於氣分則能食脾虛則肌肉削也卽消中也運氣消中皆屬熱經云少陰之勝心下熱善饑又云少陽之勝熱客於胃善饑治以寒劑是也針灸消中皆取於胃經云邪在脾胃陽氣有餘陰氣不足則熱中善饑取三里灸又云胃足

陽明之脉氣盛則身已前皆熱於胃則消穀善饑

熱則清之

盛則濶之

下消者病在下焦初發爲膏淋謂淋下如膏油之狀至病成煩躁引飲而色黧黑形瘦而耳焦小便濁而有脂液治宜養益以分其清濁而自癒矣以六味地黃丸主之益火之源以消陰翳則便溺有節

八味丸

八味

壯水之主以制陽光則渴飲不思

六味丸

丸

子和治

金匱治男子消渴小便反多如飲水一斗小便亦一斗腎氣丸主之

腎消以

督氣丸本方內加山藥一倍外桂附從四時加減冬一兩春秋五錢夏二錢半又法腎氣丸去附子加五味子一兩半

裏全善云腎消者飲一溲二其溲如膏油卽膈消消中之傳變王註謂肺藏消燥氣無所持是也蓋肺藏氣肺無病則氣能管攝津液而津液之精微者收養筋骨血脉餘者爲漫肺病則津液無氣管攝而精微者亦隨溲下故飲一溲二而溲如膏油也筋骨血脉無津液以養之故其病成漸形瘦焦乾也然肺病本於腎虛腎虛則心寡於畏妄行陵肺而移寒與

之然後肺病消故仲景治渴而小便反多用腎氣丸補腎救肺後人因名之腎消及下消也或曰經既云肺消死不治仲景復用腎氣丸治之何也曰飲一溲二者死不治若飲一未至溲二者病尚淺猶或可治故仲景腎氣丸治飲水一斗小便亦一斗之證若小便過於所飲者亦無及矣戴院使云若因色欲過度水火不交腎水下泄心火自炎以致渴濁不宜備用涼心冷劑

宜堅腎水以濟心火。當用黃芪飲加旋蘿五味各半錢，吞八味丸及小兔絲子丸、玄兔丹、鹿茸丸加減。安腎丸或靈砂丹，消腎爲病比諸爲重。古方謂之強中，又謂之內消。多因恣意色慾，或餌金石，腎氣既衰，石氣獨在精水無所養，故常發虛陽不交，精出小便無度，唇口乾焦，黃芪飲吞玄兔丹八味丸、鹿茸丸加減，腎氣丸、小兔絲子丸、靈砂丹皆可選用。未効，黃芪飲加旋蘿五味山茱萸各四分，齊龍湯、旋蘿丸。天王補

心丹

雙補丸、腎瀝散、金銀箔丸、白茯苓丸

**通治**三消丸用好黃連治淨，爲細末，不拘多少，切冬瓜肉研取自然汁，和成餅，陰乾，再爲細末，用汗浸和，加至七次，卽用冬瓜汁爲丸，桐子大，每服三十丸，以大麥仁湯入冬瓜汁送下，尋常渴止，一服効。酒色過度積爲酷熱，熏蒸五藏，津液枯燥，血泣小便併多，肌肉消鍛，專嗜冷物，寒漿勿投涼劑，以龍鳳丸主之。戴云：諸消不宜用燥烈峻補之劑，惟當滋養除消脾外，心腎

二消宜用黃芪六一湯或參芪湯吞入味丸或玄兔丹或小兔絲子丸又用竹龍散皆可又用六神飲亦治。腎消惟脾消則加當歸去黃芪三消小便既多太便必秘宜常服四物湯潤其大腸如加入參木瓜花粉在內仍煮四皓粥食之糯米泔折一亦可冷進。三消久而小便不臭反作甜氣在溺桶中漏沸其病爲重更有浮在溺面如猪脂濺在桶邊如相燭泪此精不禁真元竭矣。按消渴小便甜許學士論之其詳其

理未暢大抵水之在天地與人身皆有鹹有甘者生氣而鹹者死氣也坡仙乳泉賦備矣小便本鹹而反甘是生氣泄也生氣泄者脾氣下陷入腎中也脾氣入腎者土克水也。三消久之精血既虧或目無見或手足偏廢如風疾然此證消腎得之爲多但用治下消中諸補藥滋生精血自愈二消病退後而燥渴不解此有餘熱在肺經可用參芩甘草少許生薑汁令服虛者可用入參湯渴病愈後再劇舌白滑微

腫咽喉嚙唾，覺痛，盜腫時渴，飲冷白沫如膠，飲冷乃止。甘草石膏丸。渴疾愈，須預防。發癰疽  
黃芪六一湯。下忍冬丸。凡諸虛不足，胸中煩躁，先渴而欲發瘡，或病癰疽而後渴者，並宜黃耆六一湯多服。已發者，藍葉散。  
玄參散，齊杞丸。消渴後成水氣方書，雖有紫蘇湯，瞿麥湯，葶苈丸，皆尅澁之劑不若五皮飲送。濟生腎氣丸及東垣中滿分消諸方爲妥。

口燥咽干

此疎常渴非二消證

東垣云：飲食不節，勞倦所

行，故口乾咽乾，病人自以爲渴，醫以五苓散治之，反加渴燥乃重，竭津液以致危亡。經云：虛則補其母，當於心與小腸中補之，乃脾胃之根蒂也。以甘溫之藥爲之主，以苦寒爲之使，以酸爲之臣佐，以辛心苦緩急食酸，以收之心火旺，則肺金受邪，金虛則以酸補之，次以甘溫及甘寒之劑，於脾胃中瀉心火之亢盛，是治其本也。補益氣湯，加五味子葛根，本事方黃芪湯亦可。戴元，無病自渴，與病瘥後渴者，參木飲四君子湯縮脾湯俱加乾葛。

或七珍散加木瓜一錢生料五苓散加人參一  
錢名春澤湯以五苓散加四君子湯亦名春澤  
湯尤是要藥更兼作四皓粥食之諸病久損  
腎虛而渴並宜入味丸及黃芪飲四物湯加入  
參木瓜各半錢或七珍散大補湯並去木加木  
瓜如數諸失血及產婦蓐中渴名曰血渴宜  
求益血之劑已於吐血證中論之有無病忽然  
大渴少頃又定只宜蜜湯及縮脾湯之類折  
二汁冷進數口亦可酒渴者乾葛湯調五分

散又有果木渴因多食果子所致藥中宜用  
麝香

診

鶴筋弱小以薄者心脆肩背薄者肺脆腋  
骨弱者肝脆唇大而不堅者脉脆耳大不堅者  
腎脆皆善病消癰易傷心脉微小爲消癰滑  
甚爲善渴滑者陽氣勝肺肝脾腎脉微小皆爲消  
癰諸麻小者陰陽俱不足也勿取以針而調以甘藥心脉更而散者  
當消渴自己濡散者氣實血虛洪大者陽  
餘陰虧寸口脉浮而遲浮爲虛衛氣虧遲爲

勞榮氣竭，趺陽脉浮而數浮爲風數消穀。脉實大病久可治，懸小堅病久不可治。數大者生，細小浮短者死。病若開目而渴心下牢者，脉當得緊實而數，反得沉濁而微者死也。心移寒於肺消者飲一溲二不治。

黃疽

食勞蘋黃目黃

色如熏黃，一身盡痛乃濕病也。色如橘子黃，身不痛乃疽病也。疽分爲五：黃汗、黃疽、穀疽、酒疽、女勞疽。

黃汗

汗出染衣黃如糞汁是也。問曰：黃汗之爲病身體腫<sub>一作強</sub>，發熱汗出而渴，狀如風水。汗沾衣色正黃，如糞汁，脈自沉，何從得之？師曰：以汗出入水中浴水從汗孔入得之。宜芍桂酒湯主之。黃汗之病兩脰自冷，假令發熱，此

屬歷節食已汗出又身常暮盜汗出者此勞氣也若汗出已反發熱者久久其身必甲錯若發熱不止者必生惡瘡若身重汗出已輕者久久必身瞶又胸前痛腰上有汗腰下無汗腰髓弛痛如有物在皮中狀劇者不能食身疼重煩躁小便不利者此爲黃汗桂枝加黃芪湯主之按汗出浴水亦是仲景舉一隅耳多由脾胃有熱汗出逢閉退濕與熱盦而成者宜黃芪湯治陰黃汗染衣涕唾黃用蔓青子搗末平日以井花水服一匙日再加至兩匙以知爲度每夜

黃疸

小便中清小許帛子各書記白色

漸退白則瘥不過服五升而愈

食已卽饑偏身俱黃卧時身體帶青帶赤憎寒壯熱此飲食過度藏府熱水穀併積於脾胃風濕相搏熱氣熏蒸而得之師曰病黃疸發熱煩喘胸滿口燥者以病發時火劫其汗兩熱所得然黃皆從濕得之身發熱而黃肚熱熟在裏當下之黃疸脉浮而腹中和者宜汗之桂枝加黃芪湯熱服須臾飲熱粥以助藥力取微汗爲度未汗更服若腹滿欲嘔吐憇懨

而不和者宜吐之不宜汗。黃疸腹滿小便不利而赤自汗出此爲表和裏實當下之宜大黃硝石湯。黃疸病小便色不變欲自利腹滿而喘不可除熱熱除必噫噫者小半夏湯主之。

黃疸病茵陳五苓散主之。

穀疸

食畢卽頭眩心中憊鬱不安徧身發黃。趺陽脈緊而數數則爲熱熱則消。穀緊則爲寒食卽爲滿尺脉浮爲傷腎。趺陽脉緊爲傷脾風寒相搏食穀則眩穀氣不消胃中苦濁而氣

下流小便不通陰被其塞熱流膀胱身體盡名曰穀疸。陽明病脉遲者食難用飽飽則發煩頭眩心煩小便難此欲作穀疸雖下之腹滿如故所以然者脉遲故也。穀疸之爲病寒熱不食食卽頭眩心胸不安不久發黃爲穀疸茵陳湯主之。續法穀疸丸寶鑑茵陳梔子湯紅丸子。


酒疸

身白發黃腹如水狀不治則心下懊憹而熱不能食時時欲吐足脛滿小便黃而發赤此因飲中飲酒大醉

諸篇

卷之五

貞相



當風入水所致。夫病酒黃疸者必小便不利其候心中熱足下熱是其證也。酒黃疸者或無熱靜言了了腹滿欲吐鼻燥其脉浮者先吐之沉弦者先下之。酒疸心中熱欲嘔者吐之卽愈。

酒疸下之久久爲黑疸目青面黑心中如噉蒜韭狀大便正黑皮膚爪之不仁其脉浮躁雖黑微黃故知之。木湯出酒黃疸心中懊憹或熱痛梔子大黃湯主之。續法葛根湯小柴胡加茵陳荳豉大黃黃連葛根湯戴元嶽附錄。即曉。

酒毒熏肺脾上生肺金肺爲脾之子子移病而尅於母故黃又肺主身之皮膚肺爲酒毒熏蒸故外發於皮而黃法宜合肺脾而治宜藿梔飲葛根煎湯或梔子仁煎湯調五苓散或生料五苓散加乾葛一錢或葛花解醒湯酒疸發黃心胸堅滿不進飲食小便黃赤其脉弦濶當歸白朮湯酒疸後變成腹脹漸至面定俱腫或睡及偏身宜藿香脾飲加木香麥蘖各半錢入葛根煎湯或梔子仁煎湯調五苓散或生料五苓散加乾葛一錢或葛花解醒湯酒疸發

膀胱急小便自利或云小便不利發熱惡寒此入水所致腹如水狀不治黃家曰晡時發熱而反惡寒此爲女勞得之膀胱急少腹滿一身盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹脹如水狀大便黑或時溏此女勞之病非水也腹滿者難治硝石散主之續法加味四君子湯脾氣不健大便不實者用滑石散小便不利者用之東垣腎疸湯

通治

丹溪云五疸不要分同是濕熱如盦麴

相似輕者小溫中丸重者大溫中丸按丹

溪之言已得大意其用藥則未備也考之內經病有上中下之分有謂目黃曰黃疸者有謂黃疸暴病久逆之所生者及少陰厥陰司天之政四之氣溽暑皆發黃疸者悉是上焦濕熱病也有謂食已如饑曰胃疸者與脾風發瘅腹中熱出黃者又脾胃搏堅而長其色黃者靈樞謂脾所生病黃疸皆中焦濕熱病也有謂溺黃赤安卧者黃疸及腎脉搏堅而長其色黃者靈樞謂腎所生病皆下焦濕熱也獨張仲景妙得其旨

推之於傷寒證中或以邪熱入裏與脾濕相交則發黃或由內熱已盛復被火都兩陽熏灼其身亦黃或陽明熱盛無汗小便不利濕熱不得泄亦發黃或發汗已身自俱黃者爲寒濕在裏不解而黃也或食難用飽飽則頭眩必小便難欲作穀疸疸者單也單陽而無陰也成無已釋諸黃皆由濕熱二者相爭則黃濕家之黃黃而色暗不明熱盛之黃其黃如橘子色太抵黃家屬太陰太陰者脾之經也脾屬土黃色脾經爲

濕熱蒸之則色見於外或脉沉小腹不利者乃血在下焦之黃也凡此必須當其病用其藥直造病所庶無誅伐無過太枉之失也 大法宜利小便除濕熱 脉浮腹中和宜汗 脉浮心中熱腹滿欲吐者宜吐 脉沉心中懊憹或熱痛腹滿小便不利而赤自汗出宜下 脉不浮不沉微弦腹痛而嘔宜和解 脉沉細無力身冷而黃或自汗泄利小便清白爲陰黃宜溫男子黃大便自利宜補 餓飽勞役內傷中州

變寒病生黃非外感而得宜補。治痘須分新久新病初起卽當消導攻滲如茵陳五苓散胃苓飲茯苓滲濕湯之類無不効者久病又當變法也脾胃受傷日久則氣血虛弱必用補劑如參术健脾湯當歸秦艽散使正氣盛則邪氣退麻可收功若口淡怔忡耳鳴脚軟或微寒熱小便亦白濁又當作虛治宜養榮湯或四君子湯吞八味丸五味子附子者皆可用不可過用涼劑強通小便恐腎水枯竭久而面黑黃色不可

治矣然有元氣素弱避滲利之害過服滋補以致濕熱愈增者則又不可拘於久病調補之例也。發汗桂枝加黃芪湯麻黃醇酒湯吐瓜蒂散藜蘆散二陳湯探吐下枳子大黃湯大黃硝石湯黃連散利小便五苓散益元散除濕熱茵陳五苓散茯苓滲濕湯和解小柴胡湯揩鼻瓜蒂散溫茵陳附子乾薑湯補養榮湯補中湯大小建中湯理中湯乾黃燥也小便自利四肢不沉重渴而引飲梔子檗黃疸

皮湯 濕黃脾也小便不利四肢沉重似渴不欲飲者大茵陳湯 大便自利而黃有實熱者茵陳梔子黃連三物湯無實熱者小建中湯往來寒熱一身盡黃者小柴胡加梔子湯 腹痛而嘔者分小柴胡湯 諸疽小便不利爲裏實宜利小便或下之無汗爲表實宜發汗或吐之吐中有汗 諸疽小便黃赤色者爲濕熱可服利小便清熱滲濕之藥若小便色白是無熱也可除熱若有虛寒證者當作虛勞治之故

仲景云男子黃小便自利當與虛勞小建中湯若欲自利腹滿而喘不可除熱而除之必曠小半夏湯主之要當詳審勿令誤也 海藏云內感傷寒勞役形體飲食失節中州變寒病生黃非外感而得只用理中大小建中足矣不必用茵陳 戴復菴云諸失血後多令面黃爲血爲榮面色紅潤者血榮之也血去則面見黃色晝之竹木春夏葉綠遇秋葉黃潤與燥之別也宜養榮湯枳歸湯十全大補湯妨食者四君子湯

加黃芪扁豆各一錢，卽黃芪四君子湯加陳皮。名異，攻散亦有偏身黃者，但不及耳目。病瘡後多黃，大益脾受病，故色見於面，宜理脾爲先。異攻散加黃芪扁豆各一錢，諸病後黃者皆宜。

黑疸已前見酒痘女勞疸二條，此證多死，宜急治。用土瓜根一斤，搗碎絞汁六合頓服，當有黃水隨小便出，更服之。

食勞疳黃

一名黃脾，夫黃疸者暴病也，故仲景以十八日爲期。食勞黃者宿病也，至看久不愈者，故另爲此條。

大溫中丸

小溫中丸

暖

中丸

棗礬丸

右前三方以針砂醋之類伐

肝，以木米之類助脾，後一方以礬醋之酸瀉肝，以棗肉之甘補脾，實人及田家作苦之人宜之。若虛人與棗養柔脆者宜佐佐以補劑。

目黃

經云：目黃者曰黃疸，亦有目黃而身不黃者，故另爲條。

經云風氣

自陽明入胃循脈而上，至目眴其人肥，風氣不得外泄，則爲熱中，而目黃。煩渴引飲 河間青龍散主之。黃疸目黃不除，以瓜蒂散搗鼻，取黃水，腹


診

脉沉渴，欲飲水，小便不利者皆發黃。

腹

脹滿面萎黃躁不得睡屬黃家 黃疸之病當以十八日爲期治二十日以上宜瘥反劇爲難治 痘病渴者難治不渴者可治 脉洪大太便利而渴者死 脉微小小便利不渴者生 發於陰部其人必嘔 發於陽部其人必振寒而發熱 凡黃家候其寸口脉近掌無脉口鼻冷並不可治 痘毒入腹喘滿者危 凡年壯氣實脉來洪大者易愈年衰氣虛脉來微濶者難瘥年過五十因房勞飲酒七情不遂而得額

黑嘔噦大便自利手足寒冷飲食不進肢體倦怠服建中理中滲濕諸藥不効者不可爲也



## 嘈雜

嘈雜與吞酸一類皆由肺受火傷不能平木木  
挾相火乘肺則脾沖和之氣索矣穀之精微不  
行濁液攢聚爲痰爲飲其痰亦或從火木之成  
化酸肝木搖動中土故中土擾擾不寧而爲嘈  
雜如饑狀每求食以自救苟得少食則嘈雜亦  
少止止而復作蓋土虛不禁木所搖故治法必  
當補土伐木治痰飲若不以補土爲君務攻其  
邪久久而虛必變爲反胃爲瀉爲痞滿爲眩運

等病矣。脉洪大者火多，二陳湯加薑汁炒山梔黃連。脉滑大者痰多，二陳湯加南星括裏黃芩黃連梔子。肥人嘈雜，二陳湯少加撫芎蒼术白术炒梔子。脈弦細身倦怠者，六君子湯加撫芎蒼术白术薑汁炒梔子。有用消蔻藥過多，饑不能食，精神漸減，四君子加白芍陳皮薑汁炒黃連。心懸懸如饑欲食之時勿與以食，只服三聖丸佳。心下嘈雜者導飲丸最妙。

久嘔

腎主欠嘔，經云腎爲欠，爲嘔，是也。運氣欠嘔有三。一曰寒，經云太陽司天，寒氣下臨心氣，上從寒清時舉，孰嘔喜悲數欠，是也。二曰火經云少陽司天之政，三之氣炎暑至，民病嘔欠，是也。三曰濕鬱其火，經云陽明司天之政，初之氣陰始凝，民病中熱嘔欠，是也。經云二陽一陰發病，主驚駭背痛，善噫，善欠。王註云氣鬱於胃，故欠生焉。運氣欠伸。


皆屬風經云厥陰在泉風淫所勝病善伸數欠治以辛是也 靈樞口問篇黃帝曰人之欠者何氣使然岐伯曰衛氣晝日行於陽夜半則行於陰陰者主夜夜者卧陽者主上陰者主下故陰氣積於下陽氣未盡陽孔而上陰引而下陰陽相引故數欠陽氣盡陰氣盛則目瞑陰氣盡陽氣盛則寤矣瀉足少陰補足大陽針灸欠伸有二法此其一也其二取胃經云胃足陽明之脉是動則病振寒善伸數欠視盛虛實寒陷

下調之也

仲景云中寒家善火


嘔

靈樞口問篇黃帝曰人之嘔者何氣使然岐伯曰陽氣和利滿於心出於鼻故爲嘔補足太陽榮肩本一曰眉上也 運氣嘔有三二曰熱火經云少陰司天之政熱病生於上民病血溢耽嘔又云少陰司天熱氣下臨肺氣上從病嘔耽劬又云少陰之復燠熱內作煩躁耽嘔又云少陽所至爲耽嘔又云少陽司天火氣下臨肺氣上從發嘔耽劬治以諸寒是也 二曰金



不及火乘之經曰金不及曰從革從革之紀其  
病嘔欬覶劙從火化者是也 三曰燥金經云  
陽明所至爲覶嘔是也 劉河間云嘔鼻中因  
痒而氣噴作於聲也鼻爲肺竅痒爲火化心火  
邪熱干於陽明發於鼻而痒則嘔也或故以物  
擾之痒而嘔者擾痒屬火故也或視日而嘔者  
由目爲五藏神華太陽真火晃耀於目心神躁  
亂而熱發於上則鼻中痒而嘔也 仲景云其  
人清涕出發熱色和者善嘔

五冊終



Kitasato Memorial Medical Library