


醫治準繩


二之二



Kitasato Memorial Medical Library

F
シ-109

3 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50



490.9
Sh-14
2

No.
3665
185
125-2

傷飲食

傷常倦

虛勞瘵骨蒸熱

傳尸勞



富士川文庫

1939

傷飲食

東垣曰陰陽應象論云水穀之寒熱感則害人六府辨論云陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷此乃混言之也分之爲二飲也食也飲者水也無形之氣也因而大飲則氣逆形寒飲冷則傷肺肺病則爲喘咳爲腫爲水瀉輕則當發汗利小便使上下分消其濕解醒湯五苓散生薑半夏枳實白朮之類是也如重而蓄積爲滿者芫花大戟甘遂牽牛之屬利下之

此其太法也食者物也有形之血也如生氣通天論云因而飽食筋脈橫解腸澼爲痔又云食傷太陰厥陰寸口大於人迎兩倍三倍者或嘔吐或痞滿或下利腸澼當分寒熱輕重治之輕則內消重則除下如傷寒物者半夏神麴乾薑三稜廣茂巴豆之類主之如傷熱物者枳實白术青皮陳皮麥蘖黃連大黃之類主之亦有宣吐者陰陽應象論云在上者因而越之爪蒂散之屬主之然而不可過劑過則反傷脾胃蓋先

因飲食自傷又加之以藥過故腸胃復傷而氣不能化食愈難消矣漸至羸困故五常政大論云太毒治病十去其六小毒治病十去其七常毒治病十去其八無毒治病十去其九不可過之此聖人之深戒也傷食之證胸膈痞塞吐逆嘔酸噫敗卵臭畏食頭痛發熱惡寒病似傷寒但氣口大於人迎數倍身不痛耳內無熱與傷冷物者治中湯加砂仁一錢下紅丸子小七香丸內有熱與傷熱物者上二黃丸枳术導滯

丸通用保和丸枳术丸麴蘖枳术丸木香枳术
丸檳榔丸木香檳榔丸 傷肉食濕麴辛辣厚
味之物填塞悶亂胸膈不快三黃枳术丸 傷
濕麴心腹滿悶肢體沉重除濕益氣丸 傷熱
食痞悶丸尤欲吐煩亂不安上二黃丸 傷濕
熱之物不得旋化而作痞滿悶亂不安枳术導
滯丸 傷蟹紫蘇丁香湯 傷豆粉濕麴油膩
之物白术丸 食狗肉不消心下堅或腹脹口
乾發熱妄語煮蘆根汁飲之 食魚膾及生肉

在胸膈不化必成癥瘕搗馬鞭草汁及生薑汁
飲之 傷冷食半夏枳术丸小便淋加澤瀉寒
熱不調每服加上二黃丸十丸或用木香乾薑
枳术丸丁香爛飯丸 張仲景治宿食在上脘
以瓜蒂散吐之不卽下之凡脉浮而大按之反
濇尺中亦微而濇或數而滑或緊如轉索無常
及下利不飲食者皆宿食也皆用大承氣湯下
之其人熱其傷物亦熱者宜之其人寒其傷物
亦寒者不宜也戴云傷食腹痛脹滿大便不通



者遂成食積小七香丸一貼用水一盞薑三片煎八分去滓吞感應丸此下傷寒之方也太抵氣口脉繁盛者宜下尺脉絕者宜吐經曰氣口脉盛傷於食心胃滿而口無味口與氣口同口曰坤者口乃脾之候故胃傷而氣口緊盛夫傷有多少有輕重如氣口一盛得脉六至則傷於厥陰乃傷之輕也枳术丸之類主之氣口二盛脉得七至則傷於少陰乃傷之重也雄黃聖餅子木香檳榔丸枳殼丸之類主之氣口三盛

脉得八至九至則傷太陰填塞悶亂則心胃大痛備急丸神保丸消積丸之類主之兀兀欲吐不已俗呼食迷風是也經曰上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死瓜蒂散主之如不能吐是無治也經曰其高者因而越之此之謂也或曰盛食填塞胸中痞亂兩寸脉當用事今反兩尺脉不見其理安在曰胸中有食是木鬱宜達故探吐之食者物也物者坤土也是足太陰之號也胸中者肺也爲物所塞肺者于太陰金也

金主殺伐與坤土俱在手上而旺於天金能克木故肝木發生之氣伏於地下非木鬱而何吐去上焦陰土之物木不得舒暢則鬱結去矣食塞於上脉絕於下若不明天地之道無由達此至理水火者陰陽之微兆天地之別名也故獨陽不生獨陰不長天之用在於地下則萬物生長地之用在於天上則萬物收藏此乃天地交而萬物通也此天地相根之道也故陽火之根本於地下陰水之源本於天上故曰水出高源故

人五藏主有形之物物者陰也陰者水也右三部脉主之偏見於寸口食塞於上是絕五藏之源源絕則水不下流兩尺脉之絕此其理也何疑之有然必視所傷之物冷熱隨證加減如傷冷物一分熱物二分則用寒藥二停熱藥一停隨時消息經云必先歲氣無伐天和此之謂也既存三陰可下之法亦必存三陰可補之法故曰內傷三陰可用溫劑若飲冷內傷雖云損胃未知色脉各在何經若面色青黑脉浮沉不

弦而弱者傷在厥陰。若面色紅赤脉浮沉不細而微者傷在少陰。若面色黃索脈浮沉不緩而遲者傷在太陰也。傷在厥陰肝之經當歸四逆湯加吳茱萸生薑湯之類主之。傷在少陰腎之經通脉四逆湯主之。傷在太陰脾之經理中丸湯主之。大便硬者宜湯結者宜丸。凡諸脾脉微洪傷苦澀物經曰酸勝苦。微弦傷冷硬物經云溫以克之。微澀傷辛辣物經云苦勝辛。微滑傷腥醣物經云甘勝酸。弦急

傷酸硬物經云辛勝酸。洪緩傷甜爛物經云酸勝甘。微遲傷冷痰積聚惡物溫胃化痰。單伏主物不消化麴蘖二稜廣茂之類。浮洪而數皆中酒葛根陳皮茯苓。傷食作瀉不止於應服藥中加內豆蔻益智仁以收固之。傷食兼感風寒其證與前同但添身疼氣口人迎俱盛俗謂夾食傷寒宜生料五積散或養胃湯香蘇飲和解飲。


傷酒惡心嘔逆吐出宿酒昏冒眩暈頭痛如破

宜沖和湯半夏茯苓湯或理中湯加乾葛七分
或用末子理中湯和縮脾飲酒渴縮脾湯或煎
乾葛湯調五苓散久困於酒遂成酒積腹痛泄
瀉或暴飲有灰酒亦能致然並宜酒煮黃連丸
多飲結成酒癖腹中有塊隨氣上下冲和湯
加蓬术半錢酒停胸膈爲痰飲者枳實半夏湯
加神麴麥芽各半錢沖和湯加半夏一錢茯苓
七分解酒毒無如枝矩子之妙一名枳椇
名木蜜俗呼癩漢指頭北人名曰爛瓜江南謂

之白石樹杭州貨賣名蜜屈立詩所謂南山有
狗是也樹形似白楊其子着枝端如小指長數
寸屈曲相連春生秋熟經霜後取食如餽美以
此木作屋柱令一室之酒味皆淡薄趙以德治
酒人發熱用枝矩子而愈卽此也 東垣云酒
者太熱有毒氣味俱陽乃無形之物也若傷之
止當發散汗出則愈矣其次莫如利小便乃上
下分消其濕今之病酒者往往服酒癥九太熱
之藥下之又有用牽牛大黃下之者是無形元

氣受病，反下有形陰血，乖誤甚矣。酒性太熱已傷元氣，而復重瀉之，亦損腎水真陰及有形血氣俱爲不足。如此，則陰血愈虛，真水愈弱，陽毒之熱大旺，反增其陰火。是以元氣消鍊折人，長命不然。則虛損之病成矣。酒疽下之久，則爲黑疽，慎不可犯。宜以葛花解醒湯主之。海藏云：治酒病宜發汗，若利小便，炎燄不肯下行。故曰：火鬱則發之，以辛溫散之。是從其體性，也是知利小便，則濕去，熱不去。若動大便，尤爲踈陋，蓋

天便者，有形質之物，酒者無形之水，從汗發之，是爲近理。濕熱俱去，故治以苦溫，發其火也。佐以苦寒，除其濕也。按酒之爲物，氣熱而質濕，飲之而昏醉狂易者，熱也。宜以汗去之，既醒，則熱去而濕留止。宜利小便而已。二者宜酌而用之，大抵葛花解醒湯備矣。



傷勞倦

東垣曰調經篇云陰虛生內熱岐伯曰有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘不通而胃氣熱熟氣熏胸中故內熱舉痛論云勞則氣耗勞則喘且汗出內外皆越故氣耗矣夫喜怒不節起居不時有所勞傷皆損其氣氣衰則火旺火旺則乘其脾土脾主四肢故困熱無氣以動嬾於語言動作喘之表熱自汗心煩不安當病之時宜安心靜坐以養其氣以甘寒瀉其熱

火以酸味收其散氣以甘溫補其中氣經言勞者溫之損者溫之是也金匱要畧云平人脉大爲勞脉極虛亦爲勞矣夫勞之爲病其脉浮大手足煩熱春夏劇秋冬瘥脉大者熱邪也極熱時助邪也秋冬差者時勝邪也以春夏劇者黃芪建中湯治之此亦溫之意也蓋人受水穀之氣以生所謂清氣管氣運氣衛氣春升之氣皆胃氣之別名也夫胃氣爲水穀之海飲食入胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精

四布五經並行合於四時五藏陰陽揆度以爲常也若陰陽失節寒溫不適脾胃乃傷喜怒憂恐損耗元氣脾胃氣衰元氣不足而心火獨盛心火者陰火也起於下焦其系繫於心心不主令相火代之相火包絡之火元氣之賊也火與元氣不兩立一勝則一負脾胃氣虛則下流肝腎陰火得以乘其土位故脾證始得則氣高而喘身熱而煩其脉洪大而頭痛或渴不止其皮膚不任風寒而生寒熱蓋陰火上衝則氣高喘

而煩熱爲頭痛爲渴而脉洪脾胃之氣下流使
穀氣不得升浮是春生之令不行則無陽以護
其榮衛使不任風寒乃生寒熱此皆脾胃之氣
不足所致也然與外感風寒之證頗同而實異
內傷脾胃乃傷其氣外感風寒乃傷其形傷其
外則有餘有餘者瀉之傷其內則不足不足者
補之汗之下之吐之尅之之類皆瀉也溫之和
之調之養之之類皆補也內傷不足之病苟誤
認作外感有餘之證而反瀉之則虛其虛也實

實虛虛如此死者醫殺之耳然則奈何唯當以
辛甘溫劑補其中而升其陽甘寒以瀉其火則
愈矣經曰勞者溫之損者溫之又曰溫能除大
熱大忌苦寒之藥損其脾胃今立補中益氣湯
主之夫脾胃虛者因飲食勞倦心火亢甚而乘
其土位其次肺氣受邪須用黃芪最多人參甘
草次之脾胃一虛肺氣先絕故用黃芪以益皮
毛而閉腠理不令自汗損其元氣上喘氣短人
參以補之心火乘脾須灸甘草之甘以瀉火熱

而補脾胃中元氣。若脾胃急痛，并大虛腹中急縮者，宜多用之。經曰：急者緩之。白朮苦甘溫除胃中熱，利腰臍間血。胃中清氣在下，必加升麻柴胡以引之。引黃芪、甘草甘溫之氣味上升，能補衛氣之散解，而實其表也。又緩帶脉之縮急，二味苦平味之薄者，陰中之陽引清氣上升也。氣亂於胸中，爲清濁相干用。去白陳皮以理之，又能助陽氣上升以散滯氣。助諸甘辛，爲用脾胃氣虛不能升浮爲陰火傷其生發之氣，榮血。

大虧榮氣不營，陰火熾盛是血中伏火。日漸熬煎，血氣日減，心包與心主血，血減則心無所養，致使心亂而煩。病名曰：惋。惋者心惑而煩悶不安也。故加辛甘微溫之劑，生陽氣，陽生則陰長，故血虛以人參補之，更以當歸和之。少加黃藥，以救腎水，能瀉陰中之伏火。如煩猶不止，少加生地黃，補腎水，水旺而心火自降。如氣浮心亂，以硃砂安神丸鎮固之，則愈。以手摶之而肌表熱者，表證也。只服補中益氣湯一二服，得微

汗則已。非正發汗乃陰陽氣和自然汗出也。
若更煩亂。如腹中或周身有刺痛。皆血澀不足。
加當歸身五分或一錢。如精神短少。加人參
五分五味子十二箇。頭痛加蔓荆子三分。痛
甚加川芎五分。項痛腦痛加藁本五分。細辛三分。
諸頭痛併用此四味足矣。若頭上有熱。則此
不能治。別以清空膏主之。如頭痛有痰。沉重懶
倦者。乃太陰痰厥。頭痛加半夏五分。生薑三分。
耳鳴目黃。頸腫。頸肩腰肘臂外後廉痛。面

赤脉洪大者。以羌活二錢。防風藁本各七分。甘
草五分。通其經血。加黃芩。黃連各三分。消其腫。
人參五分。黃芪七分。益元氣而瀉火邪。另作一
服與之。嗌痛領腫。脈洪大而赤者。加黃芩。甘
草各三分。桔梗七分。口乾嗌乾。加葛根五分。
升引胃氣上行。以潤之。久病痰嗽。肺中伏火。
去人參。初病勿去之。冬月或春寒或秋涼時。各
宜加不去根節。麻黃半錢。如春令太溫。只加佛
耳草。款冬花各五分。夏月病嗽。加五味子三分。

五枚去心麥門冬五分如舌上白滑脂者是胸中有寒勿用之夏月不嗽亦加人參二分或三分并五味子麥門冬各等分救肺受火邪也食不下乃胸中胃上有寒或氣澀滯加青皮木香各三分陳皮五分此三味爲定法如冬月加益智仁草豆蔻仁各五分如夏月加黃芩黃連各五分如秋月加檳榔草豆蔻白豆蔻縮砂各五分如春初猶寒少加辛熱之劑以補春氣之不足爲風藥之佐益智草豆蔻可也 心下痞

痞悶加芍藥黃連各一錢如痞腹脹加枳實木香縮砂仁各三分厚朴七分如天寒少加乾薑或肉桂心下痞覺中寒加附子黃連各一錢不能食而心下痞加生薑陳皮各一錢能食而心下痞加黃連五分枳實三分脉緩有痰而痞加半夏黃連各一錢脉弦四肢滿便難而心下痞加柴胡七分黃連五分甘草三分胸中氣壅滯加青皮二分如氣促少氣去之腹中痛者加白芍藥五分炙甘草三分如惡寒冷痛

者加桂心三分。如惡熱喜寒而腹痛者於已加白芍藥甘草二味中更加生黃芩三二分。如夏月腹痛而不惡熱者亦然治時熱也。如天涼時惡熱而痛於已加白芍藥甘草黃芩中更少加桂。如天寒時腹痛去芍藥味酸而寒故也。加益智仁三分或加半夏五分生薑三片。如腹中痛惡寒而脉弦者是木來冠土也。小建中湯主之。蓋芍藥味酸於土中瀉木爲君。如脉沉細腹中痛以理中湯主之。乾薑辛熱於土中瀉水以

為主也。如脈緩體重節痛腹脹自利米穀不化是濕勝也。平胃散主之。脇下痛或脇下縮急俱加柴胡三分甚則五分甘草三分。臍下痛加真熟地黃五分其痛立止。如不已者乃太寒也。更加肉桂三分內經所說少腹痛皆寒證從復法相報中來也。經云大勝必太復從熱病中變而作也。非傷寒厥陰之證乃下焦血結膀胱也。仲景以抵當湯并丸主之。身有疼痛者濕若身重者亦濕加去桂五苓一錢如風濕相

搏一身盡痛加羌活七分防風藁本根各半錢
升麻蒼术各一錢勿用五苓所以然者爲風藥
已能勝濕故別作一服與之如病去勿再服以
諸風藥損人元氣而益其病故也 小便遺失
肺金虛也宜安卧養氣以黃芪人參之類補之
不愈則是有熱也加黃蘢生地黃各五分切禁
勞役如卧而多驚小便淋者邪在少陽厥陰宜
太陽經所加之藥更添柴胡五分如淋加澤瀉
五分此下焦風寒合病也經云腎肝之病同

治爲俱在下焦非風藥行經則不可乃受客邪
之濕熱也宜升舉發散以除之 大便秘澀加
當歸稍一錢太黃酒洗煨五分或一錢閉澀不行者煎成正藥先用清者一口調玄明粉五分
或一錢得行則止此病不宜下下之恐變凶證
也 脚膝痿軟行步乏力或痛乃腎肝伏熱加
黃蘢五分空心服不已更加漢防己五分脉緩
顯沉困怠惰無力者加蒼术澤瀉人參白朮茯
苓五味子各五分 右一方加減是飲食勞倦

喜怒不節始病熱中則可用之若未傳寒中則不可用也蓋甘酸適足益其氣耳如黃芪人參甘草芍藥五味之類是也

內傷始爲熱中病似外感陽證

頭痛大作四肢

肢痙攣氣高而喘身熱而煩上氣鼻息不調四肢困倦不收無氣以動無氣以言或煩躁悶亂心煩不安或渴不止病久者邪氣在血脉中有濕故不渴如病渴是心火炎上耗肺金故渴或表虛不任風寒目不欲閉惡食口不知味右手

氣口脉大於左手人迎三倍其氣口脉急大而數時一代而澀澀是肺之本脉代是無氣不相接乃脾胃不足之脉大是洪大洪大而數乃心脉刑肺急是弦急乃肝木挾心火耗肺金也其右關脾脉比五脉獨大而數數中時顯一代此不甚勞役是飲食不時寒溫失所則無右關胃脈損弱隱而不見惟內顯脾脉如此也治用補中益氣湯

內傷未傳寒中病似外感陰證

腹脹胃脘當

心痛四肢兩脇隔噎不通或涎唾或清涕或多
渴足下痛不能任身履地骨乏無方喜唾兩丸
多冷陰陰作痛或妄見鬼狀夢亡人腰背胛眼
脊膂皆痛不渴不瀉脉盛大以濶名曰寒中治
用神聖復氣湯白朮附子湯草豆蔻丸

似外感陽明中熱證

有天氣太熱時勞役得
病或路途勞役或田野中勞役或身體怯弱食
少勞役或長齋久素胃氣久虛勞役其病肌體
壯熱躁熱悶亂大惡熱渴飲水此與陽明傷寒

熱白虎湯證相似鼻口中氣短促上喘此乃脾
胃久虛元氣不足之證身亦疼痛至日西作必
譖語熱渴悶不止脉洪大空虛或微弱白虎湯
證其脉洪大有力與此內傷中熱不同治用清
暑益氣湯饑困勞役之後肌熱躁熱困渴引
飲目赤面紅晝夜不息其脉大而虛重按全無
經曰脉虛則血虛血虛則發熱證象白虎惟脉
不長實爲辨也誤服白虎湯必危宜黃芪當歸
補血湯

似外感惡風寒證

有因勞役坐卧陰涼處後

病表虛不任風寒少氣短促嬾言語困弱無力此因勞役辛苦腎中陰火沸騰後因脫衣或沐浴歇息於陰涼處其陰火不行還歸皮膚腰理極虛無陽被風與陰涼所遏以此表虛不任風寒與外感惡風相似不可同外感治宜用補中益氣湯

內傷似外感雜證

飲食失節勞役所傷脾胃

中州變寒走痛而發黃治用小建中湯或理中

湯或大建中湯選而用之

勞倦所傷虛中

理中丸心肺在膈上爲

陽腎肝在膈下爲陰此上下藏也脾胃屬土處在中州在五藏曰孤藏在三焦曰中焦因中焦治在中土有不調此尤專主故名曰理中丸人參味甘溫內經曰脾欲緩急食甘以緩之緩中益脾必以甘爲主是以人參爲君白朮味甘溫內經曰脾惡濕甘勝濕溫中勝濕必以甘爲助是以白朮爲臣甘草味甘平內經曰五味所入

甘先入脾。脾不足者以甘補之。補中助脾必須甘劑。是以甘草爲佐。乾薑味辛熱喜溫而惡寒者。胃也。寒則中焦不治。內經曰：寒淫所勝。平以辛熱散寒。溫胃必先辛劑。是以乾薑爲使。脾胃居中病則邪氣上下左右無所不之。故有諸加減焉。若腑下築者。腎氣動也。白朮味甘。補氣去白朮。壅而不瀉。則築然動也。白朮氣動者。欲作奔豚也。必服辛熱以散之。故加桂以散腎氣泄奔豚氣。吐

多者去白朮。加生薑。氣上逆則吐。多朮甘而壅。非氣逆者之所宜。千金曰：嘔家多服生薑。以其辛散。故吐多者加之。下多者還用白朮。氣泄而不收。則下多。朮甘壅補。使正氣收而不下泄也。或曰：濕勝則濡泄。朮專除濕。故下多者加之。悸者加茯苓。飲聚則悸。茯苓味甘。滲泄伏水是所宜也。渴欲得米者倍加。朮津液不足。則渴。朮甘以補津液。故加之。腹中痛者。加入參。虛則痛。經曰：補可以去弱。人參羊肉之屬是也。

寒多者加乾薑以辛熟能散寒也。腹滿者去白朮加附子內經曰甘者令人中滿朮甘壅補於腹中滿者則去之附子味辛熱氣壅鬱腹爲之滿以熱勝寒以辛散滿故加附子經曰熱者寒之寒者熱之此之謂也。建中湯內經曰肝生於左肺生於右心位在上腎處在下左右上下四藏居焉脾者土也應中央處四藏之中州治中焦生首榮衛通行津液一有不調則榮衛失所育津液失所行必以此湯溫中益脾是

以建中名之焉膠飴味甘溫甘草味甘平脾欲緩急食甘以緩之建脾者必以甘爲主故以膠飴爲君而甘草爲臣桂辛熱散也潤也榮衛不足潤而散之芍藥味酸微寒收也泄也津液不通收而行之是以桂芍藥爲佐生薑味辛溫太棗味甘溫胃者衛之源脾者榮之本靈樞經云榮出中焦衛出上焦是也衛爲陽不足者益之必以辛榮爲陰不足者補之必以甘甘辛相合脾胃建而榮衛通是以薑棗爲使也嘔家不用

此湯以味甜故也 寶鑑育氣湯參术調中湯
養胃進食丸寬中進食丸和中丸安胃丸補中
丸加減平胃散嘉禾散白术散緩中丸沉香鼈
甲散十華散沉香溫脾湯厚朴溫中湯雙和湯
小沉香丸木香分氣丸木香餅子

勞倦所傷虛中有熱

金匱要略云夫男子平

人脈大者爲勞極虛亦爲勞男面色薄者主渴
及亡血卒喘悸脉浮者裏虛也男子脈虛沉弦
無力寒熱氣促裏急小便不利面色白時目眩

兼衄少腹滿此爲勞使之然勞之爲病其脈浮
大手足煩春夏劇秋冬瘥陰寒精自出酸削不
能行男子脈微弱而濇爲無子精清冷夫失精
家少腹弦急陰頭寒目瞑髮落脉極虛芤遲爲
清穀亡血失精也 調中益氣湯治因饑飽勞
役損傷脾胃元氣不足其脈弦或洪緩按之無
力中之下時一濇其證身體沉重四肢困倦百
節煩疼胸滿短氣膈咽不通心煩不安耳聾耳
鳴目有瘀肉熱壅如火視物昏花口中沃沫飲

食失味忽肥忽瘦怠惰嗜卧溺色變赤或清利
而數或上飲下便或時餐泄腹中虛痛不思飲
食內經云勞則氣耗熱則傷氣以黃芪甘草之
甘瀉熱爲主以白芍藥五味子之酸能收耗散
之氣又曰勞者溫之損者溫之以人參甘溫補
氣不足當歸辛溫補血不足故以爲臣白朮橘
皮甘苦溫除胃中客熱以養胃氣爲佐升麻柴
胡苦平味之薄者陰中之陽爲脾胃之氣下溜
上氣不足故從陰引陽以補之又以行陽明之

經爲便也如時顯熱躁是下元陰火蒸蒸然
發也如真生地黃一分黃蘖三分如太便虛
坐不得或太便了而不利腹中常逼迫血虛血
澀也加當歸身五分如身體沉重雖小便數
多亦如茯苓五分蒼朮一錢澤瀉五分黃蘖三
分時暫從權而祛濕也不可常用兼足太陰已病其脉亦絡於心中故顯濕熱相合而煩亂
如胃氣不和加湯洗半夏半錢生薑三片有嗽
者加生地黃三分以製半夏之毒痰厥頭痛非
半夏不能除此足太陰經邪所作也如無以上

證只服黃芪一錢人參三錢甘草五分橘皮酒
洗三分柴胡二分升麻一分蒼朮五分黃藥酒
洗三分右件剉如麻豆大依前煎服如秋冬
之月胃脉四道爲衝脉所逆井脇下少陽脉二
道而反上行病名曰厥逆內經曰逆氣上行滿
脉去形明七神昏絕離其形而死矣其證氣
上衝咽不得息而喘息有音不得卧加吳茱萸
半錢或一錢半湯洗去苦觀厥氣多少而用之
如夏月有此證爲太熱也蓋此病隨四時爲

寒熱溫涼也宜以酒黃連酒黃藥酒知母各等
分爲細末熟湯爲丸如梧桐子大每服二百丸
白湯送下空心服仍多服熱湯服畢少時便以
美飲食壓之不令胃中停留直至下元以瀉衝
脈之邪也大抵治飲食勞倦所得之病乃虛勞
七損證也當用溫平甘多辛少之藥治之是其
本法也如時上見寒熱病四時也又或將理不
如法或酒食過多或辛熱之食作病或寒冷之
食作病或居太熱太寒之處益其病當臨時制

宜暫用太寒太熱治法而取効此從權也不可以得効之故而久用之必致天橫矣靈樞經曰從下上者引而去之上氣不足推而揚之蓋上氣者心肺上焦之氣陽病在陰從陰引陽宜以入腎肝下焦之藥引辛多辛少之藥使升發脾胃之氣又從而去其邪氣於腠理皮毛也又云視前痛者當先取之是先以繆刺瀉其經絡之壅者爲血凝而不流故先去之而後治他病寶鑑桂枝加龍骨牡蠣湯黃芪建中湯人參黃

芪散續斷湯柴胡散秦艽鼈甲散人參地骨皮散地仙散當歸補血湯犀角紫河車丸人參柴胡散清神甘露丸雙和散四君子湯猪肚丸酸棗仁丸定志丸麥煎散獨聖散

飲食不節勞役所傷腹脇滿悶短氣遇春則已淡無味遇夏雖熱猶有惡寒饑則常如飽不喜食冷物升陽順氣湯主之脾胃不足之證須用升麻柴胡苦平味之薄者陰中之陽利脾胃中清氣行於陽道及諸經生發陰陽之氣以滋春

氣之和也。又引黃芪人參甘草甘溫之氣味上行，充實腠理，使陽氣得衛外而爲固也。凡治脾胃之藥多以升陽補氣名之者，此也。饑飽勞役，胃氣不足，脾氣下瀆，氣短無力，不能寒熱早飯後轉增昏悶，須要眠睡，怠惰四肢不收，嬾倦動作，五心煩熱，升陽補氣湯主之。如腹脹及窄狹，加厚朴。如腹中似硬，加砂仁。脾胃虛弱氣促，氣弱精神短少，衄血吐血，門冬清肺飲。大阿膠丸、痰喘人參清鎮丸、勞風心脾壅滯痰

涎盛，多喉中不利涕唾稠粘，嗌塞吐逆，不思飲食，或時昏憊，皂角化痰丸。病久厭厭，不能食，而藏府或結，或溏，此胃氣虛弱也。白术和胃丸。明醫雜著云：東垣論飲食勞倦爲內傷不足之證，治用補中益氣湯。汎洞集中又論不足之中，又當分別飲食傷，爲有餘勞倦傷，爲不足，予謂傷飲食而畱積不化，以致宿食鬱熱，熱發於外，此爲有餘之證，法當消導。東垣自有枳术丸等治法，具於飲食門矣。其補中益氣方論，却謂

人因傷饑失飽致損脾胃非有積滯者也故只宜用補藥蓋脾胃全賴飲食之養今因饑飽不時失其所養則脾胃虛矣又脾主四肢若勞力辛苦傷其四肢則根本竭矣或專因飲食不調或專因勞力過度或飲食不調之後加之勞力或勞力過度之後繼以不調故皆謂之內傷元氣不足之證而宜用補藥也但須於此四者之間審察明白爲畧加減則無不効矣

虛勞

療骨蒸熱

素問云脈虛氣虛尺虛是謂重虛所謂氣虛者言無常也尺虛者行步悵然脉虛者不象陰也又云脉細皮寒氣少泄利前後飲食不入是謂五虛五虛死漿粥入胃泄注止則虛可治治用黃芪建中湯理中湯之類此素問但言虛而無勞瘵之名然其因則固屢言之矣凡外感六淫內傷七情其邪展轉乘於五臟遂至大骨枯藁太肉陷下各見所合衰憊之證真藏脉見則

有死期又如二陽之病則傳爲風消息貫三陽之病傳爲索澤癉成爲消中大腸移熱於胃胃移熱於膽則皆善食而瘦嘗貴後殘病從內生名曰脫營嘗富後貧名曰失精暴藥暴喜始樂後苦皆傷情氣精氣竭絕形體毀阻離絕菀結喜怒憂恐五藏空虛血氣離守靈樞曰怵惕思慮則傷神神傷則恐懼自失破胸脫肉毛瘁色天死於冬又諸熱病在膚肉脉筋骨之間者各客於所合之本藏不得客於所不勝及考醫和

視晉平公之疾曰是近女室晦女陽也而晦時淫則生內熱或蠱之疾非鬼非食疾不可爲也至漢張仲景金匱要畧明立虛勞門於是巢元方撰病源候論遂有虛勞有蒸病有注病皆由此而推之者也虛勞者五勞六極七傷是也五勞者志勞思勞心勞憂勞瘦勞六極者氣極血極筋極骨極肌極精極七傷者曰陰寒曰陰痿曰裏急曰精速曰精少陰下濕曰精滑曰小便苦敗臨事不舉又曰大飽傷脾大怒氣逆傷肝

強力舉重久坐濕地傷腎形寒飲冷傷肺憂愁思慮傷心風雨寒暑傷形大恐懼不節傷志蒸有五骨蒸脈蒸皮蒸肉蒸內蒸又有二十三蒸胞玉房腦髓骨血脉肝心脾肺腎膀胱膽胃三焦小腸肉膚皮氣各有二蒸其狀徧身發熱多因熱病愈後食牛肉或飲酒或房欲而成注者注之爲言住也邪氣居人身內生既連滯停住死又注易傍人也卽所謂傳戶已別立門外今以虛勞骨蒸合爲一門而列古明醫治法於後

金匱云五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食食傷憂傷飲傷房室傷饑傷勞傷經絡榮衛氣傷內有乾血肌膚甲錯兩目黯黑緩中補虛大黃廣蟲丸主之按虛勞發熱未有不由瘀血者而瘀血未有不由內傷者人之飲食起居一失其節皆能成傷此亦可以賭矣故以潤劑治乾以燥動噉血之物行死血死血既去病根已刻而後可從事乎滋補之劑仲景爲萬古醫方之祖有以哉又有陳大夫傳仲景百勞丸可與廣蟲丸

互用 活法機要云虛損之疾寒熱因虛而感也感寒則損陽陽虛則陰盛故損則自上而下治之宜以辛甘淡過於胃則不可治也感熱則損陰陰虛則陽盛故損則自下而上治之宜以苦酸鹹過於脾則不可治也自上而損者一損於脾故皮聚而毛落二損損於心故血脉虛弱不能榮於藏府婦人則月水不通三損損於胃故飲食不爲肌膚也自下而損者一損於腎故骨痿不起於牀一損損於肝故筋緩不能

自收持三損損於肺故飲食不能消尅也故心肺損則色弊肝腎損則形瘦脾胃損則穀不化也 治肺損皮聚而毛落宜益氣四君子湯治心肺虛損皮聚毛落血脉虛耗婦人月水愆期宜益氣和血八物湯 治心肺損及胃損飲食不爲肌膚宜益氣和血調飲食十全散 治腎損骨痿不能起於牀宜益精補腎金剛丸治腎肝損骨痿不能起於牀宜益精筋緩不能自收持宜緩中牛膝丸 治肝腎損及脾食穀

不化宜益精緩中消穀煨腎丸如陽盛陰虛
肝腎不足房室虛損形瘦無方多青黃而無
常色宜榮血養腎地黃丸如陽盛陰虛心肺
不足及男子婦人面無血色食少嗜卧肢體困
倦宜八味丸如形體瘦弱無力多困未知陰
陽先損夏月宜地黃丸春秋宜腎氣丸冬月宜
入味丸病久虛弱厭厭不能食和中丸肝
勞盡力謀慮而成虛寒則口苦骨疼筋攣煩悶
宜續斷湯炎肝俞實熱則關格牢盞不通眼目


赤脣煩悶熱壅毛悴色夭宜羚羊角散心勞
曲運神機而成虛寒則驚悸恍惚神志不定宜
遠志飲子酸棗仁湯實熱則口舌生瘡大小便
秘澀宜黃芩湯脾勞意外致思而成虛寒則
氣脹咽滿食不下噫氣宜白朮湯生嘉禾散大
建脾散實熱則四肢不和脹滿氣急不安宜小
甘露飲肺勞預事而憂所成虛寒則心腹冷
氣胸滿背痛吐逆宜溫肺湯實熱則氣喘面目
苦腫宜二母湯腎勞矜持志節所成虛寒則

遺精白濁腰脊如折宜羊腎丸實熱則小便黃
赤澀痛陰生瘡宜地黃丸肝傷筋極虛則手
足拘攣腹痛指甲痛轉筋宜木瓜散當歸枸杞
續斷實則咳而脇下痛脚心痛不可忍手足甲
青黑宜五加皮散心傷脉極虛則咳而心痛
咽喉中介介如梗宜茯神湯遠志酸棗仁朱
砂龍齒實則血焦髮落唇舌赤語澀肌瘦宜麥
門冬湯脾傷肉極虛則四肢倦關節痛不食
陰引肩背皆強宜半夏湯豆蔻厚朴陳皮益智

實則肌肉痺腠理開汗大泄四肢緩弱急痛宜
薏苡仁散肺傷氣極虛則皮毛焦溼液枯力
乏腹脹喘息宜紫菀湯人參黃芪白石英實則
喘息衝胸心恚腹滿熱煩嘔口燥咽乾宜前胡
湯腎傷骨極虛則面腫垢黑脊痛氣衰毛髮
枯槁宜鹿角丸益智五味鹿茸實則面焦耳鳴
小便不通手足痛宜玄參湯藏府氣虛視聽
已卸精極虛則遺精白濁體弱小腹急牽弱核
小宜磁石丸鹿茸破故紙龍骨人參附子

鍾乳實則目昏毛焦虛熱煩悶泄精宜石斛湯
古今錄驗五蒸湯甘草炙一兩茯苓三兩人
參二兩乾地黃三兩竹葉二把葛根三兩知母
二兩黃芩二兩梗米二合石膏五兩碎右十味
㕮咀以水九升煮小麥一升至六升去麥入藥
煎至二升半分三服次 實熱黃連黃芩黃藥大
黃虛熱烏梅秦艽柴胡氣也青蒿鼈甲蛤蚧
牡丹皮小麥血也○肺鼻烏梅紫苑天門冬麥
門冬皮舌白石膏桑白皮 膚昏昧牡丹皮

氣偏身氣熱喘促鼻乾人參黃芩梔子 大腸鼻右孔
芒硝大黃 脉溢脈緩急不調當歸生地黃○
心舌乾黃連生地黃 血髮地黃當歸桂心童子
小便 小腸下唇木通赤茯苓生地黃○脾唇焦
芍藥木瓜苦參 肉食無味而嘔芍藥 胃舌下
石膏粳米大黃芒硝葛根○肝眼前胡川芎
當歸 筋甲川芎當歸 膽眼白柴胡栝蔞
三焦手足寒石膏竹葉○腎兩耳石膏知母生地
黃寒水石 腦頭眩羌活地黃防風 髓髓中



當歸地黃天門冬骨齒黑腰痛足逆
當歸地骨皮牡丹皮生地黃冷疳蟲食藏
膏東藥胞小便生地黃澤瀉茯苓沉香滑石
膀胱左耳澤瀉茯苓滑石○凡此諸蒸皆因
熱病後食肉油膩行房飲酒犯之而成久蒸不
除變成疳病卽死矣珍珠囊云地爲陰骨爲
裏皮爲表地骨皮瀉腎火牡丹皮瀉包絡火總
治熱在外無汗而骨蒸知母瀉腎火治熱在內
有汗而骨蒸四物湯加二皮治婦人骨蒸玄

珠云五行六氣水特五之一耳一水旣衝豈能
勝五火哉虛勞等證蜂起矣其體虛者最易感
於邪氣當先和解微利微下之從其緩而治之
次則調之醫者不知邪氣加於身而未除便行
補劑邪氣得補遂入經絡至死不悟如此悞者
何啻千萬良可悲哉夫涼劑能養水清火熱劑
能燥水補火理易明也勞爲熱證明矣還可補
乎惟無邪無熱無積之人脉舉按無方而弱者
方可補之又必察其胃中及右腎一火力虧而用

之心虛則動悸恍惚憂煩少色舌強宜養榮湯
琥珀定神丸之類以益其心血脾虛而黃肌瘦
吐利清冷腹脹腸鳴四肢無力飲食不進宜快
胃湯進食丸之類以調其飲食肝虛目昏筋脉
拘攣面青恐懼如人將捕之狀宜牛膝益中湯
虎骨丹之類以養助其筋脉肺虛呼吸少氣喘
乏咳嗽嗌乾宜枳實湯加入參黃芪阿膠蘇子
以調其氣腎虛腰背脊膝厥逆而痛神昏耳鳴
小便頻數精漏宜八味丸加五味鹿茸去附子

用山藥等丸以生其精陳藏器諸虛用藥凡
例虛勞頭痛復熱加枸杞萎蕤虛而欲吐
加入參虛而不安亦加入參虛而多夢紛
紜加龍骨虛而多熱加地黃牡蠣地膚子甘
草虛而冷加當歸川芎乾薑虛而損加鍾
乳棘刺從蓉巴戟天虛而大熱加黃芩天門
冬虛而多忘加茯苓遠志虛而口乾加麥
門冬知母虛而吸吸加胡麻覆盆子柏子仁
虛而多氣兼微咳加五味子大棗虛而驚

悸不安加龍齒沙參紫石英小草。若冷則用紫
石英小草。若客熱卽用沙參龍齒。不冷不熱皆
用之。虛而身強腰中不利加磁石杜仲。虛
而多冷加桂心吳茱萸附子烏頭。虛而勞小
便赤加黃芩。虛而客熱加地骨皮白水黃耆。
虛而冷加龍西黃芪。虛而痰復有氣加生
薑半夏枳實。虛而小腸不利加茯苓澤瀉。虛而損
膀胱。虛而小腸不利加茯苓澤瀉。虛而損
溺白加厚朴。髓竭不足加地黃當歸。肺氣

不足加天門冬麥門冬五味子。心氣不足加
生黨人參茯苓菖蒲。肝氣不足加天麻川芎。
脾氣不足加白朮白芍藥益智。腎氣不足
加熟地黃遠志牡丹皮。膽氣不足加細辛酸
棗仁地榆。神昏不足加朱砂額知子茯神。
證治要訣云。五勞皆因不量才力。勉強云爲憂
思過度。嗜慾無節或病失調將積久成勞。其證
頭旋眼暈身疼脚弱心怯氣短自汗盜汗或發
寒熱或五心常熱或往來潮熱或骨蒸作熱夜

多惡夢晝少精神耳內蟬鳴口中無味飲食減少此皆勞傷之證也五藏雖皆有勞心腎爲多心主血腎主精精竭血燥則勞生焉治勞之法當以調心補腎爲先不當用峻烈之劑惟當溫養滋補以久取効天雄附子之類投之適足以發其虛陽緣內無精血不足當此猛劑然不可因有熱純用甜冷之藥以傷其胃氣獨用執藥者猶釜中無水而進火也過用冷藥者猶釜下無火而添水也非徒無益而又害之宜十全大

補湯或雙和散或養榮湯七珍散樂令建中湯皆可選用間進雙補丸諸發有雜病如咳嗽吐血不得卧盜汗寒熱潮熱等已見各門審知因虛勞得之並宜用前藥未効用十四味建中湯無熟脉不可用或大建中湯渴而不勝熱藥者七珍散加木香五味子各七分熟蜜黃芪龍甲散或人參散獨五心發熱將欲成勞者茯苓補心湯飲食減少畏食而嘔者難獨用前滯甜藥須斟酌用前快脾之劑縮砂陳皮却不可少仍

下鹿茸橘皮煎丸如不噃，不畏食用。前十全大補湯雙和散等藥亦當少加快脾之劑以爲之防。有患精血不足，明知當補腎方，欲一取之歸芪等藥，其人素減食又恐不利於脾，方欲理脾，則不免用疎刷之藥，又恐愈耗腎水全一舉而兩得之功。莫若鹿茸橘皮煎丸爲第一。故曰精不足者補之以味，又曰補腎不如補脾。以脾上交於心，下交於腎，故也。道家交構心腎，以脾爲黃婆者，卽此意。若腎元太段虛損，病勢困篤，

則腎又不容少緩，不必拘於此說。要知於滋腎之中，佐以砂仁、澄茄之類，於壯脾之中，參以北五味、黃芪之屬。此又臨時審病，用藥之活法。難經曰：腎有兩者，非皆腎也。其左爲腎，右爲命門。命門者，諸精神之所舍，原氣之所繫也。男子以藏精，女子以繫胞，故知腎有二也。男子藏精者，氣海也。女子繫胞者，血海也。所主者二，受病者一，也是故。左腎爲陰，合主地道生育之化，故曰元氣之舍也。若夫腎之藏精者，是受五藏六

府之精輸納入精房血海而藏之然精有陰有陽陰陽平則兩腎和而不偏不平則偏陰陽俱不足則兩腎俱虛故東垣治兩虛者以仲景八味丸補之偏於左腎之陰精不足則以地黃丸主之以二才封髓丹主之右腎之陽火不足則以八味丸天真丸之類主之此用方之凡例也丹溪論勞瘵主乎陰虛者蓋自子至巳屬陽自午至亥屬陰陰虛則熱在午後子前寐屬陽寐屬陰陰虛則汗從寐時盜出也升屬陽降屬

陰陰虛則氣不降氣不降則痰涎上逆而連繩吐出不絕也脉浮屬陽沉屬陰陰虛則浮之洪大沉之空虛也此皆陰虛之證用四物湯加黃柏知母主之然世醫遵用治疾乃百無一効者何哉蓋陰既虛矣火必上炎而川芎當歸皆味辛氣大溫非滋虛降火之藥又川芎上竄尤非虛炎短之者所宜地黃泥膈非胃弱食少痰多者所宜黃柏知母苦辛太寒雖曰滋陰其實燥而損血雖曰降火其實苦先入心久而增氣反

能助火至其敗胃所不待言用藥如此烏能奏功也予每用薏苡仁百合天門冬麥門冬桑根白皮地骨皮牡丹皮枇杷葉五味子酸棗仁之屬佐以生地汁藕汁乳汁童子小便等如咳嗽則多用桑皮枇杷葉有痰則增貝母有血則多用薏苡仁百合增阿膠熟盛則多用地骨皮食少則用薏苡仁至七八錢而麥門冬常爲之主以保肺金而滋生化之源無不應手而効益諸藥皆稟燥降收之氣氣之薄者爲陽中之陰氣

薄則發泄辛甘淡平寒涼是也以施於陰虛火動之症猶當溽暑伊鬱之時而商飈颯然倏動則炎歎如失矣與治暑熱用白虎湯同意然彼是外感外感爲有餘故用寒沉藏之藥而後能輔其偏此是內傷內傷爲不足但用燥降收之劑而已得其平矣此用藥之權衡也虛勞之疾百脉空虛非粘膩之物填之不能實也精血枯涸非滋濕之物濡之不能潤也宜用人參黃芪地黃天麥門冬枸杞子五味子之屬各煎膏

另用青蒿以童便熬膏及生地汁白蓮藕汁人
乳汁薄荷汁隔湯煉過酌定多少并麋角膠霞
天膏合和成劑每用數匙湯化服之如欲行瘀
血加入醋製大黃末子玄明粉桃仁泥韭汁之
屬欲止血加入京墨之屬欲行瘀加入竹瀝之
屬欲降火加入童便之屬凡虛勞之症大抵
心下引脇俱疼益滯血不消新血無以養之也
尤宜用膏子加韭汁桃仁泥呼吸少氣懶言
語無力動作目無精光面色㿠白皆兼氣虛用

麥門冬人參各三錢橘紅桔梗炙甘草各半兩
五味子二十一粒爲極細末水浸油餅爲丸如
雞頭子大每服一丸細嚼津唾嚥下名補氣丸
氣虛則生脉散不言白朮血虛則三才丸不
言四物太畧前言薏苡仁之屬治肺虛後言
參芪地黃膏子之類治腎虛蓋肝心屬陽肺腎
屬陰陰虛則肺腎虛矣故補肺腎即是補陰非
四物黃柏知母之謂也勞瘵兼瘀積其證腹
脇常熱頭面手足則於寅卯時分乍有涼時者

是也。宜以霞天膏入竹瀝加少薑汁調玄明粉行之。若頑痰在膈上膠固難治者必以吐法吐之。或沉香滾痰丸透膈丹之類下之甚則用倒倉法。若肝有積痰汚血結熱而勞瘵者其太衝、脈心與衝陽脉不相應宜以補陰藥吞當歸龍鬚丸。^{古方}柴胡飲子防風當歸飲子麥煎散皆用大黃益能折炎上之勢而引之下行莫速乎此然惟大使實者乃可。若溏泄則雖地黃之屬亦不宜況大黃乎。透肌解熱柴胡乾葛爲

要劑故治骨蒸方中多用之如秦艽鱉甲散人參地骨皮散人參柴胡散皆退熱之劑然非常用多服之藥也衍義云柴胡本經並無一字治勞今治勞方中鮮有不用者凡此悞世甚多嘗原病勞有一種真藏虛損復受邪熱者如經驗方治勞熱青蒿煎丸用柴胡正合宜耳服之無不効熱去卽須急已若無邪熱不死何待又大忌芩連柏驟用純苦寒藥反瀉其陽但當用瓊玉膏之類大助陽氣使其復還寅卯之位微加




瀉陰火之藥是也。有重陰覆其陽火，不得伸。
或洒洒惡寒，或志意不樂，或脉弦數，四肢五心
煩熱者，火鬱湯、柴胡升麻湯，病去即已，不可過
劑。服寒涼藥，證雖大減，脈反加數者，陽鬱也。
宜升宜補，大忌寒涼犯之必死。男子肌瘦氣
弱，咳嗽漸成勞瘵，用猪肚丸服之，即肥。有面
色如故，肌體自光外看如無病，內實虛損俗呼
爲桃花症，當看有何證候，於前項諸藥審而用
之。右所列五勞六極二十三蒸諸治法亦畧。

備矣。然當以脾腎二藏爲要，何以言之？腎乃繫
元氣者也。脾乃養形體者也。經曰：形不足，溫之
以氣者也。謂真氣有少火之溫以生育形體，然
此火不可使之熱，熱則壯，壯則反耗真氣也。候
其火之壯少，皆在兩腎間經。又曰：精不足，補之。
以味五味入胃，各從所喜之藏而歸之，以生津
液，輸納於腎者，若五味一有過節，反成其藏，有
餘，勝克之禍起矣。候其五味之寒熱，初在脾胃，
次在其所歸之藏，卽當補其不足，瀉其有餘，謹

守精氣調其陰陽使神內藏夫如是則天樞開
發而胃和脈生故榮衛以周於內外無不被滋
養而病愈矣勞疾久而嗽血咽疚無聲此爲
自下傳上若不嗽不疼久而渴濁脫精此爲自
上傳下皆死證也骨蒸之極聲嘔咽痛面黧
脈躁汗出如珠喘乏氣促出而無入毛焦唇反
皆死證也又骨肉相失聲散嘔血陽事不禁
晝涼夜熱者死

附水丘先生紫庭治療秘方人有傳戶礪牒

伏連五勞七傷二十六蒸其候各異其源不同
世醫不明根本妄投藥石可勝歎哉予休心雲
水遠絕人事遂以所傳樞要精微以示世醫使
之明曉夫傳戶勞者男子自腎傳心心而肺肺
而肝肝而脾女子自心傳肺肺而肝肝而脾脾
而腎五藏復傳六府而死矣或連及親族至於
滅門其源皆由房室飲食過度冷熱不時憂思
悲傷有欲不遂驚悸喜懼或大病後行房或臨
戶哭泣尸氣所感邪氣一生流傳五藏蠹食傷



心雖有諸候其實不離乎心陽腎陰也若明陰
陽用藥可以返魂奪命起死回生人知勞之名
未知其理人生以血爲榮氣爲衛二者運轉而
無壅滯勞何由生故勞者倦也血氣倦則不運
凝滯踈漏邪氣相乘心受之爲盜汗虛汗憂悲
恐懼恍惚不安腎受之爲骨蒸爲鬼交陽虛好
色愈甚肝受之爲癩瘻腸滿痞聚拳攣拘急風
氣乘之爲疼痛脾受之爲多思慮慕清涼不食
多食無味肺受之爲氣喘痰涎睡卧不安毛髮


焦枯至於六府亦各有證令人多用涼藥則損
胃氣雖虛亦難矣予之所論但在開關把胃
何則勞病者血氣不運遂致乾枯此關脉閉也
故先用開關藥通其血脉既開關則須起胃益
五藏皆有胃氣邪氣附之則五藏衰弱若不把
胃則他藥何由而行故開關把胃乃治勞妙法
也然必須明陰陽且如起胃陽病藥不可過暖
陰病藥不可過涼今人言丁香厚朴肉桂蕤蓉
可補五藏不知用之則喘息閉嗽如火益熱或

以治鬼爲先務要當法藥相濟道力資扶然後
鬼戶可逐也此論上合黃帝岐扁下明藏府陰
陽非患人有福亦不遭逢寶之

總論病證

如夜夢鬼交遺精自泄夢魂不安常見先亡恐
怖鬼神思量飲食食至不進目睛失白骨節疼
痛五心煩熱頭髮作滯面白臉時紅如傳臘脣
紅異常肌膚不潤言語氣短大便秘澀或時溏
利小便黃赤或時白濁項生瘰癧腹中氣塊鼻
口生瘡口舌乾燥咽喉不利仰卧不得或時氣

喘涕唾稠粘上氣憒滿痰吐惡心腹脇妨悶陰
中冷痛陰痒生瘡多濕轉筋拘急或忿怒悲啼
舌直苦痛目睛時疼盜汗擡肩喘息陽道虛剛
如手足心煩疼口乾舌瘡小便黃赤大便難及
熱多咽喉痛涎唾黃粘及兼前項一二證即是
陽病當用陽病開關散爲瀉陽而補陰如大便
溏利小便白濁飲食不化胃逆口惡雖有熱痰
唾白色及小便多仍兼前項數症即是陰病當
用陰病開關藥凡勞病虛極亦多令人煩躁太



小便不利宜兼諸脉證審之陰陽二症皆用起
胃散又歌訣云 水丘道人年一百煉得龍精
并虎魄流傳此法在人間聊向三天助陰德扶
危起死莫蹉跎此藥於人有效多不問陰陽與
冷熱先將脾胃與安和脾經虛冷易生寒最是
難將熱藥攻閉却太便井上氣爲多厚朴與芩
蓉此法精關兩道方病人入口便知良但須仔
細看形候莫向陰中錯用陽涕唾稠粘小便赤
乾枯四體無筋力烏龍膏子二十圓便似焦枯

得甘滴遺精夢泄腹膨高咳嗽陰疼爲患勞此
病是陰須識認便當急下玉龍膏嗽裏痰涎仰
卧難陰陽交併候多端却須兼服訶黎散治取
根源病自安

七寶圓瀉骨蒸傳戶邪氣陽病可服黃連四兩
爲細末用猪肚一箇洗淨入藥末線縫之用童
便五升文火煮令爛乾爲度以肚細切同藥爛
研置風中吹乾丸如桐子大朱砂麝香作衣空
心麥門冬水下或用陽病開關散咽下無朱砂

亦可

陽病開關散北柴胡去蘆桔梗炒秦艽麥門冬
去心各半兩芍藥木香澤瀉各一兩木通半兩
甘草一錢灸當歸桑白皮竈灸地骨皮各一兩
哎咀每服三錢水一盞薑三片煎六分空心服
小便多卽病去也

陰病開關散當歸赤芍藥肉桂白芷甘草炙各
半兩木香二錢製枳殼三錢天南星一錢去皮
薑汁浸一宿焙哎咀每服三錢薑三片煎七分

入無灰酒三分蓋童便三分盞又煎七分溫服
先服此起胃散一二日後不問退否兼玉龍膏
服之

起胃散陰陽二候皆用黃芪炙二兩白朮炒一
兩白芷半兩人參半兩山藥一兩哎咀每服三
錢加木瓜煎ス或加沉香茯苓甘草各半兩
烏龍膏烏梅去核柴胡紫苑生乾地黃木香各
一兩秦艽實好者貝母麪炒去心防風各三錢
杏仁五兩麪炒爲末皂角六十片二十片去黑

皮醋灸爲末二十片燒灰存性二十片湯浸去
黑皮用精猪肉剝爛如泥同皂角一處入木五
升細搗汁入童便三升無灰酒一升併熬如膏
和前藥末爲丸如梧桐子大每服二十丸空心
麥門冬湯下甚者二十日効

玉龍膏青蒿子柴胡白檳榔各二兩製鼈甲白
术赤茯苓木香牡蠣各半兩地骨皮半兩人參
一兩生乾地黃一兩當歸三錢朱砂一錢豆豉
心二十合虎頭骨研開酒炙黃赤色一兩肉蓯蓉


酒浸一宿灸一兩鼈甲湯煮去皮裙酒浸灸薰
赤皆爲末又加烏梅肉枳殼右前件未成却以
杏仁五升壯者以童便浸春夏七日秋冬十日
和瓶日中晒每日換新者日數足以清水淘
去皮尖焙乾別以童便一升於銀石器內以文
火煎至隨手爛傾入砂盆用柳木槌研爛爲膏
細布濾過入酥一兩薄荷自然汁二合攪勻和
藥用槌搗五百下丸如梧桐子大空心湯下十
五丸加至三十丸如覺熱減丸數服熟少還添

加減經月日，諸證皆退進食安卧，面有血色，乃藥行也。當勤服，無急忌。莧菜白粥冷水生血雀鴿等物。

訶黎散治勞嗽上氣。赤茯苓二兩訶黎勒皮二十兩木香半兩檳榔一兩當歸一兩炒大黃一兩炒吳茱萸湯泡七次半兩咬咀，每服三錢生薑三片水一盞煎，六分溫服。

傳戶勞

本事方云葛稚川言鬼疰者是五尸之一疰。又按諸鬼邪爲害，其變動乃有三十六種至九十九種。大約使人淋漓沉沉默默的，不知其所苦而無處不惡，累年積月漸就頓滯，以至於死。傳於傍人乃至滅門。覺知是候者急治癩肝一具，陰乾取末水服方寸七日三服，効未知再服此方神良。紫庭方云傳戶伏尸皆有蟲須用乳香熏病人之手，乃仰手掌以帛覆其上熏良久。




手背上出毛長寸許白而黃者可治紅者稍難
青黑者卽死若熏之良久無毛者卽非此症屬
尋常虛勞症也又法燒安息香令煙出病人吸
之嗽不止乃傳尸也不嗽非傳尸也 直指方
云療蟲食人骨髓血枯精竭不救者多人能平
時愛護元氣保養精血療不可得而傳惟夫縱
慾多淫精血內耗邪氣外乘是不特男子有傷
婦人亦不免矣然而氣虛腹餒最不可入勞瘵
之門弔喪問喪衣服器用中皆能乘虛而染觸

間有婦人入其房覩其人病者思之勞氣隨入
染患日久莫不化而爲蟲治療之法大抵以保
養精血爲上去蟲次之安息蘇合阿魏麝犀丹
砂雄黃固皆驅伐惡氣之藥亦須以天靈蓋行
乎其間蓋尸疰者鬼氣也伏而未起故令淹縕
得枯骸枕骨沿之鬼氣飛越不復附人於是乎
瘥外此則虎牙骨鯉魚頭皆食入之類也其亦
補骨之亞乎要之發用以前當以川芎當歸先
立乎根本之地先用芎歸血餘散吞北斗符

次用鼈甲生犀散取蟲，蘇遊論曰傳尸之候先從腎起。初受之兩脰痠疼，腰背拘急，行立腳弱，飲食減少，兩耳颼颼真似風聲，夜卧遺泄，陰汗，痿弱，腎既受訖，次傳於心。心初受氣，夜卧心驚或多，恐悸，心懸懸氣吸吸欲盡，夢見先亡，有時盜汗，飲食無味，口內生瘡，心氣煩熱，惟欲眠卧，朝輕夕重，兩頰口唇悉皆紋赤，如傅臘脂，有時手足五心煩熱，心受已次傳於肺。肺初受氣，咳嗽上氣喘，益甚，鼻口乾燥，不聞香臭，如或

忽聞，惟覺朽腐氣，有時惡心欲吐，肌膚枯燥，時或疼痛，或似蟲行，乾皮細起，狀如麩片，肺既受已次傳於肝。肝初受氣，兩目胱胱，面無血色，常欲顰眉，視不能遠，目常乾澀，又時赤痛，或復睛黃，常欲合眼，及時睡卧，不着肝既受已次傳於脾。脾初受氣，兩脇虛脹，食不消化，又時瀉利水穀，生蟲，有時肚痛，腹脹雷鳴，唇口焦乾，或生瘡腫，毛髮乾聳無有光潤，或時上氣擗肩，喘息利赤，黑汁，見此證者乃不治也。



夫骨蒸 残爛 伏連 尸疰 勞疰 蟲疰

毒疰 熱疰 冷疰 食疰

鬼疰善皆曰

傳屍以疰者注也病自上注也其變有二十二種或三十六種或九十九種大畧令人寒熱盜汗夢與鬼交遺精白濁髮乾而聳或腹內有塊或腦後兩邊有小結復連數箇或聚或散沉沉默默咳嗽痰涎或咯膿血如肺痿肺癰狀或腹下利羸瘦困之不自勝積月累年以至於死死復傳注親屬乃至滅門者是也更有蜚戶追

尸寒戶喪戶與尸疰謂之五戶及大小附著等證乃挾諸鬼邪而害人其證多端傳變推遷難以推測故自古及今愈此病者十不一得所謂狸骨獺肝天靈蓋銅鎖鼻徒有其說未嘗取效惟當肓俞四花穴若及早灸之可否幾半晚亦不濟矣

上清紫庭追勞方云三戶九蟲之爲害治者不可不知其詳九蟲之內三蟲不傳媚蛔寸白也其六蟲者或臟種毒而生或親屬蓄口染而傳疾

之初覺精神恍惚氣候不調切在戒忌酒色調
節飲食如或不然五心煩熱寢汗忪悸如此十
日頓成羸瘦面黃光潤此其證也太抵六蟲一
旬之中徧行四六周而復始病經遇木氣而生
立春一百後方食起三百一食五日一退方其
作苦百節皆漏蟲之食也退卽還穴醉睡一醉
五日其病乍靜候其退醉之時乃可投符用藥
不然蟲熟於符藥之後不能治也一蟲在身中
占十二穴六蟲共占七十二穴一月之中上十

日蟲頭向上從心至頭遊四穴中十日蟲頭向
內從心至肺遊四穴下十日蟲頭向下從肺至
足遊四穴陽日長雄陰日長雌其食先藏府脂
膏故其色白五藏六府一經食損卽皮聚毛脫
婦人卽月信不行血脉皆損不能榮五藏六府
也七十日後食人血肉盡故其蟲黃赤損於肌
肉故變瘦劣飲食不爲肌膚筋緩不能收持一
百二十日外血肉食盡故其蟲紫卽食精髓傳
於腎中食精故其蟲色黑食髓卽骨痿不能起

於牀諸蟲久卽生毛，毛色雜花鍾孕五藏五行之氣傳之三人卽自能飛，其狀如禽亦多品類傳入腎經不可救治利藥下蟲後其蟲色白可三十日服藥補其蟲黃赤可六十日服藥補其蟲紫黑矣此病已極可百二十日服藥補又云蟲頭赤者食患人肉可治頭白者食患人髓其病難治只宜斷後故經曰六十日者十得七八日內治者十得三四過此以往未知生全但可爲子孫除害耳

第一代爲初勞病謂初受其疾不測病源酒食加餐漸覺羸瘦治療蹉跎乃成重病醫人不詳其故悞藥多死



此蟲形如翼
見背上毛長
尋在人身中




此蟲形如
鬼狀變動
在人藏府中



此蟲形如
蝦蟆變動
在人藏府中

已上諸蟲在人身中繁著之後或大或小令人夢寐顛倒魂魄飛揚精神離散飲食不減形容漸羸四肢酸疼百節勞倦增寒壯熱背膊拘急頭腦疼痛口苦舌乾面無顏色鼻流清涕虛汗



常多行步艱辛眼睛多痛其蟲遇丙丁日食起醉歸心俞穴中四穴輪轉周而復始候蟲大醉方可醫灸取出蟲後用藥補心此用守靈散

第二代爲覺勞病謂傳受此病已覺病者患者乃自知夜夢不祥與亡人爲伴侶醒後全無情思昏沉似醉神識不安所食味輒成受害或氣痰發動風蓋所加四體不和心胸滿悶日漸羸瘦骨節乾枯或嘔酸水或是醋心唇焦口苦鼻塞胸竊背膊痠疼虛汗常出腰膝刺痛如此疾

狀早須醫治過時難療致傷性命



此蟲形如亂絲長三寸許
在人藏府中



此蟲形如蠍蛇或似守宮
在人藏府中



此蟲形如蝦蟹在人藏府中

口上諸蟲在人身中令人氣喘唇口多乾咳嗽增寒心煩壅滿毛髮焦落氣脹吞酸津液漸衰次多虛渴鼻流清水四肢將虛臉赤面黃皮膚枯瘦腰膝無力背脊痠疼吐血唾膿語言不利鼻塞頭痛胸膈多痰重者心悶吐血僵仆在地不能自知其蟲遇庚辛日食起醉歸肺俞穴中



四穴輪轉周而復始俟蟲大醉方可治醫取出其蟲補肺則差

虛成

第二代爲傳尸勞病謂傳受病人自尋得知之日漸消瘦頓改容顏日日恓惶夜夜憂死不遇良醫就死伊邇

此蟲形如蚊蠂俱遊人藏府中

此蟲形如蝶大如碎血片在人藏中

此蟲形如刺蝟在人腹中

已上諸蟲在人身中令人三焦多昏日常思睡嘔吐苦汗或吐清水或甜或苦粘涎常壅腹脹

虛鳴卧後多驚口鼻生瘡唇黑面青日漸消瘦精神恍惚魂魄飛揚飲食不消氣咽聲乾目多昏淚其蟲遇庚寅日食起醉歸厥陰穴中四穴輪轉周而復始俟蟲大醉方可治取蟲出之後補氣即差

第四代



此蟲形如亂絲在人腹藏之中




此蟲形如猪肺在人腹內之中



此蟲形如蛇虺在人五藏之中

已上諸蟲在人身中令人藏府虛鳴嘔逆傷中



瘡癬氣塊增寒壯熱。肚大筋生腰背疼痛或虛或瘦瀉利無時行履困重四肢憔悴上氣喘急口苦舌乾飲食及水過多要喫酸醕之物其蟲遇戊巳日食起醉歸脾俞穴中四穴輪轉周而復始俟蟲大醉方可治取蟲出之後補脾爲瘥魂停

第五代



此蟲形似
表裡背直



此蟲形如
有足無頭



此蟲變動
在於陽官

已上諸蟲入肝經而歸腎得血而變更也令人多怒氣逆筋骨拳攣四肢解散唇黑面青憎寒壯熱腰背疼痛起坐無力頭如斧斫眼睛時痛翳膜多淚背膊刺痛力乏虛羸手足乾枯卧着牀枕不能起止有似風中肢體頑麻腹內多痛眼見黑花忽然倒地不省人事夢寐不祥覺來篇體虛汗或有面色紅潤如平時者或有通靈而言未來事者其蟲遇癸未日食起醉歸肝俞穴中四穴輪轉周而復始俟蟲大醉方可醫救

取蟲出後補肝乃瘥 金明

第六代

此代蟲有翅足全皆千里傳
在所謂飛尸不以常法治也



馬尾有兩
條雌雄





龜鼈在人
五藏中



此蟲形如
鸞或長或短
或如飛禽

已上諸蟲在人身中居於腎藏透連脊骨令人
思食百味要喫身體危羸腰膝無力髓寒骨熱
四體乾枯眼見火生或多黑暗耳內虛鳴陰汗
燥痒冷汗如油夢多鬼交小便黃赤醒後昏沉
臍下結硬或奔心腹看物如豔心腹悶亂骨節

疼痛食物進退有時喘嗽其蟲遇丑亥日食起
醉歸腎俞穴中四穴輪轉周而復始俟蟲大醉
可醫治取蟲後補腎填精瘥育嬰散



Kitasato Memorial Medical Library