




3
28 29 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50



Kitasato Memorial Medical Library

490.9
Sh-14
8
No. 3671
195.125-2

呃逆 噎氣 諸逆衝上

諸見血證 九竅出血 鼻衄
舌衄 齒衄 耳衄 吐衄 欽摶血
咯血 泗血 下血 腸風 瘰毒 中盞
畜血



呃逆

呃逆卽內經所謂嘔也或曰成無己許學士固以嘔爲呃逆然東垣海藏又以嘔爲乾嘔陳無擇又以嘔名歟逆諸論不同今予獨取成許二家之說何也曰嘔義具在內經顧諸家不察耳按靈樞雜病篇末云嘔以草刺鼻嚏嚏而已無息而疾迎引之立已大驚之亦可已詳此經文三法正乃治呃逆之法按呃逆用紙燃刺鼻便嚏嚏則呃逆立止或閉口鼻氣使之無息亦立

已或作冤盜賊大驚駭之亦已此予所以取成
許二家之論嘔爲呃逆爲得經旨也若以嘔爲
乾嘔設使乾嘔之人或使之噯或使之無息或
使之大驚其乾嘔能立已乎嘔非乾嘔也明矣
若以嘔名欸逆按內經生氣通天論曰秋傷於
濕上逆而欬陰陽應象論曰秋傷於濕冬生欬
嗽以此論之則欸逆爲欬嗽無疑以春夏冬三
時比例自見孫真人千金曰欸逆者嗽也本自
明白後人不知何以將欸逆誤作呃逆失之遠

矣趙以德曰成無己云嘔者俗謂之欸逆呃
呃然有聲然引欬逆是嘔非也內經以嘔與欬
逆爲兩證嘔是胃病欬逆是肺病謂胃氣逆爲
嘔註云胃爲水穀之海腎與爲關關閉不利則
氣逆而上胃以包容水穀性喜受寒寒穀相搏
故爲嘔也又謂陽明之復欬噫靈樞亦謂穀入
於胃胃氣上注於肺今有故寒氣與新穀氣俱
還入於胃新故相亂真邪相攻氣并相逆復出

於胃故爲嘯。補手太陰，瀉足少陰。張仲景言嘯者皆在陽明證中。謂濕家下之太早，則嘯而陽明病不能食。攻其熱必嘯。皆因下後，冒氣虛而嘯者也。至有風熱內壅，氣不能通，有潮熱時時嘯者，與小柴胡湯和解之。嘯而腹滿，視前後知何部不利，利之者此皆可治之。證至若病極譖語甚者，至嘯又不尿，腹滿加嘯者皆不治。丹溪先生亦嘗謂，呃逆氣逆也。氣自脇下直衝上出，於口而作聲之名也。內經謂諸逆衝上，皆屬於

火東垣謂是陰火上衝而吸之氣不得入。胃脉反逆由陰中伏陽而作也。從四時用藥法治古方悉以胃弱言之，而不及火。且以丁香柿蒂竹茹陳皮等劑治之，未審孰爲降火，孰爲補虛。人之陰氣依胃爲養，胃土傷損，則木氣侮之。此土敗木賊也。喚爲火所乘，不得內守，木挾相火乘之，故直衝清道而上。言胃弱者，陰弱也。虛之甚也。病人見此似爲危證，然亦有實者不可不知。嗟乎，聖人之言，胃氣逆爲嘯者，非由因而逆。

緣王太僕用靈樞之意，竟作腎寒逆上之病註。之由是後代方論或用熟劑治寒，或用辛溫散氣，安知脾與胃一陰一陽也？二者不和，亦逆。腎用在下，相凌亦逆。且腎之逆未可便謂之寒也。左腎主水，性本潤下，烏能自逆？必右腎相火炎上，挾其衝逆，須觀所狹多寡，分正治反治。以瘠之肝木之風從少陽相火衝克者亦必治。火皆當如先生所言者以治。若別有其故而噦者，又必如仲景法隨其攸利而治之。劉宗厚曰：呃

逆，一證有虛有實，有火有痰，有冰氣不可專作寒論。蓋傷寒發汗吐下之後，與瀉利日久，及太病後，婦人產後，有此者皆脾胃氣血太虛之故也。若平人食入太速，而氣噎，或飲水喜笑，錯喉，而氣捨，或因痰水停隔心中，或因暴怒氣逆痰厥，或傷寒熱病失下，而有此者，則皆屬實也。夫水性潤下，火性炎上，今其氣自下衝上，非火而何？太抵治法虛則補之，虛中須分寒熱，如因汗吐下後誤服寒涼過多，當以溫補之，如脾胃陰

虛火逆上衝當以平補之。挾熱者涼而補之。若夫實者如傷寒失下。地道不通。因而呃逆。當以寒下之。如痰飲停蓄或暴怒氣逆痰厥。此等必形氣俱實。別無惡候。皆隨其邪之所在。涌之洩之。清之利之也。胃傷陰虛木挾相火。直衝清道。而上者宜參术湯。下大補陰丸。吐利後胃虛寒者。理中湯加附子丁香柿蒂。吐利後胃虛熱者。橘皮竹茹湯。三因方云。凡吐利後多作噦。此由胃中虛膈上熱故也。或至八九聲相

連於氣不回。至於驚入者。若傷寒久病得此甚惡。內經所謂壞病者是也。丹溪治趙立道年近五十質弱。多怒。暑月因饑後大怒。得滯下病。口渴。自以冷水調生蜜飲之。利漸緩。五七日後。診脈稍失。不數日。遂令止蜜水渴。時且以參术湯調益元散與之。刺亦漸收。七八日後。覺倦甚。發呃。知其因下久而陰虛也。念守前藥然利尚未止。又以煉蜜與之。衆皆尤藥之未當。欲用薑附。曰。補藥無速効。附子非補陰者服之必死。衆曰。

冷水飲多得無寒乎曰炎暑如此飲涼非寒勿
多疑待以日數藥力到當自止又四日而呃止
滯下亦安又治陳擇仁年近七十素厚味有
久嗽病新秋患滯下食大減至五七日後呃作
脈皆大豁衆以爲難丹溪曰形瘦者尚可爲以
參术湯下大補丸七日而安婁全善治其兄
九月得滯下每夜五十餘行嘔逆食不下五六
日後加呃逆與丁香一粒噙之立止但少時又
至遂用黃連瀉心湯加竹茹飲之呃雖少止滯

下未安若此者十餘日遂空心用御米殼些少
澀其滑日間用參术陳皮之類補其虛自服御
米殼之後呃聲漸輕滯下亦收而安以上吐利
後補虛例仲景云噦而腹滿視其前後知何部不利利
之卽急大腸結燥脉沉數者調胃承氣湯
大使小通噦數譫語小承氣湯丹溪治超越
陳氏二十餘歲因飽後奔走數里患噦但食物
則連噦百餘聲半日不止飲酒與湯則不作至
晚發熱脉濶數以血入氣中治之用桃仁承氣

湯加紅花煎服下汚血數次卽減再用木香和中丸加丁香服之十日而愈右下例有實積者宜之又治一女子年踰笄性躁味厚炎月因大怒而呃作作則舉身跳動脉不可診神昏不知人問之乃知暴病急視其形氣俱實遂以人參蘆二兩煎湯飲一碗大吐穎痰數碗大汗昏睡一日而安人參入手太陰補陰中之陽者也蘆則反是大瀉太陰之陽女子暴怒氣上肝主怒肺主氣經曰怒皆則氣逆因怒逆肝木乘火侮肺故呃大作

而神昏參蘆善吐痰盡則氣降而火衰金氣復位胃氣得和而解右宣例痰鬱者宜之三因云嘔而心下堅痞眩悸者膈間有痰水所爲虛不禁吐者宜二陳湯導痰湯加薑汁竹瀝亦有污血而嘔者丹溪治超越陳氏用桃仁承氣湯是也虛不禁下者於畜血門求輕劑用之仲景云嘔逆者陳皮竹茹湯主之又云乾嘔嘔若手足厥者陳皮湯主之本事方用枳殼五錢木香二錢半細末每服一錢白湯調下孫兆方用陳皮二

兩去白水煎通口服或加枳殼一兩此皆破氣之劑氣逆者宜之唯陳皮竹茹湯氣逆而虛者宜之水寒相搏者小青龍湯寒甚加附子尖炒潔古柿錢散寶鑑丁香柿蒂散羌活附子湯皆熱劑唯寒呃宜之戴復菴以熱呃唯傷寒有之其他病發呃者皆屬寒用半夏一兩生薑一兩半水一碗煎半碗熱服或用丁香十粒柿蒂十個切碎白水一盞半煎或理中湯加枳殼茯苓各半錢半夏一錢不効更加丁香十粒

亦有無病偶然致呃此緣氣逆而生重者或經一二日宜小半夏茯苓湯加枳實半夏湯或煎湯泡蘿蔔子研取汁調木香調氣散乘熱服逆氣用之最佳若胃中寒甚呃逆不已或復加以嘔吐輕劑不能取效宜丁香煮散及以附子粳米湯增炒川椒丁香每服各二三十粒治呃逆於臍下關元灸七壯立愈累驗又方男左女右乳下黑盡處一韭葉許灸三壯甚者二七壯

心脉小甚爲噦，肺脉散者不治。噦聲
頻密相連者爲實可治。若半時噦一聲者爲虛
難治多死在旦夕。

產後呃逆。此惡候也急灸期門三壯神效。屈
乳頭向下盡處是穴。乳小者乳下一指爲率界。
左女右與乳正直下二指陷中動脈處是穴。炷
如小豆大穴真病立止。丁香散、羌活散
桂心五錢薑汁二合水煎服。參附湯右皆
熱劑
內有熱
不禁熱

噫氣

內經曰。噫卽今所謂噯氣也。宜明五氣論以。
心爲暎。脾論以心痺者。脉不通。煩則心下鼓暴。
上氣而喘。嗌乾善噫。至真大要論以太陽司天。
少陰主地。復主爲暎。噫。四時刺逆從論刺中心。一
日死其動。勿噫。陰陽別論。二陽一陰發病。主驚
駭。背痛。善欠。名曰厥。厥脉解太陰。所謂上
走心爲暎者。陰盛而上走。於陽明。陽明絡屬心。
故曰。上走心爲暎也。此乃暎從心出者。也厥陰
意氣。

在泉腹脹善噫得後與氣則快然如衰王版論
太陰終者善噫靈樞云足太陰是動病腹脹善
噫又云寒氣客於胃厥逆從下上散復出於胃
故爲噫仲景謂上焦受中焦氣未和不能消是
故能噫衛出又云上焦不歸者噫而酢酸不歸
也上焦之氣不至其部則物不能傳化故噫而吞酸由是觀之噫者是火
土之氣鬱而不得發故噫而出王註解心爲噫
之義象火炎上煙隨焰出如痰閉膈間中氣不
得伸而噫者亦十氣內鬱也仲景云痞而噫

旋復代赭湯主之本事方心下蓄積痞悶或
作痛多噫敗卵氣枳殼散主之丹溪云胃中
有實火膈上有稠痰故成噫氣用二陳湯加香
附梔子仁黃連蘇子前胡青黛瓜蒌或丸或湯
服之

診寸口脉弱而緩弱者陽氣不足緩者胃氣
有餘噫而呑酸食卒不下氣填於膈上寸脉
緊寒之實也寒在上焦胸中必滿而噫跌陽
脈微而濇微無胃氣濇卽傷脾寒在膈而反下

之寒積不消。胃微脾傷，穀氣不行，食已自噫寒
在胸膈上虛下實，穀氣不通爲閉塞之病。趺
陽脉微濇及寸脉緊而噫者，皆屬寒。太陰終
者腹脹閉噫氣嘔逆。

諸逆衝上

逆氣五藏皆有。一曰心小腸經云諸逆衝上。
皆屬於火。又云少腹控睾引腰脊上衝。心邪在
小腸取之。肓原以散之。刺太陽以予之。取厥陰
以下之。取巨虛下廉以去之。按其所過之經以
調之。是也。二曰胃經云胃爲氣逆是也。胃逆
有嘔有吐。有噦故刺。嘔吐取中脘三里也。刺噦
取乳下黑根盡處及臍下三寸。皆大驗也。治各
見本門。三曰肺大腸經云肺苦氣上逆急食


苦以泄之又云腹中常鳴氣上衝胸喘不能久立邪在大腸刺肓之原巨虛下廉是也其肺逆曰咳喘取天突人迎泄之也治亦各有門四曰肝經云肝氣逆則耳聾不聰煩腫取益是也肝經云肝氣逆發則耳聾不聰煩腫取益是也五曰腎卽奔豚氣逆脚氣衝心之類是也治亦各有門六曰腎經云督脈別絡生竅從少腹上衝心而痛不得前後爲衝疝是也運氣厥逆有三一曰風火經云少陽司天火氣下臨風行於地厥逆膈不通是也二曰寒

經云水鬱之發善厥逆是也三百濕經云太陰司夫濕氣下臨厥逆是也

經云逆氣象陽凡氣逆必見象陽證面白脉洪當以法降其逆乃愈若以氣象陽盛而用寒藥攻之則不救矣氣上衝心咽不得息治法見傷寒厥陰病條東垣云如秋冬之月胃脉四道爲衝脈所逆并脇下少陽脉二道而反上行病名曰厥逆經曰逆氣上行滿脉去形七神昏絕離去其形而死矣其症氣上衝咽不得息喘

息有聲不得卧於調中益氣加吳茱萸半錢或一錢觀厥氣多少用之如夏月有此症爲大熱也蓋此症隨時爲寒熱溫涼宜以酒黃連酒黃芩酒知母各等分爲細末熟湯爲丸如桐子大每服二百丸空心白湯下仍多飲湯服畢少時便以美飲食壓之使不得胃中停留直至下焦以瀉衝脈之邪也 戴復菴云虛炎之證陰陽不升降下虛上盛氣促喘息宜蘇子降氣湯去前胡下黑錫丹或養正丹氣急甚而不能眠

臥者沉附湯或正元散或四柱散去木香用沉香並以鹽煎下黑錫丹或靈砂丹三炒丹不効則以前藥下硃砂丹此多用香燥剛熱之劑若者審言之陰虛內熱者誤用立殆醫乏



諸見血證

附九竅出血

毛孔出血

東垣云，衄血出於肺，以犀角升麻梔子黃芩芍藥生地紫參丹參阿膠之類主之。咯唾血者，出於腎，以天門冬麥門冬貝母知母桔梗百部黃芩遠志熟地黃之類主之。如有寒者，乾薑肉桂之類主之。痰涎血者出於脾，葛根黃芪黃連芍藥甘草當歸沉香之類主之。嘔血出於胃實者，犀角地黃湯主之。虛者，小建中湯加黃連主之。

海藏云胸中聚集之殘火腹裏積久之太陰上
下隔絕脉絡部分陰陽不通用苦熱以定於中
使辛熱以行於外升以甘溫降以辛潤化嚴肅
爲寒溫變稟刻爲和氣汗而愈也然餘毒土苴
猶有存者周身陽和尚未泰然胸中微躁而思
涼飲因食冷物服涼劑陽氣復消餘陰再作脉
退而小弦細而遲激而爲衄血唾血者有之心
肺受邪也下而爲便血溺血者有之腎肝受邪
也三焦出血色紫不鮮此重沓寒濕化毒凝泣

水穀道路浸漬而成若見血證不詳本源便用
涼折變乃生矣 陽證溢出鮮血 陰證下如
豚肝

上而血者黃芪桂枝湯 白芍當歸湯
中而血者當歸建中湯 增損胃風湯
下而血者芎歸木附湯 桂附六合湯 卷三
血證在行陽二十五度見黃芪四君子湯主之
若三血證在行陰二十五度見當歸四逆加
吳茱萸主之

吐血衄血便血其人陰虛陽走其脉沉而散其外證虛寒無熱候宜焉金丸散止之法宜上用散下用丸次以木香理中湯和大七氣湯入川芎煎調蘇合香丸溫之仁齋直指云血遇熱則宣流故止血多用涼藥然亦有氣虛挾寒陰陽不相爲守榮氣虛散血亦錯行所謂陽虛陰必走是耳外證必有虛冷之狀法當溫中使血自歸於經絡可用理中湯加南木香或局方七氣湯加川芎或甘草乾薑湯其効甚著又有飲

食傷胃或胃虛不能傳化其氣逆上亦令吐衄水香理中湯甘草乾薑湯出血諸證每以胃藥收功木香理中湯或參苓白朮散二分枳殼散一分夾和米湯乘熱調下或真方四君子湯夾和小烏沉湯米湯調下已上並用薑棗畧煎亦得右藥不惟養胃蓋以調氣輩與之並行若夫桔梗枳殼湯夾和二陳湯薑棗同煎入蘇合香丸少許佐之又調氣之上藥也

血泄又云少陽之復火氣內發血溢血泄是火氣能使人失血者也而又云太陽司天寒淫所勝血變於中民病嘔血血泄駁血善悲又云太陽在泉寒淫所勝民病血見是寒氣能使人失血也又云太陰在泉濕淫所勝民病血見是濕氣能使人失血也又云少陰司天之政水火寒熱持於氣交熱病生於上冷病生於下寒熱交犯而爭於中民病血溢血泄是寒熱凌犯能使人失血也太陰司天之政初之氣風濕相薄民

病血溢是風濕相薄血溢也又云歲金太過燥氣流行病反側咳逆甚而血溢是燥氣亦能使血溢也然則六氣皆能使人失血何獨火乎櫻寧生卮言云古人言諸見血非寒證皆以血爲熱迫遂至妄行然皆復有所挾也或挾風或挾濕或挾氣又有因藥石而發者其本皆熱上中下治各有所宜在上則梔子黃芩黃連芍藥犀角蒲黃而濟以生地黃牡丹皮之類胃血古人有胃風湯正是以陽明火邪爲風所扇而血

爲之動中間有桂取其能伐木也若蒼木地榆
白芍藥之類而濟以火劑火腸血以手陽明火
邪爲風爲濕也治以火劑風劑風能勝濕也如
黃連黃芩芍藥蘖皮荆芥防風羌活之類兼用
雞冠花則又述類之義也驚而動血者屬心
怒而動血者屬肝憂而動血者屬肺思而動血
者屬脾勞而動血者屬腎血溢血泄諸蓄妄
證其始也予率以桃仁大黃行血破瘀之劑折
其銳氣而後區別治之雖往往獲中然猶不得

其所以然也後來四明遇故人蘇伊舉問論諸
家之術伊舉曰吾鄉有善醫者每治失血蓄妄
必先以快藥下之或問失血復下虛何以當則
曰血既妄行迷失故道不去蓄利瘀則以妄爲
常曷以禦之且去者自去生者自生何虛之有
予聞之愕然曰名言也昔者之疑今釋然矣
婦人之於血也經水蓄而爲胞胎則蓄者自蓄
生者自生及其產育爲惡露則去者自去生者
自生其醞而爲乳則無復下滿而爲月矣失血

爲血家妄逆產婦爲婦人常事其去其生則一
也失血家須用下劑破血益施之於蓄妄之初。
亡血虛家不可下蓋戒之於亡失之後。

九靈山房 南天竺飲主之或用血餘灰自髮。
爲佳無卽父子一氣者次則男胎髮又次則亂
髮皂角水淨洗晒乾燒灰爲末每二十錢以茅草
根車前草煎湯調下荆葉搗取汁酒和服
刺薊一握絞汁酒半盞和服如無生者搗乾者
爲末冷水調三錢

血從毛孔出

名曰肌衄用人中白不拘多少
刮在新瓦上用火逼乾研令極細每服二錢入
麝香少許溫酒調下外以男胎髮燒灰醯之未
効以鬱金末水調鵝翎掃之卽止 九靈山房
集云湖心寺僧履師偶搔腋中亦忽自出血汨
汨如湧泉竟日不止瘡醫治療弗効邀呂元膺
蜘蛛絲他部皆無卽告之曰夫脉血氣之先也今
血妄溢故榮氣暴衰然兩尺尚可按惟當益榮

以瀉其陰火，乃作四神湯，加荆芥穗防風，不間晨夜併進。明日脉漸出，更服十全大補湯一劑，遂痊。

凡九竅出益皆可用。墻頭苔蘚可以塞。車前草汁可以滴。火燒蓮房用。水調。鍋底黑煤可以喫。石榴花片可以塞。生菜菔汁可以滴。火燒龍骨可以吹。水煎茅花可以喫。玉機微義曰：經云：榮者水穀之精也。和調五藏，灑陳於六府，乃能入於脈也。源源而來，生化

於脾，總統於心，藏受於肝，宣布於肺，施泄於腎，灌漑一身。目得之而能視，耳得之而能聽，手得之而能攝，掌得之而能握，足得之而能步，臟得之而能液，腑得之而能氣。是以出入升降濡潤宣通者，由此使然也。注之於脈，少則濶充，則實，常以飲食日滋，故能陽生陰長，取汁變化而赤，爲血也。生化旺，則諸經恃此，而長養衰耗竭，則百脉由。此而空虛，可不謹養哉？故曰：血者，神氣也。得之則存，失之則亡。是知血盛，則形盛；血弱，

則形衰神靜則陰生形役則陽亢陽盛則陰必衰又何言陽旺而生陰血也蓋謂血氣之常陰從乎陽隨氣運行於內苟無陰以羈束則氣何以樹立故其致病也易調治也難以其比陽常虧而又損則陽易亢陰易之之論可以見矣諸經有云陽道實陰道虛陰道常乏陽常有餘陰常不足婦人之生也年至十四經行四十九而經斷可見陰血之難成易虧如此陰氣一傷所變立至妄行於上則吐衄聚涸於外則虛勞

忘反於下則便紅積熱膀胱則癃閉溺血滲透腸間則爲腸風陰虛陽搏則爲崩中濕蒸熱瘳則爲滯下熱極腐化則爲膿血火極似水血色紫黑熱勝於陰發爲瘡瘍濕滯於血則爲痛痒癰瘍皮膚則爲冷癰畜之在上則人喜忘畜之在下則人喜狂隨恐跌仆則瘀惡內凝若分部位身半以上同天之陽身半以下同地之陰此特舉其所顯之證者治血必血屬之藥欲求血藥其四物之謂乎河間謂隨證輔佐謂之六合


湯者詳言之矣予故陳其氣味專司之要不可不察夫川芎血中氣藥也通肝經性味辛散能行血滯於氣也地黃血中血藥也通腎經性味甘寒能生真陰之虛也當歸分三治血中主藥也通肝經性味辛溫全用能活血各歸其經也芍藥陰分藥也通脾經性味酸寒能和血治虛腹痛也若求陰藥之屬必於此而取則焉脾胃論有云若善治者隨證損益摘其一二味之所宜爲主治可也此特論血病而求血藥之屬者

也若氣虛血弱又當如長沙血虛以人參補之陽旺則生陰血也若四物者獨能主血分受傷爲氣不虛也輔佐之屬若桃仁紅花蘇木血竭牡丹皮者血滯所宜蒲黃阿膠地榆百草霜棕櫚灰者血崩所宜乳香沒藥五靈脂凌霄花者血痛所宜從蓉瓊陽牛膝枸杞子益母草夏枯草敗龜板者血虛所宜乳酪血液之物血燥所宜乾薑肉桂血寒所宜生地黃苦參血熱所宜特取其正治太畧耳人能觸類而長可以應無

論此之變矣

診 脫血而脉實者難治 痘若吐血復駛
脉當沉細反浮大而牢者死 吐血衄血脉滑
弱小者生 實大者死 汗出若衄其脉滑小者
生 大躁者死 嘘血胸滿引痛脉小而疾者逆
也 脉至而搏血衄身熱者死 吐血欬逆上
氣其脉數而有熱不得卧者死 諸見血身熱
脉大者難治 難治者邪勝也身涼脈靜者易治
易治者正氣復也 術血者若但頭汗出身無

汗及汗出不至足者死 血溢上行或唾或嘔
或吐皆凶也若變而下行爲惡利者順也血上
行爲逆其治難下行爲順其治易故仲景云畜
血證下血者當自愈若無病之人忽然下利者
其病進也今病血證上行而復下行惡利者其
邪欲去是知吉也



鼻衄出血

三因方云衄者因傷風寒暑濕流傳經絡漏泄於清氣道中而致者皆外所因積怒傷肝積憂傷肺煩思傷脾失志傷腎暴喜傷心皆能動血隨氣上溢致者屬內所因飲酒過多啖炙燙辛熱或墜墮車馬傷損致者皆非內非外因也鼻通於腦血上溢於腦所以從鼻而出宜茅花湯調止衄散時進折二丹仍令其以麻油滴入鼻或以萊菔汁滴久亦可茅花白芍藥對半

尤穩。糯米炒微黃爲末，新水下二錢，亂髮燒灰存性，細研水服方寸匕，併吹鼻中。壹草根搗汁，每一盞入生薑汁半盞，相和，時時細呷。竹蛀屑水飲調。百藥煎半燒半生水酒調服。白芨末新汲水調下，神效。治鼻衄久不止或素有熱而暴作者，諸藥不効。神法以大白紙一張，作十數摺，於冷水內浸濕，置頂中，以熱熨斗熨之，至一重或二重紙乾立止。又方用線紮中指中節，如左鼻孔出血，紮左指；右鼻孔

出血，紮右指。兩鼻孔齊出，則左右俱紮之。血竅不愈，以三稜針於氣街穴出益，更用五味子十粒，麥門冬當歸黃芪生地人參各一錢，水煎空心熱服。六脉細弦而濶，按之空虛其色必白，而天不澤者，脫血也。此大寒證，以辛溫補血，養血，以甘溫甘熱滑潤之劑佐之，卽愈。理中湯小建中湯，六脈俱大，按之空虛，心動面赤，善驚，上熱，乃手少陰心脈也。此氣盛多而亡血，以甘寒鎮陰之劑，大瀉其氣，以墜氣浮，以甘辛溫。

微苦峻補其血。三黃補血湯實熱衄血先服。
硃砂蛤粉次服。木香黃連大便結者下之。用大
黃芒硝甘草生地塘更者。施子黃芩黃連犀角
地黃湯可選用之。有頭風自衄頭風繩發則
衄不止。宜芎附飲間進一字散。下虛上盛而
衄不宜過用涼劑。宜四物湯加參芪麥門五味
磨沉香下養正丹八味地黃丸。傷濕而衄腎
著湯加川芎名除濕湯。伏暑而衄茅花湯調
五苓散。上膈極熱而衄金沸草散去麻黃半

夏加茅花如荆芥數或用黃芩芍藥湯加茅花
一撮虛者茯苓補心湯生料雞蘇散飲酒過
多而衄茅花湯加乾葛雞矩子或理中湯去乾
葛用乾葛加茅花懶而衄不止蘇合香丸丁
丸或以小烏沉湯一錢白湯調下或煎濃紫蘇
湯獨調小烏沉湯或添入黑神散一錢鹽湯調
下亦得仍暮然以水噀其面使驚則血止非特
癲而衄凡五竅出血皆治曾病衄後血因舊
路二月或三四衄又有洗面而衄日以爲常此

卽水不通，借路之意並宜。止齶散、茅花煎、湯調下或四物湯加石菖蒲、阿膠、蒲黃各半錢，煎熟，調火煅石膏末一匙，頭許兼進。養正丹前諸證服藥不効，大齶不止者，養正丹多服，仍佐以蘇子降氣湯，使血隨氣下。齶後頭暈，四物湯十全大補湯有先因，因齶血，齶止而變生，諸證或寒熱間作，或喘急無寐，病狀不一，漸成勞憊，當於虛損諸證詳之。

舌齶

舌上忽出血如線，用槐花炒研末，摻之麥門冬煎湯調妙香散，香薷汁服。升日二匕，髮灰二錢米醋調服，且傅血出處。文蛤散治熱壅舌上出血如泉，五倍子白膠香牡蠣粉等分爲末，每用少許，摻患處，或燒熱鐵烙孔上。

齒齶

血從齒縫中或齒齦中出，謂之齒齶，亦曰牙宣，有風壅有腎虛風壅者，消風散內服，外擦，外用加鹽。

腎虛者以腎主骨牙者骨之餘火乘水虛而上炎眼涼藥而愈甚宜鹽湯下安腎丸間黑錫丹仍用青鹽炒香附黑色爲末擦之亦有胃熱牙疼而齦間出血以至崩落口臭不可近人者內服清胃散甘露飲外用大黃米泔浸全軟生地黃大元
薄切一味旋切各用一二片合定貼所患牙上一
夜卽愈忌說話嘗治二人不歎聲而血見口
中從齒縫舌下來者每用益腎水瀉相火治之
不旬日愈醫旨緒餘云有姪女十歲因毀齒

動搖以苧麻摘之血出不止一日夜積十十盆
用末藥止其處少頃復從口出診其脉皆洪大
有力以三製大黃末二錢枳殼湯少加童便調
下大黑糞數塊其血頓止一男子每齒根出益
盈盈一月一發百藥不効知其人好飲投前劑
一服而安一老嫗患此一發五七日日約升餘
投前劑亦安所下皆有黑糞是知此疾多陽明
熱盛所致緣衝任二脉皆附陽明陽明一經氣
血俱多故一發如潮涌急則治其標故投以益

底抽薪之法應手而愈。要知腎虛血出者其血必點滴而出，齒亦攸攸而疼，必不如此之暴且甚也。

耳衄

耳中出血以龍骨吹入卽止。左關脉弦洪，柴胡清肝散、尺脉或躁或弱，六味地黃丸。

吐血

夫口鼻出血皆係上盛下虛，有升無降，血隨氣上越出，上竅法當順其氣，氣降則血歸經矣。宜蘇子降氣湯加人參、阿膠各一錢，下養正丹，亦有氣虛不能攝血者，其脉必微弱，虛軟精神疲憊，宜獨參湯或人參飲子園參丸。上膈壅熱，吐血脈洪大弦長，按之有力，精神不倦，或覺胸中滿痛，或血是紫黑塊者，用生地黃赤芍當歸牡丹皮荆芥阿膠滑石大黃玄明粉桃仁泥，

之屬從大便導之此釜底抽薪法也 血從下
出者順從上出者逆一應血上溢之證苟非脾
虛泄瀉羸瘦不禁者皆當以大黃醋製和生地
黃汁及桃仁泥牡丹皮之屬引入血分使血下
行以轉逆而爲順此妙法也不知此而日從事
於芩連梔藥之屬輔四物而行之使氣血俱傷
脾胃兩敗今醫治血證百豈有一生者耶 血
既下行之後用薏苡仁多百合麥門冬鮮地骨
皮嗽渴加枇杷葉五味子桑根白皮有痰加貝

母皆氣薄味淡西方兌金之本藥因其衰而減
之自不再發於虛勞證爲尤宜急欲止之用
血餘灰二錢以白湯化阿膠二錢入童便生藕
汁刺薊汁生地黃汁各一杯仍用好墨磨濃黑
頓溫服 胸中煩熱吐血不止口舌乾燥頭疼
石膏散 冒雨著湯鬱於經絡血溢妄行從鼻
則衄衄行清道吐行濁道流入胃胱令人吐血
用腎著湯頭疼加川芎最止浴室中發衄 吐
血在夏天病人口渴面垢頭暉乾嘔煎茅花燈

心麥門冬湯，仍入藕節汁、側扇柏汁、茅根汁、生薑汁少許、生蜜亦少許，調五苓散，血止用生地黃當歸、牡丹皮、赤芍藥、百草霜末，煎服一帖。却用黃芪六一湯，調理怒氣傷肝者，唇青面白當用雞蘇丸，煎四物湯，吞下，并用十四友丸燈心麥門冬湯，吞下，蓋其中有理肝之藥。打撲傷損吐血，先以藕節汁、側扇柏汁、茅根汁、韭汁童便磨墨汁化阿膠止之，却以川芎當歸白芍藥、百合、荆芥穗、阿膠、牡丹皮、紫金藤、大黃滑

石紅花煎湯，調番降香末、白芨末，與服，戴復菴先用蘇合香丸，却以黑神散和小烏沉湯，童便調治。勞心吐血，用蓮心五十粒、糯米五十粒研末，溫酒調服，及天門冬湯，勞力太過吐血，不正蘇子降氣湯，加人參、阿膠，用猪肝煮熟，蘸白芨末食之，吐血久不正，松花散、百花煎，并常服大阿膠丸，未効以伏龍肝二錢米飲調下，速止。或飲酒之後，悶吐之時，血從吐後出，或因咬辛熱而得吐血之證，名曰肺疽，宜大薊散。

古方用紅棗燒存性百藥煎燬等分爲末米飲
調服二錢 飲酒傷胃吐血理中湯加金釣子
乾葛茅花 酒色過度饑飽吐血効方枇杷葉
款冬花北紫苑杏仁鹿茸桑白皮木通大黃爲
末煉蜜丸噙化 内損吐血下血或飲酒太過
勞傷於內其血妄行出如涌泉口鼻皆流須臾
不救卽死用側柏葉蒸焙一兩半荆芥穗燒灰
人參各一兩爲細末入飛羅麪一錢新汲水調
如稀糊不拘時啜服 傷胃吐血因飲食太飽


之後胃中冷不能消化便煩悶強嘔吐使所食
之物與氣共上衝蹶因傷裂胃口吐血色鮮正
赤腹亦絞痛自汗其脈緊而數者爲難治也宜
理中湯加川芎乾葛各半錢或只依理中本方
加川芎扁豆尤好不必乾葛若渴甚用葛丸則
白朮丸 曹氏必用方云吐血須煎薑甘草
作湯與服或四物理中湯亦可如此無不愈者
若服生地黃竹茹藕汁去生便遠三因方云理
中湯能止傷胃吐血以其方最理中院分利陰

陽安定，血脉按_各患人果身受寒氣，口受冷物邪入血分，血得冷而凝，不歸經絡而妄行者，其血必黯黑，其色必白，而天其脉必微遲，其身必清涼，不用薑桂，而用涼血之劑，殆矣。臨病之工宜詳審焉。有時或吐血兩口隨卽無事數日又發，經年累月不愈者，宜黑神散和小烏沉湯常服。吐血人多發渴，名爲血渴，十全大補湯或黃芪人參五味子地黃麥門冬葛根枇杷葉量胃氣虛實用之。吐甚頭暈發爲寒熱者，降氣。

湯合四物湯各半貼加阿膠一錢，若單發熱者，茯苓補心湯。吐血之後有潮熱咳嗽，月經大而數五至以上，不可治也。金匱方心氣不足，吐血衄血瀉心湯主之。大黃二兩黃連黃芩各一兩水三升煮取一升頓服之。此正謂心手少陰經之陰氣不足，本經之陽亢甚，無所輔，肺肝俱受其火，而病作以致陰血妄行，而飛越故用大黃泄去亢甚之火，黃芩救肺，黃連救肝，使之和平，則陰血自復而歸經矣。雲岐子加生地名生血。

犀角地黃湯 又云吐血不止柏葉湯主之柏葉乾薑各二兩艾三把以水五升取馬通汁一升合煮取一升分溫再服凡吐血不已則氣血皆虛虛則生寒是故用柏葉柏葉生而西向乃稟兌金之氣而生可制肝木木主升金主降取其升降相配夫婦之道和則血得以歸藏於肝矣故用是爲君乾薑性熱止而不走用補虛寒之血艾葉之溫能入內而不炎於上可使陰陽之氣反歸於裏以補其寒用一味爲佐馬通者

爲血生於心心屬午於是用午獸之通主降火消停血引領而行爲使仲景治吐血唯此一方可以爲準繩觸類而長之



咳血

卷之三

咳嗽血

或問，咳血止從肺出，他無可言耶？曰：肺不獨咳血，而亦唾血。蓋肺主氣，氣逆爲咳；腎主水，水化液爲唾。腎肺上入肺，循喉嚨，挾舌本，其支者從肺出絡心，注胸中，故二藏相連，病則俱病。於是皆有咳嗽血也。亦有可分別者：涎唾中有少血散漫者，此腎從相火炎上之血也。若血如紅縷，在痰中，而出者，此肺絡受熱傷之血也。其病難已。若咳白血，必死。白血淺紅色，似肉似肺也。

然肝亦唾血。肝藏血。肺藏氣。肝血不藏。亂氣自兩腸逆上。唾而出之。內經有血枯證。先唾血爲氣竭傷肝也。熱壅於肺者易治。不過涼之而已。損於肺者難治。漸以成勞也。熱嗽有血。宜金沸草散。加阿膠一錢。痰盛加瓜蔞仁。貝母。勞嗽有益。宜補肺湯。加阿膠白芨一錢。嗽血而氣急者。補肺湯加阿膠。杏仁。桑白皮各一錢。吞養正丹或三炒丹。間進百花膏亦可用。七傷散大阿膠丸。丹


溪云：欬血乃火升痰盛。身熱多是血虛。痰帶血絲出童便竹瀝止之。經血逆行或血腥吐血。唾血韭汁服立効。韭汁童便合和隔湯頓熟磨鬱金濃汁盪匀服之。其血自消。千金方治一切肺病欬唾。唾膿血用好酥三十斤。煉取凝當中。醍醐服一合日三升即止。薏苡仁。薏苡仁細末煮猪肺白蘸食之。上氣喘息欬嗽。唾血咯血人參細末雞子清調二錢。五更初

服便去枕仰卧忌酸鹹醋醬麪等物及過醉飽。
嗽咯血成勞眼睛疼四肢困倦脚膝無力五
味子黃芪散 脉大發熱喉中痛是氣虛用參
芪蜜灸黃柏荆芥地黃當歸韭汁童便少加薑
汁磨鬱金飲之 咳血久而成勞或勞病成而
嗽血肌肉消瘦四肢倦怠五心煩熱咽乾煩赤
心忡潮熱盜汗減食黃芪鼈甲散人參黃芪散
陰虛火動而嗽血者滋陰保肺湯 二三年
間肺氣上喘咳嗽咯唾膿血滿面生瘡徧身癰

腫人參蛤蚧散 蛤蚧補肺勞虛嗽有功治久
嗽不愈肺間積虛熟久則成瘡故嗽出膿血曉
夕不止喉中氣塞胸膈噎痛用蛤蚧阿膠生犀
角鹿角膠羚羊角各一兩除膠外皆爲屑次入
膠分四服每服用河水三升於銀石器內慢火
煮至半升濾去滓臨卧微溫細絃呷之其效候
服盡再搘都作一服以水三升煎至半升如前
服。傷寒後傷肺欬唾膿血胸脇脹滿上氣羸
瘦麥門冬湯 脉浮大者作虛治用前虛勞條
亥秋日


諸補藥若浮大而上壅甚者雞蘇丸 脉沉滑
有力者當用攻攻中有補 丹溪治台州林德
芳年三十餘得咳而咯血發熱肌體漸瘦衆醫
以補藥調治數年其證愈甚診其六脉皆濇此
因好色而多怒精血耗少又因補塞藥太多榮
衛不行瘀血內積肺氣壅遏不能下降治肝壅
非吐不可精血耗少非補不可唯倒倉法二者
俱備但使吐多於瀉耳兼灸肺俞五次而愈
脈浮數忌炎若誤灸之必唾血唾血而脉浮數

其不可久又可知也 脉經云肺傷者其人勞
倦則欬唾血此爲一項以人其脉細緊浮數皆
唾血此爲躁擾嗔怒得之脉傷氣壅所致此爲一項
以降氣寧神之藥治之 猪心一箇竹刀切開勿令相離
以沉香末一錢重半夏七箇人在縫中紙裹蘸
小便內令濕煨熟取出去半夏只喫猪心此方
嗽血吐血均治 热嗽咽喉痰帶血絲或痰中
多血其色鮮者並宜金沸草散若服涼藥不愈
其色瘀者此非熟證宜杏子湯 咳嗽甚而吐



血者鮮桑白皮一斤米泔浸三宿淨刮上黃皮
剉細入糯米四兩焙乾一處搗爲末每服一二
錢米飲調下久嗽咯血成肺痿及吐白涎胸
膈滿悶不食扁豆散 肺痿吐膿血甘桔加阿
膠紫苑湯 肺痿痰嗽痰中有血線盜汗發熱
熱過卽冷食減劫勞散前薏苡仁一味方 咳
而胸滿心胸甲錯振寒脉數咽乾不渴時出濁
唾腥臭久之吐膿如粥者肺癰也然待吐膿而
後覺爲癰不已晚乎千金云咳嗽膿血其脉數

實者爲肺癰若口中欬卽胸中隱痛脉反滑數
此肺癰也更於本門細查之



咯血

咯血不嗽而咯出，血也。咯與唾少異，唾出於氣上，無所阻。咯出於痰氣鬱於喉嚨之下，滯不得出。咯而乃出，求其所屬之藏，咯、唾同出於腎也。治咯血之方宜用童便青黛以瀉，手足少陽三焦與膽所合之相火，而薑汁爲佐用。四物地黃牛膝輩以補腎陰，安其血也。擗寧生厄言云：咯血爲病，最重且難治者，以肺手太陰之經氣多，血少，又肺者金象爲清肅之藏，金爲火所制。


迫而上行，以爲咯血逆之甚矣。上氣見血，下聞病音，謂喘而咯血且咳嗽也。初得病，且宜白扁豆散去半夏，加貝母，入生地黃，藕節尤佳。及濃磨京墨，調黑神散小烏沉湯各一錢，或新掘生地黃淨洗，生薑少許搗汁，去滓溫進。又有以生薑一片，四面蘸百草霜，含嚥如百草霜已淡，吐出再蘸，如薑已無味，則吐出易之。勞瘵吐咯血，七珍散加阿膠當歸各半錢，惡甜人更加百藥煎半錢，仍調鍾乳粉尤佳。一味鍾乳粉用。

糯米飲調吐血嗽血亦治。因飽脅身傷肺，吐咯血者，白芨枇杷丸或白芨蓮鬚散。治咯血，黃藥子漢防己各一兩爲末，每服一錢，七水一盞，小麥二十粒同煎，食後溫服。白芨一兩，鴉節半兩爲末，每一錢湯調服。新綿灰半錢酒調下。薏苡仁爲末，熟煮猪胰切片蘸藥食後微空時取食之。青黛一錢，杏仁四十粒去皮尖，以黃明蠟煎黃色取出研細，二味同研勻，却以所煎蠟少許溶開，和之捏作錢大餅子，每服

用乾柿一箇中破開入藥一餅合定以濕紙裹慢火煨熟取出糯米粥嚼下

瀉血

痛者爲血淋不痛者爲溺血血淋別見淋門經云悲哀太甚則胞絡絕胞絡絕則陽氣內動發則心下崩數瀉血也又云胞移熱於膀胱則癃溺血是溺血未有不本於熱者陳無擇以爲心腎氣結所致曾不思聖人之言簡意博舉一而可十九者也血雖主於心其四藏孰無血以爲養所尿之血豈拘於心腎氣結者哉若此類推之則五藏凡有損傷妄行之血皆得如心下崩者




滲於胞中五藏之熱，皆得如膀胱之移熱傳於下焦，何以言之？肺金者腎水之母，謂之連藏。況恃之通調水道，下輸膀胱者也。肺有損傷妄行之血，若氣逆上者，既爲嘔血矣。氣不逆者，如之何？不從水逆下降入於胞中耶？其熱亦直抵腎與膀胱可知也。脾土者勝水之賊邪？也。水精不布，則壅成濕熱，濕熱必陷下傷於水道，腎與膀胱俱受其害。害則陰絡傷，傷則血散入胞中矣。肝屬太陽，主生化，主疎泄，主納血。腎屬陰血，閉藏。

而不固，必滲入胞中。正與內經所謂傷肝血枯症時，時前後血者類也。大抵洩血、淋血、便血三者，雖以前後陰所出之竅血，有不同然。於受病則一也。故治分標本，亦一也。其散血止血之藥無越於數十品之間。惟引導佐使，各走其鄉者少異耳。先與生料五苓散，和四物湯。若服藥不效，其人素病於色者，此屬虛證，宜五苓散和膠艾湯，吞鹿茸丸，或八味地黃丸，或鹿角膠丸，或辰砂妙香散，和五苓散，吞二項丸子。若小便



自清後有數點血者。五苓散加赤芍藥一錢，亦有如砂石而色紅，却無石淋之痛，亦屬虛證，宜五苓散和膠艾湯，或五苓散和辰砂妙香散，吞鹿茸丸八味丸，鹿角膠丸，乾膠炙搗末酒和服，鹿角膠尤妙，每服一二兩，髮灰二錢，茅根車前草煎湯調下，當歸四兩酒三升煮取一升，頓服，鏡面草自然汁加生蜜一匙，服之以八正散加麥門冬，葱煎服，小便澀痛藥內調海金砂末，夏枯草燒灰存性爲末，米飲或涼

水調下。車前草自然汁數合空心服。實者可以調胃承氣湯加當歸下之。脉經云：尺脉滑氣血實，婦人經脈不利，男子尿血宜服朴硝煎大黃湯下，去經血，針關元瀉之，咳而且溲血脫形其脉小勁是逆也，咳溲血形肉脫脉搏是逆也。



自病後數日而色黑者正本散加赤芍
五分數，取其火氣之多，故加赤芍也。
遂兩頭相對，畏寒甚，身熱亦甚，此是火氣
熱而且與血相對，其神小體易過也。如要治
此大黃散不夫醫也。於關元穴，或用大
柴胡與實心大歸和不休，裏半身血宜加桂枝
甘草，而外半身血宜加葛根，小柴胡，桂枝
水臨軍車前草，白朮，大連子，空心菜，白朮，
實心。

下血


腸風

癥毒

血之在身有陰有陽，陽者順氣而行，循流脈中，
調和五藏，灑陳六府，如是者謂之榮血也。陰者，
居於絡脈，專守藏府，滋養神氣，濡潤筋骨，若其
藏感，内外之邪傷，則或循經之陽血至其傷處，
爲邪氣所阻，漏泄經外，或居絡之陰血，因著留，
之邪僻裂而出，則皆滲入腸胃而泄矣。世俗每
見下血，率以腸風名之，不知風乃未淫中之一
耳，或風有從腸胃經脉而入客者，或肝經風木，

之邪內乘於腸胃者，則可謂之腸風。若其他不因風邪而腸胃受火熱，下淫與寒燥濕佛鬱其氣及飲食用力過度傷其陰絡之血者，亦謂之腸風。可乎？許學士謂下滿血色鮮者，腸風也。血濁而色黯者，藏毒也。肛門射如血線者，脉痔也。然腸風挾濕者亦下如荳汁及紫黑瘀血不必盡鮮，正當以久暫爲別耳。然要之皆俗名也。世醫編書者或以瀉血爲腸風，或分瀉血與腸風藏毒爲二門，皆非也。先血而後便，此近血也。

由手陽明隨經下行，滲入大腸，傳於廣腸而下者，也赤小荳當歸散主之。先便而後血，此遠血也。由足陽明隨經入胃，淫溢而下者，也黃土湯主之。下血腹中不痛謂之濕毒，下血血色不鮮，或紫黑，或如荳汁，黃連湯主之。下血腹中痛，謂之熱毒，下血血色鮮，芍藥黃連湯主之。東垣治宿有腸血症，因五月大熱，喫杏，腸澼下血遠，三四尺散漫，如篩，腰沉沉然，腹中不痛，血色紫黑，是陽明少陽經血證，升麻補胃湯。



太陰陽明腹痛大便常溏泄若不泄卽秘而難見在後傳作濕熱毒下鮮紅血腹中微痛腸下急縮脉緩而洪弦中指下得之按之空虛和中益胃湯 溫熱 腸澼下血另作一派其血潤出有力而遠射四散如篩下腹中大作痛乃陽明氣衝熱毒所作也升陽除濕和血湯 溫寒 腸澼下血紅或深紫黑色腹中痛腹皮惡寒右三部脉中指下得之俱弦按之無力關脉甚緊肌表陽明分涼腹皮熱而喜熱物熨之內寒明

矣益智和中湯

扶寒

夫腸澼者爲水穀與血

另作一派如瀉桶漏出也夏濕熱太甚正當客氣盛而主氣弱故腸澼之病甚也以涼血地黃湯主之黃柏知母炒各一錢青皮炒槐子炒當歸熟地各五分水一盞煎七分溫服如小便澀脣下悶或大便前後重調木香檳榔細末各半錢稍熱於食前空心服如裏急後重又不去者當下之如腹中動搖有水聲而小便不調者停飲也診是何藏以去水飲藥瀉之假令脉洪大

用瀉火利小便之類是也。如胃虛不能食而大渴不止，不可用淡滲之藥止之。乃胃中元氣少故也。與七味白朮散補之，如發熱惡熱煩躁大渴不止，肌熱不欲近衣。其脈洪大按之無力或無目痛鼻乾者，非白虎湯證也。此血虛發躁，當以黃芪一兩當歸二錢，㕮咀水煎服。如大使秘塞或裏急後重數至，固而不能便，或少有白膿，或少有血，慎勿利之。利之則必致病重及鬱結不通。以升陽除濕防風湯升其陽，則陰氣自降。

矣。素問云：結喎者，便血一升再結二升三結三升。駱龍吉云：結陰之病，陰氣內結，不得外行，血無所稟，滲入腸間，故便血也。其脈虛濶者是也。因血結不行，故下。古方有結陰丹，羅謙甫治因強飲酸酒，得腹痛，次傳泄瀉，十餘日便後見血，或紅或紫，腸鳴腹痛，服涼藥如故，仍不欲食，食則嘔酸，心下痞，惡冷物，口乾煩躁，不得安卧，其脉弦細，而微遲，手足稍冷，以平胃地榆湯溫中散寒，除濕和胃，數服病減，大半又灸中脘二

七壯引胃氣上升，次灸氣海。百壯生發元氣，灸則強食。生肉又以還少丹服之。至春再灸三里，二七壯溫脾壯胃。生發元氣，次服芳香之劑。慎言語節飲食而愈。入物湯去生地黃甘草，加官桂，名胃風湯。治風冷乘虛入客，腸胃水穀不化，泄瀉注下及腸胃濕毒下如荳汙，或下瘀血，日夜無度。蓋亦結陰之類也。爲陰氣內結，故去甘寒而加辛熱。結者散之也。潔古云：如下血，防風爲上使，黃連爲中使，地榆爲下使。若血

瘀色紫者，陳血也。加熟地黃。若血鮮色紅者，新血也。加生地黃。若寒熱者，加柴胡。若肌熱者，加地骨皮。此證乃甲欺戊也。風在胃口，中焦濕泄不止，濕既去盡而反生燥，庚欺甲也。本無金氣以甲勝戊，虧庚爲母，復讐也。故經曰，亢則害，承乃制。是反制勝已之化也。若脉洪實痛甚者，加酒浸大黃。戴復菴以色鮮爲熱色瘀爲寒，熱血連蒲散寒血理物湯。血色鮮紅者多，因內蘊熱毒，毒氣入腸胃，或因飲酒過多及。

啖糟臢炙燙引血入大腸故瀉鮮血宜連蒲散
吞黃連阿膠丸及香連丸或一味黃連煎飲大
瀉不止者四物湯加黃連槐花仍取血見愁草
少許生薑搗取汁和米飲服於血見愁草中加
入側柏葉與生薑同搗汁尤好有暑毒入腸
胃下血者一味黃連煎湯飲 腸風下血以香
附末加百草霜米飲調服加入麝香少許其應
尤捷冷氣入客腸胃下瘀血理中湯不妨宜
黑神散米飲調下或用膠艾湯加米湯煎吞震

靈丹 擗撲內損惡血入腸胃下出濁物如瘀
血者宜黑神散加老黃芩爲末酒調 酒積下
血不止糞後見用神麩一兩半白酒藥二丸同
爲末清水調捏作餅子慢火上灸黃爲細末每
服二錢白湯調下亦治泄瀉 海藏治梅師太
醉醒發渴飲水及水茶後病便鮮紅先與吳茱
萸丸翌日又與平胃五苓各半散三大服血止
復自利又與神應丸四服自利乃止或問何不用
黃連之類以解毒曰若用寒藥其疾大變難

治寒飲內傷復用寒藥非其治也況血爲寒所凝入大腸間而便下血溫之乃行所以得熱則自止。唐生病因飲酪水及食生物下利紫黑血十餘行脾胃受寒濕毒與六神平胃散半兩加白朮三錢以利腰臍間血一服愈。櫻寧生危言云腸風則足陽明積熱久而爲風風有以動之也藏毒則足大陰積熱久而生濕從而下流也風則陽受之濕則陰受之戴氏要訣云藏毒者蘊積毒氣久而始見腸風者邪氣外久隨

感隨見三因方五痔藏毒腸風之辯甚詳藏毒腸風之血出於腸藏間五痔之血出於肛門蝕孔處治各不同無擇翁烏連湯治痔瘡外無形能已此由脈竅中而所下血一線如箭或點滴不能已詳見痔門腸風藏毒不拘糞前糞後並宜米飲湯調枳殼散下酒煮黃連丸或枳殼散下烏梅丸此乃因登廁糞中有血却與瀉血不同或用小烏沉湯和黑神散米飲調下血色清鮮者以瓦松燒灰研細米飲調服宜減桂五苓散加茅花半錢吞荆梅花丸仍以側柏葉同薑


搗爛冷水解下侵些米飲佳如血色淡濁者胃
風湯吞蒜連丸或烏荆丸或棕灰散仍以米飲
調香附末或三灰散 腸風腹中有痛下清血
先當解散腸胃風邪甚者肛門腫疼敗毒散加
槐角荆芥或槐花湯枳殼散 蔓毒腹內畧疼
濁血兼花紅膿併下或肛門腫脹或大腸頭宋
出大便難通先以拔毒疎利之劑追出惡血膿
水然後以內托并涼血祛風量用人虛兼以參
芪芩木助養胃氣諸般腸風臘毒並宜生銀

杏四十九箇去殼膜爛研入百藥煎末丸如彈
子大每兩三丸空心細嚼米飲下 下血久而
色痿黃漸成虛憊下元衰弱宜黃芪四君子湯
下斷紅丸或十全大補湯或黃芪飲 中蠶藏
府敗壞下血如雞肝如爛肉其證唾水沉心腹
絞痛者是也治之方馬蘭根末水服方寸七隨
吐則出 白蘿荷葉密安病人席下勿令病人
知覺自呼蠶主姓名 蚯蚓十四枚以苦酒三
升漬之服其汁 蜈毛燒末水服方寸七 吐
下血

苦瓠一枚水二升煮取一升服吐或用苦酒一升煮瓠令消服之

診 腎脉小搏沉爲腸澼下血血溫身熱者死淫而奪精身熱色天然及酒後下血血篤重是逆也 心肝澼亦下血二藏同病者可治其脈小沉澀爲腸澼其身熱者死熱見七日死身熱則死身寒則生 脉懸絕則死滑大則生脈沉小留連者生數疾且大有熱者死 腹脹便血脉大時絕是逆也如此者不及一時而

死矣 胃移熱於脾傳爲虛腸澼死不治 脾脉外鼓沉爲腸澼久自己 肝脉小緩爲腸澼易治



苦瓠 故水 治服之


醫 腎於少陽爲腸澼子血而渴者亦可
渴而身精身熱色天然及酒後子血爲
是逆也 心肝脾赤不血上城同若石
麻小沉澁爲腸澼其身熱者是熱病一月
暴瘧則死身寒則生 暴瘧則死身熱
利根熟火為顯脉人自知且預知小變其
變 胃迷殊外門脉流或相半不半

畜血

夫人飲食起居失其宜皆能使血瘀滯不行
故百病由汚血者多而醫書分門類症有七氣
而無畜血予故增著之 猪血畜血上焦 心
下手不可近畜血中焦 脘腹小腫大痛畜血
下焦 三焦畜血脉俱在左手中 猪血上焦
活人犀角地黃湯 猪血中焦仲景桃仁承氣
湯 猪血下焦仲景抵當湯韓氏地黃湯生漆
湯 海藏云畜血可用仲景抵當湯丸恐庸醫

不知藥性用之太過有不止損血之候老弱虛人之禁也故立生地黃湯蟲蟲水蛭大黃桃仁內加生地黃乾漆生薑藍葉之輩也又云生漆湯一方亦恐抵當湯丸下之太過也是以知乾漆爲破血之劑比之抵當湯則輕用之通則重用之破積治食^後則重也食藥內乾漆硝砂非氣實不可用也如牙齒等餌數年不愈當作陽明畜血治之以桃仁承氣湯細末煉蜜丸^蜜子大服之好飲者多有此疾屢服有效若登

高墜下重物撞打箭鎛刃傷心腹胸中停積鬱血不散以上中下三焦部分分之以易老犀角地黃湯桃仁承氣湯抵當湯丸之類下之亦有以小便同酒煎治之者更有內加生地黃當歸煎服者亦有加大黃者又法虛人不禁下之者以四物湯加穿山甲煎服妙亦有用花藥石散以童子小便煎服或酒調下此藥與寒藥正分陰陽不可不辨也



Kitasato Memorial Medical Library