



女科證治準繩

四之二

移
科
51
n 44
8

Kirasato Memorial Medical Library

F 11
シ-131



490.9
Jo-3
11
No. 3176
1R
2144

惡阻

胎動不安

胎上逼心

妊娠經來

漏胎下血

胎漏黃汗下

跌撲傷胎毒

系傷胎

心痛

心腹痛

腹痛 小腹痛

腰腹及背痛

心腹脹滿

惡阻 痰逆不食

惡阻謂嘔吐惡心頭眩惡食擇食是也 千金凡婦人虛羸血氣不足腎氣又弱或當風飲冷太過心下有痰水者欲有胎而喜病阻所謂欲有胎者其人月水尚來顏色肌膚如常但苦沉重憤悶不欲食飲又不知其患所在脈理順時平和則是欲有娠也如此經一月日後便覺不通則結胎也阻病者患心中憤憤頭重眼眩四肢沉重懈惰不欲執作惡聞食氣欲噉鹹酸果實多卧少起世謂惡食其至三四月日已上皆大劇吐逆不能自勝舉也此由經血既閉水漬

合前惡阻

大十日

於藏氣不宣通故心煩憤悶氣逆而嘔吐也血脈不通經絡不澁則四肢沉重挾風則頭目眩也覺如此候者便宜服半夏茯苓湯數劑後將茯苓丸痰水消除便欲食也既得食力體強氣壯力足養胎母便健矣 大全妊娠稟受怯弱便有阻病其狀顏色如故脉息和順但覺肢體沉重頭目昏眩擇食惡聞食氣好食鹹酸甚者或作寒熱心中憤悶嘔吐痰水恍惚不能支持巢氏謂之惡阻但證有輕重耳輕者不服藥亦不妨重者須以藥療之千金方以半夏茯苓湯茯苓丸專治阻病然此一藥比來少有服者以半

夏有動胎之性蓋胎初結慮其易散此不可不詳也張仲景傷寒論有用黃龍湯者小柴胡湯中去半夏是也此蓋為妊娠而設焉王子亨則有白朮散局方則人參丁香散楊振則有人參橘皮湯齊士明則有醒脾飲皆不用半夏用之多効 李茂翁云若左脉弱而嘔服諸藥不止者當服理血歸原藥則愈經云無陰則嘔是也 薛前證若中脘停痰用二陳湯加枳殼若飲食停滯用六君子加枳殼若脾胃虛弱用異功散若胃氣不足用人參橘皮湯兼氣惱加枳殼胸脇痞悶再加蘇梗脇痛再加柴胡若飲食少思用

六君子加紫蘇枳殼頭暈體倦用六君子湯若脾胃
 虛弱嘔吐不食用半夏茯苓湯蓋半夏乃健脾胃化
 痰滯之主藥也脾胃虛弱而嘔吐或痰涎壅滯飲食
 少思胎不安必用茯苓半夏湯倍加白朮然半夏白
 朮茯苓陳皮砂仁善能安胎氣健脾胃予嘗用之驗
 矣 痰逆不食證因食停滯用半夏茯苓湯加枳殼
 兼氣惱更加柴胡因痰壅滯用半夏茯苓湯加白朮
 因風寒外傷用參蘇飲飲食腹脹用香砂六君子湯
 寒熱嘔吐人參養胃湯 一妊娠嘔吐惡食體倦嗜
 臥此胃氣虛而惡阻也用人參橘皮湯 劑漸愈又

用六君子加紫蘇一劑而安 一妊娠吞酸惡心時欲
 作嘔此因脾胃虛而飲食停滯用六君子加枳殼香附
 治之而愈 一妊婦停食腹滿嘔吐吞酸作瀉不食
 余以為飲食停滯兼肝木傷脾土用六君子湯以健
 脾胃加蒼朮厚朴以消飲食吳茱萸所製黃連以清
 肝火諸證悉愈又以六君子加砂仁調理而脾土乃安
 一妊婦嘔吐脇脹或寒熱往來面色青黃此木旺
 而尅脾土用六君子加柴胡枳殼而安 一妊
 婦嘔吐酸水胸滿不食此脾土虛而肝木所侮用六
 君子加芍藥而愈 一妊婦胸腹膨脹吐痰不食此

脾胃虛而飲食為痰用半夏茯苓湯漸愈又用六君子加枳殼蘇梗桔梗而飲食如常後因恚怒脇脹不食吐痰惡心用半夏茯苓湯加柴胡山梔而愈汪石山治一婦形質瘦小面色近紫產後年餘經水不通首夏忽病嘔吐手指麻痺拳不能伸展聲音啞小歲不出聲醫皆視為風病危之汪診脈皆細微近滑曰此妊娠惡阻病也眾謂經水不通安有妊娠汪曰天下之事有常有變此乃事之變也脈雖細微似近于滑又尺按不絕乃妊娠也遂以四君子加二陳治之諸證俱減尚畏粥湯惟食乾糕香燥之物而有生

意 給事游讓溪夫人病新愈月餘經事不行嘔噦眩暈飲食艱進醫以為二陽之病發心脾女子不月法在不治江瓘診之尺脈雖小按之滑而不絕此妊而惡阻非凶候也六君加砂仁數服而安後產一女金匱婦人得平脈陰脈小弱其人渴不能食無寒熱名妊娠桂枝湯主之於法六七日當有此證設有醫治逆者却一月加吐下者則絕之婁全善曰絕之者謂絕止醫治候其自安也予嘗治一婦阻病吐愈治愈逆因思仲景絕之之旨遂停藥月餘自安真大哉聖賢之言也

命門應田 卷中 五

萬全方云凡妊娠惡食者以所思食任意食之必愈
仲景云妊娠嘔吐不止乾薑人參半夏丸主之
乾薑人參半夏丸

乾薑

人參各壹兩

半夏湯洗去

右三味末之以生薑汁糊為丸如梧子大每服拾
丸日三服

半夏茯苓湯 治妊娠惡阻嘔吐心煩頭目眩暈惡
聞食氣好食酸鹹多卧少起百節煩疼羸瘦有痰
胎孕不牢

半夏洗壹兩

赤茯苓

熟地黃各半兩

橘紅

旋復花金方無旋復

人參

芍藥

川芎

桔梗

甘草各半兩

右咬咀每服伍錢薑朮片水煎空心服並服茯苓
丸 若有客熱煩渴口瘡去橘紅細辛加前胡知
母朱錢半 若腹冷下痢去地黃加炒桂心半兩
若胃中虛熱大便秘小便赤澀加大黃朱錢半
去地黃加黃芩貳錢每分
茯苓丸 治妊娠阻病心中煩悶吐痰眩暈先服半
夏茯苓湯兩劑後服此藥

赤茯苓

人參

桂心

乾薑

半夏

橘皮

白朮

葛根

甘草

枳殼

枳殼

右為細末

煉蜜丸

如桐子

日三服

一方加麥門冬

肘後加五味子

療妊娠心胸支滿痰逆不思飲食

赤茯苓

前胡

白朮

紫蘇葉

半夏

麥門冬

人參

大腹皮

右為粗末每服四錢水壹盞薑五片煎至半米分去

滓溫服 一方無腹皮人參有大腹子檳榔

療妊娠心膈氣滯嘔吐不下飲水心神虛煩四肢少

力

枇杷葉

半夏

麥門冬

人參

甘草

訶子肉

藿香

赤茯苓

枳殼

陳皮

右咬咀每服叁錢水壹盞薑叁片棗壹枚煎至半

分去滓溫服

一方無訶子及棗

集驗療婦人妊娠惡阻嘔吐不下食

青竹茹

橘皮

生薑

茯苓各肆兩

半夏伍兩

右細切以水陸升煮取貳升半去滓分三服不差
煩服忌羊肉錫鮓等物

旋復半夏湯 治妊娠惡阻吐逆酸水惡聞食氣多

臥少起

旋復花去枝

川芎

細辛去土

人參

甘草各

當歸去蘆

半夏湯泡

赤茯苓去皮

乾生薑

陳皮去白各壹錢伍分

右作一服水貳鍾薑五片煎至壹鍾不拘時服

旋復花湯 治妊娠六七月胎不安嘔吐

旋復花伍分

厚朴

白朮

枳殼

黃芩

茯苓各壹錢伍分

半夏

芍藥

生薑各壹錢

右作一服水貳鍾煎至壹鍾食前服

右諸方並用半夏蓋取其辛以散結氣瀉逆氣故
嘔惡自止非專為痰設也婁全善曰大千方論半
夏動胎而不用仲景方乃用之予治妊娠阻病累

治前惡阻

丁香
乾
例

用半夏未嘗動胎也經云有故無殞是也

白木散 治惡阻吐清水甚者害十餘日水漿不入

白木 壹兩
人參 半兩
丁香 貳錢

甘草 壹錢

右為細末每服貳錢水壹盞薑伍片煎至柒分溫服

服

人參丁香散 治妊娠惡阻胃寒嘔逆翻胃吐食及

心腹刺痛

人參 壹兩
丁香 壹兩
藿香葉 各貳錢半

右為散每服參錢水壹盞煎柒分去滓溫服無符

又方

人參 丁香 柿蒂 各貳兩

甘艸 良薑 各半兩

右為細末每服貳錢熱湯點下無時

醒脾飲子 治妊婦阻病嘔逆不食甚者中滿口中

無味或作寒熱此出王氏博濟方

草豆蔻 以紙裹灰火中炒令紙乾取出去灰用 厚朴 薑製各半兩

乾薑 壹兩
甘艸 壹兩貳錢

右為細末每服貳錢水壹盞薑伍片煎至柒分溫服

片煎至捌分去滓呷服病輕者只一兩服便能食

舊有橘紅貳兩治寒熱瘧痢不食後入去橘皮以
乾生薑代乾薑治老人氣虛大便秘少津液引飲
有奇効產科醫官齊士明依舊用乾薑去橘皮亦
名醒脾飲子治阻病極神驗
右諸方與前茯苓丸並用了香乾薑惟中寒脈遲
者宜之

人參橘皮湯 治阻病嘔吐痰水

- 人參
- 橘皮
- 白朮
- 厚朴 製
- 麥門冬 去心各壹兩
- 甘草 叁錢
- 白茯苓 各伍錢

為粗末每肆錢加淡竹茹彈子大薑叁片水同煎

治妊娠嘔吐不食兼吐痰水

- 生薑根 柒分
- 橘紅 肆分
- 生薑 陸分

- 檳榔 貳分
- 枇杷葉 叁分

右切水貳盞煎柒分空心熱服

治妊娠惡食心中煩憤熱悶嘔吐

- 青竹茹
- 麥門冬 各叁兩
- 前胡 貳兩

- 橘皮 壹兩
- 蘆根 壹握
- 如體熱四肢煩熱者加地骨皮壹握

右切細以水壹大升煮半升去渣分兩服食前

右諸方內用門冬竹茹蘆根皆氣涼而性和有熱

無寒者通用之平劑也

治妊娠惡食古今錄驗方

人參肆兩

厚朴

生薑

枳殼

甘艸各貳兩

水陸升煮取參升分三服

理血歸原散

治妊娠惡阻嘔吐不止頭痛全不入食服諸藥無効者用此藥理血歸原則愈

人參

甘艸

川芎

當歸

芍藥

丁香各半兩

白茯苓

白朮

陳皮各壹兩伍錢

桔梗炒

枳殼去瓢炒各貳錢半

半夏湯洗米次切炒黃壹兩

右以咀每服參錢生薑伍片棗壹枚水同煎

安胎飲 治懷胎三月四月至九个月日嘔吐痰水

心中憤悶頭重目眩惡聞食氣或胎動不安腰腹

疼痛或時下血及妊娠一切疾病並皆治之

甘草

茯苓

當歸

熟地黃

川芎

白朮

黃芪

白芍藥

半夏湯泡米次切炒

阿膠切粉

地榆各等分

右以咀每服參錢生薑肆片水煎溫服無時候

一方無半夏地榆有人參桑寄生 一方無芪朮

半夏地榆有艾葉只是膠艾湯加白茯苓

小地黃丸 治妊娠惡心嘔吐清水腹疼不食

人參去蘆 乾薑炮各一分

右為細末以生地黄汁和為丸如桐子大每服五拾丸食前米飲送下

右方並理血之劑李茂翁所謂左脉弱而嘔服諸藥不止者服理血歸原藥則愈即此類是也

氣

保生湯 治婦人經候不行身無病而似病脉滑大而六脉俱勻乃是孕婦之脉也精神如故惡聞食

臭或但嗜一物或大吐或時吐清水此名惡阻切勿作寒病治之宜服此藥如覺惡心嘔吐加丁香生薑煎服溫隱居方

人參 甘草各貳錢半 白朮

香附子 烏藥 橘紅各半兩

右以咀每服參天錢水壹盞半薑伍片煎至柒分去滓溫服無時或作末子調服

白朮散 治妊娠胎氣不和飲食少進

白朮炒 紫蘇各壹錢 人參貳錢
青皮去白 訶子肉 川芎各捌分

胎前 婦科 四

甘草 多半錢

右作一服水貳鍾薑參片煎至壹鍾不拘時服

二香散 治妊娠胎動不安氣不升降飲食不美嘔

吐酸水起坐覺重

香附子 壹兩

藿香葉

甘草 各叁錢

右為細末每服貳錢不拘時沸湯調下

補遺予嘗治妊婦惡阻嘔吐不食頭暈不敢行步以

苦抽皮濃煎湯飲數盞而愈吐甚者加薑汁

又方 縮砂仁末每貳錢薑湯調下或米飲調

右方並理氣之劑氣虛者首三方為宜氣不順者

有肝火

者第三方為宜

一婦人孕三月吐痰水并飲食每自寅卯時作

時覺少腹有氣衝上然後膈滿而吐面赤微躁頭

眩卧不起牀四肢疼微渴此肝火挾衝脈之火衝

上也一日甚一日輕脈和右寸洪大百藥不効將

二月子男病偶用沉香磨水化抱龍丸一服膈寬

氣不上衝二三服吐止眩減食進而安 又應氏

婦嘈雜吐食脈壅心下滿塞氣攻背兩肘皆痛要

人不住手以熱物摩熨得吐稍疎脈洪大處此方

黃連 壹錢

黃芩 貳錢半 各炒

白朮

半夏 各貳錢

陳皮

枳殼 炒

蒼朮 各壹錢

甘州炙

當歸

香附

茯苓 壹錢半

縮砂 各伍分

山梔

人參

生薑 柴片

服二貼後嘈雜吐止心滿塞退但於夜間背肘痛用摩熨遂與抱龍丸化服其疾如失

丹一婦人年近三十懷孕兩月病嘔吐頭眩自覺不可禁持以人參白朮川芎陳皮茯苓等藥服五七日愈覺沉重召予脉之兩手弦左為甚而且弱予曰此是惡阻病必怒氣所激問之果然肝氣既逆又挾胎

氣參朮之補大非所宜教以時用茯苓湯下抑青丸二十四粒五貼自覺稍安診其脉略有數狀自言口乾苦穉食粥則口酸予意其為膈間滯氣未盡行教全以川芎陳皮山梔茯苓生薑煎湯下抑青丸十五粒十餘貼餘證皆平但食及常時之半食後覺口酸不食覺曷飢予謂肝熱未平則以白湯下抑青丸二十粒二十日而安予又脉之見其兩手脉雖和左而左手弱甚此胎必墮此時肝氣既平參朮可用矣遂用始初參朮等藥補之預防墮胎以後之虛服之一月胎自墮却得平穩無事抑青丸一味黃連為丸是

也

胎動不安者由衝任經虛受胎不實也亦有飲酒房室過度損動不安者有候擊觸而胎動者有喜怒氣宇不舒傷於心肝觸動血脉者有信醫宜服煖補反為藥所害者有因母病而胎動者但治母病其胎自安有胎不堅固動及母疾但當安胎其母自愈當以母形色察之若面赤舌青兒死母活面青舌赤口中沫出母死子活若唇口青兩邊沫出者子母俱死薛前證胎氣鬱滯者用紫蘇飲脾氣虛弱者六君子湯加蘇枳鬱結傷脾者歸脾湯加柴梔鬱

胎動不安

大全妊娠胎動不安者由衝任經虛受胎不實也亦有飲酒房室過度損動不安者有候擊觸而胎動者有喜怒氣宇不舒傷於心肝觸動血脉者有信醫宜服煖補反為藥所害者有因母病而胎動者但治母病其胎自安有胎不堅固動及母疾但當安胎其母自愈當以母形色察之若面赤舌青兒死母活面青舌赤口中沫出母死子活若唇口青兩邊沫出者子母俱死薛前證胎氣鬱滯者用紫蘇飲脾氣虛弱者六君子湯加蘇枳鬱結傷脾者歸脾湯加柴梔鬱

常服

怒傷肝脾者四七湯加芎歸怒動肝火者加味小柴胡湯若胎已死急用平胃散加枳硝腐化之

地黃

川芎

歸身尾

人參

陳皮各壹錢

白朮壹錢半

黃蘗少許

桑上辛食藤圓者米葉糯米拾肆粒

甘草叁錢

白芍藥

黃芩各五分

右咬咀水煎服

金匱婦人妊娠宜常服當歸散主之

當歸散方

當歸

黃芩

芍藥

芎藭各肆兩

白朮半斤

右五味杵為散酒飲服方寸匕日再服妊娠常服

即易產胎無苦疾產後百病悉主之

妊娠養胎白朮散主之

白朮散方

白朮

芎藭各壹兩

蜀椒米錢半去汗

牡蠣半兩

右四味水為散酒服壹錢七日三服夜一服但苦痛加芍藥心下毒痛倍加芎藭心煩痛吐不能飲

胎前胎動不安

或動
或崩
者安
之

食加細辛壹兩半夏大者貳拾枚服之後更以醋漿水服之若嘔以醋漿水服之復不解者小麥汁飲之已後渴者大麥粥服之病雖愈服之勿置集驗方療妊娠二三月上至八九月胎動不安腹痛已有所見方

艾葉

阿膠

當歸

川芎各叁兩

甘草壹兩

右細切以水捌升煮取叁升去滓內膠令烊分三服且三千金文仲備急同

四物湯加熟艾阿膠茯苓治一切胎動不安

安胎當歸湯 治妊娠五月舉動驚愕胎動不安下

在小腹痛引腰脇小便疼下血見前逐月養胎

阿膠散 治妊娠或因頓仆胎動不安腰痛腹滿或

有所下或胎上搶心

熟地黃貳兩

白芍藥

艾葉

當歸

甘草

阿膠

黃芪各壹兩

一方有川芎

右咬咀每服半兩薑叁片棗壹枚水同煎又方 治妊娠胎動不安心神虛煩腹內痛

阿膠并碎炒

人參

川芎已上各壹兩

胎前 女科

白茯苓

麥門冬 去心

柴胡 去苗已上 各半錢半

甘草 炙

當歸 剉炒

黃芩 各半兩

右件為末每服肆錢以水壹中盞生薑半分棗叁枚同煎陸分去滓熱服

立効散 治婦人胎動不安如重物所墜冷如冰

川芎

當歸 各等分

右為麤末秤叁錢水煎食前溫服

產寶治妊娠無故胎動不安腹內絞痛煩悶

當歸

桑寄生 各壹兩

川芎 半錢

鼓 捌合

阿膠 伍錢

蔥 拾肆莖

右以水貳升煮取捌合下膠烱溫分貳服空心服一方無鼓用銀器煎集驗無寄生鼓有續斷柴錢半銀多少先煎後入藥

養生必用治胎動方 救急療胎動去血腰痛

阿膠

川芎

當歸

青竹茹 各貳錢

右以水拾盞內銀壹斤煮至伍錢去銀入上件藥三味煮至貳錢半去滓入膠再煎膠烱分溫三服空心自早至暮盡未効再作

寄生氣 治胎氣常不安及五箇月已後胎不安

胎前胎動不安

婦科 女科四

桑寄生

糯米粉 半兩

秦艽

阿膠 各半

右以新汲水參升先下寄生秦艽貳味煮至貳升去滓次入阿膠糯米再者約壹升止分三服空志食前日午服之忌酒醋三五日妊婦胎氣至五月已後常不安者服之必効頃見妊婦好飲酒食鹹酸五辛胎必動不可不知

黃耆湯 治胎動不安腹痛下黃汁
糯米 帶合
黃耆
川芎 各壹
右細剉水貳大盞煎至壹盞參分溫服

順氣飲子 產前服之安胎

紫蘇葉 木香 炮
草豆蔻 茯苓 各壹
甘草 半兩

大腹子 壹兩如氣弱者不用

右吹咀每服參錢水壹盞麥根參子糯米少許煎至梨分去滓溫服

安胎寄生湯 仲療血流下方

桑寄生 白木 各壹兩 貳錢半
茯苓 壹兩
甘草 貳兩半

右切以水伍升煮取貳升半分三服若人壯者可

胎前 卷之四 七十八
加芍藥貳兩足米貳升若胎不安腹痛端然有所
見加乾薑壹兩即安忌海藻菘菜酢物桃李雀肉
等

秦朮湯指治胎動不安

秦朮

阿膠炒

艾葉

右等分爲麤末每服伍錢水貳盞糯米百粒煎至
壹盞去滓溫服

小品止痛湯 療妊娠重下痛引腰背安胎

當歸

阿膠炙

乾地黄

黃連

芍藥各壹兩

雞子壹枚

秫米壹升

右柒味以水柒升攪雞子令相得煮秫米令如蟹
且沸去滓內諸藥煮取叁升分四服忌蕪荑經心
錄同

黃芩湯 治婦人胎孕不安

黃芩

白朮各半兩

當歸貳錢

右作一服水貳鍾煎至壹鍾不拘時服

釣藤湯 治妊娠八九月胎動不安心腹疔痛面自

青冷汗出氣欲絕此由勞動用力傷胎官宜急治

之

胎前 胎動不安 卷之四

釣藤鈎

當歸

茯神

人參

各壹兩

苦梗

壹兩半

桑寄生

半兩

右為粗末每服伍大錢水貳盞煎至壹盞去滓溫服無時候忌豬肉菘菜若煩熱加石膏貳兩半臨產月加桂心壹兩

刪繁療婦人懷妊胎動不安葱豉安胎方

香豉

壹升熬

葱白

壹升

阿膠

貳兩炙

先以水參升者葱豉取壹升去滓入膠再煎令烱服一百一夜可服三四劑經心錄同始妊娠胎動不安護胎法

鯉魚

粳米

葱

豉

薑

右作臠食之每月一度

安胎織單散

白藥子

白芷

右為細末每服貳錢煎紫蘇湯調下或胎熱心煩悶入砂糖少許煎

銀芎酒

治妊娠胎動欲墮腹痛不可忍方

芎根

貳兩剉

銀

伍兩

清酒

壹瓊

右以水貳大瓊煎至壹大瓊去滓分溫二服

治前胎動不安

女科四

治胎動不安

用好銀煮取水著葱油作羹食之佳

又方 川芎貳兩 葱白壹升 右以水柒升煮取貳升

半分溫三服

療妊娠後不轉動方

阿膠炙壹兩 桑寄生半兩

右為末以酒壹升煮五沸下生雞卵壹枚酒出分

溫貳服空心食前小品方無寄生有艾葉只用水煎

肘後治胎動不安取芋根如足大指者壹尺咬咀以

水伍升煮取叁升去滓服一方有生薑伍片丹麥云芋根大能補陰而行

縮砂散

治胎動不安墮在須臾者神效方見毒物傷胎

又方 川芎貳兩 葱白伍兩 水叁碗煮貳碗半分三服

治妊娠因失所動因絕方取竹瀝飲壹升立愈

鯉魚臙方 治妊娠胎動不安心腹刺痛

鯉魚壹斤修事淨細切 阿膠壹兩杵碎炒黃燥 糯米貳合

右件以水貳升入魚膠米煮令熟入葱白生薑橘

皮鹽少許更煮伍柒沸食前喫如有所傷且喫五

七日効

治妊娠胎動煩悶不安甚方

治胎動不安

取生地黃杵絞汁每服壹小盞煎令沸入雞子白壹枚攪令勻頓服

治妊娠胎動晝夜叫呼口噤唇塞及下重痢不息方

艾葉伍兩右以好酒伍升同煮取肆升去滓更

煎取壹升服口咽者開口灌之藥下即瘥

胎上逼心即子懸

薛胎上逼心之證若氣逆胎上用紫蘇飲飲食不甘兼以四君子若肉熱晡熱兼以逍遙散若胃火所致用四君黃芩枳殼柴梔若脾鬱所致用歸脾湯加柴梔枳殼一妊婦每因恚怒其胎上逼左關脉弦洪乃肝火內動用小柴胡加茯苓枳殼山梔而愈但體倦不食用六君子調養脾土加柴胡枳殼調和肝氣乃瘥一妊婦胎上逼胸滿噯氣飲食少思此脾氣鬱滯用紫蘇飲頓安又用四君子加枳殼柴胡山梔而瘥 程文彬治孕婦七個月胸膈飽悶氣喘忽吐

胎上逼心

婦科四

八十二

胎前 婦科

出一物如小腸寸許舉家驚疑其胎爛程至診得寸
母脉洪滑知其氣盛血少胎氣湊上中焦畜有濕熱
濕生痰知所吐之物乃痰結聚病名子懸以紫蘇飲
加芩連貝母十劑獲痊

本事方紫蘇飲 治妊娠胎氣不和懷胎近上脹滿

疼痛謂之子懸兼治臨產驚恐氣結連日不下

無等名
七寶散

紫蘇莖葉 壹兩 大腹皮 八錢 人參 四錢

川芎 二錢 陳皮 一錢 白芍藥 各半

當歸 柒錢半 甘草 貳錢半

右細剉分作三服每服用水壹盞半生薑肆片蔥
白柒寸煎至柒分去渣空心服

曾有一婦累日產不下服遍催生藥不驗予曰此
必坐草太早心懷一點懼氣結而不行然非不順
也素問云恐則氣下蓋恐則精神怯怯則上焦閉
閉則氣還還則下焦脹氣乃不行矣得此藥一服
便產及婦人六七月子懸者予用此數數有驗不
十服胎便近下 陳良甫治一婦有孕七個月遠
歸忽然胎上衝心而痛坐卧不安兩醫治之無效
遂說胎已死矣用葶麻子研爛加麝香調貼臍中

胎前通心

婦科

八十三

以下之命在垂亡召陳診視兩尺脉絕他脉平和
陳問二醫作何證治之荅曰死胎也陳曰何以知
之曰兩尺脉沉絕以此知之陳曰此說出何經二
醫無荅陳曰此子懸也若是胎死却有辨處面赤
舌青子死母活面青舌赤吐沫母死子活唇口俱
青母子俱死今面不赤口不青其子未死是胎上
逼心宜以紫蘇飲子治之至于服而胎近下矣
當歸湯 治妊娠胎動盪心悶絕煩躁口乾橫生倒
產上衝下氣迷悶唇口青黑手足厥冷產科名保
安散 下方無甘草有川芎厚朴產寶方有川芎

當歸

阿膠

甘草

人參 各壹兩半

連根蔥白 壹握

右細剉水貳升煎四味至升半去滓下蔥再煎減
參合溫服一劑分為二三服

大聖散 治妊娠忪悸睡夢多驚心腹脹滿連膈急
痛胎上逼 見驚悸

治胎上逼心煩悶方又治妊娠六七月以後胎動困
篤用蔥白三七莖濃煮汁飲之若胎未死即安已死
即出未効再服 婁全善云此方神妙脉浮滑者宜之本草云蔥白通陽氣安胎
秘錄治胎動上逼心痛取艾葉如雞子大以頭醋四

升煎取二升分溫服。又治胎上逼心熱痛下血神
麩半斤搗碎和熟水絞取汁三鍾無時溫服止。
治妊娠遍身痛或衝心欲死不能飲食。

白朮 伍兩

黃芩 貳兩

芍藥 肆兩

右水陸升煮取貳升半分作三服緣胎有冰致痛
兼易產。

文仲葛氏療妊娠卒胎上迫心痛方 取弩弦急帶
之立愈。

膠艾湯 見血崩

保生丸 大法

妊娠經來 漏胎下血

脉經婦人經月下但為微少師脉之反言有軀其後
審然其脉何類何以別之師曰寸白脉陰陽俱平榮
衛調和按之滑浮之則輕陽明少陰各如經法身反
灑淅不欲食飲頭痛心亂嘔噦欲吐呼則微數吸則
不驚陽多氣溢陰滑氣盛滑則多實六經養成所以
月見陰見陽精汁凝胞散散者損墮設復陽盛雙在
二胎今陽不足故令激經也 滑脉主血有餘今
經又少故知孕也 大
抵妊娠經來不多而飲食精神如故六脉和緩滑大
無病者血盛有餘也兒大能飲自不來矣

大全夫妊娠漏胎者謂妊娠數月而經水時下也此由衝任脉虛不能約制手太陽少陰之經血故也衝任之脉為經絡之海起於胞内手太陽小腸脉也手少陰心脉也是二經為表裏上為乳汁下為月水有娠之人經水所以斷者壅之養胎蓄之以為乳汁也衝任氣虛則胞内泄不能制其經血故月水時下亦名胞漏血盡則人斃矣又有因勞役喜怒哀樂不節飲食生冷觸冒風寒遂致胎動若母有宿疾子藏為風冷所乘氣血失度使胎不安故令下血也 曾真以妊婦月信不絕而胎不損問產科熊宗古答曰婦

人血盛氣衰其人必肥既娠之後月信當來而胎不動若據晚進觀之便以為漏胎若作漏胎治之則胎必墮若不作漏胎治則其胎未必墮今推宗古之言誠有旨也巢氏云婦人經閉不利別無所苦者是謂有子以其經血畜之以養胎擁之為乳汁也有子之後畜以養胎矣豈可復能散動耶所以然者有妊而月信每至是亦未必因血盛也若謂婦人榮經有風則經血喜動以其風勝則可也既榮經為風所勝則所來者非養胎之血以此辨之若作漏胎治之必服保養補胎之藥且胎不損強以藥滋之乃所謂實實

虛虛也其胎終墮宜矣若醫者知榮經有風之理專
以一藥治風經信可止或不服藥胎亦無恙然而有
胎本不固而因房室不節先漏而後墮者須作漏胎
治之此又不可不審也 丹胎漏因氣虛因血虛因
血熱 薛前證若因風熱用防風黃芩丸若因血熱
用加味逍遙散若因血虛用二黃散若因血去太多
用八珍湯未應補中益氣湯若因肝火用柴胡山梔
散若因脾火用加味歸脾湯若因事下血作痛用八
珍湯加阿膠熟艾若因脾胃虛弱用補中益氣湯加
五味子若因脾胃虛陷用前湯倍用升麻柴胡若哺

熱肉熱宜逍遙散 妊娠卒然下血若因怒氣用小
柴胡湯若因風熱用一味防風丸若因血熱用一味
子芩丸若因脾氣虛弱用六君子湯若因中氣下陷
用補中益氣若氣血盛而下血者乃因兒小飲少也
不必服藥 一妊婦下血服涼血之藥下血益甚食
少體倦此脾氣虛而不能攝血余用補中益氣湯而
愈後因怒而寒熱其血仍下此肝火旺而血沸騰用
加味逍遙散血止用補中益氣湯而安 一妊婦下
血發熱作渴食少體倦屢脾氣虛而肝火所侮用四
君子加柴胡山梔血止因怒復作用六君子加柴胡山

梔升麻而安。一妊娠六月每怒下血甚至寒熱頭痛脇脹腹痛作嘔少食余謂寒熱頭痛乃肝火上衝脇脹腹痛乃肝氣不行作嘔少食乃肝侮脾胃小便下血乃肝火血熱用小柴胡加芍藥炒黑山梔茯苓白朮而愈。一妊娠六月體倦食少勞役下血用六君加當歸熟地黃柴胡升麻而愈。江應宿治王祠部安人孕三月腰腹通痛漏下不止氣湧脹悶速江診視六脉弦數平昔脉極沉細此必怒動肝火挾相火而生內熱喜脉不滑未至離經猶可保也以條苓白朮枳殼香附茯苓阿膠白芍當歸陳皮煎調鹿角

補虛

煨酒淬細末一錢更進抑青丸一服痛已數劑平復仲景云婦人有漏下者有半產後因續下血都不絕者有妊娠下血者假冷妊娠腹中痛為胞阻芎歸膠艾湯主之。方見前 血崩

續斷 貳兩

艾葉

當歸

乾地黄 各陸兩

竹茹

阿膠

雞蘇 各壹兩

水壹升煎取陸合空心再服

廣濟安胎胎病漏血腹痛

胎前 經來崩漏

六十四

當歸

大入參 各壹兩

川芎

大棗 貳拾箇

阿膠 炙

右切以米叁升酒肆升煮貳升半分三服五日
劑頻服三四劑無妨

濟生如聖湯 治胎動腹痛或為漏胎

鯉魚皮

當歸 酒浸

熟地黃 酒蒸

白芍藥

阿膠 蚌粉炒

川芎

續斷 酒浸

甘草 炙各等分

一方有乾薑竹茹

右咬咀每服肆錢水壹盞葶根少許薑伍片煎温
服濟生有續斷無乾薑竹茹

桑寄生散 治胎漏經血妄行淋瀝不已

桑寄生

當歸 去蘆酒浸

川芎

川續斷 酒浸

阿膠 蛤粉炒

香附子 炒去毛

茯神 去木

白朮 各壹錢

人參

甘艸 炙各半錢

右作一服水貳鍾生薑伍片煎至壹鍾不拘時服

鄭氏人參散 治漏胎敗血湊心日漸胎乾子母危

困

人參

黃芪 炙

阿膠 炒各伍錢

竹茹

木香

炙甘草

台介 姓張 字來 贈補

材料

形前
方系口

附子 炮各半錢

川芎

陳皮

苧根 各錢半

生薑 參錢炮黑

右咬咀每肆錢糯米三七粒水煎熟服忌生冷雞鴨魚麵

梅師治胎動下血心腹疼痛死生不知服此湯活即安
死即下即催生佛手散方見胎產大法即川芎當歸等分為散也
妊娠無故卒下血不止取阿膠參兩炙搗末酒壹升半煎令消一服愈

羅氏立聖散 治妊娠下血不止

雞肝叁個用酒壹升煮熟共食之大効

二黃散 治胎漏

生地黃 熟地黃等分水參蓋煎半乾去滓服

下血

治胎漏下血 阿膠貳兩搗末生地黃半斤搗取汁以清酒參升絞汁分叁服

治胎漏下血不止胎乾即死宜急治之

生地黃汁 壹升 陳酒 伍合

右同煎參伍沸温參服以正為度

地黃湯 治經血妄行及鼻衄不止

生地黃 酒搗取汁 薄荷 叁錢 甘草 壹錢

右二味為末新汲水合地黃汁調食後服

方下小注示血胎漏

續易簡治漏血

用野苧根

貳兩炒 金銀 各壹兩

為一劑酒水平

煎耗半温服若閃擲胎動欲漏砂仁皮炒令熟透

為末貳錢酒或鹽湯下

清熱

保命枳殼湯

治婦人胎漏下血及因事下血

枳殼

黃芩 各半

白朮 壹兩

右為麤末每服柒錢水壹盞煎柒分食前服

子芩丸

治肝經有熱妄行下血細條黃芩炒為末

每服壹錢以秤錘燒赤燂酒熱調服若脾胃虛不

宜用

缺

防風丸

治肝經有風以致血得風而流散不歸經

用防風為末每服壹錢白湯調服

防風黃芩丸

治肝經有風熱致血崩便血尿血用

條芩炒焦防風等分為末酒糊丸桐子大每服參

伍拾丸食遠或食前米飲或温酒送下

破血

仲景云婦人宿有癥病經斷未及三月而得漏下不

止胎動在臍上者為癥痼害 妊娠六月動者前三

月經水利時胎下血者後斷三月不血也所以血不

止者其癥不去故也當下其癥桂枝茯苓丸主之

桂枝茯苓丸方

台前 妊娠經來滯澀 女科四

月前
女科

桂枝

茯苓

牡丹

桃仁去皮

芍藥各等分

去心

右五味末之煉蜜和丸如兔屎大每日食前服壹丸不知加至叁丸

治胎下血不止取桃樹上乾不落桃子燒灰和水服

瘥本草云桃奴破血

榆白皮散 治妊孕胎漏去血恐其難產常宜服之

榆白皮

葵根

瞿麥各貳錢

大麻仁去殼

木通各壹錢

牛膝土蘆酒浸

右作一服水貳鍾煎至壹鍾不拘時服

胎漏黃汁下或如豆汁

薛前證肝脾濕熱用升陽除濕湯崩血肝脾風熱用加味道遙散肝脾鬱怒用加味歸脾湯脾胃氣虛用錢氏白朮散若脾氣下陷用補中益氣湯肝經風熱用防風黃芩丸風入腸胃用胃風湯一妊婦因怒胸膈不利飲食少思服消導順氣之劑脾胃愈弱飲食愈少大便不實且無度久而便黃水或帶白視其面色黃中隱白余曰黃色脾虛也白色肺虛也朝以補中益氣湯升補胃氣夕以六君子培補脾氣而愈大全方治妊娠忽然下黃汁如膠或如豆汁胎動腹

胎前諸病黃汁

痛

粳米 伍合

黃芪 陸兩

右以水米升煎取貳升分爲四服

銀芎酒

見前胎動不安

又方用生艾汁貳錢阿膠白蜜各壹兩煎至米分溫服

如無生艾煎乾艾濃汁亦可 一方加竹茹

方用酒不用蜜

脉經云婦人懷軀六月七月暴下斗餘水其胎必倚

而墮此非時孤漿預下故也 胎漏徐徐下水今暴下而多故知墮胎也

跌撲傷胎毒藥傷胎

大妊娠驚胎者乃懷妊將滿胎神已具墜仆傷胎甚

至下血不醒若欲驗其子母安否當參第四論治之

醒愚按前證若因怒跌仆或手足抽搐用釣藤湯

見前若因氣滯用紫蘇飲 胎上若因脾胃氣虛用六君

子加蘇梗若鬱結傷脾用歸脾湯若鬱怒傷肝脾用

四七湯 雜病加芎歸若去血過多用佛手散如不應

膠艾湯氣血虛八珍湯加膠艾

催生神妙佛手散 治婦人妊娠五七月因事築碻

着胎或子死腹中惡露下疼痛不巳口噤欲絕用

跌者 傷者 逐汚 養新

治前傷胎

女科四

九十一

胎前 傷胎 女科四 九三

此藥探之若不損則痛止子母俱安若胎損便逐下本出徐文仲神驗胎動方云治血上衝心腹滿悶者如湯沃雪又治產前產後體熱敗血腹痛又名芎藭湯

當歸 陸兩

川芎 肆兩○張氏方等分

右為粗末每服參錢水壹大盞煎令泣泣欲乾投酒壹大盞止煎膏沸去滓溫服口噤灌之如人行五里再服不過三五服便生一方云此藥治傷胎去血多崩中去血多金瘡去血多拔牙去血多昏暈欲倒者以水煎服或先以漏血腹內疼痛加芍

藥官桂減半隨手効餘詳胎產大法

治妊娠忽因倒地或擊重作勞促損腹中疼痛腫重及子死腹中不出三服立下

川芎 壹兩

右為細末以熱酒調服方寸匕日三四服

按川芎上竄散氣有服之暴亡者若診其脈舉之有按之無者忌服

治妊娠從高墜下腹痛下血煩悶

生地黃

益母草 各壹兩

當歸

黃芪 各半兩

胎前 傷胎 女科四 九三

右咬咀每服肆錢水壹盞薑肆片煎至陸分去滓無時候

集驗療妊娠二三月上至七八月頓仆失跌胎動不安傷損腰腹痛欲死若有所見及胎奔上搶心短氣下血不止方

乾地黃

當歸

艾葉各貳兩

阿膠

川芎各參兩

右以水柒升者取貳升半分作二服腹痛甚加杜仲五加皮各參兩一方無地黃有甘草一方無地黃却用生薑自然汁壹匙地黃汁半合馬通半

合煎成藥去滓入此再煎三沸溫服一方有入

參白茯苓水煎

丹婦人因閃挫傷胎肚疼血崩

歸尾

陳皮

白朮

人參

茯苓

白芍藥

川芎各參錢

甘草炙伍分

右咬咀分四貼水參盞煎取壹盞下縮砂末壹錢

伍分炒黑五靈脂壹錢

竹茹酒 治妊娠誤有尖墜損血胎損疼痛

青竹茹貳合

好酒壹升

胎前 婦科 卷五

右煮三五沸分作三服即安

秦朮湯 療妊娠或因僵仆胎動不安臍腹痛痛見方

胎動不安

治妊娠偶有所傷胎動不安疼痛不可忍兼治崩血

又兼治子官又名子癰

縮砂不以少和皮炒令黑色一方用仁熨羊內略

炒為細末熱酒調下貳錢不飲酒者以米飲調下

皆可覺腹中熱則胎已安矣此方神効子常用之

有驗

補遺安胎散 治卒然腰痛下血不閉

熟地黃 艾葉 白芍藥

川芎 黃芪 阿膠炒

當歸 甘草 地榆 各等分

右咬咀每肆錢薑伍片棗壹枚煎溫服

薛若因毒藥用甘草黑豆淡竹葉若因頓仆用阿膠

散未應煎送知母丸若因頓仆下血腹痛用佛手散

未應用八珍送知母丸血出過多用八珍湯斤許益

母草四兩水煎徐徐與服若胎死以朴硝或平胃散

下之

捷徑方 治用毒藥攻胎藥毒衝心外證牙關緊急

毒藥 傷者 用毒 和中

治有傷胎 女科 卷五

胎前 婦科 卷之六 胎前

口不能言兩手強直握拳頭低自汗身微熱外證
與中風相似但其脉浮而軟十死一生醫多不識
若作中風治之必死無疑用白扁豆貳兩生去皮
為末新汲水調下即效

阿膠散 治妊娠不問月數深淺或因頓仆或因毒

藥胎動不安腰痛腹滿或有所下或胎止搶心短

氣乏力 方見前胎動不安

妊娠誤服諸藥毒致胎動不安治之方

甘草 黑豆 淡竹葉 等分 濃煎汁飲之

奪命丸 治婦人小產下血至多子死腹中其人憎

寒手指唇口爪甲青白面色黃黑胎上搶心則則

絕欲死冷汗自出喘滿不食或食毒物或誤服燥

藥傷動胎氣下血不止胎尚未損服之可安已死

服之可下若胎腐爛腹中危甚者立可取出此方

的係異人傳授至妙 此即仲景茯苓桂枝丸但用

丹皮茯苓桂枝桃仁赤芍藥等分是也丹溪亦稱妙

胎前 婦科 卷之六 胎前

婦科

白木心痛
天妊娠心痛乃風邪痰飲交結若傷心正經為真心痛朝發夕死夕發旦死若傷心支絡則作安作作傷於子藏則胎動而血下
薛前證若飲食所傷用平胃散加枳殼山查若因錯雜諸邪當審其因而治之
一妊婦心痛煩熱作渴用白木散即愈後因停食其痛仍作胸腹膨滿按之則痛此因飲食停滯用人參養胃湯按之不痛乃脾胃受傷以六君子補之而愈
一妊婦心腹作痛胸脇作脹吞酸不食此肝脾氣滯用二陳山查山梔青皮木香而愈又因怒仍

白木心痛

天妊娠心痛乃風邪痰飲交結若傷心正經為真心痛朝發夕死夕發旦死若傷心支絡則作安作作傷於子藏則胎動而血下
薛前證若飲食所傷用平胃散加枳殼山查若因錯雜諸邪當審其因而治之
一妊婦心痛煩熱作渴用白木散即愈後因停食其痛仍作胸腹膨滿按之則痛此因飲食停滯用人參養胃湯按之不痛乃脾胃受傷以六君子補之而愈
一妊婦心腹作痛胸脇作脹吞酸不食此肝脾氣滯用二陳山查山梔青皮木香而愈又因怒仍

白木心痛

白木心痛

白木心痛

胎前 婦科 卷四

痛胎動不食面色青黃肝脉弦緊脾脉弦長此肝木乘土用六君子湯加升麻柴胡木香而愈

火龍散 治妊娠心氣疼 艾葉末鹽炒壹錢半

川棟子 茴香炒各壹錢

右作一服水貳鍾煎至壹鍾少拘時服

產寶治妊娠卒心痛氣欲絕方

川芎 當歸 茯苓

厚朴製各壹分

右水陸升煎取貳升分一服

白朮湯 治妊娠卒心痛欲死不可忍者出古今錄驗

白朮 三兩 赤芍 二兩 黃芩 一兩半

右切以水陸升煮取二升半分參服半日令盡微下

水令易生忌蒜李雀肉等

千金療妊娠心痛

青竹茹 一升 羊脂 兩 白蜜 三兩

右三味合煎每服束核大三枚食前頓服三服

又方青竹茹一升酒二升煮取一升半去滓分溫頓服

又方破雞子一枚酒調服之

又方大麻子三升研水捌升煮取伍升分五服

胎前心痛

結傷脾用歸脾湯雜病健忘加枳殼山梔一妊婦心腹
作痛吐痰惡心胎氣上攻飲食少思此脾虛氣滯而
為痰用六君子加柴胡枳殼諸證漸退飲食漸進又
用四君子加枳殼山梔桔梗而安後因怒兩脇氣脹
中脘作痛惡寒嘔吐用六君加柴胡升麻木香一劑
而愈

當歸芍藥散 治妊娠腹中絞痛心下急痛及療產
後血暈目虛氣乏崩中久痢常服通暢血脉不生
癰癤消痰養腎明目益津

白芍藥 半斤 當歸 茯苓

白朮 各肆兩 澤瀉 川芎 各貳兩

右為細末每服貳錢食前溫酒調服 元和紀用
經名為六氣經緯丸云能祛風補勞養真陽退邪
熱緩中安和神志潤澤容色散寒邪溫瘴時氣安
期先生賜李少君久餌之藥後仲景增減為婦人
懷妊腹痛方本方用芍藥肆兩澤瀉茯苓川芎各
壹兩當歸白朮各貳兩亦可以蜜丸服出三左

阿膠散 治妊娠胎動腹中疴痛不思飲食
甘草 貳錢半 白茯苓 白朮
川芎 阿膠 各柒錢半 當歸 炒

治心腹腹痛

用前... 女科四

陳皮 各壹兩

右咬咀每服參錢水壹盞薑參片棗壹枚煎至柒分服

療妊娠患腹痛并胎動不安

葱白 切壹升

人參

厚朴

阿膠

川芎 各貳兩

當歸 參兩

右咬咀以水柒升煎取參升分三服 一方有甘

草無厚朴川芎

療妊娠先患冷氣忽中心腹痛如刀等歸湯

川芎

人參

茯苓

吳茱萸

苦梗

當歸 各參兩

厚朴 製

芍藥 各貳兩

右咬咀以水玖升煎取參升分三服氣下即安

草豆蔻散 治妊娠心腹常痛喫食減少四肢不和

全不入食

草果仁 想是草

陳橘皮

乾地黄

白朮 各壹兩

川芎 柒錢半

當歸 炒

桂心

乾薑

木香 各半兩

右為細末每服肆錢水壹盞棗貳枚煎陸分熱服

古今錄驗療妊娠腹內冷痛忽胎動

治心腹痛

女科四

百七

薤白 壹升 當歸 切肆兩

右以水伍升煮取貳升作三服亦將小便服將去

千金瘕妊娠腹中痛方 生地黄 貳斤取汁酒壹升

合煎減半頓服愈 刺蘇文 薄黃

治妊娠胎動欲落腹中痛不可忍

草豆上等銀 壹斤 茅根 貳斤 以水玖升者銀取

伍升入清酒壹升同煎茅根取叁升分三服立安

治妊娠四五月忽心腹絞痛

大紅棗 拾肆枚 燒存性為末童子小便調下

治妊娠心腹痛不可忍方

鹽 壹斤 燒令赤以兩指取一撮酒調服

香茂散 治妊娠五个月已後常胸腹間氣刺滿痛

或腸鳴以至嘔逆減食此由喜怒憂慮過度飲食

失節之所致也 蔡元度寵人有子夫人怒欲逐

之遂病醫官王師復處此方三服而愈

廣中莪茂 壹兩 丁香 半兩 粉草 貳錢半

右為細末空心鹽湯點服壹大錢覺胸中如物按

下之狀愈

補遺手拈散 四七湯加歸芍 四磨湯 小烏沉

湯安胎飲除地榆 已上諸方皆可選用

[Faded bleed-through text from the reverse side of the page]

腹痛

仲婦人懷胎腹中諸疾痛當歸芍藥散主之 見前心腹痛

潔地黃當歸湯 治婦人有孕胎痛

當歸 壹兩 熟地黃 貳兩

右為末作一服水參升煎至壹升半去滓頓服

仲婦人腹中痛小建中湯主之 方見傷寒腹痛

雲芎歸湯 治妊娠先患冷氣忽心腹痛如刀刺 見前

心腹痛

丹孫院君因近喪冒惡氣傷胎肚痛手不可近發熱

口中不思食須安胎散滯氣

合前腹痛

青皮 壹錢
 歸尾 壹錢半
 甘草 多少許
 黃芩
 芍藥 各貳錢
 川芎 壹錢
 木香 伍分

分二貼水參盞先煮苓根兩大片至貳盞去苓根入前藥同煎至壹盞熱服

治妊娠腹痛用生地黄參斤搗取汁酒壹升合煎減半頓服愈

脈師曰婦人有胎腹痛其人不安若胎病不動欲知生死冷人摸之如覆杯者則男如肘頸參差起者女也冷在何面冷者為死溫者為生

小腹痛

大妊娠小腹痛者由胞絡虛風寒相搏痛甚亦令胎動也 薛前證若風寒所搏用紫蘇飲加生薑氣血虛用八珍湯脾氣虛用六君子湯中氣虛用補中益氣湯若腹脹痛用安胎飲加升麻白朮不應兼補中益氣湯 一妊婦小腹作痛其胎不安氣攻左右或時逆上小便不利用小柴胡湯加青皮山梔清肝火而愈後因怒小腹脹滿小便不利水道重墜胎仍不安此亦肝木熾盛所致用龍膽瀉肝湯一劑諸證頓愈乃以四君子加柴胡升麻以培脾土而安

療妊娠被驚惱胎向下不安小腹痛連腰下血

當歸

川芎 各捌分

阿膠 炙

人參

艾葉 各肆分

大棗 貳拾个

茯苓 拾分

右細切以水肆升煮取貳升温分三服

補遺 治妊婦小腹痛胎動不安

川芎為細末酒調下

又方 川芎 當歸 各等 水煎温服

腰腹及背痛

大腎主腰足因勞傷損動其經虛則風冷乘之則腰痛冷氣乘虛入腹則腹痛故令腰腹相引而痛其痛不止多動胎氣婦人腎以繫胞妊娠而腰痛甚者則胎墮也 薛前證若外邪所傷用獨活寄生湯 雜病勞傷元氣用八珍杜仲砂仁膠艾脾腎不足以前藥加白朮補骨脂氣血鬱滯用紫蘇飲加桔梗枳殼肝火所動用小柴胡湯 傷寒少陽病加白朮枳殼山梔肝鬱結用歸脾湯 雜病健忘加柴胡枳殼 一妊婦頸項強直腰背作痛此膀胱經風邪所致用拔萃羌活湯 雜病

腰痛一劑而愈。又用獨活寄生湯及八珍湯以祛邪固本而痊。石山治一婦懷妊八月嘗病腰痛不能轉側大便燥結醫用人參等補劑痛益加用硝黃通利之藥燥結雖行而痛如故汪診之脈稍洪近駛曰血熱血滯也宜用四物加木香乳沒黃蘗火麻仁煎服四五貼痛稍減燥結潤復加發熱面赤或時惡寒仍用前方去乳香沒藥加柴胡黃芩服二貼而寒熱除又背心覺寒腰痛復作汪曰血已利矣可於前方加人參壹錢服之而安。江篁南治一婦妊娠三個月因閃挫傷胎腰痛小腹疼下血內有熱用當歸白朮

黃芩土熟地川芎防風砂仁中艾葉上香附下用水煎服血止小腹不痛去砂仁又用雞子黃叁個以酒攪化煮熟食之即痊

通氣散 治妊娠腰痛狀不可忍此藥神效

破故紙不以瓦上炒香熟為末嚼胡桃肉壹个空心溫酒下叁錢

五加皮散 治妊娠腰痛不可忍或連髀痛先服此散

杜仲肆兩炒 五加皮 阿膠炙

防風 金毛狗脊 川芎

白芍藥 細辛 草薺各叁兩

杏仁搗碎去尖皮熬炒一方有白茯苓無白芍

右咬咀以水九升煮取貳升去滓下膠作三服

五加皮丸治證同前服前散後丸

續斷炒 杜仲各貳兩半 芎藭

獨活各參兩 五加皮 狗脊

草薢 芍藥 訶子肉各肆兩

右為細末煉蜜和丸如梧子大空心酒下肆拾丸

日三

療觸動胎以致腰痛背痛 當歸

杜仲 五加皮

芍藥 川芎 草薢各等分

右細剉以水柒升煮取壹升半分温三服

丹仁六嫂有胎腰痛

白朮肆錢 陳皮參錢 黃檗炒貳錢半

人參 條芩 川芎

地黃 當歸尾各半兩 甘草炙壹錢

右分四貼水酒煎服

療妊娠氣壅攻腰痛不可忍兼治腹痛

當歸參兩 阿膠 甘草各貳兩

葱白壹升

右細剉以水米升煮取參升去滓分温三服

大地黃丸 治產前後腰腹疼一切血疼兼治血氣

虛四肢不舉骨髓熱疼

熟地黃 貳兩 烏梅肉 當歸 各壹兩

右為細末煉蜜丸如彈子大每服壹丸空心白湯

嚙下

紫酒 治妊娠腰痛如折

大黑豆 貳合 炒令香熟以酒壹大盞煮取米分去

豆空心頓服

本治胎動腰痛搶心或下血取蔥白不拘多少濃煮

汗血 療妊娠腰背痛反覆不得

鹿角 長六寸燒令赤酒中碎取所淬酒飲之

方鹿角為末酒服亦可

止血 卒腰痛不安或腰痛胎轉搶心下血不止用蓴蒲汁

酒壹升服之

妊娠卒胎動不安或但腰痛或胎轉搶心或下血不

正艾葉壹把如鷄子大以酒肆升煮取貳升分為

貳服良

小品芋根湯 療損動胎腰腹痛去血胎動向下方

生乾地黄

芋根各貳兩

當歸

芍藥

阿膠

甘州各壹兩

右細切以水陸升煮取貳升去滓內膠煎烱分温
三服忌海蕪菜

此方治胎前心腹脹滿者由腹內素有寒氣致令停
飲妊娠重因觸冷飲發動與氣相平故令心腹脹滿
也薛前證若外感風寒內傷飲食用霍香正氣散
中病若食傷脾胃用六君子湯若陽氣壅滯用紫蘇
飲通心一妊婦飲食停滯心腹脹滿或用人參養
胃湯加青皮山查枳殼其脹益甚其胎上攻惡心不
食右關脉浮大按之則弦此脾土不足肝木所侮用
六君子加柴胡升麻而愈後小腹痞悶用補中益氣
湯升舉脾氣而差一妊婦腹脹小便不利吐逆諸

心腹脹滿

大全天妊娠心腹脹滿者由腹內素有寒氣致令停
飲妊娠重因觸冷飲發動與氣相平故令心腹脹滿
也薛前證若外感風寒內傷飲食用霍香正氣散
中病若食傷脾胃用六君子湯若陽氣壅滯用紫蘇
飲通心一妊婦飲食停滯心腹脹滿或用人參養
胃湯加青皮山查枳殼其脹益甚其胎上攻惡心不
食右關脉浮大按之則弦此脾土不足肝木所侮用
六君子加柴胡升麻而愈後小腹痞悶用補中益氣
湯升舉脾氣而差一妊婦腹脹小便不利吐逆諸

醫雜進溫胃寬氣等藥服之反吐轉加脹滿痰心驗
之胎死已久服下死胎藥不能通因得鯉魚湯其論
曰妊婦通身腫滿或心胸急脹名曰胎水遂去妊婦
胸前看之胸肚不分急以鯉魚湯三五服大小便皆
下惡水腫消脹去方得分娩死胎此證蓋因懷妊腹
大不自知覺人人皆謂妊娠孕如此終不知胎水之
患也

倉公下氣湯 治妊娠心腹脹滿兩脇妨悶不下飲

食四肢無力

羌活

赤芍藥

甘草

檳榔

青皮

大腹皮

陳皮

赤茯苓

半夏

桑白皮

桂心 各半兩

紫蘇莖 貳兩

吹咀每服參錢水壹盞薑伍片棗壹个煎柒分去
滓服無時 局方分心氣飲大同小異加燈心煎
訶黎勒散 療妊娠心腹脹滿氣衝胸膈煩悶四肢
少力不思飲食

訶黎勒

赤茯苓

前胡 各壹兩

陳皮

大腹皮

桑白皮 各柒錢半

枳殼

川芎

白朮 各半兩

右為粗末每服肆錢水壹盞半薑叁片棗子壹个煎至柒分去滓温服無時

安胎和氣飲 治胎冷腹脹痛引兩脇小便頻數大便虛滑

訶子 麴裏煨 去核

高良薑 炒

陳米 炒

甘艸 炙各壹錢

白朮 各貳錢

木香 不見火

白芍藥

陳皮 去白

右作一服水貳盞生薑五片煎至壹鍾不拘時服忌食生冷之物

治妊娠心下滿氣急切痛

赤茯苓 陸分

桑白皮 伍分

前胡 肆分

郁李仁

檳榔 各叁分

右為細末以水壹升煮取一半去滓夜卧服

紫蘇飲 治妊娠心腹脹滿兩脇妨悶

枳殼湯 治婦人妊胎腹脹

枳殼 叁兩

黃芩 壹兩

為粗末每服五錢水壹盞半煎温服如胎前腹滿身體沉重加白朮壹兩

仲景婦人懷妊六七月脉弦發熱其胎愈脹腹痛惡寒者少腹如扇所以然者子藏寒故也當以附子湯

婦科

温其藏

附子湯方

附子

貳枚炮去皮破捌片

白朮

肆兩

茯苓

芍藥

各叁兩

人參

貳兩

右五味以水捌升煮取叁升去滓温服壹升日三

服

婦人傷胎懷身腹滿不得小便從腰以上重如有水氣狀懷身七月太陰當養不養此心氣實當刺瀉勞宮及關元小便微利則愈

