

女科證治準繩

五之三

松
久
利


44

×

F 16
シ-131

Kitasato Memorial Medical Library

3 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



440.9
J0-3
16
No. 3171
12 m 44

渴

自汗

黃疸

發熱

往來寒熱

水腫

壽方

虛羸

痞悶

腹脹

咳嗽

積聚

霍亂

呕吐

吃逆



1478

渴

熊產後心煩發渴宜清心蓮子飲

雜病白濁

薛前證若

出血過多虛火上炎用童子小便或四物白朮麥門丹皮若胃氣虛而有熱用竹葉歸芪湯若血虛發熱用八珍加麥門五味若血脫發熱煩躁用當歸補血湯若胃氣虛弱用補中益氣湯或七味白朮散一產婦患前證朝寒暮熱肚腹作痛以手按之不痛余以為血氣俱虛用八珍之類治之彼反行逐血更加發熱煩躁余用當歸補血湯熱躁漸止用八珍麥門五味氣血漸復

熟地黃湯 治產後虛渴不止少氣腳弱眼眩飲食無味

熟地黃

酒沈淨蒸
去心各半錢

瓜蔞根

貳錢

甘艸

炙半錢

人參

去蘆半兩

右作一服水貳鍾糯米壹撮生薑叁片紅棗叁枚同煎至壹鍾不拘時服

產寶療產後大渴不止

蘆根

切壹升

瓜蔞

各叁兩

人參

白朮各半錢

大棗

貳拾枚

麥門冬

去心各半錢

茯苓

各叁兩

大棗

貳拾枚

右以水玖升煮取叁升分三服頓服四劑即瘥已
菘菜

黃芩散

楊氏

治產後血渴飲水不止

黃芩

去心各等分

麥門冬

各等分

哎咀每服叁錢水盞半煎至捌分去滓溫服無時

括蔞根

湯驗

療產後血渴

括蔞根

驗

療產後血渴

生乾地黃

肆兩

麥門冬

去心各半錢

人參

各叁兩

大棗

貳拾枚

產寶無地黃麥門冬有牡蠣粉等分

哎咀以水捌升煮取貳升半分三服

千金竹葉湯 療產後虛渴少氣力

竹葉 叁升

甘艸

人參

茯苓 各壹兩

小麥 伍合

生薑

半夏 兩

麥門冬 伍兩

大棗 拾伍枚

右㕮咀以水九升先煮竹葉小麥薑棗取柒升去滓內藥再煎取貳升去滓一服五合日三夜七味白朮散 治中氣虛弱津液短少口乾作渴或因吐瀉所致者

人參

白茯苓

木香

甘草 炒

藿香

乾葛 各壹錢

右水煎服

竹葉歸芪湯 治胃氣虛弱口乾作渴惡冷飲食者

竹葉 壹錢半

黃芪 貳錢

白朮

人參

當歸 各壹錢

麥門冬 半錢

甘艸 炒伍分

右水煎服

鬱金

乾葛

青皮

枳殼

桂心

玄胡索

右各等分以好醋浸宿焙乾末之每服貳錢陳皮湯調下日三夜一

桃花散 治產後不順而渴

新石灰

壹兩

黃丹

伍錢

右爲細末渴時井水調下壹錢

本治產後出血太多虛煩發渴用真正蒲黃末貳錢白湯調下如渴燥甚井花水下

治產後中風煩渴用紅花子伍合微炒研碎以水煎濃徐徐呷之

療血渴及產後渴疾用蓮子心生取爲細末米飲調下貳錢効

自汗

大夫虛汗不正者由陰氣虛而陽氣加之裏虛陽氣獨發於外故汗出也血爲陰產則傷血是爲陰氣虛也氣爲陽其氣實者陽加於陰故令汗出而陰氣虛弱不復者則汗出不止也凡產後血氣皆虛故多汗因之遇風則變成癰縱不成癰亦虛之短氣身體柴瘦唇口乾燥火則經水斷絕由津液竭故也薛按前證屬血氣俱虛急用十全大補湯如不應用參附芪附等湯若汗多亡陽發癰尤當用前藥王海藏先生云頭汗出至頸而還額上偏多蓋額爲六陽

之所會也。由虛熱熏蒸而出竊謂前證當以部位分之。額左屬肝，額右屬肺，鼻屬脾，頤屬腎，額屬心，治者審之。一產婦略聞音響其汗如水而昏憒，諸藥到口即止。余以爲脾氣虛敗，用參附末爲細丸，時含三五粒隨液嚥下，乃漸加之。至錢許却服參附湯，而產一產婦盜汗不止，遂致廢寐，神思疲甚。口乾引飲，余謂血虛有熱，用當歸補血湯以代茶，又以當歸六黃湯內黃芩連檗炒黑倍加人參五味子，二劑而愈。

大天 凡產後忽冒悶汗出，不識入。

治用雞子及竹液二法見前血量

薛前證屬太虛宜固元氣爲主，其汗不止必變本證。

東垣先生云：婦人分娩及半產漏下，昏冒，目瞑，蓋因血暴亡而火上熾，但補其血則神自昌。若當時血下當補而升舉其氣，陽得血而神安，則目明矣。今立一方，以補手足厥陰之血，兼益陽氣，名曰全生活血湯。全生活血湯 治發熱自汗盜汗，目睭盪，四肢無力，口乾頭暈，行步欹側。

升麻

芍藥炒各

柴胡

當歸

葛根各壹錢

羌活

獨活

甘草炒各

防風

川芎

藁本伍分各壹錢

生地黃

熟地黃各壹錢

細辛

蔓荆子各伍分

紅花參分

右每服伍錢水煎熱服

麻黃根散 治產後虛汗不止

當歸

黃芪

麻黃根

牡蠣煅爲粉

人參

粉草各等分

右咬咀每服肆錢水壹盞煎至柒分去滓溫服

又方

黃芪各壹兩

麻黃根貳兩

右咬咀每服叁錢水壹盞煎去滓分去滓服

千金療產後風虛汗出不止小便難四肢拘急難以屈伸

甘草炙壹兩

附子半箇炮去皮尖

桂心

芍藥各半兩

右咬咀每服叁錢水壹盞生薑肆

片棗壹枚煎柒分去滓空心溫服忌豬肉冷水生葱等物

經効療產後汗出不止

黃芪拾貳分

白朮

牡蠣煅

茯苓

防風

麥門冬去心

生地黃各捌分

大棗柒枚

右咬咀水煎升煮取柒合去滓空心分溫兩服

療產後血氣暴虛汗出，淡竹葉煎湯參合微溫服之須臾再服。

又方 馬齒莧研取汁參大合煮一沸投蜜匙許食停頓服。無新者用乾者。汗入蜜服。

止汗散 治產後盜汗不正。一應汗多者皆可服。

牡蠣粉

煅研

小麥麴

炒令黃色。研爲粉。

右等分和勻煮生豬肉汁調下貳錢無時人參湯 治產後諸虛不足發熱盜汗。

人參

當歸

各等分

右爲末以豬腰子壹隻去脂膜切小片子以水參

升糯米半合葱白兩條煮米熟取清汁壹盞入貳錢煎至捌分溫服不拘時
當歸六黃湯 治氣血虛熱盜汗不正不應加入參白朮心血不足加酸棗仁炒

當歸熟地黃自製。炒各

生地黃

黃檗炒黑。

黃芩炒黑。

黃連炒黑各壹錢。

右水煎服

參附湯 治陽氣虛寒自汗惡寒或手足逆冷大便自利或臍腹疼痛吃逆不食或汗多發瘡等證
人參壹兩。大附子炮五錢。

右作二服。薑棗水煎。徐服去入參加黃芪。名芪附湯。

附湯。

芪附湯 治陽氣虛脫惡寒自汗或口噤痰涌四肢逆冷或吐瀉腹痛飲食不入及一切虛寒等證。

黃芪 壹兩

附子 炮伍錢

右作一劑。薑棗水煎服如不應倍加附子方得全濟。

當歸補血湯 見前

十全大補湯 見下

虛羸

丹治一婦人四月內產發黃四肢倦怠食少經事不來時發熱脉弦。

黃疸

白术

壹兩

人參

牡丹皮

生地黃

柴胡

芍藥 各半兩


川芎

黃芩

乾葛 各壹錢

甘草 伍分

右分十二貼水煎食前熱服。



發熱

產後虛煩發熱乃陽隨陰散氣血俱虛若惡寒發
熱煩躁作渴急用十全大補湯若熱愈甚急加桂附
若作渴面赤宜用當歸補血湯若誤認爲火證投以
涼劑禍在反掌王太僕先生云如大寒而甚熱之不
熱是無火也熱來復去晝見夜伏夜發晝止不時而
熱是無火也當治其心如大熱而甚寒之不寒是無
水也熱動復止倏忽往來時動時止是無水也當助
其腎故心盛則生熟腎盛則生寒腎虛則寒動於中
心虛則熱收於內又熱不勝寒是無火也寒不勝熱

是無水也治法前證無水者六味丸無火者八味丸氣血俱虛者八珍湯與十全大補湯。大尹俞君之內產後發熱晡熱吐血便血兼盜汗小便頻數胸脇脹痛肚腹痞悶余曰此諸臟虛損也治當固本爲善自恃知醫用降火之劑更加瀉利腸鳴嘔吐不食腹痛足冷始信余言診其脉或浮洪或沉細或如無其面或青黃或赤白此虛寒假熱之狀時雖仲夏當捨時從證先用六君子湯加炮薑肉桂數劑胃氣漸復諸證漸退更佐以十全大補湯半載全愈 儒者楊敬之內人所患同前但唾痰涎或用溫補化痰之劑

不應面色黧黑兩尺浮大按之微細此因命門火虛不能生脾土脾土不能生諸臟而爲患也用八味丸補土之母而痊 一婦產後三百日起早況氣血未定遂感身熱目暗如風狀卽以清魂散二服得微汗而愈 滑伯仁治一產婦惡露不行臍腹痛頭疼寒熱衆皆以爲感寒溫以薑附益火熱手足搐搦語譫目擴診其脉弦而洪數面赤目閉語喃喃不可辨舌黑如焰燥無津潤胸腹按之不勝手蓋燥劑搏其血內熱而風生血蓄而爲痛也曰此產後熱入血室因而生風卽先爲清熱降火治風涼血兩服頗爽繼以丸

柏牛黃等稍解人事後以張從政三和散行血破瘀
三四服惡露大下如初時產已十日矣于是以是諸證悉
平。一婦盛暑月中產三百發熱其脉虛疾而大惡
露不行敗血攻心狂言叫呼奔走掣捉不往以乾荷
葉生地黃牡丹皮濃煎湯調下生蒲黃二錢二服即
定惡露旋下而安。一婦產後時發昏聾身熱汗多
眩暉口渴或時頭痛惡心醫用四物涼血之劑病不
減又用小柴胡病益甚石山至診得浮洪搏指汪曰
產後而得是脉又且汙多而脉不爲汙衰法在不治
所幸者不喘不泄耳其脉如是蓋涼藥所激也用入

參芩錢黃芪貳錢甘草當歸各半分白朮門冬各半
錢乾薑陳皮黃芩各五分煎服五劑脉歛而病漸安
王念憲宜人產後因沐浴發熱嘔惡渴欲引冷水
瓜果譖語若狂飲食不進體素豐厚不受補醫用清
涼無增劇診得六脉浮大洪數江曰產後暴損氣血
孤陽外浮內真寒而外假熱宜大補氣血與八珍湯
加炮薑八分熟減大半病人自以素不宣參芪不喜
再服過一日復大熱如火復與前劑摻加參芪炮薑
連進二三服熱退身涼而愈。

當歸養血丸

產後腹痛

當歸黃芪湯

腰痛

產後腹熱

文斗

五

虛

當歸補血湯

大全人參湯

見上
自汗

當歸散

並見胎自
墮半產條

虛

羅氏犀角飲子

見上
自汗

治產後亡津液虛損時自汗出發

熱困倦唇口乾燥

犀角

麥門冬

白朮

各半兩
柴胡

枳殼炒地骨皮

生地黃

甘艸

炒

當歸

人參

茯苓

黃芩

黃芪

各朱錢

右㕮咀每服肆錢薑叁片浮麥柒拾粒水煎服

三之一湯 治產後虛勞發熱日久不安

柴胡

黃芩

人參

半夏

川芎

當歸

芍藥

熟地黃

甘草

各壹錢半

作一服水貳鍾薑參片紅棗壹枚煎一鍾無時服
三分散 治產後日久虛勞發熱

川芎

當歸

芍藥

熟地黃

白朮

白茯苓

黃芪

各壹錢半

人參

各壹錢半

黃芩

半夏

各壹錢半

右作一服水貳鍾生薑參片紅棗壹枚煎至壹鍾

食前服

加味逍遙散

治產後發熱口乾作渴唇裂生瘡

當歸

白芍藥

乾葛各貳錢

生地黃

川芎

黃芩

各壹錢半

人參玖分

麥門冬玖分

柴胡壹錢

烏梅貳箇

甘草陸分

癰

人參當歸湯 治產後去血過多血虛則陰虛陰虛則生內熱心胸煩滿呼吸短氣頭痛悶亂晡時轉

甚與太病後虛煩相類

方見前產後虛煩

丹溪法也

往來寒熱

郭產後乍寒乍熱者何答曰陰陽不和敗血不散能令乍寒乍熱產後血氣虛損陰陽不和陰勝則乍寒陽勝則乍熱陰陽相乘則或寒或熱若因產勞傷臟腑血弱不得宣越故令敗血不散入於肺則熱入於脾則寒醫人若誤作瘧疾治之則謬矣陰陽不和宜增損四物湯敗血不散宜奪命丹又問二者何以別之時有刺痛者敗血也但寒熱無他證者陰陽不和也增損四物湯不一皆隨病加減薛產後寒熱因氣血虛弱或脾胃虧損乃不足之證經云陰虛則發

熱陽虛則惡寒，若兼太便不通，尤屬氣血虛弱，切不可用發表降火。若寸口脉微，名陽氣不足，陰氣上入於陽中，則惡寒。用補中益氣湯，尺部脉弱，名陰氣不足，陽氣下陷於陰中，則發熱。用六味地黃丸，大抵陰不足，陽往從之，則陽內陷，而發熱。陽不足，陰往從之，則陰上入而惡寒。此陰陽不歸其分，以致寒熱交爭，故惡寒而發熱也。當用八珍湯。若病後四肢發熱，或形氣倦怠，此元氣未復，濕熱乘之故耳。宜補中益氣湯。若肌熱大渴，引飲自赤，面紅，此血虛發熱，用當歸補血湯。若認為寒，則誤矣。一產婦惡寒發熱，用十

全大補加炮薑治之而愈。但飲食不甘，肢體倦怠，補中益氣而安。又飲食後犯怒，惡寒發熱，抽搐咬牙，難候其脈，視其面色青中隱黃，欲按其腹，以手護之，此肝木侮脾土，飲食停滯而作用。六君加木香，一劑而安。一產婦惡寒發熱，余欲用八珍加炮薑治之，其家知醫，以為風寒，用小柴胡湯。余曰：寒熱不時，乃氣血虛也，不信，仍服一劑，汗出，不止，譴語不絕，煩熱作渴，肢體抽搐，余用十全大補湯二劑，益甚，脈洪大重，按如無，仍以前湯加附子四劑，稍緩，數劑而安。吳茭山治一婦人，產後去血過多，食後著，惱頭疼身

痛寒熱如瘡左手弦大微有寒邪右手弦滑不勻飲痰火也二者因虛而得宜養正祛邪遂以茯苓補心湯去地黃加羌活青皮葱棗三服汗出身涼其患漸差然後以八物湯調理半月後全愈一婦產後惡露未盡瘀血入絡又感寒邪身熱如瘡卽以生料五積散五貼惡露自下而寒熱除又一婦產後惡露未盡因起抹身寒氣客於經絡乍寒乍熱脉緊而弦以葱白散二貼安一少婦初產四日冷物傷脾胃但覺身分不快嘔逆飲食少孕缺心腹滿悶時或腹脇刺痛晨惡寒晚潮熱夜則恍惚譳語晝則抽搐頗

類風狀變異多端諸醫莫測或作虛風或云血凝實熱用甘溫而行血以寒涼退實熱如此半月不效江至見醫滿座亦跼縮診其脉弦而緊遂令按之小腹急痛知瘀血未盡也思患者大勢惡露已下未必還有餘血偶因寒涼所傷瘀血停滯下焦日久客于經絡所以變生諸證須得大調經散倍入琥珀化諸惡血成水其患方愈遂合前藥服之五日後行惡水半許更不可近患人覺倦病勢漸減然後以人參養榮湯數十貼月餘如初

雲產後往來寒熱四物內加小柴胡湯

保治日久虛勞微有寒熱脈沉而數宜柴胡四物湯

川芎

熟地黃各壹錢半

當歸

柴胡捌錢

芍藥

人參

甘草各叁錢

半夏各叁錢

右爲末水煎服

雲產後往來寒熱脉弦者少陽也小柴胡加生地黃

湯

柴胡貳兩

黃芩伍錢

人參叁錢

半夏壹兩半

大棗叁枚

生地黃

梔子

枳殼捌炒名伍錢

右如前煎服

增損柴胡湯

治產後虛發寒熱飲食少腹脹

柴胡

人參

甘草

半夏

陳皮

川芎

白芍藥各等分

爲哎咀

囊

增損四物湯方見本卷腹痛

評曰乍寒乍熱榮衛不和難以輕議若其敗血不散豈止入脾肺一臟邪大抵一陰閉一陽卽作寒熱陰勝故寒陽勝故熱只可云敗血循經流入閉諸陰則寒閉諸陽則熱血氣

西醫卷之三十一

方五

與衛氣解則休，遇再會而復作。大調經散五積散入醋煎佳。

雲岐熟地黃散 治產後蓐勞，皆由體虛氣力未壯，勞復所起。四肢煩疼時發寒熱，不思飲食。

熟地黃

人參

白芍藥

續斷各壹兩

黃芪

白朮

五味子

當歸

川芎各柒錢半

大全左有麥門冬朱錢半

右㕮咀，每服肆錢薑三斤棗壹枚水煎服。一方無桂心五味續斷有柴胡黃芩半夏各柒錢半作散。

黃芪丸 治產後蓐勞寒熱，進退頭目眩痛，骨節痠疼，氣力羸乏。

黃芪

鱉甲

當歸

炒各壹兩

桂心

白芍藥

續斷

川芎

牛膝

蒼朮

沉香

柏子仁

枳殼各柒錢半

五味子

熟地黃各半兩共

右煉蜜和丸，梧子大，每服肆伍拾丸，食後粥飲下。

大調經散 治產後血虛惡露未消，氣為敗濁凝滯，榮衛不調，陰陽相乘，增寒發熱，或自汗或腫滿，皆

之邪

氣血未平之所爲也

大豆

壹兩半
炒去皮

茯神

壹兩

真琥珀

壹錢

右爲細末濃煎烏豆紫蘇湯調下

加減烏金散

治產後寒熱似瘧

厚朴

柴胡

黃芩

麻黃

陳皮

當歸

桂枝

桔梗

白芷

枳殼

各壹錢

羌活

草果

半夏

各貳錢

甘艸

玖分

白芍藥

熟地黃

各壹錢
五分

右剉爲散分作兩服每服用水壹鍾半薑參片葱參莖煎至壹鍾不拘時服有汗多當歸川芎白芍藥熟地黃有脹多厚朴陳皮有熱多柴胡黃芩有寒多蒼朮草果桂枝有痰多半夏桔梗茯苓有頭痛多川芎白芷羌活有瀉去枳殼甘草不用如方用有餘血塊在腹作潮熱疼痛香遍身痛加羌活獨活寒熱往來加黃芩柴胡

產寶療產後惡寒壯熱一夜三五度發惡語口中生瘡時時乾嘔困乏悶絕

產後

往來寒熱

女二十五

人參

獨活

白鮮皮

葛根

防風

青竹茹

遠志

各壹兩半

茯神

白斂

貳兩半

玄參

參兩半

竹瀝

貳升半

知母湯

治產後乍寒乍熱通身溫壯胸心煩悶

知母

參兩半

芍藥

黃芩

各貳兩

桂心

甘草

各壹兩半

芍藥

黃芩

各貳兩

桂心

右水五升煮取貳升半分三服

一方不用桂心
用生地黃

瘡

要產後瘡疾多由污血挾寒熱而作大法宜柴胡四物湯調之熱多者草果飲子寒多者生熟飲子產後瘡疾因脾胃虛弱飲食停滯或因外邪所感或鬱怒傷脾或暑邪所伏審係飲食用六君加桔梗蒼术藿香如外邪多而飲食少用藿香正氣散如外邪少而飲食多用入參養胃湯飲食勞役用補中益氣湯氣虛則寒血虛則熱胃虛則惡寒陰火下流則寒熱桂元氣脫陷急加附子夫凡久瘡多屬元氣虛寒蓋

交作或吐瀉不食腹痛煩渴發熱譫語或手足逆冷寒戰如慄雖見有證當峻溫補其病自退若誤用清脾截瘻之類多致不起一產婦患瘻發熱作渴胸膈脹滿遍身作痛三日不食嘔酸噫氣此是飲食所傷脾胃不能消化用六君加神麴山楂四劑而不作酸乃去神麴山楂四劑而飲食所至三十五日計進飲食七十餘碗腹始悶令用豬膽汁導而通之其糞且不甚燥一產婦患瘻久不愈百病蜂起其脉或洪大或微細或弦緊或沉伏難以名狀用六君加炮薑二十餘劑脉證稍得又用參术煎

膏佐以歸脾湯百餘劑而瘥一產婦朝寒暮熱或不時寒熱久不愈用六君子補中益氣兼服百餘劑而愈

草果飲子 治婦人產後瘻疾寒熱相半者或多熟者宜此

半夏湯泡赤茯苓 甘草炙 草果炮去皮

川芎

陳皮

白芷各貳錢

青皮去白肆錢

良薑

紫蘇各貳錢半

乾葛

肆錢

右㕮咀每服參錢水壹大盞薑參片棗貳个同煎至七分去滓當發日侵早連進三服無有不安

身

生熟飲子 治產後癟疾多寒者

肉豆蔻

草果仁

厚朴

生去粗皮

半夏

陳皮

甘草

大棗

去核

生薑

右八味等分細剉和勻一半生一半用濕綿紙裹
煨令香熟去紙與一半生者和勻每服秤伍錢重
水貳錢煎至七分食前一服食後一服
補遺產後癟疾多寒少者清脾湯 寒多熱少者
養胃湯 久而不已者七寶飲截之方並見卷二
雜病癟

蓐勞

夫產後蓐勞者此由生產日淺血氣虛弱飲食未平
復不滿日月氣血虛羸將養失所而風冷客之風冷
搏于氣血則不能溫于肌膚使之虛乏勞倦乍卧乍
起顏容憔悴飲食不消風冷邪氣而感于肺肺受微
寒故咳嗽口乾遂覺頭昏百節疼痛榮衛受于風邪
流注臟腑須臾頻發時有盜汗寒熱如瘧背膊煩悶
四肢不舉沉重着床此則蓐勞之候也 又曰婦人
因產理不順疲極筋力憂勞心慮致令虛羸喘乏寒
熱如瘧頭痛自汗肢體倦怠咳嗽痰逆腹中絞刺名

曰蓐勞

薛按前證當扶養正氣為主用六君子湯

加當歸若肺脾氣虛而咳嗽口乾用補中益氣加麥門五味若因中氣虛而口乾頭暈用補中益氣加蔓荆子若肝經血虛而肢體作痛用四物參末若因肝腎虛弱而自汗盜汗寒熱往來者用六味丸加五味子若因脾虛血弱肚腹作痛月經不調用八珍湯倍加白朮若因脾胃虛燥皮膚瘙痒用加味道遙散大抵此證多因脾胃虛弱飲食減少以致諸經疲憊而作當補脾胃飲食一進精氣生化諸臟有所倚賴其病自愈矣仍參虛煩發熱方論主治 汪一婦產科

滿月因怒氣血流如水二三百方止隨又勞苦四肢無力睡而汗出日晡潮熱口乾五心如炙諸醫皆用柴芩薄荷之類其熱愈熾診其脈弦大無力此蓐勞也以四物湯壹兩入胡黃連秦艽青蒿各半錢數服熱退身涼後以黃連八珍丸一料而安

石子湯 療產後虛羸喘乏乍寒乍熱如瘧四肢疼痛面色痿黃名曰蓐勞

豬石子

壹雙去脂膜四破

香豉

一方無此有知母

葱白

切

粳米

當歸

芍藥

各貳兩

右㕮咀分兩劑每劑用水參升煮取壹小碗去滓

三分服 廣濟無芳藥有人參

增損柴胡湯

見前來寒熱

豬腰子粥 治震勞發熱 用豬腰子壹枚去白膜切作柳葉片以鹽酒拌先用粳米壹合入葱椒煮粥鹽醋和將腰子鋪盆底以熱粥蓋之如作盦生狀空心服

虛寒人參鼈甲散 治震勞皆由在產內未滿百日體中虛損血氣尚弱失於將理或勞動作傷致成震勞其狀虛羸乍起乍卧飲食不消時有咳嗽頭目昏痛發歇無常夜有盜汗寒熱如瘧背膊拘急沉困

在床服此大效

人參

桂心

當歸

桑寄生

白茯苓

白芍藥

桃仁

麥門冬去心

熟地黃

甘草各半

續斷

貳錢半牛膝

柒錢半

鼈甲

黃芪

兩各壹

右爲細末每服先以豬腎壹對去筋膜以水兩大盞生薑半分棗參一枚煎至壹盞去豬腎薑棗然後入藥末貳錢葱白參寸烏梅壹箇荆芥伍穗煎至柒分去滓空心晚食前溫服此藥神妙

許仁則療產後日淺久坐視聽言語多或運用氣力

遂覺項、脣、肢節皮肉痛，乍寒乍熱，此爲蓐勞。

豬腎

壹雙去脂膜四坡

當歸

芍藥

生薑

各貳兩

葱白

切

桂心

各壹兩

右水捌升煮腎，取陸升下藥，煮取貳升分溫二服。

熟地黃散

見前來寒熱

白茯苓散

治蓐勞緣生產日後久坐多語運動用力致頭目四肢疼痛，熱煩，宜此方

白茯苓

壹兩當歸兩

川芎

桂心

白芍藥

黃芪

人參

各半兩

熟乾地黃

壹兩

㕮咀先以水貳盞入豬腎（治蓐勞緣生產日後久坐多語運動用力致頭目四肢疼痛，熱煩，宜此方）膜切薑片棗一枚煎壹盞去三物入藥半兩煎染分去滓食前分溫三服。

黃芪丸

往來寒熱

胡氏牡丹散

治產後虛羸發熱，自汗欲變，蓐勞或血氣所搏經候不調，或寒熱羸瘦，

白芍藥

當歸

五加皮

地骨皮

人參

各半兩

桂心

各貳錢

牡丹皮

參錢

右爲細末，每服貳錢，水酒各半盞，如不飲酒，只用

水壹盞開，用錢壹枚，麻油蘸之同煎，染分去滓，通

口服，煎不得攪喫，不得吹。

黃耆煮散

治產後蓐勞，肌膚黃瘦，面無顏色，或憎寒壯熱，四肢痠疼，心煩，頭痛。

鼈甲

醋炙

黃芪

各壹兩

桂心

當歸

炒

桑寄生

白茯苓

白芍藥

人參

熟地黃

麥門冬

去心各半兩

甘草

炙各半兩

牛膝

朱錢

右爲細末每服用豬石子壹對去脂膜切破先以
黃水壹盞入薑半分棗參枚煎至柒分去石子薑棗
却下藥伍錢更煎至肆分去滓空心晚食前溫服
二滓併煎

黃芪建中湯

治產後諸虛不足發熱或惡寒腹痛

黃芪

炒各壹兩

肉桂

各壹兩

白芍藥

炒貳兩

甘草

炒朱錢

每服伍錢薑棗水煎服日二三服虛甚者加附子
紫河車丸治勞及產後虛弱大効猫犬瘡兒卽食
其胞衣故無產疾

方見卷之四
虛勞

虛羸

產寶云產後虛羸者皆由產後虧損血氣所致須當
慎起居節飲食六淫七情調養百病保無疾若中
年及難產者毋論日期必須調養平復方可涉喧否
則氣血復傷虛羸之證作矣薛前證產傷氣血者
用八珍湯飲食傷胃者用四君子湯停食傷脾者用
六君子湯勞傷元氣者用補中益氣湯若愛氣覺有
藥味者此藥復傷胃也但用四君子湯徐徐少飲以
調脾胃若胃氣健血氣自生諸證自愈矣

丹產後補虛

人參

白术 各壹錢

黃芩

歸身尾 各伍分

川芎 半兩

陳皮 叁分

右水煎服如有寒加乾薑參分茯苓壹錢保命三元湯治產日久虛勞而脉浮大者卽小柴胡合四物也治產後日久虛勞鍼灸不効者三合散物此四君子四方合和是也

白术

川當歸

芍藥

黃芪

茯苓

熟地黃

柴胡

人參 各壹兩半

黃芩

半夏 甘草 各陸錢 川芎 壱兩
右爲粗末每服壹兩水壹鍾半煎服日三當歸羊肉湯 治產後雖無疾者但覺虛弱兼心腹痛

肥羊肉

壹斤去脂水壹斗 煮取捌片去肉

當歸 伍兩

黃芪

肆兩

生薑 陸兩

右以肉汁煮三味取貳升伍合分爲四服若覺惡露不盡加桂參兩惡露下多加芍參兩有寒加茱萸壹兩有氣加細辛貳兩有熱加生地黃汁貳合保命治產婦虛勞不能食十全散 錠十全大補湯

十全大補湯 治諸臟虧損氣血俱虛寒發熱或自汗盜汗便血吐血或大便不實飲食少思或胸腹作痛口舌生瘡或耳目不明牙齒不固

人參

白朮

白茯苓

黃芪

當歸

熟地黃

酒洗蒸焙

白芍藥

川芎

肉桂

甘草

炙各伍分

右薑棗水煎服

當歸建中湯

見前腹痛

雲岐治產後虛損飲食不下四物加建中人參白朮

茯苓主之

癥瘕太虛心腹急痛血氣上搶心氣息乏補益方

黃芪

白朮

當歸

人參

甘草

各貳兩

生薑

肆兩

先以白羊肉參斤去膜水

壹斗

升

煮肉取汁

伍升下

諸藥煮參升分三服

冷勞

大夫產

則血氣勞傷

臟腑虛弱

而風冷客之

冷

博於血氣

不能溫於肌膚

使入虛乏疲頓

致羸

損不平復

若久不平復

風冷入於子臟

則胞臟冷

使入無子

薛前證

若血氣虛弱

用入珍湯

血氣虛寒

用十全大補湯

胃氣虛弱

用補中益氣湯

脾氣虛弱

用六君子湯

命門火衰

用八味丸


肝脾血虛

用加味

哲氏

文珠五

卷之五



逍遙散 肝脾鬱怒用加味歸脾湯

產寶療產後風虛羸瘦勞弱不生肌肉

黃耆

當歸

芍藥

人參各參桂心

甘草

川芎

生薑各肆

大棗拾貳枚

右九味水半升煮參升分溫參服

療產後虛勞骨節疼痛頭痛汗不出

當歸

人參

生薑各貳兩

黃芪參兩

淡豉

參合

豬腎貳枚

梗米參合

薤白參合

右水壹半伍升先煮豬腎取陸升下諸藥者取貳升分爲參服

又方

豬腎壹雙煮入葱豉作臘如常食之

痞悶

郭問產後口乾痞悶者何答產後榮衛大虛血氣未定食麵太早胃不能消化麵毒結聚於胃腕上熏胸中是以口乾燥渴心下痞悶醫者不識認爲胸膈壅滯以藥下之萬不得一但服見覲丸則愈陳無擇評曰產後口乾痞悶未必只因食麵或產母內積憂煩外傷燥熱飲食甘肥使口乾痞悶當隨其所因調之可也心煩宜四物湯去地黃加入參烏梅煎若外傷燥熱看屬何經當隨經爲治難以備舉飲食所傷見覲丸却能作效薛前證若宿食停滯用六君子

實神麴若因肉食所致，更加山楂。若因魚鱠之類，再加陳皮。其物既消，而仍痞，或反作痛，作嘔。此脾胃受傷，用六君子湯，或燕酸凌腐，加炮薑，作瀉，更加升麻。如不應，佐以四神丸。或間用補中益氣湯。一婦人食角黍，煩渴痞悶，腹痛大便欲去，不去服消導之藥，不應。飲食日減，肌體日瘦，半年矣。余謂此食積爲患，用大酒麴炒爲末，溫酒調服，貳錢俄而腹鳴，良久，仍下粽而愈。一婦人食魚鮓，腹痛患痢，諸藥不應。用陳皮白朮等分，爲末，以陳皮湯送下數劑而愈。見現丸。

薑黃

炒

三稜

醋炒

草澄茄

陳皮

去白

良薑

人參

蓬莪茂

酒炒各等

右爲細末，用蘿蔔搗爛，絞取汁，煮麵糊丸，如梧子大，每服叁拾丸，蘿蔔湯下。白湯亦可。

腹脹

郭 產後腹脹滿悶吸吐不定者何咎曰敗血散於脾胃受之則不能運化精微而成腹脹胃受之則不能受納水穀而生吐逆醫者不識若以尋常治脹止吐藥治之病與藥不相干轉更傷動正氣疾愈難矣但服抵聖湯則愈薛前証若敗血傷於脾胃宜用前方若飲食停於脾胃用六君厚朴若飲食傷於胃宜用六君子湯大凡損其脾胃當節某飲食為善一產婦患前証或用抵當湯敗血已下前証益甚小腹重脹似欲去後余謂此脾氣虛而下陷用


補中益氣湯加炮姜溫補脾胃，重陰如失，又用八君子湯而安。

抵聖湯入生姜半兩，焙乾水煎。方見胎前腹脹。薛氏云此方最宜用之。

局方平胃散加入參亦可。

水腫

郭產後四肢浮腫者，敗血乘虛停積循經流入四肢，留溼日深，却還不得腐壞如水，故令面黃四肢浮腫。醫人不識便作水氣治之，凡治水多用導水藥，極虛入大產後既虛又以藥虛之，是謂重虛，往往多致枉枉。但服小調經散，血行腫消則愈。陳無擇曰：產後浮腫多端，有自懷妊腫至產後不退者，亦有產後失於將理外感寒暑風濕內則喜怒憂驚，血與氣搏，留滯經絡，氣分血分不可不辨，要當隨所因脉證治之，宜得其情，小調經散治血分固効，但力淺難憑，不若



吳茱萸湯枳术湯奪魂散大調經散皆要藥也 又論曰夫產後勞傷血氣腠理虛則爲風邪所乘邪搏於氣不得宣越故令虛腫輕浮是邪搏於氣氣腫也若皮膚如熟李狀則變爲水腫氣腫者發汗即愈水腫者利小便差也 紹古如產後風寒在表面目四肢浮腫宜局方七聖丸白湯下日加以利爲度 如浮腫至膝端嗽加木香檳榔倍之謂氣多也 如浮腫又頭痛昏冒加羌活川芎謂風多也 如只浮腫止七聖丸本方服 東垣中滿分消丸雜病用四物湯吞之 丹產後腫必用大補氣血爲主少佐以蒼朮

木茯苓使水自利 薛前證若寒水侮土宜養脾而若氣虛浮腫宜益脾胃若水氣浮腫宜補中氣當參雜證本門主治 一產婦飲食少思服消導之劑四肢浮腫余謂中氣不足朝用補中益氣湯夕用六君子湯而愈後因怒腹脹誤服沉香化氣丸吐瀉不止飲食不進小便不利肚腹四肢浮腫用金匱加減腎氣丸而愈 二產婦泄瀉四肢面目浮腫喘促惡寒余謂肺脾虛寒用六君子裏桂而泄瀉愈用補中益氣而脾胃健 杜張宣徽侍寵產後半月忽患浮腫急看產科醫治經半月不差病勢轉劇召杜治之杜

至曰諸醫作何病張曰皆云水氣浮腫杜白非也且水氣發咳嗽小便澁是也今憂寵小便不澁不作咳嗽惟手足寒乃血藏虛氣塞不通流而生浮腫遂用益血和氣藥治之旬日病去七八經半月全愈所用之藥乃靈苑方牡丹散也其方云治血藏風虛冷今產科家多用此藥治產後諸病如神更名損金湯者是也見血量牡丹散一婦產後四肢浮腫寒熱往來盜因敗血流入經絡滲入四肢氣喘咳嗽胸膈不利口吐酸水兩脇疼痛遂用旋覆花湯微汗漸解頻服小調經用澤蘭梗煎湯調下腫氣漸消

行山

寒熱

小調經散

大調經散

治產後腫滿喘急煩渴小便不利

利尿後

小調經散

大調經散

治產後腫滿喘急煩渴小便不利

利尿後

行氣

漆如此填滿用鹽泥固濟火煅通赤放冷研爲散
但是產後諸疾熱酒調下貳錢

利水

行氣

經云產後肌浮柑皮酒服

橘皮爲未每服貳錢酒調出

白术湯 治心腹堅大如盤邊如旋盤水飲所作名

曰氣分

枳實 壹兩半

白术 參兩

丹婦人產後浮腫小便少口渴惡寒無力脉皆沉此
右哎咀每服肆錢水壹盞半煎至七分去滓溫服
腹中更節當散也

氣可也

白术 貳兩半

陳皮 壹兩

川芎 半兩

木通 陸錢

茯苓 參錢

右用米煎下與點丸貳拾伍丸

黃芩爲未粥丸名與點丸亦名清金丸

奪魂散

治產後虛腫喘促利小便則愈

生薑 參兩

白麪 參兩

大半夏 尖枚

右以生薑汁搜麵裹半夏爲七餅子煨焦熟爲末
水調壹盞小便利爲効

張氏方治產後血虛風腫水腫

澤蘭葉

防已 等分

產後水腫

女科五

經

右爲末每服貳錢溫酒調下不飲者醋湯調亦可
漢防已散此藥虛人戒服

漢防已

緒苓

枳殼

桑白皮各壹兩

商陸

甘艸錢半

右爲粗末每服肆錢水壹盞半薑參片煎至柒分
去滓空心溫服

七聖丸

雜病大便不通

加減吳茱萸湯

治婦人臟氣本虛宿挾風冷胸膈
滿痛腹脇絞刺嘔吐惡心飲食減少身面虛浮惡
寒戰慄或泄瀉不止少氣羸困及因生產藏氣暴

虛邪冷內勝宿疾轉增

吳茱萸壹兩

苦梗

乾薑

甘草

麥門冬

防風

半夏

細辛

當歸

赤茯苓

牡丹皮

桂心各半兩

右爲粗末每服肆錢水壹盞半煎至柒分去滓食
前熱服

金匱加減腎氣丸

方見雜病水腫

加味八物湯 治產後遍身浮腫氣急潮熱

人參

白茯苓

熟地黃

利小便
寒治風

七聖丸

雜病大便不通

加減吳茱萸湯

治婦人臟氣本虛宿挾風冷胸膈
滿痛腹脇絞刺嘔吐惡心飲食減少身面虛浮惡
寒戰慄或泄瀉不止少氣羸困及因生產藏氣暴

產後水腫

妇科五

小蠶香

各參錢

白术

川芎

各肆錢

當歸

黃芩

柴胡

各壹錢

右剉散分作六七服每服水壹鍾半薑參片煎至

柒分空心熟服盡此藥方服調經丸

各參錢

若嘔吐惡心加良薑砂

延胡索乾漆枳殼

各參錢

若腹痛加良薑砂

仁

各貳錢

若嘔吐惡心加良薑砂

半錢

若咳嗽加

五味子欵冬花杏仁

積聚

血瘕卽兒枕宜參看

大夫積者陰氣也五臟所生聚者陽氣也六腑所成皆由飲食不節寒熱不調致五臟之氣積六腑之氣聚積者痛不離其部聚者其痛無有常處所以然者積爲陰氣陰性沉伏故痛不離其部聚爲陽氣陽性浮動故痛無常處產後血氣傷于臟腑臟腑虛弱爲風冷所乘搏於臟腑與血氣相結故成積聚癥塊也薛前證乃真氣虧損邪氣乘之况產後得之尤當固真氣爲主若求旦夕之効而攻其邪則速其危矣當於前雜證積聚諸方論治之一產婦腹中似有

一塊或時作痛而轉動按之不痛面各癢黃痛則眩
白脈浮而濡余謂此肝氣虛而血弱也不信乃用破
血行氣痛益甚轉動無常又認以爲血鼈專用破血
驅逐之藥痛攻兩脇肚腹尤甚益信爲鼈確服下蟲
等藥去血甚多形氣愈虛肢節間各結小核隱於肉
裏以爲鼈子畏藥而走於外余曰用藏血而養諸筋
此因肝血復損筋洞而攀結蓋肢節胸項皆屬肝
膽部分養其脾土補金水以滋肝血則筋自舒遂用
八珍湯逍遙散歸脾湯加減調治而愈一婦月經
不調兩拗腫脹小便滯滯腹中一塊作痛或上或脇
八珍湯逍遙散歸脾湯加減調治而愈

腹或卜攻小腹發熱晡熱惡寒肌膚消瘦飲食無味
殊類瘵證久而不愈余謂肝脾血氣虧損用八珍湯
逍遙散歸脾湯隨證互服而愈

夫新產後有血與氣相搏而痛者謂之瘕瘕之言假
也謂其痛浮假無定處也此由夙有風冷血氣不治
至產血下則少故致此病也不急治則多成積結妨
害月水輕則否澁重則不通也薛前證乃寒邪乘
客氣血壅結此因氣病而血病也當補養胃氣調和
月經寬緩靜養爲善難經云任脉之病男子爲七疝
女子爲瘕聚當參前後各論治之

丹南山婦人年三十八於九月二十三日月經行比
前過後十日得草藥以收血海爲下胎之謀有數滴
血下因此腹痛在小腹下有塊如碗大不可按湯熨
則痛稍定太小便抽痛小便澁太便略下少赤積垢
食不進口略渴發熱此胃氣爲草藥所敗加以受傷
之血妄行而不得洩所以爲病也

砂仁

廿艸炙

川芎

黃芩各參分

滑石壹錢半

牛膝貳錢

桃仁

米粒

右水酒煎服

芍藥湯

保命

治產後諸積不可攻宜養陰去熱其病自

安

芍藥

各一錢

黃芩

各陸兩

右剉散每以半兩水煎溫服日三

開產後消血塊

滑石

參錢

沒藥

各一錢

血竭

錢

各一錢

右爲細末醋糊丸如惡露不下以五靈脂爲細末

麵糊丸白术湯陳皮湯任下

又方消血塊

香附

童便浸

桃仁

大等分

爲末醋糊丸

治血瘕作痛脣下脹滿或月經不行發熱體倦

生後積聚

當歸 貳兩 桂心

芍藥 炒

血竭

蒲黃 炒各壹兩半

延胡索 炒壹兩

右爲末每服貳錢空心執酒調下
葛氏方治證同前 桂心爲末每服壹錢空心酒調下
產寶療血痕痛無定處

童便

參升

生地黃汁

生薑汁 各壹升

右先煎前三味約三分減一
次下薑汁慢火煎如稀餳每服取壹合暖酒調下
千金療血痕

生薑汁

參升

生地黃汁

生薑汁 各壹升

生乾地黃

壹兩

烏賊魚骨

貳兩

右爲細末空心溫酒調服貳錢匕

四神散 治產後瘀血不消積聚作塊心腹切痛
川芎

當歸

去蘆

乾薑

炮

赤芍藥各等分

右爲細末每服貳錢食遠用溫酒調服

桂心丸 治產後血氣不散積聚成塊上攻心腹或
成寒熱四肢羸瘦煩疼

桂心


當歸

赤芍藥

牡丹皮

沒藥

檳榔 各半兩



青皮

乾漆

炒烟盡各半錢

大黃

桃仁

去皮尖酥炙

三稜

煨

玄胡索

右爲細末，煉蜜和丸梧子大，每服參肆拾丸，食前用溫酒送下。

霍亂

大產後霍亂氣血俱傷，臟腑虛損或飲食不消觸冒風冷所致，陰陽不順，清濁相干，氣亂於腸胃之間，真邪相搏，冷熱不調，上吐下痢，故曰霍亂也。經一渴而飲水者，五苓散寒多不飲水者，理中丸太段虛冷者加附子來復丹亦妙。薛一產婦停食霍亂用藿香正氣散之類已愈後，胸腹膨脹飲食稍過即嘔吐或作瀉，余謂此脾胃俱虛，用六君子湯加木香治之漸愈。後因飲食失調，兼恚怒，患霍亂，胸腹大痛，手足逆冷，用附子散又用八味丸以補土母，而康設泥痛無

補法而用辛散或用平補之劑必致不起。一產婦吐瀉嘸酸面白浮腫此脾氣虛寒先用六君加炮薑爲主佐以越鞠丸而嘸酸愈又用補中益氣加茯苓半夏而脾胃康。

白术散 治產後霍亂吐利腹痛煩渴手足逆冷

白术
乾薑

橘紅

人參各壹兩

麥門冬去心半兩

爲粗末每服肆錢水壹盞生薑伍片煎去滓溫服溫中散 治產後霍亂吐瀉不止

人參

白术

當歸

草豆蔻仁

乾薑

厚朴壹兩半製

右爲粗末每服叁錢水煎服

附子散 治產後霍亂不止手足逆冷

附子炮

白术

當歸

吳茱萸洗

桂心

人參

丁香

橘紅

甘草

各半兩

右爲細末每服貳錢粥飲調下不拘時

高良薑散 治產後霍亂吐利腹中疼痛

良薑

當歸

草豆蔻仁

右等分爲細末每服貳錢用粥飲調下

右二方非真寒不可用

局方參苓白朮散療產後霍亂吐利身熱帶渴者良

方見雜病泄瀉

若吐逆不受湯藥以伏龍肝細末參錢米湯調下卽

受餘詳雜病霍亂門

嘔吐

因夫胃爲水穀之海水穀之精以爲血氣榮潤臟腑
因產則臟腑傷動有時而氣獨盛者則氣乘腸胃腸
胃燥澀其氣則逆故嘔逆不下食也 薛前證若因
飲食過時用四君子湯飲食過多用六君子湯飲食
過時而兼勞役用補中益氣若因飲食停滯用人參
養胃湯脾胃氣虛用六君子湯胃氣虛寒加炮薑木
香寒水侮土用益黃散肝木侮脾土用六君升麻柴
胡命門火衰不能生土用八味丸嘔吐泄瀉手足俱
冷或肚腹作痛乃陽氣虛寒急用附子理中湯多有

生者一產婦朝吐痰夜發熱晝夜無寐或用清痰降火肥體日瘦飲食日少前證愈甚余曰早間吐痰脾氣虛也夜間發熱肝血虛也晝夜無寐脾血耗也遂用六君子湯加味道遙散加味歸脾湯以次調理而痊

開胃散 治產後胃氣不和嘔吐不止全不納食宜服此

詞子肉

壹兩半

人參

壹兩

甘草

半兩

右三味爲細末別以半夏半分生薑壹分薤白貳
半莖水壹大盞煎至陸分去滓分爲兩服

產後嘔逆不正

鄧知縣傳

橘紅

壹兩

半夏麴

甘草

各半兩

霍香

參兩

右爲細末每服貳錢水壹錢半薑薑片煎至陸分溫服無時

治產後更無他疾但多嘔逆不能食

白朮

壹兩半錢半

生薑

壹兩半

右細切酒水各貳升煎取壹升分參服

產後嘔逆不已四君子湯加陳皮半夏藿香砂仁

石蓮散 治產後咳逆嘔吐心怔目暉

石蓮子

去殼丙半

白茯苓

壹兩

丁香

伍錢

右爲細末米飲調服參錢無時
內熱嘔吐服前藥不効者以枇杷葉

蜜炙去毛

茅根各伍

錢前濃湯入蘆根汁半盞和勻服

雲參

參頭

甘草

一兩

吃逆

大夫肺主氣五臟六腑俱稟於氣產後則氣血傷臟腑皆損而風冷搏於氣氣則逆上而又脾虛聚冷胃中伏寒因食熱物冷熱氣相衝擊使氣厥而不順則吃逆也脾者主中焦爲三焦之關五臟之倉廩貯積水穀若陰陽氣虛使榮衛氣厥逆則致生斯病也經云吃意者胃寒所生服藥無効者灸期門參壯必愈期門穴乃胃之太絡薛前證屬胃氣虛寒之惡候如用後方未應急投參附湯亦有復生者

參附湯

見前自汗

雜後吃逆

收計五

篇之五

丁香散 治產後心煩咳嗽不止

丁香

白豆蔻仁各半兩 伏龍肝壹兩

右爲細末前桃仁吳茱萸湯調下壹錢如火行五

里再服

石蓮散

見嘔吐

產寶療產後吃逆三百不正欲死方

桂心

半兩

薑汁

六合合

右同煎取貳合以大火炙手摩背熟時塗藥汁盡妙

治產後吃逆方 用乾柿壹枚切碎以水壹盞煎至

陸分熱呷之

又方 古壁鏡窠參肆個水壹小盞煎至半小盞熟

服

羌活散靈芝花

羌活

附子炮

懷香炒各半兩

木香

白薑炮各貳錢半

右五味爲末每服貳錢水壹盞鹽壹捻煎拾數沸熟服一服止

補遺治產後吃逆橘皮湯及大小橘皮湯皆効

右諸方當審寒熱虛實用之如寒者宜丁香薑桂

產後口文
女科五
百草
熱者宜乾柿竹茹實者宜香附橘皮虛者宜人參
甚則附子佐之誤施則有礙脣之悔慎之

木香
白薑
橘子
薑香

咳嗽

大夫肺者主氣因產後血虛肺經一感微邪便成咳嗽或風或熱或寒或濕皆令人咳嗽也若產後喫鹽太早而咳嗽者難治產後血氣不通咳嗽者何咎曰產後咳嗽多因食熟麵壅納或熱病或有氣塊發時衝心痛氣急咳嗽四肢寒熱心悶口乾或時煩躁睡夢驚悸氣虛肢體無力宜服局方黑神散五積散加棗煎服薛產後咳嗽或因陰血耗損或因肺氣鬱傷或陰火上炎或風寒所感主治之法若陰血虛者用等歸熟地參术肺氣傷者用四君等歸桔梗陰

卷之五
大經五
火炎者六味地黃加參水風寒所感者補中益氣
加桔梗紫蘇若瘀血入肺發喘急用一味參蘇飲多
有得生者若兼口鼻起黑或鼻出血急用前飲亦有
得生者然而所患寒因胃氣不足蓋胃為五臟之根
本人身之根蒂胃氣一虛五臟失所百病生焉但患
者多謂腠理不密所致殊不知肺屬辛金生於巳土
亦因土虛不能生金而腠理不密外邪所感其陰火
上炎亦壯土金生腎水以制火為善若逕治其病則
誤矣
產婦咳嗽聲重鼻塞流涕此風寒所感用
參蘇飲一鍾頓愈六七乃與補中益氣加桔梗茯苓

半夏三劑而痊又與六君加黃芪以實其腠理而安
一座婦咳嗽痰盛面赤口乾內熱晡熱徹作無時
此陰火上炎當補脾胃遂用補中益氣湯六味地黃
丸而愈
一產婦咳而腹滿不食涕唾面腫氣逆此
病在胃關於肺用異功散而愈

旋復湯

卽旋復花湯見喘

知母飲 治產後惡露上攻流入於肺經咳嗽宜服
此藥若傷風痰嗽却以尋常傷風藥主治一名母散

知母

貝母

白芍苓

人參各貳錢

桃仁

杏仁並生去皮各壹錢

產後

外科五

百四

百四

右作一服水貳錢煎至壹鍾食後服

集驗療產後感風傷寒咳嗽多痰垂粘

甘草

苦梗各半

桑冬花壹兩

生麥門冬

生地黃各參

葱白壹捲

豉

舊方無葱白與豉

右咬咀水貳升煮取捌合去滓食後分兩服

經効療咳嗽多痰垂粘氣急

前胡

五味子

紫苑

貝母各壹兩半

桑白皮

茯苓各貳兩

淡竹葉貳拾片

右咬咀水貳升煎取捌合去滓食後分兩服

療產後咳嗽氣喘

百部根

苦梗各陸分


桑白皮貳拾分

乾百合

赤茯苓各捌分

右咬咀水貳升煮取柒合去滓食後分兩服

自製噙化丸見前雜病咳嗽



Kitasato Memorial Medical Library