


女科證治準繩

五之四

✕
n 44

Kitasato Memorial Medical Library

F 17
シ-131



喘 鼻衄 血崩 月水不調

月水不通 活利 赤白利 大便秘澀

大小便不通 遺尿 淋 小便數 尿不禁

小便出血 大便下血 陰脫 玉門不閉

陰蝕 乳少

490.9
50-3
17
No 3182 117 44

喘

翼產後喘極危多死也 郭產後喉中氣急喘促者
何荅曰榮者血也衛者氣也榮行脉中衛行脉外相
隨上下謂之榮衛因產所下過多榮血暴竭衛氣無
主獨聚肺中故令喘也此名孤陽絕陰為難治若惡
露不快敗血停疑上熏於肺亦令喘急但服奪命丹
胞衣血去喘自定 陳無擇評曰產後喘急固可畏
若是敗血上熏於肺猶可責効奪命丹若感風寒或
因憂怒飲食鹹冷等奪命丹未可均濟况孤陽絕陰
乎若榮血暴絕宜大料煮芩藹湯亦可救傷風寒宜

產後喘 女科 百五

旋覆花湯性理鬱發宜小調經散用桑白皮杏仁煎湯調下傷食宜服見睨丸五積散芎藭湯薛前證若脾肺氣虛弱用六君桔梗若兼外邪更加紫蘇若中氣虛寒用補中益氣加炮薑肉桂若陽氣虛脫更加附子若瘀血入肺急用二味參蘇飲一產婦喘促自汗手足俱冷常以手護臍腹此陽氣虛脫用參附湯四劑而愈浦江吳輝妻孕時足腫七月初旬產後二月洗浴即氣喘但坐不得卧者五個月惡風得暖稍寬兩關脈動尺寸皆虛百藥不効用牡丹皮杏仁桂枝茯苓乾薑枳實厚朴桑白皮紫蘇五味瓜

血氣

芫荽煎湯服之即寬二三服得卧其痰如失蓋作活血感寒治之也血竭散治產後敗血衝心胸滿上喘命在須臾宜服

真血竭如無紫礦代沒藥

右等分研細頻篩再研取盡為度每服貳錢用童便合好酒半大盞煎一沸溫調下方產下一服上床良久再服其惡血自循經下行更不衝上免生百病

雲岐參蘇飲治產後血入於肺面黑發熱而欲死者

人參 壹兩
蘇木 貳兩

右以水兩碗煮取蘇木壹碗以下去查調參末隨時加減服神效

表 旋覆花湯 治產後傷風寒喘咳嗽痰涎壅盛坐臥不安

旋覆花 赤芍藥 荆芥穗

半夏麴 前胡 甘草

茯苓 五味子 杏仁去皮炒

麻黃各等分 一方芍藥茯苓多一倍

右以水兩碗煮取蘇木壹碗以下去查調參末隨時加減服神效

裏 至柒分去滓食前温服有引者ハ不宜服
若傷鹹冷飲食而喘者宜見現丸見前
五味子湯 治產後喘促脉伏而厥

五味子杵炒 人參 杏仁各貳錢

麥門冬去心 陳皮各壹錢

右薑叁片棗貳枚水煎服

大補湯 治產後百白外面青浮腫唇白氣急有汗乃太虛之證急宜服此

當歸頭 大川芎 大白朮

白芍藥 白茯苓多 人參多

產後 女科 五 百五十五

黃芪 多 五味子 熟地黄

乾薑 上下 甘艸 少

右剉散水煎服此二貼不退即加川烏木香另磨入服 有瀉加訶子肉豆蔻栗殼

木香 訶子 肉豆蔻 栗殼 川烏 木香 另磨 入服 有瀉 加訶子 肉豆蔻 栗殼

鼻衄

郭產後口鼻黑氣起及鼻衄者何答曰陽明者經脈之海起於鼻交頰中還出頰口交人中左之右右之左產後氣虛血散榮衛不理散亂入於諸經却還不得故令口鼻黑氣起及變鼻衄此緣產後虛熱變生此證胃絕肺敗不可治 經驗方云急取緋線壹條并產婦頂心髮兩條緊繫中指節上即止無藥可治亦禳厭之一端也 薛按胃脈俠口繞承漿蓋鼻隼屬脾土鼻孔屬肺金誠胃虛肺損氣脫血死之證急用三味參蘇飲加附子五錢亦有得生者 汪一婦

產後 鼻衄 女科 五 百五十五

產後血逆上行鼻衄口乾心躁舌黑蓋因瘀血上升
遂用益母丸貳丸童便化下鼻衄漸止下血漸通

產後血逆上行鼻衄口乾心躁舌黑蓋因瘀血上升
遂用益母丸貳丸童便化下鼻衄漸止下血漸通

血崩

陳產後血崩者何答曰產卧傷耗經脉未得平復勞
役損動致血暴崩淋瀝不止或因酸鹹不節傷毒榮
衛衰弱亦變崩中若小腹滿痛肝經已壞為難治急
服固經丸以止之陳無擇評曰血崩不是輕病况
產後有此是謂重傷恐不止鹹酸不節而能致之多
因驚憂恚怒臟氣不平或產後服斷血藥早致惡血
不消鬱滿作堅亦成崩中固經丸自難責效不若大
料煮芎藭湯加芍藥候定續次隨證諸藥治之為得
薛前證若血滯小腹脹滿用失笑散血少小腹虛

瘡等驚湯肝火血妄行加味道遙散脾鬱不統血加
 味歸脾湯脾氣虛不攝血補中益氣湯厚味積熱傷
 血清胃散加槐花風熱相搏傷血四君子防風枳殼
 一產婦血崩小腹脹痛用破氣行血之劑其崩如
 湧四肢不收惡寒嘔吐大便頻瀉余用六君加炮黑
 乾薑四劑稍愈又以十全大補三十餘劑而痊
 產婦血崩因怒其血如湧什地口噤目斜手足抽搦
 此肝經血耗生風余用六味丸料一劑諸證悉退但
 食少晡熱佐以四君柴胡牡丹皮而愈
 固經丸

艾葉

赤石脂煨

補骨脂炒

木賊各半兩

附子壹枚炮

右為末陳米飯和丸如梧子大每服貳拾丸食前
 溫酒下米飲亦可

共驚湯加芍藥方

艾葉

當歸

芍藥各等分

右咬咀每服肆錢水壹盞半煎至柒分去滓熱服
 無時

熟乾地黄散治產後崩中頭自旋運神思昏迷四肢
 煩亂不知人事

熟乾地黄 伏龍肝 黃芪

赤石脂各壹兩 阿膠 甘草

白朮 艾葉炒 川芎

人參各半兩 當歸柴錢半

右以咀每服肆錢水壹盞半薑參片煎至柒分去

滓温服

白芍藥散 治產後崩中下血淋瀝不絕黃瘦虛損

白芍藥 牡蠣 乾薑

熟乾地黄 桂心 黃耆

烏賊魚骨 鹿角膠 龍骨各壹兩

右為末每服貳錢食前温酒下

又方

鹿茸 赤石脂 熟地黄各壹兩

右為細末食前以粥飲調下貳錢

阿膠丸 治產後崩中下血不止虛羸無力

阿膠 赤石脂各壹兩半 續斷

川芎 當歸 甘草

丹參各壹兩 龍骨 鹿茸酥炙

烏賊魚骨 鼈甲炙各貳兩

右煉蜜丸如梧桐子大空心温酒下貳參拾丸

芎藭酒 治產後崩中下血不止 芎藭壹兩半以

酒貳盞煮取壹盞去滓分溫三服食前

瑞蓮散 治產後惡血崩漏狀如泉

瑞蓮百枚燒存性 棕櫚燒存性 當歸

桂心兩各壹 鯉魚鱗燒 川芎各半 檳榔貳枚

右為細末每服叁錢煨薑酒調下如未止更進一

服或非時血崩無藥可治但進三服即止

補遺治產後血崩 香附子炒赤貳兩 蓮蓬殼伍枚燒存性

右為末米飲調下貳錢

產後血崩素有熱者奇効四物湯良方見血崩

月水不調

大產後月水不調者由產傷動血氣虛損未復而風邪冷熱之氣客於經絡乍冷乍熱冷則血結熱則血消故令血或多或少或在月前或在月後故名不調也 產前證若過期而作痛者氣血俱虛也八珍加柴胡丹皮不及期而來血熱也四物山梔柴胡將來而作痛者血實也四物加桃仁紅花過期而來者血虛也四物加參朮紫黑成塊者血熱也四物加炒梔炒連丹皮作痛而色淡者痰多也四物合二陳治當臨證制宜 一產婦月經不調內熱燥渴服寒涼之

劑血更如崩腹脹寒熱作嘔少食用六君子二十餘劑諸病悉愈以加味道遙散調理而安

琥珀散 治產後經脈不調四肢痲疼飲食全少且

漸羸瘦

琥珀

牛膝

生乾地黄

當歸 各壹兩

桃仁

赤芍藥 各半兩

右為粗末每服參錢水壹盞薑參片煎至陸分去滓服

薑黃丸 治產後虛之不足胸心短氣腹內緊急腰

背疼痛月水不調食少煩渴四肢無力

薑黃

當歸

熟地黄

牡丹皮

厚朴 製

桂心

川芎

續斷

菴仁

白朮 各壹兩

赤芍藥

水香 各柒錢半

羚羊角屑 貳錢半

右為細末煉蜜丸如梧子大每服參拾丸食前溫酒下

產後 卷之五 五
是少壯血盛之人注受極易產乳必衆其子失乳必
四肢疰羸壯火青筋頭大髮焦好啖泥土病名無辜
若經血有餘者不可以藥止之若產後一二歲月經
不通而無疾苦何必服藥或勞傷氣血衝任脉虛氣
血衰少而不能行者但服健脾胃資氣血之藥自然
通行若用牛膝紅花蘇木乾漆蜜蟲水蛭等藥以通
之則爲害滋大經水枯竭則無以滋養其能行乎初
虞世所謂譬猶索萬金於乞丐之手雖捶楚並下而
不可得也後之學者更宜詳審而療之

薛前證

胃虛弱用六君子湯若兼鬱火傷脾用歸脾湯加丹
皮山梔若怒火傷血宜用四物合小柴胡氣血俱虛
用八珍牡丹皮仍參前論主之 一產婦月經年餘
不通內熱晡熱服分氣丸經行不止惡寒作渴食少
倦怠胸滿氣壅朝用加味道遙散夕用四君子湯月
許諸證稍愈佐以八珍湯兼服兩月而愈
以上三證宜於調經門中參看通用

產後腹痛及瀉利者何答曰產後腸胃虛怯寒邪
易侵若未滿月飲冷當風乘虛襲留於育膜散於腹
脇故腹痛作陣或如錐刀所刺流入大腸水穀不化
洞泄腸鳴或下赤白眩脇填脹或痛走不定急服調
中湯立愈若醫者以為積滯取之禍不旋踵謹之謹
之陳無擇評曰產後下痢非止一證當隨所因而
調之既云飲冷當風何所不至寒熱風濕本屬外因
喜怒憂思還從內性况勞逸飢飽皆能致病若其洞
泄可服調中湯赤白滯下非此能愈各隨門類別有

瀉利

郭產後腹痛及瀉利者何答曰產後腸胃虛怯寒邪
易侵若未滿月飲冷當風乘虛襲留於育膜散於腹
脇故腹痛作陣或如錐刀所刺流入大腸水穀不化
洞泄腸鳴或下赤白眩脇填脹或痛走不定急服調
中湯立愈若醫者以為積滯取之禍不旋踵謹之謹
之陳無擇評曰產後下痢非止一證當隨所因而
調之既云飲冷當風何所不至寒熱風濕本屬外因
喜怒憂思還從內性况勞逸飢飽皆能致病若其洞
泄可服調中湯赤白滯下非此能愈各隨門類別有

薛產後瀉痢或因飲食傷損脾土或脾土虛不能消食當審而治之若米食所傷用六君加穀蘖若麵食所傷用六君加麥蘖若肉食所傷用六君加山查神麩凡兼嘔吐皆加藿香若兼燕酸或嘔吐用前藥送越鞠丸若肝木來侮脾土用六君加柴胡炮薑若寒水及來侮土用錢氏益黃散若久瀉或元氣下陷兼補中益氣湯以升發陽氣若瀉痢色黃乃脾土真氣宜加木香肉果若脾土虛寒當用六君子加大香薑桂若脾腎虛寒用補中益氣及四神丸若屬命門火衰而脾土虛寒用八味丸以補土母若小便

瀦滯肢體漸腫或兼喘咳用金匱腎氣丸以補脾腎利水道若胃氣虛弱而四肢浮腫治須補胃為主若久而不愈或非飲食所傷而致乃屬腎氣虧損蓋胞胎主於任而繫於腎况九月十月乃腎與膀胱所養必用四神六味八味三藥以補腎若用分利導水之劑是虛其虛也一產婦瀉痢發熱作渴吐痰甚多肌體消瘦飲食少思或胸膈痞滿或小腹脹墜年餘矣余以為脾胃瀉朝用三神丸夕用六君子三月餘而痊一婦產後泄瀉兼嘔吐燕酸面目浮腫此脾氣虛寒先用六君加炮薑為主佐以越鞠丸而燕酸

愈又用補中益氣加茯苓半夏而脾胃康。一產婦
瀉利年餘形體骨立內熱晡熱自汗盜汗口舌糜爛
日吐痰三碗許脈洪大重按全無此命門火衰脾土
虛寒而假熱吐痰者乃脾虛不能統攝歸源也用八
味丸補火以生土用補中益氣湯兼補肺金而脾胃
健。一產婦腹痛後重去痢無度形體倦怠飲食不
進與死為鄰此脾腎俱虛用四神丸十全大補湯而
愈但飲食難化肢體倦怠用補中益氣湯而康。一
婦人五月患痢日夜無度小腹墜痛發熱惡寒用六
君子湯送香連丸二服漸愈仍以前湯送四神丸四

服全愈至七月終怠惰嗜臥四肢不收體重節痛口
舌乾燥飲食無味大便不實小便頻數洒淅惡寒悽
慘不樂此肺之脾胃俱虛而陽氣寒不伸也用升陽
益胃湯而痊。汪石山治一婦產後滑泄勺水粒米
弗容時即泄下如此半月餘眾皆危之或用五苓散
平胃散病益甚汪診之脈皆濡緩而弱曰此產中勞
力以傷其胃也若用湯藥愈滋胃濕非所宜也今以
參苓白朮散除砂仁加陳皮肉豆蔻煎薑棗湯調服
旬餘而安。汪石山治一婦產後滑泄勺水粒米
弗容時即泄下如此半月餘眾皆危之或用五苓散
平胃散病益甚汪診之脈皆濡緩而弱曰此產中勞
力以傷其胃也若用湯藥愈滋胃濕非所宜也今以
參苓白朮散除砂仁加陳皮肉豆蔻煎薑棗湯調服
旬餘而安。

丹治產後泄瀉惡露不行此餘血滲入大腸為瀉洞

泄不禁下青白黑色用荆芥大者肆伍穗於盞內燒
灰不得犯油火入麝香研湯三呷調下此藥雖微能
治人病方名的
奇散下
產後泄方

茯苓

川芎

黃芩

白朮

乾薑

滑石

陳皮

芍藥

炒各

右水煎服之

調中湯

高良薑

當歸

桂心

芍藥

附子

川芎

甘草

半兩

炮

各壹兩

右為粗末每服參錢匕水盞盞煎至壹盞去滓熟
服

右方惟寒中洞泄者宜之其腸胃有熱者當服黃
連而愈如金丸香連丸之類若戊巳丸固腸丸
四神丸五味子丸之類皆產後大便不實必用之
藥已詳載雜病及前泄瀉門中茲不贅引

產後諸症... 腹痛... 惡露... 崩漏... 帶下... 胎前產後... 婦科... 卷五... 百六十四

赤白痢

大產後痢疾者由產勞傷臟腑不足日月未滿虛乏未復或勞動太早或誤食生冷若行起太早則外傷風冷乘虛入於腸胃若誤食生冷難化之物傷於脾胃皆令洞泄水瀉甚者變為痢也若血滲入大腸則為血痢難治世謂之產子痢也得冷則白或如魚腦得熱則赤黃或為驟血若冷熱相搏則下痢赤白或膿血相雜若下痢青色則極冷也若飲食不進便利無常日夜無度產後本虛更加久痢不止無力瘦乏愈見羸弱謂之虛羸下痢又有產後氣宇不順而下

產後赤白痢

痢赤白謂之氣痢治之之法熱則涼之冷則溫之冷熱相搏則調之滑者澁之虛羸者補之水穀不分者當利小便若產婦性情執著不能寬解須當順其氣未有不妥者也薛前證白屬氣分而赤屬血分也其論詳見瀉利一產婦食雞子腹中作痛面色青黃服平胃二陳更下痢腹脹用流氣飲子又小腹一塊不時上攻飲食愈少此脾胃虛寒肝木尅侮所致用補中益氣加木香吳茱漸愈又用八珍大補兼服調理尋愈一婦產後痢未至月滿因食冷物及酒冷熱與血攻擊滯下純血纏墜極痛其脉大無力曰

乾用黃芩芍藥湯三服而安

熊治產後赤白痢證用四君子湯加黃耆粟殼神效雲救急散治產後赤白痢腹中絞痛

芍藥

阿膠

艾葉

熟地黄各壹兩

甘草

當歸各叁兩

右咬咀水煎分二服空心飲

大當歸芍藥散治妊娠腹中絞痛心下急痛及療產後血暈崩中久痢方見血崩

療妊娠血痢用阿膠貳兩以酒壹升半煮壹升頓服產後諸痢者薤白食之又方羊腎脂炒薤白空心

食之甚佳

經治產後胎前痢疾敗龜甲壹枚米醋炙研為末醋

湯調下丹溪云龜甲大補陰治勞倦

丹婦人患墮胎後膈滿食少痢不止脉虛左手尤甚

滑石水煎白芍藥炒蒼朮各伍錢

白朮貳錢訶子貳錢煨乾薑肆錢

茯苓壹錢

右為細末調下保和丸肆伍拾粒

雲產後血痢臍腹疼痛四物湯加槐花黃連御米穀等藥

黃連丸治產後赤白痢腹中攪痛不可忍

黃連肆兩阿膠兩蒲黃

梔子仁各壹兩當歸貳兩半黃芩

黃蘗各貳兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服陸柒拾丸米飲吞

下日三夜

仲產後下痢虛極白頭翁加甘艸阿膠湯主之脉經作熱

痢重下新產虛極者

白頭翁 阿膠各貳兩 黃連

黃蘗 秦皮各叁兩 甘草貳兩

產後赤白痢 卷五 頁七

右以水柴升者取貳升半納膠令消盡溫分三服
婦人臨產痢疾山梔不拘多少燒灰為細末空心溫
熟水調下壹錢甚者不過五服

產後血痢小便不通臍腹疼痛用生馬齒莧搗汁二
大合煎壹沸下蜜壹合調頓服

梅治產後血泄不禁餘血作痛兼瑰桂心乾薑等分
為末空心酒調服方寸匕

大療產後痢日五十行者取木裏蛀蟲糞屑炒黃急
以水沃之令稠稀得所服之即瘥

聖治產後諸痢方取蒼耳葉搗汁半盞日三四溫服

渴產後下痢作渴者水穀之精化為血氣津液以養
臟腑臟腑虛燥故痢而渴若引飲則難止反溢水氣
脾胃既虛不能尅水水自流溢浸漬皮膚則令人腫
但止其渴痢則自瘥 匿前證若渴而不喜冷飲屬
胃氣虛不能生津液宜用七味白朮散夜間發熱口
渴屬腎水弱而不能潤宜用六味丸並佐以益氣湯
以滋化源 一產婦瀉痢發熱作渴吐痰肌體消瘦
飲食少思或胸膈痞悶或小腹脹墜年餘矣余以為
脾腎之瀉朝用二神丸夕用六君子三月餘而痊
一產婦患前證形體倦怠飲食不進與死為隣此脾

胃俱虛也。用四神丸十全大補湯而愈。

必効。療產後痢而渴飲無度數。麥門冬陸分 烏梅

貳拾 細剉水壹升煮取柒合 細呷

經効。療產後久痢津液涸渴不止。

龍骨拾貳分 厚朴 茯苓 黃芪

麥門冬各捌分 人參陸分 生薑陸分 大棗拾肆個

右以水壹太升者取柴合空心分兩服

療產後痢日久津液枯竭四肢浮腫口乾舌燥古錄今

冬瓜壹枚 黃泥糊厚伍寸 煨爛熟去皮絞汁服之瘥

補遺人參白朮散治產後痢津液竭渴不止方見胎前

大便秘澀

郭產後大便秘澀者何答曰產卧水血俱下腸胃虛

竭津液不足是以大便秘澀不通也若過五六日腹

中悶脹者此乃燥屎在臟腑以其乾澀未能出耳宜

服麻仁丸以津潤之若誤以為有熱投之寒藥則陽

消陰長變證百出性命危矣薛產後大便不通因

去血過多太腸乾涸或血虛火燥乾涸不可計其日

期飲食數多用藥通之潤之必待腹滿覺脹自欲去

而不能者乃結在直腸宜用豬膽汁潤之若服苦參

藥潤通反傷中焦元氣或愈加難通或通而瀉不能

產後大便秘澀 女科 五

正必成敗證若屬血虛火燥用加味道遙散氣血俱
虛八珍湯慎不可用麻子杏仁枳殼之類一產婦
大便不通七日矣飲食如常腹中如故余曰飲食所
入雖倍常數腹不滿脹用八珍加桃仁杏仁至二十
一日腹滿欲去用豬膽汁潤之先去乾糞五七塊後
皆常糞而安一產婦大便八日不通用通利之藥
中脘作痛飲食甚少或云通則不痛痛則不通乃用
蜜導之大便不禁吃逆不食余曰此脾腎復傷用六
君加吳茱肉果骨脂五味數劑喜其年壯而愈不然
多致不起一產婦大便秘結小腹脹痛用大黃

藥致吐瀉不食腹痛胸痞余用六君子加木香炮薑
治之而愈一婦人大便秘澁諸藥不應苦不可言
令飲人乳而愈

麻仁丸

麻仁 研如泥

枳殼

人參 各壹兩

大黃 半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心溫酒下貳拾丸
未通漸加丸數不可太過
評曰產後不得利利者百無一生去血過多臟燥
大便秘澁則固當滑之太黃似難輕用唯蔥涎調

大便秘澁

產後 女科 五

臘茶為丸復以臘茶下之必通子常用地黃易熟湯以生地黃易熟

地黃加青皮去白煎服甚效

大事婦人產後有二種疾鬱冒則多汗汗多則大便
秘故難於用藥惟麻子蘇子粥最為穩當用紫蘇子
大麻子二味各半合洗淨研極細用水再研取汁壹
盞分二次煮粥啜下此粥不唯產後可服大抵老人
諸虛風秘皆宜服之嘗有一人母年八十四忽爾腹
痛頭疼惡心不食召醫數十議皆用補脾進食治風
清利頭目等藥數日雖愈全不入食其家憂惶余嘗
說前藥皆誤矣此證正是老人風秘臟腑壅滯聚

胸中則腹脹惡心不思飲食又上至於顛則頭痛神
不清也若臟腑流暢諸疾悉去矣予今作此粥兩發
而氣泄先下結糞如胡椒者十餘枚後漸得通利不
用藥而自愈矣

丹產後秘結不通膨滿者氣急坐卧俱難用大麥蘖
炒黃為末酒下壹合神效出兵部手集

產後大便秘結

產後遺尿

車前子

黃芩

蒲黃

牡蠣

生地黄

芍藥

各壹兩 伍錢

右為細末空心米飲服方寸匕忌麪蒜

通氣散治產後夫小便不通亦可用封臍法見前雜證大便

不通

心治婦人產後忽小腹脹如蠱大小便不通氣海三里關元三陰交陰谷主之

大小便不通

遺尿

產後遺尿若脾腎虛弱用還少丹仍以補中益氣湯為主虛寒加肉豆蔻補骨脂或四神丸若脾腎虛寒用八味丸兼四神丸仍佐以前二方

按產後遺尿乃腎氣不固宜五味子丸主之雜病世瀉

一產婦大便不實飲食少思或侵晨遺尿此中氣虛寒脾腎不足用補中益氣送四神丸而痊

一產婦小便出糞名大小腸交乃氣血俱虛失行常道先用六君子湯二劑又用五苓散二劑而痊尋常腸交亦可用

可用

廣濟療產後遺糞方

取故燕窠中草燒為末以酒調下半盞亦治男子

集驗方 療產後遺糞亦治男子

礬石

括

牡蠣

煨冬

右為末酒服方寸匕日三服

補遺療產後遺糞不知出時方

白斂

芍藥

各等分

酒服方寸匕

補遺治產後遺糞不知覺可服固腸丸

方見前雜症泄瀉條

華佗云病人卧遺屎不覺者死

淋闕

天產後諸淋因產有熱氣客於脬中內虛則起數熱則小便澀痛故謂之淋又有因產損氣虛則挾熱熱則搏於血即流滲於胞中故血隨小便出而為血淋淋者淋瀝之謂也 三因論曰治諸產前後淋祕其法不同產前當安胎產後當去血如其冷熱膏石氣淋等為治則一但量其虛實而用之瞿麥蒲黃最是產後要藥唯當尋究其所因則不失機要矣 薛按前證若膀胱虛熱用六味丸若陰虛而陽無以化用滋陰腎氣丸蓋土生金金生水當滋化源也 一

產婦小水淋瀝或時自出用分利降火之劑二年不愈余以為肺腎之氣虛用補中益氣湯六味地黃丸而痊

茅根湯 治產後諸淋無問冷熱膏石氣結悉主之

白茅根 捌兩 瞿麥穗 六兩 白茯苓 各肆

葵子 各貳 人參 兩 蒲黃 兩

桃膠 滑石 各壹兩 甘草 各壹兩

紫貝 拾枚煨 石首魚頭中石 貳拾枚燒

右剉散每服肆大錢水壹盞半薑叁片燈心貳拾莖煎至柒分去滓溫服亦可為末木通煎湯調下

貳錢如氣壅閉木通橘皮煎湯調下

滑石散 療產後淋

滑石 壹兩貳錢半研 通草 車前子

葵子 各壹兩

右為末以漿水調服方寸匕至貳匕為妙

張不愚療產後小便不通淋閉方

陳皮 壹兩去白為末 空心溫酒調下貳錢一服便通

療卒不得小便方

杏仁 拾肆枚 去皮尖 右炒為末和飲頓服通

療產後淋小便痛及血淋

產後 婦科 卷五

白茅根

伍兩

瞿麥

車前子

各貳兩

鯉魚齒

壹百枚 為末

通草

參兩

冬葵子

貳合

右水貳升者取壹升入魚齒末空心服

治產後小便不通腹脹如鼓悶亂不醒蓋緣未產之前內積冷氣遂致產時尿胞運動不順用鹽於產臍中填可與臍平却用葱白剥去麁皮拾餘根作一縛切作一指厚安鹽上用大艾炷滿葱餅子大小以火灸之覺熱氣直入腹內即時便通神驗不可具述

集乳

小便數

因夫產後小便數者乃氣虛不能制故也 薛前證若因穩婆不慎以致胞損而小便淋瀝者用八珍湯以補氣血若因膀胱氣虛而小便頻數當補脾肺若膀胱陰虛而小便淋瀝須補肺腎 一產婦小便頻數時復寒戰乃屬脾肺虛弱用補中益氣湯加山茱山藥為主佐以桑螵蛸散而愈後患發熱晡熱盜汗自汗月水不調用加味逍遙散而安 一產婦患前證吐痰發熱日晡作渴此膀胱陰虛用補中益氣湯以六味丸而愈又患病後小便頻數手足俱冷屬陽

氣虛寒用前湯及八味丸而瘳

桑螵蛸散金十 治產後小便數及遺尿

桑螵蛸參拾枚煨 鹿茸酥炙 黃芪各參兩

牡蠣煨 人參 厚朴 赤石脂各貳兩

右為末空心粥飲調下貳錢外臺無厚朴石脂有甘草生薑

括萋湯集驗 療產後小便數兼渴 桑螵蛸 甘草

並黃連各貳兩 生薑各貳兩 括萋根參兩 人參參兩 大棗伍拾枚

右細切用水柒升煮貳升半分三服忌豬肉冷水

補遺療產後小便數或遺尿 益智仁為米飲調服

小便不禁

陳婦人產蓐產理不順致傷膀胱遺尿無時 丹嘗

見收生者不謹損破產婦尿脬致病淋瀝遂成廢疾

一日有徐婦年壯難產得此因思肌肉破傷在外者

宜可補完胞雖在腹恐亦可治遂診其脉虛甚示曰

難產之由多是氣虛產後血氣尤虛試與峻補因以

參芪為君若歸為臣桃仁陳皮黃芪茯苓為佐煎以

豬羊胞中湯極饑時飲之但劑小率用壹兩至二月

而安蓋令氣血驟長其胞自完恐稍緩亦難成功矣

喬町婦人產後尿不禁面微浮略發熱于午後此勝

產後小便不禁

產後 婦科 五

脫為坐婆所傷

黃芪

歸身尾

芍藥

各壹錢半

白朮

人參

陳皮

各伍分

甘草

多少許 右水煎服之

薛前證若脾肺陽虛用補中益氣湯若肝腎陰虛用六味地黄丸若肝腎之氣虛寒用八味地黄丸一產婦小便不禁二年不愈面色或青赤或黃白此肝脾氣虛血熱用加味道遙散為主漸愈佐以六味地黃丸而痊後因怒小便自遺大便不實左目頻緊面色頓赤仍用前散佐以六君子湯以清肝火生肌

培脾止而痊

廣濟療產後小便不禁

鷄尾毛燒存性酒調下

七日服

千金治產後遺尿不知出

白薇

芍藥

各等分

為末酒服方寸七日

又方

桑螵蛸

半兩炒

龍骨

壹兩

右為末食前粥飲調下貳錢

固脬散治婦人臨產時傷手脬破小便不禁

產後小便不禁

婦科 五

百七

黃絲絹

自然黃者染黃者不用參片以炭灰汁
煮極爛以清水洗去灰令淨入黃蠟半

右用冰貳升再煎至壹盞空心頓服服時飲氣服

之不得作聲如作聲無効

補遺補脬飲 治產後傷動脬破終日不小便但淋

濕不乾

生絲絹

黃色者

白牡丹根皮木

白芨

各壹錢

用水壹碗煎至絹爛如餲服之勿作聲作聲無効

雞內金散 治產後溺床失禁

以雞脍脍壹具并腸洗燒為末酒調服方寸匕

小便出血

大產後小便出血者因血氣虛而熱乘之血得熱則

流散滲於胞內故血隨小便出 薛一產婦尿血漸

黃脇脹少食此肝木乘脾土也用加味道逍補中益

氣煎服而愈後為懷抱不樂食少體倦驚悸無寐血

仍作用加味歸脾湯二十餘劑將愈惑於眾論服犀

角地黄湯諸證復作仍服前湯而愈

治小便利血方

亂髮湯洗垢

右燒研為末米飲調服方寸匕

產後小便出血

又方用滑石研髮灰等分每服壹錢地黄汁調下

崔氏方 療產後血滲入大小腸
蜜壹大合 車前草搗汁壹升

右相和煎沸分兩服

補遺方治產後小便出血

川牛膝去蘆水煎服

又方

生地黄汁半升 生薑自然汁半合

右相和服之

大便下血

產後便血或飲食起居或六淫七情以致元氣虧損腸絡外傷治法若因膏粱積熱用加味清胃散若因淳酒濕毒葛花解醒湯若因怒動肝火六君加芍藥柴胡芎歸若因鬱結傷脾加味歸脾湯若因思慮傷心妙香散若因大腸風熱四物加側柏荆防枳殼槐花若因大腸血熱四物加芩連若因腸胃虛弱六君加升麻柴胡若因腸胃虛寒六君加肉蔻木香若因元氣下陷補中益氣加茯苓半夏若因氣虛用六君升麻若因血虛用四物氣血俱虛用八珍俱加柴

胡升麻大凡病久或元氣虛弱見病百端皆因脾胃
虧損內真寒而外假熱但用六君子或補中益氣加
炮薑溫補脾氣諸證悉退若四肢畏冷屬陽氣虛寒
急加附子病因多端當臨證制宜庶無誤矣 一產
婦糞後下血諸藥不應飲食少思肢體倦怠此中氣
虛弱用補中益氣加吳茱炒黃連五分四劑頓止但
怔忡少寐盜汗未止用歸脾湯治之而痊 一婦人
但怒便血寒熱口苦或胸脇脹痛或小腹痞悶此本
乘土用六君加山梔柴胡而愈又用補中益氣加味
逍遙一藥而不復作 一婦人久下血在糞則愈

胃虛寒元氣下陷用補中益氣湯加連炒吳茱一錢
數劑稍緩乃加生吳茱五分數劑而愈 一婦人產
後便血口乾飲湯胸脇膨滿小腹悶墜內熱晡熱飲
食不甘體倦面黃日晡則赤酒漸惡寒此脾肺氣虛
先用六君加炮薑木香諸證漸愈用補中益氣將愈
用歸脾湯全愈後飲食失節勞役兼怒氣發熱血崩
夜間熱甚謔語不絕此熱入血室用加味小柴胡二
劑而熱退用補中益氣而血止用逍遙散歸脾湯調
理而康

陰脫產門不閉
三因婦人趣產勞力努嘔太過致陰下脫若脫肛狀
及陰下挺出逼迫腫痛舉重房勞皆能發作清水續
續小便淋露
硫黃散 治產後勞傷陰脫
硫黃 烏賊魚骨 各半
右為末 摻患處
桃仁膏 治產後陰腫妨悶
桃仁 去皮 枯礬
右以下二味為末 研桃仁為膏 拌勻 傅之

陰脫產門不閉
三因婦人趣產勞力努嘔太過致陰下脫若脫肛狀
及陰下挺出逼迫腫痛舉重房勞皆能發作清水續
續小便淋露
硫黃散 治產後勞傷陰脫
硫黃 烏賊魚骨 各半
右為末 摻患處
桃仁膏 治產後陰腫妨悶
桃仁 去皮 枯礬
右以下二味為末 研桃仁為膏 拌勻 傅之

硫黃湯 治產勞玉門開而不閉

硫黃 肆兩

吳茱萸

兔絲子 各壹兩半

蛇床子 兩

右每服肆錢水壹碗煎數沸濾滓洗玉門日再洗

炭法

單炒蛇床子乘熱布裏熨患處亦治產後陰痛

當歸散 治陰下脫

黃芩 各貳兩

芍藥 壹兩

蛭皮 燒存性半兩

牡蠣 散貳兩半

右為末每服貳錢溫酒米湯任意調下忌登高舉重

丹溪 一婦人三十餘歲生女二日後產戶一物如手

帕下有帕尖約重壹斤予思之此因胎前勞乏傷氣成肝痿所致却喜血不甚虛其時歲暮天寒恐冷乾壞子急與炙黃芪半錢人參壹錢白朮伍分當歸壹錢半升麻五分三貼連服之即收止得汗通身乃安但下齋沾席處乾者落一片約五六兩重蓋脂膜也食進得眠診其脉皆濇左略弦視其形却實與白朮芍藥各錢半陳皮壹錢生薑壹片煎二三貼以養之一婦人產子後陰戶中下一物如合鉢狀有二歧其夫來求治予思之此子宮也必氣血弱而下墜遂

用升麻當歸黃芪大料三貼與之半日後其夫復來
曰服二次後覺響一聲視之已收陰乃訖但因經宿
乾着席生破一片如掌心大在席其妻在家哭泣恐
傷破不可復生予思之此非腸胃乃糟粕也肌肉破
尚可復完若氣血充盛必可生滿遂用四物湯加入
參與一百貼三年後復有子 治子宮下用黃芪壹
錢半人參壹錢當歸柒分升麻參分甘草貳分作一
貼水壹鍾煎至伍分去滓食前服却用五倍子末泡
湯洗又用末傅之如此數次宜多服藥永不下
薛玉門不閉氣血虛弱也用十全大補湯腫脹炊

肝氣虛熱也加味道遙散若因憂怒肝脾氣血傷也
加味歸脾湯若因暴怒肝火血傷也龍膽瀉肝湯
一產婦玉門不閉發熱惡寒用十全大補加五味子
數劑而寒熱退用補中益氣加五味子數劑而玉門
閉 一婦人脾胃素弱兼有肝火產後玉門腫痛寒
熱作渴嘔吐不食外敷大黃等藥內用驅利之劑腫
及於腎諸證蜂起此真氣虛而邪氣盛也先用六君
子以固腸胃次用補中益氣以升陽氣不數劑而全
愈 一產婦患此失治腫潰不已形體消瘦飲食少
思朝寒暮熱自汗盜汗半年矣用補中益氣湯加茯

苓半夏膿水漸少飲食漸進又用歸脾湯共五十餘劑而愈
一產婦玉門不閉小便淋瀝腹內一塊或走脇下或脹或痛用加味逍遙散加車前子而愈
一婦人子宮腫大二白方入損落一片殊類豬肝面黃體倦飲食無味內熱晡熱自汗盜汗用十全大補湯二十餘劑諸證悉愈仍復生育

外治

治產後陰腫下脫肉出玉門不閉 石灰壹升炒湯極熱
貳升投灰中適溫冷澄清坐水中以浸玉門斯即平復如故 又方以鐵精粉上推內之 又灸下橫紋伍柒壯

一法用鐵精羊脂二味攪令稠布裹炙熱熨推內之

鐵精是鍛鐵爐中飛出如塵紫色而輕虛可以燃器血者

子母療產後陰下脫燒兔頭末傳之

補遺治產後生腸不收 用枳殼煎湯浸良久即入

又方五倍子白礬煎湯浸亦良 又方酸篤草俗

名老鴟酸煎湯用草坐不開孔纔薰收一半稍溫

下手洗並收入而安

又方子宮脫出以溫水洗軟却用雄鼠糞燒烟熏入

又法革麻子拾肆粒去殼搗爛塗頂心如入即洗去

針灸

東婦人胞胎門落頰不收常濕神關 玉泉伍拾

身交指縫中灸 又法 玉泉傍開三寸隨

年壯 女人陰門冷腫飯來

甲婦人陰挺出四肢淫樂身悶少海主之照海

陰中肉線 一婦產後水道中出肉線壹條長三四尺

動之則痛欲絕先服失笑散數次以帶皮薑叁斤研

爛入清油貳斤煎油乾為度用絹兜起肉線屈曲于

水道邊以前薑熏之冷則熨之一日夜縮其大半

日即盡入再服失笑散等歸湯調理之如肉線斷則

不可治矣

陰蝕

大凡婦人少陰脉數而滑者陰中必生瘡名曰羸瘡

或痛或痒如蟲行狀淋露膿汁陰蝕幾盡者此皆由

心神煩鬱胃氣虛弱致氣血留滯故經云諸痛痒瘡

皆屬於心又云陽明主肌肉痛痒皆屬於心治之當

補心養胃外以薰洗坐導藥治之乃可薛前證乃

肝脾鬱結之證木旺生蟲耳宜解鬱清肝備見前雜

證陰中生瘡類 一產婦素有肝火患此內潰痒痛

食少熱渴小水淋瀝用加味道遙散加味歸脾湯兼

服間以蘆薈丸外以鶴虱草煎洗而愈

千金方 卷五

千金方 蒲黃 參升 水銀 壹兩 二味研勻以粉上

又方 肥豬肉拾斤水壹碩煮水浸冷即易不過三

兩度

洗渴湯方

甘草

乾漆 各壹兩

黃芩

乾地黄

當歸

芍藥 各貳兩

龜甲 伍兩

右細切以冰柴升煮耗一半以綿帛內湯中以搗

瘡處良久即易日十度每搗湯可入行十里許即

裹乾捻取甘濕散薄傅瘡上使遍可經半日又以

湯樹搗訖如前傅藥 余家婢遇此疾醫療不

蝕處作兩瘡深半寸余因檢得此方仍以自處搗

文蛇膽散不經七日瘡乃平復甚効凡浴數十人應

手而瘡請廣布之

甘濕散

又名蚌

療疔蟲陰蝕

蚌蛇膽

真者

青木香

石硫黃

鐵精

麝香

各肆分臨時分之多少入

利蛇膽即無力也舊

右陸味各等分為末更細研有患取如三基子和

井花水日再服訖先令便利了即以後方桃枝熏

產後

下部訖然後取藥如碁子安竹管裏吹入下部中亦用再度老少量減其熏法每日壹度不用再為之良

療疳蟲蝕下部及五臟方 取桃東南枝參朮枝輕

捷頭使散以綿纏之又搗石硫黃為末將此綿纏

桃枝撚轉之令末少厚又截壹短竹筒先內下部

中以所撚藥桃枝熟燃熏之

文仲療陰蝕欲盡者方 以蝦蟇兔屎等分為末傳

之良

狼牙湯 古今錄驗 療婦人陰蝕其中爛傷膿水淋漓莫

穢

狼牙 參兩

右吹咀以水肆升煮取半升去滓內苦酒如雞子

中黃大沸湯壹盃消盡夜適寒溫以綿纏筋頭大

如繭濡湯以瀝瘡中日四五度即瘥

補遺治產後陰戶生瘡

青黛

黃丹

水粉

五倍子 等分 為末

用賣肉鋪上拭肉中燒為末和前藥先以荆芥薄

荷栢葉煎湯洗淨後摻藥如瘡乾可用油調末塗

又方 平胃散加貫衆末每貳錢孰煮豬肝拌藥內
陰丸中

之 平胃散加貫衆末每貳錢孰煮豬肝拌藥內
陰丸中
又方 平胃散加貫衆末每貳錢孰煮豬肝拌藥內
陰丸中
又方 平胃散加貫衆末每貳錢孰煮豬肝拌藥內
陰丸中

乳少

大凡婦人乳汁或行或不行者皆由氣血虛弱經絡
不調所致也乳汁勿令投於地蟲蟻食之令乳無汁
若乳益溢可發東壁上佳或有產後必有乳若乳雖
脹而產後畧作者此年少之人初經產乳有風熱耳
須服清利之藥則乳行若累經產而無乳者亡津液
故也須服滋益之藥以動之若雖有乳却又不甚多
者須服通經之藥以動之仍以羹臙引之蓋婦人之
乳資於衝脉與胃經通故也有屢經產而乳汁常多
者亦婦人血氣不衰使然也太抵婦人素有疾在衝

產後乳少

任經者乳汁少而其色帶黃所生之子怯弱而多疾

三因產婦有二種乳脉不行有氣血盛而壅閉不

行者有血少氣弱澁而不行者虛當補之盛當疎之

盛者當用通草漏蘆土瓜根輩虛者當用煉成鐘乳

粉豬蹄鯽魚之屬槩可見矣 薛前證若氣血虛弱

而不能化生宜壯脾胃怒動肝膽而乳腫汁出當清

肝火夫乳汁乃氣血所化在上為乳在下為經者屢

產無乳或大便澀滯當滋化源

漏蘆散 療乳婦氣脉壅塞乳汁不行及經絡乾滯

妳乳脹痛留蓄邪毒或作癰腫此藥服之自然內

服之

消乳汁通行

漏蘆 貳兩半

蛇蛻 拾條

瓜萋 拾枚

右為末温酒調下貳錢無時候服藥後即以豬蹄

又方

葵菜子 炒香 縮砂仁 各等分

右為細末每服貳錢熱酒調下滋益氣脉榮衛行

津液止蔡張不愚方常用極有驗

產寶療產後乳無汁方

產後乳少 女科五

土瓜根

通草 肆兩

漏蘆 各參兩

甘州 貳兩

右水捌升煎取貳升分溫參服忌如常法 一方加桂心並為末酒服方寸匕

產書下乳汁

土瓜根為末酒調服壹錢日三四服

下乳汁以京三稜參個水貳碗煎取壹碗洗取汁下為度極妙

湧泉散 成都教授單驤方療產乳無汗亦治乳結

癰腫

穿山甲

洗淨壹兩 灰炒燥

為細末酒調服方寸匕

必用方云漏蘆括蕒皆要藥或云多食諸蕒蕒括蕒取子淨洗炒令香熟槌破取仁在上攤漚令白色研為細末溫酒調下壹錢服了合面臥少時未效再作一方瓜蕒壹枚熟壽以白酒壹斗煮取肆升去滓溫飲壹升日叁

成煉鍾乳散 療乳婦氣少血衰脉澁不行乳汁絕少

成煉鍾乳粉 研細 濃煎漏蘆湯調下貳錢

靈苑下乳汁立效方

補

粳米

糯米各半

萵苣子壹合並淘淨

生甘草半兩

用冰貳升煎汁壹升去滓分叁服立下

又方 豬蹄壹肆通草兩肆水壹斗煮作羹食之妙

薛一產婦因乳少服藥通之致乳房腫脹發熱作渴

余謂血氣虛以玉露散補之而愈

玉露散 治乳脉不行身體壯熱疼痛頭目昏痛太

便澁滯等證

川芎

桔梗

白芷各貳錢

芍藥

當歸各壹錢半

人參

白茯苓

甘艸各壹錢

右作一服米貳鐘煎至壹鐘食後服如頭熱甚

便秘者加大黃叁錢

羅氏湧泉散 治婦人乳汁因氣絕少

瞿麥穗

麥門冬去心 龍骨

穿山甲炮黃

王不留行各等分

右為細末每服壹錢熱酒調下後吃豬蹄羹少許

又用木梳於左右乳上各梳叁貳拾梳日三服依

前法

又方治妳汁少

瓜蒌根

薄荷幹身等分

右為粗末先喫羊蹄汁壹碗次服藥後再喫葱絲
羊羹湯少許出効

有入乳汁不行已十七日諸藥無効遇有入送赤豆
一斗遂時常煮粥食之當夜乳脉通行

又方 麥門冬不拘多少去心焙為末以酒磨犀用
約壹錢許煖犀角酒調門冬末貳錢服之不過兩
服乳汁便下

乳汁自出

大產後乳汁自出蓋是身虛所致宜服補藥以止之

若乳多温滿急痛者温帛熨之產寶有是論却無方
以治之若有此證但以漏蘆散亦可 有未產而乳
汁自出者謂之乳泣生子多不育經書未嘗論及
薛前證氣血俱虛用十全大補湯肝經血熱用加味
逍遙散肝經怒火用四物參朮柴梔肝脾鬱怒用加
味歸脾湯一產婦勞役忽乳汁如涌昏昧吐痰此
陽氣虛而厥也灌以獨參湯而甦更以十全大補湯
數劑而安若婦人氣血方盛乳房作脹或無兒飲脹
痛增寒發熱用麥芽二三兩炒熟水煎服立消其耗
散血氣如此何脾胃虛弱飲食不消方中多用之

漏蘆散 見前

吹妳

大產後吹妳者因兒喫妳之次兒忽自睡呼氣不通乳不時洩蓄積在內遂成腫硬壅閉乳道津液不通傷結疼痛亦有不痒不痛腫硬如石名曰吹妳若不急治腫甚成癰產後吹妳最宜急治不爾結癰速至死者速服皂角散括蘆散傳以天南星散以手揉之則散矣 **薛**前證用藥切不可損其氣血餘詳外科乳癰條 **括樓散方**

乳香 壹錢研

括樓實 壹个研勻温酒煎服

天南星散

南星 為末 温湯調以鷲翎蘸塗患處

皂角散 歌曰

婦人吹妳治如何皂角燒灰蛤粉和熱酒壹杯調搗字須臾揉散笑呵呵

治妳結硬疼痛

百藥煎為細末每服叁錢酒壹盞煎數沸熱服

乳硬作痛 嫩桑葉生研以米飲調攤紙花貼腫處補遺治產後吹妳結實腫痛

用陳皮 壹兩 甘州 壹錢 水貳碗煎至壹碗分兩服

次用荆芥羌活獨活煎湯熏洗即散

麻黃妬乳

夫妬乳者由新產後兒未能飲之及乳不洩或乳脹
捏其汁不盡皆令乳汁蓄結與血氣相搏即壯熱大
渴引飲牢強掣痛手不得近是也初覺便知以手拈
捏去汗更令傷人助吮引之不爾或作瘡有膿其熱
勢盛必成癰也輕則為吹乳妬乳重則為癰雖有
專門不可不知

連翹湯 治產後妬乳并癰

連翹

升麻

芒硝

玄參

芍藥

白欬

防風

射干

大黃

杏仁

甘草 各壹錢

右作一服水貳鍾煎至壹鍾食後服

療產後婦乳初結脹不消令敗乳自退方

瓜蒌

壹箇半 生半炒

大粉草

壹寸半 生半炙

生薑

壹塊半 生半煨

右同剉用酒壹椀煮取壹盞去滓服之其痛一會
不可忍即搜去敗乳臨卧再一服順所患處乳側
卧於床上令其藥行故也

療產後吹乳作癰

葵莖及子

右擣篩為散酒服方寸匕即愈

又方 雞屎乾為末酒服方寸匕須臾三服愈

又方 皂角拾條以酒壹升採取汁消石半兩煎成

膏傅之

療乳腫將次結成癰方 右以馬溺塗之立愈

補遺療產後吹妳妬妳但未結成癰或成癰未作有

膿者

蔓荊子搗爛酒服仍以滓敷患處

又方用赤小豆酒研爛温酒服滓封患處

乳頭
心之
水出

又方仙人掌草壹握小酒糟壹塊生薑壹大塊同研

爛入桂末少許炒酒服留滓罨患處

集驗論曰凡婦人女子乳頭生小淺熱瘡搔之黃汁

出浸淫為長百種療不差者動經年月名為妬乳病

婦人飲兒者乳皆欲斷世謂苟抄乳是也宜以赤龍

皮湯及天麻湯洗之傅一物飛鳥膏及飛鳥散佳始

作者可傅以黃芩漏蘆散黃連胡粉散並佳

赤龍皮湯

槲皮卷升

温之分以洗乳

右以水壹斗煮伍升夏冷用秋冬

天麻湯

天麻草伍升切

右以水壹斗半煎取壹斗隨寒

溫分洗乳以殺痒也此草葉如麻葉冬生夏着花

赤如鼠尾花亦以洗浸淫黃爛熱瘡痒疽濕陰蝕

瘡小兒頭瘡洗畢傅膏散

飛鳥膏散方

用燒朱砂作水銀上黑烟各維粉者參礬石燒粉

右二味以絹篩細以甲煎和之令如脂以傅乳瘡

日三作者不須和有汁自着可用散亦傅諸熱瘡

黃爛浸淫汁瘡蜜瘡丈夫陰蝕痒濕諸小兒頭瘡

疔蝕口浸淫瘡蝸瘡等並以此傅之

又黃連胡粉膏散方

黃連貳兩

胡粉貳兩半

水銀壹兩兩同研

右參味搗黃連為末參物相和皮裏熟按之自和

合也縱不成一家且得水銀細散入粉中以傅乳

瘡諸濕痒黃爛肥瘡若着甲煎為膏千金同

補遺婦人乳頭小瘡瘡爛痒以芙蓉花或葉乾為末

摻之又有婦人乳頭裂痛取秋後冷落茄子花裂

開者陰乾燒存性水調塗之

寬文十三年癸丑仲秋吉辰
銅駝坊書肆
村上平樂寺刊行

