

妇科證治準繩

一之二


Kitasato Memorial Medical Library

松  
科  
別

n 44

F  
シ-131

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50



# 經候總論

## 經門

490.9  
J. 3

No. 3167  
12.1144



1464

### 調經門

#### 經候總論

良岐伯曰女子十七歲腎氣盛齒更髮長二十七而天至任脈通太衝脈盛月事以時下天謂天眞之氣謂壬癸之水壬爲陽水配丁而化未癸爲陰水合戊而化火故曰水火者陰陽之徵兆也女子陰類故得癸焉衝爲血海任主胞胎二脉流通經血漸盈應時而下天眞氣降與之從事故曰天癸也常以三百多見以像月盈則虧不失其期又名月信也若遇經行最宜謹慎否則與產後證相類若被驚恐勞役則血

氣錯亂經脉不行多致勞瘵等疾若逆於頭面肢體之間則重痛不寧若怒氣傷肝則頭暈脇痛嘔血而癆瘡癰瘍若經血內滲則竅先淋瀝無已凡此六淫外侵而變證百出犯時微若秋毫成患重如山岳可不畏哉

**薛**血者水穀之精氣也和調五臟灑陳六腑在男子則化爲精在婦人上爲乳汁下爲血海故雖心主益肝藏血亦皆統攝於脾補脾和胃血自生矣凡經行之際禁用苦寒辛散之藥飲食亦然良婦人月水不調由風邪乘虛客於胞中而傷衝任之脈損手太陽少陰之經蓋衝任之脉皆起於胞中

爲經絡之海與手太陽小腸手少陰心經爲表裏上爲乳汁下爲月水然月水爲經絡之餘苟能調攝得宜則經應以時矣

**薛**經曰飲食入胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行東垣先生謂脾爲生化之原心統諸經之血誠哉是言也竊謂心脾平和則經候如常苟或七情內傷六淫外侵飲食失節起居失宜脾胃虛損心火妄動則月經不調矣有先期而至者有後期而至者其說詳見後條蓋血生於脾土故云脾統血凡血病當用苦甘之劑以助陽氣而生陰血也

丹經水者陰血也陰必從陽故其色紅稟火色也血爲氣之配氣熱則熱氣寒則寒氣升則升氣降則降氣凝則凝氣滯則滯氣清則清氣濁則濁往往見有成塊者氣之凝也將行而痛者氣之滯也來後作痛者氣血俱虛也色淡者亦虛也而有水混之也錯經妄行者氣之亂也紫者氣之熱也黑者熱之甚也今人但見其紫者黑者作痛者成塊者率指爲風冷而行溫熱之劑則禍不旋踵矣良由病原論月水諸病皆曰風冷乘之宜其相習而成俗也或曰黑北方水色也紫淡於黑非冷而何予曰經曰亢則害承

乃制熱甚者必兼水化所以熱則紫甚則黑也況婦人性熱而見鄙嗜欲加倍藏府厥陽之火無日不起非熱而何若曰風冷必須外得設或有之蓋千百二三者也冷證外邪初感入經必痛或不痛者久則變熱矣且寒則凝旣行而紫黑故非寒也

海四物加黃芩黃連湯

治經水如黑豆汁

四物湯

肆兩

黃芩

黃連

各壹兩

右爲米醋糊丸服

丹月經黑口渴倦怠形短色黑脈不勻似數

赤芍藥

各半兩

黃芩

各參錢

甘草

貳錢

右爲末，醋糊丸，白湯下，五六十九。永康胡人娘子二十歲二月經事不來，忽行小腹痛，有塊血紫色。

白芍藥

白术

陳皮各半  
木通兩

黃芩

川芎

甘草少許  
芍藥兩

何嚮人氣滯，血澀，脈不瀆，經不調，或前或後，紫色口苦，兩太腿外廉，麻木，有時痒，生瘡，大便秘滯。

麻子仁

桃仁

枳殼  
歸頭

枳殼

白术

生地黃

威靈仙  
訶子肉  
陳皮各伍錢  
大黃  
各爲末，粥丸，如桐子大，白湯下，五六十九。

丹經水色淡者，氣血俱虛也，宜八物湯之類。八物者，四物四君子也，如兼它證，隨證加藥。

樓婦人年四十八，因有白帶口渴，月經多，初血黑色，後來血淡，倦怠食少，臍上急。

白朮

白芍藥

陳皮各壹錢  
黃芩各伍分

木通

枳殼

甘草炙各參分  
紅花豆許

右煎湯下保和丸參拾丸抑青丸貳拾丸  
**審多少**婦人病多是月經乍多乍少或前或後將發  
疼痛醫者不審一例呼為經病不知陽勝陰陰勝陽  
所以服藥無効蓋陰氣乘陽則包藏寒氣血不運行  
經所謂天寒地凍水凝成冰故令乍少而在月後若  
陽氣乘陰則血流散溢經所謂天暑地熱經水沸溢  
故令乍多而在月前當和血氣平陰陽斯為福也  
陽勝陰月候多者當歸飲

當歸飲 抑陽助陰調理經脉

當歸

微炒

地黃

酒蒸焙

川芎

白朮

白芍藥

黃芩

各等分

每服參錢水一盞半煎至八分空心溫服

陰勝陽月候少者七沸湯

七沸湯 治榮衛虛經水愆期或多或少腹痛

當歸

川芎

白芍藥

蓬朮

熟地黃

川薑

木香各等分

每服肆錢水一盞半煎至八分溫服  
經水過多為虛熱為氣虛不能攝血  
海四物加黃芩白朮湯 治經水過多

四物湯 肆兩

黃芩

白朮 各壹兩

四經水過多

黃芩 炒

芍藥 炒

龜板 炙各壹兩

椿樹根皮 柒錢半

黃檗 炒叁錢

香附 貳錢半

右爲末酒糊丸空心白湯下 五六十九

用一婦人脉弦而大不數形肥初夏時倦怠月經來

時多此稟受弱氣不足攝血故行多

白朮 壹錢半

黃芪 生

陳皮 各壹錢

人參 伍分

甘草 叁分

經水澀少爲虛爲澀虛則補之澀則濡之

海因物加葵花湯

治經水澀少

四物湯 肆兩

葵花 壹兩

方又加紅花血見愁

四物湯加熟地黃當歸湯治經水少而色和

四物湯 肆兩

熟地黃

當歸 各壹兩

宋市曰有二婦人來診言經水少不如前者何也師曰更下利若汗出小便利者可荷以故師曰以其津液故令經水反少設經下多於前者當所苦困當言恐大便難身無復汙也

先期後期 王子亨曰經者常候也謂候其一身之陰陽愆伏知其安危故每月一至太過不及皆爲不調

陽太過則先期而至，陰不及則後時而來。其有乍多乍少，斷絕不行崩漏者，皆由陰陽衰盛所致。

月經不及期者，血熱四物湯加黃連。肥人不效日數而多瘀者，血虛有熱，南星白朮蒼朮黃連香附川芎作丸。薛先期而至者，有因脾經血燥者，宜加味逍遙散；有因脾經鬱滯者，宜歸脾湯。方見利健忘門

有因血分有熱者，宜加味小柴胡湯。即四物加柴胡丹皮山梔，方見傷寒勞倦門有因肝經怒火者，宜加味四物湯。方見雜病因勞役火動者，宜補中益氣湯。方見傷寒勞倦門先期湯 治經水先期而來，宜涼血固經。

生地黃

川當歸

白芍藥

各貳錢

黃檗

知母各壹錢

條芩

黃連

川芎

阿膠

炒各捌分

艾葉

香附

炙甘草

各柒分

水二鍾煎一鍾食前溫服。

金匱土瓜根散 治帶下經水不利，小腹滿痛，經十月再見者。

土瓜根

芍藥

桂枝

麿蟲

各柒錢半

右四味杵為散，酒服方寸匕日三服。

按仲景此方乃破堅下血之劑則經不及期有汙血者矣前論所未及也欲知汙血有無須以小腹滿痛與不滿痛別之

丹經水過期血少川芎當歸人參白朮與瘀藥過期色淡者瘀多也二陳湯加芎歸過期色紫有塊血熱也必作痛四物湯加香附黃連薛過期而至者有因脾經血虛者宜人參養榮湯有因肝經血少者宜六味地黃丸有因氣虛血弱者宜八珍湯三方並見雜病虛勞門

過期飲 治經水過期不行乃血虛氣滯之故法當

補血行氣

白芍藥

當歸

熟地黃

川芎

壹錢

香附各貳錢

蓬莪茂

半分

甘草

肉桂各半分

水二鍾煎一鍾食前溫服

滋血湯 治婦人心肺虛損血脈虛弱月水過期

人參

山藥

黃芪各壹錢

白茯苓去皮

川芎

當歸

白芍藥

熟地黃各壹錢半

右作二服水二十鍾煎至一鍾食前服

脈師曰脉微血氣俱虛年少者亡血也乳子下利為可否者此爲居經三月一來師曰寸口脉微而澀微則衛氣不足澀則血氣無餘衛不足其息短其形躁血不足其形逆榮衛俱虛言詰謬誤趺陽脉浮而濶濶則衛氣虛虛則短氣咽燥而口苦胃氣澀則失液少陰脉微而遲微則無精遲則陰中寒濶則血不來此爲居經三月一來問曰婦人妊娠三月師脉之言此婦人非軀氣月經當下其脉何類何以別之師曰寸口脉衛浮而大榮反而弱浮大則氣強反弱則

少血孤陽獨呼陰不能吸一氣不停衛降榮竭陰爲積寒陽爲聚熱陽盛不潤經絡不足陰虛陽往一作實故令少血時發洒淅咽燥汙出或溲稠數多唾涎沫此令重虛津液漏泄故知非軀苗煩滿血月稟一經三月一來陰盛則瀉名曰居經謂右脉浮大左脉反弱也

調經平劑簡易方當歸散治經脉不勻或三四月

不行或一月再至

當歸

川芎

白芍藥

炒各半兩

黃芩

壹兩

白术

山茱萸肉

壹兩半

右爲細末空心溫酒調

下貳錢日二服

如令去

黃芩加肉桂壹兩

人參養血丸

治女人稟受素弱，血氣虛損，常服。

補衝任調經候暖

下元生血氣

烏梅肉

卷兩

熟地黃伍兩

當歸貳兩

人參

川芎

赤芍藥

蒲黃

炒各  
壹兩

逍遙散

和

治血虛煩熱，月水不調，臍腹脹痛，痰嗽

任下

潮熱

右爲細末，煉蜜丸，梧子大，每服八十丸，溫酒米飯

逍遙散

和

治血虛煩熱，月水不調，臍腹脹痛，痰嗽

當歸

白术

白芍藥

柴胡

茯苓

各壹兩

甘草

炙半兩

右㕮咀，每服半兩，入薑薄荷葉，煎服。

薛新甫加牡丹皮山梔

炒各伍分，名加味逍遙散。

神巧萬全方無當歸芍藥甘草有人參黃芪各等

分

增損四物湯 治月事不調，心腹疼痛，補血溫經，注

額

川芎

當歸

芍藥

熟地黃

牡丹皮

白术

各壹  
錢半

地骨皮

壹錢

右作二服用水一鍾煎至一鍾食前服。

濟生方論曰內經云百病皆生於氣經有所謂七氣有所謂九氣喜怒憂思悲恐驚者七氣也七情之外益之以寒熱二證而爲九氣也氣之爲病男子婦人皆有之惟婦人血氣爲患尤甚蓋人身血隨氣行氣壅滯則血與氣併或月事不調心腹作痛或月事將行預先作痛或月事已行淋瀝不斷心腹作痛或遵腰脇或引背脊上下攻刺吐逆不食甚則手足搐搦狀類驚癇或作寒熱或爲癥瘕肌肉消瘦非特不

能受孕久而不治轉而爲瘵疾者多矣

戴復菴云婦人每月經水應期而下不使有餘猶太陰之缺也其有或先或後或少或多或欲來先病或遇來而斷續皆謂之不調和氣飲加香附子半錢兼

礞石附丸

升麻和氣飲

見雜病水腫門

澹寮煮附丸

治經候不調血氣刺痛腹脇脹頭

量惡心崩漏帶下並宜服之

香附子

擦去皮不以多少米醋浸一晉白用瓦銚煮令醋盡

右醋糊爲丸梧子大日乾每五十丸淡醋湯

一方香附壹斤艾葉肆兩當歸貳兩製同名艾附

丸

沉香降氣散 順氣道通血脈

烏藥

木香

甘草 各等分

縮砂仁

右爲細末每服貳錢空心鹽湯調下  
嚴氏抑氣散 治婦人氣盛怒血變生諸證頭暉膈

滿

香附子 肆兩

茯神

甘草 各等分

陳皮 貳兩

紺珠正氣天香湯 治婦人一切氣氣上湧心心胸  
攻築脇肋刺痛月水不調

合烏藥 貳錢

香附子 涮錢

陳皮

蘇葉各壹錢

乾薑 半錢

右㕮咀每七八錢水煎服

右抑氣例

煮附子醋製佐以當歸則氣中之血  
藥也今世以童便酒醋鹽水四製而以四物佐之  
皆本於此人人知之故不著 氣鬱多者宜於雜  
病氣證門中選用不必拘此

東垣益胃升陽湯 治婦人經候不調或血脫後脉弱食少水泄日二三行

黃芪 貳錢

白朮 參錢

炒麵 豈錢半

當歸身

陳皮

炙甘草

人參 各壹錢

升麻

柴胡 各半錢

黃芩 半錢

右㕮咀每服半兩水煎腹痛加芍藥嗽去人參

補中益氣湯

治婦人室女經候不調脉微食少體倦

或熟

方見雜病首冊勞卷門

四君子湯

六君子湯

方見雜病首冊虛勞門

右補氣例

調經

大溫經湯

金匱

治衝任虛損月候不調或

來多不已或過期不行或崩中去血過多或經損  
妊娠血停留小腹急痛五心煩熱並皆治之

吳茱萸

湯泡

牡丹皮

各一錢

白芍藥

肉桂

去龜皮

阿膠 碎炒

甘草 各一錢

麥門冬

去心

半夏 貳錢半

小溫經湯

簡易

右作二服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服

當歸

附子

炮各等分

右㕮咀每服三錢水一盞煎捌分空心溫服  
溫經湯和劑治婦人血海虛寒月水不調

川芎

當歸

各等分

蓬木各壹錢半人參

牡丹皮

各壹錢半錢

芍藥

各半錢

水二鍾煎至一鍾不拘時服

滋血湯

滋養榮血補婦人治血海久冷

當歸

壹錢半

川芎

各等分

芍藥

各半錢

牡丹皮

人參

芍藥

各半錢

琥珀另研各

半夏麴

官桂

阿膠炒

酸棗仁

甘草

各半錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服  
加味吳茱萸湯 治衝任衰弱月候愆期或前或後  
或崩漏不止赤白帶下小腹急痛每至經脉行時  
頭眩飲食或少氣滿心怯肌肉不澤悉皆治之

半夏貳錢

吳茱萸

當歸各壹錢半

苦梗

南木香

防風

牡丹皮

甘草

各壹錢

官桂

北細辛

各半錢

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾食前服

桃仁散

治婦人月水不調或淋瀝不斷斷後復來狀如瀉水四體虛倦不能飲食腹中堅痛不可行動月水或前或後或經月不來多思酸物

桃仁

半夏

川牛膝

桂心

人參

蒲黃

牡丹皮

川芎

澤蘭葉各壹錢

赤芍藥

生地黃

各壹錢半

粉草

半錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

薑黃散

治血臟久冷月水不調脅腹刺痛

薑黃

片子者

白芍藥各貳錢

玄胡索

牡丹皮

當歸

各壹錢半

蓬朮

紅花

桂心

川芎

各壹錢

右作一服水二鍾酒半鍾煎至一鍾不拘時服  
紫石英丸本治婦人病多是月經乍多乍少或前或後時發疼痛醫者一類呼為經病不曾說是陰勝陽是陽勝陰所以服藥少效蓋陰氣乘陽則胞寒

氣冷血不運行。經所謂天寒地凍，水凝成冰，故令乍少。而在月後，若陽氣乘陰，則血流散溢。經所謂天暑地熱，經木沸溢，故令乍多。而在月前，當別其陰陽，調其血氣，使不相乘，以平為期。宜服此丸。

紫石英

細研水飛

川烏

炮

杜仲

絲炒去

禹餘糧

煅醋淬

遠志

去心

澤瀉

桑寄生

桂心

龍骨

別研

當歸

人參

肉蓯蓉

酒浸

石斛

乾薑

五味子

甘草

炙各

壹兩

牡蠣

煅

川椒

去白并口者不

右爲細末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前用米飲湯下。

暖宮丸 治衝任虛損，下焦久冷，月事不調，不能孕育，崩漏下血，亦白帶下，並皆治之。

生硫黃

陸兩

赤石脂

火煅

海螵蛸

附子

炮去皮臍各叁兩

禹餘糧

玖兩火煅醋淬

右爲細末，醋糊爲丸，如梧桐子大。每服三十九空心，用溫酒送下。

內補當歸丸 治血氣虛損，月水不調，或崩中漏下。

內補當歸丸

治血氣虛損，月水不調，或崩中漏下。

去血過多肌體羸困及月水將行腰腿重痛並皆治之

當歸去蘆炒

阿膠炒

白芷

續斷

乾薑炮

芎藭

甘草炙各肆兩

熟地黃半兩

附子炮去皮臍

白芍藥

肉桂各貳兩

吳茱萸湯泡

白术各參兩

蒲黃炒

大茴

右爲細末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服五十丸空心用溫酒送下。

熟地黃丸

治婦人風虛勞冷胃弱水穀不化或

腸壅受冷，太便時泄，或月水不調淋瀝不止，或閉斷不通，結聚癥瘕久不成胎，一切諸虛之證。

熟地黃

五味子各壹兩半

柏子仁炒另研

牛膝去苗酒浸培

芎藭

禹餘糧火燶醋淬

山藥

肉蓯蓉酒浸

卷柏去根

白芷

厚朴去麌皮，製

乾薑炮

赤石脂貳兩煅另研

杜仲去麌皮，炙

防風壹兩

人參去蘆

川椒去目并合口者

蛇床子

續斷各柒錢半

紫石英煅另研水飛

石膏 煅另研  
各參兩

當歸 去蘆炒  
各一兩

澤蘭 去梗  
各一兩

官桂 去盆皮各一兩  
貳兩貳錢半

石斛 壹兩壹錢半

甘草 炙壹兩  
半錢半

右爲細末，煉蜜爲丸，如梧桐子大，每服五十丸空心用溫酒或米飲送下。

禹餘糧丸

治血虛煩熱，月水不調，赤白帶下漸成崩漏。

禹餘糧 火煅  
各一兩

白石脂 各壹兩

附子 炮去皮臍  
各一兩

鱉甲 炙  
去裏，醋  
各一兩

桑寄生 各一兩

白朮

厚朴 去皮，  
製  
各一兩

當歸 去蘆，  
各一兩

柏葉炒

乾薑 炮各一兩

白芍藥

狗脊 去毛各一兩

右爲細末，煉蜜和丸，如梧桐子大，每服五十丸空心用溫酒或米飲湯送下。

鹿茸丸

治衝任虛損，又爲風寒所乘，尺脉微小甚者，可灸關元穴。

鹿茸 炙  
各一兩

赤石脂

禹餘糧 各壹兩

續斷 貳兩

柏葉

附子 炮  
各一兩

熟地黃

當歸

酒浸

右爲朱酒糊丸，梧子大，每服五十丸，空心溫酒送下。按此足少陰厥陰藥也，今人多用之，故收入治血。

虛濕勝帶下甚捷

升陽舉經湯加味 治經水不調右尺脉按之空虛是氣血俱脫太寒證輕手其脉數疾舉指弦緊或澀皆陽脫之證陰火亦亡見熱證於口鼻眼或渴此皆陰躁陽欲去也當溫之降之引之燥之此法大升浮血氣補命門之下脫也諸藥豆根近留處去留便是

柴胡根

當歸根

白朮

黃芪各參錢

藁本去土

羌活根

防風根

各貳錢

紅花

白芍藥各伍

獨活根壹錢半

桃仁去皮尖研拾枚

細辛陸分

川芎

熟地黃水中沉者

人參去蘆

黑附子炮去皮臍

甘草稍炙各壹錢

肉桂去龜皮秋分伍分夏不用

右爲麩末每服貳錢水一盞煎至八分空心稍熱

服

調經破血之劑 紅花當歸散 治婦人血脈虛竭或大積瘀血經候不調或斷續不定時作腹痛腰胯重疼攻刺小腹緊硬及室女月水不通並皆治之

紅花

蘇木搗碎各壹錢

桂心壹錢半

白芷

當歸尾

劉寄奴 錄各貳

赤芍藥 參錢

甘草 半錢

右作一服水一鍾酒一鍾同煎至一鍾空心服  
大玄胡索散 治婦人經病并產後腹痛或腹滿喘  
悶或癥瘕癖塊及一切心腹暴痛

玄胡索

赤芍藥

川棟子 去核

蓬莪术

京三稜 煅

厚朴 薑製

當歸

黃芩

川芎

桔梗

檳榔 各壹錢

木香

官桂 去龜皮

甘草 各半錢

大黃 貳錢

右作一服水一鍾煎至一鍾食前服

鼈甲丸 治婦人月經不調肌肉黃瘁脇下積氣結  
痛時發刺痛漸成勞狀

鼈甲 去裏

桂心

三稜 醋煮炒

牡丹皮

天牛膝 去苗

琥珀

荊子 取肉

桑仁 去皮尖雙

土瓜根

大黃 醋炙

各等分

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服十五丸食  
前用桃仁湯送下

針灸 心月經不調 陰獨 三分此冗大効須待經定  
此冗大効須待經定

三分此冗大効須待經定

東又法內踝下白肉際青脉上灸隨年壯

集又法

中極

三陰交

腎俞

氣海

心經閉久忽大崩復又斷絕復又大行不調者 豐

隆止血

石門

斷經

婦人五旬經斷後再行或多或少或瘀或紅並下腹

中氣滿如胎孕

天樞

中脘

氣海

各五分立愈

甲婦人漏下苦血閉不通逆氣脹

血海主之

女子

胞中痛月水不以時休止

天樞主之

千金作

腹脹腸

小腹脹滿痛引陰中月水至則腰脊痛

胞中瘕子門有寒引體寒水道主之

千金引體作

太小便不通

身痛產寶經水者行氣血通陰陽以榮於身者也氣血盛陰陽和則形體通或外虧衛氣之充養內乏榮血之灌溉血氣不足經候欲行身體先痛也越痛散治血氣虛寒身體作痛

虎骨

伍銖

扶苓

續斷

當歸

芍藥

白芷

藁本

防風

甘草

白术

附子各參銖

右爲麤末每服五錢水二盞薑五片棗二枚煎至一盞不拘時服

**腹痛** 良婦人經來腹痛由風冷客於胞絡衝任或傷手太陽少陰經用溫經湯桂枝桃仁湯若憂思氣鬱而血滯用桂枝桃仁湯地黃通經丸 方見雜經門 若血結而成塊用萬病丸 薛前證若風寒傷脾者六君子加炮薑 方見雜病虛勞 思慮傷血者四物加參术 方見雜病虛勞 思慮傷氣者歸脾加柴梔 方見雜病健忘 鬱怒傷血者歸脾逍遙兼服餘參前後論治之 戴經事來而腹痛者經事不來而腹亦痛者皆血之不調故也欲調其血先調其氣四物湯加茱萸半錢香附子壹錢和氣飲如茱萸半錢亦可用痛甚者玄胡索湯然又恐感外

則飲食微痛痛不因血尤宜詳審和氣飲却能兼治因冷而節因節而痛宜大溫經湯冷甚者去麥門冬不用

丹抑氣丸治臨經之時腹痛以四物湯加玄胡索陳皮牡丹皮甘草痛甚以豆淋酒痛少以童便煮香附入條芩為丸經水將來而痛者四物湯加桃仁香附黃連

將行時  
痛為帶

河

八物湯 治經事將行臍腹絞痛臨經痛者血滯

故也

川芎貳錢

當歸

芍藥

經晚  
爲滯

熟地黃

各貰錢

木香

檳榔

玄胡索

告棟

碎炒焦各壹錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服。  
本治婦人月經壅滯每發心腹臍痛不可忍及治產後惡露不快血上搶心迷悶不省氣絕欲死者

琥珀散

京三稜

蓬莪术

赤芍藥

劉寄奴

牡丹皮

熟地黃

官桂

菊花

真蒲黃

當歸

各壹兩

濟生方無菊花蒲黃有玄胡索烏

右前五味用烏豆一升生薑半斤切片米醋四升同煮豆爛爲度焙乾入後五味同爲末每服二錢溫酒調下空心食前服一方不用菊花蒲黃用烏藥玄胡索亦佳予家之秘方也若是尋常血氣痛只一服產後血衝心一服便下常服尤佳予前後救人急切不少此藥亦宜多合以濟人  
**大交加散** 治榮衛不和月經湛濁逐散惡血腹痛經血諸疾並皆治之

生薑

貳斤搗取汗存滓用

生地黃

貳斤取汗存滓

白芍藥

藥

卷一百一十五

當歸

桂心

各壹兩

紅花

炒無惡血不用

沒藥另研各半兩

蒲黃

隔紙炒各壹兩

玄胡索

醋紙包煨熱用布擦去皮

右將地黃汁炒生薑滓，生薑汁炒地黃滓，各焙乾用諸藥爲細末，每服三錢，溫酒調下。若月經不依常蘇木煎酒調下。若腰痛，糖酒調下。

交加地黃丸

治婦人經不調，血塊氣痞，肚腹疼痛。

生地黃

搗汁存滓

老生薑

搗汁存滓各壹斤

玄胡索

當歸

明沒藥

川芎

各壹兩

芍藥

各貳兩

木香

各壹兩

桃仁

去皮尖

人參

各半兩

香附

半斤

右爲末，先以生薑汁浸地黃滓，以地黃汁浸生薑滓，晒乾，皆以汁盡爲度。共二十味作一處，晒乾研爲末，醋糊爲丸，空心以薑湯下。

大交加散 治婦人榮衛不通，經脈不調，腹中撮痛，氣多血少，結聚爲癥。產後中風。

生地黃

生薑

各伍兩各研取汁

右交互取汁，浸一夕，各炒黃，漬汁盡爲度。末之，尋常腹痛，酒調下，三錢。產後尤不可闕。

溫經湯

方見前

雲桂枝桃仁湯 治經候前先腹痛不可忍

桂枝

芍藥

生地黃 各貳兩

桃仁 肆拾枚

甘草 壹兩

右爲麩末每服五錢水二盞薑三片棗一枚同煎去滓溫服

玄胡索湯 濟生 治婦人室女七情傷感遂使血與氣併

心腹作痛或連腰脇或引背膂上下攻刺甚作擗  
搘經候不調但是切血氣疼痛並可服之

當歸 浸剉炒去蘆酒

玄胡索 炒去皮

蒲黃 炒

赤芍藥

官桂 不見火各半兩

片子薑黃 洗

乳香

沒藥

木香 不見火各參錢

甘草

炙貳錢半

右咬咀每服四錢水一盞半生薑七片煎至七分  
去滓食前溫服 吐逆加半夏橘紅各半兩

丹瘀血

香附子

醋煮肆兩

桃仁 去皮尖

牡丹皮

大黃

蒸肆兩

當歸 各壹兩

川芎

紅花

各半兩

瓦龍子 煅醋煮一

書後貳兩

右炊餅爲丸空心溫酒下各四丸

三神丸 治室女血氣相搏腹中刺痛痛引心端經

詞經

女科

卷之三

行灤少或經事不調以致疼痛，

橘紅 貳兩

玄胡索 去皮醋煮

當歸

赤蘆酒浸剉略炒各壹兩

右爲細末酒煮米糊爲圓如梧桐子大每服七十圓加至百圓空心艾湯送下米飲亦得。

埴柴胡丁香湯 治婦人年三十歲臨經預先脅腰痛甚則腹中亦痛經縮一三百步

柴胡

羌活

丁香

全蝎

當歸身

生地黃

右都作二服水四盞煎至一盞去渣稍熱食前服沒藥除痛散 逐寒邪療腹痛

蓬术 炮壹兩

當歸 焙

玄胡索

五靈脂

肉桂 去龜皮

良薑 炒

蒲黃 炒

甘草 炙

、沒藥 各半兩

右爲末每服五錢溫酒調服

婁一婦人三十歲每因浴後必用冷水淋通身又嘗大驚遂患經來時必先少腹大痛口吐涎水然後經行行後又吐水一百其痛直至六七日經水止時方住百藥不効予診其脉寸滑大而弦關尺皆弦大而急尺小於關關小於寸所謂前大後小也遂用香附參兩半夏貳兩茯苓黃芩各壹兩半棗實玄胡牡丹

皮人參當歸白朮桃仁各壹兩黃連柴錢川棟遠志甘草各半兩桂參錢茱萸壹錢半分十五貼水煎入生薑汁兩塊熬熟服後用熱湯洗浴得微汗乃已忌當風坐臥手足見水并喫生冷服二十貼全愈半年後又因驚憂前病復舉腰腹時痛小便淋閉心惕惕跳驚悸予意其表已解病獨在裏先與灸少衝勞宮崑崙三陰交止悸定痛次用桃仁承氣大下之下後用香附參兩蓬木當歸身各壹兩半三稜玄胡索桂太黃青皮俱醋制青木香礞石木通桃仁各壹兩烏藥甘草縮砂檳榔苦棗肉各半兩木香吳茱萸

谷貳錢分作二十貼入新取牛膝濕者貳錢生薑五片用荷葉湯煎服服訖漸安

右行血例

加味烏沉湯 治婦人經水欲來臍腹疼痛

烏藥

縮砂

木香

玄胡索各壹兩

香附炒去毛貳兩

甘草壹兩半

右細剉每服七錢水一盞半生薑三片煎至七分

不拘時溫服

右抑氣例

一婦人經行腹痛食則嘔吐肢體倦怠發熱作渴

此乃素稟氣血不足用八珍湯二三十餘貼而愈後生子一年而經不行前證仍作服八珍湯逍遙散百餘劑方愈入珍湯卽雜病虛勞門入物湯

右補虛例

汪一婦人瘦小年二十餘經水紫色或前或後臨行腹痛惡寒喜熱或時感寒腹亦作痛脉皆細濡近滑兩尺重按略洪而滑此血熱也或謂惡寒如此何謂爲熱曰熱極似寒也遂用酒者黃連肆兩香附歸身尾各貳兩五靈脂壹兩爲末粥丸空腹吞之而愈一婦年二十歲六月經行腹痛如刮難忍求死脉

得細軟而馳尺則沉弱而近駛汪曰細軟屬濕裏則爲熱尺沉屬鬱滯也以酒煮黃連半斤炒香附蔴兩五靈脂半炒半生參兩歸身尾貳兩爲末粥丸空心湯下三四錢服至五六料越九年得一子又越四年經行兩月不斷腹中微痛又服前丸而愈續後經行六七日經止則流清水腹中微痛又服前丸而痛亦止又經往只有七八日若至行時或大行五六日續則適來適斷或微紅或淡紅行後常流清水小腹大痛漸連遍身胸背腰腿骨裏皆痛自己至酉乃止痛則遍身冷熱汗大出汗止痛減尚能飲食自始痛至

今歷十五年前藥屢服屢効今因効者何也。汪復診之脉皆洪滑無方。幸其尚有精神。汪曰此非舊日比矣。舊乃鬱熱。今則虛寒。東垣曰始為熱中終為寒中是也。經曰脉至而從按之不鼓。乃陰盛陽當作寒治。且始病時而形微小。今則形肥大矣。醫書曰瘦人血熱肥人氣虛。豈可同一治耶。所可慮者汗大泄而肺不為汗衰。血大崩而脉不為益減耳。其痛日重夜輕。知由陽虛不能健運。故亦凝滯而作痛。以證參脉。宜用助陽。若得脉減痛輕。方為佳兆。遂投參芪歸术大劑。加桂附。一貼來早再診。脈皆稍寧。服至三十

貼時當二月至五月。病已愈。蓋病有始終。寒熱之異藥有前後。用舍不同。形有肥瘦。壯少不等。豈可以一方而通治哉。

丹經過後而作痛者。乃虛中有熱。所以作痛。新荷姐頭痛口乾。經行後身痛。腰甚痛。

生地黃

白朮

芍藥各壹錢

芎芻

歸身尾各伍分

黃檗炒

甘草炙各叁分

右用水入少酒煎服

按經後腹痛為虛明。甚若脉不數。證無顯熱。未可斷其為熱也。無熟人珍為宜。有熟逍遙為宜。

右寒熱例

吳茭山治一婦經血過多五心煩熱日晡潮熱諸藥不効以四物加胡黃連三服而愈 薛新甫治一婦人發熱口乾月經不調兩腿無力服祛風滲濕之劑腿痛體倦一膝浮腫經事不通薛作肝脾腎三經血虛火燥證名鶴膝風用六味八味丸兼服兩月形體漸健飲食漸進膝腫漸消不半載而痊前證若脾胃虛寒腿足軟弱或足膝枯細用八味丸若飲食過多腿足或腎內癟脹或浮腫作痛用補中益氣加茯苓半夏主之 一婦人經候過期發熱倦怠或

用四物黃連之類反兩月一度且少而成塊又用峻藥通之兩目如帛所教薛曰脾為諸陰之首目為血脉之宗此脾傷五臟皆為失所不能歸于目矣遂用補中益氣濟生歸脾一湯專主脾胃年餘尋愈 婦人月事未期而至發熱自汗服清熱止汗之劑反作渴頭痛手掉身麻此因肝經風熱用柴胡炒芩連炒山梔歸芍生地丹皮各壹錢參芪芩术各壹錢伍分川芎七分甘草五分二劑其汗全止更以補中益氣而愈凡發熱久者陽氣亦自病須調補之 一婦人氣血素虛經行不調飲食少思日晡熱甚用十全

大補加山茱萸丹皮麥門冬五味子而愈次年秋患寒熱或用清脾飲而元氣愈弱仍以前藥而愈一婦人素勤苦冬初患咳嗽發熱久而吐血益汙經水兩三月一至偏身作痛或用化痰降火藥口噤筋攣此血虛而藥益損耳用加減八味丸及補中益氣加來門五味山藥治之年餘而痊

經水適來適斷者或有往來寒熱者先服小柴胡湯以去其寒熱後以四物湯和之

本婦人血脉不調往來寒熱狀如勞倦

當歸

川芎

甘草

黃芪

官桂

去麌皮  
各壹兩

熟地黃

白朮

白芍藥

各貳兩

柴胡

爲細末每服五錢棗一枚水煎空心溫服白湯點服亦得常服不生帶下調血脈養子官終身無病太倉公治二女病腰背痛寒熱衆醫皆以爲寒熱也公診之曰內寒月事不下也卽竄以藥旋下病已病得之欲男子不可得也所以知其病者診其脉時切之腎脉也竇而不屬竇而不屬者其來難堅故曰月不下肝脉弦出左口故曰欲男子不可得也蓋男子

以精爲主婦人以血爲主男子精盛則思室女子月盛則懷胎夫肝攝血者也厥陰弦出寸部又上魚際則陰血盛可知矣別詳師尼寡婦條內 薛新甫治一婦人耳內或耳後項側作痛寒熱口苦月經不調此肝火氣滯而血凝用小柴胡加山梔川芎丹皮治之諸證悉退月事不行而寒熱者詳經閉門

**熱入血室**良婦人傷寒傷風發熱經水適來晝則安靜暮則譫語有如瘡狀此爲熱入血室台者無犯胃氣及上二焦宜服小柴胡湯若脉運身涼當刺期門穴下針病人五吸停針良久徐徐出針凡針期門穴

必瀉勿補肥人寸瘦人寸半也薛前證若因勞役或怒氣發熱適遇經行而患崩證者亦用小柴胡湯加生地黃治之血虛用四物加柴胡若病既愈而熱未已或元氣素弱竝用補中益氣湯脾氣素鬱用濟生歸脾湯血氣素虛用十全大補湯許學士治一婦病傷寒發寒熱遇夜則如見鬼狀經六七日忽困許視之曰得病之初曾值月經來否其家云經水方來病作而經遂止得一二百發寒熱晝雖靜夜則有鬼祟從日昨不省人事許曰此乃熱入血室證仲

景云婦人中風發熱惡寒經水適來晝則明了暮則  
讞語如見鬼狀發作有時此名熟入血室醫者不曉  
以剛劑與之遂致胸膈不利涎潮上喘急息高昏  
冒不知入當先化其痰後除其熱乃急以子呷散投  
之兩時頃涎下得睡省人事次授以小柴胡湯加生  
地黃三服而熱除不汗而自解矣 一婦人患熱入  
血室證醫者不識用補血調氣藥治之數日遂成血  
結胸或勸用前藥許公曰小柴胡已遲不可行也無  
已刺期門穴斯可矣予不能針請善針者治之如言  
而愈或問熱入血室何爲而成結胸也許曰邪氣傳

入經絡與正氣相搏上下流行遇經水適來適斷水  
氣乘虛入于血室血爲邪所迫上入肝經肝受邪則  
讞語而見鬼復入膻中則血結于胸中矣何以言之  
婦人平居水養木血養肝方未受孕則下行之爲月  
水既孕則中畜之以養胎及已產則上壅之以爲乳  
皆血也今邪逐益併歸于肝經聚于膻中結于乳下  
故手觸之則痛非藥可及故當刺期門也 虞恒德  
治一少婦夏月行經得傷寒似瘧譴語狂亂諸醫皆  
以傷寒內熱投雙解散解毒湯服之大汗如雨反如  
風狀次以牛黃丸金石之藥愈投愈劇一日延虞診

視脈弦而大，虞思傷寒內熱，狂亂六陽俱病，豈不口乾舌黑，况脈不數，病體微之，或熱或靜，其腹急痛，意必有內傷，在前傷寒，在後今傷寒得利雖已，內傷則尚存故也。因細問之，患者曰：正行經時，因飲食後，多汗用冷水抹身，因得此證。方知冷水外閉其汗，內阻其血，邪熱入室，經血未盡，血得邪熱，乍靜乍亂，寒熱譫語，掉眩類風，須得玉燭散，下之而愈。後譫語已定，次以四物小柴胡湯調理，五日熱退，身涼，其患遂瘳。衍義云：一婦人溫病已十日，診之，其脉六七至，而濶寸稍大，尺稍小，發寒熱，頰赤，口乾不了了耳。

聲問之，病數日，經水乃行，此屬少陽熱入血室也。若治不對病，則必死。乃按其證，與小柴胡湯服之，二百又與小柴胡湯加官桂乾薑，二日寒熱遂止。又五腑下急痛，又與抵當丸，微利，腑下痛，瘡身漸涼，脈漸勻，尚不了了，乃復與小柴胡湯，次日但胸中熱躁，口鼻乾，又少與調胃承氣湯，不得利，次日心下痛，又與太陷胸湯半服，利三行，次日虛煩不寧，時妄有所見，復狂言，雖知其尚有燥屎，以其極虛，不敢攻之，遂與竹葉湯去其煩熱，其夜大便自通，至晚兩次中，有燥屎數枚，而狂言虛煩盡解，但咳嗽唾，此肺虛也。若不治，

恐成肺痿，遂與小柴胡湯去人參，大棗，生薑，加乾薑五味子湯。一日咳減，二日而病悉愈。以上皆用仲景方。  
薛立齋治一婦人，經行感冒，風寒日間，安靜至夜譫語，用小柴胡加生地治之，頓安。但內熱頭暉，用補中益氣加蔓荆子而愈。後因惱怒寒熱譫語，胸脇脹痛，小便頻數，月經先期。此是肝火血熱妄行，用加味逍遙加生地黃而愈。  
一婦人因怒寒熱頭痛譫語，日晡至夜益甚，而經暴至，蓋肝藏血，此怒動火而血妄行，用加味逍遙散加生地黃治之，神思頓清。但食少體倦，月經未已，蓋脾統血，此脾氣虛，不能攝血。

用補中益氣治之，月經漸止。  
一婦人懷抱素，驚感冒，經行譫語，服發散之劑，不應用寒涼降火，前證益甚。更加月經不止，肚腹作痛，嘔吐不食，痰涎自出。此脾胃虛寒，用香砂六君，脾胃漸健，諸證漸退。又用歸脾湯，而全愈。

加味小柴胡湯 治婦人傷風續得寒熱，發作有時，經水適斷，此爲熱入血室，其血必結致如瘡狀。  
柴胡參錢 半夏 黃芩各貳錢  
生地黃 人參各壹錢半 甘草半錢  
作一服，水一鍾，薑五片，棗二枚，煎一鍾，不拘時服。

乾薑柴胡湯 治婦人傷寒經脉方來熟入血室寒  
熱如瘡或狂言見鬼

柴胡 壹錢

桂枝 叁分

枯萎根 伍分

牡蠣 煅

乾薑 炮

甘草 炒各參分

右水煎服汗出而愈

海蛤散

治婦人傷寒血結胸膈宜服此藥及針刺

門穴

海蛤

滑石 煅水飛

甘草 各一錢

右爲末每服一錢用鷄子清調下小腸通利其病

芒硝 壹兩

泄瀉

汪右山治一婦經行必瀉

古然後行診其脈

皆濡弱此脾虛也脾屬血屬濕經水將動脾血先已  
流注血海然後下流爲經脾血既虧則虛而不能運  
行其濕令作參苓白朮散每服一錢一日米飲調下  
二三次月餘經行不瀉矣 一婦年逾四十形長色  
脆病經不調右脉浮軟而大左脉虛軟而小近駛嘗  
時經前作泄今年四月感風咳嗽用湯洗浴汙多因  
泄一月六月復因洗浴發瘡六七次瘡雖止而神思  
不爽至八月盡而經水過多白帶時下瀉泄遂覺右

脚疼痛，舊曾閃肭脚跟，今則假此延痛，腎腰脇尻骨頸項右邊筋皆掣痛，或咳嗽一聲，則腰眼痛如腰札，日輕夜重，吐號不已，幸痛稍止，飲食如常。今詳月水過多，白帶時下，日輕夜重，瀉泄無時，亦屬下多。乍陰宜作血虛論治，服四物止痛之劑，益甚。九月，汪復診視，始悟此病乃合神農所謂陽生則陰長之法矣。夫經水多，白帶下，常泄瀉，皆由陽虛陷下而然。命曰陽脫，是也。日輕夜重，蓋日陽旺，而得健運之職，故血亦無凝滯之患，而日故輕也。夜則陰旺，而陽不得其任，失其健運之常，血亦隨滯，故夜重也。遂以參术助

陽之藥煎服，五七貼，痛減，此亦病證之變治法，殊常故記之。


**月水不斷** 婦人月水不斷，淋瀝無時，或因勞損氣血，而傷衝任，或因經行而合陰陽，皆令氣虛，不能攝血。若時止時行，腹痛脉沉細，此寒熱邪氣客於胞中，非因虛弱也。

**薛前證** 若鬱結傷脾，用歸脾湯，恚怒傷肝，逍遙散，肝火妄動，加味四物湯，脾氣虛弱，六君子湯，元氣下陷，補中益氣湯，熟傷元氣，前湯加五味麥門炒黑黃檗。儒者錢思習，子室年三十餘無嗣，月經淋瀝無期，夫婦異處幾年矣，思習欲為娶妾，以謀

諸余謂此鬱怒傷肝脾虛火動而血不歸經乃肝不能藏脾不能攝也當清肝火補脾氣遂與加味歸脾逍遙藥四劑送至其家仍告其姑曰服此病自愈而當受胎安可無娶也果病愈次年生子一婦人性急每怒非太陽耳項喉齒胸乳作痛則胸滿吞酸吐瀉少食經行不止此皆肝火之證肝自病則外證見土受克則內證作余先以四物加白朮茯苓柴胡炒梔炒龍膽清肝養血次用四君子加柴胡芍藥神鞠吳茱萸炒黃連以培土制肝漸愈惟月經不止是血分有熱脾氣尚虛以逍遙散倍用白朮茯苓陳

皮又以神中益氣加酒炒芍藥兼服而安一婦人多愁經行旬餘方止後淋瀉無期肌體倦瘦口乾內熱盜汗如洗日晡熱甚皆由肝脾虧損無以生發元氣用參芪歸朮茯神遠志棗仁麥門五味丹皮龍眼肉炙草柴胡升麻治之獲痊一婦人懷抱不舒腹脹少寐飲食素少痰涎上湧月經頻數余曰脾統血而主泄此鬱悶傷脾不能攝血歸源耳用補中益氣濟生歸脾而愈

膠艾湯治勞傷血氣衝任虛損月水過多淋瀉不



阿膠炒

川芎

甘草

當歸

艾葉炒名參兩

熟地黃

白芍藥各肆兩

右咬咀每服半兩水煎 一方有黃芪  
續斷丸大治月水不斷口乾心煩四肢羸乏飲食減少

川續斷

當歸

烏鵲骨

黃芪

牛角鰓燒

五味子

熟地黃各壹兩

龍骨煅研

赤石脂

禹餘糧貳兩

地榆半兩

艾葉

附子

乾薑

川芎各柒錢半

右爲木煉蜜丸 檉子大 每服三十丸空心溫酒下

禹餘糧丸

治久冷月水不斷面黃肌瘦虛煩減食

禹餘糧貳兩

鹿角膠赤錢半粉炒

紫石英

續斷

赤石脂

熟地黃

川芎各壹兩

乾薑

黃芪

艾葉

柏葉炒

當歸炒

人參

白茯苓各半兩

右爲末煉蜜丸 檉子大 每三十丸空心米飲下

生薑丸

治血虛損月水不斷



牡蠣粉

赤石脂

代赭石

各壹兩

阿膠

川芎

當歸

鹿茸

續斷

乾薑

甘草貳錢半

右爲末，煉蜜丸梧子大，每服三十丸，空心溫酒下。經驗方 治經血不正。

黃芩

伍分

當歸

柏葉

蒲黃

右肆分

生薑

貳分

艾葉

壹分

生地黃

貳拾肆分

伏龍肝

拾貳分

右㕮咀用冰二升煎，取八合分二服。

又經血不止詩云：婦人經血久淋漓，舊衄蓮蓬燒。

作灰，熟酒一杯，調八字，自然安樂，更無疑。

又方 蓮蓬殼 捣霜花

貳味等分

爲末，每服二錢，空心米飲調下。

伏龍肝散治血氣勞傷，衝任脈虛，經血非時，注下，或如豆汁，或成血片，或五色相雜，臍腹冷痛，月經不止。

伏龍肝

水瓶麥門冬去心

赤石脂

各壹錢

熟地黃

艾葉

炒各壹錢半

當歸

炒去蘆

川芎

各貳錢半

肉桂

去龜皮

乾薑

炮

甘草 各半錢

右作一服水一鍾紅棗一枚煎至一鍾食前服  
固經丸 治經水過多不止乃陰挾熱所致法當補  
陰清熱

黃檗 參兩

龜板 炙肆兩

黃芩 貳兩

白芍藥 參兩

樗根皮 壓兩半

香附子

童便製  
壹兩半

五七十九

月水不利 良婦人月水不利者由勞傷氣血體虛而  
風冷客於胞內傷於衝任之脉故也若寸脈弦關脉

沉是肝病也兼主腹痛孔竅生瘡尺脉滑血氣實經  
絡不利或尺脉絕不至兼主小腹引腰痛氣攻胸膈  
也 醉前證屬肝膽二經蓋肝膽相爲表裏多因恚  
怒所傷若本經風熱用補肝散方見附門血虛用四物  
加酸棗仁若腎水不足用六味丸若患諸瘡瘍治見  
後

牛膝散 滑水不利臍腹作痛或小腹引腰氣攻  
胸膈

牛膝 酒製

桂心

赤芍藥

桃仁 壱兩 去皮尖

玄胡索炒

當歸 酒浸

同上

女科

卷之三

牡丹皮 木香 各半 銀錢半

右爲末每服一錢空心溫酒調下

牡丹散 治月候不利腹臍疼痛不欲食

牡丹皮

大黃 炒各半 壴兩

赤茯苓

梔仁

赤芍藥 各半

當歸

桂心

木香 各半

白朮

石韋 去毛

各半

生地黃

右㕮咀每服三錢水一盞薑三片煎七分空心溫

服

產寶方 泊女人月經不利臍下氣脹上攻心口不

服

當歸 肆錢

乾漆 卷錢炒  
令煙盡

右爲細末蜜丸梧子大空心溫酒下十五丸

養榮湯 治婦人血海虛弱心中恍惚時多驚悸或  
發虛熱經候不調

白芍藥

川芎

熟地黃

薑黃

當歸

川薑

青橘皮

五加皮 各等分

牡丹皮

每服五錢水一盞半生薑五片烏梅一箇煎至一

蓋溫服不拘時送紫桂丸五十粒

紫桂丸方見帶下

過期不止

產寶云男子生於寅寅屬木陽中有陰故

男子得八數女子生於申申屬金陰中有陽女子得七數男以氣爲主八八則卦數已盡盡則陽精衰女以血爲主七七則卦數已終終則經水絕任衝脉虛衰太癸絕地道不逆而無子矣或勞傷過度喜怒不時經脉衰微之際又爲邪氣攻衝所以當止不止而崩下也 許學士云婦人經脈過期不及腰腹疼痛或七七數盡而月經下者宜用當歸散治之

當歸散 治婦人天癸已過期經脈不匀或二四月

不行或一月乃至腰腹疼痛素問云七損八益謂女子七數盡而經不依時者血有餘也不可止之但令得依時不腰痛爲善

方見前謂經平劑條

竹芩心丸 治婦人四十九歲已後天癸當住每月却行或過多不止用黃芩心枝條者二兩米泔浸七日炙乾又浸又炙如此七次爲末醋丸如桐子大每服七十丸空心溫酒送下日進二服

右二方熱者宜之

茺附湯

補任衝調血氣

乾薑

建兩

肉桂

去麞皮

附子

經過期  
不正爲  
勢有餘

言經

方解

龍骨 生用

防風 各壹兩

牡蠣 煅

當歸 各貳兩

鹿茸 卷兩

每服半兩水二鍾煎八分溫服

補中芎窮湯 治風虛冷熱勞傷衝任月水不調崩

中暴下產後失血過多虛羸腹痛或姪娠胎動不安

安下血

當歸

乾薑 炮各參兩

川芎 煎

黃芪

甘草 炙

吳茱萸 炮黃

杜仲 炒

熟地黃

人參 各壹兩

每服三錢水一鍾半煎一鍾空心服

薛前證若肝腎虛熱用當歸散肝血虛熱四物加柴

梔丹皮肝火內動小柴胡加山梔丹皮肝火血燥加

味逍遙散脾經鬱火加味歸脾湯肝脾鬱火歸脾逍

遙兼服肝腎鬱損歸脾六味兼服仍與前後月經不

調治驗同用

一婦人年五十內熱晡熱經水兩三

月一至此血虛有熱用逍遙散加山茱萸治之而愈

後有痰作渴或小便不調或頭暈白帶用六味丸而

安

脉問曰婦人年五十數一朝而清血二三百不止何

止。何以治之？師曰：此婦人前絕生經水，不下全反清血。此為居經，不須治。當自止。經水下常五日止者，五日愈。

講經

女科

經閉

內經陰陽別論云：二陽之病發心脾，有不得隱曲者。子不月其傳，為風消，為息賁者，死不治。潔古曰：女子月事不來者，先瀉心火，血自下也。內經曰：二陽之病，發心脾，有不得隱曲者。女子不月其傳，為風消。王啓玄注曰：大腸胃熱也。心脾受之，心主血，心病則血不流，脾主味，脾病則味不化，味不化則精不足，故其病則不能隱曲。脾土已虧，則風邪勝，而氣愈消也。又經曰：月事不來者，胞脈閉也。胞脈屬於心絡於胞中，今氣上迫肺，心氣不得下通，故月事不來，先服降心。

火之劑後服局方中五補丸後以衛生湯治脾養血也  
李東垣曰經閉不行有三補前人之闕婦人  
脾胃久虛形體羸弱氣血俱衰而致經水斷絕不行  
或病中消胃熱善食漸瘦津液不生夫經者血脉津  
液所化津液既絕爲熱所燶肌肉漸瘦時見渴躁血  
海枯竭名曰血枯經絕宜瀉胃之燥熱補益氣血經  
自行矣此病或經適行而有子子亦不成而爲胎病  
者有矣此中焦胃熱結也  
或心包絡脉洪數躁作時見大便祕澀小便雖清不利而經水閉絕不行此乃血海  
乾枯宜調血脈除包絡中火邪而經自行矣此下焦胞脈熱

或因勞心心火上行月事不來者胞脈閉也包  
脉者屬於心而絡於胞中今氣上迫肺心氣不得下  
通故月事不來宜安心補益瀉火經自行矣此上焦心肺熱結也  
裴澤之夫人病寒熱月事不至者數年又加喘  
嗽醫者率以蛤蚧桂附投之曰不然夫人病陰為陽  
所搏溫劑太過故無益反害投以涼劑涼血和血藥  
則行矣已而果然

五補丸局方補諸虛安五臟堅骨髓養精神

熟地黃

人參

牛膝

酒浸去蘆燒乾

白茯苓

地骨皮各等分

右爲細末，煉蜜丸如梧子大，每服三五十丸，溫酒下空心服。

衛生湯

當歸

甘草 壱兩

白芍藥 各貳兩

黃芪 參兩

右爲末，每服半兩水一盞煎至一盞溫服。空心如虛者，加入參壹兩。

右東垣潔古治血枯之法皆主於補血，瀉火也。補血者，四物之類；瀉火者，東垣分上中下，故火在中則善食，消渴治以調胃，承氣之類；火在下則太小。

秘澀治以玉燭之類。玉燭者，四物與調胃，承氣等分也。火在上則得於勞心治以芩連及二和之類；三和者，四物涼膈，當歸等分也。潔古先服降心火之劑者，蓋亦芩連三和玉燭之類後服五補衛生者，亦補氣之劑也。

素帝曰：有病胸脇支滿者，妨於食，病至則先聞腥臊臭，出清液，先唾血，四肢清，目眩，時時前後血。病名爲何？何以得之？岐伯曰：病名血枯，此得之少年時，有所大脫血。若醉入房中，氣竭，肝傷，故月事衰少，不來也。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以四鳥鰣骨一隻，茹一一味，并

合之丸以雀卵大如小豆以五丸爲後飯飲以飽魚  
汁利腸中及傷肝也

腹中論○王註云烏鵲魚骨主血閉竈茹主散惡血雀卵主血

雀卵不拘數和丸小豆大每服五丸至十九丸煎鮑魚湯食後日服以美膳

右岐伯河間治血枯之法

四血枯經閉者四物湯加桃仁紅花陰虛經脈久  
不通小便短澀身疼者四物加蒼朮牛膝陳皮生甘  
草作湯又用蒼朮丸加蒼耳酒芍藥爲丸就煎前藥  
吞下

右丹溪治血枯太法

薛夫經水陰血也屬衝任一脈主上爲乳汁下爲  
水其爲患有因脾虛而不能生血者有因脾鬱傷而  
血耗損者有因胃火而血消爍者有因脾胃損而血  
少者有因勞傷心而血少者有因怒傷肝而血少者  
有因腎水不能生肝而血少者有因肺氣虛不能行  
血而閉者治療之法若脾虛而不行者調而補之脾  
鬱而不行者解而補之胃火而不行者清而補之脾  
胃損而不行者調而補之勞傷心血而不行者靜而  
補之怒傷肝而不行者和而補之肺氣虛而不行者  
補脾胃虛而不行者補肺脾經云損其肺者益其

氣損其心者調其榮衛損其脾者調其飲食適其寒溫損其肝者緩其中損其腎者益其精審而治之庶無誤矣

一婦人停食飽悶發熱或用入參養胃湯益甚再用木香檳榔丸泄瀉吐痰腹中成塊飲食少息又用一陳黃連厚朴之類前證益甚腹脹不食月經不至余以爲胃氣虧損用補中益氣加茯苓半夏三十餘劑脾胃健而諸證愈又二十餘劑而經自行一婦人飲食後或腹脹或吞酸彼服枳木丸吞酸益其飲食日少胸膈痞滿腿內酸痛畏見風寒又服養胃湯一劑腿內作痛又一劑腿膝浮腫月經不行

余謂鬱結所傷脾虛溼熱下注侵晨用四君二陳等歸午後以前湯送越鞠丸飲食漸進諸證漸愈又用歸脾八珍二湯兼服兩月餘而經行一婦人性沈多慮月經不行胸滿少食或作脹或吞酸余以爲中氣虛寒用補中益氣加砂仁香附煨薑二劑胸膈和而飲食進更以六君加芎歸貝母桔梗生薑太棗數劑脾胃健而經自調矣一婦人素有胃火或用清胃散而安後因勞役躁渴內熱肌肉消瘦月經不行余謂此胃火消爍陰血用逍遙散加丹皮炒梔以清胃熱用八珍湯加茯苓遠志以養脾血而經自行矣

一婦人久患瘡形體怯弱內熱晡熱自汗盜汗飲食少思月事不行或用通經丸虛證人具余曰此因虛而致瘡因瘡以閉經也用補中益氣及六味地黃丸各百餘劑瘡愈而經行 一婦人久患瘡瘡作則經不行形虛脉大頭痛懶食大便泄瀉小便淋瀝口乾唇裂內熱腹膨蓋由久瘡正氣已虛陰火獨旺用補中益氣湯治之尋愈惟不時頭痛乃加蔓荆子而痛止又兼用六味地黃丸而經行 一婦人因勞耳鳴頭痛體倦此元氣不足用補中益氣加麥門五味而痊二年後得子因飲食勞倦月經不行晡熱內熱

自汗盜汗用六味地黃丸補中益氣湯頓愈 一婦人胃氣素弱爲寒每吐血咳嗽發熱盜汗經水三百不行余以爲悲則傷肺思則傷脾遂朝服補中益氣加桔梗貝母知母夕用歸脾湯送地黃丸而愈 一癰婦少寐經水兩月餘一至誤服通經丸屢轉無寐午前惡寒午後發熱余以爲思慮虧損脾血用歸脾湯作丸午前以六君送下午後以逍遙散送下兩月餘得寐半載經行如期年餘而瘡愈  
右薛氏治血枯大法以補養真元爲主蓋本易水師弟之言而廣之王道也

下利解  
斷者利

止鼻

經閉

女科

自古

脉問曰婦人病下利而經水反斷者何也師曰但當止利經自當下勿怪所以利不正而血斷者直下利亡津液故經斷利止津液復經當自下問曰婦人病經水斷一二月而反經來今脉反微溫何也師曰此前月中若當利故令妨經利止月經當自下此非軀也婦人血下咽乾而不渴其經必斷此榮不足本自有微寒故不可飲渴而別飲者津液得通榮衛自和其經必復下

有腹痛  
老氣為  
汗老  
痰

年

血寒

積結

胞門

寒傷

經絡

凝堅

在上

嘔吐

涎沫

久

成肺癰形體損分在中盤結繞脅寒疝或兩脇疼痛與臟相連或結熱中病在關元脉數無常肌若魚鱗時着男子非止久身在下未多經候不匀令陰掣痛少腹惡寒或引腰脊下根氣衝氣衝急痛膝脛疼煩奮忽眩冒狀如厥顛或有憂慘悲傷多嗔此皆帶下非有鬼神久則羸瘦脉虛多寒三十六病千變萬端審脈陰陽虛實緊弦行其針藥治危得安其雖同病脉各異源子當辨記勿謂不然

丹經候過期不行杜牛膝搗汁大半鍾以文胡末壹錢香附末枳殼末各半錢早調服

大萬病丸

治經事不來繞脅痛

乾漆

杵碎炒烟盡

牛膝

去苗酒浸宿

右爲末以生地黃斗臺升入一味藥末銀器內慢火熬可丸卽丸如桐子大每服二丸空心米飲或溫酒下

土牛膝散 治婦人室女血閉不通五心煩熱

土牛膝

當歸尾

各壹兩

桃仁

去皮研

紅花

各半兩

右爲細末每服一錢空心溫酒下

當歸乾漆丸療月經不利臍下懸逆氣脹滿

見調經門  
月水不利

治經雍滯臍腹疼痛

當歸

玄胡索

右爲麩末每服三錢薑三片水一鍾半煎至七分去滓稍熱服

當歸散 治血脉不通

當歸

穿山甲

灰炒

蒲黃

炒各半兩

辰砂

另研

麝香

少許

右爲細末研勻每服一錢食前熱酒調下

琥珀散 治心膈迷悶腹臟撮痛氣急氣悶月信不通等疾

天台烏藥

貳兩

當歸

莪术各壹兩

右爲細末每服二錢溫酒調下後以食壓之忌生  
冷油膩產後諸疾炒薑酒調下  
小腸移熱於大腸爲伏瘕爲沉王註云血澀不利則月事沉滯而不行  
聖治婦人月水滯滯不快結成瘕塊筋脹大欲死用  
馬鞭草根苗五斤剉細水五斗煎至一斗去渣別以  
淨器盛熬成膏食前溫酒調下半匙本草云馬鞭草辛涼破血瘀  
羅血極膏治婦人乾血氣以川大黃爲末用醋熬  
成膏子丸如鷄頭大每服一丸酒化開臨卧溫服大  
便利行後紅脈自下是婦人之仙藥也加當歸

仲婦人經水不利抵當湯主之亦治男子胸胱病有瘀血者方見復  
產寶方 治月經不通腹中痛

牛膝

陸分

大黃

桃仁

去皮尖炒

細辛

各伍分

川芎

當歸

各肆分

水蛭

米炒黃

右爲細末煉蜜丸梧子大每服二十丸空心溫酒

下

千金桃仁煎 治血積癰瘕月水不行

經開

大黃 濕紙裹蒸 朴硝

杏仁 製炒各貳兩

重蟲 壹兩去足  
翅炒黑

右爲細末醋二升半銀石器中慢火熬膏却入大黃桃仁重蟲末不任攪度可丸却入朴硝再攪食久出之丸如梧子大五更初溫酒下五丸至日午取下如赤豆汁雞肝臘棗衣樣候鮮紅任服仍以調氣藥補之

三稜丸 治婦人經脈不通氣痛帶下兼治血瘕

三稜 醋炒

川芎

蓬朮 醋炒

牛膝

蒲黃

玄胡索

番藺

牡丹皮

茺花

醋炒

白芷

當歸

地龍

去土酒浸炒

乾薑

炮各壹兩

大黃

貳兩爲末以米醋熬成膏和藥

右爲細末以太黃膏和丸如梧子大每服三五十丸空心醋湯下或紅花煎酒下

輕劑後六方重劑也

右經一節方七首皆治污血有熱而經閉前一方

紅花當歸散 治婦人經候不行或積瘀血腰腹疼痛及室女月經不通

紅花

當歸尾

紫葳

絕閉

牛膝

赤芍藥 玫兩

甘艸

蘇木

細剉各  
貳兩

白芷

各壹兩

劉寄奴 伍兩

桂心

右爲細末，空心熟酒調三錢服之。食前臨卧每服。  
若久血不行，濃煎紅花酒下。孕婦休服。一名凌霄  
花散，卽紫葳。

牛膝散

見調經門月水不利條

溫經湯

見前調經門

桂枝桃仁湯

治婦人月事不通，小腹膨脹疼痛。

牡丹散

見前調經門月水不利條

通經丸

本事

治婦人室女月候不通，或成血瘕。

入雞

子病同丸畏添  
入腸胃生瘡也

桂心

青皮 去白

大黃 炮

乾薑 炮

川椒 炒出汗

川烏 炮

蓬莪术

乾漆 炒煙盡

當歸

桃仁

製炒各等分

右爲末，先將四錢用米醋熬成膏，和餘六錢末，成  
劑。臼中杵丸，如桐子大，晒乾，每服二十丸，用淡醋  
湯下，加至三十丸。溫酒亦得。空心食前服。濟生  
去川烏加紅花等分。

經閉

丸

九

滋血湯 治勞動致臟腑衝住氣虛不能約制經血以致崩中或下鮮血或下五色連日不止淋漓不斷形羸血少倦怠困乏月水閉絕

馬鞭草

牛膝

荆芥穗 各貳兩

當歸

肉桂

牡丹皮

赤芍藥

川芎 各壹兩

右每服四錢烏梅一箇水二盞煎一盞食前服日進四五服服至半月或一月經脈自通  
右方七首皆治汚血有寒而經閉前四方輕劑後二方重劑也

大治月水不通屢試有驗厚朴不以多少薑汁炙細切濃煎去渣空心服不過三四劑瘥形實氣盛者宜之

丹積瘀傷經不行夜則妄語

瓜蒌子

壹兩

黃連

半兩

吳茱萸 拾兩

桃仁

伍拾粒

紅麴 貳錢

縮砂 參兩

山楂末

壹兩

右生薑汁研吹餅爲丸

軀脂滿經閉導瘀湯加芩連不可服地黃如用薑汁

桔梗導瘀湯節陳加

枳實黃連是也

楊村婦人年二十餘兩年經閉食少乏方

黃連

貳錢

白术

壹錢

陳皮

滑石

各壹錢

黃芩

半錢

木通

卷分

桃仁

拾貳箇

甘草

炙少許

此方分兩有訛

右丹溪治痰結胸腹而經閉之法皆用輕劑導痰降火也

經云氣上迫肺則心氣不得下通故月事不來今用連朴之類導痰降火使不上迫於肺故心氣下通而月事來也

丹溪治一婦人久瘡食少經閉兩年無脉每白與三花神祐丸十餘粒津咽之日餘食進脉出又半月

愈又一月經行亦此意也詳見久瘡子嘗體丹溪之意治陳氏婦二十餘歲形肥痞塞不食每白卧至未時吃一盞薄粥吃粥後必吐水半碗仍復卧經不通三月矣前番曾暗通黑色脉之辰時寸關滑皆有力午後關滑寸不滑詢之因乘怒飲食而然遂以白朮壹兩半厚朴黃連枳實各壹兩半夏茯苓陳皮山楂人參滑石各捌錢縮砂香附桃仁各半兩紅花貳錢分作十貼每白服一貼各入薑汁二蚬殼間三日以神祐丸神祕沉香丸微下之至十二日吐止食漸進四十日平復如故又汪氏婦三十餘形瘦亦痞不食

吐水經不通以前藥方加參术歸爲君煎熟入竹瀝  
缶盞薑汁服之但不用神佑丸下亦平復若咳嗽寒  
熱而經閉者當於欬門濕痰條求之

子和凡婦人月事不來用茶調散吐之次用玉燭散  
芎歸湯三和湯桂苓白术散之類降心火益腎水開  
胃進食分陰陽利水道之藥也 一婦人月事不行  
寒熱往來口乾頰赤飲食少日暮間欬一二聲諸醫  
皆用蟲水蛭乾漆硇砂芫青紅娘子沒藥血竭之  
類惟戴人不然曰古方雖有此法柰病人服之必躋  
腹發痛飲食不進乃命止藥飲食少進內經曰二

之病發心脾心受之則血不流故女子不月既心受  
積熱宜抑火升水流濕潤燥開胃誘食乃涌出瘀  
二升下泄水五六行濕水上上下皆去血氣自然湍流  
月事不爲水濕所隔自依期而至矣亦不用蟲水  
蛭之類有毒之藥如用之則月經總來小溲久閉他  
證生矣凡精血不足宜補之以食大忌有毒之藥偏  
勝而致天闕多矣 一婦人年三十四歲經水不行  
寒熱往來面色痿黃唇焦頰赤時咳三五聲問其所  
服之藥黑神散烏金丸四物湯燒肝散鼈甲散建中  
湯寧肺散針艾千百轉劇家人意倦不欲求治戴人

憫之先，涌痰五六升，午前涌畢，午後食進，餘證悉除。  
後三百復輕，涌之又去痰一斗升，食益進，不數日，又  
下通經散，瀉訖一二升，後數日去死皮數重，小者如  
麩片，大者如葦膜，不月餘，經水自行，神氣大康矣。  
月事不來者，胞脈閉也。胞脈者屬心，而絡於胞中，今  
氣上迫肺，心氣不得下，通故月事不來也。全文見水腫  
天室女月水不來，用雄鼠屎一兩燒存性，爲細末空  
心溫酒調下一錢，神效。

海掌中金丸 治婦人乾血氣

穿山甲

炮

甘草

苦丁香

川椒

苦蕁蘆

白附子

猪牙皂角

草烏頭

各參錢

巴豆

壹錢全用研

右爲細末，以生蔥絞汁和丸，彈子大，每用一丸，新  
綿包之，內陰中一日卽白二十日，卽赤三百日，卽血神  
効。

仲婦人經水閉不利，臟堅癥不止，中有乾血，下白物，  
攀石丸主之。

攀石丸

參錢燒

杏仁

壹分

右二味未之煉蜜丸，棗核大，內臟中劇者再內之。  
女經成勞寇宗奭曰：夫人之生，以氣血爲本，人

之病未有不先傷其氣血者。若掌女童男積，想在心思慮過度，多致勞損，男大則神色消散，女子則月水先閉，蓋憂愁思慮則傷心，而血逆竭，神色先散，月水先閉，且心病則不能養脾，故不嗜食，脾虛則金虧，故發軟腎水絕，則木氣不榮，而四肢乾瘦，故多怒，鬚髮焦筋骨瘦，若五臟傳偏，則死。自能改易心志，用藥扶持庶可保生。切不可用青蒿、蜜蠟等涼血行血，宜用柏子仁丸、澤蘭湯益陰血，制虛火。薩經云：五穀入於胃，其糟粕津液宗氣分爲二隧。故宗氣積于胸中，出於喉嚨，以貫心肺，而行呼吸。榮氣者，必其津液注

之於脈，化以為血，以榮四末，內養五臟六腑。若服苦寒之劑，復傷胃氣，必致不起。一室女年十七，歷久不愈，天癸未通，發熱咳嗽，飲食少，思欲用通經丸，余曰此蓋因真氣不足，陰血未充，故耳。但養氣血，益津液，其經自行，彼惑於速効，仍用之，余曰非其治也。此乃剽悍之劑，大助陽火，陰血得之，則妄行，脾胃得之，則愈虛，後果經血妄行，飲食愈少，遂致不救。

柏子仁丸

全大

炒別研

牛膝

各貳兩

卷柏

各半兩

澤蘭葉

續斷

各貳兩

熟地黃

參兩

經開

外科

卷五

爲細末，煉蜜丸如梧子大，空心米飲下三十丸。

澤蘭湯

澤蘭葉 參兩

當歸

芍藥 各壹兩

甘草 半兩

當歸

芍藥 各壹兩

沉香、鼈甲散。室女經候凝滯，或頭目昏悶，停痰五心虛煩，少食多困。

沉香

甘草 炙

檳榔

各參分

木香

常山

當歸

柴胡

人參

半夏

桂心

生地黃

白茯苓

青皮

淨陳皮 各壹兩

鼈甲 壹兩半

右爲細末，每二錢薑二十片水煎，七分空心溫服。  
劫勞散。療心腎俱虛，水火不交，初則微嗽，遇夜發熱，卽冷，有盜汗，倦怠瘦弱，減食恍惚，或微嗽唾中  
有紅線，名曰肺痿，爲不治。

白芍藥

薩兩

黃芪

甘草

人參

當歸

半夏

白茯苓

北五味子

阿膠炒

熟地黃

洗各載兩

右咬咀每三天錢水盞半薑十二片棗三十枚煎溫  
服百藥不効一料除根

麥煎散 治少男室女骨蒸婦人血風攻症四肢心  
胸煩壅口臭肌熱盜汗

鱉甲

大黃 煙

常山

赤茯苓

柴胡

白朮

當歸

乾漆 炒煙盡

生地黃

石膏 各壹兩

甘草 半兩

右為細末每服一錢水盞小麥五十粒食後臨  
卧溫服有虛汗加麻黃根二兩

牡丹散 和劑 治血氣虛損內則月水不行外發潮熱  
肢體羸困漸成骨蒸

乾漆

炒貳兩

蘇木

蓬莪術

鬼箭 各壹分

甘草

當歸

桂心

牡丹皮

芍藥

延胡索

淨陳皮

紅花

烏藥

沒藥

別研各壹兩

右咬咀每服三錢水盞煎七分溫服無時

六神湯 和劑 治血氣不足肌體煩熱四物湯加黃芪  
地骨皮各等分咬咀水煎又治衝任虛損月水

行肌膚發熱如瘡狀四物湯各一兩柴胡半兩黃芩一分水煎

桃仁散 治婦人女子血閉不通五心煩熱  
炒牛膝各等分

紅花 當歸

桃仁

牛膝

各等分

右爲末每服三錢酒調下空心服

脉師曰有一婦人將一女子年十五所來診言女子年十四時經水自下今經反斷其母言恐怖師曰若是夫人親女必夫人年十四時亦以經水下所以斷此爲避年勿怪後當自下此真氣猶怯稟賦素弱而然也宜固太元真氣使水升火降則五臟自和而經

脈通矣 入方

鹿茸

山茱萸

當歸

各肆

麝香

壹兩

爲細末入麝香拌勻和酒糊爲丸每服百丸或五

十九溫酒鹽湯任下

針灸 心經脉不通已有寒熱此穴大効 三陰交

立有効如疼時乃經脈要通也

膈經脉不通

心術同

曲池

支溝

三里

三陰交

集月經斷絕

中極

三陰交

腎俞

合谷

東又法

四滿

在丹田傍一寸半

心經脈不通變成瘕證飲食如常腹漸大如鹽氣  
海用針通管其瀉水惡物


取法亦如上

陰爻

去其惡物

甲月水不通奔泄氣上下引脅脊痛氣尤主之女子  
子不下月水照海主之婦人少腹堅痛月水不通  
帶脉主之月水不利見血而有身則反敗及乳腫  
臨泣主之

診腎脈微濁為不月



Kitasato Memorial Medical Library