


妇科證治準繩

二之二

科別

44

F
シ-131



440.9
J2-3
卷 M44
5 No. 3170

中風

先尸血厥 痰癥

顛振

驚悸

顛狂

血風煩悶

血風攻脾不能食

身體骨節疼痛



富士田太郎

1467

中風

藥隱云婦人中風角弓反張風痺手足不隨偏枯口噤口眼喎斜風眩頭痛血風心神驚悸癲狂骨節風血風走注瘡痺癰疹風痰諸證雖各有方論亦要先明其大體察脉之虛實辨證之冷熱相人強弱入臟入腑在絡在經首以方調治未要猛速用藥今之治法先宜順氣然後治風萬不失一蓋有中風中寒中喝中痰中氣皆能令人涎潮昏塞所謂朱紫相凌玉石不分醫者不可不詳而究之如中風若作中氣治之十愈八九中氣若作中風治之十無一生所以疑

惑之間不問中風中氣首以蘇合香丸五積散加麝
煎如中痰則有參蘇飲如中寒則有理中湯如中渴
則有白虎湯如的然是中風有三生飲木香煮散排
風續命風引大小竹瀝大入風湯辨其冷熱虛實而
投之未有不安者也然此疾積襲之久非一日所能
致今火服藥三五服便責無効其責醫者亦速矣正
宜大劑久服方有其効孟子曰七年之病求三年之
艾也 大夫中風者虛風中於人也風是四時八方
之氣常以冬至之日自坎而起候其八方之風從其
鄉來者主長養萬物若不從其鄉來者名為虛賊風

告萬物人體虛者則中之當時雖不卽發停在肌膚
後或重傷於風前後重沓因體虛則發入臟腑命俞
皆在背中風多從俞入隨所中之俞而乃發病婦人
血氣虛損故令中風也當察口眼開闔以別重輕脈
沫有無以明證治如眼開口閉手足不開涎不作聲
者可治如眼閉口開聲如鼾睡遺尿不覺者死 按
卒仆暴厥之證不論男子婦人是風是寒是氣是食
是痰是濕但要分得閉與脫二證明白如牙關緊閉
兩手握固卽是閉證宜蘇合香丸三生飲之類閉之
若口開手撒卽是脫證宜用大劑黃芪人參煎濃湯

灌之雖曰在法不治亦十救五六若誤服蘇合香丸之類卽不可救矣蓋斬關奪門之藥原爲閉證設若施之脫證是人旣入井而又下之石也

薛中風者卽內經所謂偏枯風痱風懿風痺是也而有中腑中臟中血脉之分焉夫中腑者爲在表中臟者爲在裏中血脉者爲在中在表者宜微汗在裏者宜微下在中者宜調榮中腑者多著四肢如手足拘急不仁惡風寒此數者病淺皆易治用加減續命湯之類中臟者多滯丸竅如眼瞀者中于肝舌不能言者中于心唇緩便祕者中于脾鼻塞者中于肺耳聾

者中于腎此數者病深多難治中血脉者外無太經之證內無便溺之阻肢不能舉口不能言用大秦艽湯主之中腑者多兼中臟如左關脉浮弦面白青左脇偏痛筋脉拘急目瞤頭目眩手足不收坐踞不得此中膽兼中肝也用犀角散之類如左寸脉浮洪面舌赤汗多惡風心神顛倒言語謇澁舌強口乾忪悸恍惚此中小腸兼中心也用麻黃散之類如右關脉浮緩或浮大面唇黃汗多惡風口渴語澀身重怠惰嗜卧肌膚不仁皮肉瞞動腹膨不食此中胃兼中脾也用防風散之類如右寸脉浮濶而短面色白鼻流

清涕多喘胸中冒悶短氣自汗聲嘶四肢痿弱此中太腸兼中肺也用五味子湯之類如左尺脉浮滑面目黧黑腰脊痛引小腹不能俛仰兩耳虛鳴骨節疼痛足痿善恐此中膀胱兼中腎也用獨活散之類此皆言真中風也而有氣血之分焉蓋氣虛而中者由元氣虛而賊風襲之則右手足不仁用六君子湯加釣藤薑汁竹瀝血虛而中者由陰血虛而賊風襲之則左手足不仁用四物湯加釣藤竹瀝薑汁氣血俱虛而中者則左右手足皆不仁也用八珍湯加釣藤薑汁竹瀝其與中風相類者則有中寒中濕中火中

氣食厥勞傷房勞等證如中於寒者謂冬月卒中寒氣昏冒口噤肢攣惡寒脉浮緊用麻黃桂枝理中湯之類中於暑者謂夏月卒冒炎暑昏冒痿厥吐瀉喘滿用十味香薷飲之類中於濕者丹溪所謂東南之人多因濕土生痰痰生熱熱生風也用清燥湯之類加竹瀝薑汁中於火者河間所謂非肝木之風內中六淫之邪外侵良由五志過極火盛水衰熱氣拂鬱昏冒而卒仆也用六味丸四君子獨參湯之類內有恚怒傷肝火動上炎者用柴胡湯之類中於氣者由七情過極氣厥昏冒或牙關緊急用蘇合香丸之類

誤作風治者死食厥者過於飲食胃氣自傷不能運化故昏冒也用六君子加木香勞傷者過於勞役耗損元氣脾胃虛衰不任風寒故昏冒也用補中益氣湯房勞者因腎虛精耗氣不歸源故昏冒也用六味丸此皆類中風者也夫內經主於風河間主於火東垣主於氣丹溪主於濕愚之斯論僭補前人之闕也若夫地之南北人之虛實固有不同其男子女人大略相似當與後論參看通變治之雜病中風
內方並見靳閣老夫人先胸脇脹痛後四肢不收自汗如水小便自遺太便不實口緊目瞓飲食頗進十餘日矣或以爲

中藏公甚憂余曰非也若風既中藏真氣既脫惡證既見禍在反掌焉能延之乃候其色面目俱赤面時或青診其脈左三部洪數惟肝尤甚余曰胸乳脹痛肝經血虛肝氣痞塞也四肢不收肝經血虛不能養筋也自汗不止肝經風熱津液妄泄也小便自遺肝經熱甚陰挺失職也大便不實肝木熾盛剋脾土也遂用犀角散四劑諸證頓愈又用加味道逍散調理而安後因鬱怒前證復作兼發熱嘔吐飲食少思月經不止此木盛克土而脾不能攝血也用加味歸脾湯為主佐以加味逍遙散調補肝脾之氣清和肝脾

之血而愈後每遇怒或睡中手足抽搐復用前藥卽愈。大參朱雲溪母於九月內忽仆地痰昧不省人事唇口喎斜左目緊小或用瘀血之劑其勢稍緩至次年四月初其病復作仍進前藥勢亦漸緩至六月終病乃大作小便自遺或謂風中於臟以爲不治余診之左關弦洪而數此屬肝火血燥也遂用六味丸加五味子麥門冬歸一劑而飲食頓進小便頓調隨用補中益氣加茯苓山梔鈞藤丹皮而安至十月復以傷食腹痛作瀉左目仍小兩關尺脉弦洪鼓指余以六君加木香吳茱升麻柴胡一劑而痛瀉俱緩復

以六君加肉果故紙一劑諸脈頓平痛瀉俱止奈甲左關弦洪由肝火血燥故左目緊小右關弦洪由肝邪乘脾故唇口喎邪腹痛作瀉一尺鼓指由元氣下陷設以目緊口喎誤作風中投以風藥以腹痛泄瀉誤作積滯投以峻劑復耗元氣為害甚矣後以陽虛惡寒圍火過熱致痰喘誤服寒劑而卒一婦人因怒仆地語言謇澁口眼喎斜四肢拘急汗出遺尿六脉洪大肝脉尤甚皆由肝火熾盛蓋肝主小便因熱甚而自遺也用加味逍遙散加鈞藤及六味丸尋愈一老婦兩臂不遂語言謇澁服祛風之藥反致筋

攀骨痛余謂此肝火血虛所致用八珍湯補氣血用地黃丸補腎水佐以排風湯年餘而愈一婦人經行口眼歪斜痰涎壅盛此血虛而肝火動用加味道逍散加丹皮治之尋愈後因飲食停滯日吐痰涎此脾氣虛不能攝涎歸經也用六君子二十餘劑而安一婦人因怒口眼喰斜痰涎上涌口噤發搐此肺脾氣虛而肝木旺用六君子加木香鈞藤柴胡治之漸愈又用加味歸脾湯調理而安一產婦勤於女工忽任地牙關緊急痰喘氣粗四肢不遂此氣血虛而發瘧朝用補中益氣加茯苓半夏夕用八珍加半

夏各二十餘劑不應此氣血之未復藥之未及也仍用前一湯又五十餘劑尋愈一婦人素性急患肝風之證常服搜風順氣丸秦艽湯之類後因大怒吐血唇口牽緊小便頻數或時自遺余以爲肝火旺而血妄行遂用小柴胡湯加山梔牡丹皮漸愈五年之後又大怒吐血誤服降火祛風化痰之劑大便頻數胸滿少食用清氣化痰之劑嘔而不食頭暉口乾不時吐痰用導痰降火之類痰出如涌四肢常冷余曰嘔而不食胃氣虛弱也頭暉口乾中氣不能上升也痰出如涌脾氣不能攝涎也四肢逆冷脾氣不能運

行也用補中益氣加茯苓半夏治之諸證漸愈又用
加味歸脾湯兼服而安。陳癸丑春有一婦人年四
十二三其證語言氣短足弱行得數步則口若含霜
七十日內三次經行則口冷頭目眩暈足冷則透心
冷痛每行則口中冷氣不相續有時鼻中熱面赤翕
然而熱身體不仁不能行步手足不隨不能俛仰冷
痺骨疼有時悲傷夢與前夫相隨則止氣奄然而極
心驚志意不定恍惚多忘却能食如此僅一年許醫
者投熟藥則面翕然而熱氣滿胸中咽中窒塞悶絕
投冷藥則瀉又一醫者以十全湯服之則發煩躁心

驚而跳一醫以雙和湯服之覺面上與腹中如火燄
心愈驚欲吐不吐太便祕裏急後重求僕診之六味
弦緩喜見於春此是可治之疾未供藥間忽然吐瀉
瀉後覺肛門如火雖瀉却不多僕且與俞山人降氣
湯入服次日診之脉差有力云服藥後覺嘔熱心煩
悶齒噤與參蘇飲入服黃連圓壹兩越三日云服藥
後如故與茯苓補心湯服皆無効僕以脉證詳之只
是排風湯甚對或曰何以知之能食飲此風飢也
二十七日三次經行此是榮經有風血得風散也三
頭目眩暈此肝風也四面赤翕然而熱悲傷此心風

也五身體不仁不能行步夢與前夫相隨此脾風也
六手足不隨腰痛難忍伸冷痺骨疼此腎風也因令
人驚恍忽多忘真排風湯證也或曰風肺當浮今
脉弦緩微弱恐非風也予曰風無一定之脉大抵此
證虛腎生風然排風湯藥品有十全大補湯料亦有
平補之資却不勝燥供十服越三百云服有効脈亦
差勝只是腹中如烟生微熱大便秘此真是風證再
與排風湯服加牛黃清心丸皂角圓助之越三百云
服前藥大煩躁發熱諸證悉除只是足弱不能支時
與秘傳降氣湯十服諸證悉退只是夢裏虛驚太便

滑泄煩數脉尚弱與五積散加入參鹽煎兼感應丸
卽愈但頭眩痛重不能久立久坐再與排風湯脫然
而安矣 繆安人年六十忽中風不省人事無汗有
痰衆醫爲不可治名僕診之脉浮緩脾胃溢關此真
風脉先以參蘇飲六服寬氣下痰次以木香煮散而
愈 馬觀文夫人於七月間病氣弱倦怠四肢厥逆
惡寒有汗少飲食一醫謂伏暑一醫謂虛寒治皆無
効召僕診之六脉雖弱而兩關差甚焉問是何證僕
曰六脉雖弱而關獨甚此中焦寒也中焦脾也脾胃
既寒不但有此證必有腹痛吐瀉今四肢厥冷脾屬

四肢是脾胃虛冷無疑焉曰未見腹痛吐瀉之證合用何治僕曰宜附子理中湯未服藥間旋卽腹痛而瀉莫不神之卽投此藥而瘥

防風散 治婦人中風言語蹇澁四肢拘急身體壯熱頭疼目眩心胸不利

防風

去蘆壹兩

石膏

貳兩半

麻黃

去節

漢防已

去皮

各細辛

去苗

黃芩

川升麻

當歸

去蘆

桂心

芍薑

赤茯苓

去皮

甘草炙

羌活

去蘆半兩

右爲麤散每服八錢水一中盞半煎至一大盞去滓入淡竹瀝一合更煎一兩沸溫服不拘時
芎窮散 治婦人卒中風四肢不仁善笑不息
芎窮 壹兩半 石膏 貳兩半 當歸 去蘆

麻黃

去節

秦艽

去蘆

乾薑

炮炒

桂心

各壹兩

杏仁

貳拾枚
麸炒

黃芩

壹兩

右爲麤末每服八錢水一中盞半煎至一大盞去滓溫服不拘時候日進二三服
附子散 治婦人中風筋脉拘急四肢疼痛言語謇澁心胸不利

附子 炮去皮臍

細三絳朱錢

當歸 炒去蘆

芳薷

前胡 去蘆

枳殼 炒去瓢

黃芩

白鮮皮

漢防已 去皮

羌活 去蘆

杏仁 舞炒

桂心 各壹兩

甘草 炙

麻黃 去節

茯神 去木

右爲麤末每服五錢水一中盞半生薑五片煎至一大盞去滓不拘時溫服。羌活散 治婦人中風筋脈拘急肢節痠疼言語蹇澁頭目不利。

羌活 去蘆

天麻 各壹兩

芍藥

酸棗仁

各半錢
半微炒

蔓荊子
柏子仁

白附子 炮

薏苡仁

當歸 去蘆
炒

桂心

烏蛇肉

酒拌炒
令黃

蟬殼 炒各半兩

爲細末入研麝香每服一錢豆淋酒調下無妨

南星散 治婦人中風牙關緊急四肢強直心胸癥

延咽膈不利

天南星

生薑製

麻黃

赤箭

各半兩

川烏頭 炮去皮臍

桂心

蝎梢

各貳錢
半生用

麝香 研半錢

細末入研麝香令勻每服一錢豆淋酒調下日進二服不拘時候

木香煮散治左癱右瘓并素有風濕諸藥不妨常服調氣進食寬中

羌活

麻黃去節各
壹兩

防風半錢半
炮

白术

陳皮

黑附子炮

南木香

檳榔

牛膝

大川烏炮

草豆蔻連皮煨

杏仁去皮
炒

當歸

白茯苓

川芎

人參


甘草

桂心各半
兩

右㕮咀每服四錢水一大盞半生薑五片煎至八分去滓熱服太便不通加大黃心腹脹加苦葶苈滑石膈上壅滯咳嗽氣促如半夏川升麻天門冬知母

右古方專主婦人中風故收之率用麻黃桂心張真中外邪不宜輕用只以薛氏法調之為善其餘證治方藥詳見雜病本門男婦初無一治也

角弓反張大夫婦人角弓反張者是體虛受風風入諸陽之經人之陰陽經絡周環於身風乘虛入於諸陽之經則腰背反折攣急如角弓之狀宜服小續命



湯 薛仲景先生云太陽病發汗太多致痙，風病下之則痙。三因方云氣血內虛，風寒濕熱所中則痙。以風能散氣，故有汗而不惡寒。白柔痙，寒能澀血，故無汗而惡寒。曰剛痙非專於風濕，因內虛發汗亡血，筋潰瘍等病及因劫伐之劑傷損氣血，而變若金東木無所榮，而然乃虛象也。竊謂傷寒汗下過度與產婦旺先用瀉青丸。初科後用異功散。幼科吐瀉腎水虛用六味丸。雜病肝火旺先用加味小柴胡湯。血室次用加味四物湯。發熱用加味道逍遙散。若木侮脾土用補中益氣湯。雜病傷勞倦加芍藥山梔，脾經鬱結用加味歸脾。

湯 雜病健忘 脾生濕熱用大承氣湯。胃實大凡病後氣血虛弱，用參术濃煎，佐以薑汁竹瀝時時用之。如不應用十全大補湯。雜病虛勞更不應加附子。或用參附湯緩則不救。人參壹兩附子貳錢水煎服

白僵蠶散 治婦人中風角弓反張口噤不能言，皮膚頑麻，筋脈抽掣。

白僵蠶壹兩炒少 膜香貳錢半另研 烏蛇肉炒令黃
蟬殼炒 桑螵蛸炒 牀角屑
天麻
川烏頭炮去皮臍 白附子炮 珠砂另研水飛

防風

去蘆各半兩

右爲細末入研藥令勻每服二錢溫酒調下不拘時日三服

麝羊角散 治婦人中風角弓反張筋脉拘急言語謇澀心神煩悶

麝羊角屑

鹿角膠

搗碎炒黃燥

赤箭

酸棗仁

薏苡仁

各一錢半炒去蘆

白附子

炮

當歸

炒去蘆各一錢半

人參

去蘆各半錢半

羌活

白鮮皮

地骨皮

柏子仁

蔓荊子

犀角屑

牛黃

另研

麝香

另研各一錢半

右爲細末入研藥令勻每服一錢煎薄荷湯調下

日進三服無時

紫湯 治婦人中風腰脊反張如弓之狀

雞糞白

微黃壹合

大豆

炒熟

防風

去蘆各一錢半

右爲麩末每服五錢酒水各一中盞煎至六分去滓溫服不拘時候

烏蛇丸 治婦人中風角弓反張或身體強直牙關緊急

烏蛇肉

酒浸

犀角屑

白附子

炮

天麻各壹兩

女科

半夏

湯洗朱遍
生薑製

天南星

炮

麻黃去節

桂心

獨活

去蘆

白僵蠶炒

晚蠶沙炒

乾蝎

微炒各半兩

麝香

另細研貳錢半

右爲細末入研麝令勻，煉蜜和搗二三百下丸，如梧桐子大。每服三十丸，豆淋酒送下。日二服無時餘，並詳雜病瘡門。

口噤夫婦人中風口噤者，是體虛受風，風入頷頰夾口之筋也。手三陽之筋結於頷頰足陽明之筋上，夾於口而風挾冷乘虛入其筋，則筋攣故引牙關急。

而口噤也

薛前證若風邪客於手足，陽明經口眼

喝斜用秦艽升麻湯

雜病
中風

若風熱傷氣用省風湯

雜病

中當與後方同用

一婦人因怒經事淋瀝半月

方

竭遇怒其經即至甚，則口噤筋攣鼻衄頭痛瘻逕搐搦瞳子上視，此肝火熾甚以小柴胡湯

傷寒加熟地少陽

山梔釣藤治之後不復發

一婦人素陰虛患遍身

瘙痒誤服祛風之藥，口噤抽搐，肝脉洪數，余曰肝血

為陰為水，肝氣為陽為火，此乃肝經血虛火盛耳，宜助陰血抑肝火，用四物麥門五味子柴胡山梔生甘草，熱搐頓止，又以八珍黃芪麥門五味釣藤炙草調

理而痊

天南星散

治婦人中風口噤，四肢拘急，或癥氣上

天南星

薑汁炒黃

白附子

炮

黑附子

炮

烏蛇肉

酒炙

全蝎

炒等分

右爲細末，每服半錢，以生薑汁溫酒調下，拘急，或癥氣上

走馬散

治婦人中風口噤，四肢強直，拘急，或癥氣上

附子

炮去皮臍

天麻

各半兩

桂心

石膏

研如麵

麻黃

去節

川烏頭

炮去皮臍

天南星

炮

蝎梢

各貳錢

麝

另細研半錢

右爲細末，入麝香研令勻，每服二錢，豆淋酒調下，拘急，或癥氣上

不拘時，幹開口灌之。

烏蛇散

治婦人中風口噤，拘急，或癥氣上

烏蛇肉

酒浸

乾蝎

炒

白礪蠶

炒

天南星

炮

天麻

各半兩

膩粉

另研半錢

右爲細末，入膩粉研勻，每服二錢，生薑酒調下，拘急，或癥氣上

不拘時，幹開口灌之。

白术酒

治婦人中風口噤，言語不得

白术

剉

黑豆

各參兩炒熟

右以酒四升煎至二升，去滓，分四服，幹開口灌之。

治婦人中風口噤舌本縮語言難

芥子

壹升細研

以醋三升煎至一升塗頸領下

効

不語巢氏論曰脾脉絡胃夾咽連舌本散舌下心之別脉系舌本今心脾二臟受風邪故舌強不得語也喉嚨者氣之所以上下也會厭者音聲之戶舌者聲之機唇者聲之扇風寒客於會厭之間故卒然無音皆由風邪所傷故謂之中風失音不語經云醉卧當風使人發瘡不能言也

薛前證若因痰迷心竅當清心火若因濕痰舌強當清脾熱若因風熱牙關緊急當清肝火若因風痰塞喉當道痰涎若因虛火上

炎當在水之主若因氣虛厥逆當益火之源若因腎虛古瘡而不語當補腎氣一婦人因怒仆地痰湧不語灌牛黃清心丸稍甦用神仙解語湯加山梔柴胡桔梗漸愈又用六君柴胡山梔枳殼而痊一婦人忽然不語半年矣諸藥不應兩尺浮數先用六味丸料加肉桂數劑稍愈乃以地黃飲子二十餘劑而痊男子多有此證亦以此藥治之

諸方並見雜證中風

神仙解語丹治心脾經受風言語謇澁舌強不轉涎唾溢盛及療淫邪搏陰神內鬱塞心脈閉滯暴不能言

白附子

炮

石菖蒲

去毛

遠志

去心水煮甘草

天麻

酒炒

全蝎

酒炒

羌活

白僵蠶

炒

南星

牛膽醣如無只煨各壹兩

木香

半兩

右爲細末水煮麵糊丸如梧桐子大量入辰砂爲衣每服貳拾丸至參拾丸生薄荷湯吞下無時

防風湯

治中風內虛脚弱語謇

石斛

壹兩半酒炒

乾地黃

杜仲

去粗皮切薑汁炒

丹參

貳錢半各壹兩

防風

川獨活

各壹兩

麥門冬

去心去火

桂心

川芎

右咬咀每服五錢水壹盞半棗貳枚煎至捌分去

苦梗

枳殼去穰炒

溼溫服

竹瀝湯

治中風入肝脾經年四肢不遂舌強語謇

葳靈仙

附子炮

苦梗

蔓荆子

防風

枳殼去穰炒

川芎

當歸各等分

右咬咀每服肆錢水壹盞竹瀝半盞薑叁片煎至捌分溫服一日四服忌茶

地黃飲子等方詳雜病本門

風痺手足不隨夫婦人風痺者由風寒濕三氣合而爲痺風多者爲風痺其狀肌膚盡痛諸陽之經皆起

中風

女科

卷二十一

於手足而循行於身體，風寒之氣客於肌膚始為痺，復傷陽經隨其虛處而停滯與血氣相搏，血氣行則遲緩故風痺而復手足不隨也。醫經云邪之所湊，其氣必虛，前證若風邪淫旺或怒動肝火，血燥筋攣，用加味逍遙散，肺氣虛，肌膚不仁，手足麻木，用三癆湯，若腎水虧損不能滋養筋骨或肝脾血虛而筋痠疼，用六味丸，服燥藥而筋攣者用四物生甘艷氣血俱虛，用八珍湯，何醫林集要等方，新刊丹溪心法附錄云，人太拇指麻木不仁或手足少力或肌肉微掣三年內必有大風之證，宜先服八風湯，天麻丸。

防風通聖散以預防之殊不知河間云風者病之末也，所以中風有癱瘓者非謂肝木之風內中亦非六淫風邪外襲良由五志過極心火藏盛，腎水虛衰，不能制之則陰虛陽實而熱氣怫鬱，心神昏憤，筋骨無用而卒倒無知也，治當以固元氣為主，若遽服八風等藥則反傷元氣，適足以招風取中，一婦人因怒吐痰胸滿服二陳順氣化痰之劑半身不遂，內熱口乾形氣殊倦，余視之乃肝火熾盛而侮脾土也，用逍遙散補中益氣湯六味地黃丸，喜其慎疾年餘而愈，一婦婦胸脇脹痛，內熱，晡熱月經不調，肢體痠麻。

不時吐痰，或用清氣化痰藥。喉間不利，白帶腹脹，又用清熱理氣藥。胸膈不寬，肢體時麻，余曰此本鬱怒傷肝脾，前藥傷甚耳。朝用歸脾湯以解鬱結，生脾氣，夕用加味逍遙散以生肝血，清肝火，百餘劑而愈。後因怒肢體復麻，用補中益氣加山梔茯苓半夏而痊。後復怒，病再作，月經如注，脉浮洪而數。此肝火傷脾，不能攝血所致也。用六君子歸炮薑，一劑而血止。用補中益氣加炮薑茯苓半夏四劑而胃醒。更用歸脾湯逍遙散調理而痊。一婦人頭暈吐痰，用化痰理氣藥，肢體或麻，服祛風化痰藥，肢體常麻，手足或冷。

或熟此脾土虛而不能生肺金，用補中益氣加茯苓半夏炮薑二十餘劑，脾氣漸復，諸證稍愈，更用加味逍遙散三十餘劑而愈。後因怒，吐痰自服清氣化痰丸，飲食不進，吐痰甚多，胸脇脹滿，余用六君子加參末少加木香數劑而康。

三癰湯 治血氣凝滯，手足拘攣，風痺氣痺等疾。

川續

杜仲剉薑汁去絲

防風去蘆

桂心

華陰細辛

人參去蘆

白茯苓去皮

當歸去蘆

白芍藥

甘草各壹兩炙

秦艽去蘆

生地黃

川芎

川牛膝酒浸各壹兩

川獨活各半兩

黃芪去蘆半兩

右咬咀或爲末每服捌錢水貳盞生薑伍片棗壹枚煎至壹盞去滓熟服無時候但腹稍空服有入病左臂不隨後已痊平而手指不便無力試諸藥不効服此藥一料而愈

獨活湯 治婦人風渾手足不隨身體疼痛言語謇澁筋脉拘急並宜服之

獨活去蘆

桑寄生

牛膝酒浸

秦艽去蘆

赤芍芍反去

桂心

防風去蘆

附子炮去皮臍

當歸炒去蘆

生乾地黃各壹兩

杜仲剉炒去絲

細辛去苗

芎窮各半兩

赤芍藥各半兩

甘草炙半兩

右為咬咀每服捌錢水壹中盞半煎至壹大盞去滓溫服無時

烏蛇散 治婦人風痺手足頑麻筋脈擣拗口眼不正言語謇澁

烏蛇肉酒拌炒去皮臍

土蜂兒炒

天南星炮去節

天雄炮去皮臍

赤箭

麻黃

薏苡仁

羚羊角屑

乾蝎微炒

朱砂研水飛各半兩

桑螵蛸微炒

桂心

酸棗仁炒

當歸炒去蘆

柏子仁錢半兩

爲細末，入硃砂藥研勻，每服壹錢食前溫酒調下。
東垣羌活湯 治濕熱身重，或眩暈，寐木小便赤澁。

下焦痠軟，不能行履。

羌活

防風

藁本

獨活

澤瀉

豬苓

甘草炙

陳皮

柴胡各一錢

茯苓

黃芪炒

黃檗酒炒

黃連炒

蒼朮

升麻

川芎各伍分

右水煎服。

甘草附子湯 治風濕相搏，骨節煩疼，不時抽痛，不能伸屈，抑之則痛劇，汗出短氣，小便不利，惡風，不欲去衣，或微腫痛。

甘草炙壹兩

附子壹枚重壹兩參肆錢者，去皮尖，不真，不效。

白术炒壹兩

桂枝貳兩

右每服伍錢水煎。

八珍湯 治肝脾氣血俱虛，不能養筋，以致筋攣，骨痛，或不能行履，或發熱，晡熱寒，熱往來等證。

上

加味逍遙散 治肝經風熱血燥筋攣肢體不遂內
熱晡熱等證

入稱方見雜病虛勞本方見本科調經

自汗藥隱老人云尋古治中風方續命排風越婢等悉能除去而千金多用麻黃令人不得慮虛凡以風邪不得汗則不能泄也然此治中風無汗者為宜若治自汗者更用麻黃則津液轉使脫泄反為太害中風自汗仲景雖處以桂枝湯至於不住發搐口眼瞓動遍身汗出者豈勝對治當此之時獨活湯續命煮散復榮衛却風邪不可闕也 薛前證若腠理不固而自汗者用桂枝湯或防風白朮牡蠣湯若過服風

藥而自汗者用白朮防風湯若陽氣虛弱而自汗者用芪附湯若兼盜汗用補中益氣湯送六味丸加不應用當歸六黃湯

獨活湯 治風虛昏憊不自知覺手足癱瘓坐卧不能或發寒熱血虛不能服發汗藥及中風自汗尤宜服之

川獨活

羌活

人參

防風

當歸

五味各去蘆

細辛

去苗

茯神

去木

半夏

湯先切片子

桂心

白薇

遠志

去心

菖蒲

川芎各半兩

甘草半錢

右咬咀每服捌錢水壹盞半薑伍斤煎柒分去滓溫服不拘時候

續命煮散

治風氣留滯心中昏憒四肢無力口眼瞓動有時搐搦失津液渴欲引飲此能扶榮衛

去虛風中風自汗及產後中風自汗尤宜服之

防風

獨活

當歸

人參

細辛

葛根

芍藥

川芎

甘草

熟地黃

半夏

遠志

荆芥穗

各半兩

桂心

柒錢

右咬咀每服伍錢水壹盞叁大片煎至柒分去滓溫服不拘時候汗多不止者加牡蠣粉壹分半

補遺防風白朮牡蠣散

治中風自汗不止

白朮

牡蠣

各等分

未爲末酒調下米飲亦可日三服汗即止如不止可

服黃芪建中湯

賊風偏枯藥隱老人云偏枯者其狀半身不隨肌肉枯瘦骨間疼痛神智如常名曰偏枯也原其疾之由皆因陰陽偏虧臟腑怯弱經絡空虛血氣不足當風

衝坐風邪乘虛而入內經云汗出偏沮使入偏枯詳其義理如樹木或有一邊津液不蔭注而先枯槁然後被風所害人之身體或有一邊血氣不能榮養而先枯槁然後被風所苦其理顯然王子亨云舟行於水人處於風水能泛舟而亦能覆舟風能養體而亦能害體蓋謂船漏水入體漏風傷古人有云醫風先醫血血行風自滅是也治之先宜養血然後驅風無不愈者宜用大八風湯增損茵芋酒續斷湯

大賊

風偏枯者是體偏虛受風風客於半身也人有勞傷血氣半身偏虛者風乘虛入客於半體名爲偏風也

薛醫風先醫血此論得之太抵此證多因胎前產後失於調養以致精血乾涸肝木枯槁治法當滋其化

源考之生氣通天論曰風客淫氣精乃亡邪傷肝也陰陽應象大論曰風氣通於肝風搏則熱盛熱盛則水乾水乾則氣不榮故精乃亡此風病之所由作也一婦人性善怒常自汗月經先期余以爲肝火血熱不信乃汎用降火之劑反致月經過期復因勞怒口噤呻吟肢體不遂六脉洪大面目赤色用八珍麥

門五味子山梔丹皮數劑漸愈兼用逍遙散六味丸各三十餘劑全愈

大八風湯治中風偏枯失音半身不隨時復恍惚當歸去蘆

杏仁炒

甘艸久

桂心

防風乾薑炮各貳兩

五味子

升麻各半

川烏頭皮臍炮去

黃芩

芍藥

獨活

防風各去蘆

川芎

麻黃去節

秦艽

人參各去蘆

石斛去根切酒浸炒

茯神去木

石膏

黃耆去蘆

紫苑各壹

大豆皮炒參兩去

右爲哎咀每服伍錢水貳盞酒壹合煎至壹盞去滓溫服恍惚者不用酒煎一方無茯神有遠志赤茯苓

增損茵芋酒治半身不遂肌肉乾燥漸漸細瘦或時有痛病名偏枯

茵芋葉

川烏頭炮去皮尖

石楠葉

防風

川椒炒出汗

女萎

附子炮

北細辛各一

獨活

卷柏

肉桂

天雄炮去皮

秦艽

當歸

防已

各壹兩

躑躅花

炒

生乾地黃

各貳兩

芍藥

壹兩

右㕮咀酒貳斗漬之冬七日夏三日春秋各五日初服壹合漸增之以知爲度令酒氣相續續斷湯治偏枯少血

當歸

去蘆各壹兩

陳皮

去白

芍藥

各一兩

細辛

去苗各壹兩

生乾地黃

貳兩

右㕮咀每服伍錢水貳盞煎至捌分去滓涅眼瞼寒多利者入熟附子壹兩和前藥服之補遺全生虎骨散治半身不遂肌肉乾瘦忌用麻

黃發汗恐津液枯竭惟當潤筋養血消風

當歸

貳兩

赤芍藥

續斷酒浸炒

白术

藁本

虎骨伍兩

烏蛇肉

炙半兩

右爲末每服貳錢酒調下骨痛加生地壹兩自利加天雄半兩

虎脰骨酒

治中風偏枯四肢不隨一切風痺筋脉

石斛

石楠葉

防風

虎脰骨

炙

當歸

茵草葉

中風

衣卦二

杜仲

酒炒

牛膝

酒浸

續斷

酒浸

芎藭

巴戟

續斷

去心炒

狗脊

去毛各壹兩

右以絹囊盛藥用酒壹斗漬拾日每服壹盞溫飲
偏風口喎夫婦人偏風口喎者是體虛受風風入於
夾口之筋也足陽明之筋上夾於口其筋偏虛風因
虛而乘之使其筋偏急不調故令口喎僻也
婦人懷抱鬱結筋攣骨痛喉間似有核服烏藥順
氣等藥口眼歪斜臂難伸舉痰涎愈多內熱晡熱食
少體倦余以為鬱火傷脾血燥生風用加味歸脾湯
二十劑形體漸健餘食漸進又用加味道遙散十餘

割瘻熱少退喉核少消更用升陽益胃湯數劑諸證
漸愈但臂不能伸此肝經血少而筋攣耳用六味地
黃丸以滋腎水生肝血而愈

防風湯

去蘆

治卒然口喎斜言語牽急

防風

去蘆

羌活

去蘆半兩

甘草

蜜炙錢

右爲哎咀每服伍錢水貳盞煎至壹盞去滓入麝
香研壹字溫服

深師續命湯

療中風口僻噤諸疾卒死不知人稱

虛起死神方

防風

麻黃

去根節

人參

芍藥

川芎

甘草

黃芩

白朮各半兩

桂心

附子炮

防風各半兩

生薑伍兩八錢

右切以水壹升貳升煮取叁升分爲叁服不差更
作忌海藻菘菜桃李葱生菜雀肉豬肉
防風散 治婦人中風言語蹇澁肢節疼痛皮膚不
仁

防風

羌活各去蘆

當歸炒去蘆

大南星炮

天麻

桂心

芎藭

烏蛇肉酒浸


白僵蠶炒

桑螵蛸炒各半兩 麝香研
朱砂各貳錢半
爲細末入研藥令勻每服壹錢溫酒調下不拘時

千金方

炒大豆叁升令焦以酒叁升淋取汁頓服
治口眼喎斜

用草薢子半粒去皮研細作餅子安在手心右咽
手左咽却用銅盃乘湯坐於藥上繩正卽洗去
安右手却用銅盃乘湯坐於藥上繩正卽洗去
巴豆不用草薢出本草



良方本草

卷之二

用黃耆子末

或以細物

大豆卷共分數次

人食之

人頭

人頭

人頭

飛尸血厥

夫飛尸者遊走皮膚穿臘脈每發刺痛變作無常遁尸者附骨入肉攻鑿血脉每發不可得近見尸喪聞哀哭便發風尸者淫濯四肢不知痛之所在每發昏沉得風雪便作沉尸者纏骨結臘衝心脇每發絞切遇寒冷便作注尸者舉身沉重精神錯亂常覺昏發每節氣至變轉成大惡皆宜用忍冬葉剉數斛煮令濃取汁煎之服如鷄子大日三服

人平居無疾苦忽如死人身不動搖默默不知人目閉不能開口噤不能言或微知人惡聞人聲但如眩

冒移時方寤此由汗過多血少氣併於血陽獨上而不下氣壅塞而不行故身如死氣過血還陰陽復通故移時方寤名曰鬱冒亦名血厥婦人多有之宜服

白薇湯倉公散

丹溪云凡人忽手足逆冷肌膚起如米粒頭面青黑精神恍惚或錯言妄語或牙關緊急或昏寒仆倒平死問喪入廟登墓多有此病先以蘇合香丸灌之次服調氣散雜病平胃散雜病玉機微義云卒厥飛戶客忤鬼擊口噤用麻黃湯傷寒太陽寒厥表熱裏寒則下利清穀食火則吐脉沉手足冷用四逆湯傷寒熱厥


腹滿身重難轉面垢譫語遺溺手足厥冷自汗脉沉滑用白虎湯雜病癸熟錦衣楊永興舉家避竄有僕沉醉失避者既而神思昏昧遍身青傷各煎金銀藤忍冬葉湯灌之愈一婦人忽昏憤發譫語自云爲前謀賴某人銀兩某神責我將你起解往城隍理問兩脚踝膝骱處皆青腫痛不可忍口稱苦楚次日方甦痛尚不正用金銀藤兩許水煎服卽愈一婦人入古墓患前證以紫金錠磨汁灌之卽甦通政余子華太常汪用之皆因往吊而卒死喪家想卽是證也

太乙神精丹

方見雜病

蘇合香丸

方見雜病卒中



雄硃散

方見雜病譜妄

白薇湯

當歸名壹兩

人參半兩

甘艸貳錢半

右㕮咀每服伍錢水二盞煎至一盞溫服

倉公散 治猝鬼擊鬼疰鬼刺心腹如刺下血卽死不知人及卧魘齒脚趾不覺者并諸毒氣等疾

瓜蒂末

九籥衛生左無瓜蒂末有皂角末

梨蘆末

雄黃研

譽石

研各等分

右爲細末研停用少許吹入鼻中得嚏氣通便

未嘵再吹以得嘵爲度此藥能起死人恐皂角者爲正

補遺內鼻散 治尸厥脈動而無氣氣閉不通靜而若死名卒厥

石菖蒲

去毛爲末

右每用二字內鼻中咬之令久仍以桂末安舌下硫黃散 治尸厥奄然死去四肢厥冷不省人事腹中氣走如雷鳴

焰硝


半兩

右細研分三服酒調灌下如人行五里又進一服

飛尸血癥

卷之二

七



不過三服即甦

問難不吸人吐正理又對

寒黃膏兩

中風去城雷鳴

癲瘇婦口不知吞食水四知鶴谷不會大寒頭
本經用二物內服中火攻令人以水灌之未安舌不

舌苔滿口


癲瘇因食婦

急五

本經再加火清風寒藥指表半入夢

癲瘇

薛醫藥綱目云：「瘓者筋脈急也，癰者筋脈緩也。急則引而縮，緩則縱而伸，或縮或伸動而不止者，名曰瘓。」俗謂之發搐，是也。凡癲瘇風痙破傷風三證皆能瘓癰，但癲瘇則仆地，不省風痙瘓癰則角弓反張，破傷風瘓癰則有瘡口竊。謂瘓者屬肝經，風熱血燥或肝火妄動，血傷瘀者，屬肝經血氣不足，或肝火汗多亡血，以致手足伸縮不已，抽搐不利。若因風熱血燥，用麝羊角散妊娠加釣藤山梔，若肝火妄動，用加味四物湯卽四物加柴胡丹皮山梔，加釣藤鈎山梔，若肝經血氣不



足用八珍湯即雜病虛勞門八物湯加釣藤鈎山梔若肝火亡血用加味逍遙散調經加釣藤鈎山梔如不應須用六味丸雜病虛勞以補腎水生肝木爲主佐以前劑治之若其脉長弦者是肝之本脉則易治其脉短澁者是肺金尅肝木也則難治其面色青中見黑者是水生木也當自愈青中見白者是金尅木也必難愈一婦人素口苦月經不調或寒熱妊娠五月兩臂或拘急或緩縱此肝火傷血所致也用四物加柴胡山梔丹皮釣藤鈎而愈一姪婦因怒寒熱頸項動掉四肢抽搐此肝火血虛風熱用加味逍遙加釣藤鈎數劑痊

顫振

黃帝曰人之顫者何氣使然岐伯曰胃氣不實則諸脉虛諸脉虛則筋脈懈墮筋脉懈墮則行陰用力不復故爲顫因其所在補分肉間醫學綱目云顫振與瘓癥相類瘓癥則手足牽引而或伸或屈顫振則但顫動而不伸屈也胃虛有痰用參术以補氣茯苓半夏以行痰如實熱積滯用張子和三法薛顫振者掉眩也易曰鼓萬物者莫疾乎風鼓之爲言動也大抵掉眩乃風木之搖運也諸風掉眩皆屬於肝治法若肝木實熱用瀉青丸幼科肝木虛熱用六味丸雜病

虛勞肺金丸，肝木用瀉白散。雜病發熱肝木虛弱，用逍遙散，
調經加參术。釣藤鈎，脾血虛弱，用六君子湯。雜病虛勞加芍
歸釣藤鈎，胃氣虛弱，用補中益氣湯。雜病虛勞加釣藤
鈎。若產後顫振，乃氣血虧損，虛火益盛而生風也。切
不可以風為論，必當大補斯無誤矣。一婦人性善，
怒發，熱經水非過期，則不及肢體倦怠，飲食少思，而
顫振，余謂脾氣不足，肝經血少，而火盛也。午前以調
中益氣湯加茯苓、貞母送六味丸，午後以逍遙散送
六味丸，兩月餘而愈。一婦人身顫振，口妄言，諸藥
不効，余以為鬱怒所致，詢其故，蓋爲素嫌其夫而含

怒久矣，投以小柴胡湯。傷寒少陽稍可，又用加味歸脾湯。
歸脾湯加柴胡山梔而愈。

交加散 治癥癰或顫振或產後不省人事，口吐痰涎。

當歸

荆芥穗各等分

右爲細末，每服三錢水一盞，酒少許煎至七分灌，
下咽即有生理。

增損柴胡湯 治產後或經適斷致手足牽搐，或牙

昏冒異證

柴胡

捌錢

黃芪

錢五

黃芩

炒

石膏各肆錢

半夏參錢

知母

甘草

炙各貳錢

右為麤末每服半兩薑五片棗四枚水煎溫服
本事青鹽丸 治肝腎虛損腰膝無力顫振顰曳
礞香末參兩 兔絲子肆兩 乾山藥貳兩

青鹽壹兩研

又先將兔絲子洗淨無灰酒浸晒七日冬天近火
煨炙乾另爲細末和酒糊丸梧子大每服五七
十九溫酒或鹽湯下常服壯筋力進飲食一婦人
素患足顰曳服此藥履地如故

本事星附散 治中風能言而手足顰曳脈虛浮而
數

天南星

製同半夏

半夏薄切片薑汁浸透

黑附子

炮

白附子

炮

川烏頭炮

白僵蠶炒

沒藥

人參

白茯苓各等分

右為麤末每服二錢酒水各一盞同煎至八分去
滓熱進三服汗出即瘥 在桐廬有患此證用
前藥三服得汗手足卽能舉動
三因獨活散 治氣虛感風或驚恐相乘肝膽受邪
使正氣不守正位致頭搖搖手足顫掉漸成目瘡

叟獨活

地骨皮
細辛

防風

去叉

三因芎
菊草分等

甘草炙等

菊花者

甘味

右爲麞末每服三錢水盞半煎至二盞去滓煎取清汁六分入竹瀝少許再煎一沸食後溫服日

二服

世傳茯苓丸治手臂抽牽或戰掉不能舉物服此藥立愈又治脾氣虛弱痰邪相搏停伏中脘以致臂內筋脉攣急而痛

茯苓

半夏

薑製各貳兩

枳殼


薑炒半兩

風化朴硝

壹兩

右爲末薑汁糊丸桐子大每服二十丸食後薑湯

下



亦為本草書脉之附錄卷之二十六卷之二十六卷之二

讀兩

驚悸失血心神不安

婦人血風驚悸者是風乘於心故也心藏神爲諸臟之主若血氣調和則心神安定若虛損則心神虛弱致風邪乘虛襲之故驚而悸動不定也其驚悸不止則變惚恍而憂懼也

排風湯亦可用

薛丹溪先生云驚悸

者血虛用殊砂安神丸痰迷心竅用定志丸怔忡者屬火屬痰思慮便動者屬虛時作時止者火動也假如病因驚而致驚則神出其舍痰乘而入矣蓋人之所生者心心之所養者心血虛神氣不守此驚悸之所由生也治當調養心血和平心氣而已金氏

婦暑月赴筵，因坐次失序，自愧成病。言語失倫，兩脈弦數。予曰：當補脾導瘀，清熱不信以數卒者噴水呪之而死。或謂病既無邪以邪治之，何至於死乎？白暑月赴筵外，受蒸熱，辛辣適口，內傷鬱熱，而況舊有積痰，加之愧悶，其痰愈盛。又驚以法尺，益驚其神而氣血不寧，噴以法水，閉其肌膚而汗不得泄，內燔則陰既銷而陽不能獨立不死。何待故滑伯仁先生云：若膽氣虛寒，用茯神湯；膽氣實熱，用酸棗仁丸；心氣虛熱，用定志膏；茯苓補心湯；心氣實熱，用硃砂安神丸；茯神散。文學歸雲橋內人月事不及期，忽崩血絆。

慣發熱不寐，或謂血熱妄行，投以寒劑益甚，或謂胎成，受傷投以止血，亦不効。余曰：此脾氣虛弱，無以統攝，故耳。法當補脾而血自止。用補中益氣湯。雜病傷寒，健忘，勞力，加炮薑，不數劑而驗。惟終夜少寐，驚悸，別服八物湯，不効，余曰：雜矣。乃與歸脾湯。雜病傷寒，健忘，加炮薑，以補心脾，遂如初。一婦人勞則心跳，怔忡，寒熱往來，用歸脾湯為主佐，以八珍湯諸證漸愈。又用加味逍遙散，寧志丸而安。後復作服歸脾定志二藥即愈。一婦人患驚悸，怔忡，日晡發熱，月經過期，飲食少，思用八珍湯，加遠志、山藥、酸棗仁三十餘劑，漸愈。佐以歸脾湯。

全愈後因勞發熱食少體倦用補中益氣湯又因怒
適月經去血不止前證復作先以加味逍遙散熱銀
經止又用養心湯治之而痊一婦人驚悸怔忡無
寐自汗盜汗飲食不甘急情嗜卧用歸脾湯而愈至
年餘懷抱鬱結患前證兼衄血便血仍用前湯而愈
茯神散 治婦人血風五臟大虛驚悸安神定志

茯神去木

人參去蘆

龍齒另研

獨活去蘆

酸棗仁各壹兩微炒

防風去蘆

遠志去心

桂心

細辛去苗

白术去蘆各朱錢半

甘草炙

乾薑炮各半兩

右咬咀每服五錢水一中盞半煎至一大盞去粗
溫服不拘時候

龍齒丸 治婦人血風上攻心神恍惚驚悸眠昧不
安

龍齒另研

茯神去木各壹兩

硃砂研水飛

人參去蘆

當歸去蘆

天麻各朱錢半

檳榔

防風去蘆

生乾地黃

犀角屑各半兩

遠志去心

赤箭各貳錢半

右爲細末煉蜜和搗三五百下丸如梧桐子大每

服三十丸薄荷湯送下不拘時

朱賁琥珀散

治婦人血風驚悸

琥珀研

沒藥研

木香

羌活

芍藥

白芷

川芎各半兩

乾地黃

延胡索

白朮

土瓜根

牡丹皮去心

右爲末每服壹錢水壹盞煎至七分加酒壹分再

煎少時熟服重者數服効

茯苓補心湯

治心氣不足善悲愁怒衄血面黃五

心煩熱或咽喉痛舌本作強

茯苓

肆兩

桂心

甘草炒

麥門冬

去心各參兩

紫石英煅

赤小豆

貳拾肆粒

人參各壹兩

右用水七升煎一升半分三服

茯神湯 治膽氣虛冷頭痛目眩心神恐畏不能獨處胸中煩悶

煩渴茯神去木炒

酸棗仁炒

黃芪炒

柏子仁炒

白芍藥炒

五味子杵炒各壹兩

桂心

熟地黃自製

女參

甘草炒各半兩

右每五錢薑水煎服

酸棗仁丸

治膽氣實熱不得睡卧神思不安驚悸

怔忡多

杏仁去皮

酸棗仁炒

遠志去心

柏子仁炒

防風各一兩

枳殼炒

生地黃柏膏各半兩

青竹茹貳錢

右爲末煉蜜丸梧桐子大

每服七八十九白湯下

定志丸

治心神虛怯神思不安或語言鬼怪喜笑

驚悸多

人參

茯苓各壹兩

菖蒲

遠志去心各

壹兩

右爲末蜜丸如前服

養心湯

治心血虛驚悸怔忡不寧或盜汗無寐發

熱煩躁多

多

當歸酒拌

川芎各半兩

半夏麴

去皮

柏子仁

酸棗仁炒

辣桂去皮

多

五味子杵炒

錢

人參各參錢

右每服三五錢薑水煎服

硃砂安神丸 治心經血虛頭暉心神驚悸等證

硃砂飛過伍錢黃連酒洗陸錢甘草炙伍分

生地黃

當歸各壹錢

右為末飯糊為丸每服十五丸如一服不應當歸脾湯補之

治要茯苓散 治心經實熱口乾煩渴眠卧不安或心神恍忽

茯神

麥門冬各壹兩半去心通草

升麻

各壹兩貳錢半

大棗

拾貳枚

紫苑

桂心

各半朱錢

知母

壹兩半

赤石脂

壹兩半錢

淡竹茹

伍錢

右每服壹兩水煎

失血心神不安

薛前證

若脾胃鬱熱用加味逍遙散

脾胃鬱結用加味歸脾湯，脾胃虛弱氣血不足用八珍湯十全大補湯，肺虛氣血不足用補中益氣湯六君子湯，痰氣鬱滯用六君桔梗貝母，如不應審孫氣虛但補脾胃，如不應用獨參湯，如惡寒發熱屬氣血俱虛內熱晡熱屬血虛作渴面赤是血脫煩躁皆宜甘苦之劑以補陽氣而生陰血，經云血脫補氣，若用寒涼之劑以降火則誤矣仍審證屬之因治之

寧志膏

治婦人因失血過多心神不安言語失常

不得睡卧

辰砂研

酸棗仁炒

人參

白茯神去木

琥珀各壹分

滴乳香壹錢研

右爲末和停每服壹錢濃煎燈心棗湯空心調下
上方無茯神琥珀蜜丸如彈子大薄荷湯化下壹丸

茯苓補心湯 婦人以血旺氣衆爲本心主血肝藏血今血衆而氣盛者由心氣虛耗不能主血又不能制乎肺金使肺金得以乘乎肝木肝之虧損則血不能藏漸致枯涸不榮經絡故月事不調矣此

方專補心元之虛抑其肺氣之乘調和榮衛滋養血脈其疾自然平復矣

卽參蘇飲內除木香與四物湯對分勻和以薑棗

前每服四錢食前溫服

參蘇飲方見後

四物湯

方見通治

妙香散

治心氣不足精神恍忽虛煩少寐盜汗等證

半夏

甘草炒伍錢

遠志去心炒

山藥蜜汁炙

茯苓

茯神去木

桔梗各伍錢

辰砂另研

人參

蠶母

麝香貳錢
另研

木香貳錢
伍分

右爲細末每服貳錢溫酒調下

半夏湯

治膽腑實熱精神恍惚寒熱泄瀉或寢汗

憎風善太息

半夏壹錢
伍分

黃芩

遠志去骨
各壹錢

生地黃貳錢
伍分

秋米壹合

酸棗仁炒參
錢

硝砂仁壹錢
伍分


右作一劑長流水煎服

衝脈湯

治元氣虛弱惡寒發熱或作渴煩躁痰喘

氣促或氣虛卒中不語口噤或痰涎上湧手足逆

冷或難產產後不省喘急用好人參二兩或三四兩加炮薑五錢水煎徐徐服蓋人參性寒故以薑佐之如不應急加附子



顛狂

大夫婦人顛狂病者由血氣虛受風邪所爲也人稟陰陽之氣而生而風邪入并於陰則爲顛入并於陽則爲狂陰之與陽有虛有實隨其虛時爲邪所併則發也顛者卒發意不樂直視仰地吐涎沫口唱目急手足擦戾無所覺知良久乃甦狂者少卧不飢自高賢也自辨智也自貴居也妄笑好歌樂妄行不休故曰顛狂也 素問云陽厥狂怒飲以鐵落狂怒出於肝經肝屬木鐵落金也以金制木之意予嘗治一女人眼見鬼物言語失常循衣直視衆醫多用心藥治

之無效予投養正丹二貼煎乳香湯送下以三生飲
佐之立愈又一男子亦曾病此證亦用此藥收効且
養正丹與百一方抱膽丸無異抱膽丸內無硫黃有
乳香也 薛劉宗厚先生云有在母腹中受驚者或
有間太驚而得者蓋驚則神不守舍舍空則痰涎歸
之或飲食失節胃氣有陽痰停胸膈而作當尋人尋
痰固元氣虛頑痰膠固上膈必先用吐法若在腸胃
亦須下之竊謂此證若因元氣虛弱或痰盛發熱等
皆是虛象如慢驚證無風可祛無痰可逐但補脾胃
生氣健旺神智自清痰涎自化若誤用辛散祛逐腦

麝之劑必為敗證 一婦人素清苦因驚而顛或用
風痰等藥愈甚余用參芪歸木濃煎佐以薑汁竹瀝
服三斤餘方愈

防風散 治婦人風邪顛狂或啼泣不止或歌笑無

度或心神恐懼或言語失常

防風

扶神去木少

人參

遠志去心

菖蒲去毛少

禹餘糧

牡蠣各壹兩

秦艽

桂心各半錢

甘草朱錢半

蛇蛻壹尺炙

右為粗末每服參錢水壹盞半煎，去滓，溫服。

又方

羚羊角屑

人參

生乾地黃各柒錢半

獨活

遠志去心

菖蒲去毛

防風兩各半

茯神去木

石膏

麥門冬去心

龍齒別研

白鮮皮各壹兩

右為粗末每服參錢水煎，溫服無時。
牛黃清心丸亦可用

方見雜病中風

餘詳雜病本門

血風煩悶

大婦人血風煩悶者由府臟勞傷，血氣虛而風邪入之，搏於血脉，使氣不通而不潤，則生於熱，或肢節疼痛，口乾少眠，皆因虛弱而氣血壅滯，故煩悶也。前證多屬肝脾血虛發熱，宜參照前寒熱方論主治。酸棗仁散 治婦人血風煩悶四肢疼痛心神多躁，飲食減少並皆治之。

酸棗仁

赤芍藥

赤茯苓去皮

當歸去蘆

紅花子

生乾地黃

羚羊角屑各柒錢半

防風去叉

羌活去蘆

牛膝酒浸

芎藭

桂心

地骨皮

麥門冬去心

甘草炙各半兩

右為哎咀每服八錢水壹盞半生薑柒片薄荷
柒葉煎至壹大盞去滓溫服不拘時

紫石英散

紫石英壹兩

茯神去木

麥門冬去心

人參去蘆

遠志去心

酸棗仁

當歸去蘆

黃芩各半兩

羚羊角屑

防風去蘆

黃芪各半兩

甘草炙貳錢半兩

右為哎咀每服五錢水壹盞半生薑五片棗拭

枚煎至壹大盞去滓溫服不拘時
當歸散 治婦人血風潮熱

當歸去蘆

芍藥

玄胡索

熟地黃各半兩

大黃蒸半錢半兩

桂心半兩

甘草炙貳錢半兩

赤芍藥

右為細末每服壹錢水壹盞入乾胭脂壹錢同煎
至陸分去滓食後溫服


赤芍藥散 治婦人氣血不和心胸煩悶不思飲食

四肢少力頭目昏眩身體疼痛

牡丹皮

白芍藥

赤芍藥



血風煩悶

女科二

百三

白芷

甘草

各貳兩

柴胡

壹兩半

右為細末每服貳錢水壹盞生薑壹片棗壹枚同煎至半分溫服食後臨卧

血風攻脾不能食

因脾屬於土脾為中州意智之臟也其肝心肺腎皆受脾之精氣以榮養焉脾與胃為表裏脾主化穀納食胃為水穀之海故經言四時皆以胃氣為本也婦人氣血不調臟腑勞損風邪冷氣蘊蓄在內攻於脾胃脾胃既虛為邪所乘則不能消任五穀故不能食也
薛經云胃乃脾之剛脾乃胃之柔傷胃則脾無所稟受傷脾則不能為胃運化是以脾胃為之表裏籍飲食以滋養百脉者也竊謂前證若飲食所傷六君子湯雜病虛勞卷勞役所傷補中益氣湯雜病傷勞卷若風寒

所傷用入參理中湯雜病霍亂木旺乘土六君加柴胡嘔吐腹痛或大便不實前湯加木香胸膈虛痞或肚腹不利六君子湯鬱怒傷損肝脾歸脾湯雜病健忘命門火衰火味丸雜病虛勞仍審諸經錯雜之邪而治之假如不能食而肌肉削乃脾胃經本病布關脉緩而弱乃脾胃之本脈若見弦緊或四肢滿明淋溲便難轉筋此肝之脾胃病也若兼洪大或脈熱煩熱面赤此心之脾胃病也若兼浮濶或氣短喘急咳嗽痰盛此肺之脾胃病也若兼沉細或善恐善欬此腎之脾胃病也各當於本經藥中加兼證之藥此東垣先生之治法

也一婦人停食飽悶或用入參養胃湯木香檳榔丸而泄瀉吐痰腹中成塊又與一陳黃連厚朴反加腹脹不食余以爲脾胃氣虛不能消磨用補中益氣加茯苓半夏五十餘劑脾胃健而諸證痊一婦人飲食每用碗許若稍加非太便不實必吞酸嚥腐或用二陳黃連枳實反加內熱作嘔余曰此未傳寒中不信仍作火治虛證悉至月經不止余用六君加炮薑木香數劑諸證漸退又以補中益氣加炮薑木香茯苓半夏數劑全愈後因飲食勞倦兼以怒氣飲食頓少元氣頓怯仍用前藥更加發散脉洪大按之而

虛兩尺如無此命門火衰用補中益氣加薑桂及八味丸兼服兩月餘諸證尋愈此證若因中氣虛弱用人參理中湯或六君子加木香炮薑不應用左金丸

兩脇脹痛

或越鞠丸

雜病

虛寒加附子理中湯

中寒無有

不愈一婦人飲食後或腹脹或吞酸自服枳术丸飲食日少胸膈痞滿腿內酸痛畏見風寒或用養胃湯腿痛浮腫益盛丹經不行余以為鬱結所傷脚虛濕熱下注侵晨用四君子芳歸二陳午後以前湯送越鞠丸諸證漸愈又用歸脾八珍二湯兼服兩月餘而經行婦人胸滿少食或腹脹吞酸或經候不

調此中氣虛而不能施化也用補中益氣加砂仁香附煨薑而飲食進更以六君子芳歸貝母桔梗而經自調一婦人年二十餘忽不進食日飲清茶水果三年餘矣余謂脾氣鬱結用歸脾加吳茱萸四劑遂飲食如常若人脾胃虛而不飲食當以四神丸治之一婦人不進飲食一年矣日飲清茶果品之類肝脾二脉弦浮按之微而結滯余謂肝脾氣鬱用六君子香吳茱萸下痰積甚多飲食頓進形體始瘦卧牀月餘仍服六君之類而康

草豆蔻散 治婦人血風冷氣攻脾胃嘔逆不納飲

食

草豆蔻去皮

白茯苓去皮

枇杷葉炙

半夏湯洗朱次切作

斤各一錢半

高良薑

白术去蘆

縮砂仁

桂心

木香

青橘皮去白

甘草炙各半兩

人參去蘆

壹兩

右㕮咀，每服五錢水壹中盞半生薑七片煎至壹
盞去滓，溫服。不拘時候。

訶梨勒散 治婦人血風氣攻脾胃，腹脇妨悶，四肢
煩疼，或時癥逆，不下飲食。

訶梨勒皮

陳橘皮各壹兩

半夏湯洗朱次切片

人參去蘆

桂心

細辛去苗

當歸炒去蘆

白术

去蘆

藿香

赤茯苓去皮

芍藥各半錢

右製煎服法同前。

神麴丸 治婦人血風氣攻脾胃，腹脇脹滿，不思飲
食。

神麴

白术去蘆

附子炮去皮臍

枳實麸炒去穰

訶梨勒皮

桂心

食茱萸

木香

陳橘皮去白

血風攻脾不能食

妇科

百廿

人參各壹兩

去蘆

桔梗

去蘆

乾薑

炮各半兩

右爲細末酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服參拾丸空心食前生薑湯下日進貳服

進食散 李潛云治脾胃虛寒不思飲食及久病人脾胃虛全不入食者只兩服能食

陳云此方既有效力治益風攻

脾不食豆無良驗

青皮

陳皮

粉草

桂心

良薑

各貳錢半去核

川烏頭

炮去皮尖

草豆蔻仁各叁枚

訶子伍枚

爲細末每服壹錢水壹盞生薑參片煎七分溫服

身體骨節疼痛

大婦人血風身體骨節疼痛者由體虛氣血不調爲風所侵故也其狀風邪在於皮膚肌肉歷於骨節邪氣與正氣交擊故令疼痛也 薛東垣先生云飲食失節脾胃虛弱乃血所生病故口中津液不行若火熱來乘土位故肢體發熱作渴若肝經血熱用四物

雜病虛勞羌活黃芩黃檗肝經血虛用逍遙散

調經山梔川

芎風濕兼瘀用四物南星半夏羌活蒼术風濕傷脚

用羌活勝濕湯

雜病腰痛暑濕傷氣用清燥湯

雜病傷暑氣鬱

肝脾用四君木香枳殼檳榔胃氣受傷用補中益氣

湯 雜病傷寒

瘀血流注用四物桃仁紅花骨痛筋掣

用當歸沒藥丸 本條倦怠無力用補中益氣羌活川芎

一婦人自汗盜汗發熱晡熱體倦少食月經不調吐痰甚多二年後遍身作痛陰雨益甚此氣虛而風寒所乘用小續命湯疼痛頓止又用補中益氣加味歸脾三十餘劑諸證悉愈一婦人月經不調且素有痛風遇勞必作用衆手重按痛稍止此氣血俱虛用十全大補 雜病虛勞加獨活而痛痊用六味丸 虛勞逍遙散而經調一婦人肢體作痛面色痿黃時或未白 發熱惡寒吐瀉食少腹痛脇脹月經不時或始崩漏

或痰盛喘嗽頭目眩痛或五心煩熱口渴飲湯或健忘驚悸盜汗無寐等證卧牀年許悉屬肝脾虧損氣血不足所致用十全大補加味歸脾兼服月餘諸證悉痊

芎鴟散 治婦人血風身體骨節疼痛心膈壅滯少思飲食

川芎 壹兩

赤茯苓 去皮

赤芍藥

酸棗仁 炒

桂心

當歸 去蘆

木香

牛膝 酒浸各半錢

羌活 去蘆

枳殼 去穰

炒

甘草 各半兩

炙

右爲㕮咀每服參錢水壹大盞半薑五片煎至壹
大盞去滓熱服不拘時候

海桐皮散 治婦人血風身體骨節疼痛，

海桐皮

桂心

白芷

當歸

去蘆

漏蘆

川芎

麝羊角屑

各壹兩

赤芍藥

沒藥

另研

川大黃

炒

木香

檳榔

兩各半

右爲細末每服貳錢溫酒調下不拘時

虎骨散 治婦人血風攻疰身體疼痛

虎脰骨

壹兩半

麝香

貳錢半

桂心

川芎

海桐皮

當歸

去蘆

牛膝酒浸

天麻

附子

炮去皮臍

骨碎補

沒藥

另研

琥珀

另研各壹兩

羌活

去蘆

木香

兩

右爲細末入研藥令勻每服貳錢溫酒調下不拘

時候日進貳服

何首烏散 治婦人血風身體骨節疼痛或手足羸
瘦腰跨沉重牽拽不隨並皆治之

何首烏

羌活

去蘆

當歸

炒去蘆

赤箭

附子

炮去皮臍

桂心

赤芍藥

芎芻

羚羊角屑錢各半

葳靈仙

牛膝酒浸各
壹兩

防風半兩
去蘆

通靈丸

治男子婦人手足疼痛風走注痛不可忍

白附子

炮

僵蠶

炒各
壹兩

全蝎

半兩
炒

麝香

另研
壹字

右爲細末，每服貳錢，豆淋酒調下，不拘時。

當歸沒藥丸 治婦人血風血氣，腹脇刺痛，筋攣，骨

痺，手足麻木，皮膚癩痒，並宜服之。

當歸

去蘆

五靈脂

炒各
壹兩

沒藥

半兩
另研

右爲細末，醋糊和丸，如梧子大，每服參拾丸。

溫酒送下，生薑湯亦可。日進貳服。

四生丸 治血風骨節疼痛，舉臂不起，行履艱難，遍身麻痺。

白僵蠶

炒

地龍

去土

白附子

生

五靈脂

炒

草烏頭

去皮尖生
各等分

右爲細末，以米糊和丸，梧子大，每服貳拾丸。溫酒送下，或作末酒調半錢，亦可。日進貳服，不拘時候。

羚羊角散

治血風身體疼痛，手足無力，心神壅悶。

羚羊角屑

酸棗仁炒

生乾地黃

蜜檳榔各壹兩

五加皮

防風

赤芍藥

當歸

骨碎補炒毛法

海桐皮

川芎各半錢半兩

甘草半兩

右爲末每服貳錢溫酒調下

羌活勝濕湯

治頭痛脊痛腰似折項似拔

羌活

獨活各壹錢

藁本

防風

甘草炙各半錢



蔓荆子

川芎各貳分

右水煎眼如身重腰沉沉然

是濕熱也

加黃檗壹錢附子半錢蒼朮貳錢



Kitasato Memorial Medical Library