





F  
シ-131



Kitasato Memorial Medical Library

No. 3171 490.9  
IR m 44 J0-3  
6

# 走症痛 頭目眩暈 頭痛

心痛 二腹痛 小腹痛 頸筋痛  
兩脇脹痛 腰痛 腰脚疼痛 脊痛

脚氣 瘰癧癩痒



富士川實庫

走症痛

大夫婦人體虛受風邪之氣隨血而行或淫易皮膚卒然掣痛遊走無有常處故名爲走症也加減小續命湯主之薛東垣云若人身體沉重走症疼痛此濕熱相搏或風熱鬱而不得伸附著於有形也是證多因飲食起居失節或因七情勞役失宜脾胃虧損腠理不密外邪所侵以致內熱腫熱自汗盜汗或經候不調飲食不甘治法濕熱腫痛者清燥湯雜病傷暑兼瘻佐以二陳湯雜病飲肝火作痛者加味逍遙散脾鬱作痛者加味歸脾湯血虛作痛者四物湯氣虛作痛

者四君子湯氣血俱虛者八珍湯俱加羌活川芎月經先期而痛者加味逍遙散頭眩倦怠而痛者補中益氣湯大抵按之痛甚者病氣實按之痛緩者元氣虛勞役而痛者亦元氣虛也飲食失宜而痛者脾氣虛也惱怒而痛者肝火盛也若晝輕而夜重者血分病也一婦人歷節發熱作渴飲食少思月經過期其脉舉之洪大按之微細用附子八物湯四劑而痛止用加味逍遙而元氣復用六味丸而月經調一婦人體肥胖素有熱月經先期患痛風下體微腫痛甚則小便頻數身重肌緩此風濕血虛有熱用羌活

勝瀉湯二劑腫痛漸愈用清燥湯數劑小便漸清用加味逍遙散內熱漸愈又為飲食停滯發熱仍痛面目浮腫用六君加柴胡升麻而愈又因怒氣小腹痞悶寒熱嘔吐用前藥加山梔木香而安惟小腹下墜似欲去後此脾氣下陷用補中益氣而愈後因勞役怒氣作嘔吐痰遍身腫痛經行寒熱此肝木侮脾土用六君加柴胡山梔腫痛嘔吐悉退後用補中益氣而安一婦人飲食少思畏風寒患痛風嘔吐寒熱脈弦緊用附子八物湯而四肢痛愈用獨活寄生湯而腰痛漸痊惟兩膝腫痛用大防風湯而痛漸愈用

卷之三  
方二

百十三

歸脾逍遙而元氣復  
沒藥散 治婦人血風走症肢節疼痛發時來往不定

沒藥另研

乳香另研

芎芻

當歸炒去蘆

桂心

漏蘆去蘆

木香各半兩

白芷

琥珀另研

地龍去土微炒各半錢

安息香另研

麝香另細研各貳錢半

右爲細末入研藥拌勻每服壹錢溫酒調下不拘時

琥珀散 治婦人血風走症疼痛來往疼痛

琥珀另研

當歸去蘆

牛膝酒浸

羌活去蘆入血分

川大黃剉微炒各半錢

桂心壹兩

沒藥另研

血竭另研

乾漆炒去盡

玄胡索

防風去蘆

羚羊角屑各半兩

虎脰骨貳兩

乾蝎炒

當歸炒

威靈仙

牛膝酒浸

羌活去蘆

桂心各壹兩

芎芻另研各半錢

沒藥另研各半錢

右為細末每服貳錢溫酒調下不拘時候日進貳服

雄黃散 治婦人血風走疰疼痛

雄黃

研水飛

血竭

另研

赤箭

側子

炮去皮

桂心

沒藥

另研

木香

各半兩

麝香

貳錢半另研

烏蛇

貳兩酒浸去皮骨炒微黃

右為細末入研藥更研令勻每服貳錢熱酒調下  
不拘時候日進貳服

漏蘆散 治婦人血風走疰疼痛無有常處

漏蘆

生用

白芥子

去土

地龍

去土另研

炒

桂心

各半兩

當歸

去頭葉

牛膝

各參分去土

羌活

各半兩

地龍

去土

防風

去根

桂心

各半兩

白芷

去土

沒藥

研

甜瓜子

各半兩

虎脰骨

酥炙

敗龜板

醋炙各壹兩

右為細末每服貳錢熟酒調下無時

麝香丸

治白虎歷節諸風疼痛遊走不定狀如蟲

齧晝靜夜剝及一切手足不測疼痛

大八角川烏頭

參枝去皮尖生用

生全蝎

貳拾箇

生黑豆

貳拾粒

生地龍

去土半兩

爲細末入麝香壹字同研停糯米糊爲丸如菉豆大每服七丸甚者拾丸夜卧令鬲空溫酒吞下微出冷汗一身便瘥許學士云予得此方凡歷節及不測疼痛一服便瘥在歙州日有一貴家婦人遍身走注疼痛至夜則發如蟲齧其肌多作鬼邪治予曰此正歷節病也三服效

芍藥知母湯治諸肢節疼痛身體魁癩脚腫如脫頭眩短氣溫溫欲吐

桂心

知母

防風各肆

芍藥

麻黃去根節

甘艸各肆

附子

貳兩炮

右㕮咀每服四錢水壹盞半生薑五片煎七分去滓空心服一方有白术川芎杏仁半夏

附子八物湯

治風歷節疼痛四肢如鎚鍛不可忍

附子

乾薑

芍藥

茯苓

人參

甘艸

桂心

各叁兩

白朮

肆兩

右㕮咀每服四大錢水貳盞煎七分去滓食前服一方去桂用乾地黃貳兩

獨活寄生湯

方見雜病腰痛

小續命湯 治白虎歷節痛不可忍

方見雜病中風

陳一婦人先自兩足踝骨痛不可忍，次日流於膝，三日流於髀骨，甚疼，至於肩，肩流於肘，肘流於後溪，或如鎚鍛，或如虫竄痛不可忍。晝夜劇服諸藥無効。召僕診之，太脈緊，曰：此真歷節證也。非解散之藥不能愈。但用小續命湯一劑而痊。又鄧安人夏月亦病歷節痛不可忍，諸藥無効。召僕診之，人迎與心脉虛此。因中暑而得，合先服酒蒸黃連丸，衆醫莫不笑用此藥，服一貼即愈。自後與人良驗。

治婦人血風走疰腰膝骨節疼痛不可忍

附子生

薰陸香

杏仁研

桂心

當歸

芸薹子

芫花

巴豆去皮，各壹兩

松脂壹兩半

右爲細末，鎔黃蠟五兩，攬和諸藥，捏作片子，包裹痛處，立効。

又方

芫花

桂心各壹兩

漢椒貳兩

桑根白皮

參兩

芸薹子

柳艸屑各伍兩

右爲細末，用醋一升，拌和蒸令熟，用青布裹，熨痛。

處冷卽更入醋蒸用之

治婦人血風走症腰胯脚膝疼痛

天仙子

川烏頭生

附子生各壹兩

右爲細末以酒煎成膏攤於帛上敷貼痛處多年者不過三十効

頭目眩暉

夫婦人頭眩由氣虛風入於腦循脈引於目系目系急而然也邪甚則必癲素問云頭痛癲疾下虛上實過在足少陰巨陽甚則入腎徇蒙招搖目瞑耳聾下實上虛過在足少陽厥陰甚則在肝下虛者腎虛也故腎厥則頭痛上虛者肝虛也故肝虛則暉徇蒙者如以物蒙其首招搖不定目眩耳聾皆暉之狀故肝厥頭痛不同也薛丹溪先生云眩者言其黑運旋轉其狀目閉眼暗身轉耳聾如立舟船之上起則欲倒蓋虛極乘寒得之亦不可一途而取軌也若風則

有汗寒則掣痛暑則熱悶濕則重滯此四氣乘虛而眩暈也若鬱結生痰而眩暈者此七情虛火上逆也若淫慾過度而眩暈者此腎虛氣不歸源也若吐衄漏崩而眩暈者此肝虛不能攝血也有早起眩暈須臾自定者元氣虛也正元飲雜病下黑錫丹雜病頭痛傷濕頭暈用腎着湯傷濕加川芎有痰用青州白丸子雜病中風頭風風熱也久則目昏偏頭風相火也久別目緊便澁皆宜出血以開表之竊謂前證肝虛頭暈用釣藤散腎虛頭暈六味丸雜病虛勞頭暈吐痰養正丹不應八味丸雜病虛勞血虛四物參苓白朮不應當歸補血

湯雜病勞倦氣虛四君歸芪不應補中益氣湯雜病勞倦肝木實瀉青丸雜病頭痛虛用地黃丸雜病虛勞不應川芎散脾氣虛二陳參木柴胡升麻不應益氣湯加茯苓半夏脾胃有痰半夏白朮天麻湯風痰上涌四神散發熱惡寒雜病中濕八物湯虛勞七情氣逆四七湯傷濕而暈除濕湯胃虧損耳一婦人內熱口乾勞則頭暈吐痰帶下

詳下嘈雜門

養正丹 治虛風頭眩吐涎不已。蓋此藥升降陰陽，補接真氣，非止頭眩而已。

黑鉛

朱砂

研各  
壹兩

水銀

硫黃

研

右用建殘壹隻火上鎔，鉛成汁，次下水銀，用柳枝子打停，取下歇少時，入貳味，打停候冷，取下研為粉，以糯米軟飯丸，如棗豆大，每服參拾丸，棗湯吞下，空心食前日貳服。

釣藤散

本事

治肝厥頭暈，清頭目。

釣藤

陳皮

去白

半夏

湯洗切片子

朱次

麥門冬

去心

茯苓

去皮

茯神

去木

朱次

人參

去蘆

甘菊花

石膏

壹兩

防風

去蘆

各半兩

右咬咀，每服四錢水，壹盞半，生薑七片煎至壹盞去滓，熱服，日進貳服。

獨活散 治婦人風眩頭疼，嘔逆身體時痛，情思昏悶。

獨活

壹兩

白术

去蘆

防風

去蘆

細辛

去蘆

人參

去蘆

芎藭

荆芥各半錢

半夏湯洗米次切片子

炙甘草

赤芍藥各半兩

石膏貳兩

右咬咀每服八錢水壹中盞半生薑七片薄荷七葉煎至壹大盞去滓溫服不拘時

川芎散 治風眩頭暈

川芎

山藥

白茯神木

甘菊花野菊不用

人參各半兩去蘆

山茱萸肉壹兩

右爲細末每服貳錢溫酒調下不拘時候日進三服

四神散 治婦人血風眩暈頭痛

川芎

當歸

去蘆

旋復花

荆芥穗各等分

右爲細末每服貳錢水壹盞葱白叁寸茶末壹錢煎至七分通口服良久去枕仰卧少時

斗門方 治血風頭旋或不知人事用喝起草嫩心陰乾爲末酒服貳錢其功甚妙卽前蒼耳散

治頭旋如天動地轉名曰心眩膽礬壹兩細研用麪餅劑壹箇拌勻勒如骰子大瓦上焙乾每服壹骰爲末燈心竹茹煎湯調下此去痰之法當審而用之



頭痛

薛東垣云足太陽頭痛脉浮緊惡風寒川芎羌活獨活麻黃爲主手少陽經頭痛脉弦細往來寒熱柴胡爲主足陽明頭痛身熱目疼鼻乾惡寒發熱脉浮緩而長升麻湯升麻葛根或石膏白芷爲主手太陽頭痛有痰體重或腹痛爲痰癖脉沉緩蒼木半夏南星爲主足少陰經頭痛足寒氣逆爲寒厥脉沉細麻黃附子細辛湯傷寒太陽爲主足厥陰頭項痛或吐涎沫厥冷脉浮緩吳茱萸湯傷寒吐主之諸血虛頭痛當歸川芎爲主諸氣虛頭痛人參黃芪爲主氣血俱虛頭痛調中

益氣湯

雜病勞倦

少加川芎蔓荆細辛痰厥頭痛半夏白

术天麻湯

雜病眩暈

厥逆頭痛羌活附子湯

雜病頭痛

如濕氣

在頭者以苦吐之不可執方而治若脉雜亂而病見不一且補胃為主

一婦人因勞耳鳴頭痛體倦用

補中益氣加麥門五味而痊三年後得子因飲食勞倦前證益甚月經不調晡熱內熱自汗盜汗用六味

地黃丸補中益氣湯頓愈經云頭痛耳鳴九竅不利

腸胃之所生也故脾胃虛耳目九竅皆為之病

一婦人兩眉稜痛後及太陽面青善怒此肝經風熱之證用選奇湯

雜病頭痛

合逍遙散

調經

加山梔天麻黃芪

半夏黃芩而愈此證失治多致傷目或兩耳出膿則危矣

旋覆花湯許叔微云婦人患頭風者十居其半每

發必掉眩如在車船上蓋因血虛肝有風邪襲之

爾予嘗處旋覆花湯此方修合服之比他藥甚效

川芎

當歸

去蘆

羌活

去蘆

旋覆花

石膏

細辛

去苗

蔓荆子

防風

去蘆

半夏

白

藜本

去蘆

乾地黃

甘草

炙各半兩

右咬咀每服五錢水壹盞半生薑五片煎至七分去滓溫服日進貳服

七生丸 治男子婦人八般頭風及一切頭痛痰厥氣厥飲厥傷寒傷風頭痛不可忍者並皆治之

川烏頭

草烏頭

白芷

半夏

冷水洗去滑

川芎

石膏

並生用各等分

右爲細末研韭菜自然汁丸如梧桐子大每服七丸加至拾丸嚼生葱茶送下食後日進貳服

陳普治鄧安人頭痛如破諸藥無効加北細辛等分全蠶減半爲丸服貳拾粒即愈

藥隱老人云若頭痛連齒時發時止連年不已此由風寒中於骨髓留而不去腦爲髓海故頭痛齒亦痛謂之厥逆頭痛宜白附子散灸曲鬚穴此穴在耳上將耳掩前正尖上可灸七壯左痛灸左右痛灸右白附子散

白附子

炮壹兩

烏頭

炮去皮臍

天南星

炮

麻黃

不去根節各半兩

乾薑

炮

辰砂

研各貳錢半

全蠶

炒伍枚

麝香

另研壹字

右爲細末每服壹錢溫酒調下不拘時候治頭風痛不可忍

硝石

人中白

腦子 各等分

右研令極細，每用一字搗入鼻中。

川芎茶調散

捌兩

治諸風土攻頭目昏重偏正頭痛

各一  
克

薄荷

捌兩

川芎

荆芥

各肆  
克

羌活

白芷

防風

甘草

炙各貳兩

細辛

壹兩

右爲末，每服貳錢，食後茶清調下。

如聖餅子和治男婦氣厥上盛，虛痰飲風寒伏留，陽經偏正頭疼痛，連腦顛吐逆，惡心目瞑，耳聾，常服清頭目，消風化痰，暖胃。

防風 生半夏 天麻

各半兩 天南星

洗各半兩

川烏

去皮尖，各一兩

乾薑

各壹兩

川芎

甘艸

炙各貳兩

爲細末，湯浸蒸餅，和丸茱實大捻作餅子，日乾，每服伍餅，同荆芥穗參伍莖，細嚼，茶酒湯任下。無時若頭痛筋攣，骨重少氣，噦噫腹滿時驚，不嗜卧，欬嗽煩冤其脉，舉之則弦，按之石堅，由腎氣不足而內著其氣逆而上行，謂之腎厥，頭痛宜玉真丸，與硫黃丸。

玉真丸

硫黃

研參貳分兩

硝石

研貳分兩

石膏

研半夏湯洗各壹兩

右研令停匀，生薑自然汁打糊，圓如梧子，大生薑丸。

湯下參蛤圓 一方無半夏有天南星  
硫黃丸 治頭痛不可忍或頭風年深暴患無所不  
治服此除根

硝石

壹兩

硫黃

貳兩

右研令極細滴水丸如指頭大空心蠟茶清嚼下  
壹丸百一方云中暑者以水服之下咽卽酒然  
治傷冷以艾湯下

裕陵傳王荊公偏頭疼方云是禁中祕方用生蘆菔  
汁蜋殼仰卧注鼻中左痛注左或兩鼻皆  
注亦可數十年患皆一注而愈

心痛

大夫婦人血氣心痛者由臟腑虛血氣不調風冷邪  
氣乘於心也其痛發有死者有不死者成證者心為  
諸臟之主而主於神其正經不可傷傷之而痛者各  
為真心痛朝發夕死夕發旦死心之支別絡為風冷  
所乘而痛者故痛發乍輕乍甚而成證者也 薛前  
證若寒邪所傷溫散之飲食停滯消導之肝火妄動  
辛平之脾氣鬱結和解之仍與後六證方藥同用  
一婦人久患心痛飲食少思諸藥到口卽吐予以為  
脾土虛弱用白术一味同黃土炒去土每服壹兩以

米泔煎濃徐服少許數日後自能大飲用三斤餘而安上舍陳履學長子室素怯弱產後患瘀瘡年餘不愈因執喪旬月每欲眩仆一日感氣忽患心脾高腫作疼手不可按而嘔吐不止六脉微細或見其形實誤認諸痛不可補氣乃用青皮木香五味吳茱萸等藥而愈繼復患瘡且墮胎又投理氣行血之藥病雖去元氣轉脫再投參芪補劑不應矣六脉如絲欲絕迎字至診之曰形雖實而脈虛極反用理氣之劑損其真氣故也連投參芪歸朮附子薑桂一劑間用八味丸五日寢食漸甘六脉全復此證若心脾疼痛

時卽服此等藥瘡亦不作矣

大烏藥散 治婦人血氣攻心痛發歇不定

烏藥

莪茂

桂心

當歸

桃仁

桂心

木香

各等分

爲末每服貳錢熱酒調下

阿魏丸 治婦人血氣攻心疼痛及一切積冷氣

當歸

桂心

青皮

附子

炮

白术

川芎

各壹兩

吳茱萸

炮

木香

乾薑各分

檳榔

肉豆蔻煨

延胡索

莪朶各兩

朱砂細研半兩

右爲末先以醋壹升煎阿魏成膏和藥末搗參百杵丸如梧桐子大每服貳拾丸食前熱酒下

雞舌香散

治男子婦人九種心痛一切冷氣

良薑

剉細麻油炒

桂心

赤芍藥各分

右爲細末每服貳錢水壹盞入鹽木瓜參片同煎七分溫服鹽湯點亦可血氣疝瘕痛用熟醋湯調下忌生冷

應痛散

治心脾痛不可忽者婦人脾血氣作心脾

痛尤効前方同只無桂心用醋煎醋湯點亦可乙丑年春初次女年十五經脉未行初一日心痛如刺吐飲不止脈沉緩弦細以蘇合香丸神保丸沉香丸理中丸訶子散七氣湯皆無効余思之此證非蟲卽飲作疾非局方九痛丸則不可遂合與服一二丸卽愈矣

陳氏二神丸治婦人血氣不和作痛不止及下血無時月水不調

東川真蒲黃炒

草薢鹽炒

右等分爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服參拾丸空

心溫酒下如不能飲米飲吞下兩服即止  
陳日華抽刀散 治婦人血風血氣等疾武興戎司  
機宜俟愷平卦云見一道人用此方療病不一而足遂  
以爲獻真平卦是奇妙

五靈脂炒壹兩

莪茂

桂心


共薹子炒各半兩

右爲末每服貳大錢酒半盞水半盞煎至八分疾  
作熱服

失笑散見產後心痛 詞子散見霍亂亦妙

靈苑方 治婦人卒血氣心痛只用生五靈脂爲細

末每服壹錢酒壹盞煎沸熱服  
局方四七湯加良薑又沉香降氣湯分心氣飲皆治  
心痛良三方並見  
雜病諸氣



心痛

女科二

百方

心痛

本草綱目 卷之三十一 心腹痛

心腹痛

大婦人血氣心腹疼痛由臟腑虛弱風邪乘於其間與真氣相擊而痛其痛隨氣上下或上衝於心或下攻於腹故云血氣攻心腹痛也

醫前證若氣滯血瘀用沒藥散

勞傷

元氣用補中益氣湯

雜病傷勞倦

肝脾

鬱結用四七湯

雜病

怒動

肝火用小柴胡湯

熱入肝

脾血虛用四物湯

通肺脾

氣虛用四君子湯

雜病虛勞

中物

氣虛弱用補中益氣湯

治脾氣虛俱虛用八珍湯

雜病虛勞

中湯

一婦人每怒心腹作痛久而不愈此肝火傷脾氣也用炒山梔一兩生薑五片煎服而痛止更以二

陳加山梔桔梗乃不再發。一婦人懷抱鬱結不時心腹作痛，諸藥不應用歸脾湯雜病健忘倍加炒山梔而愈。陳湖陸小村母久患心腹疼痛，每作必胸滿嘔吐，手足俱冷，面心脣麻，咽乾舌燥，寒熱不時，月餘竟夕不安。其脉洪大，衆以藜火治之，屢止屢作，迨乙巳春發頻而甚，仍用前藥，反劇。此寒涼損真之故，內真寒而外假熱也。且脉息洪弦而有怪狀，乃脾氣虧損，肝木乘之而然。當溫補胃氣，遂用補中益氣湯，加半夏茯苓、吳茱萸、木香，服熟寐徹曉，洪脈頓斂，怪脉頓除，諸證釋然。

三神丸 治室女血氣腹中刺痛，痛引心端，經行澀少，或月水不調以致疼痛。

橘皮

貳兩  
焙

當歸

酒浸炒

玄胡索

醋煮各壹兩

右為細末，煉蜜和丸，如梧桐子大，每服五十丸，空心溫酒送下。見枕塊痛，心溫酒送下。

沒藥散 治一切血氣脣腹撮痛，及產後惡露不下。

兒枕塊痛

炙

沒藥

研末

當歸血竭

炒研末

桂心

玄胡索

當歸

蒲黃

紅花

乾漆

炒烟盡

木香

芍藥各等分

右爲細末每服貳錢食前溫酒調下

大延胡索散

治婦人血氣攻心腹疼痛

延胡索

當歸

川芎

桂心各半錢半

木香

枳殼

赤芍藥

桃仁各半兩

熟地黃

壹兩

右咬咀每服參錢水壹盞薑叁片煎至七分去滓

熱服

琥珀散

治婦人血氣攻心腹煩躁悶亂疼痛不正

琥珀

另研 没藥

另研 當歸

牡丹皮

延胡索

炒

赤芍藥

桂心各等分

紅花各壹

蒲黃

莪茂

錢

右爲末每服壹錢溫酒調下

瑞金散

治婦人血氣撮痛月經不行預兆嘔吐疼

痛

玄胡索

牡丹皮

紅花各壹

川芎

赤芍藥

錢

片薑黃

貳錢半

當歸

各壹錢半

官桂

半錢

作壹服水壹鐘酒壹鐘同煎至壹鐘食前服

牡丹散

治婦人久虛羸瘦血塊走注心腹疼痛不

思飲食

牡丹皮

玄胡索

官桂

各壹錢

京三稜

當歸

各壹錢半

蕤蕤

赤芍藥

牛膝

各貳錢

右煎服法同前

八慶散 治血氣心腹病痛立驗

當歸

厚朴

芍藥

枳殼

製

人參

各肆分

甘草

茯苓

各伍分

肉豆蔻

貳

右爲末水貳升煮取入合空心分空服

又八仙散

治淤

棕櫚

貳兩

當歸

壹兩並剉碎燒成炭細研

麝香

壹錢細研

右同研令停每服壹錢溫酒調下

玄胡索湯 治婦人室女七情所感血氣併心腹疼痛或連腰脇甚作搐搦一切血氣經候不調並宜服之

玄胡索

蒲黃

赤芍藥

片菖黃

當歸

去蘆各壹錢半

乳香

木香

不見火

官桂

不見火

沒藥

各壹錢



熟服用燒赤秤錘冷過調服亦可常服只用溫酒

菖蒲丸

治婦人脾血積氣及心脾疼

菖蒲九節者  
陸兩

吳茱萸炮

香附子炒去毛  
各肆兩

右三味並剗細以釀醋五升煮乾為度焙乾研細末以好神麪打糊為丸如梧桐子大空心食前以淡薑湯吞下四五拾丸日參服橘皮湯下亦好

手拈散 治血氣心腹疼痛

草菓

玄胡索

五靈脂

沒藥各等分

爲末每貳錢溫酒調服

木香枳术丸

破滯氣消飲食開胃進食消化癥延

木香

枳實炒各壹兩

白朮貳兩

右每服五錢薑棗水煎服

木香化滯湯

治脾胃虛弱飲食停滯腹脹作痛或

心下痞滿不思飲食若憂怒飲食而致者尤宜用之

木香

紅花各參錢

橘皮

當歸尾

枳實炒各貳錢

柴胡肆錢

草豆蔻

甘草炙各半兩

半夏壹兩

右每服參五錢薑水煎服



草豆蔻

桂枝

半夏

當歸

熟地

芍藥

木香

桔梗

陳皮

大婦人小腹疼痛者此由胞絡之間風有風冷搏於血氣停結小腹因風虛發動與血相擊故痛也

薛前證若氣寒血結用威靈仙散氣滯血凝用當歸散

肝經血虛用四物湯通加參木柴胡肝經濕熱用龍膽瀉肝湯雜病淋肝脾氣虛用六君子湯雜病虛勞加柴胡

芍藥肝脾虛寒用六君子加柴胡肉桂石兼嘔吐加木香四肢逆冷再加炮薑通府張孟威云其妹小腹痛服附子理中湯附子服過八十餘枚此乃沉寒

### 小腹痛

大婦人小腹疼痛者此由胞絡之間風有風冷搏於血氣停結小腹因風虛發動與血相擊故痛也

薛前證若氣寒血結用威靈仙散氣滯血凝用當歸散

肝經血虛用四物湯通加參木柴胡肝經濕熱用龍膽瀉肝湯雜病淋肝脾氣虛用六君子湯雜病虛勞加柴胡

芍藥肝脾虛寒用六君子加柴胡肉桂石兼嘔吐加木香四肢逆冷再加炮薑通府張孟威云其妹小腹痛服附子理中湯附子服過八十餘枚此乃沉寒

痼冷之甚不多有者

大威靈散 治婦人久冷氣滯血刺小腹疼痛

威靈仙

壹兩

當歸

沒藥

木香

桂心

各半兩

右爲細末無時熟酒調下壹錢服，溫茶當歸散治婦人久積血氣瘀刺小腹疼痛四肢無力不能飲食。

當歸

炒

赤芍藥

劉寄奴

沒藥

枳殼

延胡索

各等分

右爲細末熟酒調下壹錢無時候

追氣丸

靈芝花

治婦人血刺小腹疼痛不可忍。

甘臺子

微炒

桂心

外壹兩

良薑

半兩

爲細末醋糊丸如梧桐子大每服五丸不拘時淡醋湯下常服補血虛破氣塊甚有効。

石灰散

治婦人血氣痛不可忍者陳五婆方

右取猪貼脊血半盞於湯上緩用杖子攢停後用石灰於火上燒令黃爲末羅過灰壹錢同血攢停放溫服立愈。

予嘗用紫金皮爲細末醋糊丸如櫻桃大又治婦人血氣小腹疼痛以溫酒磨下壹丸及有心腹痛者亦良。

吳茱萸湯 治婦人素虛又為風冷乘氣停滯腹脇刺痛

吳茱萸 湯沈

當歸 去蘆各貳錢

桔梗 去蘆各炮

細辛 去苗半

防風 去蘆各貳錢

乾薑 炮各壹錢

熟地黃 半錢

甘草 炙半錢

右作壹服水貳鍾煎至壹鍾空心服

椒紅丸 治婦人血氣不調臟腑積冷臍腹疗痛肌

體日瘦

椒紅

沉香

當歸 去蘆各炮

訶梨勒 核去皮

蓬术

附子 炮去皮附子

白术 各壹兩

肉豆蔻

良薑

丁香 各半兩

麝香 另研貳錢半

右為細末煉蜜和丸如梧子大每服參拾丸空心用溫酒送下

大腹皮飲 治婦人血癖單腹痛

大腹皮

防已

木通

桑白皮

厚朴

瓜蔞

黃芪

陳皮

枳殼 麸炒

大黃 蒸各壹錢

青皮 壹錢半

五味子 半錢

右作壹服水貳鍾煎至壹鍾入酒半盞再煎一二

弗去滓食前服

黃耆各一錢  
青皮一錢半

王叔和注

葛根

刺史

葛根姜炒

桑白皮

刺史

桑白皮

大卿皮

刺史

大卿皮

人頭肉桂

川芎白芷  
細辛各一錢半

赤芍根木通

甘草大頭頭各一錢半

王叔和注

葛根姜炒

白果

白果

人頭肉桂

川芎白芷  
細辛各一錢半

項筋強痛

陳良甫云婦人項筋拘攣強痛每得此疾療之似易而實難然方冊中所載亦少縱有言之議論亦寥以予考之然旣有是疾必有是方何古人言此疾證尚且略又無的然之論詳之必是挾諸疾而生所以絕無專門予因暇日撫古名方以備檢閱然自明學識淺鄙未必全備博學之士見其遺缺尚冀補而完之夫頸項之處乃屬足太陽膀胱之經又許大學云是足少陰腎之經蓋腎與膀胱爲表裏故也以感外邪論之則有太陽經先因感風又感寒濕致令外證

發熱惡寒與傷寒相似頸項強急腰身反張如中風  
狀瘻癰口噤其身體凡凡古人以強直爲痙其脉沉  
遲弦細新產血虛多汗出喜中風亦有此證詳見產  
後中風茲不贅錄又有坐枕轉項不得者與三五  
七散追風散仍與急風散搽項上若因被風吹頭  
目昏眩太陽并腦俱痛項背筋脈拘急可與蝎附散  
都梁丸許太學治項筋強痛不可轉側以木瓜煎  
薛前證若因肝木自旺用瀉青丸頭精血不足六  
味丸雜病虛勞風熱淫肝加味道遙散調經怒動肝火加味  
小柴胡湯熱入血室肝經血虛加味四物湯即四物加柴胡丹皮山梔

腎不能生用六味丸膀胱氣滯羌活勝濕湯腰痛  
大抵肝火旺則肝血虛而筋燥頸項強急或腰背反  
張或四肢攣拳或頸項等處結核一婦人耳內或  
耳後項側作痛寒熱口苦月經不調此肝膽經火兼  
傷脾胃用四君加柴胡升麻黃芪芍藥而愈後因勞  
役怒氣嘔吐脇脹用六君子湯加山梔柴胡而安  
一婦人因怒寒熱作渴左目緊小頭頸動掉四肢抽  
搐遍身疼痛此血虛肝熱則生風也用加味道遙加  
釣藤鉤數劑諸證漸愈又用八珍湯而痊  
追風散治年深日近偏正頭疼又治肝臟久虛血

氣衰弱，風毒之氣上攻頭痛，頭眩，心忪煩熱，百節痠疼，腦昏目痛，鼻塞聲重，項背拘急，皮膚瘙痒，面上遊風，狀若蟲行，及一切頭風，兼療婦人血風攻症，頭目昏痛，皆治之。

川烏

炮去皮臍

防風

去蘆

石膏

煅

川芎

甘草

荆芥穗

炙

白僵蠶

炒去絲各一兩

天南星

炮

羌活

全蝎

去尾針

地龍

炙

白附子

炮

沒藥

研

乳香

研

草烏頭

炮去皮臍

右為細末，每服半錢，入好茶少許，同調食後，及臨卧服。常服清頭目，利咽膈，消風化痰。

急風散

草烏頭

參兩半，內蘸令冷，餘半生用

丹砂

另研，水飛

黑豆

貳錢伍分同草烏，十處為末

麝香

另研

右為細末，入研藥，勻停酒，調塗痛處。

蝎附散 治一切風邪，頭痛，夾腦風，瘡，癰，盛，嘔逆，惡心，口吐清水，暗風，旋暈，眼見黑花，牙關緊急，口眼喎斜，面目瞞動，頭項拘急，肩背引疼，耳痒，目晝，四肢麻木，及沐浴出，暴感風邪，頭目昏痛，兩太陽。

疼遠年頭風服諸藥無効並皆治之

全蝎炮

雄黄水飛

硃砂水飛

附子炮去皮臍

川烏頭炮去皮臍

白僵蠶炒各

天南星薑製

防風去蘆

白僵蠶炒去節

藁本去蘆土

白芷各半兩

右爲細末每服半錢葱茶調下食後孕婦不可服  
京城之醫用此藥兼嚼如聖餅子治眼羞明多  
淚見物不明有効一方用白附子蝎稍

木瓜煎

宣州木瓜

貳枚切頭作

沒藥貳兩

乳香貳錢半另研

右二味入木瓜中用蓋子合了竹簽定之飯上蒸  
三四次爛研成膏子每服三匙生地黃汁半盞無  
灰好酒二盞調和服之有人患此病自午後發  
黃昏時定予曰此患必先從足起經言十二經絡  
各有筋惟足下少陰之筋自足至頭大抵筋者肝  
之合也日中至黃昏天之陽陽中之陰也又曰陽  
中之陰肺也自離至兌陰旺陽之時故靈寶祕  
法云離至乾腎氣絕而肝氣弱肝腎一臟受陰氣  
故發於是時予授此方三服而愈

餘證治論方俱詳、雜病本門

史人無謂也。其無子者，則其妻之子也。故曰：「無子者，有子也。」  
今也吾曰：「我生子也。」是吾之子也。故曰：「我生子也。」又曰：「  
吾無子也。」是吾之子也。故曰：「吾無子也。」

兩脇脹痛

大夫婦人兩脇脹痛者由臟腑虛弱氣血不周風冷之氣客於腸胃傷於胞絡之間與血氣相搏壅塞不宣邪正交爭衝擊故令兩脇脹痛也薛東垣先生云胸脇作痛口苦舌乾寒熱往來發嘔發吐四肢滿悶淋洩便難腹中急痛此肝木之妄行也竊謂前證若暴怒傷血用小柴胡芎歸山梔氣虛用四物參术柴梔若久怒傷氣用六君芎歸山梔若氣血俱虛用六味地黃丸若經行腹痛寒熱晡熱或月經不調發熱痰咳少食嗜卧體痛用八珍柴胡丹皮若脇脹發

熱口渴唾痰或小便淋瀝頸項結核或盜汗便血諸  
血失音用六味丸若兩脇作脹視物不明或筋脉拘  
急面色青小腹痛或小便不調用補肝散若柴用香  
燥之劑反傷清和之氣則血無所生諸證作焉丹溪  
先生云右脇痛用推氣散小龍薈丸當歸龍薈丸控  
涎丹抑青丸十聚湯皆病氣元氣俱實之劑用者審  
之一婦人性急吐血發熱兩脇脹痛日晡益甚此  
怒氣傷肝氣血俱虛也朝用逍遙散倍加炒黑山梔  
黃蘖貝母桔梗麥門冬爻以歸脾湯送地黃丸而愈  
一婦婦內熱晡熱肢體痠麻不時吐痰或用清氣

化瘀藥喉間不利白帶腹脹用行氣散血藥胸痛不  
利肢體時麻此鬱怒傷肝脾而藥益甚也予則朝用  
歸脾湯以解脾鬱生脾氣夕用加味逍遙散以清肝  
火生肝血百餘劑而愈後因怒飲食日少肢體時麻  
此乃肝火侮土用補中益氣加山梔茯苓半夏而痊  
又飲食失調兼有怒氣肢體麻甚月經如注脉浮洪  
而數此脾受肝傷不能統血而致崩肝氣虧損陰血  
而脉大繼用六君如等歸炮薑而血崩止又用補中  
益氣加炮薑茯苓半夏而元氣復更用歸脾湯逍遙  
散調理而康

靈寶散 治婦人血氣攻刺癰疽兩脇

丁香

木香

乳香

玄胡索

當歸

白芍藥各等分

草豆蔻散

治婦人脾胃虛氣攻兩脇脹痛

草豆蔻

诃子肉各一兩

桂心

苦梗

厚朴各三分

甘艸壹分

川芎

當歸

乾薑

右爲細末，每服貳錢水壹盞煎，去滓食前服。

右爲粗末，每服肆錢水壹盞煎，去滓食前服。

服

卷藺子散

治婦人臟腑虛冷宿冷氣攻兩脇脹痛

坐卧不安

當歸

桃仁

入卷藺子

延胡索

桂心各一兩

赤芍藥

木香

沒藥各半兩

右爲末，每服貳錢溫酒調下。

人參紫金丸

治婦人榮衛不和，心腹刺痛，胸膈脹滿，不運飲食

紫金皮

蒼术

石菖蒲各一兩

香附子

貳兩

人參

半兩

木香

參錢

氣針丸

右爲末米糊丸如梧子大食後薑湯吞下參拾丸

治久積風壅踈利氣滯空胸膈止刺痛

木香

青皮

去白

大黃

炮

檳榔

各壹兩

黑牽牛

生半炒

右爲末煉蜜丸如梧子大溫水下參拾丸  
鄧安人年五十忽然氣痛投神保丸愈不一月再痛  
再服神保丸六七十粒大腑不通其疾轉甚亦有  
要用沉香木香薑桂芍藥而未敢投痛甚則築心  
築背築之兩脇似有兩柴十字挿定心脇叫聲徹

天召子診之六脉沉伏乍來乍去衆問何如子曰  
夫九痛之脉亦可準也但以證辨用藥觀其人質  
肥偉問其太腑數日不通余曰實痛也其不必服  
但以火按之痛甚手不可向邇此太實也經云太  
滿太實者可下之用氣針丸伍陸百粒是晚愈  
又已未在金陵有家提幹巽內人病心脇脹痛衆  
醫投木香沉香檳榔大腹芍藥薑桂之類益甚召  
子診之六脉弦緊而和不似病脉但診之時兩手  
如火以此知其實痛也衆問如何治療僕曰大凡  
心腹刺痛不可便作虛冷治之有一醫答曰非令

即何熱，即生風，冷生氣是也。子曰：不然。難經云：虛則痒，實則痛。又仲景云：腹痛者，桂枝加大黃湯痛甚者，桂枝加大黃湯，提幹曰荆布素弱。子曰：有可辨處，遇痛時，使一婢按之，若痛止，是虛寒證也。按乏轉甚者，不可近此實痛也。即令婢按之，手不可近。叫呼異常者，曰此實熱無可疑者，當用大柴胡湯治之。衆不從子責狀，而投之八服愈。

論：脇肋痛服木通散，亦可治男子。

心下脇肋少腹疼痛，皆素有積寒而溫暖，湯散亦可主治。甚者以溫藥下之心下與小腹痛，諸善並有效。

方而脇肋下痛鮮獲治法此。

木通散 治脇肋苦痛偏効。併心下脇肋并少腹牽引痛者，皆主之。

木通

去皮

青皮

去白

川棟子

去皮核，各壹兩

蘿蔔子

炒

木香

舶上懷香

壹兩炒

滑石

兩各半

右爲細末，煎葱白酒調，參錢一服，愈。甚者不過再服。

三碗散 治中焦虛痞，兩脇氣痛，面目手足浮腫，大

西用川雅  
便秘瀉兼治脚氣

大腹皮

紫蘇

沉香

乾木瓜

獨活各壹兩

白术

川芎

木香

甘草

陳皮

檳榔各叁分

木香

右㕮咀每服參錢水壹盞煎至半分去滓空心熱服日中再服。戊午秋在京城有一婦人中焦虛痞腹膨脹痛大便秘結不脈虛弱諸醫服藥無效予投此藥不終劑而愈。

補遺局方青木香丸沉香降氣湯小烏沉湯四磨湯

皆可用

薛左金丸

名四  
金丸

治肝火胸脇脹痛或發寒熱或頭

目作痛或大便不實或小便淋秘或小腹疼痛及

一切肝火之證

黃連

炒陸兩

吳茱萸壹兩湯者  
片時用

右爲末粥丸

白朮陳皮湯下

當歸龍脅丸治肝經實火胸脇脹痛或大便秘結

小便澀滯凡屬肝經實火皆宜用之

當歸

炒

龍膽艸炒焦

梔子仁炒

黃連

炒

黃芩炒各壹兩

大黃炒

薑薑

麝香另研伍分

青黛各伍錢

木香貳錢半

右爲末用神麴糊丸桐子大每服貳拾丸薑湯下  
補肝散 治肝腎二經氣血虧損脇脹作痛或脇脹  
頭暈寒熱發熱或遍身作痛經候不調

山茱萸肉

當歸

五味子炒杵

山藥

黃芪炒

川芎

木瓜

各半兩

熟地黃自製

白朮

炒各壹錢

獨活

酥棗仁炒各肆兩

右爲末每服五錢棗水煎服

腰痛

藥隱老人論曰夫腎主於腰女人腎藏繫於胞絡若  
腎氣虛弱外感六淫內傷七情皆致腰痛古方亦有  
五種之說如風腰痛宜小續命湯加桃仁杜仲煎服  
脾胃氣痞及寒濕腰痛宜五積散雜病中寒加桃仁如虛  
損及五種腰痛服青娥丸雜病腰痛神應丸全上皆可用  
也如氣滯腰痛服如神湯必効 薛陳無擇先生云  
若形體虛羸面色黧黑腿足痿軟不能行立此失志  
所爲也腹急脇脹目視睞睞宗筋弛縱白淫下注此  
鬱結所爲也肌肉不仁飲食不化腸胃脹滿閉塞腰

脇此憂思所爲也皆屬內若腰冷作痛身重不渴小便自利飲食如故因勞汗出腰悽脇痛或墜墮血滯或房勞精竭皆屬不内外因也竊謂前證失志腎虛熱者六味丸雜病虛勞腎虛寒者八味丸雜病虛勞鬱怒傷肝實用龍膽瀉肝湯雜病淋虛用六味丸補肝散雜病腰痛憂慮傷脾者歸脾湯雜病健忘逍遙散經調腎着者寒則附湯雜病陽濕虛則腎着湯全上腰痛腰勝痛者寄生湯養腎散雜病腰痛瘀血帶者如神湯舒筋散房勞腰痛者青娥丸十補丸見前虛勞一婦人腰痛三年矣每痛必面青頭暉目緊余以爲肝脾氣虛用補肝散而愈三年後因

勞役患頭痛兼惡心用補中益氣湯一方有杜仲無當歸加茯苓半夏蔓荆子而愈一婦人苦腰痛數年不愈余用白朮一味大劑服不三月而痊乃胃氣虛閉之證故用白朮也

如神湯治男子婦人氣虛腰痛杜仲無當歸

玄胡索

當歸

去蘆

桂心

等分

右爲細末每服參錢溫酒調下甚者不過數服獨活寄生湯夫腰痛者皆由腎氣虛弱臥冷濕地當風所得不時速治喜流入脚膝爲偏枯冷痺緩弱疼重或腰痛拘攣脚膝重痺宜急服之

獨活參兩

桑寄生

續斷

杜仲

炒去絲

北細辛

川牛膝

秦艽

茯苓

白芍藥

桂心

川芎

防風

人參

熟地黃

當歸

各貳兩

試右㕮咀每服參錢水壹錢煎至七分去滓溫服空心氣虛下利除地黃并治新產腹痛不得轉動及腰脚掣痛彌弱不得屈伸此藥最能除風消血肘後有附子故無寄生人參當歸粉草近人將治歷節風腳氣流注亦効

舒筋散 治腰痛神效

桂枝亦良

玄胡索炒

杜仲薑汁炒

官桂

去粗皮


羌活

芍藥各等分

右爲末酒調下貳錢

又方 猪核炒香研酒去粗下青木香丸方見

又方 天羅布瓜子仁炒焦擂酒熱服留查炒熟封痛處效



腰痛

女科一

腰痛

夫腰主於腰脚，女人腎臟繫於胞絡。若勞傷腎氣虛弱，而風冷客於胞絡，邪氣與真氣交爭，故令腰脚疼痛也。治當以補元氣為主，佐以祛邪之劑。

薛前證  
若真陽衰敗，寒邪乘襲，手足俱冷，頭痛惡寒或嘔吐腹痛等證，宜用本方。若氣血虛弱，寒邪所感，惡寒發熱，頭痛作渴，或嘔吐腹痛等證，宜用五積散。雜病中寒  
若

元氣虛弱，濕熱所傷，兩脰腫痛，寒熱身疼，或嘔吐不食等證，宜用瀉蘇敗毒散。雜病傷濕  
若脾胃虛弱，元氣下陷，寒熱嘔吐，發熱頭痛，喘渴體倦等證，宜用補中益

氣湯，雜病傷勞倦。若足三陰精血虧損，陰火內動，內熱晡熱作渴，痰甚，小便頻數等證，宜用六味地黃丸，雜病虛勞。若足三陰陽氣虛敗，惡寒發熱手足俱冷，吐痰不食，二便滑數等證，宜用八味地黃丸，雜病虛勞。一婦人先腰膝作痛，後兩腿亦痛，余以爲足三陰虛寒外邪所傷，用小續命湯及獨活寄生湯，或作或止，所用飲食極熟，腹中方快，余曰邪氣去而元氣虛寒也，診其脉，果沉細，用養腎散，本條漸愈，又用十補丸，虛勞而瘓，一婦人所患同前，但發熱作渴，喜冷飲食，脈洪數按之遲濶，余以爲血虛有熱，用羚羊角散，身體去病，竊之遲濶，余以爲血虛有熱，用羚羊角散，身體去病。

柳加白朮茯苓數劑，更用加味逍遙散，結而瘥。一婦人患前證時，或腿膝作痛，脉浮數，按之遲緩，此元氣虛而風濕所乘，用獨活寄生湯，頓愈，又用八珍湯而安。一婦人因怒患前證，寒熱往來口苦，不食，晡熱內熱，余以爲肝火血虛，先用小柴胡湯，加山梔，頓愈，又用加味逍遙散，而瘳。一婦人患前證，寒熱頭痛殊類傷寒，此寒邪之證，用檳蘇敗毒散，而安，又用補中益氣調補，而愈。

虎骨丸 治婦人血風攻注，腰脚骨節疼痛，不可忍，酥炙 虎胫骨 酥炙 敗龜 酥炙 檳榔

牛膝酒浸各  
青兩

當歸去蘆炒  
各一

川大黃炒  
各一

木香

桃仁浸炒  
各半兩

海桐皮錢半  
各一

防風去蘆根  
各一

附子炮去  
皮臍各半兩

赤芍藥

桂心

血竭

沒藥另研  
各一

地龍去土炒  
各半兩

右爲細末煉蜜和搗三五百下丸如梧桐子大每服參拾丸空心食前溫酒不日貳服

仙靈脾散

治婦人血風攻注腰脚疼痛

仙靈脾

桃仁炒  
數粒

檳榔各一  
半兩

羌活去蘆根  
各一

海桐皮

牛膝酒浸各  
一

當歸去蘆炒  
各一

芎菊

骨碎補

玄胡索

桂心

枳殼去瓤  
炒

木香

菴藺子各一  
錢半

蜘蛛炒  
半兩

麝香另研  
錢半

右爲細末每服貳錢食前用豆淋酒調下日進二十服

藁本散 治婦人血風流注腰脚疼痛不可忍

藁本去蘆根  
半兩

狗脊

天麻

骨碎補

桂心

沒藥另研  
各一

血竭研  
各一

蟬殼微炒  
各一

虎脛骨醋炙  
各一

敗龜醋炙

穿山甲各貳兩 醋炙

麝香半兩 另研

右爲細末入麝香拌勻每服貳錢生薑豆淋酒調下空心食前日二服

敗龜散 治婦人風毒流注腰脚疼痛行步艱難

敗龜酥炙

虎脰骨酥炙 各貳兩

白僵蠶炒

薏苡仁炒去殼

當歸去蘆半兩

杜仲剉炒去絲各貳兩

地龍炒去土另研

桂心桂半兩

乳香另研各貳錢半

沒藥另研半兩

右爲細末每服貳錢食前溫薄荷酒調下

骨碎補散 治婦人血風氣攻腰脚疼痛腹脇拘急

並宜服之

骨碎補炒

草薢酒浸

牛膝酒浸

桃仁薌炒

海桐皮

當歸去蘆半兩

桂心

檳榔各壹兩

赤芍藥

附子炮去皮臍

川芎各半錢

枳殼半兩 薌炒去穰

右爲咬咀每服五錢水一大盞半生薑參片棗壹枚煎至一大盞去滓溫服

附子散 治婦人腰脚積年疼痛不瘥

附子炮去皮臍

桂心

沒藥另研

威靈仙

乾漆炒去煙

牛膝酒浸

各壹兩

右爲細末每服貳錢溫酒調下食前日進二服  
養腎散 治腎經虛弱風寒所侵以致腰脚疼痛不

能步履

蒼朮

壹兩

乾蝎

叁錢

天麻

草烏頭

炮去皮尖

黑附子

炮去皮臍各貳錢

右爲末每服壹錢酒調服麻痺少時隨愈孕婦勿  
服此治風寒傷腎膀胱虛寒之良藥用之得宜殊  
有神効

臂痛

夫婦人臂痛筋脉攣急不得屈伸遇寒則劇由肝  
虛爲風寒邪氣流於血脉客於經絡搏於筋筋不禁  
則乾急而痛其脉緊細宜服柏子仁丸舒筋湯若臂  
痛不能舉或左或右時復轉移一臂由中腕伏痰脾  
氣滯而不行上與氣相搏四肢皆屬於脾脾氣滯而  
氣不下上攻於臂故痛其脉沉細宜茯苓丸控涎丹  
薛前證若肝血虛用加味逍遙散中氣虛用補中  
益氣湯血氣俱虛用入珍湯風熱血燥用秦艽地黃  
湯脾腎虛寒用柏子仁丸脾胃實熱用茯苓丸水不

能生末用六味丸逍遙散怒動肝火用小柴胡加川芎當歸眩暈晡熱用四物柴梔丹皮晡熱月經不調用加味逍遙散食少體倦無寐盜汗用加味歸脾湯先太宜人偏身作痛筋骨尤甚不能屈伸口乾目赤頭眩痰壅胸膈不利小便赤短夜間殊甚遍身作痒如蟲行此屬肝腎氣虛而熱也用六味地黃丸料加山梔柴胡而愈

柏子仁丸

指迷

柏子仁

乾地黃

各貳兩去根切自製

茯苓

枳殼

去穰炒

覆盆子

炒

北五味子

杵炒

附子

炮

石斛

酒蒸炒去根切

鹿茸

酥炙

酥棗仁

炒

桂心

沉香

黃芪

蜜水炙各壹兩一方云等分

丸

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大空心酒下參拾

丸

舒筋湯

治臂痛又名五痺湯亦治腰下疾

片子菖黃

肆兩甘草

羌活

各壹兩

白术

中

海桐皮

當歸

赤芍藥

各貳兩

右爲粗末每服參錢水一盞半煎七分去滓溫服

如腰以下疾空心服腰以上疾食後服

茯苓丸 治臂痛不能舉手或左或右時復轉移由  
伏痰在內中脘停滯脾氣不行上與氣搏四肢屬  
脾脾滯而氣不升故上行攻臂其脉沉細者是也  
後人謂此臂痛乃痰證也用以治痰無不効者予  
嘗以此藥治人隨服隨愈世所謂療藥多矣未有  
立効如茯苓丸速也

茯苓

壹兩

半夏

貳兩

枳殼

半兩去  
穢炒

風化朴硝

半兩

右爲末薑汁煮糊丸如梧子大生薑湯下貳拾丸

食後服

控涎丹 凡人忽患冒背手足頸項腰胯隱痛不可  
忍連筋骨牽引釣痛坐卧不寧時時走易不定俗  
醫不曉謂之走症便用藥及針灸皆無益又疑是  
風毒結聚欲爲癰疽亂以藥貼亦非也此乃痰涎  
伏在心膈上下變爲此疾或令人頭痛不可舉或  
神意昏倦多睡或飲食無味痰唾稠粘夜間喉中  
如鋸聲多流唾涎手腳重腿冷脾氣脈不通誤認  
爲癰瘍亦非也凡有此疾但以此藥不過數服卽  
愈

甘遂去心

大戟去皮

真白芥子炒各等分

右爲細末糊丸如梧桐子大臨卧淡薑湯下五七丸如疾猛再加至十九丸

白芥子散 治臂痛牽引背胛或輶或作由榮衛循行失度痰滯經絡或似癰瘍

真白芥子

木鼈子各參兩數炒

沒藥另研

桂心

木香各半兩

右爲末每服壹錢溫酒下 愚按前三方脾氣虛弱者必佐以六君子湯中氣虛弱者必佐以補中益氣湯氣血虛者必佐以八珍湯脾氣鬱滯者必

佐以歸脾湯肝經怒氣者必佐以逍遙散若專用前方治之胃氣益虛病氣益甚不可不謹  
流氣飲 治七情氣滯胸膈悶痞咽喉不利嘔喘而浮二便不調或氣攻肩背脇肋作痛或脚氣喘急腹脹便閉元氣充實者宜用此藥慎之

紫蘇葉

黃芪炒

青皮去白

芍藥炒

桔梗

烏藥

當歸

半夏薑製

陳皮各半錢

防風各伍錢

川芎

桔梗

枳實麸炒

木香各貳錢伍分

甘草炙壹兩貳錢半

大腹子

薑製  
壹兩

右每服半兩，薑棗水煎服。

四物湯 治血滯中風，血虛手足不遂。

如臂痛加紅花煎。

交加散加木瓜牛膝治冷癥，肩臂作痛，卽人參敗毒和五積散。

烏藥順氣散 加羌活木瓜治外邪氣滯，筋骨作痛或

痰氣不利。方見雜病中氣

秦艽地黃湯 治肝膽經風熱，血燥，肩臂疼痛或筋脉引急，或時牽痛，其內證發熱或寒熱，晡熱，月經

不調或肢體酸痛等證。

秦艽

熟地黃自製

當歸各壹錢

川芎

芍藥

茯苓各壹錢

牡丹皮

釣藤鈎壹錢


白术

甘草伍分

柴胡

參草各各

右水煎服。



## 卷之三

白朱

川芎

桂枝

芍藥

甘草

大棗

半夏

桔梗

杏仁

白芍

甘草

大棗

桔梗

杏仁

白芍

甘草

大棗

陳臨川云。凡頭痛身熱肢節痛。大使秘。或嘔逆而脚屈弱者。脚氣也。輕者可與香蘇散加木瓜。檳榔。生薑。煎服。然後隨證治之。要知有脚氣之人。先從脚起。或先緩弱疼痛。或行起忽倒。或兩脰腫滿。或脚膝枯細。或心中忪悸。或小腹不仁。皮頑不知疼痛。或舉體轉筋。或見食嘔逆。惡聞食氣。或脅滿氣急。或遍體酸痛。皆脚氣之候。黃帝所謂緩風濕痺是也。頑弱為緩風。疼痛為濕痺。寒中三陽所患必冷。小續命湯主之。成前  
入生薑白然此最妙

桂一半主之大煩躁者紫雪最良若無紫雪以自合薄荷煎冷水調服極妙太便祕者脾約丸麻仁丸三和散主之仍針灸為佳服補藥與湯淋洗皆醫家之大禁也夫婦人脚氣與丈夫不同男子則腎臟虛弱為風濕所乘女子以胞絡氣虛為風毒所搏是以胞絡屬於腎也腎主於腰脚又肝脾腎三臟經絡起於足十趾若臟腑虛損則風邪先客於脚從下而上動於氣故名脚氣也此皆由體虛或當風取涼或久坐卑濕或產後勞損或恚怒悲傷則心氣不足致月候不通因其虛傷風毒傳入筋骨則令皮膚不仁

筋骨疼痛肢體不隨筋脉拘攣或時冷疼或發腫滿或兩脚痺弱或舉體轉筋目眩心煩見食嘔吐精神昏憊肢節煩疼小便赤黃大便祕澀如此證候其婦人脚氣療之與丈夫不同以其氣血不調胎姪產損傷之是以療寡婦及尼與妻妾殊別卽其義也

薩嚴用和先生云前證初患不覺因他病乃發先從脚起或緩弱痺痛不能行履或兩脛腫滿或足膝細小或心中怔忡或小腹不仁或舉體轉筋或見食作嘔或胸滿氣急偏體酸痛其脈浮而弦者因於風濡而弱者因於濕洪而數者因於熱遲而濶者因於寒男

子由於腎氣虧損，女子血海虛弱，七情所致，竊謂前證若足三陰虛弱，用還少丹，雜病虛勞若脾氣虛寒，用八味丸，雜病虛勞若飲食停滯，臀腿瘦脹浮腫，作痛，此脾氣下陷，用六君子，雜病虛勞少加柴胡升麻，不應須用八味丸，若發熱口渴，月經不調，兩腿無力，此足三陰血虛火燥，用六味丸，兼服前證，西方之人多患之，因素食乳酪，脾胃壅滯，脛足腫滿，至於南方亦有因膏粱厚味，濕熱下注，而患者，故古人謂之壅疾，所用之方多疎通發散之劑，然感於房勞過度，虧損三陰，治法又當以固本為主，故六物附子為元氣虛寒。

邪內侵之聖藥

大腹皮散 治婦人風毒脚氣，肢節煩疼，心神昏悶，並宜服之

大腹皮

桑白皮

木通

去皮

羌活

去蘆

赤芍藥

荆芥

獨活

去蘆

青橘皮

去白

乾木瓜

各壹兩

枳殼

去瓤炒

紫蘇葉

各貳兩

右㕮咀，每服八錢水，壹中盞半，生薑五片，葱白七寸，煎至壹大盞，去滓，食前溫服。

紫蘇飲 治婦人風毒脚氣，心腹痞塞，痰飲停積，不

思飲食脚重虛腫

紫蘇葉

木通去皮

茴香

桑根白皮各壹兩

獨活去蘆

羌活去蘆

乾木瓜

青橘皮去白

甘草炙各半兩

大腹皮半兩

枳殼去瓤炒貳兩

荆芥半兩

右㕮咀每服八錢水一大盞半生薑五片連鬚薑白壹莖煎至一大盞去滓溫服不拘時日進二服四白散治男子婦人血虛發熱夜多盜汗不進飲食四肢羸瘦筋脈拘攣脚痛不能行立

黃芪去蘆

厚朴薑製

益智仁

陳皮去白

藿香

白扁豆

白术去蘆各壹兩

白茯苓去皮

白豆蔻仁

人參去蘆

甘草炙

天台烏藥各半兩

芍藥壹兩半

檀香

沉香各貳錢半

右爲細末每服參錢水壹盞生薑參片棗子壹枚煎至七分和溫服日進二服諸證減退只有脚攀痛不能行服蒼朮丸治之

蒼朮丸 大治乾濕脚氣筋脉拘攣疼痛不能行履

兼補下部

乳香另研

沒藥各貳錢另研

川牛膝酒浸

青鹽各半兩  
研

川烏頭全錢炮  
去皮臍

熟芩肆錢米搘  
過研末

全蝎壹錢  
炒研

右件爲細末入研藥令勻用大木瓜壹枚切丁頭留作蓋去穰入上件藥於木瓜內將蓋簽定安於黑豆中蒸令極爛取出去皮連藥研成膏却入生蒼朮末不以多少拌令得所丸如梧桐子大每服五十丸空心用木瓜湯下或溫鹽酒亦得日進三服忌血與蒜

餘證方論並詳雜病本門

癰瘍癰疔

大夫婦人體虛爲風邪氣客於皮膚復傷風寒所以則發風瘡癰疔若赤疹者由寒濕客於肌中極熱熱結則成赤疹也得大熱則發取冷則瘥也白疹者由風氣客於肌中熱熱與風相搏則成白疹也得天陰雨寒則發出風傷亦發得晴煖則減著衣煖亦瘥脉浮而洪浮卽爲風洪則爲氣風氣相搏則生癰瘍身體瘡疔凡人汗出不可當風露日及浴後出早使人身振寒熱以生風疹也藥隱老人云治婦人遍身時發瘡疔或赤腫癰疔五心煩熱血風攻疰與人參

當歸散或逍遙散兼服導赤丸如不通者食後服皂角丸氣虛老人不可久服如服皂角丸不退者此凝滯熱甚者宜先服青木香丸三兩服以開氣道服蒺藜散立効。薛前證有身熱尤痞或如丹毒痒痛非常或膿水淋漓發熱煩渴或頭目昏眩日晡益甚或寒熱發熱月經不調皆肝經風熱血燥用加味逍遙散謂經爲主佐以四君芎歸若忿怒身發疮瘡痛痒寒熱乃肝火血燥用加味小柴胡湯熱入血室氣血俱虛用八珍加柴胡牡丹皮若夜間發熱作渴譫語乃熱入

血室用小柴胡湯加生地黃血虛四物合小柴胡後用加味逍遙散調理若鬱結食少體倦內熱晡熱乃脾經血燥用加味歸脾湯寒熱加山梔熟地黃若遊走癰瘍乃血風走注用何首烏散血虛逍遙散風熱消風散若專用風藥復傷陰血必致筋攣等證。一婦人身發疙瘩或如丹毒痒痛不常搔碎成瘡膿水淋漓發熱煩渴頭目眩暉日晡益甚此血虛內熱之證也以當歸飲加柴胡山梔仁治之而愈。一婦人患前證肢體疼痛頭目不清自汗盜汗月水不調肚腹作痛食少倦怠先用人參荆芥散後用逍遙散治

卷之二

女科

百病

之而痊

一婦人因忿怒身發疙瘩，憎寒發熱，余謂

肝火用小柴胡湯加山梔黃連治之而愈。後口苦脇痛，小便淋漓，復用前藥全愈。

一婦人患前證，發熱夜間譫語，此血分有熱，以小柴胡湯加生地黃治之而安。後用四物加柴胡山梔丹皮而熱退。又用逍遙散全愈。一室女年十四歲，天癸未至，身發赤斑，痒痛，左關脉弦數，此因肝火血熱，以小柴胡湯加山梔生地黃牡丹皮治之而愈。若因怒而致者，又當治以前藥。

何首烏散 治婦人血風皮膚瘙痒，心神煩悶，及血

風逆走不定，並宜服之。

何首烏

防風

白蒺藜

枳殼

天麻

殭蠶

胡麻

茺蔚子

蔓荆子各等分

蒺藜散

右爲細末，每服貳錢，煎茵陳湯調下，無時。

蒺藜散 治婦人風癩皮膚中如蟲行，及生癰疹搔

之作瘡，面腫心煩，並宜服之。

白蒺藜炒

莽艸炒

麝羊角屑各半錢

黃芩

人參去蘆

苦參去蘆

蛇床子

秦艽去蘆

防風去蘆

麻黃去節

當歸炒去蘆

甘草炙

枳殼辦炒去瓢

細草去苗半兩

右㕮咀每服五錢水壹中盞半煎至壹大盞去滓溫服不拘時日進二十服

治婦人風庠癰疹不差

蒼耳花葉子各等分

治癰疹

右爲細末每服貳錢豆淋酒調下不拘時候日進二服

治皮膚有風熱遍身生癰疹

牛蒡子

水黃壹兩淨  
晒乾炒令香

浮萍蒸過焙乾等分

右爲細末每服貳錢薄荷湯調下日二十服

又治風氣客於皮膚搔之不已

蟬蛻洗

大葉薄荷

右等分爲細末每服貳參錢溫酒調下無時

又方

露蜂房

洗過密火令焦蛇蛻各等分

右爲細末每服壹貳錢溫酒調下不拘時

治婦人風庠癰疹身痒不止宜用淋漬方

卷之三

馬蘭

茺蔚子

白礬

白蒺藜

茵芋

羊桃根

凌霄花

各貳兩

蒴藋根

草麻葉

各壹兩

右咬咀以水貳斗煮取壹斗去粗於避風處洗之

又方

凌霄花

參三兩

蒴藋根


半斤

右件藥以水七升煮取參升濾去滓入白礬末貳兩攬均以綿瀆頻拭於疹上後煮槐柳湯浴之

又方

以醋漿水磨白礬塗之

女科證治準繩卷之二



Kitasato Memorial Medical Library