


鍼灸甲乙經

二

S 95

F
シ-159

Kitasato Memorial Medical Library



492.9
Sh-2
2

No 3603
18.5.93



2749

筋肉筋膜之解剖學

鍼灸甲乙經卷之二目錄

十二經脈絡脈支別上下

奇經八脈


脉度

十二經標本

經脈根結

經筋

骨度腸度腸胃所受



492.9
Sh-2
2

No 3603
18.5.93



富士川文庫

2749

鍼灸甲乙經卷之二目錄

十二經脈絡脈支別上下

奇經八脈

脈度

十二經標本

經脈根結

經筋

骨度腸度腸胃所受

新編醫學全集


Kitasato Memorial Medical Library



倘有餘力則以字文

Kitasato Memorial Medical Library





鍼灸甲乙經卷之二

十二經脈絡脈支別第一

上

雷公問曰禁脉之言凡刺之理經脈爲始願聞其道
黃帝答曰經脈者所以決死生處百病調虛實不可
不通也

肺手太陰之脈起於中焦下絡大腸還循胃口上膈
屬肺從肺系橫出腋下下循臑內行少陰心主之前
下肘中循臂內上骨下廉入寸口上魚循魚際出大
指之端其支者從腕後直出次指內廉出其端是動
則病肺脹滿膨脹然而喘咳缺盆中痛甚則交兩手
而脅音務又是謂璧厥是主肺所生病者咳上氣喘
喝煩心胷滿膿音臂內前廉痛厥掌中熱氣盛有餘

則肩背痛。風寒汗出中風小便數而欠氣虛則肩背
痛寒少氣不足以息。溺色變一云卒遺失無變爲此諸病凡
十經之病盛則寫之虛則補之熱則疾之寒則留
之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者則寸口大
三倍於人迎虛者則寸口反大於人迎也

太陽手陽明之脉起於太指次指之端外側循指上
廉出合骨兩骨之間上入兩筋之中循臂上廉入肘
外廉上循臑外廉上肩出髃骨之前廉上出桂骨
之會上一下入缺盆絡肺下鬲屬太陽其支者從缺盆
直上至頸貫頰下入齒中還出俠口交人中左之右
右之左上俠鼻孔是動則病齒痛頰腫是主津液所
生病者目菀口乾魄音齶齶喉痺肩前膿痛者太指次

指痛不用氣盛有餘則當脉所過者熱腫虛則寒慄
不復爲此諸病盛者則人迎大三倍於寸口虛者則
人迎反小於寸口也

胃足陽明之脉起於鼻交頰中傍約太陽之脉下循
鼻外上入齒中還出俠口環唇下交承漿却循順後
下廉出太迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額
顱其支者從太迎前下人迎循喉嚨入缺盆下鬲屬
胃絡脾其直者從缺盆下乳內廉下俠脅入氣街中
其支者起于胃口下循腹裏下至氣街中而合以下
髀關抵伏兔下入膝腋中下循脇外廉下足跗入中
指內間其支者下膝三寸而別以下入中指外間其
支者別跗上入大指間出其端是動則病淒淒然振

寒善伸數欠顏黑病至則惡人與火聞木音則惕然驚心欲動獨閉戶塞牖而處甚則欲上高而歌棄衣而走竚響腹脹是爲臂肝一作臂厥是主血所生病者狂瘥瘥一作瘡溫溼汗出軌駁口渴脣緊頸腫喉痺大腹水腫膝膿腫痛循膺乳氣街股伏兎脇外廉足跗上皆痛中指不用氣盛則身以前皆熱其有餘于胃則消穀善饑溺色黃氣不足則身以前皆寒慄胃中寒則脹滿爲此諸病盛者人迎大三倍于寸口虛者人迎反小寸口也

脾足太陰之脉起於大指之端循指內側白肉際過核骨後上內踝前廉上腨內循胫骨後交出厥陰之前上循膝股內前廉入腹屬脾絡胃上鬲夾咽連舌

本散舌下其支者復從胃別上鬲注心中是動則病舌本強食則嘔胃脘痛腹脹善噫得後與氣則快然而衰身體皆重是主脾所生病者舌本痛體不能動搖食不下煩心心下急寒瘥溏瘕泄水閉黃疸不能食唇青強立股膝內腫痛厥足太指不用爲此諸病盛者則寸口大三倍於人迎虛者則寸口反小於人迎也

心少陰之脉起于心中出屬心系下鬲絡小腸其支者從心系上俠咽繫目系一本作循其直者復從心系却上肺上出腋下下循臑內後廉循太陰心主之後下肘中內廉循臂內後廉抵掌後兌骨之端入掌內後廉循小指內出其端是動則病溢乾心痛渴而

欲飲是爲臂厥。是主心所生病者。目黃。脇滿痛。臑臂內後廉痛。厥掌中熱痛爲此。諸病盛者。則寸口大。再倍于人迎。虛者。則寸口反小於人迎也。

小腸手太陽之脉。起于小指之端。循手外側。上腕出踝中。直上循臂骨下廉。出肘內側兩骨之間。上循臑外。後廉出肩解。繞肩胛。交肩上入缺盆。向腋下絡心。循咽下鬲抵胃。屬小腸。其支者。從缺盆循頸上頰至目銳。背却入耳中。其支者。別頰上頭。拙抵鼻至目內。臑似折。是主液所生病者。耳聾。目黃。頰腫。不可以顧。肩似拔。肘臂外後廉痛爲此。諸病盛者。則人迎大。再倍於寸口。虛者。則人迎反小於寸口也。

膀胱足太陽之脉。起于目內眞。上額交顴。其支者。從顴至耳上角。其直者。從顴入絡腦。還出別下項。循肩膊內。挾脊抵腰中。入循膂。絡腎。屬膀胱。其支者。從腰中下會于後陰。貫臀。入臍中。其支者。從膊內左右別下貫肺。一作臟。挾脊內過髀樞。循髀外後廉下合臍中。以下貫蹠。足眼內出外踝之後。循京骨至小指外側。是動則病。衝頭痛。目似脫。項似拔。脊似折。不可以曲。膕如結。蹠如裂。是謂蹠厥。是主筋所生病者。痔瘻。狂癲。疾頭顛。信音項頸間痛。目黃。淚出。鼽衄。項背腰尻。膕蹠脚皆痛。小指不用爲此。諸病盛者。則人迎大。再倍于寸口。虛者。則人迎反小於寸口也。

腎足少陰之脉。起於小指之下。斜趣足心。出然谷之

下循內踝之後，別入跟中以上端內出膕中內廉上股內後廉貫脊屬腎絡膀胱其直者從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨夾舌本一本云從橫骨中挾臍循腹裏上行而入肺其支者從肺出絡心注胸中是動則病饑不欲食面黑如炭色咳唾則有血喝喝而喘一作喉鳴坐而欲起目睭睭無所見心如懸若饑狀是爲骨厥是主腎所生病者口熱舌乾咽腫上氣隘乾及痛煩心心痛發瘡辟脊股內後廉痛痿厥著卧足下熱而痛灸則強食生肉緩帶被髮大杖重履而步爲此諸病盛者則寸口大再倍於人迎虛者則寸口反小於人迎也

心主手厥陰之脉起于胸中出屬心包絡下肩歷絡三焦其支者循臂出脇下腋三寸上抵腋下循膕內

行太陰少陰之間入肘中下循臂行兩筋之間循中指出其端其支者別掌中循小指次指出其端是動則病手心熱臂肘掣急腋腫甚則胷脇支滿心中憺憺大動面赤目黃喜笑不休是主脉一作心包絡所生病者煩心心痛掌中熱爲此諸病盛者則寸口大二倍於人迎虛者則人迎反大寸口反小於人迎也三焦手少陽之脉起于小指次指之端上出兩指之間循手腕出臂外兩骨之間上貫肘循臑外上肩上出耳上角以屈下額一作頤至頤其支者從耳後入耳中出走耳前過客主人前交頰至目發聳是動則偏屬三焦其支者從膻中上出缺盆上頸夾耳後直

病耳聾渾渾焞焞嗌腫喉痺是主氣所生病者汗出目兌背痛頰耳後肩臑肘臂外皆痛小指次指不爲角爲此諸病盛者則人迎大左倍於寸口虛者則人迎反右小於寸口也

膽足少陽之脈起于目兌背上抵頭角下耳後循頸行手少陽之前至肩上却交出手少陽之後入缺盆其支者從耳後入耳中出走耳前至目兌背後其支者別兌背下太迎合手少陽抵於頸下一本云別兌陽於頸加頬車下頸合缺盆以下會中貫膚絡肝屬膽循脇裏出氣街繞手際橫入脾厭中其直者從缺盆下腋循胸中過季脇下合脾厭中以下循脾陽出腋外廉下外輔骨之前直下抵絕骨之端下出外果之

前循足跗上入小指次指之端其支者別跗上入大指之間循大指岐骨內出其端還貫入爪甲出三毛是動則病口苦善太息心脇痛不能反側甚則面微塵體無膏澤足外反熱是爲陽厥是主骨所生病者頭面頷痛目兌背痛缺盆中腫痛腋下腫痛馬力挾癰汗出振寒瘡胸中脇肋髀膝外至脛絕骨外踝前及諸節皆痛小指次指不用爲此諸病盛者則人迎大倍於寸口虛者人迎反左小於寸口也

肝足厥陰之脈起於大指叢毛之際上循足跗上廉去內踝一寸分踝八寸交出太陰之後上膕內廉循股陰入手中環陰器抵少腹夾胃屬肝絡膽上貫腹布筋腸循喉嚨之後上入頤顙連目系上出額與督

脉會於顚一云其支者從小腹與太陰少陽結其支於腰闕夾脊下第三第四骨孔中
者從目系下頰裏環唇內其支者復從肝別貫膈上注肺中是動則病腰痛不可以俛仰丈夫癩疝婦人少腹腫甚則嗌乾面塵脫色是主肝所生病者胸滿嘔逆洞泄狐疝遺精癃閉爲此諸病盛者則寸口大一倍於人迎虛者則寸口反小於人迎也足少陰氣絕則骨枯少陰者冬脉也伏行而濡骨髓者也故骨不濡一作軟則肉不能著骨也骨肉不相親則肉濡而却肉濡而却故齒長而垢髮無潤澤無潤澤者骨先死戊篤已死土勝水也手少陰氣絕則脉不通脉不通則血不流血不流則變色不澤故面色如黧漆一作柴者血先死戊篤癸死水

勝火也。靈樞云少陰終者面黑齒長而垢腹脹閉上下不通而終矣。

足太陰氣絕則脉不營其口唇口唇者肌肉之本也脈弗營則肌肉濡肌肉濡則人中滿一作舌癰人中滿則唇反唇反者肉先死甲篤乙死木勝土也手太陰氣絕則皮毛焦太陰者行氣溫於皮毛者也氣弗營則皮毛焦皮毛焦則津液去津液去則皮節著皮節著則爪枯毛折毛折者毛先死丙篤丁死火勝金也九卷云腹脹閉不得息善噫善嘔嘔則逆逆則面赤不逆上下不通上下不通則面黑皮毛焦而終矣。

筋者聚於陰器而脈絡於舌本故脈弗管則筋縮急筋縮急則引卵與舌故脣青舌卷卵縮則筋先死庚篤辛死金勝木也九卷云中熱嗌乾喜溺煩心甚則舌卷卵上縮而終矣

陰俱絕則目系轉轉則目運運爲志先死故志先死則遠一白半而死矣

太陽脈絕其終也戴眼及折瘻瘻其色白絕汗乃出則終矣

少陽脈絕其終也耳聾白節盡縱目棄一作眾本無此字一系絕系絕一半白死其死也目白乃死一作色青白陽明脈絕其絕也口自動作善驚妄言色黃其上下盛而不行不仁作則終矣

六陽俱絕則陰陽相離陰陽相離則腠理發泄絕汗乃出大如貫珠轉出不流則氣先死矣故旦占夕死夕占且死此十二經之敗也

十二經脉絡脉支別第一下

黃帝問曰經脉十二而手太陰之脉獨動不休何也岐伯對曰足陽明胃脈也胃者五藏六府之海其清氣上注於肺肺氣從太陰而行之其行也以息往來故人脉一呼再動一吸脉亦再動呼吸不已故動而不止曰氣口何以獨爲五藏主曰胃者水穀之海六府之太源也五味入於口藏於胃以養五藏氣氣口亦太陰也是以五藏六府之氣味皆出於胃變見於氣故五氣入於鼻藏於心肺肺有病而鼻爲之



不刺也

先卷言其動素問論其氣此言其爲五藏之所主相發明也

曰氣之過

於寸口也上出焉息下出焉伏何道從還不知其極也曰氣之離於藏也卒然如弓弩之發如水注之下上於魚以反衰其餘氣衰散以逆上故其行微也曰足陽明因何而動曰胃氣上注於胃其悍氣上衝頭者循喉上走空竅循眼系入絡腦出額下竅主人循牙車合陽明并下人迎此胃氣走於陽明者也故陰陽上下其動也若故陽病而陽脉小者爲逆陰病而陰脉大者爲逆陰陽俱盛與其俱動若引絳相傾者病曰足少陰因何而動曰衝脉者十二經脉之海也與少陰之絡起於腎下出于氣街循陰股內廉斜入眼中循肺骨內廉並少陰之經下入內踝之

後足下其別者斜入踝內出屬跗上入太指之間以

注諸絡以溫足跗此脉之常動者也

曰衛氣之行也上下相貫如環無端今有卒遇邪氣及逢大寒手足不隨其脉陰陽之道相輸之會行相失也氣何由還曰夫四末陰陽之會此氣之大絡也四衝者氣之經也經一作徑故絡絕則經通四末解則氣從合相輸如環黃帝曰善此所謂如環無端莫知其紀終而復始此之謂也

十二經脈伏行於分肉之間深而不見其常見者足太陰脈過於外踝之上無所隱故諸脈之浮而常見者皆絡脈也六經絡手陽明少陰之太絡起五指間上令脉冲飲酒者衛氣先行皮膚先充絡脈絡脈先

盛則衛氣以平營氣乃滿而經脈大盛也脉之卒然動者皆邪氣居之留於本末不動則熱不堅則陷且空不與衆同是以知其何脉之動也

雷公問曰何以知經脈之與絡脈異也黃帝答曰經脉者常不可見也其虛實也以氣口知之脉之見者皆絡脈也諸絡脈皆不能經大節之間必行絕道而出入復合於皮中其會皆見於外故諸刺絡脈者必刺其結上甚血者雖無血結急取之以寫其邪而出其血留之發爲痺也

凡診絡脈脉色青則寒且痛赤則有熱胃中有寒則手魚際之絡多青胃中有熱則魚際之絡赤其脈黑者久留痺也其有赤有青有黑者寒熱也其青而小

短者少氣也尺刺寒熱者皆多血絡必間日而取之血盡乃止調其虛實其小而短者少氣甚者寫之則悶悶甚則仆不能言悶則急坐之也

手太陰之別名曰列缺起於腕上分間並太陰之經直入掌中散入於魚際其病實則手允骨掌熱虛則久欬音搘口也小便遺數取之去腕一寸別走陽明手少陰之別名曰通里在腕一寸半別而上行循經入於心中繫舌本屬目系實則心痛虛則爲煩心取之腕後一寸別走太陽

手心主之別名曰內關去腕一寸出於兩筋之間循經以上系於心包絡心系實則心痛虛則爲煩心取之兩筋間

手太陽之別名曰支正上腕五寸內注少陰其別者上走肘絡肩髃實則筋弛肘廢虛則生筋小者如指痺疥取之所別

手陽明之別名曰偏歷去腕三寸別走太陰其別者上循臂乘肩髃上曲頰偏齒其別者入耳會於宗脉實則齶音齒耳聾虛則齒寒痺毫取之所別手少陽之別名曰外關去腕二寸外繞臂注胸中合心主實則肘擎虛則不收取之所別足太陽之別名曰飛揚去踝七寸別走小陰實則室鼻一云頭背痛虛則鼽衄取之所別足少陽之別名曰光明去踝上五寸別走厥陰並經下絡足跗實則厥虛則痿躄坐不能起取之所別

足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走太陰其別者循脛骨外廉上絡頭項合諸經之氣下絡喉嗌其病氣逆則喉痺瘡瘍實則顛狂虛則足不收脛枯取之所別

足太陰之別名曰公孫去本節後一寸別走陽明其別者入絡腸胃厥氣上逆則霍亂實則腸中切痛虛則鼓脹取之所別足少陰之別名曰大鍾當踝後繞跟別走太陽其別者並經上走於心包下外貫腰脊其病氣逆則煩悶實則癃閉虛則腰痛取之所別

足厥陰之別名曰蠡溝去內踝上五寸別走少陽其別者循經上畢結於莖其病氣逆則睂腫卒疝實則

挺長熱虛則暴癢取之所別任脉之別名曰尾翳下鳩尾散於腹實則腹皮痛虛則搔癢取之所別

督脈之別名曰長強俠脊上項散頭上走當肩胛左右別走太陽入貫膂實則脊強虛則頭重高搖之挾脊之有過者九墟無此九字取之所別


脾之大絡名曰大包出淵腋下三寸布胸脇實則一身盡痛虛則百脉皆縱此脉若羅絡之血者皆取之凡此十五絡者實則必見虛則必下視之不見求之上下人經不同絡脉異所別也

黃帝問曰皮有分部脉有經紀願聞其道岐伯對曰欲知皮部以經脉爲紀者諸經皆然陽明之陽名曰

害蟲十二經上下同法視其部中有浮絡者皆陽明之絡也其色多青則痛多黑則痺黃赤則熱多白則寒五色皆見則寒熱也絡盛則入客於經陽主外陰主內

少陽之陽名曰樞杼十一作持視其部中有浮絡者皆少陽之絡也絡盛則入客於經故在陽者主內在陰者主外以滲於內也諸經皆然

太陽之陽名曰關樞視其部中有浮絡者皆太陽之絡也絡盛則入客於經其入於經也從陽部注於經其出者從陰部內注於骨




心主之陰名曰害，有視其部中有浮絡者皆心主之絡也，絡盛則入客於經。

太陰之陰名曰關蟄，視其部中有浮絡者皆太陰之絡也，絡盛則入客於經。凡此十一經絡脉者皮之部也是，故百病之始生也必先客於皮毛邪中之則腠理開，開則入客於絡脉留而不去傳入於經留而不去傳入於腑廩於腸胃邪之始入於皮也漸然起毫毛，開腠理其入於絡也則絡脉盛色變其入客於經也則盛虛乃陷下其留於筋骨之間寒多則筋攣骨痛熱多則筋弛骨消肉爛膿破毛直而敗也。曰十上部其生病何如曰皮者脉之部也邪客於皮則腠理開，開則邪入客於絡脉絡脉滿則注于經脉經。

脉滿則入舍於府藏故皮有分部不愈而生大病也。曰夫絡脉之見其五色各異其故何也曰經有常色而絡無常變。曰經之常色何如曰心赤肺白肝青脾黃腎黑皆亦應其經脉之色也。曰其絡之陰陽亦應其經乎曰陰絡之色應其經陽絡之色變無常隨四時而行寒多則凝泣凝泣則青黑熱多則淖淖音淖淖則薰赤此其常色者謂之無病五色俱見謂之寒熱。

曰余聞人之合於天地也內有五藏以應五音五色五味五時五位外有六府以合六律主持陰陽諸經而合之十二月十二辰十二節十二時十二經水十二經脈此五藏六府所以應天道也夫十二經脈者



人之所以生病之所以成人之所以治病之所以起學之所始工之所止粗之所易上之所悉也其離合出入柰何曰此粗之所過上之所悉也請悉言之足太陽之正別入於臍中其一道下尻五寸別入於肛屬於膀胱散之腎循脅當心入散直者從脅上出於項復屬於太陽此爲一經也

足少陰之正至臍中別走太陽而合上至腎當十四椎出屬帶脈直者系舌本復出於項合於太陽此爲一合九墟云或以諸陰之別者皆爲正也

足少陰之正或以諸陰別者爲正一本云繞脾入於別者入季脇之間循胸裏屬膽散之上肝貫心以上

俠咽出頤頷中散於面繫目系合少陽於外毗

足厥陰之正別跗上上至毛際合於少陽與別俱行此爲二合

足陽明之正上至齧入於腹裏屬於胃散之脾上通於心上循咽出於口上頰頤還繫目合於陽明

足太陰之正則別上至齧合於陽明與別俱行上絡於咽貫舌本此爲三合

手太陽之正指地別入於肩解入腋走心繫小腸手少陰之正別下於淵腋兩筋之間屬心主上走喉

嚾出於面合目內眞此爲四合

手少陽之正指天別於顛入於缺盆下走三焦散於胸中

手心主之正別下淵腋三寸入胸中別屬三焦出循

喉嚨出耳後合少陽完骨之下此爲五合手陽明之正從手循膺乳別于肩髃入柱骨下走大腸屬於肺上循喉嚨出缺盆合於陽明手太陰之正別入淵腋少陰之前入走肺散之太陽上出缺盆循喉嚨復合陽明此爲六合

奇經八脉第二

黃帝問曰脉行之逆順柰何岐伯對曰手之三陰從藏走手手之三陽從手走頭足之三陽從項走足足之三陰從足走腹曰少陰之脉獨下行何也曰衝脈者五藏六府之海也五藏六府皆稟焉其上者出於頸頬滲諸陽灌諸陰其下者注少陰之大絡出於氣衝循陰股內廉斜入胸中伏行髀骨內下至內踝

之後屬而別其下者至於少陰之經滲三陰其前者伏行出屬跗下循跗入大指間滲諸絡而溫肌肉故別絡結則跗上不動不動則厥厥則寒矣曰何明之曰以言道之切而驗之其非必動然後可以明逆順之行也

衝脈任脈者皆起於胞中上循脊裏爲經絡之海其浮而外者循腹上行會於咽喉別而絡唇口血氣盛則充膚熱肉血獨盛則滲灌皮膚生毫毛婦人有餘於氣不足於血以其月水下數脫血任衝並傷故也任衝之交脈不營其唇故髭鬚不生焉任脈者起於中極之上以下毛際循腹裏上關元至咽喉上顧循目入面衝脈者起於氣衝並少陰之經難

作陽明之經，俠脅上行，至胸中而散。其言衝脈與九卷異任脈爲病，男子內結七竅，女子帶下瘕聚。衝脈爲病逆氣裏急。

督脈爲病脊強反折，亦與九卷互相發也。

曰人有傷於陰，陰氣絕而不起，陰不爲用。鬚鬚不去，信者獨去何也？曰宦者去其宗筋，傷其衝脈，血瀉不復皮膚內結，唇口不營故無鬚鬚。夫宦者其任衝之脉不盛，宗筋不成，有氣無血，口唇不營，故鬚鬚不生。

督脈者經缺不具見於營氣曰上循，嶺下項中循脊入體是督脈也。

素問曰：督脈者起於少腹以下，骨中央，女子入繫廷孔，其孔漏孔之端也。其絡循陰器，合募間，繞募後別繞，陽至少陰，與巨陽中絡者合，少陰上股內，後廉貫脊屬腎與太陽起於目內眞上額交顴上入絡腦還。

出別下項循肩髀內，俠脊抵腰中，入循督絡腎，其男子循華下至募與女子等，其小腹直上者，貫脅中，中央上貫心，入喉上顧環唇上繫兩目之中，此生病從小腹上衝心而痛，不得前後，爲衝疝，其女子不孕，癰痔遺溺嗌乾，督脈生病治督脈。

難經曰：督脈者起於下極之俞，並於脊裏上至風府，入屬於腦，上顱循額至鼻柱，陽脉之海也。九卷言營督脈故從上下難經言其脉之所起故從下上所以互相發也。素問言督脈似謂在衝多聞闕疑故并載以胎後之長者云。

曰蹻脈安起，安止何氣管也？曰：蹻脈者少陰之別起，於然骨之後，上內踝之上，直上循陰股，入陰上循腳裏，入缺盆上循入迎之前，上入勲。靈樞作屬，字煩屬目內皆

合於太陽陽蹻而上行氣相并相還則爲濡深作目
氣不營則目不合也

曰氣獨行五藏不營六府何也曰氣之不得無行也
如水之流如日月之行不休故陰脈營其藏陽脈營
其府如環之無端莫知其紀終而復始其流溢之氣
內溉藏府外濡腠理

曰蹻脉有陰陽何者當其數曰男子數其陽女子數
其陰其陰一本無此二字當數者爲經不當數者爲絡也
難經曰陽蹻脉者起於跟中循外踝上行入風池陰
蹻脉者亦起於跟中循內踝上行入喉嚨交貫衝脈
此所以互相發明也又曰陽維陰維者維絡於身
溢畜不能環流溉灌也故陽維起於諸陽會陰維起

於諸陰交也

又上

脈起於季肋廻身一周

自衝

脉已

下是謂奇

經八脉

又曰陰蹻爲病陽緩而陰急陽蹻爲病
陰緩而陽急陽維維於陽陰維維於陰陽不能
維爲病腰腹縱容如囊水之狀一云腹滿腰溶此八
脉之診也

脉度第三

黃帝問曰願聞脈度岐伯對曰手之六陽從手至頭
長五尺五六合三丈手之六陰從手至胸中長三尺
五寸三十六一丈八尺五六合三尺凡二丈一尺足之
六陽從頭至足長八尺六八合四丈八尺足之六陰
從足至胸中長六尺五寸六六合三丈六尺五六三
尺凡三丈九尺蹻脉從足至首長七尺五寸二十七

丈四尺二寸五合，一尺凡一丈五尺督脈任脈各長四尺五寸二寸五合，八尺二寸五合，一尺凡九尺凡都合十六丈二尺。此氣之太經隧也。經脈爲裏支而橫者，爲絡絡之別者，爲孫絡孫絡之盛而有血者，疾誅之盛者瀉之虛者飲藥以補之。

十二經標本第四

黃帝問曰：五藏者所以藏精神魂魄也，六府者所以受水穀而化物者也。其氣內循於五藏而外絡支節，其浮氣之不循於經者爲衛氣，其精氣之行於經者爲營氣。陰陽相隨，外內相貫，如環無端，亭亭淳淳乎孰能窮之？然其分別陰陽皆有標本虛實所離之處，能別陰陽十二經者，知病之所生，候虛實之所在者。

能得病之高下，知六經之氣街者，能知解結紹於門戶，能知虛實之堅濡者，知補瀉之所在，能知六經標本者，可以無惑於天下也。岐伯對曰：博哉聖帝之論！臣請悉言之。


足太陽之本，在跟上五十，中標，在兩絡命門，命門者目也。

足少陰之本，在內踝下上三十，中標，在背腧與舌下兩脉。

足少陽之本，在竅陰之間，標在憲籠之前，憲籠者耳。
千金云憲籠者耳，前上下也，脉以手按之動者是也。

足陽明之本，在厲兑標，在人迎上頰頑頬。
九卷云標在人迎頰。

上俠頑頬



足厥陽之本，在行間上五寸所標在背腧，
足太陰之本，在中封前四寸之中標在背腧，與舌本
手太陽之本在外踝之後標在命門之上一寸。云命門在心

手少陽之本，在小指次指之間上三寸一作二寸標在耳後，一寸角下外眞。

手陽明之本，在肘骨中上至別陽標在顏下合鍤上，
手太陰之本，在寸口之中標在腋下內動脈是也。

手少陽之本，在兌骨之端標在背腧。

手心主之本，在掌後兩筋之間標在腋下三寸一作二寸凡候此者，主下虛則厥下盛則熱，上虛則眩，上盛則熱。

病故實者絕而止之虛者引而起之請言氣街胃氣

有街腹氣有街頭氣有街筋氣有街故氣在頭者上，
一作下之於腦在胸中者上之膺與背腧氣在腹者上之於背腧與衝脈於臍左右之動脈者氣在筋者上之氣街與承山踝上以下取此者用毫鍼必先快而久存之應於手乃刺而子之所刺者頭痛眩仆喉痛中滿暴脹及有新積可移者易已也積不痛者難已也。

經脉根結第五

黃帝曰：天地相感寒熱相移，陰陽之數孰少孰多？陰道偶而陽道奇。發於春夏陰氣少而陽氣多，陰陽不調何補？何瀉？發於秋冬陽氣少而陰氣多，陰氣盛陽氣衰，故莖葉枯槁，濕雨下歸陰陽相離，何補？何瀉？奇

邪離經不可勝數不知根結五藏六府折關敗樞開闔而走陰陽大失不可復取九鍼之要在於終始能知終始一言而畢不知終始鍼道絕矣

太陽根於至陰結於命門命門者目也

陽明根於厲兌結於頤額頤額者鉗大鉗大者耳也少陽根於竅陰結於竅竈竅竈者耳也

太陽爲開陽明爲闔少陽爲樞故開折則內節潰緩而暴病起矣故候暴病者取之太陽視有餘不足潰緩者皮肉緩瞧而弱也闔折則氣無所止息而癥病起矣故癥病者皆取之陽明視有餘不足無所止息者真氣稽留邪氣居之也樞折則骨搖而不能安於地故骨搖者取之少陽視有餘不足節緩而不收者

當覈其本

太陰根於隱白結於太倉

厥陰根於太數結於玉英絡於膻中

少陰根於湧泉結於廉泉

太陰爲開厥陰爲闔少陰爲樞故開折則倉廩無所輸膈洞膈洞者取之太陰視有餘不足故開折者則氣不足而生病闔折則氣弛而善悲善悲者取之厥陰視有餘不足樞折則脉有所結而不通不通者取之少陰視有餘不足有結者皆取之

足太陽根於至陰流於丘墟注於陽輔入於天柱飛揚

足少陽根於竅陽流於丘墟注於陽輔入於天柱飛揚

誤

光明

足太陽明根於厲兌流於衝陽注於下陵入於人迎豐隆。

手太陽根於少澤流於陽池注於少海入於天窓

誤疑

支正

手少陽根於關衝流於陽池注於支溝入於天牖外關。

手陽明根於商陽流於合谷注於陽谿入於扶突偏歷此所謂十二經絡也絡盛者當取之

經筋第六

足太陽之筋起於足小指上結於踝斜上結於膝其下者從足外側結於踵上循跟結於膕其別者結於

肺外上腋中內廉與腋中並上結於膕上俠脊上項其支者別入結於舌本其直者結於枕骨上頭下頸一作顏一作結於鼻其支者爲目上綱下結於勦靈樞作頤字其下支者從腋後外廉結於肩髃其支者入腋下出缺盆上結於完骨其支者出缺盆斜上入於勦其病小指支踵痛三作小指脰攣急脊反折項筋急肩不知爲數以痛爲腧名曰仲春痺。

足少陽之筋起於小指次指之上結於外踝上循脇外廉結于膝外廉其支者別起於外輔骨上走髀前者結于伏菟後者結於尻其直者上乘脅季脇上走腋前廉繫于膺乳結于缺盆直者上出腋貫缺盆出

太陽之前循耳後上額角交顴上下走額上結於鼽其支者結於目外眞爲外維其病小指次指支轉筋引膝外轉筋膝不可屈伸膕筋急前引髀後引尻上乘眇季脇痛上引缺盆膺乳頸維筋急從左之右右目不開上過右角并蹠脉而行左絡於右故傷左角右足不用命曰維筋相交治在燔鍼刲刺以知爲數以痛爲輸名曰孟春痺


足陽明之筋起於中二指結於跗上斜外上加於輔骨上結於膝外廉直上結於髀樞上循脇屬脊其直者上循髀結於膝其支者結於外輔骨合少陽其直者上循伏菟下結於髀聚於陰器上腹而布至缺盆而結上頸上俠口合於勦下結於鼻上合於太陽太

陽爲目上綱陽明爲目下綱其支者從頰結於耳前其病足中指支脣轉筋脚跳堅伏菟轉筋髀前腫脹痺腹筋乃急引缺盆及頰卒口僻急者目不合熱則經弛縱不勝目不開頰筋有寒則急引頰移口有熱則筋弛縱不勝收故僻治之以馬膏膏其急者以白酒和桂塗其緩者以桑鈎鉤之即以生桑灰置之坎中高下與坐等以膏熨急頰且飲美酒啖炙肉不飲酒者自強也爲之三拊而已治在燔鍼刲刺以知爲數以痛爲輸名曰季春痺

足太陰之筋起於太指之端內側上結於內踝其直者上絡於膝內輔骨上循陰股結於髀聚於陰器上腹結於臍循腹裏結於脇散於胸中其內者著於脊

其病足太指支內踝痛轉筋內輔骨痛陰股引髀而痛陰器紐痛上臍兩脇痛膺中脊內痛治在燔鍼劫刺以知爲數以痛爲輸名曰孟秋痺足少陰之筋起於小指之下入足心並足太陰而斜走內踝之下結於踵則與太陽之筋合而上結於內輔之下並太陰之經而上循陰股結於陰器循脅內俠脊上至項結於枕骨與足太陽之筋合其病足下轉筋及所過而結者皆痛及轉筋病在此者主癰瘍及瘡病在外者不能在內者不能仰故陽病者腰反折不能俛陰病者不能仰治在燔鍼劫刺以知爲數以痛爲輸在內者熨引飲藥此筋折紐紐發數甚者死不治名曰仲秋痺

足厥陰之筋起於大指之上結於內踝之前上衝脅上結內輔之下上循陰股結於陰器絡諸經作其病足太指支內踝之前痛內輔痛陰股痛轉筋陰器不用傷於內則不起傷於寒則陰縮入傷於熱則縱挺不收治在行水清陰器其病轉筋者治在燔鍼劫刺以知爲數以痛爲輸名曰季秋痺手太陽之筋起於小指之上結於腕上循臂內廉結於肘內兒骨之後彈之應小指之上入結於腋下其支者從腋走後廉上繞臑外廉上肩胛循頸出足太陽之筋前結於耳後完骨其支者入耳中直者出耳上下結於頷上屬目外眞其病小指及肘內兒骨後廉痛循臂陰入腋下腋下痛腋後廉痛繞肩胛引頸



而痛應耳中鳴。痛引領目瞑良久乃能視。頸筋急則爲筋痿。頸腫寒熱在頸者治在燔鍼劫刺。以知爲數以痛爲輸。其爲腫者復而兌之名曰仲夏痺。原本復下有本支者上曲牙循耳前屬目外皆上領結于角其痛當所過者支轉筋治在燔針劫刺以知爲數以痛爲輸

一段

手少陽之筋起於小指次指之端結於腕上循臂結於肘上繞臑外廉上肩走頸合手太陽其支者上當曲頰入繫於舌本其支者上曲牙循耳前屬目外皆上乘額結於角其病當所過者即支轉筋舌卷治在燔鍼劫刺以知爲數以痛爲輸名曰季夏痺。

手陽明之筋起於大指次指之端結於腕上循臂上結於肘上繞臑結於臑其支者繞肩胛飲脊其直者從肩髃上頸其支者上頰結於勦其直者上出手太陽之前上左角絡頭下右頸其病當所過者支_{一本}痛字及字轉筋痛肩不舉頸不可左右視治在燔鍼劫刺以知爲數以痛爲輸名曰孟夏痺。

手太陰之筋起於大指之上循指上行結於魚際後行寸口外側上循臂結肘中上臑內廉入腋下出缺盆結肩前髃上結缺盆下結於胸裏散貫竇合腋下抵季肋其病當所過者支轉筋痛甚成息竇脇急吐血治在燔鍼劫刺以知爲數以痛爲輸名曰仲冬痺。

手心主之筋起于中指與太陰之經並行結於肘內廉上臂陰結腋下散前後腋脇其支者入腋散胸

內結於臂其病當所過者支轉筋痛手心主前及胸痛息貴治在燔鍼劫刺以知爲數以痛爲輸名曰孟冬痺

手少陰之筋起於小指之內側結於兌骨上結肘內廉上及腋交太陰挾乳裏結於胸中循臂下繫於腋其病內急心承伏梁下爲肘綱其病當所過者支轉筋痛治在燔鍼劫刺以知爲數以痛爲輸其成伏梁吐膿血者死不治凡經筋之病寒則反折筋急熱則筋縱緩不收陰痿不用陽急則反折陰急則俛不伸焫刺者刺寒急也熱則筋縱不收無用燔鍼劫刺名曰季冬痺

足之陽明手之太陽筋急則口目爲之僻目眚急不足

能卒視治此皆如右方也

骨度腸度腸胃所受第七

荀卿問曰脈度言經脈之長短何以立之伯高對曰洗綬其骨節之大小廣狹長短而脉度定矣曰人長少矣五寸者其骨節之大小長短知各幾何曰頭一頸之大骨圍二尺六寸胸圍四尺五寸腰圍四尺二寸髮所覆者顱至項一尺二寸髮以下至頤長一尺君子參又作終折結喉以下至缺盆中長四寸至缺盆下至觸骭長九寸過則肺大不滿則肺小觸骭以下至天樞長八寸過則胃大不及則胃小天樞已下至橫骨長六寸半過則廻腸廣長不滿則狹短橫骨長才寸半橫骨上廉以寸至內輔之上廉長一尺八

寸內輔之上廉以下至下廉長三寸半內輔下廉至
內踝長二尺三寸內踝以下至地長三寸膝臍以下
至跗屬長一尺六寸跗屬以下至地長三寸故骨圍
大則太過小則不及角以下至柱骨長一尺寸一作行
腋中不見者長四寸腋以下至季脇長一尺二寸季
脇以下至髀樞長六寸髀樞以下至膝中長一尺九
寸膝以下至外踝長一尺六寸外踝以下至京骨長
三寸京骨以下至地長一寸耳後當完骨者廣九寸
耳前當耳門者廣一尺二寸一作三寸兩顴之間廣九寸
半九寸七分兩乳之間廣九寸半兩髀之間廣六寸半
足長一尺二寸廣四寸半肩至肘長一尺七寸肘至
腕長一尺二寸半腕至中指本節長四寸本節至

末長四寸半項髮以下至脊骨長三十半二寸脊骨
以半至尾骶二十一節長三尺上節長一寸四分分
之七奇分之一奇分在下故上七節下至脅骨九寸
八分分之七此衆人骨之度也所以立經脉之長短
也是故視其經脉之在於身也其見浮而堅其見明
而大者多血細而沉者多氣乃經之長短也
曰願聞六府傳穀者腸胃之大小長短受穀之多少
柰何曰穀之所從出入淺深遠近長短之度唇至齒
長九分廣二寸半齒以後至會厭深三寸半大容五
合舌重十兩長七寸廣二寸半咽門重十兩廣二寸
半至胃長一尺六寸胃紓曲屈伸之長二尺六寸大
一尺五寸徑五寸大容三斗五升小腸後附脊

左環廻周葉一作疊積其注於廻腸者外附於臍上
廻運環反十六曲大二寸半徑八分分之少半長三
丈一尺一尺三寸廻腸當臍左環廻周葉積而下廻運環
反十六曲大四寸徑一寸寸之少半長二丈一尺廣
腸脈傳脊以受廻腸左環葉積一作上卡辟大八
寸徑二寸寸之太半長二尺八寸腸胃所入至所出
長六丈四寸四分廻曲環皮三十二曲

曰人不食七日而死者何也曰胃大丁尺五寸徑五
寸長一尺六寸橫屈受水穀三斗五升其中之穀常
留者一斗水一斗五升而滿上焦泄氣出其精微漂
悍滑疾下焦下溉泄諸小腸小腸大二寸半徑八分
分之少半長三丈二尺受穀二斗四升水六升三斗


合之太半廻腸大四寸徑一寸寸之少半長二丈一
尺受穀一斗水七升半廣腸大八寸徑二寸寸之太
半長二尺八寸受穀九升三合八分合之一腸胃之
長凡五丈八尺四寸受水穀九斗二升一合合之大
半此腸胃所受水穀之數也○平人則不然胃滿則
腸虛腸滿則胃虛更滿更虛故氣得上半五藏安定
血脉和利精神乃居故神者水穀之精氣也故腸胃
之中常留穀一斗四升水一斗五升故人一百再至
後後一升半一日中五升五七三斗五升而留水穀
盡矣故平人不飲不食七日而死者水穀精氣津液
皆盡故七日死矣

鍼灸甲乙經卷之二終

明治編

卷之二

三



Kitasato Memorial Medical Library