

傷寒蘊要

二
一
四

Kitasato Memorial Medical Library

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1





131

490.9
Sh-Z17
1

F-1
シ-76

Kitasato Memorial Medical Library



12513

Kitasato Memorial Medical Library

辨痰症 辨傷食 辨虛煩 辨脚氣

辨瘡瘍發熱 辨內傷瘀血發熱 普濟清毒飲 荆防敗毒散

傷寒大頭例 救苦清毒散 清涼救苦散 升麻葛根湯 三因加味羌活湯

傷寒癰疽例 人參化斑湯 加味小柴胡湯 清毒犀角飲 玄參升麻湯

解毒防風湯 犀角玄參湯 犀角大青湯 當歸丸 漏蘆連翹湯

五物木香湯 孫兆山挽散 黃連一物湯 青黛一物湯 黃連解毒湯

加減三黃石膏湯 通脈四逆湯 大建中湯 傷寒登黃例 茵陳湯

孫兆治黃方 山茵陳散 千金茵陳湯 傷寒登黃例 茵陳湯

大茵陳湯 枳實梔子豉湯 茵陳丸

柴胡甘草湯 茵陳犀角湯 黃山茵陳散 加味茯苓湯

茵陳五苓散 小茵陳湯 茵陳四逆湯 茵陳蒿皮湯

傷寒發狂例 陽毒升麻湯 升麻六物湯 加味升麻湯

加減三黃石膏湯 黑奴丸 黃連散 玄明粉法

傷寒心下滿例 高根黃芩湯 硝水漬法 傷寒咳嗽例

傷寒喘例 人參杏子湯 三拗湯 傷寒心下悸例

傷寒身振例 葛根黃連黃芩湯 蘇沈九寶湯 加減瀉白散

傷寒戰慄例 桂枝甘草湯 茯苓甘草湯 傷寒戰慄例

傷寒腹痛例 傷寒小便不通例
 傷寒小便數例 傷寒小便自利例 清肺飲
 黃芩湯 清心蓮子飲 八正散
 滋陰化氣湯 滋腎丸 滋陽益氣湯
 傷寒大便不通例 半硫丸 加味四物湯
 當歸潤燥湯 麻仁丸 蜜煎導法
 諸苦膽道法 雜方
 傷寒藏結例 傷寒可發汗例 傷寒不可發汗例
 傷寒可下例 傷寒急下例 傷寒不可下例
 傷寒可吐不可吐例 傷寒皮膚骨節寒熱例
 傷寒火攻例 傷寒水攻例

傷寒蘊要全書目錄卷之二

傷寒蘊要全書卷之二

錢唐吳綬編輯

論傷寒提綱之要

仲景傷寒三百九十七法提綱之要無出於表裏虛實
 實陽陽冷熱八者而已若能明究此八者則三百九
 十七法可得一定於膏中也何以言之然有表實有
 表虛有裏實有裏虛有表裏俱實有表裏俱虛有表
 寒裏熱有表熱裏寒有表裏俱寒有陰症有陽症其
 所苦各不同要當弁而治之且表實者脈浮緊惡寒
 身疼而無汗也宜麻黃湯汗之表虛者脈浮緩惡風
 身疼而有汗也宜桂枝湯和之如裏實者腹中鞭滿
 大便不通潮熱脈實宜大柴胡湯下之裏虛者腹鳴
 自利有寒有熱詳見自利條下如表裏俱實者內外
 皆熱也脈浮洪身疼無汗者宜通解散汗之若口渴
 飲水舌上乾燥脈滑大者人參白虎湯主之脈若弦

而滑者小柴胡湯合白虎湯主之如表裏俱虛者
自汗自利內外皆虛宜人參三白湯或黃芪建中湯
陪加參朮主之脈微細足冷者必加附子溫之如表
寒裏熱者身寒厥冷脈滑數口渴渴宜白虎湯主之
如裏寒表熱者面赤煩躁身熱自利清穀脈沉細者
宜四逆湯溫之如表裏俱寒者自利清穀身疼惡
寒者此內外皆寒也宜四逆湯先救其裏次以桂枝
湯以救表也如陰症發熱則脈沉細而不渴陽症發
熱則脈洪數而躁渴以此別之夫抵治法當明此提
綱之要則治之而無差惑矣

傷寒瘟疫熱病說

夫病有因有名而有形也王安道曰要當弁其因正
其名察其形三者俱當始可以言治矣一或未明而
曰不誤於人者則吾未之信也且以傷寒言之自霜
降之後天令以寒而感之者乃傷寒也若天令溫暖

而感之者為冬溫也如至春天令溫暖有人壯熱為
病者乃溫病也若天令尚寒冰雪未解而感寒者赤
曰傷寒也若三月四月五月六月七月八月之間天
道忽有暴寒而感之為病者此名時行寒疫也若夏
至日後壯熱脈洪者謂之熱病也如四時天令不正
感而為病長幼相似互相傳染者謂之時行之氣也
夫時氣者一曰時疫蓋受天之疫厲之氣而為病乃
非寒也然又有溫瘧風溫乍毒溫疫中風傷風中濕
風濕中暑中暈濕暈等証一皆發熱狀似傷寒故醫
家通以傷寒稱之也然通稱傷寒者為發熱傳變皆
相類也至於用藥則不同矣但發表解肌而有差別
也蓋冬月傷寒者人之著寒而即病也若不即病至
春變為溫病或至夏變為熱病也且溫病熱病乃因
伏寒為變既變不得復言其寒也其寒瘧乃天之暴
寒與冬時嚴寒又有輕重之不同耳時氣自是天行

瘦厲之氣又非寒比也。溫病乃山澤蒸氣暑病乃冬
日之火傷風乃天之賦邪傷於人者也。有中者為重傷
者輕也。溫癰風濕等証又是傷寒壞証更感異氣所
變各有其因不同豈可通以傷寒稱而治之也。孔子
曰名正則言順名不正則言不順矣。若能正其名而
治之則無差忒也。活人書曰天下之事名定而實安
言順而事成。蓋傷寒為病之物名其種類數多而不
同也。若識其名而治之未愈者則所感邪氣深也。故
效亦遲速也。而無失矣。如不能識其名妄行治療往
往中暑作熱病治之。亂投湯藥。溫濕作風。濕治之。復
加發汗。此以虛實混淆是非紛亂人之性命寄於風
燭矣。可不慎哉。惟恐未明各開條于後以便覽焉。
傷寒者寒邪傷於太陽經即病頭疼惡寒身痛發熱
脈浮緊而無汗也。若脈浮緩而有汗者謂之傷風也。

治例俱見本條。中寒者寒邪直中三陰也。蓋中寒比
傷寒尤甚若不急治死在旦夕也。如寒中太陰者則
中脘疼痛也。宜理中湯或薑香正氣加味理中湯主
之。寒甚脈沉細足冷者又加附子名曰附子理中湯
也。若寒中少陽則胸腹疼痛宜五積散加紫葉薑主
之。寒甚脈沉足冷者宜四逆湯加紫葉薑主之。若寒
中厥陰則少腹至陰疼痛宜當歸四逆湯加紫
葉薑甚者必用附子倍之。如冷在唇青厥逆無脈囊
縮者仍用葱熨法或紫葉薑炒熨法并灸臍中并
氣海關元二三十壯最佳。取脈漸起而來手足溫煖
乃可生也。如一時無藥急用凉水搭手足四腕視其
青紫筋處以三稜鍼刺其血出亦愈。或於十指尖出
血亦佳。或一味紫葉薑煎湯與之亦可救之也。
辨傷風見寒脈傷寒見風脈
傷風脈當浮緩而反浮緊者此風得寒脈也宜羌活

神木湯主之內有熱 從易先九味羌活湯主之如
天寒有汗神木湯少佐桂枝白芍藥亦佳若傷寒脈
當浮緊而反浮緩者此寒得風脈也宜人參羌活湯
或神木湯加人參主之或熱多而無汗者以十味芎
蘇散加人參亦佳大抵脈之浮緩者多因元氣虛也
易老以九味羌活湯主之必加人參大寒為妙也

辨三陽合病併病

凡寒邪傷在二陽經同受病之不一傳也併病二陽
合病一陽病裏一陽病盛歸併於一經也別說一陽
經先受病傳過一經併而為病故曰併病也且三陽
合病必互相下利如太陽與少陽合病脈必浮而弦
自下利者黃芩湯主之若嘔者加半夏生薑湯主之
太陽與陽明合病脈浮長喘而汗多者不可下宜麻
黃加杏仁湯主之陽明與少陽合病脈弦而長自下
利者小柴胡加葛根芍藥湯主之設脈不長而獨弦

而利不止不食者名曰負者失也此土敗木賊則
死也且太陽與陽明併病太陽病未罷其人面色緣
々正赤或躁煩者表未解也宜發其汗若太陽症已
罷潮熱大便實手足濇々汗出者此內實也可下之
其若脈弦而長口苦舌燥口渴飲水者小柴胡湯加葛根
主之若脈弦大而熱盛舌燥口渴飲水者小柴胡合
白虎湯主之也若太陽與少陽併病頭項強痛眩冒
如結脊狀心下痞鞭宜刺大椎肝俞慎不可下也若
下之遂成結脊心下痞鞭下利不止水漿不入而為
難也三陽合病身重腹滿難以轉側口中不仁面垢
譫語遺尿自汗出者白虎湯主之不可汗不可下也
若三陽與三陰合病即是兩感也大抵治法二陽經
同病宜用藥必以二經之藥合而治之如人參羌活
散乃三陽經藥神木湯沖和湯皆太陽經藥葛根湯
白虎湯乃陽明經藥小柴胡湯乃少陽經藥也凡表

尚寒必須少佐麻黃亦可要在暄時審察而已不可
執於一說也凡溫病發于三陽者多而發於三陰者
少若發于三陰必有所因也或飲寒物內傷太陽而
得之或因慾先傷腎經而得之也凡治例皆與傷寒
傳變各條同治惟發表不與傷寒同例也凡瘟疫壯
熱脈浮大有力者可治若沉瀉細小者多難治也所
以溫病大熱壞者脈小足冷者多死也

辨熱病

自夏至以後時令炎暑有人壯熱煩渴而不惡寒者
乃熱病也凡脈浮洪者發于太陽也洪而長者陽明
也弦而數者少陽也然此發在三陽者為之可治若脈
沉細微小足冷者發在三陰為之難治也大抵熱病
大熱須得脈洪大有力或滑數有力乃為脈病相應
為之可治若脈小弱無力為之難治若人虛脈弱者且
以人參湯與之而扶其元氣也不可以攻其熱如脈

洪身疼壯熱無汗煩亂者宜六神通解散發汗則愈
或人參養活散加葛根淡豆豉生薑以汗之輕者只
用十味芍藥散汗之亦佳如夾暑加香薷扁豆及解
之若無有內傷生冷飲食停滯或嘔吐惡心中脘痞
悶或惡風或增寒拘急者宜藿香正氣散加香薷扁
豆葛根以發汗名二香湯也若發散熱不解者有太
陽經宜用人參養活散加黃芩在陽明經宜用升麻
葛根湯加黃芩熱甚燥渴脈大者白虎湯加人參主
之在少陰宜用小柴胡湯隨証增損治之若夾暑者
加黃連香薷主之若熱而大便自利小便不利煩渴
者五苓散去桂加葛根黃連香薷滑石之類主之若
表裏俱熱而自利脈浮數而小便不利者小柴胡湯
合四苓散主之若其不解或傳經變証或裏實可下
或陰寒可溫或發斑黃等症皆從正傷寒條內治之
也凡熱病一二日泄利腹滿熱甚者死三四日目昏

譫語熱盛而脈小者死四五日熱盛脈小足冷者死
五六日汗不出嘔吐譫語昏沉脈急促者死六七日
舌本焦黑燥者死七八日衄血吐血躁熱脈大者死
九日發瘧搖擗昏亂者死凡熱病脈促結代沉小皆
難治也熱病不得汗而脈躁急者死以得汗而熱反
盛脈躁急者死也

辨時氣

時氣者乃天疫暴厲之氣流行凡四時之令不正者
乃有此氣行也者人感之則長幼相似而病及能傳
染於人者也其作與傷寒相似蓋傷寒因寒而得之
此乃疫氣不可與寒同論也治法要當解散疫氣扶
正氣為主若多日不解邪熱傳變何症宜從傷寒變
症條內詳而用之惟發散之藥則不同矣凡發散湯
劑藿香正氣散芫香蘇散十神湯人參敗毒散十
味芎蘇等方皆可選而用之也

辨寒疫

寒疫乃天之暴寒為病也凡四時之中天令或有暴
風寒之作人感冒而即病者名曰寒疫也其症與正
傷寒同但暴寒惟輕耳治法若初作頭疼增寒拘急
或嘔逆惡心中腕痞悶或飲食停滯不化或腹中作
痛未發熱者宜藿香正氣散增損一二味主之若已
發熱者宜用十味芎蘇散汗之若身痛骨節疼而發
熱者宜人參羌活散加葱白葛根生薑以汗之或神
木湯亦可若有自汗不宜再汗之宜九味羌活湯主
之若熱不解或變別症宜從正傷寒條內治之也

辨冬溫之毒

經曰其冬有非節之暖名曰冬溫蓋此時行之氣
也若發斑者又曰溫毒而亦時氣發斑也又傷寒壞
病陽脈洪數陰脈實大更遇溫熱變為溫毒其病最
重也蓋此因前熱多日不解更成溫熱之氣而為病

故曰重也。若無汗者，以三黃石膏湯汗之。若有自汗者，宜人參白虎湯主之。煩熱錯語，不得眠者，白虎合黃連解毒湯主之。表熱又盛者，更加柴胡主之。若內實大便不通，宜三黃瀉心湯下之。或大柴胡湯加芒硝下之亦可。若斑出如錦文者，多難治也。宜人參化斑湯、玄參升麻湯并黑膏大青四物湯主之。方見發斑條內詳之。

三黃石膏湯

石膏四錢

黃芩

黃連各二錢

黃蘗

山梔仁各一錢五分

香豉一百粒

麻黃二錢，若天寒用三錢

甘草一錢

右作一服，用水二鍾，煎至一鍾，濾清，通口服，以衣被覆之，取汗而愈。

辨傷濕中濕風濕不同
傷濕者，濕傷太陽經起也。中濕者，濕中太陽脾經，或腎經也。風濕者，或先傷濕而後傷風，令濕相搏而為病也。經言太陽病關節疼痛而煩，脈沉而細者，此名濕痺。其人小便不利，大便反快，但當利小便也。又曰：濕病但頭汗出，背強欲得被覆，向火，膏滿小便不利，舌上如胎者，此丹田有熱而膏中有寒也。渴欲得水而不能飲，則口燥煩也。若誤下之，則噦為難治。若下之，額上汗出，微喘，小便利者，死也。若下利不止者，亦死矣。又濕家病，身止疼痛，發熱面黃而喘，頭疼鼻塞，而煩，其脈大，自能飲食，腹中和無病，病在頭中寒濕以藥內鼻中，則愈。按此以瓜蒂散吹入鼻中，搐下，藥水則效也。又曰：濕家為病，發熱一身盡痛，身色如似薰黃，凡傷濕及身重而不便也。經言風濕相搏，一身盡疼，法當汗出而解，不可大發汗，大汗則風去，濕不

去也但當微々似欲汗出者此風濕俱去也治風濕方俱見神珍藥方濕門詳而用之也

辨濕溫

經曰濕溫之脉陽濡而弱陽小而急活人書謂其久先傷於濕後傷於暑々濕相搏其症多汗妄言双脰逆冷者宜本附湯加人參香薷扁豆主之若脉大有力自汗煩渴者人參白虎湯加白朮主之輕者或十味香薷飲清暑益氣湯增損主之但在除濕益元氣清暑而已方見中暑條下

辨風濕

經曰陽脉浮滑陰脉濡弱更遇于風變為風濕又曰發汗已身灼熱者各曰風濕脉陽俱浮自汗乃出身重多眠鼻息必鼾語言難出也不可汗下不可以火薰之誤用之則死活人書用萎薤湯主之或人參敗毒散增損用之亦可汗後身灼熱者知母葛根湯

主之身重出汗者防己湯麗安常用葛根龍膽湯主之若大渴者用括萎根湯主之知母葛根湯治汗後身灼熱

知母一錢五分

乾葛二錢

石膏三錢

甘草

羌活

升麻

黃芩

南星

人參

防風各一錢

杏仁七分

川芎一錢

木香五分

萎薤二錢半

麻子一錢有汗去之

石作一服水二鍾煎至一鍾通口服相再煎一次防己湯治風濕身重汗出

黃芪二錢五分白朮二錢

防己二錢

防風一錢五分甘草一錢

生薑三片

大棗二枚

煎法同前

萎薤湯

萎薤二錢五分石膏三錢葛根二錢

羌活

白薇

杏仁

青木香

川芎各二钱

麻黄一钱有汗去之

桔萎

根湯治風濕灼

熱大渴

煎法同前

石膏二钱

防風一钱五分

乾薑二钱

甘草一钱

知母一钱五分

煎法同前

葛根

龍胆湯治風濕脉弱身重汗出

石膏五分

升麻二钱

甘草一钱半

龍膽草一钱

桂枝一钱五分

煎法同前

芍药三钱

煎法同前

人參

敗毒散方見惡風門

辨溫瘧

凡溫瘧傷寒壞病前熱未除其脉阴阳俱盛重感寒邪變為溫瘧也寒熱往來口苦舌乾病者小柴胡湯

加白芍藥少加桂枝主之若熱多者倍用柴胡寒多者倍用桂枝若熱甚而煩渴者人參白虎湯少加薄荷主之若單熱無寒者不用桂也但有寒必少佐之如熱多者小柴胡合白虎湯主之痰多而熱者小柴胡合二陳湯主之若食少胃弱者加白朮心下痞加枳實黃連脉虛者必倍人參口渴者去半夏加括萎根主之若邪熱纏結於裏大便秘實脉滑大有力者以大柴胡湯下之若變瘧以正須急用勝金丹截之則愈矣方見各條內詳焉

辨溫疫

經曰阳脉濡弱阴脉弦緊更遇溫氣變為溫疫也蓋此先因傷寒前熱未除更感時行之溫氣而為溫疫也治例與溫病同法矣

并中暍中暑夏月四證

凡中暍者即中熱也蓋傷在太陽經與傷寒相似故

曰中暍也。中暑者熱傷於心脾經而不在太陽故曰中暑也。易老言動而得之為中熱靜而得之為中暑。經言太陽經中熱者暍是也。其人汗出身熱而渴也。宜白虎湯倍加人參。主之若身重而疼者人參敗毒散加黃連香薷。主之中暑者其候面垢自汗身熱煩渴脈虛也。或有背微寒者蓋暑喜傷心火不受邪則包絡受之包絡本相火也。此火助火則熱甚而昏不省也大抵治法清心利小便最妙。黃連香薷飲冰水浸冷與之極好。煩渴熱甚自汗者白虎湯倍加人參。主之或竹葉石膏湯亦可用之也。若煩渴小便不利者香薷湯合四苓散加滑石木通。主之若大便瀉而小便少者亦主之內熱心煩者加薑汁炒黃連。脈虛者倍加人參白朮也。若嘔吐頭疼惡心昏瞶滿胸或腹中痛者以藿香正氣散加香薷扁豆。名曰二香湯也。若小便不利而大便自利者以正氣散合五苓散。

主之轉筋者加木瓜。主之其十味香薷飲桂苓甘露飲清暑益氣湯皆治暑之要藥可選而增損。主之也大抵不可作傷寒一例而治妄施汗下則誤之矣。活人書所謂夏日有四肢傷寒傷風脈症互見中暑熱病疑似難明也。若脈緊惡寒謂之傷寒脈緩惡風謂之傷風脈盛壯熱謂之熱病脈虛身熱謂之傷暑以此別之也。

香薷湯

香薷五錢

厚朴一錢

扁豆二錢

甘草七分

右用水二大甌煎取一甌去粗瀝清涼水中浸冷飲之有効。心煩熱多或嘔逆加黃連一錢五分生薑汁炒用如手足搐搦此暑風也加防風羌活各一錢五分如小便不利加滑石赤茯苓各一錢五分如吐加藿香陳皮各一錢五分嘔痰水加生薑

五片半夏一钱五分如口渴加白乾姜二钱如瀉利加木白茯苓各二钱如脉弱加人参二钱五分麥門冬一钱五分若轉筋加木瓜若虛汗不止加黃芪二钱白朮二钱主之

十味香薷飲

香薷上

人參中

陳皮中

白朮中

茯苓中

黃芪中

木瓜下

厚朴下

扁豆中

甘草下

右用水二鍾煎至一鍾濃清服

清暑益氣湯

人參上

黃芪中

蒼朮中

升麻下

白朮中

神麴下

陳皮中

甘草下

黃柏下

麥門冬中

當歸中

葛根中

五味子十二箇

澤瀉中

青皮下

右煎法同前

桂苓甘露飲

白朮上

茯苓中

豬苓中

澤瀉中

石膏中

寒水石中

滑石中

桂下

右煎法同前

辨霍亂

經言病嘔吐而利頭痛身疼惡寒發熱或吐利止而發熱者乃霍亂也霍者上吐下利揮霍撩亂以名之也仲景以熱多口渴能飲水者用五苓散散主之若中暑者加香薷扁豆葛根姜汁炒黃連之類也若寒多腹痛不飲水者宜理中湯主之嘔吐者加藿香陳皮半夏厚朴各薑理湯瀉多而小便少者加五苓散合理中湯主之若脘上築々然者腎氣動也去白朮倍

加肉桂也若吐多不止者藿理湯更加生姜汁若有
熱渴而吐利者藿苓湯加姜炒黃連生姜汁葛根主
之若瀉未止者倍加蒼白朮脈虛者必倍用人參轉
筋痛者必加木瓜痛甚有寒者必加吳茱萸主之若
逆冷脈沉細下利清穀裏寒外熱者必用附子理中
湯或四逆湯主之若吐利發熱汗出惡寒四肢拘急
手足厥冷者四逆湯主之若吐利止小便清利大汗
出下利清穀內寒外熱脈微欲絕者四逆湯主之吐
已下新汗出而厥四肢拘急不解脈微欲絕者通脈
四逆湯加豬膽汁湯主之要在審察冷熱而治不可
不分辨也若夏月中暑霍亂脈虛小便不利不可用附子
乾姜須仔細辨之若非陰寒則附子不可用也方見
各條有之

辨瘧症

經曰瘧症身熱足寒頭項強急惡寒時頭熱面赤目

脈赤頭面搖卒口噤背反張也以發熱惡寒無汗
為剛瘧有汗惡風為柔瘧凡仰面而臥閉目為陽合
面而臥閉目為陰脈浮緊數者屬陽脈沉細濡者屬
陰口中燥渴者為陽口中和者為陰脈滄々如蛇者
汗虛致瘧也脈緊急如弦直上下行者風瘧也活人
書謂太陽經先傷於風後感寒濕而致瘧又發汗大
過者因致瘧也凡陽瘧則易治陰瘧多難醫也証治
曰太陽無汗小便不利氣上沖口噤欲作剛瘧麻黃加
葛根湯主之一方加川獨活防風主之或人參羌活
散加麻黃葛根發汗亦佳太陽病凡身軀強脈反
沉細此為瘧病宜括萎桂枝湯主之若有自汗惡風
者不可發汗宜桂枝湯加羌活獨活防風主之胃弱
加人參白朮口乾者加葛根也凡剛瘧可下者昏滿
口噤咬齒脚掣急宜秉氣湯或防風通聖散去麻黃
下之亦要再察其內實脈實有力乃可下也脈無力

切不可下之凡附瘕脉沉細者活人書有附子散桂
心白朮散附子防風湯八物白朮散皆可選而用之
難知治血虛發瘕用當歸防風湯主之若汗多而發
瘕者須用八珍湯加防風羌活黃芪肉桂主之脉小
虛甚者加熟附子主之或大建中湯加羌活防風主
之亦可新產婦人發瘕亦宜此湯增損主之吳蒙齊
剛柔二瘕通用小續命湯主之此言未可憑也如柔
瘕有汗須去麻黃無熱有寒須去黃芩防己乃可用
之若剛瘕熱多須去附子恐不為續命湯也用者詳
之

括萎桂枝湯

治太陽經頭痛發熱惡寒身軀強凡然脉及沉
細者此為瘕病也

括萎根二錢 甘草炙一錢 桂枝二錢五分
白芍藥二錢五分 生姜三片 大棗二箇

活書

海藏神水湯

治剛瘕即羌活神水湯倍羌活加獨活防風麻黃
方見太陽發熱條內葛根湯方見自利門

桂心白朮散

治陰瘕自汗脉沉細手足搐搦

桂心一錢五分 白朮二錢半 附子二錢五分 炮
川芎一錢五分 甘草炙一錢 生姜三片
大棗二箇 一方加羌活防風各一錢半 人參二錢

白朮散治附瘕

川烏炮二錢 桂梗一錢五分 附子炮二錢
白朮三錢 細辛一錢 乾姜炮一錢 加
羌活一錢半 防風一錢半 肉桂一錢
甘草炙一錢

右煎法同前自汗者加黃芪一錢五分
難知防風當歸散

治汗多亡血發瘧

防風二錢 當歸三錢 川芎三錢

生地黄一錢半一方加 白芍藥一錢五分

甘草炙一錢 羌活一錢半人參二錢

惡風自汗加桂枝一錢白朮二錢八珍湯以四物

湯四君子傷合而用之也大建中湯俱見神珍

方內虛門不錄

麻黃加獨活防風湯

治剛瘧發熱無汗惡寒脈浮緊者

麻黃二錢 桂枝一錢 杏仁一錢

甘草一錢 獨活二錢 防風一錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾去滓通口

服溫覆取汗則愈

桂枝加川芎防風湯

治柔瘧發熱自汗惡風脈浮緩者

桂枝一錢 白芍藥二錢 甘草炙一錢

防風二錢 川芎二錢 大棗二枚

生薑三片 右煎法同前

桂枝加芍藥防風湯

治發熱脈沉而細腹痛發瘧者附太陰也

桂枝一錢五分防風二錢 防己一錢

白芍藥二錢 生薑三片 大棗二枚

右煎法同前

小柴胡加防風湯

若汗下後不解不靜不躁目直視往來寒熱脈弦

數者少陽瘧也若一日或左或右視并一午一足

搐搦者少陽也

柴胡二錢 人參一錢 半夏一錢

黃芩一朶五分 甘草一朶 防風二朶
大棗二枚 生姜三片 右煎法同前

附子散

治陰瘧手足冷筋脉拘急汗出不止頭項強頭搖口噤

桂心二朶 附子半箇 白朮一朶五分
川芎一朶 獨活一朶半 桑子一枚

右煎法同前

附子防風湯

治陰瘧面目合面手足冷筋脉拘急汗出不止

白朮一朶 防風二朶 甘草一朶
桂心一朶 附子二朶 乾姜一朶
柴胡五分 茯苓五分 五味子十二个
生姜四片 右並法同前 玄及个一不三作三

八物白朮散

治陰瘧三日面目腫手足冷筋脉拘急汗不出者

白朮 蒼朮各一朶 五味子九箇 桂心一朶
麻黃二朶 良姜一朶 羌活一朶半 附子二朶
生姜五片 右煎法同前

辨瘧證

凡中脘停痰留飲亦令人作寒熱有類傷寒之狀但
瘧在上焦則寸口脉沉滑或沉伏瘧在中焦則右手
關脉滑大有氣鬱者必沉而滑也夾食者則短而滑
也脉弦滑者有痰飲偏弦者亦主飲也脉沉而弦者
有懸飲內痛凡左右關脉滑大者膈上有伏痰也可
吐之又關上脉伏而大者瘧也目下如灰烟黑者多
癰也凡瘧飲凝結增寒發熱胸中痞悶者宜麥蘇飲
增損主之熱多而氣盛者去木香入參加黃芩無熱
而氣不調者還用木香脉弱而元氣虛者還用人參
若膏中瘧唾如膠者加金沸草喘嗽去人參加杏仁

素白皮主之。若酒客內熱者，加黃連主之。且二陳湯治諸痰之要藥。凡治痰飲，必以此湯為主。隨証加藥治之。如外有熱，加柴胡、前胡、葛根之類。內有熱，加黃芩、黃連、山梔、仁之類。如痰垢昏中，加山萸、仁、貝母之類。如痰在膈間，不化，必加竹瀝、生姜汁之類也。大抵要在能辨痰証，不可混以傷寒治之也。

辨傷食

凡飲食停滯，中焦不化而發熱者，則其脈左平而右寸氣口緊盛，或右關脈短滑也。蓋停食則惡食，理必然也。或噯氣作酸，或惡聞食臭，或欲吐不吐，或吐之不盡，或惡心，或短氣痞悶，或胃口作疼，或心下痞滿，按之則痛也。此皆食停之候。可并之矣。若停食感寒者，則左右手人迎氣口俱大也。外症頭疼身寒，拘急中脘痞悶，或吐或嘔，或痛者，以藿香、正氣散，或人參養胃湯，加香附、砂仁之類。若肉食不化，必加棠棣

子末、麴食不化者，加神麴、大麥蘖、生冷肉食、果子之類，不化者，必加草菓、砂仁、枳實、青皮、主之。酒食傷，必加葛根、紫蘇、砂仁、烏梅、枳實之類。主之。大抵增寒未甚熱者，用此二方。若已發熱無汗，必須先解其外，以十味芎藭散汗之。身疼疼痛發熱者，用人參羌活湯，加葛根、葱白、生姜以汗之。然後消其食也。如食在胃上口未入于胃，乃可吐之。如不吐，則消導之。待食下入胃，變化糟粕，外症以解，乃可下其食也。如外證無惡風惡寒，乃可下其食。宜三物厚朴湯。熱多者，大柴胡湯，加厚朴下之，亦佳。凡治夾食傷寒，不可先攻其食，且先發散寒邪，次可消導之也。

辨虛煩

凡諸虛煩，熱狀似傷寒，要在辨之而已。蓋煩即熱也。心中鬱々不安者，謂之煩也。若飲食不節，內傷勞後而發熱者，則寸心熱，手背不熱也。蓋外感有餘，則口

鼻之氣俱盛內傷不起則少氣懶言而煩熱作也蓋凡諸虛發熱狀似傷寒不可不辨而治若誤作外感治之一例發汗攻下其害豈勝言哉蓋虛脈雖大按之無力或尺脈多浮大左手寸關或濡或弱或微或濡者乃虛脈也且脈數熱數而有力為實熱數而無力為虛熱也要畧曰平人脈大為虛內經曰陽虛生內熱又曰勞則喘且汗出則氣耗矣夫飲食失節喜怒不調有所勞傷皆損其氣令表則火旺火旺則乘其脾土四支故困熱無氣以動懶於言語動則氣促喘乏或表熱自汗惡風當以甘溫之劑補其中氣滋其真陰其熱自愈大抵勞者溫之損者溫之溫能除大熱最忌苦寒之劑重瀉其脾也且人參黃芪之甘溫乃除熱之聖藥也以東垣補中益氣湯主之少加黃柏以滋腎水更能出入通變而用之如神其效也又房勞陰虛相火發熱者并大病後虛熱皆宜此

湯主之最妙也古有竹葉石膏湯十味溫胆等湯皆治病後煩熱虛熱之藥也要在選而用之矣

辨脚氣

夫脚氣之作必發寒熱或嘔逆狀類傷寒但察其兩足腫嫩赤而腫者溫熱也黃白而腫者寒濕也凡脚浮者主於風濕者主於寒沈濡者主於濕數大者主於熱也然傷寒則無足腫之病以此別之治脚氣方見醫方脚氣門俗詳不錄

辨瘡瘍發熱

經曰諸脈浮數當發熱而洒淅惡寒若有病無飲食如常當發熱有膿也又曰數脈不時則生惡瘡也所以惡瘡初生必寒熱交作不可便以傷寒治之須視病人頭面脊背有無瘡頭若有小紅白膿頭瘡須當仔細辨之凡瘡背而作只起一小瘡也不過二三日則大發也若疔瘡初作全與傷寒相似要當識之也若

一例而發汗或妄投寒涼之藥則誤之矣若識其瘡毒須尋瘡科治之庶不誤也若精氣走散則難救也

辨內傷瘀血發熱

凡人所從高墜下擗撲損傷或被人拳踢所傷或被物相撞有所因一時不覺過至七八日或十餘日則寒熱乃作其腹下少腹疼痛按之不可近者此有瘀血也或時發血上冲則昏逆不省如死之狀良久復甦治法宜復元活血湯或當歸導滯散桃仁養氣湯加蘇木紅花童子小便下其瘀血即愈若不識并妄作傷寒治之而加發汗則誤之也凡有瘀血停畜之處則癰瘡疔不可近也其脈多見芤滿以此別之其傷損藥方俱見袖珍方損傷門宜詳而用之者也蓋肝為血海凡所有瘀血必畜於腹下或水腹之分乃肝部也但小便如常者血証諦也若不識血證之諦而妄攻其血則損元氣夭折人命也慎哉

大頭傷寒

大頭者一日時毒二曰疫毒也蓋天行疫毒之氣入感之而為大頭也若先發于鼻額紅腫以致面目腫盛不用針額上面部焮赤而腫而此屬陽明也或壯熱氣喘口乾舌燥或咽喉腫痛不利其脈數大者普濟消毒飲主之若內實熱甚者以防風通聖散增損主之若發于耳之上下前後并頭角紅腫者此屬少陽也或肌熱日晡潮熱或寒熱往來口苦咽乾目赤痛服蒲瀉宜用小柴胡湯加消毒之藥主之若發于頭上并腦後下項并目後赤腫者此屬太陽宜荆防敗毒散主之若三陽經俱受邪併發於頭面耳鼻者以普濟消毒飲或通聖散增損主之外用清涼散苦散塗之其治法不宜大速攻則邪氣不伏而反攻內必傷人也且頭面空虛之分邪既著空虛則無所不至也所以治法當先緩而後急則邪伏也凡先緩者

且宜清熱消毒如虛人熱益元氣胃虛食少者兼助胃為主待其內實熱盛大便秘結以酒浸大黃下之則宜然而按其毒也此為先後後急之法也蓋此毒先從鼻腫者次腫于目又次腫于耳從耳至頭上絡後腦結塊則止不散必出膿則愈也

普濟消毒飲子

柴胡一錢二分黃連二錢酒炒黃芩一錢酒炒玄參一錢

生甘草一錢桔梗一錢連翹一錢

鼠粘子炒研一錢升麻一錢白芷一錢

馬勃一錢僵蚕炒七分板藍根一錢如無大藍葉代

之或真青黛五分亦可調入某內以代之可也

虛弱人脈虛加人參一錢五分

胃虛食少加白朮一錢五分橘紅一錢五分有

一方加防風荆芥穗各一錢當歸一錢

如大便秘艱者少加酒浸大黃下之

右作一服水二鍾煎至一鍾去滓食後徐服之
就臥以有藥性上行也

荆防敗毒散

羌活一錢獨活一錢前胡一錢柴胡一錢

人參一錢茯苓一錢川芎一錢枳殼一錢

桔梗一錢甘草一錢荆芥一錢

防風一錢五分牛蒡子一錢薄荷一錢

右作一服煎法同前若內熱加酒炒黃芩一錢

熱盛更加酒炒黃連一錢口渴加天花粉一錢

凡頭面腫盛目不開鼻塞胸悶口乾舌燥內外有熱或

咽喉腫痛不利或內實大便秘結其脈洪數煩渴

者宜增損通聖消毒散主之

通聖消毒散

荆芥一錢防風一錢連翹一錢牛蒡子一錢甘草一錢

芍藥一錢當歸一錢薄荷一錢黃芩一錢山梔子一錢

石膏一錢桔梗一錢芒硝一錢內熱甚大便實者用之內

大黃 酒浸止行如內實大便祕者用之內虛便溏者不用量其輕重虛實而用之
麻黃 增寒拘急無汗脉浮數者用之微汗以散表邪之熱也自汗不惡寒者不用
腫不消更加牛旁子一錢黑玄參一錢
或生犀角一錢尤妙

凡時毒頭面紅腫咽噎堵塞水米不下若素有藏府積熱為腫毒疣瘡一切惡瘡紅腫並宜服漏蘆湯

漏蘆湯

漏蘆二錢 升麻一錢半 大黃 酒浸量輕重

黃芩酒洗一錢半 生甘草一錢 藍葉如無以真青黛五分 黑玄參一錢 牛旁子一錢

苦桔梗一錢 連翹一錢

右用水二鍾煎取一鍾去滓溫服若熱甚大便實者加芒硝一錢或二錢取利為度

救苦消毒丸

大黃酒浸 牡蠣煨粉 白僵蚕炒各三錢

石三味為末蜜丸如彈子大新汲水化下一二丸無時服

凡雷頭風頭面疼痛腫痛增寒發熱四肢拘急狀似傷寒以清震湯主之

清震湯

升麻 蒼朮 赤芍藥各二錢

生甘草一錢 蒼朮一錢 青荷葉一個如無新者用乾者

右作一服水二鍾煎至一鍾去粗溫服夫雷者屬震卦也震象仰盂故用荷葉色青中以類象形而治之則效也

清涼救苦散

芙蓉葉 霜桑葉經霜者 白斂 白芨

紫荷車 大黃 黃芩 黃連 黃柏 白芷

雄黃 芒硝 赤小豆 山慈姑 南星

各等分為末用蜜水調塗腫頻掃之或萬病解毒丹生薄荷水磨服半錢并塗腫上亦佳咽噎

腫痛濃磨水魚入喉中亦效或用綠雲散吹之
青黛一錢 鴨砂五分 寒水石一錢

山豈根 紫荷車 玄明粉

硃石各一錢 冰片一分

右為細末以竹管吹入喉中或筋點入痛如

○癰斑治例

凡癰斑有六一日傷寒二日時氣三日濕毒四日
陽毒五日內傷寒六日疔証各別于左要在詳辨
而治之也

一日傷寒癰斑者蓋因當汗不汗當下不下熱毒
蘊于胃中乃癰斑也千金方曰紅赤者為胃熱紫
赤者為熱甚紫黑者為胃爛也故赤斑出者五死
一生黑斑出者十死一生也大抵鮮紅起癰者吉
雖大亦不妨但忌稠密成片紫赤者為難治雜黑
者尤為難也凡斑既出須得脈洪數有力身溫足

煖者易治若脈沉小足冷元氣弱者多難治凡斑
欲出未出之際且與四味升麻湯先透其毒若脈
弱者倍加人參食少大便不實者倍用白朮主之
若斑已出則不宜再升發也又不可發汗之更
增斑爛又不宜早下之則斑毒內陷也如脈洪數
熱盛煩渴者以人參化斑湯主之若消斑毒或以
犀角玄參湯大青四物湯之類如熱毒內甚心煩
不得眠錯語呻吟者以黃連解毒湯加玄參升麻
大青犀角之類主之熱甚煩渴喘咳者解毒化
斑湯主之若斑熱稍退內實不大便譫語有潮熱
者大柴胡湯加芒硝或調胃承氣湯下之曾治一
人傷寒八九日癰斑四肢強鞭昏沉譫語不知人
大便四五日不通以調胃承氣湯一下而愈如未
可下有潮熱煩渴者且與小柴胡湯去半夏加黃
連山梔黃柏枳實根主之或加大青亦佳如無以

大藍葉代之或真青黛代之亦可大抵鮮胃熱胃
爛之毒必以黃連不青犀角玄參升麻青黛石膏
知母黃芩山梔黃柏之類也要在當察病情合宜
而用之矣

二曰時氣發斑者乃天疫時行之氣也人感之則
增寒壯熱身軀拘急或嘔逆或喘嗽或膏中煩悶
或躁熱起臥不安或頭痛鼻乾呻吟不得眠此皆
斑候也先用紙燈照看病人面部膏堂四肢背
心有紅點起者乃發斑也易老曰凡大紅點發于
皮膚之上者謂之斑小紅點行于腠中不出起者
謂之疹蓋疹輕而斑重也大抵一發鮮紅稀朗者
吉若一發如針頭稠密紫赤者凶難治者
乘勢急者發熱一二日便出斑束勢緩者發熱三
四日而出也凡治例必察病人元氣虛實歟之有
力無力為主若脈微弱元氣虛者必先以三白湯

倍加人參以助真氣為主次察斑欲出未透者以
升麻葛根湯主之如胃弱人虛者以四君子湯合
而用之各曰升君湯也若斑不透者直指方加紫
草茸亦佳若斑疹初出有表証增寒壯熱頭痛骨
節痠四肢拘急者中滿胸者以三因加味羌活散
主之或加紫草亦可若斑出稠密或咽喉不利者
犀角消毒飲玄參升麻湯之類主之凡斑出脈數
大煩渴者人參化斑湯主之若發熱或潮熱不解
者以小柴胡湯隨証增損用之或人參敗毒散皆
可出入用之凡斑出而嘔逆者必用陳皮半夏生
薑黃連之類若喘嗽不止者必用知母貝母瓜
仁黃芩石膏之類若咽痛者必用連翹牛蒡子黑
玄參升麻苦桔梗甘草之類若斑出而毒盛者必
用犀角大青玄參黃連黃芩山梔石膏知母
之類主之也此方謂之紅眼兒瘡氣等名色又多

大義不為無有曉文

落一葉

所避忌香臭蓋 觸之也凡斑已出未出之時切
不可便投寒涼之藥以攻其熱并飲涼水等物恐
傷胃氣先作嘔吐也又不可發汗攻下虛其表裏
之氣其害尤甚也若脈弱者必先有房事要在審
問之如有夾陰者必先即真氣為之要也
其無根失守之火聚于膏中上獨薰肺傳於皮膚
而發斑點但如蚊蚋咬痕然非大紅點也喫
調中溫胃加以曲香妙白為藥主之寒甚脈微者
以大建中湯主之則真陽自回因火自降而病乃
愈此治本不治標也大抵發斑身溫足暖脈數不
者為順身涼足冷脈微細者為逆也凡治斑不可
專以斑治必察脈之浮沉病之虛實而治之則為
善治斑也若孟浪不察一察論之而曰不誤於人
者則未之信也
治陽症發斑之劑

升麻葛根湯
凡發斑欲出未出者以此湯升發之若已出斑者
不可用也

升麻三錢 葛根三錢 白芍藥三錢
炙甘草一錢

右作一服水二鐘煎至一鐘去粗通口服直指方
加紫草茸一錢半治斑不透出者若脈弱加人參
二錢胃虛食少加白朮二錢如腰痛倍加炒白芍
藥和之

三因加味羌活散

治斑疹初出增寒壯熱或頭疼身痛昏中不利者

羌活上 獨活中 柴胡中
前胡中 枳殼中 桔梗中
人參中 茯苓中 川芎中
升麻上 白芍藥中 甘草下

生薑五片

右煎法同前

若斑未透者加紫草茸一錢半若脈虛者倍加人參
參弱食少者加白朮二錢大便自利者亦加白朮
未去枳殼若斑出盛或煩熱或咽痛者加荊芥薄荷
荷防風牛蒡子連翹各一錢五分主之若內熱口
苦心煩者加黃芩黃連各一錢半若熱甚舌燥煩
渴者更加石膏二錢知母一錢若喘嗽者亦用之
若有痰熱中煩胸加括萎仁一錢半若斑毒盛
出者須加玄參犀角各一錢以消其毒也

人參化斑湯

治斑出熱盛脈洪數舌燥口乾煩渴者或譫語或
氣喘或惡熱表裏俱熱日晡潮熱並皆治之

人參二錢

石膏五錢熱甚者用七錢

知母二錢

甘草一錢

粳米半合

右用水二鍾煎至一鍾濾清溫服之

加味小柴胡湯

治發斑肌熱潮熱或往來寒熱口苦咽乾目眩耳
聾身痛膏滿心煩或乾嘔或煩渴或喘或咳嗽不
止者宜服之

柴胡上

人參中

黃芩中

半夏中

甘草下

黃連中

升麻中

白芍藥中

玄參中

生薑三片

大棗二枚

煎法同前

若口燥渴去半夏加括萎根一錢半若咽痛加苦
桔梗二錢倍用甘草若嘔者還用半夏去括萎根
加生薑減少甘草主之若斑毒出盛加犀角屑一
錢牛蒡子另炒研一錢毒甚者更加大青二錢若
胸中煩悶不利加瓜蒌仁一錢半若痰火上喘加
青更一錢知母貝母各一錢半瓜蒌仁一錢桑白
皮一錢主之若喘而舌燥煩渴脈數大者更加石

膏三錢若喉痛齒滿不利者加枳殼桔梗各一錢
羊若心下痞軟加枳實一錢羊黃連倍之

治發斑癰疹或咽喉腫痛或毒氣壅盛者

真犀角屑上 牛旁子新尾上炒香研破用中
荆芥穗中 防風中 甘草中

右用水二鍾煎至一鍾去粗溫服
若咽痛加苦桔梗二錢甘草倍之玄參二錢主之
或連翹薄荷皆可加之內熱者須用黃芩黃連各
一錢主之

解毒防風湯

治發斑癰疹痒痛者

防風上 地骨皮中 黃芩中
赤芍中 枳殼中
牛旁子中炒加前一方加當歸黑玄參各一錢

當歸丸

治發斑內寒大便不通者

當歸五錢 甘草 黃連

大黃各一錢半

右將膏飯用水一鍾煎成濃膏子以三杓為細末
和勻為丸如梧桐子大每服五十九溫白湯下以
利為度未利再服之

黑膏

治濕毒時氣發斑如錦紋者

生地黃四兩 淫蘆豉半升

右二味以脂一斤合煎之至濃汁入雄黃五分
射香二分攪勻丸如彈子大自湯化下未効再服
漏蘆連翹湯治熱毒發斑無汗大便實者服之

漏蘆 黃芩 連翹 升麻 白欬

甘草各一錢 枳實二錢 大黃三錢

若熱甚者加芒硝二錢用水二鍾煎至一鍾下芒硝再煎一二沸去粗溫服如人行五里地不効者再服一次以利為度

苦酒鷄子湯

治熱毒發斑或咽痛或聲音不清或心煩不眠

猪膽

米醋各三合 鷄子一枚

石三味合煎三四沸人壯者盡服之弱者須煎六七沸分為三次服之汗出乃愈

黃連一物湯

治熱病發斑豆瘡者

黃連一兩

石用水二鍾煎至一鍾去粗通口服

青黛一物湯

治赤斑熱毒甚者

真青黛二錢以凉水調下

五物木香湯

治豌豆瘡煩疼者

青木香二錢

黨陸香 檳榔石

丁香各一錢

麝香半分

右用水二鍾再至一鍾去粗溫服如熱毒盛者加犀角屑一錢如無以升麻一錢半代之若病輕者去麝石神驗

孫兆山梔散

治熱毒火盛遍身發斑甚者發瘡如豌豆

牡丹皮二錢半 山梔仁二錢半 黃芩二錢半

大黃二錢半 廣黃二錢半 木香五分

石水二鍾煎至一鍾去粗溫服

治斑出豌豆瘡塗土乃用芒硝為細末和豬膽汁塗瘡上勿動之待其脫落無痕仍臥黃土末上良若病

小便淡有血者內壞瘡皆黑靨不出膿者死
犀角大青湯

治斑毒熱甚煩疼者

大青五錢

梔子十枚

犀角屑二錢半

香豉一撮

石煎法同前

黃連解毒湯

治發斑熱甚心煩不得眠

黃連三錢

黃芩二錢

黃柏二錢

山梔子二錢

石用水二鍾煎一鍾去粗溫服若斑毒盛者加大一
青二錢或真青黛二錢調入湯內服之亦妙凡脉
弦數內外熱甚譫語者合小柴胡湯主之若脉洪
數內外熱甚舌燥煩渴者合化斑湯主之
加減三黃石膏湯
治熱發斑紫赤煩渴脉洪數者

黃連上

黃芩中

黃柏中

山梔子中

石膏中

知母中

升麻中

赤芍藥中

玄參中

甘草下

粳米二撮

石煎法同前一方斑毒甚者加大青二錢犀角屑
一錢乃消熱毒斑瘡之藥也
一方時行發斑瘡以好蜜塗瘡上良久方用蜜煎
升麻中

治內傷寒與陰症發斑之劑
通脉四逆湯

治陰症發斑身冷無脉斑黑昏沉厥逆不知人事
者宜服之

乾薑一錢半

附子五錢

炙甘草一錢半

人參二錢半

石作一服水二鍾煎至一鍾入童子小便猪膽汁

各一小盞肉羊盞再煎二三沸去粗溫服之如乾嘔躁煩欲冷水者以此湯於冷水中浸冷與之則愈

陽毒升麻湯

升麻

當歸

炙甘草各二錢

川椒一錢

鯀甲醋炙一錢雄黃五分

右用水二鍾煎至一鍾去粗溫服

調中湯

蒼朮一錢半

陳皮

砂仁

藿香

白芍藥炒

甘草炙

桔梗

半夏

白芷

羌活

枳殼各五錢

川芎七分

麻黃五分

桂枝五分

生姜三片

右煎法同前

大建中湯

當歸中

白芍藥中

白朮中

麥門冬上

黃耆上

甘草下炙

肉桂中

肉蓯蓉中

人參上

川芎中

附子中

半夏中

熟地黃中

茯苓中

生薑三片

大棗二枚

右煎法同前

人參三白湯

白朮中

白茯苓中

白芍藥中

人參上

生薑三片

大棗二枚

右煎法同前若脈沉足冷加附子半錢

治傷寒黑斑曾治一人傷寒七八日目服涼藥不過遂變身涼手足厥冷通身黑斑惟心頭溫煖乃伏臥也診其六脈沉細昏沉不知人事亦不能語言狀似尸厥遂用人參三白湯加熟附子半錢乾姜二

錢水二鍾煎一鍾與之服下待一時許斑色漸紅
手足漸暖而甦醒也復有餘熱不清此伏火後作
也以黃連解毒竹葉石膏湯調之而愈

○傷寒發黃治例

凡發黃有八者一曰瘧熱在裏但頭汗出到頸而
還身無汗渴飲水將求小便不利此為瘧熱在裏
汗出不越必發黃也其黃如橘子色明而黃也茵
陳湯主之

二曰濕熱發黃者一身盡疼發熱身色如似薰黃
黃者暗而不用也其候口渴小便不利者茵陳五
苓散等方加利小便之藥主之

三曰寒濕發黃者病人身疼發熱而黃頭痛鼻塞
而煩其脈大自能飲食腹中和無病病在頭中寒
濕以葶內鼻中則愈用瓜蒂散搐鼻中取下黃水
或以神木湯如麻黃茵陳微汗之亦可

四曰瘧氣發黃者病人心下滿鞭按之不痛者是
也宜半夏瀉心湯加茵陳枳實之類主之若小便
不利亦宜五苓散加茵陳山梔子之類主之蓋瘧
消則黃自退也

五曰結毒發黃病者心胃滿鞭按之痛或卒不可
近大陷毒湯加茵陳主之蓋結去則黃退也

六曰畜血發黃者其人身黃脈沉結少腹滿鞭小
便自利大便色黑其人如狂此為畜血在下焦也
宜桃仁養氣湯主之甚者以抵當湯下之蓋血下
則黃自退也

七曰內傷寒者其人脾胃素虛或食寒物寒食結
搏停滯不散中則憂寒而發黃也或嘔逆或腹滿
或自利小便少者宜調中湯加茵陳主之或理中
湯加枳實青皮陳皮茵陳之類主之如逆冷脈沉
者必加熟附子溫之則愈也

八曰陰症發黃者其人兩手脈沉細身肢逆冷
 肉上粟起或氣促嘔悶舌上白胎而滑遍身發黃
 或時煩躁面赤或發投泥水中或歎坐井中此除
 黃也宜附子理中湯或四逆湯少加茵陳主之凡
 治陰黃須兼以熱湯溫之或以湯盛盆中以病人
 坐于上以布蘸熱搭其黃上乃愈大抵發黃則益
 麵相似濕熱發熱者則多有之內傷陰黃則間
 有之也要在詳辨而治不可一論而論之也脈經
 曰脈沉渴飲飲水者必發黃也經言兩明病無汗
 而小便不利心中懊惱必發黃又被火額上微汗
 出小便不利必發黃大抵身熱煩渴無汗小便不
 利者必發黃也凡發黃寸口近掌無脈及口鼻之
 氣冷者不治也

○治瘧熱發黃之劑
 茵陳湯治瘧熱發黃渴飲水將水小便不利者

恐誤或有脫文

方中即麻黃連翹赤小豆湯

茵陳三錢 梔子三錢 大黃三錢量病人
 壯怯邪熱輕重酌量用之
 石用水二鍾煎至一鍾去粗溫服若小便利如皂
 角汁色狀正赤一宿當減黃從小便去也

梔子蘗皮湯
 治傷寒瘧熱在裏身必發黃
 大黃二錢 赤小豆半合連翹二錢即連翹根
 杏仁七箇去皮尖炒 生梓白皮三錢
 大棗二枚 生姜二片 甘草一錢
 右作一服用潦水二鍾煎至一鍾去沫滓溫服

孫兆方
 治傷寒時氣瘧熱發黃
 草龍膽一錢 生犀末二錢 川升麻二錢
 山茵陳三錢
 右為細末水一鍾入真生乳一鍾同煎至七分連

未頃暖重者不過再一劑及治赤斑出兼發黃者神效

山茵陳散

治瘧熱發黃

山茵陳

梔子各五錢

枳殼二錢

石用水二鐘煎至一鐘去滓溫冷任服如大便秘實者加大黃二錢若小便不利者加水通滑石赤茯苓各一錢五分

千金茵陳湯

治身軀面目盡黃如金色者

茵陳三錢

黃連二錢

黃芩一錢半

大黃二錢

甘草一錢

人參一錢

梔子二錢半

秦艽一錢

右煎法同前若目睛黃加草龍膽一錢治發黃身面目萎黃如金色小便如膿者藥汁諸藥

不效方

茵陳蒿四錢

梔子三錢

黃芩二錢

大黃三錢

紫柏三錢

升麻二錢

龍膽草一錢

右煎法同前若怯弱人云大黃加生地黃倍山梔子五分凡大便不安者亦云大黃山梔子二味

不茵陳湯

治瘧熱內實發黃如金色肌熱口苦咽乾大便實

小便赤少者

茵陳上

大黃以實者用三錢內虛者不用

黃柏中

白朮中

黃芩中

甘草下

茯苓中

瓜蒌根中

柴胡中

枳實中

梔子中

前胡中

生姜三片

右煎法同前若心下痞滿加黃連小便不利加木

通腹滿加厚朴主之
枳實梔子豉湯

治內傷飲食停滯或停酒飲濕熱生疹而發黃心
下痞鞭而悶者或新差後食而痞者

枳實三錢 梔子二錢 豉豆豉一百粒

加茵陳二錢

石煎法同前若大便秘結不通脈實有宿屎不去
者加大黃三錢下之

茵陳丸

治傷寒瘧熱或時氣發黃并瘕氣瘴氣瘧瘧皆治

茵陳

梔子

芒硝

常山酒蒸

杏仁各三錢

鼈甲醋炙二錢

大黃酒蒸五錢 香豉五錢

右為末以錫和丸如梧桐子大每服三丸溫白湯
下以吐利為度大抵此藥熱實大便不利人壯者

乃可用之人弱者不可下也

柴胡甘中湯

治傷寒發黃熱輕者

柴胡五錢

甘中二錢半

白茅根一握

用水二鍾煎至一鍾溫服

茵陳犀角湯

治傷寒時氣發黃并發斑者

茵陳

草龍膽

生犀末

升麻各等分

右四味共搗為細末每服二錢真牛乳一盞水一
鍾服重者不過再服一次及治發斑神效

經驗解毒山茵陳散

治發黃并發斑

山茵陳五錢

梔子三錢

枳殼二錢

升麻一錢五分

甘中一錢

石煎法同前若大便不通加大黃二錢小便不通加木通二錢斑毒不消加犀角屑大青主之

秦九茵陳湯

治傷寒瘀熱發黃如橘子色遍身黃者

茵陳上

黃芩中

山梔中

升麻中

石膏中

知母中

黃連中

秦艽中

甘草下

牡丹皮下

麻黃中

右用水二鍾煎至一鍾去滓溫服如內實不大便者加酒浸大黃三錢

柴胡加山梔子湯

治發黃脈弦數口苦舌滿心煩發熱或往來寒熱或日晡小有潮熱或耳聾眼痛者

人參中

柴胡上

黃芩中

半夏中

甘草中

山梔子中

茵陳蒿上

生姜三片

右用水二鍾煎至一鍾去滓溫服若渴而口燥者去半夏加栝蒌根二錢若脅滿腹中煩加栝蒌實二錢若小便不利加茯苓滑石一錢半木通一錢以利之若膏中痞滿加枳殼枳實各一錢心下痞滿加枳實黃芩各一錢主之若口乾津液不足小便少者加麥門冬二錢若陰虛夢遺小便頻數者加知母黃柏各一錢半主之若熱多而黃不退者加秦艽一錢半目黃如金色者加草龍膽一錢主之

茵陳五苓散

治濕熱發黃煩渴引飲小便不利或大便反快者

白朮上

白茯苓上

猪苓中

澤瀉中

茵陳蒿上

官桂少用引經

石作一版用水二鍾煎至一鍾濾清溫服一方五
苓為末濃煎茵陳湯調下二三錢亦可若濕熱小
便黃者加木通山色子黃柏各一錢主之口乾加
葛根二錢煩渴更加滑石二錢若發熱口苦加柴
胡葛根各一錢半黃芩一錢主之一方加秦艽黃
柏各一錢主之蓋能除熱而消黃也一方治發黃
煩渴心不寧小便不利者以辰砂益元散濃煎茵
陳湯下二三錢

加味茯苓湯

治濕熱發黃煩渴引飲小便不利身目俱黃或逆
不渴每卧

白茯苓上

澤瀉中

茵陳上

豬苓中

黃連中

山色仁中

蒼朮上

白朮上

黃柏中

陳皮中

枳實中

防己下

青皮下

生姜三片

右煎法同前凡發熱脈弦數口苦身煩滿加柴胡
二錢若往來寒熱亦加之若嘔逆者加半夏一錢
生薑倍用之若惡寒加桂五分自汗惡風者加桂
枝五分若大便秘利不安者去枳實防己山色子
宜倍用蒼朮白朮黃連黃柏如用須炒過少用之
若無內熱者亦且減之

治寒濕發黃之劑

瓜蒂散

瓜蒂二錢

母丁香一錢桑葉四十九粒

赤小豆五分

石為細末每夜于鼻中搐之取下黃水則愈
神不渴見太陽表證例

治內傷寒發黃之劑

茵陳蒿皮湯

治陰症身黃、脉沉細遲、發熱手足冷、喘嘔煩躁、不渴者、服之。

茵陳一匙 橘皮一匙半 生姜五片

白朮三匙 半夏一匙半 茯苓一匙半

乾姜一匙炮

右用水二鍾煎至一鍾去粗通口服

小茵陳湯

治發黃、脉沉細遲、四肢冷者

附子一個炮切作八片 炙甘草一匙半

茵陳二匙

右煎法同前

茵陳四逆湯

治陽黃、脉沉遲、肢節逆冷、腰以下自汗

附子一個製如前

乾姜炮一匙半

茵陳二匙

右煎法同前

茵陳茱萸湯

治陽黃、脉伏不出者

吳茱萸一匙 當歸一匙半 附子製如前一個

木通一匙

人參二匙

乾姜炮一匙 茵陳一匙

右煎法同前

茵陳理中湯

治陰寒、發黃、腹痛或自利者

理中湯見自利條下加茵陳一分主之如小便不利加五苓散合而用之脉沉寒甚足冷者必加附

子半個主之

一方擦黃法

用茵陳蒿一把同生姜一大塊搗爛於膏堂前擦之及擦四肢亦可凡痞氣結滯畜血等方並見各條下宜詳本條而治之

○傷寒發狂治例

夫發狂為傷寒古惡之候其例有九要在詳辨而治之故各附錄于左以便覽焉
一曰陽盛發狂者內經曰陽盛則四肢實今則能登高也然盛於身則棄衣而走難經所謂重陽者狂也大抵熱盛則神昏狂妄罵詈不避親疎甚則喻垣上屋登高而歌此神明之亂皆非素能為之乃病之便然凡欲察脈施治必先以涼水微噴其面或以硝水法搭脊中甚者必以玄明粉寒水石散先與之以折其熱勢取其稍定乃可察脈若脈之實大滑大便秘澀胸腹滿艱者急以大承氣湯倍加芒硝下之如勢輕未可大攻者且以三黃石膏湯或梔子仁湯三黃瀉心湯之類主之
二曰陽明經病欲作汗而狂者經曰病人欲食小便反不利大便秘其人骨節疼身熱然如有熱狀奄然發狂濺然汗出而解此水不勝穀氣與汗

共併故發狂脈緊者則汗出而愈也
三曰畜血發狂者經言傷寒六七日其人發狂者以熱在下焦少腹當鞕滿小便不利者以有畜血也宜桃仁承氣湯甚者以抵當湯下其畜血乃愈又輕者其症如狂唇舌青口燥或但欲漱水而不欲嚥下小便自利大便色黑此血證諦也宜下血則愈抵當湯主之
四曰驚狂者經言傷寒脈浮醫以火迫劫之必驚狂起卧不安宜桂枝救逆湯主之
五曰濕病發狂者乃伏寒得春時溫氣而發也諸脈大皆滿多痰發狂者宜升麻湯加山梔子仁吐之若脈浮數壯熱不得汗出者六神通解散汗之表裏俱熱實以宣明雙解散汗之下之
六曰熱病發狂乃發于冬暑之時其熱尤甚若發狂急汗脈數大者須用通解散汗之熱甚者三黃

石膏湯或如鮮散主之凡溫病熱病發狂得汗者
生不得汗者死脉小逆冷者不治也大抵傷寒溫
熱病不得汗出則發狂也要在審察而汗之
七曰陽毒發狂者蓋其人素有積熱于內因患傷
寒又失于發汗誤下其熱蘊而為毒脉洪大而
數尤疾之甚也其候舌卷焦黑唇口焦黑鼻如烟
煤或面赤咽痛狂言自利或發斑頭面皆狀如
錦文或如豌豆赤豎之類而發狂者七日內可治
七日之外多難治也宜陽毒升廣湯犀角大青湯
三黃石膏湯梔子仁湯之類選而用之大抵與陽
盛發狂治例同也因以發斑咽痛故曰毒也
八曰陽厥發狂病發狂內經病能論曰陽氣者因暴
折而難決故善怒也病名陽厥蓋陽氣暴折鬱而
多怒則發狂也治以鐵落飲者以金制木之法也
兼以平肝降火之劑主之若兼以痰火內盛而狂

者宜竹瀝湯等方治之

九曰陰症煩躁如發狂狀非狂也外臺秘要曰陰
極發躁欲坐井中欲投泥水中臥或欲向陰處
坐躁亂不安亦如狂也但手足逆冷脉息沉微細
遲雖煩渴不能飲水者是也宜霹靂散附子湯甚
者火熯散金液丹之類救之詳見煩躁條下蓋不
可一例以陽狂治也大抵審脉症仔細而詳辨之
設若差遲則人之命在頃臾而已

○治陽毒發斑發狂之劑

陽毒升麻湯

治傷寒傳變不解變成陽毒身重腰脊痛煩悶不
安狂言亂走見鬼或吐血下利其脉浮大而數面
赤斑如錦紋咽喉痛吐膿血六日可治七日不
可治也此方即升廣湯無山危子也

升麻二錢

甘草一錢

當歸一兩半

川椒五分 雄黃五分 鼈甲醋炙二分

梔子仁一匙五分

右以咀作一服水二鍾煎至一鍾去粗溫服如人行五里再一服溫覆取汗蓋汗出則毒出也

升六物湯

治陽毒發狂而喘者

升麻二匙半 大青三匙 梔子仁二匙半

杏仁去皮尖炒一匙黃芩二匙半葱白三莖

右煎法同前

加味升麻湯

治熱病發狂不得汗出心煩不眠者

升麻三匙 蒼朮一匙 麥冬去心二匙

麻黃二匙 黃芩一匙半 大青一匙

石膏三匙 淡竹葉七片

右煎法同前溫覆取汗

升麻梔子湯

治陽毒發狂發斑治溫病發狂用此湯探吐之

升麻一匙半 柴胡三匙 梔子仁二匙半

生地黃五匙 右煎法同前

陽毒升麻湯

治發斑赤紫狂言下利膿血咽喉疼痛

升麻二匙 犀角屑二匙 射干一匙半

桔梗一匙半 甘草一匙半

右煎法同前若斑毒盛者加大青二匙

玄參升麻湯

治發斑咽痛

升麻 玄參 甘草

桔梗各二匙五分

右煎法同前加犀角一匙半各犀角玄參湯

梔子仁湯

治陽毒發斑發狂煩躁面赤咽痛者

梔子仁上

赤芍藥中

大青中

升麻中

黃芩中

石膏上

杏仁去皮尖下

紫胡上

甘草中

淡豉一百粒

知母中

右煎法同前

加減三黃石膏湯

治陽毒熱病發狂不得汗熱甚者

黃連上

黃芩上

黃柏上

石膏上

知母中

甘草中

升麻中

葛根中

赤芍藥中

麻黃中

豉一百粒

右用水二鍾葱白二莖生姜三片粳米撮煎至

一鍾去滓通口服以衣被溫覆汗出則愈

豬苓散吐法

治溫病身不熱煩渴發狂小便不利

以鷄子清同白蜜一匙新汲水下

一方治發狂用草龍胆一味為細末入鷄子清同

白蜜涼水調下二匙

一方用玄明粉一匙寒水石一匙牛黃一分硃砂

末一匙以白蜜一匙新汲水下

萬病紫金錠子即解毒丹加雄黃辰砂二味治發狂亂

走胡言者新汲水磨化半錠與之良久未効者再

服半錠神効苦咽喉痛者就以水塗痛處亦可

葛根黃芩湯

治陽毒熱甚心煩胡言亂道面赤渾身如火煩躁

目赤項背強直坐臥不安大小便不通其脈洪大

而數無汗者

葛根

黃芩各三錢

山梔子

柴胡各二錢

枳殼

羌活

川芎

牡丹皮

滑石

甘草各二錢

升麻一錢半

生薑三斤

藍頭二兩

水二鍾煎至一鍾去粗通口服溫覆之取汗出則止未汗再服之

凡小柴胡湯見少陽例大柴氣湯調胃氣湯並見瀉熱例白虎湯見太陽例皆發狂宜用之方如熱甚狂言者小柴胡合白虎湯或白虎合解毒湯皆可選而用之也黃連解毒湯方見發斑條下

硝水漬法

治熱極發狂凡傷寒熱甚者可用之

淨朴硝一升新汲水一桶將硝研細末和水中以真青布方圍一尺三寸塊浸於硝水中微攪半乾搭病人膏堂并後心上頻易冷者搭之如得睡汗出乃愈凡熱極甚此結不能解者以地龍水與之方見結毒例或者置病人於涼水浸

之或冰浸之尤妙浸後作寒汗出乃愈

玄明粉法

治熱甚心神錯亂發狂用玄明粉二錢寒水石一錢黃連末一錢真珠末五分硃砂末五分鷄子清一個白蜜一匕新汲水調下

萬病解毒丹加雄黃硃砂者一名紫金錠子用生薄荷汁磨下半錠病甚人壯者用一錠嚥下治熱毒狂亂神效若治陽毒熱盛咽痛亦良磨濃汁點喉中蓋服之效

○傷寒心下滿例

凡心下滿者正在心之下胃之上也此自滿而非下之所致若下之而致滿者此為痞氣別有條也凡心下滿以手按之振之則散而軟者此虛氣也

不發熱者以木香和中湯主之若發熱者以小柴

胡加枳實一錢去黃芩加姜炒黃連一錢減人參
一半主之若按之汨汨有聲而軟者此有停水也
若按之硬痛者有宿食也若手不按而痛者其人
喜忘者畜血也各有本條宜詳審而治之凡少陽
脈弦口苦發熱心下滿者以小柴胡湯加枳實黃
連各一錢主之若寒在胃中心下滿而煩飢不能
食有宜瓜蒂散吐之經曰陽明病心下鞭滿者不
可下下之則利不止者死又曰脈浮大心下滿鞭
有熱屬臟者攻之按此言屬藏者宿屎在藏也故
可下之矣若食在胃口未入于胃且未可下也要
在命而已方見痞氣條下

○傷寒欬例

凡表寒欬嗽者脈浮惡寒身疼拘急而無汗也麻
黃湯或三拗湯汗之疼啞如膠者金沸草散汗之
若以有熱者參蘇飲去不香人參加桑白皮杏仁

麻黃汗之亦佳但察天時與病情斟酌而用之也
若表寒未解心下水飲乾嘔發熱而欬者小青
龍湯主之若虛弱人胃感風寒而欬嗽有痰或惡
風頭疼乾嘔者宜人參杏子湯主之凡傷寒三四
日傳少陽經脈弦口苦發熱而欬嗽者小柴胡湯
去人參天冬生薑加五味子十五箇乾姜五分主
之若發熱昏中煩滿而欬者加瓜蒌仁去殼炒二
錢若胸膈痞滿發熱而欬者加枳殼桔梗各二錢
主之凡少陰病脈沉四逆而欬者四逆散加乾姜
二錢細辛一錢五味子十五箇主之若四肢沉重
疼痛自利而欬者此裏有水也真武湯主之按小
青龍湯治表寒停水之藥也真武湯治裏寒停水
之藥也要在命而用之矣凡發熱脈弦數口苦咽
乾口渴或往來寒熱而欬嗽者小柴胡湯加五味
子知母貝母麥門冬天花粉之類主之云半夏也

柳烏夜切折也

三拗湯

生甘草

麻黃不去節杏仁不去皮尖

人參杏子湯

人參一錢半

半夏一錢半

茯苓二錢半

細辛五分

乾姜五分

甘草炙五分

官桂五分

芍藥一錢半

五味子一錢

杏仁去皮尖

生薑三片

右用水二鐘煎取八分臨卧徐令服若脈浮緊惡寒無汗加麻黃二錢以汗之按此即小青龍湯加

人參杏仁也

生薑五片

右煎法同前其餘藥方以見各條不錄也

○傷寒喘例

凡表有寒發喘者脈浮緊惡寒身疼無汗也宜麻黃湯汗之若表有風發喘者脈浮緩惡風自汗也宜桂枝湯加厚朴杏仁主之凡內有寒心下有水氣乾嘔發熱而喘或欬嗽者小青龍湯主之凡發汗微汗出而喘無大熱者麻黃杏仁甘草石膏湯主之凡太陽病誤下之脈促者表未解也喘而汗出者葛根黃芩芍藥連湯主之凡陽明病內實不大便腹滿短氣發潮熱而喘者大柴胡加厚朴杏仁湯主之或小承氣湯下之亦可凡陰症發逆脈沈細而微氣促而喘無汗者可治宜四逆湯加五味子杏仁主之若冷汗如油或汗出髮潤或額汗出如珠不流者皆不治也凡虛人脈伏若手足逆冷

而喘者五味子湯主之凡暴感風寒脈浮無汗而喘者蘇沉九室湯主之凡熱盛有痰脈弦數而喘不可汗不可下以小柴胡湯加知母貝母瓜蒌仁知之也膏滿者更加枳殼桔梗心下滿者加枳實黃連舌燥飲水而喘者加知母石膏主之也凡病目睛直視或上視喘滿者死矣

麻黃石膏湯

麻黃三錢

杏仁三錢去皮尖炒用

石膏五錢

甘草一錢

右用水二鍾煎至八分通口服近世秘方加細茶一撮桑白皮一錢五分各五虎湯定喘喘如神其效矣又名萬應化痰湯此乃劫劑也凡虛人自汗盜汗者不宜用也

葛根黃連黃芩湯

葛根二錢

黃芩二錢

黃連二錢

甘草一錢

右煎法同前

五味子湯治喘而脈伏者

人參二錢

五味子十五个麥門冬二錢

杏仁一錢五分

陳皮二錢

生姜七片

大棗二枚

右煎法同前

又方治喘而氣促者

橘紅二錢

桔梗二錢

紫蘇葉一錢半

五味子十五箇

人參三錢

杏仁一錢

桑白皮一錢半

右煎法同前

蘇沉九室湯

桑白皮上

百甲下

天伏皮下

官桂下

麻黃中

薄荷下

陳皮上

紫蘇中

杏仁去皮尖炒中

生薑三片

烏梅半箇

右煎法同前其餘藥方以見別條不錄也

加減瀉白散

治煩熱胎暈不利止氣喘促口乾或數者

桑白皮二錢

知母一錢半地骨皮一錢

橘紅一錢半

細黃芩一錢五分

貝母一錢半

桔梗一錢半甘草一錢半

瓜蒌仁一錢五分去壳

右煎法同前

古人云諸喘為惡故非輕也華陀曰盛則為喘者蓋非肺氣盛也乃肺中之邪火盛也取以瀉白者浮肺中之火也非浮肺也又如浮心湯非浮心也乃瀉心下之痞滿者也衛生堂鑑曰凡看文字有餘當認作不疑者蓋受病為不疑病氣為有餘也

○傷寒心下悸例

凡悸者一曰怔忡也然心中一動惕而不安也且氣虛而悸者故經曰傷寒二三日心中悸而煩者以小建中湯主之也凡心下悸者宜四逆散加茯苓主之也蓋凡飲水過多而水停心下悸者然心屬火而惡水也若水氣乘心而惕動悸則不安也宜茯苓甘草湯主之或用五苓散分利其所謂發汗過多者其人則及午自冒心下悸惕欲得按者宜用桂枝甘草湯主之凡厥而心下悸者此有水也亦宜茯苓甘草湯主之凡汗下後內虛而悸者小建中湯或人參三白湯主之若脈沉微者真武湯主之也

小建中湯

治傷寒二三日心中悸而煩者

桂枝一錢

芍藥五錢芍藥炒五錢

膠飴羊合

大棗二枚 生姜三片

右用水二鍾煎至一鍾下膠飴更上火煎消去滓
溫暖凡嘔吐者不可用此湯以甘甜故也凡吐
涎者不可用蜜得甜則逆上也中脘痞滿者不可
用甘能緩而不散也凡陽虛自汗加黃芪二錢名
黃芪建中湯若脈沉腹痛足冷者加熟附子三錢
名附子建中湯若血虛腹痛加當歸身二錢名當
歸建中湯夫建中者立也蓋中氣不足以此重立之
也宜詳而用焉

桂枝甘草湯

治發熱多又手自冒心者

桂枝四錢

甘草炙二錢

石用甘瀾水二鍾煎至一鍾溫服汗多則心虛欲
得手按之也凡用甘瀾水取其揚之無力不助腎
邪而剋心火也作甘瀾水法以水一大盂用杓揚

之則水上起珠子泡五七千顆相逐而取用之也

真武湯

四逆散俱見以陽症條下
三白散見發熱條下

茯苓甘草湯

治心下停水而動悸者

茯苓二錢

桂枝二錢

甘草炙一錢

生姜五片

傷寒身振例

右用甘瀾水二鍾煎一鍾溫服

凡振者身振而動搖也蓋發汗或吐或下之後
過致損血氣虛極而作也經曰傷寒若吐若下後
心下逆滿氣上沖齋起則頭眩身振動搖者
茯苓桂枝白不甘草湯主之又曰太陽病發汗不
解其人仍發熱心下悸頭眩身振動振之欲擗地

真武湯主之。大抵氣血俱虛，不能榮養筋骨，其身不能主持，故為之振搖也。須大補血氣，則可矣。曾用人參養榮湯，主之有效。又一人身搖不得眠者，以十味溫膽湯倍加人參治之，遂愈。思矣。

○傷寒戰慄例

凡戰主外，其人森然寒慄，而身戰也。慄者主內，乃心戰也。內經曰：寒之傷人，使人毫毛畢直，鼓顙戰慄而無汗，按之表寒而戰慄也。經言病有戰而汗出，因得解，其脈浮而緊，按之反芤，此為本虛故當戰而汗出也。又曰：脈陰陽俱停，以三部浮沉遲數，脈同等，必先振慄汗出而解也。若脈浮數，按之不芤，其人本不虛者，則汗出而解，不發戰也。夫戰者，陰陽相爭，邪氣將出，邪正交爭，其人本虛，是以發戰。且正氣勝則戰已發，熱汗出而解也。若正氣不能勝邪，雖戰無汗，為之難治。若待半日或至夜

有汗者為愈也。凡小柴胡湯症，而以他藥下之，常胡症仍在者，後與小柴胡湯，服之良久必蒸蒸而振，寒發熱汗出而解也。若不發戰而心慄者，此陽中為邪，必內慄也。凡正氣怯弱，寒邪在內，必為慄也。蓋戰者，正氣勝邪欲解也。且慄者，邪氣勝正，故為重也。凡傷寒六七日，欲解之時，必戰而汗出，若不發戰，但心慄，鼓顙身不戰者，已而遂成寒逆，不得解也。者以其陽氣內盛，正氣極虛，須用大建中湯主之也。

○傷寒腹滿例

凡腹滿者，腹中脹滿也。經言腹滿不減者為實，時滿時減者為虛也。若以手按之堅鞫而痛，不可按者，滿實可按，可揉，內軟者，虛也。要畧曰：腹滿時減，復如故，此虛寒從下上也。宜理中湯加厚朴、木香、主之。凡腹滿屬大陽或吐食不下者，理中湯加藿

香厚朴陳皮半夏下香之類主之凡發汗後腹脹滿者厚朴甘草半夏人參生薑湯主之凡吐後腹脹滿內實者小承氣主之凡下之後心煩腹脹滿臥起不安者梔子豉湯加厚朴主之凡少陰病六七日不大便腹脹滿者急下之宜大承氣湯凡發汗後不解腹脹滿者急下之宜大承氣湯凡潮熱腹滿短氣而喘內實者宜下之以大柴胡湯加厚朴凡腹脹太實大滿者必以大承氣湯下之凡心腹滿鞭而痛手不可近者必有畜血也又當詳之自有本條也大抵要在辨其虛實或血或屎而已

○傷寒腹痛例

凡腹中痛可按可揉者內虛也不可揉者內實也經曰太陽病下之早因爾腹痛者屬大陰也桂枝加芍藥湯主之太實痛者桂枝加大黃湯

下之王海藏言中脘痛者屬脾土脈沉遲內寒者理中湯或附子理中丸主之若陽脈滿陰脈弦以小建中湯主之胸腹滿者屬少陰脈沉者宜真武湯或附子建中湯主之若小腹少腹痛屬厥陰經分宜當歸四逆加吳茱萸湯主之厥逆者四逆湯加吳茱萸主之凡內實腹痛繞臍刺痛煩躁發作有時此有燥屎也小承氣湯下之若大實腹滿而痛或繞臍刺痛不大便脈實者以大承氣湯下之凡潮熱不大便從心下至少腹鞭滿而痛手不可近者大陷瘕湯下之凡腹中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯主之如脈弦腹痛無熱無寒者芍藥甘草湯主之凡脈弦口苦發熱腹中痛者小柴胡去人參加炒白芍藥主之若寒熱交作腹中痛者加肉桂芍藥主之若寒多而痛者去黃芩倍肉桂芍藥也凡少陽發熱手足冷腹中痛者四

逆散加附子湯、炒芍藥、肉桂、吳茱萸、主之也。凡發熱、脈洪弦而腹痛者，芍藥黃芩湯主之。大抵腹痛有虛有實，有冷有熱，要在脈症而治之。凡畜血亦令人腹痛，不可逆，自有本條要在詳辨而用之者也。

○傷寒小便不通例

凡傷寒小便不利，當分六經治，不可與雜病同目而語也。

太陽經發熱，脈浮煩渴，小便不利者，五苓散主之。凡發熱無汗，煩渴，小便不利者，宜五苓散利之。但有汗多者，不可用也。

陽明病發熱，脈浮煩渴，引飲，小便不利者，猪苓湯主之。若汗多者，小便固少，不可與猪苓湯。脈洪大，舌燥，飲水者，人參白虎湯主之。無用天水散亦可。若大便乍難乍易，小便不利而熱者，此有燥屎也。

調胃承氣湯下之。若頭汗出，壯熱渴飲水，將小便不利者，必發黃也。宜茵陳湯加滑石，木通主之。如

輕者，以猪苓湯加山茵陳主之。

少陽症發熱，口苦或嘔，或心下悸，小便不利，脈弦數者，小柴胡湯加茯苓主之。若口乾者，加竹葉麥

門冬主之。須去半夏。若陰虛火動，小便赤澀不利者，加木通、生地黃、知母、黃柏主之。凡內熱盛，大便

不通，小便赤澀不利者，八正散主之。

太陰腹滿，自利，小便不利，無熱，脈沉者，理中湯合五苓散，更加厚朴、木香，分其小便，利大便止也。

少陰病四、五日，小便不利，四肢沉重，自下利者，真武湯主之。又少陰四肢逆冷，或欬或悸，或小便不利，或泄利下重者，四逆散主之。

厥陰寒厥，厥冷，脈伏，囊縮入腹，小便不利，宜四逆湯加通草、茯苓主之。或灸氣海、石門穴，或以葱熨

法治之
凡風濕中濕大便自利小便不利者詳見本條
凡不渴而小便不利者熱在血分也宜知母黃柏
木通生地黃之類主之
夫膀胱為津液之府氣化而能出也若有汗多者
津液外泄小便固少不可利之恐重亡津液也待
汗止小便自利矣又小便自利不可妄利之恐引
熱入膀胱則憂畜血又為害也

○傷寒小便數例

凡小便數者頻數去而不多也經言太陽之明小
便數而大便祕者此名脾約約者儉也東也謂約
束津不行也以脾約麻仁丸主之凡汗下後小便
數大便祕識語有燥屎也調胃承氣湯主之凡腎
虛有熱而小便頻數者清心蓮子飲或人參三白
湯加知母黃柏麥門冬石蓮肉之類主之或服滋

腎丸亦佳或補中益氣湯加知母黃柏生地黃麥
門冬主之也

○傷寒小便自利例

凡少腹鞭滿應小便不利今反自利者此有畜血
下焦也治見本條凡少陰病脈沉渴欲引水自救
小便色白自利者此下虛有寒也宜附子湯濕之
治熱在氣分渴而小便不利之劑

清肺飲

治渴而小便祕此上焦有熱肺氣傷而不清也

白朮中

茯苓上

猪苓中

澤瀉中

灯心十根

琥珀別研細調入

木通中

通草中

車前子上

瞿麥中

扁蓄中

滑石中

右用水二鍾煎一鍾濾清食前溫服

黃芩湯

治肺燥渴而小便不通

黃芩二錢

梔子仁 五个切破

右用長流水一鍾煎五分服

五苓散天水散並見太陽例

治熱在氣在血小便不通之劑

八正散

治實熱大小便不利

車前子上

瞿麥中

滑石中

甘草稍

大黃中

山厄仁中

石用水二鍾煎至一鍾去滓溫服

清心蓮子飲

治虛熱小便不利或頻數者

黃芩上

黃耆中

人參中

赤茯苓中

石蓮肉中

地骨皮中

車前子上

麥門冬上

甘草下

右煎法同前

治熱在血分不渴而小便不通之劑

滋陰化氣湯

治膀胱有熱氣不施化或服熱藥過小便不利

知母上

黃柏上

木通中

生地黃中 甘中稍下

右煎法同前

滋腎丸一名通關丸

治陰虛小便不利熱在下焦而不清脬腰滿悶者

知母

黃柏各一兩酒浸晒乾共為末

入肉桂末二錢滴水丸如梧桐子大每服一百

九白湯送下若小便若不通以車前子草生取

連根葉搗爛取汁入生白酒半盞和勻送下滋

腎丸一百丸最效

治虛熱小便數滋陰之劑
滋陰益氣湯

人參中

黃芪中

當歸身中

白朮中

陳皮中

升麻中

甘草中

甘草下

知母中

黃柏中

麥門冬中

車前子中

生地黃中

右用水二鍾煎至一鍾去滓溫服
治傷寒熱甚小便不通者

玄明粉二錢灯心湯下或以車前子草連根葉
洗淨搗汁半盞和勻調下玄明粉最佳如無玄
明粉以淨芒硝代之亦可

一方治小便不通射香少許填臍中以生田螺
搗爛成餅貼臍上不一方以生土狗搗爛成餅貼
之一方以羊膽汁或猪膽汁灌入小便即通

恐脫文
正是硫年九

船上硫黃

大半夏湯泡七次去皮半兩

右為末用生薑自然汁湯麵糊丸如梧桐子大每
服三十九白湯送下

當歸潤燥湯

治血燥不大便或發汗過多者

當歸上

芍藥中

川芎中

薤仁中

生地黃中

熟地黃中

麻仁中研如泥用

右作一服水二鍾煎至一鍾服如膏中不利加枳
殼一炙氣不調後重不行加木香五分換即七分

麻仁丸即脾約麻仁丸

治小便數而大便秘者

麻子仁去壳一兩

白芍藥五炙枳實麩炒五炙

大黃酒浸七炙

厚朴三分

杏仁五分去皮尖

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九白湯下

蜜煎導法

用白蜜二兩銅鈔內以慢火煎熬至琥珀色滴些
於淨石上待冷取看可丸不粘手為度如稀粘
再熬至可丸取出放磁器內待冷丸如指頭大長
二寸半納入肛門內盡之如未行再納一箇即行
一方加皂角細末干上亦佳取通其氣也若人壯
病甚者須長三寸如手中指之狀若人小怯者如
手小指之狀可也

豬苦膽導法

用大苦膽一箇以簪脚通其上竅令透胆不可破
別用鵝翎上管取一根磨令頭光插入苦膽內通
其汁以線繫住以口吹管內相通膽脹大即可却
入茶醋一匙灌入管內下膽中再吹緊收管插入
肛門內寸許以手將其膽令盡少頃去大便也如
病未通者再用一箇即通其鵝管非毛管也乃

翅內有肉管一大一細用細者可也此管氣絕內
用之則光滑尤好也

一方名提盒散用川烏為末以葱白頭蘸之插入肛
門內即通治冷結者良

一方用土瓜根切如指頭大插入肛門內通之或用
陳年醬油亦可

一方用皂角燒煙薰下部即通

一方治熱極不大便以田螺搗爛入麝香少許捻成
餅貼臍中即通小便不通者亦可用之

一方治大小便不通用生葱白十四莖生姜一小塊
浸薑豉四十九粒共搗成餅烘熱貼臍上以帛繫
定再用熨斗火於上熨之最妙

傷寒臍結例

凡臍結者臍氣結而不流通也其狀如結膏飲食
如故時久下利不往來寒熱或寒而不熱其人反

靜古上白胎者不可攻也宜灸氣海關元定宜人
參三白湯加乾姜生之寒甚者必加附子經言病
入腹下素有痞連臍痛引小腹入阴筋者死不治
也要在并而治之

○傷寒可發汗例

凡頭項強痛者汗之腰疼背強者汗之身疼拘急
者汗之黃汗惡寒者汗之翕々發熱者汗之凡脉
尺寸浮緊者汗之凡脉浮數者汗之已上皆屬表
証而得表脉無汗者即宜發汗凡發汗後不解者
若有表証表脉仍在者再宜汗之如表証已解其
熱不解者此傳經也必解審治之

○傷寒不可汗例

凡口燥舌乾者不可汗口苦咽乾者不可汗咽喉
疼痛者不可汗吐血衄血者不可汗淋血便血者
不可汗小便淋瀝者不可汗大便溏利者不可汗

內傷勞倦者不可汗房勞陰虛者不可汗夢泄走
精者不可汗肺有動氣者不可汗風溫灼熱者不
可汗濕溫中暑者不可汗金瘡流血者不可汗癰
腫初破者不可汗婦人經水適來者不可汗新產
血虛者不可汗凡脉沉細者不可汗苦誤汗之其
害不可勝言要在仔細詳而治焉

○傷寒可下例

經言太陽病三日發汗不解其人蒸々發熱者屬
胃也調胃承氣湯下之凡潮熱腹痛者大柴胡湯
加厚朴下之潮熱譫語者大柴胡湯下之凡陽明
病多汗胃中必燥大便必鞭々則譫語小承氣湯
下之若譫語脉清而疾發潮熱者大柴胡湯下之
凡譫語有潮熱不食者胃中必有燥屎五六枚小
承氣湯下之若能食大便鞭者大承氣湯下之凡
汗出譫語以有燥屎調胃承氣湯下之凡潮熱手

足漿々汗出大便難而識語者大承氣湯下之凡五六日不大便繞臍痛煩躁發作有時者此有燥屎也調胃承氣湯下之凡曾經下後又六七日不大便煩熱不解腹滿痛者此有燥屎也大承氣湯下之病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘滿不能臥者有燥屎也大承氣湯下之凡吐後腹脹滿者調胃承氣湯下之凡汗吐下後微煩小便數而大便鞭者小承氣湯下之凡腹滿不減者小承氣湯下之凡下利脈三部皆平按其心下鞭者大承氣湯下之凡寸口脈浮大按之反澀者有宿食也小承氣湯下之凡病腹中滿痛者有宿食也小承氣湯下之凡脈沉有力內實潮熱不解者大柴胡湯下之大抵下藥必切脈沉實或沉滑沉疾有力者可

○傷寒急下例

下也再以手按臍腹鞭者或吐痛不可按者則下之無疑也凡下後不解者再按臍腹有無鞭處若有鞭如牛不可按下不尽也須再下之若下後腹中虛軟脈無力者此為虛也以參胡三白湯和之若發熱或潮熱或往來寒熱不解者並宜小柴胡湯增損和之若煩熱不得眠者宜竹葉石膏湯或十味溫膽湯全之也

經言傷寒陽明病六七日目中不了了睛不和大便實身微熱無表証此裏實也宜急下之又曰發熱汗出多者急下之凡發汗不解腹中滿而痛者急下之凡腹脹鞭滿而喘有潮熱者急下之凡肉實識語煩渴腹中鞭滿或發狂不大便者宜急下之也凡下利三部脈皆平心下鞭者急下之已上俱用大承氣湯下之也

○傷寒不可下例

下泄胃氣

凡有惡風惡寒者不可下凡腹滿時減時滿者不可下凡腹中不轉矢氣者不可下凡腹脹可揉可按虛軟者不可下凡脈之左右有動氣者不可下凡陽虛勞倦不可下凡手足逆冷不可下凡尺中脈弱者不可下凡脈浮有表不可下經言陽明病面合赤色不可下又心下鞭滿不可下凡脈沉不實不疾按之無力者不可下凡咽中閉塞不可下凡亡血虛家及婦人經水適來適斷或熱入血室與夫胎前產後崩漏等証皆不可下凡小便頻數而大便秘者不可下凡小便清白大便秘者不可下也要在并而下焉

○傷寒可吐不可吐例

凡病在膈上者宜吐之凡脈大胃滿多痰者宜吐之凡食在胃口脈滑者宜吐之凡病人手足厥冷

脈乍結以客氣在胸中則心下滿而煩飲食不能食者吐之凡病在胸中滿實鬱久而痰不能食欲使人按之而反有涎吐出及下利日數行寸口脈微滑者宜吐之其利則止也內經曰在上者因而越之乃吐也華佗謂傷寒三四日邪在胃中者宜吐之凡吐用瓜蒂散或淡鹽湯或溫茶湯與之如人弱者以人參芦湯吐之亦可若痰多者以二陳湯一甌乘熱與之以指探喉中則吐也凡老人怯弱與其房勞內傷虛人并婦人胎前產後血虛脈弱小者皆不可吐也凡藥發吐者如防風桔梗山梔子只用一味煎湯溫服之則吐也蓋誤吐則使人上焦元氣為害非輕矣可不慎哉

○傷寒皮膚骨髓寒熱例

病人身熱欲衣寒在骨髓熱在皮膚治以桂枝麻黃各半湯病人身寒不欲衣熱在骨髓寒在皮膚

治以白虎加桂湯蓋素寒者欲衣素熱者不欲衣
大神通解散治見熱病條中
治時氣熱病頭疼發熱脈洪身疼無汗

麻黃上

蒼朮中

滑石中

石膏中

黃芩中

甘中中

生薑三片煎服取汗

○傷寒火攻例

凡火燒地令赤布挑栢葉席病人卧之取汗或
者燒火磚噴之以醋紙包置被中蒸之或者以香
艾等燒煙置被中或者以燒熱瓦噴之以醋
紙包熨背四肢已上皆取汗也或以燒針刺之
或以艾火灸之或以火置床下或而火于身
此皆逼迫寒氣也且夫人生天地之間惟陰陽二
氣以生成也若陰寒內盛則陽氣下陷也蓋用火
之法者無非引導陽氣以退陰寒也所以寒氣在
表不汗出未變熱者可以火攻取汗也若 裏熱

病在陽經陽氣自盛不可以火濟火也要在審詳
合宜而已經言病在陽應以汗解若以火灸之則
邪無從出病從腰已下重而痺名曰火逆也又以
火薰之者不得汗出其人必躁必便清血名曰火
邪也或者用火迫却之則亡陰驚狂也或者以熱
物熨背令汗大出而大熱入胃則發譫語也凡病
人脈弱々者被火攻必發譫語凡脈浮熱甚而反
灸之此為實々以火助火必咽燥吐血也或加燒
針刺之則發驚也凡燒針令其汗出者針處被寒
核起而赤者必發奔豚也凡火逆下之因燒針必
煩躁也凡太陽經中風以火却之而取汗邪風被火
血氣流溢失其常度而熱相薰其身發黃陽盛則
欲臥陰虛則小便難陰陽俱虛竭身軀必枯燥但
頭汗出則刺頸而還腰滿微喘口乾咽燥或不文
便久則譫語甚者至噤手足躁擾捻衣摸床小便

利者其人可治也此皆誤火之爲病切須仔細分別也要在辨而已

○傷寒水攻例

凡水攻者或與涼水飲之須察病人大小壯怯審其邪熱輕重淺深而酌量多少與之也若人壯熱深者必多與之人怯熱淺者必少與之要依証而與之也凡與水新汲井水味利而涼者最佳須以大碗滿盛之則涼若飲少者三五口而止能飲者半碗而止少待半時或一時而口又渴欲飲者須仍前新汲之蓋頻與水不妨但不宜一飲而極意也凡飲水後忽然寒戰交作汗出而解者乃自愈也若飲水而不與之則乾燥無由而作汗及煩躁胸亂也古人以傷寒時氣欲飲水者爲之欲愈也凡熱盛者必用水漬法或以水噴其面或以水澆洗其身或置病人於水中或以水浸手足或

脫又

脫又

○

以水浸舌漱口而不欲嚥者以見各條不重錄也大抵陽症陽脉內實熱甚煩渴舌燥者與水則無疑也經言傷寒應以汗解而反以水噴之其熱不去弥更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者與之始散不差者與五苓散主之凡水停心下輕則爲支結重則爲結胸若水漬入腸則爲浮利若內寒飲之其人心陰症與水則爲吃逆若胃虛與之則爲嘔噦汗後與之則爲發喘以水灌之亦喘或爲腹滿脹或爲小便不利或爲寒慄比皆誤用水之害可不謹哉凡中暑霍亂煩渴欲飲水者亦少與之如夏月水有塩味鹹不鮮渴須多以水洗淨方可與之臘月水雪尤爲妙也

溫粉

治汗出不止以此撲之

白朮

藁本

川芎

白芷各等分

右為細末每茶一兩入末粉一兩伍錢相和用

周身撲之

傷寒全書卷之二終

蒸法既甚連若脉浮有力人壯者乃可為之
如脉浮無力怯弱者不可為也昔梁武帝之相
范雲患傷寒熱甚不得汗出命在旦夕召徐文
伯診視是時武帝有賜雲九錫之命雲曰文伯
曰可得速愈者乎文伯曰便瘥甚易但慮君元
氣不足恐二年後不復起爾雲曰朝聞道夕死
可矣何況二年後乎文伯遂以蒸法取汗而愈
後二年果卒所以取汗必先審人之壯怯而可
為者為之若不察其人元氣虛實一察取汗促
人壽期此范雲之戒以為龜鑑矣



Kitasato Memorial Medical Library