

傷寒雜病論

S 151

Kitasato Memorial Medical Library

シ-78





2017

490.9
Sh-52
2

No.3730

195151

傷寒雜病論卷第八

漢長沙太守南陽張機仲景述

問曰。病有結胸。有藏結。其狀何如。答曰。按

之痛。寸脈浮。關脈沉。名曰結胸也。

何謂藏結。答曰。通行本錯簡在藏結者。五

如結胸狀條

藏各具。寒熱攸分。宜求血分。血凝結而氣



阻。雖有氣結。皆血為之。假令肝藏結。必在左。左脇下痛而嘔。脈沉弦而結。宜吳茱萸湯。若發熱不嘔。此為實。脈當沉弦而急。宜桂枝當歸丹皮桃核枳實湯主之。通行本佚

吳茱萸湯方

吳茱萸一升 洗
 人參三兩
 生薑六兩

大棗十二枚
 右四味。以水七升。煮取二升。去滓。溫服七合。日三服。

桂枝當歸丹皮桃核枳實湯方

桂枝二兩 當歸二兩 丹皮三兩

桃核二十枚 枳實二兩

右五味。以水八升。煮取三升。溫服一升。	五合。日再服。	心藏結。必心中痛。鬱鬱不樂。脈大而濇。宜	連翹阿膠半夏赤小豆湯主之。若心中熱	痛而煩。脈大而弦急。此為實。宜黃連阿膠	半夏桃核茯苓主之。 <small>通行本佚</small>
---------------------	---------	----------------------	-------------------	---------------------	-------------------------------

連翹阿膠半夏赤小豆湯方	連翹 <small>二兩</small> 阿膠 <small>一兩</small> 半夏 <small>半升</small>	赤小豆 <small>三兩</small>	右四味。以水四升。先煮三物。取二升。去	滓。內膠烱消。溫服七合。日三服。	黃連阿膠半夏桃核茯苓湯方
-------------	--	-----------------------	---------------------	------------------	--------------

黃連

三兩

阿膠

二兩

半夏

半升

桃核

二十枚
去皮尖

茯苓

三兩

右五味。以水五升。先煮四味。取二升。去

滓。內膠烱消。溫服一升。日再服。

肺藏結。胸中閉塞。喘咳善悲。脈短而澹。宜

百合貝母茯苓桔梗湯主之。若咳血胸中

痛。此為實。宜葶藶括萐半夏丹皮大棗湯

主之。

通行
本佚

百合貝母茯苓桔梗湯方

百合

七枚

貝母

三兩

茯苓

三兩

桔梗

二兩

右四味。以水七升。煮取三升。分溫三服。

葶藶括萐半夏丹皮大棗湯方

葶藶

丸蒸令黃色子大搗

括萋實

大者一枚搗

半夏一升 牡丹皮

三兩

大棗

十二枚

右五味以水六升。煮取三升。分溫三服。

脾藏結。腹中滿痛。按之如覆杯。痛甚則吐

黃水。食不化。脈伏而緊。宜白朮枳實桃仁

乾薑湯主之。若腹中脹痛不可按。大便初

溏後鞭。轉失氣。此為實。宜大黃丹皮厚朴

半夏茯苓甘草湯主之。

通行本佚

白朮枳實桃仁乾薑湯方

白朮

二兩

枳實

半兩

桃仁

二十枚

乾薑

二兩

右四味以水五升。煮取二升。溫服一升。

大日再服。

大黃丹皮厚朴半夏茯苓甘草湯方

大黃^{三兩}牡丹皮^{二兩}厚朴^{三兩}

半夏^{一升}茯苓^{四兩}甘草^{二兩}

右六味。以水六升。煮取三升。溫服一升。

日再服

腎藏結。少腹鞕。隱隱痛。按之有核。小便時

清時濁。脈沉細而結。宜桂枝附子茯苓丹

皮湯主之。若小腹急痛。小便赤數。此為實。

脈當沉緊而急。宜附子桂枝黃柏丹皮茯

苓湯主之。

通行本佚

桂枝附子茯苓丹皮湯方

桂枝^{二兩}附子^{一枚}茯苓^{三兩}丹皮^{三兩}

右四味。以水五升。煮取二升。溫服一升。

附子桂枝黃柏丹皮茯苓湯方

附子炮一枚桂枝二兩黃柏皮二兩

牡丹皮三兩茯苓三兩

右五味。以水六升。煮取二升。溫服一升。

師曰。如結胸狀。飲食如故。時時下利。寸脈

浮。關脈小細沉緊。名曰藏結。舌上白胎滑者。難治。

藏結無陽證。不往來寒熱。一云寒而不熱其人反

靜。舌上胎滑者。不可攻也。

病發於陽。而反下之。熱入。因作結胸。病發

於陰。而反下之。汗一作因作痞也。所以成結

胸者。以下之太早故也。結胸者。項亦強。如
柔瘕狀。下之則和。宜大陷胸丸方。

大黃半斤 葶藶子半升 芒消半斤

杏仁半升 去皮

右四味。搗篩二味。內杏仁芒消。合研如
脂。和散。取如彈丸一枚。則搗甘遂末一

錢七。白蜜二合。水二升。煮取一升。溫頓
服之。一宿乃下。如不下更服。取下為效。

禁如藥法。

結胸證。其脈浮大者。不可下。下之則死。

結胸證。悉具。煩躁者亦死。

太陽病。脈浮而動數。浮則為風。數則為熱。

動則為痛。通行本多頭痛發熱。微盜汗
則為虛四出。而反惡寒者。表未解也。醫反下之。動數
 變遲。膈內拒痛。一云頭胃中空虛。客氣動
痛即眩高。短氣躁煩。心中懊懣。陽氣內陷。心下因
 鞭。則為結胸。大陷胸湯主之。若不結胸。但
 頭汗出。餘處無汗。劑頸而還。小便不利。身

必發黃。宜五苓散主之。方治

大陷胸湯方

大黃六兩 去皮 芒消一升 甘遂一錢匕

右三味。以水六升。先煮大黃。取二升。去
 滓。內芒消。煮一兩沸。內甘遂末。溫服一
 升。得快利。止後服。

五苓散方

豬苓

十八銖 去黑皮

白朮

十八銖

澤瀉

六一銖

茯苓

十八銖

桂枝

半兩 去皮

右五味為散。更於白中杵之。白飲和方

寸匕服之。日三服。多飲煖水。汗出愈。

傷寒六七日。結胸熱實。脈沈緊而實。

通行本

沈而緊。關實字。心下痛。按之石鞮者。大陷胸湯主之。

傷寒十餘日。熱結在裏。復往來寒熱者。與

大柴胡湯。但結胸無大熱者。此為水結在

胸脇也。但頭微汗出者。大陷胸湯主之。

大柴胡湯方

柴胡

半斤

枳實

四枚

生薑

五兩

黃芩

三兩

芍藥

三兩

半夏

半升

大棗

十二枚

大黃

二兩

右八味。以水一斗二升。煮取六升。去滓

再煎。溫服一升。日三服。

太陽病。重發汗而復下之。不大便五六日。

舌上燥而渴。日晡所小有潮熱。

一云日晡所發心胸

煩從心下至少腹鞞滿。而痛不可近者。大

陷胸湯主之。

小結胸病。正在心下。按之則痛。脈浮滑者。

小陷胸湯主之方。

黃連

一兩

半夏

半升

栝蒌實

一枚

右三味。以水六升。先煮栝蒌。取三升。內

諸藥煮取二升。去滓。分溫三服。

太陽病。二三日。不能卧。但欲起。心下必結。

脈微弱者。此本有寒分也。反下之。若利止。

必作結胸。未止者。通行本多四日。復下之五字。此作協

熱利也。

太陽病。其脈促。一作下之。通行本誤接不。

結胸者。此為欲解也。脈浮者。下之必結胸。

脈緊者。下之必咽痛。脈弦者。下之必兩脇

拘急。脈細數者。下之頭痛未止。脈沉緊者。

下之必欲嘔。脈沉滑者。下之協熱利。脈浮

滑者。下之必下血。按自脈浮者句以下。下之二字。通行本皆闕。

病在陽。應以汗解之。反以冷水澀之。若灌

之。其熱被劫不得去。彌更益煩。肉上粟起。意欲飲水反不渴者。服文蛤散。若不差者。與五苓散。寒實結胸無熱證者。與三物小陷胸湯。

白散亦可服。

一云與三七散。物小白散。

文蛤散方

文蛤五兩 麻黃 甘草 生薑各三兩

石膏五兩 杏仁五十粒 大棗十二枚

右七通行本一作一味為散。以沸湯和一方寸

匕服。湯用五合。以水二升。煎至水減過

半。溫服。汗出即愈。通行本闕。亦見金匱。名文蛤湯。但闕以水

二升四字。

白散方

桔梗

三分 巴豆

一分 去皮心 熬黑研如脂

貝母

三分

右三味為散。內巴豆。更於白中杵之。以白飲和服。強人半錢匕。羸者減之。病在膈上必吐。在膈下必利。不利。進熱粥一杯。利過不止。進冷粥一杯。身熱皮粟不

解。欲引衣自覆。若以水濕之洗之。益令

熱。劫不得出。當汗而不汗則煩。假令汗

出已。腹中痛。與芍藥三兩。如上法。

太陽與少陽併病。頭頸強痛。或眩冒。時如

結胸。心下痞鞭者。當刺大椎第一間。肺俞

肝俞。慎不可發汗。發汗則譫語。脈弦大。

字大

本通行五日。譫語不止。當刺期門。
 婦人中風。發熱惡寒。經水適來。得之七八日。熱除而脈遲身涼。胃脘下滿。如結胸狀。譫語者。此為熱入血室也。當刺期門。隨其實而取之。九
 婦人中風。七八日。續得寒熱。發作有時。經

水適斷者。此為熱入血室。其血必結。故使如瘧狀。發作有時。小柴胡湯主之。方十。
 柴胡半斤 黃芩三兩 人參三兩
 半夏半升 甘草三兩 生薑三兩
 大棗十二枚
 右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。

再煎。取三升。溫服一升。日三服。
 婦人傷寒發熱。經水適來。晝日明了。暮則
 譫語如見鬼狀者。此為熱入血室。無犯胃
 氣。及上下通行本焦。必自愈。
 傷寒六七日。發熱微惡寒。支節煩疼。微嘔
 心下支結。外證未去者。柴胡桂枝湯主之。

方十二。

桂枝 <small>去皮</small>	黃芩 <small>半兩</small>	人參 <small>半兩</small>
甘草 <small>炙一兩</small>	半夏 <small>二合</small>	芍藥 <small>半兩</small>
大棗 <small>六枚</small>	生薑 <small>半兩</small>	柴胡 <small>四兩</small>

右九味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服
 一升。本云人參湯作如桂枝法。加半夏

柴胡黃芩。復如柴胡法。今用人參作半劑。
 傷寒五六日。已發汗而復下之。胸脇滿微結。小便不利。渴而不嘔。但頭汗出。往來寒熱。心煩者。此為未解也。柴胡桂枝乾薑湯主之。方十三。

柴胡	半斤	桂枝	三兩 <small>去皮</small>	乾薑	二兩
括蕒根	四兩	黃芩	三兩	牡蠣	二兩 <small>熬</small>
甘草	二兩 <small>炙</small>				

右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。日三服。初服微煩。復服汗出便愈。

傷寒五六日。頭汗出。微惡寒。手足冷。心下滿。口不欲食。大便鞭。脈細者。此為陽微結。必有表復有裏也。脈沉亦在裏也。汗出為陽微。假令純陰結。不得復有外證。悉入在裏。此為半在裏半在外也。脈雖沉細。通行本作不得為少陰病。所以然者。陰不得有汗。

今頭汗出。故知非少陰也。可與小柴胡湯。設不了了者。得屎而解。傷寒五六日。嘔而發熱者。柴胡湯證具。而以他藥下之。柴胡證仍在者。復與柴胡湯。此雖已下之。不為逆。必蒸蒸而振。却發熱汗出而解。若心下滿而鞭痛者。此為結胸。

也。大陷胸湯主之。但滿而不痛者。此為痞。柴胡不中與之。宜半夏瀉心湯。方十五。

半夏洗半升黃芩

乾薑

人參

甘草各三兩炙

黃連一兩

大棗十二枚擘

右七味

以水一斗。煮取六升。去滓。再煎

取三升。溫服一升。日三服。須大陷胸湯

者。方用前法。

一方用半夏一升

太陽少陽併病。而反下之。成結胸。心下鞅

下利不止。水漿不下。其人心煩。

脈浮而緊。而復下之。緊反入裏。則作痞。按

之自濡。但氣痞耳。小青龍湯主之。

方治通

小青龍湯方

麻黃去節芍藥細辛乾薑

甘草炙桂枝各三兩五味子半升

半夏洗升升

右八味。以水一斗。先煮麻黃。減二升。去

上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。

若渴。去半夏。加括蔞根三兩。若微利。行

本誤入去麻黃加芫花如若噎者。去麻

黃。加附子一枚。炮。若小便不利。少腹滿

者。去麻黃。加茯苓四兩。若喘。通行本誤

加杏仁半升。去皮尖。通行本多且芫

字。三字。意二十字。此語反之疑非仲景

太陽中風。下利嘔逆。表解者。乃可攻之。其

人藜藜汗出。發作有時。頭痛心下痞。鞭滿引脇下痛。乾嘔短氣。汗出不惡寒者。此表解裏未和也。十棗湯主之。方十六。

芫花熬甘遂

大戟

右三味等分。各別搗為散。以水一升半。先煮大棗肥者十枚。取八合。去滓。內藥

末。強人服一錢匕。羸人服半錢。溫服之。平旦服。若下少病不除者。明日更服。加半錢。得快下利後。糜粥自養。

太陽病。醫發汗。遂發熱惡寒。因復下之。心下痞。表裏俱虛。陰陽氣并竭。無陽則陰獨。復加燒針。因胸煩面色青黃。膚潤者難治。

今色微黃。手足溫者。易愈。

心下痞。按之濡。其脈關上浮。大本通關者。大

黃黃連瀉心湯主之。方十七。

大黃 二兩 黃連 一兩 黃芩 一兩 通行本

右三味。以麻沸湯二升漬之。須臾。絞去

滓。內附子汁。分溫再服。

心下痞。而復惡寒。汗出者。附子瀉心湯主之。方十八。

大黃 二兩 黃連 一兩 黃芩 一兩

附子 一枚 炮去皮

右四味。切三味。以麻沸湯二升漬之。須

臾。絞去滓。內附子汁。分溫再服。

本以下之。故心下痞。與瀉心湯。痞不解。其人渴而口躁煩。小便不利者。五苓散主之。

一方云忍之一日乃愈之

傷寒汗出解之後。胃中不和。心下痞鞅。乾噫食臭。脇下有水氣。腹中雷鳴下利者。生薑瀉心湯主之。方二十。

生薑

四兩切

甘草

三兩炙

人參

三兩

乾薑

一兩

黃芩

三兩

半夏

半升洗

黃連

一兩

大棗

十二枚擘

右八味。以水一斗。煮取六升。去滓。再煎

取三升。溫服一升。日三服。

通行本多附子瀉心湯本

云加附子半夏瀉心湯甘草瀉心湯同體別名耳。生薑瀉心湯本云理中人参

黃芩并瀉肝
法五十字

傷寒中風。醫反下之。其人下利日數十行。穀不化。腹中雷鳴。心下痞鞭而滿。乾嘔。心煩不得安。醫見心下痞。謂病不盡。復下之。其痞益甚。此非結熱。但以胃中虛。客氣上逆。故使鞭也。甘草瀉心湯主之。方二十一。

甘草 四兩 黃芩 三兩 乾薑 三兩

人參 三兩 通行本關 半夏 半升 大棗 十二枚

黃連 一兩

右七味。以水一斗。煮取六升。去滓。再煎。取三升。溫服一升。日三服。傷寒。服湯藥。下利不止。心下痞鞭。服瀉心

湯已。復以他藥下之。利不止。醫以理中與之。利益甚。理中者。理中焦。此利在下焦。赤石脂禹餘糧湯主之。復不止者。當利其小便。

赤石脂禹餘糧湯方二十二

赤石脂

碎一斤

太一禹餘糧

碎一斤

右二味。以水六升。煮取二升。去滓。分溫

三服。

傷寒吐下後。發汗。虛煩脈甚微。八九日。心下痞鞭。脇下痛。氣上衝咽喉。眩冒。經脈動。惕者。久而成痿。傷寒發汗。若吐若下解後。心下痞鞭。噫氣。

不除者。旋復代赭湯主之。方二十三。

旋復花 三兩 人參 二兩 生薑 五兩

代赭 一兩 甘草 三兩 半夏 半升

大棗 十枚

右七味。以水一斗。煮取六升。去滓。再煎

取三升。溫服一升。日三服。

下後不可更行桂枝湯。若汗出而喘。無大

熱者。可與麻黃杏子甘草石膏湯。方二十

四。

麻黃 四兩 杏仁 五十箇 甘草 二兩

石膏 半斤

右四味。以水七升。先煮麻黃。減二升。去

白沫。內諸藥煮取三升。去滓。溫服一升。

通行本多本云黃耳杯五字

太陽病。外證未除。而數下之。遂脇熱而利。利下不止。心下痞鞭。表裏不解者。桂枝人參湯主之。方二十五。

桂枝

四兩 別切

甘草

四兩 炙

白朮

三兩

人參

三兩

乾薑

三兩

右五味。以水九升。先煮四味。取五升。內桂。更煮取三升。去滓。溫服一升。日再夜一服。

傷寒大下後。復發汗。心下痞。惡寒者。表未解也。不可攻痞。當先解表。表解乃可攻痞。

解表宜桂枝湯。攻痞宜大黃黃連瀉心湯。

桂枝湯方

桂枝 三兩 芍藥 三兩 甘草 二兩

生薑 三兩 切 大枣 十二枚 擘

右五味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。須臾啜熱稀粥一升。以助藥力。溫

覆取汗。

大黃黃連瀉心湯方

見前 二十六

傷寒發熱。汗出不解。心下痞鞅。嘔吐而不

通行本利者。大柴胡湯主之。二十七。

病如桂枝證。頭不痛。項不强。寸脈微浮。胸

中痞鞅。氣上衝喉咽不得息者。此為胸有

寒也。當吐之。宜瓜蒂散。方二十八。

瓜蒂

一分

赤小豆

一分

右二味。各別搗篩。為散已。合治之。取一

錢匕。以香豉一合。用熱湯七合。煮作稀

糜。去滓。取汁和散。溫頓服之。不吐者。少

少加。得快吐乃止。諸亡血虛家。不可與

瓜蒂散

病脇下素有痞。連在臍傍。痛引少腹。入陰

筋者。此名臧結。死。

傷寒若吐若下後。七八日不解。熱結在裏。

表裏俱熱。時時惡風。大渴。舌上乾燥而煩。

欲飲水數升者。白虎加人參湯主之。方。

知母六兩 石膏碎一斤 甘草二兩

人參二兩 粳米六兩

右五味以水一斗。煮米熟。湯成去滓。温

服一升。日三服。通行本多此方。立夏後

不可服。正月二月三月尚涼冷。亦不可與服之。與之則嘔利而腹痛。四十字。

諸亡血虛家亦不可與。得之則腹痛利

者。但可温之當愈。

傷寒無大熱。口燥渴。心煩。背微惡寒者。白

虎加人參湯主之。

傷寒。脈浮發熱無汗。其表不解。當發汗。行通

本不可與白虎湯。渴欲飲水無表證者。白

虎加人參湯主之。

太陽少陽併病。心下鞕。頸項強而眩者。當刺大椎肺俞肝俞。慎勿下之。
太陽與少陽合病。自下利者。與黃芩湯。若嘔者。黃芩加半夏生薑湯主之。

黃芩湯方

黃芩 三兩 芍藥 二兩 甘草 二兩

大棗 十二枚 右四味。以水一斗。煮取三升。去滓。溫服一升。日再夜一服。

黃芩加半夏生薑湯方

黃芩 三兩 芍藥 二兩 甘草 二兩

大棗 十二枚 半夏 半升 生薑 一方

右六味。以水一斗。煮取三升。去滓。温服一升。日再夜一服。

傷寒。胸中有熱。胃中有邪氣。腹中痛。欲嘔吐者。黃連湯主之。方。

黃連 三兩 甘草 三兩 乾薑 三兩

桂枝 三兩 人參 二兩 半夏 半升

大棗 十二枚

右七味。以水一斗。煮取六升。去滓。温服。

晝三夜二。通行本多疑非仲景方五字。按通行本誤入傷寒八十九

目風濕相搏。身體疼煩。不能自轉側。桂枝附子湯證一條。及風濕相搏。骨節疼煩。掣痛不能屈伸。甘草附子湯證一條。兩條並方治共二百三十二字。今在辨

治濕病證

傷寒脈浮滑。此以表有熱。裏無通行本寒。
白虎湯主之。方。

知母六兩 石膏一斤 甘草二兩 粳米六合

右四味。以水一斗。煮米熟。湯成去滓。溫
服一升。日三服。

傷寒脈結促。通行本促作代心動悸。炙甘草湯主

之。方。

甘草四兩 生薑三兩 人參二兩

生地黄一斤 桂枝三兩 阿膠二兩

麥門冬半升 麻仁半升 大棗三十

右九味。以清酒七升。水八升。先煮八味。
取三升。去滓。內膠烱消盡。溫服一升。日

三服一名復脈湯。

通行本多脈按之來緩時一止復來者名

曰結。又脈來動而中止。更來小數。中有還者反動。名曰結。陰也。脈來動而中止。

不能自還。因而復動者。名曰代。陰也。得此脈者。必難治一段。共六十三字。今在

平脈法第二。但通行本此條。文有錯簡。

按本卷增經文五條。計三百四十字。增方十。計五百十八字。增字三十九。共增

八百九十七字。訂正十二字。刪一百四十一字。又風濕方治二條。計二百三十

二字。脈法一段。計六十三字。今分見瘧病證治及平脈法第二。

陽明病證治并治
陽明病者。太陽陽明。有正陽陽明。有少陽
陽明。可謂也。答曰。太陽陽明者。脈約。一
是也。正陽陽明者。胃家實是也。少陽陽明

傷寒雜病論卷第九
 辨陽明病脈證并治
 太陽病發汗
 後身熱者此
 陽明也
 問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也答曰太陽陽明者脾約一云是也正陽陽明者胃家實是也少陽陽明

傷寒雜病論卷第九
 大對藥者此為對

漢長沙太守南陽張機仲景述

問曰辨陽明病脈證并治

太陽病發汗後身熱者此陽明也

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也

答曰太陽陽明者脾約一云是也正陽陽明者胃家實是也少陽陽明

者發汗利小便已。胃中燥煩實。大便難是也。也。即何能也。答曰。太陽病。即答。即何能也。
陽明之為病。胃家實。寒一作是也。即何能也。
問曰。何緣得陽明病。答曰。太陽病。若發汗。若下。若利小便。此亡津液。胃中乾燥。因轉屬陽明。不更衣。內實大便難者。此名陽明。

也。
問曰。陽明病外證云何。答曰。身熱汗自出。不惡寒反惡熱也。
問曰。病有得之一日。不發熱而惡寒者。何也。答曰。雖得之一日。惡寒將自罷。即自汗出而惡熱也。

問曰。惡寒何故自罷。答曰。陽明居中主土也。萬物所歸。無所復傳。始雖惡寒。二日自止。此為陽明也。
本太陽初得病時。發其汗。汗先出不徹。因轉屬陽明也。傷寒發熱無汗。嘔不能食。而反汗出濺濺然者。是轉屬陽明也。

傷寒三日。陽明脈大。
傷寒脈浮而緩。手足自溫者。是為繫在太陰。太陰者身當發黃。若小便自利者。不能發黃。至七八日大便鞅者。為陽明病也。
傷寒轉繫陽明者。其人濺然微汗出也。
陽明中風。口苦咽乾。腹滿微喘。發熱惡風。

通行本脈浮而緩。通行本若下之。則腹滿。
誤作寒小便難也。

陽明病。若能食。名中風。不能食。名中寒。

陽明病。若中寒者。不能食。小便不利。手足
濇然汗出。此欲作固瘕。必大便初鞭後溏。
所以然者。以胃中冷。水穀不別故也。

陽明病。初欲食。小便反不利。大便自調。其
人骨節疼。翕翕如有熱狀。奄然發狂。濇然
汗出而解者。此水不勝穀氣。與汗共并。脈
緊則愈。

陽明病欲解時。從申至戌上。

陽明病。不能食。攻其熱必噦。所以然者。胃

中虛冷故也。以其人本虛。攻其熱必噦。
陽明病。脈遲。食難用飽。飽則微煩頭眩。必
小便難。此欲作穀瘵。雖下之。腹滿如故。所
以然者。脈遲故也。
陽明病。法多汗。反無汗。其身如蟲行皮中
狀者。此以久虛故也。

陽明病。反無汗而小便利。二三日嘔而欬。
手足厥者。必苦頭痛。若不欬不嘔。手足不
厥者。頭不痛。一云冬陽明
陽明病。但頭眩。不惡寒。故能食而欬。其人
咽必痛。若不欬者。咽不痛。一云冬陽明
陽明病。無汗。小便不利。心中懊懣者。身必

發黃。

陽明病。被火。額上微汗出。而小便不利者。必發黃。

陽明病。脈浮而短。通行本誤作緊者。必潮熱發作

有時。但浮者必自汗出。

通行本誤作盜

陽明病。口燥。但欲漱水不欲嚥者。此必衄。

陽明病。本自汗出。醫更重發汗。病已差。尚

微煩不了了者。此必大便鞭故也。以亡津

液。胃中乾燥。故令大便鞭。當問其小便日

幾行。若本小便日三四行。今日再行。故知

大便不久出。今為小便數少。以津液當還

入胃中。故知不久必大便也。

傷寒嘔多。雖有陽明證。不可攻之。

陽明病。心下鞅滿者。不可攻之。攻之利遂

不止者死。利止者愈。

陽明病。面合色赤。不可攻之。必發熱。色黃

者。小便不利也。

陽明病。不吐不下。心煩者。可與調胃承氣

湯方一。

甘草

炙二兩

芒消半升

大黃

酒洗四兩清

右三味。切。以水三升。煮二物至一升。去

滓。內芒消。更上微火一二沸。溫頓服之。

以調胃氣。

陽明病。脈實。

通行本誤作遲

雖汗出不惡寒者。其

身必重。短氣腹滿而喘。有潮熱者。此外欲
 解。可攻裏也。手足濇然汗出者。此大便已
 鞣也。大承氣湯主之。若汗多微發熱惡寒
 者。外未解也。桂枝湯與其熱不潮。未可與承
 氣湯。若腹大滿不通者。可與小承氣湯。微
 和胃氣。勿令至大泄下。大承氣湯方二。

大黃

酒洗

厚朴

去半斤皮

枳實

炙

五枚

芒消

三合

右四味。以水一斗。先煮二物。取五升。去

滓。內大黃。更煮取二升。去滓。內芒消。更
 上微火一兩沸。分溫再服。得下餘勿服。

小承氣湯方

大黃酒洗厚朴二兩 灸 去皮枳實三枚 大 者 灸
 右三味。以水四升。煮取一升二合。去滓。
 分溫二服。初服湯當更衣。不爾者。盡飲
 之。若更衣者。勿服之。
 陽明病。潮熱。大便微鞮者。可與大承氣湯。
 不鞮者。不可與之。若不大便六七日。恐有

燥屎。欲知之法。少與小承氣湯。湯入腹中
 轉失氣者。此有燥屎也。乃可攻之。若不轉
 失氣者。此但初頭鞮。後必澹。不可攻之。攻
 之必脹滿。不能食也。欲飲水者。與水則噦。
 其後發熱者。必大便復鞮而少也。以小承
 氣湯和之。不轉失氣者。慎不可攻也。小承

氣湯三。

二用前第

夫實則譫語。虛則鄭聲。鄭聲者。重語也。直

視譫語喘滿者死。下利者亦死。

發汗多。若重發汗者。亡其陽。譫語脈短者

死。脈自和者不死。

傷寒。若吐若下後不解。不大便五六日。上

至十餘日。日晡所發潮熱。不惡寒。獨語如

見鬼狀。若劇者。發則不識人。循衣摸牀。惕

而不安。

一云順衣妄撮。恍惕不安。

微喘直視。脈弦者生。

濇者死。微者但發熱譫語者。大承氣湯主

之。若一服利。則止後服。

四用前第

陽明病。其人多汗。以津液外出。胃中燥。大

+

便必鞭。鞭則譫語。小承氣湯主之。若一服
譫語止者。更莫復服。五。用前第
二方
陽明病。譫語。發潮熱。脈滑而疾者。小承氣
湯主之。因與承氣湯一升。腹中轉氣者。更
服一升。若不轉氣者。勿更與之。明日又不
大便。脈反微澁者。裏虛也。為難治。不可更

與承氣湯也。用前第
二方
陽明病。譫語有潮熱。反不能食者。胃中
有燥屎五六枚也。若能食者。但鞭耳。宜大
承氣湯下之。七。用前第
二方
陽明病。下血譫語者。此為熱入血室。但頭
汗出者。刺期門。隨其實而瀉之。濺然汗出

則愈。

汗出讖語者。以有燥屎在胃中。此為實。通

本誤也。須下之。過經乃可下之。下之若早。

語言必亂。以表虛裏實故也。下之愈。宜大

承氣湯。八。用前第二方。一云大柴胡湯。

傷寒四五日。脈沉而喘滿。沉為在裏。而反

發其汗。津液越出。大便為難。表虛裏虛。久

則讖語。

三陽合病。腹滿身重。難以轉側。口不仁而

垢。又云。一讖語遺尿。自汗者。屬白虎湯。

通行本汗字下有出字。屬白虎湯。作白虎湯主之。錯簡在手足逆冷句後。若行

本在首。發汗則讖語。下之則額上生汗。手

足逆冷。方九。

知母六兩

石膏

碎一斤

甘草

二兩

粳米六合

右四味。以水一斗。煮米熟。湯成去滓。温

服一升。日三服。

二陽併病。太陽證罷。但發潮熱。手足漿漿

汗出。大便難而讞語者。下之則愈。宜大承

氣湯。

十。用前第二方

陽明病。脈浮而大。

通行本

咽燥口苦。腹滿

而喘。發熱汗出。不惡寒。反惡熱。身重。若發

汗則躁。心憤憤。

公對切

反讞語。若加温針。必

怵惕煩躁不得眠。若下之則胃中空虛。客

氣動膈。心中懊懣。舌上胎者。梔子鼓湯主之。方十一。

肥梔子

十四枚

香豉

四合

右二味。以水四升。煮梔子。取二升半。去

滓。內豉。更煮取一升半。去滓。分二服。溫

進一服。得快吐者。止後服。

若渴欲飲水。口乾舌燥者。白虎加人參湯

方十二。

知母

六兩

石膏

一斤

甘草

二兩

粳米

六合

人參

三兩

右五味。以水一斗。煮米熟。湯成去滓。溫

服一升。日三服。

若脈浮發熱。渴欲飲水。小便不利者。豬苓湯主之。方十三。一升。煮米熟。去米。取汁。去滓。分三服。日三服。

豬苓去皮茯苓去皮澤瀉

阿膠六兩滑石二兩甘草二兩附子一枚

右五味。以水四升。先煮四味。取二升。去

滓。內阿膠烱消。溫服七合。日三服。

陽明病。汗出多而渴者。不可與豬苓湯。以汗多胃中燥。豬苓湯復利其小便故也。脈浮而遲。表熱裏寒。下利清穀者。四逆湯主之。方十四。

甘草二兩乾薑半兩附子一枚

右三味。以水三升。煮取一升。二合。去滓。

分温二服。強人可大附子一枚。乾薑三兩。

若胃中虚冷不能食者。飲水則噦。

脈浮發熱。口乾鼻燥。能食者則衄。

陽明病。下之。其外有熱。手足温。不結胸。心

中懊懣。飢不能食。但頭汗出者。梔子豉湯

主之。十五。用前方第十一

陽明病。發潮熱。大便溏。小便自可。胸脇滿

不去者。與小柴胡湯。方十六。

柴胡洗半升 黃芩三兩 人參三兩

半夏洗半升 甘草三兩 生薑三兩

大棗十二枚

右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。日三服。

陽明病。脇下鞕滿。不大便而嘔。舌上白胎者。可與小柴胡湯。上焦得通。津液得下。胃氣因和。身濺然汗出而解。十七。
陽明中風。脈弦浮大而短氣。腹都滿。脇下

及心痛。久按之氣不通。鼻乾不得汗。嗜卧。一身及目悉黃。小便難。有潮熱。時時噦。耳前後腫。刺之小差。外不解。病過十日。脈續浮者。與小柴胡湯。十八。
脈但浮無餘證者。與麻黃湯。若不尿。腹滿加噦者。不治。麻黃湯方十九。

麻黃三兩 去節 桂枝二兩 去皮 甘草一兩 炙

杏仁七十箇 去皮尖

右四味。以水九升。煮麻黃。減二升。去白

沫。內諸藥。煮取二升半。去滓。溫服八合。

覆。取微似汗。

動作頭痛重。熱氣潮者。屬陽明。通行 本佚

陽明病。津液竭者。雖不大便。不可下。人參

乾地黃麻仁白蜜煎與之。腹中痛者。湯中

加厚朴與之。通行 本佚

人參乾地黃麻仁白蜜湯方

人參一兩 乾地黃六兩 麻仁一升 白蜜八合

右四味。先煎三味。以水一斗。煎取五升。

去滓。納蜜。微火煎十餘沸。待小冷。每服一升。日三服。腹中痛者。加厚朴二兩。先煎。
陽明病。自汗出。若發汗。小便自利者。此為津液內竭。雖鞭不可攻之。當須自欲大便。宜蜜煎導而通之。若土瓜根及大猪膽汁。

皆可為導。二十。

蜜煎方

食蜜七合

右一味。於銅器內。微火煎。當須凝如飴狀。攪之。勿令焦著。欲可丸。併手捻作挺。令頭銳。大如指。長二寸許。當熱時急作。

令則鞭。以內穀道中。以手急抱。欲大便時。乃去之。
又大猪膽一枚。瀉汁。和少許法醋。以灌穀道內。如一食頃。當大便。出宿食惡物甚效。

陽明病。脈遲。汗出多。微惡寒者。表未解也。

可發汗。宜桂枝湯。二十一。

桂枝

三兩
去皮

芍藥

三兩

生薑

三兩

甘草

二兩

大棗

十二枚

右五味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。須臾。啜熱稀粥一升。以助藥力。取汗。

陽明病。脈浮無汗而喘者。發汗則愈。宜麻
黃湯。二十二。用前第十九方
陽明病。發熱汗出者。此為熱越。不能發黃
也。但頭汗出。身無汗。劑頸而還。小便不利。
渴引水漿者。此為瘧熱在裏。身必發黃。茵
陳蒿湯主之。方二十三。

茵陳蒿

六兩

梔子

十四枚

大黃

二兩 去皮

右三味。以水一斗二升。先煮茵陳。減六
升。內二味。煮取三升。去滓。分三服。小便
當利。尿如皂莢汁狀。色正赤。一宿腹減。
黃從小便去也。
陽明證。其人喜忘者。必有畜血。所以然者。

本有久瘀血。故令喜忘。屎雖鞞。大便反易。其色必黑者。宜抵當湯下之。方二十四。

水蛭

熬

蝱蟲

去翅足熬各三十箇

大黃

酒洗

桃仁

二十箇去皮

右四味。以水五升。煮取三升。去滓。溫服

一升。不下更服。

陽明病。下之。心中懊懣而煩。胃中有燥屎者。可攻。腹微滿。初頭鞞。後必澹。不可攻之。若有燥屎者。宜大承氣湯。二十五。用前第二方病人不大便五六日。繞臍痛。煩躁。發作有時者。此有燥屎。故使不大便也。宜抵當湯。病人煩熱。汗出則解。又如瘧狀。日晡所發

熱者屬陽明也。脈實者宜下之。脈浮虛者
 宜發汗。下之與大承氣湯。發汗宜桂枝湯。
 二十六。大承氣湯用前第二方。桂枝湯用前第二十一方。
 大下後六七日不大便。煩不解。腹滿痛者。
 此有燥屎也。所以然者。本有宿食故也。宜
 大承氣湯。二十七。用前第二方。

病人小便不利。大便乍難乍易。時有微熱。
 喘冒。一作息不能卧者。有燥屎也。宜大承氣
 湯。二十八。用前第二方。
 食穀欲嘔。屬陽明也。吳茱萸湯主之。得湯
 反劇者。屬上焦也。吳茱萸湯方二十九。
 吳茱萸洗一升 人參三兩 生薑切六兩

大棗十枚 二擘
 右四味以水七升。煮取二升。去滓。温服
 七合。日三服。
 太陽病。寸緩關浮尺弱。其人發熱。汗出復
 惡寒。不嘔。但心下痞者。此以醫下之也。如
 其不下者。病人不惡寒而渴者。此轉屬陽

明也。小便數者。大便必鞭。不更衣十日。無
 所苦也。渴欲飲水。少少與之。但以法救之。
 渴而飲水多。小便不利。渴字以下八
字通行本闕者。宜
 五苓散。方三十。
 豬苓去皮 白朮 茯苓各十
銖
 澤瀉一兩
六銖 桂枝半兩
去皮

右五味為散。白飲和服。方寸匕。日三服。
 脈陽微而汗出少者。為自和也。汗出多者。
 為太過。陽脈實。因發其汗。出多者。亦為太
 過。太過者為陽絕於裏。亡津液。大便因鞮
 也。
 脈浮而芤。浮為陽。芤為陰。浮芤相搏。胃氣

生熱。其陽則絕。
 跌陽脈浮而濇。浮則胃氣強。濇則小便數。
 浮濇相搏。大便則鞮。其脾為約。麻子仁丸
 主之。方三十一。
 麻子仁并二芍藥并枳實并大黃并
 厚朴一尺炙去皮杏仁并去皮去脂一

右六味。蜜和丸。如梧桐子大。飲服十丸。日三服。漸加。以知為度。

太陽病。三日。發汗不解。蒸蒸發熱者。屬胃也。調胃承氣湯主之。三十二。用前第一方

傷寒吐後。腹脹滿者。與調胃承氣湯。三十

三。用前第一方

太陽病。若吐。若下。若發汗後。微煩。小便數。大便因鞫者。與小承氣湯和之愈。三十四。

用前第二方

得病二三日。脈弱。無太陽柴胡證。煩躁。心下鞫。至四五日。雖能食。以小承氣湯少少與。微和之。令小安。至六日。與承氣湯一升。

若不大便六七日。小便少者。雖不受食。

便不大但初頭鞭後必澹未定成鞭攻之必

澹須小便利。屎定鞭。乃可攻之。宜大承氣

湯。三十五。用前第二方

傷寒六七日。目中不了了。睛不和。無表裏

證。大便難。身微熱者。此為實也。急下之。宜

大承氣湯。三十六。用前第二方

陽明病。發熱汗多者。急下之。宜大承氣湯。

三十七。用前第二方宜大承氣湯。四十

發汗不解。腹滿痛者。急下之。宜大承氣湯。

三十八。用前第二方

腹滿不減。減不足言。當下之。宜大承氣湯。

三十九

用前第二方

陽明少陽合病。必下利。其脈不負者。為順也。負者失也。互相尅賊。名為負也。脈滑而數者。有宿食也。當下之。宜大承氣湯。四十。

用前第二方

病人無表裏證。發熱七八日。雖脈浮數者。

可下之。假令已下。脈數不解。合熱則消穀

喜飢。至六七日不大便者。有瘀血。宜抵當

湯。四十一

用前第二十四方

若脈數不解。而下不止。必腸熱便膿血也。傷寒發汗已。身目為黃。所以然者。以寒濕

一作温

在裏不解故也。

通行本多以為二字

不可下也。

於寒濕中求之。

傷寒七八日。身黃如橘子色。小便不利。腹

微滿者。茵陳蒿湯主之。四十二。用前第二十三方

傷寒身黃發熱。梔子蘘皮湯主之。方四十

三。

肥梔子

十五箇

甘草

一兩

黃蘘

二兩

右三味。以水四升。煮取一升半。去滓。分

溫再服。

傷寒瘀熱在裏。身必黃。麻黃連軹赤小豆

湯主之。方四十四。

麻黃

二兩

連軹

二兩

杏仁

四十箇

去皮尖

赤小豆

一升

大棗

十二枚

生梓白皮

切一升

生薑

二兩切

甘草

二兩

右八味。以潦水一斗。先煮麻黃再沸。去

上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。分溫三服。

半日服盡。

按本篇增經文二條。計四十九字。增方一。計七十四字。增字八。共增一百三十一字。訂正九字。刪五字。

傷寒雜病論卷第十

漢長沙太守南陽張機仲景述

辨少陽病脈證并治

少陽之為病。口苦咽乾目眩也。

少陽中風。兩耳無所聞。目赤。胸中滿而煩

者。不可吐下。吐下則悸而驚。

傷寒脈弦細。頭痛發熱者。屬少陽。少陽不

可發汗。發汗則譫語。此屬胃。胃和則愈。胃

不和。煩而躁。通行本
作悸

本太陽病不解。轉入少陽者。脇下鞅滿。乾

嘔不能食。往來寒熱。尚未吐下。脈沉弦。通行

本
作者。與小柴胡湯方一

柴胡八兩 人參三兩 黃芩三兩

甘草三兩 半夏半升 生薑三兩

大棗十二枚

右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。

再煎取三升。溫服一升。日三服。

少陽病。氣上逆。令脇下痛。痛甚則嘔逆。此

為膽不降也。柴胡芍藥枳實甘草湯。主之。

通行。按柴芍枳甘湯。通行本。本佚。誤作四逆散。見少陰篇。

柴胡 芍藥 枳實破水漬 甘草炙

右四味。各十分。搗篩。白飲和服。方寸匕。日三服。欬者。加五味子乾薑各五分。並主下利。悸者。加桂枝五分。小便不利者。

加茯苓五分。腹中痛者。加附子一枚。炮

令坼。泄利下重者。先以水五升。煮薤白

三升。煮取三升。去滓。以散三方寸匕內

湯中。煮取一升半。分溫再服。

若已吐下發汗溫針。讖語。柴胡湯證罷。此

為壞病。知犯何逆。以法治之。

三陽合病。脈浮大。上關上。但欲眠睡。目合則汗。
傷寒六七日。無大熱。其人躁煩者。此為陽去入陰故也。
傷寒三日。三陽為盡。三陰當受邪。其人反能食而不嘔。此為三陰不受邪也。

傷寒三日。少陽脈小者。欲已也。

少陽病欲解時。從寅至辰上。

按本篇增經文一條。計三十二字。訂正二字。

太陽中風。四肢煩疼。陽微陰清而長者。欲愈。
太陽病。汗者。可發汗。宜桂枝湯方一。

三陽合病脈浮大上開目但欲眠身重
 則難言者宜下之
 傷寒六七日無大熱其人躁煩者此為陽
 去天也
 火氣盛則心煩身熱
 則發三陽也

辨太陰病脈證并治
 太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚
 時腹自痛若下之必胸下結鞭
 太陰中風四肢煩疼陽微陰濇而長者為
 欲愈
 太陰病脈浮者可發汗宜桂枝湯方一

桂枝三兩芍藥三兩甘草二兩

生薑切三兩大棗枚十二

右五味以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。須臾啜熱稀粥一升。以助藥力。溫覆取汗。自利不渴者。屬太陰。以其藏有寒。故也。當

溫之。宜服四逆輩。二。

傷寒脈浮而緩。手足自溫者。繫在太陰。太陰當發身黃。若小便自利者。不能發黃。至七八日。雖暴煩下利。日十餘行。必自止。以脾家實。腐穢當去故也。本太陽病。醫反下之。因爾腹滿時痛者。屬

太陰也。桂枝加芍藥湯主之。大實痛者。桂枝加大黃湯主之。三。

桂枝加芍藥湯方

桂枝三兩 芍藥六兩 甘草二兩

大棗十二枚 生薑三兩

右五味。以水七升。煮取三升。去滓。溫分

三服。本云桂枝湯。今加芍藥。

桂枝加大黃湯方

桂枝三兩 大黃二兩 芍藥六兩

生薑三兩 甘草二兩 大棗十二枚

右六味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服

一升。日三服。

太陰為病。脈弱。其人續自便利。設當行大黃芍藥者。宜減之。以其人胃氣弱。易動故

也。下利者先煎芍藥三沸。

太陰病。大便反鞭。腹中脹滿。此為食不化。脈當浮而濇。宜白朮乾薑枳實白蜜湯主之。若不脹滿。短氣。此為脾氣陷。脈當下墜。

宜黃耆五物湯。加乾薑半夏主之。通行本佚

白朮乾薑枳實白蜜湯方

白朮三兩 乾薑三兩 枳實半兩 白蜜二兩

右四味。先煎三味。以水六升。煮取三升。去滓。納白蜜烱消。溫服一升。日再服。

黃耆五物湯加乾薑半夏方

黃耆 三兩 芍藥 三兩 桂枝 三兩 生薑 六兩

大棗 十二枚 乾薑 三兩 半夏 半升

右七味。以水六升。煮取二升。溫服七合。

日三服。

太陰病。渴欲飲水。飲水即吐。此為水隔在

上。脈當浮弦而澹。乾薑半夏竹茹茯苓湯

主之。通行本佚

乾薑 二兩 半夏 一升 竹茹 半升 茯苓 四兩

右四味。以水四升。煮取二升。溫服一升。

日可三四服。得吐止為度。

太陰病。下利口渴。發熱汗出。此為脾津竭。

脈當虛數而澹。人參白朮生薑大棗甘草

飴膠湯主之。

通行本佚

人參

三兩

白朮

三兩

生薑

半兩切

大棗

十二枚

甘草

二兩

飴膠

一斤

右六味。以水七升。煮取三升。去滓。內飴。

更上微火消解。溫服一升。日三服。

太陰病。不下利。吐逆。但腹中苦脹。此為脾

氣結。脹當大而滑。宜厚朴枳實半夏知母

湯主之。

通行本佚

厚朴

二兩炙去皮

枳實

三枚炙者

半夏

一斤

知母

三兩

右四味。以水四升。煮取二升。溫服一升。

日再服。得大便快利。腹脹即減。虛者禁

十

與。

太陰病。不腹滿。不吐嘔。但利不自覺。此為脾陽衰。脈當濡而濇。宜人參乾薑蜀椒甘

草湯主之。

通行本佚

人參 三兩 乾薑 三兩 蜀椒 二兩

甘草 二兩

炙

右四味。以水三升。煮取一升。去滓。分溫再服。復利不止者。加黃耆三兩。附子一枚。

太陰病。惡風。欲吐不吐。下利時甚時疏。此為脾受風。脈當浮而濇。宜茯苓白朮桂枝半夏生薑湯主之。

通行本佚

茯苓 三兩 白朮 三兩 桂枝 三兩

半夏 一升 生薑 切三兩

右五味以水六升。煮取二升。去滓。溫服

一升。日再服。

太陰病。惡寒吐逆。腹中冷痛。雷鳴下利。此為脾受寒。脈當緊而弱。乾薑附子麻黃薤

白湯主之。通行本佚

乾薑 三兩 附子 一枚 麻黃 一兩 薤白 三兩

右四味以水五升。先煮乾薑附子。取二

升。內麻黃薤白。煮取一升半。分溫再服。

欬發於肺。不獨肺病。所以然者。肺司氣。五

臟受邪。欲作欬。必先動氣。令氣逆也。五臟

為欬。各有其氣。欲分受氣。必平脈息。為子

條記。傳與後賢。通行本佚

肺欬。脈短濇。假令浮短而濇。知受風邪。浮

短而緊。知受寒邪。浮短而數。知受熱邪。浮

短而急。知受燥邪。短濇而濡。知受濕邪。通行

佚本

心欬。脈大散。假令浮大而散。知受風邪。緊

大而散。知受寒邪。數大而散。知受熱邪。急

大而散。知受燥邪。大散而濡。知受濕邪。通行

佚本

肝欬。脈弦濇。假令浮而弦。知受風邪。弦而

緊。知受寒邪。弦而數。知受熱邪。弦而急。知

受燥邪。弦而濡。知受濕邪。本通行

脾欬。脈濡濇。假令浮濡而濇。知受風邪。濡

濇而緊。知受寒邪。濡而數。知受熱邪。濡而

急。知受燥邪。濡而滯。知受濕邪。本通行

腎欬。脈沉濡。假令沉濡時一浮。知受風邪。

沉濡時一緊。知受寒邪。沉而數。知受熱邪。

沉而急。知受燥邪。沉濡而滯。知受濕邪。本通行

本佚

痰飲之為欬。不得卧。卧則譫語。此為實。不

能言。言則氣短。此為虛。欬病多端。治無定

法。邪異脈變。以意揣之。隨證處方。自可萬

全。本通行

病宿食。脈滑而實者。可下之。宜承氣湯。但滑者。宜引導之。厚朴茯苓半夏麩麥豆黃卷湯主之。便溏者。加白朮與之。通行本佚

三承氣湯選用

厚朴茯苓半夏麩麥豆黃卷湯

厚朴二兩 茯苓三兩 半夏半升

麩麥 三兩 水浸取 豆卷 一兩

粳米 五合 炒 生薑 一兩 切

右七味。以水六升。煎取三升。溫服一升。

日三服。

太陰病。欲解時。從亥至丑上。

按本篇增經文十五條計六百五十二字增方八計四百七十七字共增一千零

六十九字

按本卷共增經文十六條計六百八十四字增方八計四百十七字共增一千一百零一字

訂正二字

傷寒雜病論卷第十一
漢長沙太守南陽張機仲景述
辨少陰病脈證并治

傷寒雜病論卷第十一

漢長沙太守南陽張機仲景述

辨少陰病脈證并治

少陰之為病。脈微細。但欲寐也。

少陰病。欲吐不吐。心煩但欲寐。五六日。自

利而渴者。屬少陰也。虛故飲水自救。若小

便色白者。少陰病形悉具。小便白者。以下
焦虛。有寒。不能制水。故令色白也。
病人脈陰陽俱緊。反汗出者。亡陽也。此屬
少陰。法當咽痛。而復吐利。
少陰病。欬而下利。譫語者。被火氣劫故也。
小便必難。以強責少陰汗也。

少陰病。脈細沉數。病為在裏。不可發汗。
少陰病。脈微。不可發汗。亡陽故也。陽已虛。
尺脈弱瀋者。復不可下之。
少陰病。脈緊。至七八日。自下利。脈暴微。手
足反溫。脈緊反去者。為欲解也。雖煩下利。
必自愈。

少陰病。下利。若利自止。惡寒而踈卧。手足
温者。可治。

少陰病。惡寒而踈。時自煩。欲去衣被者。可

治。

少陰中風。脈陽微陰浮者。為欲愈。若煩躁

不得卧者。為未愈也。

二若煩躁不得卧者
句通行本闕

少陰病欲解時。從子至寅上。不至不愈而

少陰病。吐利。手足不逆冷。反發熱者不死。

脈不至者。灸少陰七壯。

少陰病。八九日。一身手足盡熱者。以熱在

膀胱。必便血也。

少陰病。但厥無汗。而強發之。必動其血。未

知從何道出。或從口鼻。或從目出者。是名
下厥上竭。為難治。

少陰病。惡寒身踈而利。手足逆冷者。不治。

少陰病。吐利躁煩四逆者死。

少陰病。下利止而頭眩。時時自冒者死。

少陰病。四逆惡寒而身踈。脈不至。不煩而

躁者死。

一作吐利而躁逆者死。

少陰病。六七日。息高者死。

少陰病。脈微細沉。但欲卧。汗出不煩。自欲

吐。至五六日。自利。復煩躁不得卧寐者死。

少陰病。始得之。反發熱。脈沉者。麻黃細辛

附子湯主之。方一。

麻黃

二兩 去節

細辛

二兩

附子

一枚 炮

去皮 破

八片

右三味。以水一斗。先煮麻黃。減二升。去

上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。

日三服。

少陰病。得之二三日。麻黃附子甘草湯微

發汗。以二三日無裏證。故微發汗也。方二。

麻黃

二兩 去節

附子

一枚 炮

去皮 破

八片

甘草

二兩 炙

右三味。以水七升。先煮麻黃一兩沸。去

上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。

日三服。

少陰病。得之二三日以上。心中煩。不得卧。

黃連阿膠湯主之。方三。

黃連 四兩 黃芩 二兩 芍藥 二兩

鷄子黃 二枚 阿膠 三兩

云三兩一挺

右五味。以水六升。先煮三物。取二升。去

滓。內膠烱盡。小冷。內鷄子黃。攪令相得。

溫服七合。日三服。

少陰病。得之一二日。口中和。其背惡寒者。

當灸之。附子湯主之。方四

附子

二枚炮去皮破八片

茯苓

三兩

人參

二兩

白朮

四兩

芍藥

三兩

右五味。以水八升。煮取三升。去滓。溫服

一升。日三服。

少陰病。脈浮而弱。弱則血不足。浮則為風。

風血相搏。則疼痛如掣。宜桂枝湯加當歸。

主之。方治通行本闕

桂枝湯加當歸方。即前桂枝湯加當歸二

兩。通行本闕

少陰病。身體痛。手足寒。骨節痛。脈沉者。附

子湯主之。五。用前第四方

少陰病。下利便膿血者。桃花湯主之。方六。

赤石脂一斤 乾薑一兩 粳米一升

右三味。以水七升。煮米令熟。去滓。溫服

七合。內赤石脂末方寸匕。日三服。若一

服愈。餘勿服。

少陰病。二。三日至四五日。腹痛。小便不利。

下利不止。便膿血者。桃花湯主之。用前第六

方

少陰病。下利便膿血者。可刺。

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。方八。

吳茱萸一斤

人參二兩 生薑六兩 大棗十二枚

右四味。以水七升。煮取二升。去滓。溫服七合。日三服。

少陰病。下利。咽中乾。通行本闕痛。胸滿心

煩。猪膚湯主之。方九。

猪膚一斤

右一味。以水一斗。煮取五升。去滓。加白

蜜一升。白粉五合。熬香和令相得。温分
六服。

少陰病。二三日。咽中腫。中腫二字。通行本闕。痛者。可

與甘草湯。不差。與桔梗湯。十。

甘草湯方

甘草二兩
不炙

右一味。以水三升。煮取一升半。去滓。温
服七合。日二服。今三載去辛。以少合煎

桔梗湯方。肉桂良者。苦麻中以蘇子。豈置

桔梗一兩甘草二兩

右二味。以水三升。煮取一升。去滓。温分
再服。

少陰病。咽中傷生瘡。痛引喉旁。本通行不能
語言。聲不出者。苦酒湯主之。方十一。

半夏

洗破如棗核十四枚

鷄子

一枚去黃內上苦酒着鷄子殼中

右二味。內半夏著苦酒中。以鷄子殼置
刀環中。安火上令三沸。去滓。少少含嚥
之。不差。更作三劑。

少陰病。咽中痛。痰飲氣逆。本通行半夏散及
湯主之。方十二。

半夏

洗

桂枝

去皮

甘草

炙

右三味。等分。各別搗篩。已合治之。白飲
和服。方寸匕。日三服。若不能散服者。以
水一升。煎七沸。內散兩方寸匕。更煮三

沸。下火令小冷。少少嚥之。

凡少陰病有咽痛者。脈必虛數而細。本通行

少陰病。下利。白通湯主之。方十三。

葱白四莖 乾薑一兩 附子一枚 生去皮 破八片

右三味。以水三升。煮取一升。去滓。分溫

再服。

少陰病。下利。脈微者。與白通湯利不止。厥逆無脈。乾嘔煩者。白通加猪膽汁湯主之。服湯脈暴出者死。微續者生。白通加猪膽

湯。方十四。白通湯用上方

葱白四莖 乾薑一兩 附子一枚 生去皮 破八片

人尿五合 猪膽汁一合

右五味。以水三升。煮取一升。去滓。內膽
 汁。人尿。和令相得。分溫再服。若無膽亦
 可用。
 少陰病。二三日不已。至四五日。腹痛。小便
 不利。四肢沉重疼痛。自下利者。此為有水
 氣。其人或欬。或小便利。或下利。或嘔者。真

武湯主之。方十五。

茯苓三兩 芍藥三兩 白朮二兩

生薑三兩 附子一枚

右五味。以水八升。煮取三升。去滓。溫服
 七合。日三服。若欬者。加五味子半升。細
 辛一兩。乾薑一兩。若小便利者。去茯苓。

若下利者。去芍藥。加乾薑二兩。若嘔者。去附子。加生薑足前為半斤。少陰病。下利清穀。裏寒外熱。手足厥逆。脈微欲絕。身反不惡寒。其人面色赤。或腹痛。或乾嘔。或咽痛。或利止脈不出者。通脈四逆湯主之。方十六。

甘草	<small>二兩</small>	附子	<small>大者一枚生用</small>
乾薑	<small>三兩強人可四兩</small>	人參	<small>二兩</small>
			<small>通行本闕人參</small>

右四味。以水三升。煮取一升二合。去滓。分溫再服。其脈即出者愈。面色赤者。加蔥九莖。腹中痛者。去蔥。加芍藥二兩。嘔者。加生薑二兩。咽痛者。去芍藥。加桔梗

一兩。利止脈不出者。去桔梗。加人參二兩。病皆與方相應者。乃服之。
少陰病。四逆。其人或欬。或悸。或小便不利。或腹中痛。或泄利下重者。四逆散主之。方十七。
四逆散。即四逆湯中四味為散。

少陰病。下利。六七日。欬而嘔渴。心煩不得眠者。豬苓湯主之。方十八。
豬苓 去皮 茯苓 阿膠 澤瀉
滑石 各一兩
右五味。以水四升。先煮四物。取二升。去滓。內阿膠烱盡。溫服七合。日三服。

少陰病。得之二三日。口燥咽乾者。急下之。
宜大承氣湯。方十九。

枳實

炙五枚

厚朴

半斤去皮炙

大黃

酒洗四兩

芒消

三合

右四味。以水一斗。先煮二味。取五升。去滓。內大黃。更煮取二升。去滓。內芒消。更

上火令一二沸。分溫再服。一服得利。止

後服。

少陰病。自利清水。色純青。心下必痛。口乾

燥者。可下之。宜大柴胡湯。

大承氣湯

二十。

少陰病。六七日。腹脹不大便者。急下之。宜

大承氣湯。

用前第十九方

少陰病。脈沉者。急溫之。宜四逆湯。方二十

二。

甘草二兩 乾薑半兩 附子一枚 生用 去皮 破 八片

右三味。以水三升。煮取一升二合。去滓。

分溫再服。強人可大附子一枚。乾薑三

兩。

少陰病。飲食入口則吐。心中溫溫。欲吐復

不能吐。始得之。手足寒。脈弦遲者。此胸中

實。不可下也。當吐之。若膈上有寒飲乾嘔

者。不可吐也。當溫之。宜四逆湯。二十三。依方

上法

少陰病。下利。脈微瀼。嘔而汗出。必數更衣。

反少者當溫其上灸之。

脈經云灸陰可五十壯。

按本篇增經文一條訂正經文四條。增方一訂正方一。共增七十五字。

少氣弱血者。當溫其下。灸之。壯之。少氣弱血者。當溫其下。灸之。壯之。少氣弱血者。當溫其下。灸之。壯之。

辨厥陰病脈證并治

厥陰之為病。消渴。氣上撞心。心中疼熱。飢而不欲食。食則吐蚘。下之利不止。

厥陰中風。脈微浮為欲愈。不浮為未愈。若

手足拘急。亦為未愈也。

為未愈以下兩句通行本闕。

厥陰病欲解時。從丑至卯上。

厥陰病。渴欲飲水者。少少與之愈。

諸四逆厥者。不可下之。虛家亦然。

傷寒。先厥後發熱。而利者。必自止。見厥復

利。不利者。不可下之。利下之。亦不利。

傷寒。始發熱六日。厥反九日而利。凡厥利

者。當不能食。今反能食者。恐為除中。一云消中。

食以索餅。不發熱者。知胃氣尚在。必愈。恐

暴熱來。出而復去也。後日脈之。其熱續在

者。期之旦日夜半愈。所以然者。本發熱六

日。厥反九日。復發熱三日。并前六日。亦為

九日。與厥相應。故期之旦日夜半愈。後三

日脈之。而脈數。其熱不罷者。此為熱氣有

餘。必發癰膿也。其症不一。或發於背。或發於胸。或發於腹。或發於四肢。或發於頭面。或發於手足。或發於皮膚。或發於筋骨。或發於臟腑。或發於經絡。或發於脈道。或發於血氣。或發於精神。或發於飲食。或發於睡眠。或發於言語。或發於動作。或發於靜坐。或發於行步。或發於起居。或發於百病。
傷寒脈遲。六七日。而反與黃芩湯。微其熱。
脈遲為寒。今與黃芩湯。復除其熱。腹中應
冷。當不能食。今反能食。此名除中。必死。
傷寒。先厥後發熱。下利必自止。而反汗出
咽中痛者。其喉為痺。發熱無汗而利。必自

止。若不止。必便膿血。便膿血者。其喉不痺。
傷寒。一二日至四五日。厥者必發熱。前熱
者後必厥。厥深者熱亦深。厥微者熱亦微。
厥應下之。而反發汗者。必口傷爛赤。
傷寒病。厥五日。熱亦五日。設六日。當復厥。
不厥者自愈。厥終不過五日。以熱五日。故

知自愈。
 凡厥者。陰陽氣不相順接。便為厥。厥者。手足逆冷者是也。
 傷寒脈微而厥。至七八日。膚冷。其人躁無暫安時者。此為藏厥。非虵厥也。虵厥者。其人當吐虵。今病者靜。而復時煩者。此為藏

寒。虵上入其膈。故煩。須臾即止。得食而嘔。又煩者。虵聞食臭出。其人常自吐虵。虵厥者。烏梅丸主之。又主久利。方一。

烏梅	枝三百	細辛	六兩	乾薑	十兩
黃連	兩十六	當歸	四兩	附子	六兩炮
蜀椒	四兩出汗	桂枝	六兩去皮	人參	六兩
				黃蘗	六兩

右十味。異擣篩。合治之。以苦酒漬烏梅一宿。去核。蒸之。五斗米下。飯熟。擣成泥。和藥令相得。內臼中。與密杵二千下。丸如梧桐子大。先食飲服十丸。日三服。稍加至二十九。禁生冷滑物臭食等。

傷寒熱少微厥。指一作頭寒。嘿嘿不欲食。

煩躁數日。小便利。色白者。此熱除也。欲得食。其病為愈。若厥而嘔。胸脇煩滿者。其後必便血。

病者手足厥冷。言我不結胸。小腹滿。按之痛者。此冷結在膀胱關元也。

傷寒發熱四日。厥反三日。復熱四日。厥少

熱多者。其病當愈。四日至七日。熱不除者。必便膿血。傷寒。厥四日。熱反三日。復厥五日。其病為進。寒多熱少。陽氣退。故為進也。傷寒。六七日。脈微。手足厥冷。煩躁灸厥陰。厥不還者死。

傷寒發熱。下利至甚。厥不止者死。傷寒六七日。不利。便發熱而利。其人汗出不止者。死。有陰無陽故也。傷寒五六日。不結胸。腹濡。脈虛。復厥者。不可下。此亡血。下之死。發熱而厥。七日。下利者。為難治。

傷寒脈促。手足厥逆。可灸之。促一作縱

傷寒脈滑而厥者。裏有熱。白虎湯主之。方

知母合六石膏一斤碎甘草二兩粳米合六

右四味。以水斗一。煮米熟。湯成去滓。溫服

手足厥寒。脈細欲絕者。當歸四逆湯主之。

方三。通行本方缺
人參附子

當歸三兩桂枝三兩芍藥三兩人參四兩

細辛三兩甘草二兩通草二兩附子一枚

大棗二十五枚擘

右九味。以水八升。煮取三升。去滓。溫服

一升。日三服。

若其人內有久寒者。宜當歸四逆加吳茱

莫生薑湯方四。

當歸 三兩 芍藥 三兩 甘草 二兩 人參 四兩

通草 二兩 桂枝 三兩 細辛 三兩 附子 一枚

吳茱萸 二升 生薑 半斤 大棗 二十五枚

右十一味。以水六升。清酒六升。和煮取

五升。去滓。溫分五服。一方水酒各四升

大汗出。熱不去。內拘急。四肢疼。又下利。厥逆而惡寒者。四逆湯主之。方五。

人參 二兩 甘草 二兩 乾薑 一兩

附子 一枚 生用去皮破八片

右四味。以水三升。煮取一升二合。去滓。

分溫再服。若強人可用大附子一枚。乾

薑三兩。

大汗若大下利。而厥冷者。四逆湯主之。六。

用前第
五方

病人手足厥冷。脈乍緊者。邪結在胸中。心
下滿而煩。饑不能食者。病在胸中。當須吐
之。宜瓜蒂散。方七。

瓜蒂

赤小豆

右二味。各等分。異擣篩。合內白中更治
之。別以香豉一合。用熱湯七合。煮作稀
糜。去滓。取汁。和散一錢匕。溫頓服之。不
吐者。少少加。得快吐乃止。諸亡血虛家。
不可與瓜蒂散。

傷寒厥而心下悸。宜先治水。當服茯苓甘草湯。方八。

茯苓 二兩 甘草 炙一兩 生薑 切三兩

桂枝 二兩 去皮

右四味。以水四升。煮取二升。去滓。分温

三服。

傷寒六七日。大下後。寸脈沉而遲。手足厥逆。下部脈不至。咽喉不利。唾膿血。泄利不止者。為難治。宜人参附子乾薑阿膠半夏柏葉湯主之。不差。復以鹿茸附子人参乾薑湯救之。

人参附子乾薑阿膠半夏柏葉湯方

人參二兩附子一枚切八片炮乾薑二兩炮

半夏半升阿膠二兩柏葉三兩

右六味。以水六升。煮取二升。去滓。內膠

土烱消。溫服一升。日再服。

鹿茸附子人參乾薑湯方

鹿茸一錢附子一枚切八片炮乾薑三兩人參二兩

右四味。以水二升。先煮三味。取一升。去

滓。入鹿茸和服。

傷寒四五日。腹中痛。若轉氣下趣少腹者。

此欲自利也。麻黃升麻湯主之。按麻黃升麻湯通行

本誤接上條為難治下。

麻黃二兩去節當歸一分兩升麻一分兩

知母

銖十八

芍藥

銖六

黃芩

銖十八

菖蒲

銖十八

通行本
作姜薤

茯苓

銖六

白朮

銖六

桂枝

銖六

乾薑

銖六

石膏

銖六

綿裹
碎

甘草

銖六

按本方通行本多天門冬
一味注用六銖去心

右十三味。以水一斗。先煮麻黃一兩沸。

去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。分溫三

服。相去如炊三斗米頃。令盡。汗出愈。

傷寒本自寒下。醫復吐下之。寒格更逆吐

下。若食入口即吐。乾薑黃芩黃連人參湯

主之。方十。

乾薑

黃芩

黃連

人參

各三兩

右四味。以水六升。煮取二升。去滓。分溫

再服。

下利有微熱而渴。脈弱者。今自愈。

下利。脈數有微熱。汗出。今自愈。設復緊。為

未解。一云設脈浮復緊

下利。手足厥冷。無脈者。灸之不溫。若脈不

還。反微喘者死。少陰負趺陽者。為順也。

下利。寸脈反浮數。尺中自濇者。必清膿血。

柏葉阿膠乾薑丹皮湯主之。

柏葉阿膠乾薑丹皮湯方

柏葉三兩阿膠二兩乾薑二兩丹皮三兩

右四味。以水三升。先煮三味。煮取二升

去滓。內膠烱消。溫服一升。日再服。

下利清穀。不可攻表。汗出必脹滿。
下利。脈沈弦者。下重也。脈大者。為未止。脈
微弱數者。為欲自止。雖發熱不死。
下利。脈沉而遲。其人面少赤。身有微熱。下
利清穀者。必鬱冒汗出而解。病人必微厥。
所以然者。其面戴陽。下虛故也。

下利。脈數而渴者。今自愈。設不差。必清膿
血。以有熱故也。
下利後。脈絕。手足厥冷。晬時脈還。手足溫
者。生。脈不還者。死。
傷寒下利。日十餘行。脈反實者。死。
下利清穀。裏寒外熱。汗出而厥者。通脈四

逆湯主之。方十一。

人參 二兩 甘草 二兩 附子 大者一枚生

乾薑 三兩強人可四兩

右四味。以水三升。煮取一升二合。去滓。

分溫再服。其脈即出者愈。

熱利下重者。白頭翁湯主之。方十二。

白頭翁 二兩 黃蘗 三兩 黃連 三兩 秦皮 三兩

右四味。以水七升。煮取二升。去滓。溫服

一升。不愈。更服一升。

下利腹脹滿。身體疼痛者。先溫其裏。乃攻

其表。溫裏宜四逆湯。攻表宜桂枝湯。十三。

四逆湯用
前第五方

桂枝湯方

桂枝三兩芍藥三兩甘草二兩

生薑切三兩大棗十二枚

右五味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服

一升。須臾。啜熱稀粥一升。以助藥力。

下利欲飲水者。以有熱故也。白頭翁湯主

之十四。用前第十方

下利譫語者。有燥屎也。宜小承氣湯。方十

五。

大黃酒洗四兩枳實三枚厚朴二兩

右三味。以水四升。煮取一升二合。去滓。

分二服。初一服。譫語止。若更衣者。停後

服。不爾。盡服之。

下利後更煩。按之心下濡者。為虛煩也。宜

梔子豉湯。方十六。

肥梔子

十四箇

香豉

四合

右二味。以水四升。先煮梔子。取二升半。

內豉。更煮取一升半。去滓。分再服。一服

得吐。止後服。

嘔家。有癰膿者。不可治。嘔膿盡自愈。

嘔而脈弱。小便復利。身有微熱。見厥者。難

治。四逆湯主之。十七。

用前方第五

乾嘔吐涎沫。頭痛者。吳茱萸湯主之。方十

八。

吳茱萸洗一升湯 人參三兩 大棗十二枚

生薑切六兩

右四味。以水七升。煮取二升。去滓。溫服

七合。日三服。

嘔而發熱者。小柴胡湯主之。方十九。

柴胡八兩 黃芩三兩 人參三兩

甘草炙三兩 半夏洗半升 生薑切三兩

大棗十二枚

右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓

更煎。取三升。溫服一升。日三服。

傷寒。大吐大下之。極虛復極汗者。其人外

氣沸鬱。復與之水。以發其汗。因得噦。所以


然者。胃中寒冷故也。發其汗。因發汗。所以
傷寒。噦而腹滿。視其前後。知何部不利。利
之即愈。平三升。此湯。有桂。且升。涼。濕。脈。
便膿血。相傳為病者。名曰時利。此病多發
於秋。秋令燥。移燥於血。血燥相搏。其病乃
成。脈當浮弦而濇。宜桂枝當歸阿膠茯苓

黃芩半夏湯主之。若弦數者。加黃連與之。
得湯則嘔者。去黃連加乾薑與之。腹中脹
滿者。加厚朴與之。假令發寒熱者。表未解
也。當先解外。此治時利之大法也。通行
本佚。
桂枝當歸阿膠茯苓黃芩半夏湯方

桂枝 二兩 當歸 三兩 阿膠 半兩 茯苓 三兩

半夏	一升	黃芩	三兩	芍藥	二兩
右七味。以水一斗。先煮六物。取五升。去滓。內膠烱盡。分溫三服。若胸中有熱者。加黃連三兩。得湯嘔者。去黃連。加乾薑二兩。腹中脹滿者。加厚朴二兩。外有寒熱者。方中去呵膠。加柴胡四兩。生薑二					

兩。大棗十二枚。熱多者去桂。	按本篇增經文一條。計一百零九字。增方五。計三百四十六字。訂正方二。計十八字。刪八字。共增四百七十三字。	按本卷共增經文二條。增方六。訂正文四條。訂正方三。共增五百四十八字。刪八字。
----------------	---	--



Kitasato Memorial Medical Library

