

✕

d 9

慶應義塾
醫學部
圖書文化庫




177

導氣私錄補下

490.9
Do-3
2

No. 1369
10 d 9



1009

醫藥文庫

導竅私録補之下合二心內之表其六

備後大貴小出龍君德三著

男信近義 技

○脾肝腎其他諸部疾

論曰脾中風者翕々發熱形如醉人腹中煩重皮目


潤々而短氣

論曰水在脾少氣身重 亦曰脾水者其腹大四肢

苦重津液不生但苦少氣小便難

經曰脾脹者喜噦四肢煩悅體重不能勝衣卧不安

脹論



麻子仁丸。論曰跌陽脉浮而澀。浮則胃氣強澀則小便難。浮澀相搏大便則堅其脾爲約。麻子仁十二兩芍藥各四兩枳實各四兩大黃厚朴各八兩杏仁六兩右六味末之煉蜜和丸梧子大飲服十丸日三以知爲度

茵陳蒿湯。論曰陽明病發熱汗出此爲熱越不能發黃也但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴引水漿者此爲瘀熱在裏身必發黃。茵陳蒿一丈八分梔子大黃各六分已上三味以水二合先煮茵陳取一合二勺內二味煮取六勺

補血二

茵陳五苓散。論曰黃疸病。茵陳蒿十分五苓散五分右二物和先食飲方寸匕日三服

麻黃淳酒湯。論曰治黃疸病。麻黃三錢右一味

以美酒一合二勺煮取六勺頓服盡冬月用酒春

論月用水煮之

小柴胡湯。方見前。論曰諸黃腹痛而嘔者

梔子蘘皮湯。論曰傷寒身黃發熱者。梔子一錢五分

甘草五分黃蘘一錢右以水一合六勺煮取六勺

小建中湯。方見前。論曰男子黃小便自利

大黃消石湯。論曰黃疸腹滿小便不利而赤自汗

出此為表和裏實當下之 大黃 黃蘗 消石
各八分 梔子 四分 已上四味以水一合二勺煮三
 味取六勺去滓內硝石冷消一合六勺 煎六分
 論曰肝中寒者兩臂不舉舌本燥喜大息胸中痛不
 得轉側食則吐而汗出也
 論曰肝中風者頭目暈兩脇痛行常偃令人嗜甘
 論曰水在肝脇下支滿噎而痛
 論曰肝水者其腹大不能自轉側脇下腹痛時々津
 液微生小便續通
 經曰肝脹者脇下滿而痛引小腹

補血三

旋復花湯 論曰肝著其人常欲蹈其胸上先未苦

時但欲飲熱 金匱五臟風寒積聚病篇 旋覆花 三兩

葱 十四莖 新絳 少 右三味水煎

龍膽瀉肝湯 同 治小便澀滯或莖中作痛屬肝經

濕熱者 上 車前 木通 生苜 歸尾 山梔

黃芩 甘草 各五分 澤瀉 龍胆 各一錢半 右九

味水煎服加大黃尤妙也

經曰膽足少陽也是動則病口苦善大息心胸痛不

能轉側甚則面微有塵體無膏澤 經脈論

又曰膽病者善大息口苦嘔宿汁心下澹々恐人將

捕之 邪氣藏府病形篇

又曰膽脹者脇下痛脹口中苦善大息 脹論

柴胡龍骨牡蛎湯 方見前 論曰傷寒八九日下之胸

滿煩驚小便不利讖語一身盡重不可轉側者

白虎湯 論曰三陽合病腹滿身重難以轉側口不

仁而面垢讖語遺尿發汗則讖語下之則額上生

汗手足逆冷若自汗出者 知母 六分 甘草 二分

石膏 一圭六分 粳米 一圭二分 右四味以水一合二勺

煮取六勺

大承氣湯 方見前 論曰傷寒若吐若下後不解不大

補世四

便五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨

語如見鬼狀若劇者發則不知人循衣摸狀惕而

不安微喘直視脉弦者生濇者死微者但發熱讖

語者大承氣湯主之若一服利止後服 發後限數

參棗丸 入 治一切驚心怖膽累效 辰砂五錢

人參 酸棗仁各一兩 乳香 二錢 已上四味為末

蜜丸彈子大每一丸薄荷煎湯化下 姜水送下

仁熟丸 入 治膽虛常多畏恐不能獨卧頭目不利

人參 枳殼 五錢 五味子 桂心 山茱萸 茯神

甘菊花 枸杞子各三分 栝子仁 熟地黃各二兩

右爲丸每二錢温酒調服
 温膽湯 治大病後虛煩不得眠此寒膽也 又曰
 心膽怯弱怔忡易驚者 竹茹一錢 甘草五分
 陳皮 茯苓 半夏 枳實各三錢半 姜 右七
 味水煎
 梔子鼓湯 論曰陽明病脉浮而緊咽燥口苦腹滿
 而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則燥
 心憤々反讞語若加燒鍼必怵惕煩燥不得眠下
 之則胃中空虛客氣動膈心中懊懣舌上胎者
 梔子八分 香鼓二錢 已上二味以水一合六勺先

補世五

煮梔子取一合去滓內鼓煮取六勺
 論曰水在腎心下悸

論曰腎水者其腹大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛
 鼻上汗其足逆冷面反瘦

經曰腎脹者腹滿引背央々然腰體痛
 腎氣丸 論曰虛勞腰痛少腹拘急小便不利者○

又曰夫短氣有微飲當從小便去之苓桂朮其湯
 主之腎氣丸亦主之 乾地黄八兩 山茱萸

薯蕷各四兩 澤瀉 茯苓 牡丹皮各三兩 桂枝
 附子各一兩 已上八味末之煉蜜和丸梧子大酒

下十五九日再服

苓薑朮甘湯

方見前

論曰腎著之病其人身體重腰

中冷如坐水中形如水狀反不渴小便自利飲食

如故病屬下焦身勞汗出衣裏冷濕久久得之腰

以下冷痛腰重如帶五千錢

苓桂朮甘湯

論曰夫短氣有微飲當從小便去之

苓桂朮甘湯主之腎氣丸亦主之

茯苓一分

桂枝九分

朮各六分

右四味以水一合二

勺煮取六勺

五苓散

方見前

論曰男子消渴小便反多以飲一斗

補此六

小便一斗腎氣丸主之脉浮小便不利微熱消渴

者宜利小便發汗

經曰膀胱脹者少腹滿而氣癢脹論

消礬散 論曰黃家日晡所發熱而反惡寒此為女

勞得之膀胱急少腹滿身盡黃額上黑足下熱因

作黑疽其腹脹如水狀大便必黑時澹此女勞之

病非水也腹滿者難治 消石 礬石各等分

右二味為末以大麥粥汁和服方寸匕日三服病

隨大小便去小便正黃大便正黑是候也

桃核承氣湯 論曰大陽病不解熱結膀胱其人如

狂血自下下者愈其外不解者尚未可攻當先解
外外解已但小腹急結乃可攻之 桃仁 桂枝
芒消 甘草 各五分 大黃 一錢 已上五味以水一
合五勺煮取六勺去滓內芒消微沸令消
龍按桃核承氣湯之證云熱結膀胱其人如狂血
自下或ハ曰夕仲景氏內景ヲ不知膀胱ハ尿囊
也血ハ血室之所關ナリ血下リ少腹急結者ヲ
以テ熱結膀胱ト言モノハ誤ナリト龍私ニ按
スルニ長沙氏ノ書小柴胡湯之證熱入血室ト
云下瘀血湯之證乾血在血室ト云大黃甘遂湯

補世七

之証水血結在血室ト云其他血室膀胱之語往
々見ヘタリ仲景氏豈不知血室膀胱之有別哉
蓋シ桃核承氣湯之血下ルト言モノハ多ハ大
腸ヨリ下ル亦膀胱ヨリ下ルモアリ血室ヨリ
下ルモアリ皆桃核承氣湯之所至治ナリ又外
証不解上逆シテ衄血スルトモアリ麻黃湯桂
枝湯之證是ナリ此ヲ以テ血證ノ血室二ノ
拘ハラサルト見ヘシ今承氣湯之証ニ熱結
膀胱ト云モノハ旨アリ當ニ血ハ心ヨリ出テ
一身四肢爪髮端ニ至ル迄往還セサル所ナキ

ヲ知へし蓋血室ハ有餘ノ血ノ聚ル処ナリ真
血ノ源淵ニハアラス

抵當丸 論曰傷寒有熱少腹滿應小便不利今反

利者爲有血也當下之不可餘藥 水蛭 蠅蟲

桃仁 各二十個 大黃 六錢 右四味杵分爲四丸以水

九勺煮一丸取六勺服之晡時當下血若不下者

更服

猪苓湯 方見前 論曰若脉浮發熱渴欲飲水小便不

利者

苓桂甘棗湯 論曰發汗後其人臍下悸者欲作奔

補世八

豚 茯苓 一分 甘草 四分五厘 大棗 五分五厘 桂枝

六分 已上四味以水二合煮取六勺

桂枝加桂枝湯 論曰燒鍼令其汗鍼處被寒核起

而赤者必發奔豚氣從少腹上衝心者灸其核上

各一壯與桂枝加桂枝湯 桂枝湯方內加桂 三分

煮如本方

苓桂五味甘艸湯 論曰欬逆倚息不得卧小畜龍

湯主之青龍湯下已多唾口燥寸脉沉尺脉微手

足厥逆氣從小腹上衝胸咽手足痺其面翕々如

醉狀因復下流陰股小便難時復冒者與苓桂五

味甘艸湯治其氣衝心茯苓桂枝各八分甘艸六分五味各一分右四味以水五合六勺煮取六勺

奔豚湯論曰奔豚氣上衝胸腹痛往來寒熱者

甘草二兩川芎二兩當歸二兩黃芩二兩芍藥各二兩生葛五兩

半夏五兩生姜各四兩甘李根白皮一斤右九

味以水二合煮取六勺一右四方奔豚氣ヲ治ス

氣臍下ヨリ起リ上テ心胸ヲ衝ク難經二之ヲ

腎積ト云奔氣及脚氣ノ類ハ皆氣上テ心ヲ衝

ク忽チ死スルモノ間々多シ甚々急卒ノ病ニシ

補血丸

テ最可恐ナリ奔豚湯謂不治奔豚氣者非

營衛津液論并治方例

經曰人受氣於穀穀入於胃以傳於肺五臟六府皆

以受氣其清者為營濁者為衛營在脉中衛在脉

外○亦曰營氣之道精專者行於經隧常營無已

終而復始是謂天地之紀○亦曰營衛者精氣也

血者神氣也故血之與氣異名同類焉故奪血者

無汗奪汗者無血故人生有兩死而無兩生汗根

論曰營緩則為亡血衛緩則為中風榮康味榮康味

亦曰寸口脉浮而遲浮即為虛遲即為勞虛則衛氣

亦不足勞則榮氣竭
桂枝湯論曰病常自汗出者此為榮氣和榮氣和
者外不諧以衛氣不共榮氣和諧故爾以榮行脉
中衛行脉外復發其汗榮衛和則愈亦曰病人
藏無他病時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和
也先其時發汗則愈亦曰大陽病發熱汗出者
此為榮弱衛強故使汗出欲救邪風者桂枝湯主
之 方見前

柴胡加桂枝湯論曰發汗多亡陽譫語者不可下
與柴胡加桂枝湯和其榮衛以通津液後自愈

補四

小柴胡湯方內加芍藥桂枝各三分

大烏頭煎論曰腹痛脉弦而緊張則衛氣不行即

惡寒烏頭煎 三錢 右以水九勺煮取三勺去滓內

蜜六勺煎取六勺

大烏頭煎最大攻劇之方也
初學之輩妄不可用之

越婢加朮湯 方見前 論曰內極熱則身體津脫腠理

開汗大泄厲風氣下焦脚弱亦曰裏水者一身

面目黃腫其脉沉小便不利故令病水假令如小

便自利此以津液故令渴也

小柴胡湯 方見前 論曰陽明病脇下鞅滿不大便而

嘔舌上白胎者可與小柴胡湯上焦得通津液得

下胃氣因和身濺然而汗出解也

○婦人疾

桂枝湯

方見前

論曰婦人得平脉陰脉小弱其人渴

不能食無寒熱名妊娠桂枝湯主之於法六十日

當有此症設有醫治逆者却一月加吐下者則絕

續之○又曰產後中風續之數十日不解頭微痛惡

寒時々有熱心下悶乾嘔汗出雖久陽且證續在

耳可與陽且湯

陽且湯者桂枝湯也

乾薑人參半夏丸論曰妊娠嘔吐不止乾嘔者

乾薑人參

各一兩

半夏

二兩

右三味末之以生

補四十一

薑汁糊為丸如梧子大飲服十九日三服

龍按稱惡阻病者婦人經斷一二月二三月或四

五月之間嘔而不能食雖與止嘔吐之藥而不止

者用此方得奇効

芎歸膠艾湯論曰婦人有漏下者有半產後因續

下血都不絕者有妊娠下血者假令妊娠腹中痛

為胞阻

芎藭

阿膠

甘草

芍藥

各三分

艾葉

當歸

各四分

乾地黃

九分

右六味以水

一合清酒一合煮取六勺去滓內膠令消盡

龍按阻字凡妊娠中嘔吐者曰惡阻腹痛者曰胞

阻皆阻隔之義也近代之書或有作疝字者恐誤
乎合散配一合煮取六分去滓內服今試盡

附子湯 論曰婦人懷娠六七月脉弦發熱其胎愈

脹腹痛惡寒者少腹如扇所以然者子藏開故也

當以附子湯温其藏附子黃芩茯苓芍藥各六分

人參四分朮八分右五味以水一合六勺煮取六

勺用其古方聲言也

當歸芍藥散 論曰婦人懷妊腹中疝痛當歸

芍藥各三兩茯苓朮各四兩澤瀉半斤

右六味杵為散取方寸匕酒和日三服水煎服亦

補四十二

佳對一經合散之方又鼻上受風故以水二

歸母苦參丸 論曰妊娠小便難飲食如故

當歸貝母苦參各四兩 右三味末之煉蜜丸

如小豆大飲服三丸加至十九

葵子茯苓散 論曰妊娠右水氣身重小便不利洒

浙惡寒起即頭眩者葵子一分茯苓三兩右二

味杵為散飲服方寸匕日三服小便利愈水煎服

亦佳

當歸散 論曰婦人妊娠宜常服 方後曰妊娠常

服即易產胎無苦疾產後百病悉主之 當歸

黃芩 芍藥 各一斤 白木 半斤 右五味杵

為散酒飲服方寸七日再服

白木散 外臺 論曰妊娠養胎 白木 芎藭 各四分

蜀椒 三分去汗 牡蠣 二分 右四味杵為散酒服

錢七日三服夜一服水煎服亦佳

旋覆花湯 方見前 論曰寸口脉弦而大弦則為減大

則為芤減則為寒芤則為虛寒虛相搏此名曰革

婦人則半產漏下

琥珀湯 山東洋先生方 治產後腫 琥珀 一錢半 商陸 一錢

桂枝 一錢或下子 猪苓 八分 反鼻 五分 右五味以水二

補四十三

合煮取一合 元幹曰加澤瀉更妙也

小柴胡湯 方見前 論曰新產婦人有三病一者病瘥

二者病鬱胃三者大便難 云云 大便堅嘔不能食

小柴胡湯主之○又曰婦人中風七八日續得寒

熱發作有時經水適斷者此為熱入血室其血必

結故使如瘧狀發作有時○又曰婦人中風發熱

惡寒經水適來得七八日熱除脉遲身涼和胸脇

滿如結胸狀讖語者此為熱入血室也當刺期門

隨其實而取之○又曰婦人在草蓐自發露得風

四肢苦煩熱頭痛者與小柴胡湯頭不痛但煩者

三物黃芩湯主之

三物黃芩湯方 黃芩四分 苦參八分 乾地黄一分

右三味以水一合八勺煮取六勺

下瘀血湯 論曰產婦腹痛法當以當歸芍藥散假

令不愈者此為腹中有乾血著臍下宜下瘀血湯

主之亦主經水不利 大黃四錢 桃仁 蟅虫

各二十枚 右三味末之煉蜜和為四丸以酒八勺煮

一九取六勺

大承氣湯 方見前 論曰產後七八日無大陽證少腹

堅痛此惡露不盡不大便煩燥發熱切脉微實再

補四十四

倍發熱日晡時煩燥者不食食則譫語至夜即愈

宜大承氣湯主之熱在裏結在膀胱也

竹葉湯 論曰產後中風發熱面正赤喘而頭痛

竹葉一把 葛根三兩 防風 桔梗 桂枝 人參

甘草各一兩 附子一枚炮 大棗十五枚 生姜五兩

右十味以水一斗煮取二升半分溫三服溫覆使

汗出頸項強用大附子一枚破之如豆大煎藥揚

去沫嘔者加半夏半升

竹皮大丸 論曰婦人乳中虛煩亂嘔逆安中益氣

生竹茹 石膏各二分 桂枝 白薇各一分 甘草

七分 右五味末之棗肉和丸彈子大以飲服一九
日三夜二服有熱者倍白薇煩喘者加栝實一分
白頭翁加甘艸阿膠湯 論曰產後下痢虛極

白頭翁 黃連 黃栢 秦皮 各六分 甘艸

阿膠 各四分 右五味以水一合七勺煮取六勺去

滓內膠令消

千金內補當歸建中湯 治婦人產後虛羸不足腹
中刺痛不止吸吸少氣或苦少腹拘急痛引腰背
不能飲食產後一月日得服四五劑為善令人強
壯 例曰若去血過多崩傷內衄不止加地黃六

補四十五

阿膠 二兩 當歸 四兩 桂枝 生薑 各三兩 芍藥

六兩 甘艸 二兩 大棗 十二枚 右六味以水一斗煮

取三升分溫三服一日令盡若大虛加飴糖 六兩

八味丸 腎氣丸 凡云方見前 論曰婦人病飲食如故煩熱不得

卧而反倚息者何也曰此名轉胞不得溺也以胞

系了戾故致此病但利小便則愈

龍按スルニ八味丸ノ證ニ所謂轉胞ノ胞ハ子

宮ナリ若其胞系了戾而膀胱ヲ妨レハ小便不

利又是即チ八味丸ノ證ナリ又賀川氏ノ產論

ニ轉胞ノ術アリ其術ヲ施シテ子宮膀胱各其

本位ニ復セシムレバ小便通シテ忽チ安シ故
ニ子宮膀胱ノ位置ヲ常ニヨク會得セサレバ
術ヲ施ト雖氏功ヲ取ルト少シ蓋シ轉胞ノ術
ハ一旦ノ安ヲ得ノミ始終ハ味丸ヲ用テ腎氣
ヲ調理スルニアラサレハ全愈ヲ得カタシト
シルヘシ

半夏厚朴湯 論曰婦人咽中如有灸燔者 半夏

一匁二分 厚朴 三分 茯苓 四分 生姜 五分 乾蘇葉

二分 右五味以水一合五勺煮取六勺

甘麥大棗湯 論曰婦人藏躁喜悲傷欲哭象如神

補四十六

靈所作數欠伸者 甘艸 四分五厘 小麥 二匁四分

大棗 四分 已上三味以水一合二勺煮取六勺

溫經湯 論曰問曰婦人年五十所病下利數十日

不止暮即發熱少腹裏急腹滿手掌煩熱唇口乾
燥何也師曰此病屬帶下何以故曾經半產瘀血
在小腹不去何以知之其證唇口乾燥故知之當
以溫經湯主之 吳茱萸 三兩 當歸 牡丹皮

芍藥 人參 桂枝 阿膠 川芎 生薑 一匁

甘草 各二兩 半夏 麥門冬 一升去心 右十二味

以水一斗煮取三升分溫三服亦主婦人少腹寒

久不受胎兼治崩中去血或月水來過多及至期不來

土瓜根散論曰帶下經水不利少腹滿痛經一月

再見者及陰癰腫者土瓜根芍藥桂枝

麝蟲各三分右四味杵為散酒服方寸匕日三服

礬石丸論曰婦人經水閉不利藏堅癖不止中有

乾血下白物者礬石三分燒杏仁一分右二味

末之煉蜜和丸棗核大內藏中劇者再內之

紅藍花酒論曰婦人六十二種風及腹中血氣刺

痛者紅藍花一兩右一味以酒一大升煎減半

補四十七

頓服一半未止再服

狼牙湯論曰少陰脉滑而數者陰中即生瘡陰中

蝕瘡爛者洗之狼牙二兩右一味以水四升煮

取半升以綿纏筋如繭浸湯瀝陰中日四遍

膏髮煎論曰胃氣下泄陰吹而正喧此穀氣之實

也猪膏半斤亂髮如雞子大三枚右二味和膏中

大煎之髮消藥成分再服病從小便出

挑核承氣湯方見前熱結膀胱其人如狂血自下者

大及少腹急結者

抵當湯方見前論曰熱在下焦其人發狂者少腹鞭

滿喜忘者有畜血熱論曰熱在腸中小腹腫痞按之即痛
便膿血者方見前

大黃甘遂湯論曰婦人小腹滿如敦狀小便微難
而不渴生後此為水與血俱結在血室也味大黃

各四分其遂阿膠各七分右三味以水合八
勺煮取六勺

當歸補血湯辨治男婦肌熱燥熱目赤面紅煩渴
引飲晝夜不息其脉洪大而虛重按全無者

黃芪蜜炙一兩當歸三錢右二味水煎

補三八

龍按スルニ當歸補血湯之症ト白虎湯之症甚

相似タリ脉亦大二同フシテ少ク異ナリ其少

ク異ナルモ人太ク要ナリ所ナリ若不知ハ人

ヲ誤ル克ク之ヲ知レハ死ヲ起ス幾微ノ間ニ

シテ人ノ死生壽夭係ル可不慎哉

羚羊散濟生子癇者目牙口噤癇仆也宜此方

當歸蘇川防風一茯苓一獨活一杏仁

薏苡各三分酸棗一木香一五加一羚羊一甘草

生薑各二分右十三味水煎服

龍胆瀉肝湯方見前治婦人前陰濕痒者

神功瓜呂散 大全良方 產後吹乳乳癰主之

瓜呂根 甘草 當歸 各五分 酒浸 乳香 沒藥 各一分

右五味為末用清酒煎服良久再服其効妙也婦人乳癰方雖多獨此一方神功無類万不失一

小柴胡加石羔湯 方見前 治乳癰結核者氣鬱滯而

乳房內結核與乳岩初起相似能察其挽微而莫

誤焉乳岩核硬而漸々腫大也乳癰核軟而荏苒

不腫大也小柴胡加石羔湯至之兼用瓜呂散

葛根加桔梗湯 方見前 風冷入乳房邪熱結而為寒

熱腫痛者主之甚者加牛蒡子更妙也

補四十九

瓜呂橘皮湯 一方 治乳癰腫痛者核久內脹作痛外

腫堅硬煖熱手不可近謂之乳癰 瓜呂根

青皮 各二分 石羔 當歸 皂角刺 金銀花

各一分 甘草 一分 右七味以水七合煮取二合分

溫服 二三次

鹿角散 一方 治婦人乳頭生瘡汁出疼痛不可忍者

鹿角 三分 甘草 一分 右二味為末以鷄子黃於銅

器中置溫處瘡上傳之日再即愈

龍按二婦人乳疾ヲ患ルモノ多シ是亦婦女子

ノ一大患而醫亦知ラザルベカラズ其中二壬

乳岩ハ尤難治ノ証トス。瘍醫ニシテ乳岩ヲ治スルモノ殊ニ稀也。偶々木國花園翁乳岩ヲ治スル神術アリ。然トモ翁ノ療法カヲ以テ之ヲ断裁ス。故ニ婦女子恐怖シテ治ヲ託セサレモノアリ。二三年若ハ五六年ニシテ皆死ス。醫ニシテ徒ニ之ヲ看ル。亦慨マサランヤ。余文政己丑夏。俗間ノ老媪ニ傳ル所ノ名灸アリ。其穴肺ノ輪ヲ圍テ凡テ十七穴。直ニ乳汁脉ノ湊源ナリ。之ヲ灸スルコト尤其謹ナキニアラス。是ヲ以テ近年乳岩乳癰ノ証ニ逢。毎ニ之ヲ教テ頻リニ

補五十

灸治ヲナサレメ驗ルニ輕キモノハ灸スルコト二三度ニシテ治ス。重キモノモ一二旬灸シテ數々功ヲ得タリ。故ニ今爰ニ載セ乳疾ヲ患ル人ニ告知シメテ。責テ千百中ノ一二ヲ救ントス。○乳岩ト乳癰トハ甚々紛ヲハレキ証ナリ。乳癰ハ初發ノ時必寒熱アリ。赤腫疼痛シ膿易ク斂リ易シ。乳岩ハ覺ヘズ。乳房中凝核ヲ生シ。之ヲ探レバグレクト動キ強テ不痛亦胸肋ニ着テ不動モアリ。是ハ又一段重証ナリ。乳癰ハ鍼刺テ膿ヲ取ハ早夕愈ユ。乳岩ハ鍼刺ベカラ

又。若誤テ之ヲ刺ハ必ス漫爛反花^{ヒレカク}元遂ニ不可
救ニ至ル。其他乳疾雖多不可治^{益夫}。逢原堂
方庸ニ詳ナリ。
經曰石瘕生於胞中。龍按スルニ婦人病癥瘕ノ症多シ。其中ニ石瘕
ト云アリ。婦人ノ子宮中ニ生シテ。一二年乃至
二三年モ惱ム。其症先ツ經水不行小腹結塊似
姙非姙動スレハ膀胱ヲ壓テ小便不利ナラシ
ム。亦大二惱サルモノモアリ。水氣滯リテ水腫
病トナルモアリ。亦腹ノミ大ニシテ鼓脹トナ

ルモノ間々多シ。何レモ其病因ヲ辨識セスシ
テ幾日藥ヲ用ルト雖氏治スルコト得ベカラ
ス。余石瘕ノ症ヲ折々見及ヒ夕リ。近時浪速米
屋町弟三街銀簪屋某妻。經閉三年小腹結堅塊
大如青橙。時々小便不利或自利一身枯燥飲食
雖如平漸々羸瘦。衆醫不効一醫與大黃牡丹湯
桃核承氣湯等。凡一年許一日卒然腹變急呼吸
短逼額上流冷汗俯不能仰。夜深而請治。於余。因
往診之。親族環坐扶病需藥於予。乃作芍藥甘草
湯與之。又以熊膽丸一分白湯兼服之。至翌日諸

證微寬。呼吸平穩得正座。余重脰其腹脉謂是石癥。作家方當歸飲加海藻湯煎服之二日。家人來告曰。婦人前門見一塊堅如石。余益仍與前方三日。堅塊脫出而愈。取塊洗視之大如桃。淡黑色太堅剛。碎而視之真石矣。亦可謂奇也。姑附記焉。以告後之遇。此証者云。

○蛇蟲辨

一 余解剖スル毎二其腹内ヲ攷ルニ。凡十人ニメ七八人ハ腸胃中ニ蛇虫アリ。偶體氣至テ健ニメ病氣ナキ様ナル人ニハ。蝮蟲更ニナキ者モ

補五十二

見ヘタリ。大体ハ皆生レ易キモノト見ユ。余解剖ニ從事シテ人ノ腹中ニ蛇虫生レ易キモノト云フヲ覺レヨリ以來。奇怪ノ症ニ逢テ蛇虫ヲ治シ効ヲ得タルコト多シ。心得アルヘキコトナリ。吾家累世傳ル所ノ一奇方アリ。木精丹ト云。專ラ蛇虫ヲ殺レ腸胃ヲ清クシ。癩癩膈噎噤口痢ヲ治ス。其他奇怪ノ症ニ用テ驗効アル藥ナリ。其方ノ製法太夕精細ニシテ筆頭ニ述ベカラザルヲ以テ今此ニ載セヌ。太史原載由之主千金曰。凡人腹中有尸虫。此物與人俱生而爲人大

害尸虫之形狀似夫馬尾。或薄筋依脾而居。乃有頭尾。皆長三寸。又有九夷。一曰伏虫。則群虫之主也。長四分。二曰蛇虫。長一尺。貫心則殺人。三曰白虫。長一寸。相生子孫轉多。其母轉大。長至四五寸。亦能殺人。四曰肉虫。狀如爛杏。令人煩滿。五曰肺虫。狀如蠶。令人欬嗽。六曰胃虫。狀如蝦蟇。令人嘔吐。胃逆喜噦。七曰弱虫。狀如瓜瓣。又名隔虫。令人多唾。八曰赤虫。狀如生肉。令人腸鳴。九曰螯虫。至細微。形如菜虫。狀居腸之間。多則為痔。劇則為癩。因人瘡癢。即生諸瘡。疽癰疥。齧虫無所不為。

補五十三

人亦不必盡有。有亦不必盡多。或偏有。或偏無。類婦人常多。其虫凶惡。人之極患也。常以白苧草沐浴佳。根葉皆可用。既是香草。且是尸虫所畏也。

凡欲服補藥。及治諸病。皆須去諸虫。並痰飲宿癖。醒々除盡。方可服補藥。不爾。必不得藥力。

治腎勞熱。四肢腫急。螻虫狀如菜虫。為患方。

蕪夷 胡粉 槐皮 各一兩 乾漆 二兩 貫衆 三枚

杏仁 四十枚 吳茱萸 五十枚 右七味 治下節平且

井花水服。方寸匕。

蕪蕪圓 治少小有蛇虫。結在腹中。數發。腹痛微下。

龍按
靡蕪
川芎
苗也

白汁吐悶寒熱飲食不生肌皮肉痿黃四肢不相
勝拳靡蕪貫衆 雷丸 山茱萸 狼牙
天門冬 各八兩 藿薈 甘菊花 各四兩 右八味爲
末蜜丸如大豆三歲飲服五丸以上漸至十九
治寸白蟲方 榧子四十九枚去皮以月上旬平且
空心服七枚七日服盡虫消成水
以上二説及三方愚息春達座右録ヨリ出シテ
今爰二載又其平日經驗スル所ナリ
今常物語に典業頭何某ト云ヤ人ニヤカク此醫師
五十許乃女の一身法ふくと腫た寸白小六

補五十四

そとくぬくに随て白髪麦れやうぶありのこ
おつりそとくと取く引お糸くと長くのふれハ出
るにゆうおつて廳乃指ふ巻付つり七尋八尋巻畢
る時女能目鼻常の人乃始くおつり思持こくとこれ
醫師とも感し養ふとやん張りおつり其後女業と法
けはは醫師云只薑苳湯試用る外の治法あるを
かゝはとも返しけり

一按薑苳湯ハ薑苳莖煎款五体身分集ニ其方ア
リ 右一説本朝醫談ニ見ヘ夕リ
烏梅丸 方見前 論曰蛇厥者當吐蛇令病者靜而復

時煩此為藏寒。蛇上入膈故煩。須臾復止得食而嘔。又煩者蛇聞食臭出其人常自吐蛇。蛇厥者烏梅丸主之。
甘艸粉蜜湯。論曰蛇蟲之為病令人吐涎心痛發作。有時毒藥不止。甘艸二錢粉一錢蜜四錢右三味以水九勺先煮甘艸取六勺去滓內粉蜜攪令和煎如薄粥。

粉之為品或為胡粉或為米粉或為甘艸粉。諸家說紛々未一定也。龍按或為胡粉者博物志有燒鉛成粉之文因以為胡粉。或為甘艸粉者其症

補五十五

急迫殊劇者也。因之用甘艸粉。雖然緩急迫以甘味者方中既有甘草蜜之二味焉。何以再用甘草粉為乎。亦胡粉者毒藥也。本論曰毒藥不止。今又何以用胡粉為乎。獨吾師惠美先生用米粉焉。是最為至當也。蓋內米粉攪令和煎則如薄粥亦能利於其症也。蓋字書粉字下曰礪米為細末。以是攷之粉者米粉也。其他若胡粉若金銀粉若海粉若粉壁之類。僉稱於粉者借此字也。甘艸粉蜜湯用米粉而奏効者數矣。惠美先生者每論而取實焉。此亦醫之意也。學者其思之。

理中安蛇湯六傷寒吐蛇者手足冷胃空虛也此方

主之方見前

藝疾之邑。備後國。惠蘓郡。比和村。河內屋藤七妻。小夜。齡四十有餘。某年春來。微寒熱往來。上逆頭眩胸腹動悸。心氣鬱々。不樂飲食。無味。顏色時赤。時青。腹中拘攣。大便祕。小便如平。二三醫治之。不得功也。請治於余。余診之。與柴胡桂姜湯。凡百有餘日。諸證依然。既至仲秋。一身枯瘦。時々微盜汗出。手足沉重。飲食愈減少。乃作黃芪建中湯與之。兼服木精丹。凡二十日許。而臍起脹。而不堪痒。自覺蠱焉。五六日有蟲

補五十六

從臍孔出。如大指長二寸。滿身有柔鱗。灰色而頭大。有口無齒。牙在尻。無肛穴。蠱々三日而死。婦人使。每入視之後。不日病差復。故其人稱之。尸虫逢入。輒出示之。其家從來有傳尸病。一男二女。皆十有餘歲而死。獨阿小夜。幸免死。此亦一奇事也。故記而備。后徵云。

○疥癬論并治方

西國ニテハ疥癬ト云
東國ニテハ濕瘡ト云

此病ハ多ク四時ノ雨濕毒ヲ受テ生スルナリ
然レ其人ノ稟賦ト行作トニ依テ一様ナ
ラス。陽ニ發スルモノアリ。陰ニ發スルモノアリ

リ。陽ニ發スルモノハ專ラ血脉ニ係テ出。瘡大ニシテ間々豆粒ノ如キモノ交リ。痒ク疼ク膿ヲナス。陰ニ發スルモノハ出瘡細ニシテ蚕種ノ如ク膿ヲナサス。唯疔痒ニ堪ヘス。又血毒甚ハタ深キ人ハ身體浮腫滿身ノ出瘡潰膿臭穢ニ堪ス。仰臥シテ轉側スヘカラス。手足屈伸スルコトアタハス。如斯ク症若シ治療ヲ誤レハ遂ニ救ヘカラサルニ至ル。近年世上疥癬大ニ流行シテ。都鄙貴賤ノ差別ナク之ヲ患ルモノ少カラス。其唯早ク治センコトヲ欲シテ治方ヲ誤リ

補五十七

内攻ニ死スルモノ多ク見及フ所ナリ。故ニ暫ク之ヲ論シテ。人々ノ心得トナサシメンコトヲ欲ス。

大体疥癬ハ先ツ桂麻各半湯。荊防敗毒散之類ヲ用テ。毒氣ヲ表發シ。次ニ葛根加大黃連翹湯。或ハ防風通聖散之類ヲ以テ。血毒ヲ通利シ。若水毒盛ニシテ浮腫アルモノニハ。赤小豆湯ヲ用ヒ。十分濕毒モ解シ浮腫モ退キタルヲ待テ。然レ後ニ藥湯ニ浴スレハ速ニ治ス。藥湯ハ浪花ナル小山氏ノ製スル所ノ疥癬藥ト稱スル

モノ甚夕名方ナリ。能々服藥ヲ用ヒ濕瘡ノ勢
ヒ除キタル時分ヲ候ヘ。此藥湯ニ浴スレハ根
治スルルヲ疑ヒナシ。

赤小豆湯 治諸疥瘡內攻腫者 赤小豆五錢

商陸二錢 麻黃七分 大黃 連翹各五分 桂枝三分

生姜一分 右七味以水二合煎取一合加反鼻益

妙

濟生赤小豆湯 治年少血氣俱熱遂生瘡疥變爲

腫滿或煩或渴小便不利者 赤小豆炒 當歸

商陸 澤瀉 連翹 芍藥 防已 桑白皮

補五十八

猪苓 澤瀉 各等分 生姜少 右十一味水煎温
服熱甚者加犀角

又按スルニ疥癬膿瘡等馬蘭之葉。又ハ橐吾之
葉ヲ以テ卷ハ。臭キ水大二出ツ。世人知ラス瘡ノ
毒出去ト心得テ。頻リニ是ヲ卷殊ニ知ラス。是
毒ノ出ルニ非ス。物ヲ以テ瘡ヲ包ミ覆フ故ニ。
蒸々トメ津水出ルナリ。如此レテ遂ニ内攻シ
死スルモノ間々多シ。可恐慎ナリ。

○名方類

治魚骨髒方

咽中ニ骨ノタチタルナリ

橄欖ヲ頻リニ食スヘシ。亦核ヲ粉ニシテ水ニテ飲モ宜シ。竹木ノ刺タルニモ効アリ。亦鳳仙花ノ實莖葉トモニ黒焼トナシ。酒ニテ用ヒテ大ニ効アリ。

治河豚魚毒方

フダノ毒ニアタルモノ

橄欖ヲ食スレハ其毒立地ニ解ス。亦煎シ用ルモ佳シ。亦一方白砂糖熱湯ニ拌飲テ大ニ毒ヲ解ス。海辺俗此方ヲ用テ常ニ効ヲ得ナリ。亦一人一日小蝦魚ヲ食シ體癢痺橄欖三箇核ヲ去テ之ヲ嚼率然體氣常ニ復ス

補五十九

橄欖肉一切ノ魚毒ヲ解ス。此モノ漢渡ナリ。藥舗

ニ貯ヘルモノ多ハ塩漬ナリ。故ニ塩出シテ藥

用ニス。亦近年砂糖漬ニシテ貯ルアリ。此ハ其マク用テ佳シ。只其真物ヲ撰ヒ用ユヘシ。近年漢種ニテ和産長崎ニ多シト云ヒ。又紀州ニヅクト云モノアリ。大抵橄欖ニ相似タリ。魚毒ヲ解スル功アリ。橄欖ノ一種トス。右蘭山先生本草解ニ見ユ

治療疽方

古書ニハ癰疽ノ發ル無定処トアレ凡多ハ指ニ發スルナリ

粘穢十キ土鍋ニ入レ。流水五合ヲ以テ能々煮

リ。蘭山先生ノ本艸解ニ出ツ。内藥ハ杏仁ヲ煎
シ用ユヘシ。

又方 本朝經驗 療風狗咬 鐵砂 一匁 番木鱉 六分

其艸 五分 右三味以水二合煎取一合服 小兒減半

又方 本朝經驗 急用熱小便洗淨咬處生杏仁研爛封

之日 一換宜服 防風 外麻 葛根 各五分

杏仁 一匁 其艸 一分 右五味以水一合半煎取一

合服此方甚効 谷字 共讀此書ニ此方ヲ用テ

又方 外臺 衆療不差毒攻心煩亂 嗽已 作大聲者

天靈蓋燒灰末以東流水和服方寸匕以活止。

補六十一

嗽音童
多言也

凡風犬咬者百日内忌飲酒忌食雞羊猪

肉肥膩及赤小豆一年勿食 茄子蕎麥青梅實勿

食之 又方 博聞類纂 狗咬血不止急以砂糖塗之立愈

血止方 キリキズ ツッキ、ズ 打ヤフリキズ
何疵ニモアレ先ツ血ヲ止ル 肝要ナリ

兵家ノ説ニ云。軍中ニテ血止ノ藥間ニ合又時

ハ。疵ヨリ出ル血ヲ少シ吞ヘシ。其マ、血止ム

モノナリ。又柿ノ澁ヲ吞ヘシ。手負ニハ具足ヲ

脱セスソリノ舟又様ニスヘシ。真綿ニ鍋スル

ヲ多ク付テ疵口ヲフスブル時ハ。疵愈テ翌日

軍場へ出ラルゝナリ。馬ノ手負モ如此薰へシ。
余嘗テ驗ミルニ。金瘡ハ火ニテ近クアブレハ
血止モノナリ。全九集擲磔作孔出血者。用通紅
炭火去灰帶火。乳鉢内入塩一捻。急研末塞瘡口
中令滿。以絹帶緊縛。不可寬。血立止。痛定不作膿
無水出極妙。

蝦夷人ハ箭鏃ニ毒ヲ附テ射ル。此毒ハ蒜ヲ力ニ
テ附へシ。鉄炮ノ疵口ニモ蒜ヲ附へシ。

右二方本朝醫談ニ見へタリ。毒箭ノ治方ハ余
未タ不驗ト雖。凡友入某ノ實驗セシヲ以テ俱

補六十二

二此二載ス

鼻衄不止時ハ其人ノ頭上ニ頻リニ冷水ヲ灌キ
而シテ鹿胎霜ヲ七分酒ヲ以テ服ス即止。若其
人性質弱ナレハ冷水ニテ手拭ヲ浸シ其人ノ
百會ニ抵。而シテ鹿胎子霜ヲ酒服スル。如前
方。

嚼斷活心 出血不止者急取米醋用鷄翎刷斷處

其血即止。而後 真蒲黃 杏仁各四 硼砂五分

右三味爲細末。煉蜜調。銜含之。

導竅私錄補終

然惟命命錄此書之書亦不流有之古今
現本將能月而得而者為兩序示其方法耳
致初湯能無而自得之則通所五物必有不
可尋者也
天保丙申十一月

醫小出信 敬題



Handwritten signature or mark in cursive script.

