

跌蹶轉筋陰疽疔虫

十九

妊娠

二十

產後

二十一

婦人雜病

二十二

雜療方

二十三

金匱要略註解

卷之九
九十九
九十九

氏平

跌蹶之蹶

劉棟云就與之為病類

亦有編體而成一病者

亦今取而論之也

跌蹶之蹶

不離之也

下先不

有程

堂上

治跌

治跌

治跌

金匱要略註解卷之十九

正珍曰一說曰跌當作跌字

跌蹶手指臂腫轉筋陰狐疝蚘蟲病脉證治第

十九 論一首 脉證一條 方四首

師曰病跌蹶其人但能前不能却刺臑入二寸此大

陽經傷也病人常以手指臂腫動此人身體痲痲者

藜蘆甘艸湯主之

此段未詳

藜蘆甘艸湯方

轉筋之為病其人臂脚直脉上下行微弦轉筋入腹

者雞屎白散主之

重刊

金匱要略卷之十九

目... 益... 粉... 心... 正... 猪... 此... 引... 似... 今... 心...

心... 痛... 而... 時... 而... 溫... 腫... 蛇... 主... 苦... 人...

知故甘劑主之。○醫學六要曰風字從虫風化也濕熱鬱久則生蟲腐草為螢陳麥為蛾之類菓實外殼完整虫生于內人之腸胃無物不受豈得無虫云九道理或有之其猖狂於腸胃為痛為嘔為嗽為嗜種種煩苦須仗醫藥至蛔蟲乃人之消化搬運者偶為食傷則或吐或瀉出和中自安不可攻伐味者不知安用雷丸史君之類禍不旋踵

取 甘艸 二兩 枳 一兩 蜜 四兩 右三味以水三升先煮甘艸取一升去滓內枳蜜

攪令和煎如薄粥溫服一升差即止 蛇厥者當吐涎令病者靜而復時煩此為臟寒蛇止入膈故煩須更復止得食而嘔又煩者蛇聞食臭出其人常自吐蛇

烏梅丸方 烏梅 三百 細辛 六兩 乾姜 十兩 黃連 一斤

當歸 四兩 附子 六兩 川椒 四兩 桂枝 六兩 人參 六兩 黃蘗 六兩

右十味異搗篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核

蒸之五升米下飯熟持成泥和藥令相得內臼中與蜜杵二千下丸如梧子大先食飲服十九二服稍加至二十九禁生冷滑臭等食

吳昆曰胃虛臟寒得食而嘔蛇從上出者此方主之烏梅味酸蛔得之而軟連栝味苦蛔得之而伏椒細味辛蛔得之而死乾姜附桂溫臟寒也人參當歸補胃虛也

金匱要略註解卷之十九 終

金匱要略註解卷之二十

婦人妊娠病脉證并治第二十

脉證二條 方八首

師曰婦人得平脉陰脉小弱其人渴不能食無寒熱

各妊娠桂枝湯主之方見於法六十日當有此證設

有醫治逆者却一月加吐下者則絕之絕產半產之義

脉經曰腎名胞門子戶尺中腎脉也尺中之脉按

之不絕法妊娠也然其脉小弱渴不能食者血弱

而然故當以桂枝湯溫之蓋月水已絕一月而有

此證醫不知誤治之却又一月而加吐下者與治

目黑心云桂枝湯以其人渴不能食而附之者未之執之抑以養血之故致致有脈之附至

折云婦人有脈之不一

以心不實者宜早服

固加渴之不能食即

阻之各事也他

血之全云絕之者

絕止者皆候其自

嘗謂阻者何胎子

惡阻之物者何胎子

此之強弱于胎

月有之者蓋受胎之

此證醫不知誤治之却又一月而加吐下者與治

胎經此

胎前產後諸病
吐下之藥宜斷絕之六十月即是一月也
婦人宿有癥病經斷未及三月而得漏下不止胎動
在臍上者為癥痼害
經斷得胎也胎動在臍上者胎小隨為癥痼痼疾也
妊娠六月動者前二月經水利時胎下血者後斷三
月不血也所以血不止者其癥不去故也當下其癥
桂枝茯苓丸主之
此因有癥而胎動也雖後三月不下血以前三月
胎未固之時下血之故及至六月亦胎動血不止也
桂枝茯苓丸方

不血二字四思作血
字

在珠氏云此方婦人良法名奪命四治難產回春名催生湯以治產母胎痛最效

吐下之藥宜斷絕之六十月即是一月也

婦人宿有癥病經斷未及三月而得漏下不止胎動

在臍上者為癥痼害

經斷得胎也胎動在臍上者胎小隨為癥痼痼疾也

妊娠六月動者前二月經水利時胎下血者後斷三

月不血也所以血不止者其癥不去故也當下其癥

桂枝茯苓丸主之

此因有癥而胎動也雖後三月不下血以前三月

胎未固之時下血之故及至六月亦胎動血不止也

桂枝茯苓丸方

桂枝

茯苓

牡丹

桃仁去皮

芍藥各等分

右五味末之煉蜜和丸如兔屎大每日食前服一

丸不知加至三丸

桂枝芍藥牡丹桃仁共皆破癥血茯苓引以陰

下降所以其癥去也

取婦人懷娠六七月脉弦發熱其胎愈脹腹痛惡寒者

以腹如扇所以然者子臟開故也當以附子湯溫其

臟方未見

此證疑寒破子宮乎然惜平方未見

全溢云少腹如扇狀
惡寒如扇之侵襲
子宮之○宿淫曰少腹
如扇之○作冷者或
扇之也○宿八札行
麻曰扇木麻曰圍
○正珍曰如扇者得
急不弛○五難曰元
以前子團扇用絹
為之未有指者古
始用指扇出入懷
殊便

胎前產後諸病

命注胎阻者阻于胎前
血而危不順胎痛者
官人

心與胎阻者胞脉阻滯
血少而危不順胎
者為胎阻膠艾湯
主之

胎前產後
折之姓娠下血蓋胎
而人如世借之胎痛
胎前產後而下者胎阻
以審飾之也

一日婦人漏下者
主之
二日半產後用
梳下血不絕者
主之
三日姓娠下血而
胎中痛者胎阻
主之

疔与疔同字彙音

胎前急痛
心與云母散文疔音絞胎
中急方血不足而水侵
之血不足而水侵到胎
失之所養而友也
所害矣胎中能急疔
痛字

十全方得患阻之
而吧吐者之
心與云母散益虛溫胃
心與云母散中虛而有
心與云母散中虛而有

金匱要略

師曰婦人有漏下者有半產後因續下血都不絕者
有妊娠下血者假令妊娠腹中痛為胞阻膠艾湯主之

胞中因瘀血而阻絕是即半產而胎未墮盡之故也

芎歸膠艾湯方

芎藭 二兩 阿膠 二兩 甘草 二兩 艾葉 三兩

當歸 二兩 芍藥 四兩 乾地黄 六兩

右七味以水五升清酒二升合者取三升去滓內

膠令消盡溫服一升日三服不差更作

芎藭當歸地黃芍藥四物湯也以治血病不可

缺艾葉止胎動阿膠能止漏血甘草和諸藥

命注云綿之而痛不若實心之絞痛血氣之刺痛

婦人懷妊腹中疔痛當歸芍藥散主之

當歸芍藥散方

當歸 三兩 芍藥 一斤 茯苓 四兩

白朮 四兩 澤瀉 半斤 芎藭 半斤

右六味杵為散取方寸匕酒和日三服

當歸芍藥芎藭四物湯也白朮能利血補脾蓋

腹痛胎動恐脾虛胎即墮故用之茯苓澤瀉利

膀胱膀胱與胞同其氣通則胎定腹痛止

妊娠嘔吐不止乾姜人參半夏丸主之

乾姜人參半夏丸方

心與云母散益虛溫胃
心與云母散中虛而有
心與云母散中虛而有

方書竹花橘皮平安各
冬人多各三五女必以
仲景之末後也

此方和方不相
馬非仲景
心與云小便難而飲食如
加初起不由中焦出而
又云腹滿身重亦行
利更非水氣不有也
瀉少也

乾姜 一兩
人參 二兩命注所
半夏 一兩命注所
右三味末之以生姜汁糊為丸如梧子大飲服十
丸日三服

半夏止嘔乾姜溫胃嘔吐不止恐元氣虛乏之而

胎墮故用人參以補元氣

妊娠小便難飲食如故歸母苦參丸主之

當歸貝母苦參丸方

當歸 貝母 苦參 各四兩

右三味末之煉蜜丸如小豆大飲服三丸加至十丸

當歸治血貝母本草曰治淋瀝亦肺經氣分藥

男子加滑石半兩
折云飲食如故者胎中
胎動者之益以胞胎靠迫化
不施加也

也能散心胸鬱結之氣苦參本州曰治溺有餘
瀝逐水二味能共通小便非如淡滲之劑瀉利
膀胱有妨子宮也

取 妊娠有水氣身重小便不利酒淅惡寒起即頭眩葵

子茯苓散主之心曲云妊娠小便不利者上焦因而身重西漢
子全也水氣為病初虛熱少者實壞懸珠矣

酒淅惡寒頭眩皆因有水氣然

葵子茯苓散方

葵子 一升
茯苓 三兩

右二味杵為散飲服方寸匕日三服小便利則愈

茯苓淡利小便葵子淡滑治五癰利小便能入

丹溪云白木黃芩
方曰安胎丸

子宮故妊婦之所宜用又所宜忌也

婦人妊娠宜常服當歸散王之

命注云宜常服者雖云胎前宜服之折云產後百病悉主之至之此謂產後

當歸 黃芩 芍藥

芳菊 各一 白木 半斤

右五味并為散酒飲服方寸七日再服妊娠常服
即易產胎無苦疾產後百病悉主之

醫學原理有人參曰治胎婦一切諸症蓋妊娠
之婦氣血凝聚胎元濕熱易於壅滯法當調養
氣血清理濕熱是以用川歸芍藥川芎白木人

命注云
即疾嗽見血
不減人瘦予
因于胎痛加
劑而病少止
人藥胎安

參養血益氣黃芩清熱又曰本無人參有香附亦妙
妊娠養胎白木散王之

命注云
胎前宜服之
折云產後百病
悉主之至之此
謂產後

白木 芍菊 蜀椒 牡蠣

右四味并為散酒服一錢七日二服夜一服但苦

痛加芍藥心下毒痛倍加芍菊心煩吐痛不能食
飲加細辛一兩半夏大者二十枚服之後更以醋

漿水服之若嘔以醋漿水服之復不解者小麥汁
服之已後渴者大麥粥服之病雖愈服之勿置

妊婦脾虛弱則胎必墮故白木以補脾氣牡蠣

命注云苦字下脫胎字

此字諸注... 婦人傷胎懷身腹滿不得小便從腰以下重如有水

能固胎若窮散氣滯運血蜀椒少加温子宮是

所以能養胎也
婦人傷胎懷身腹滿不得小便從腰以下重如有水
氣狀懷身七月太陰當養不養此心氣實當刺瀉勞

官及關元小便微利則愈
見玉函
脈經云婦人懷胎一月之時足厥陰脈養二月足
少陽脈養三月手心主脈養四月手少陽脈養五
月足太陰脈養六月足陽明脈養九月足少陰脈
養十月足太陽脈養

金匱要略註解卷之二十終

婦人產後病脈證治第二十一

論一首 證六條 方七首

問曰新產婦人有二病一者病瘧二者

太便難何謂也師曰新產血虛多汗出喜中風故

令病瘧亡血復汗寒多故令瘧冒

瘧身軀反張也血虛筋燥又得風則瘧必起亡血

後復得汗經絡虛寒氣隨閉之則令瘧冒

亡津液胃燥故太便難

胃者六腑長也胃燥則腸亦燥太便堅

婦人產後病脈證治第二十一
好按下文所以產
在薄中肌背強不舒
循破傷也之傷區以產
血虛筋燥又得風則瘧必起亡血

按必大汗出者血氣循
還榮衛知之
秋代云微而必冒之而
字者微弱以新虛三吧
折去脈微弱以新虛三吧
不使食虛上其以花飲
之大便反堅以汗津液
反者反脈微弱病解
後食服陽已止能食
之八日更發熱者知
證之十日更發熱者
解之下平分爲別章
好按所以已下字
他篇錯簡或衍文

下支產於七八日無太跌
行之多氣而之者
○以爲胃實脈絀作
爲胃氣實新則云以
有國文脫之

命注云此段言大虛者
有實者即當以實治
可發明也
大虛者如案不燥如
此况他病乎

此內傷不足虛寒之
或產後感冷者
秋氏云此肝血之虛也
雙和散當于建石陽
至之

按以氣滯血虛更惡
不厚之微

產婦驚冒其脈微弱不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出以血虛下厥孤陽上出故頭汗出

血脉衰弱故其脈微弱也不能食者寒冒表也冒寒欲解則必大汗出此其證也

所以產婦喜汗出者亡陰血虛陽氣獨盛故當汗出陰陽乃復大便堅嘔不能食小柴胡湯主之

陰陽乃復厥逆氣復也

也小柴胡湯治肝鬱止嘔

取吧而不能食之病解能食七八日更發熱者此爲胃實大承氣湯主之

之方見產中
病解表證已解也表證已解而却發熱者熱邪在裏也故大承氣湯宜之

產後腹中疝痛當歸生薑羊肉湯主之并治腹中寒

亦虛勞不足

產後腹中疝痛者寒傷血然此同於寒亦不足之

當歸生薑羊肉湯方 見寒病中

產後腹痛煩滿不得臥枳實芍藥散主之

枳實芍藥散方

金匱要略 卷二十一

一證云疑之云子疑行
或疑之得效

治人云云其支加黃芩
名曰且湯加乾薑名曰
且湯者世之使此則
桂枝湯之義以別而
名也

病者不用葛根湯者
平陽者血虛也天行
○及陽之也其支支
若平陽之也

產後中風發熱面赤喘而頭痛
此即太陽陽明太陰合病也
凡風熱邪以而裏氣不同者宜於此
竹葉湯方

時陽火暫衰也
蓋將一舉而五之效

產後風續之數十日不解頭微痛惡寒時時有熱心
下悶乾嘔汗出雖久陽且證續在耳可與陽且湯

枝湯方見
○金鑑曰陽且湯即桂枝湯加黃芩

陽且各義未詳或曰服之陰邪散氣爽快如朝日
初出

產後中風發熱面正赤喘而頭痛竹葉湯主之

此即太陽陽明太陰合病也

竹葉湯方

竹葉一把 葛根三兩 防風 桔梗

桂枝 人參 甘草 附子 大棗 生姜 右十味以水一斗煮取一升半分溫三服溫覆使汗出

辨證云以上二方治
瘧之症在頭項後用
大附子一枚

揚去沫嘔者加半夏半外洗

葛根防風桂枝生薑四味備能去表邪竹葉桔
梗除肺熱人參大棗能助元氣甘州以和諸藥
而又非附子力則不能去大邪故用之以急治

之實產後可懼之證矣

婦人乳中虛煩亂嘔逆安中益氣竹皮大丸主之

目黑或乳中脈絕作產
中然乳則乳產之義
言單生中然此亦作
早之脈經乳作產
○折之脈經乳作產
○折之脈經乳作產

竹葉石膏湯主之
竹葉石膏湯主之
竹葉石膏湯主之
竹葉石膏湯主之

竹皮大丸方

生竹茹二分
石膏二分
桂枝一分
甘州七分
白薇一分

右五味末之棗肉和丸彈子大以飲服一丸日三夜二服有熱者倍白薇煩喘者加柏實一分

乳房陽明經是也因陽明熱煩乳中虛故石膏白薇涼清陽明熱竹茹微寒止煩熱兼治崩中凡婦人熱逆證不可缺之藥也桂枝甘州甘辛以去風緩邪治嘔逆○李時珍曰白薇古人多用後世罕能知之按仲景治婦人產中虛煩嘔

產後下利胎前作婦
人熱利下重
又後胃弱未有不虛者

產後下利虛極白頭翁加甘州阿膠湯主之
白頭翁加甘草阿膠湯方

白頭翁
甘州
阿膠各二兩

秦皮
黃連
蘘皮各三兩

右六味以水七升煮取一升半內膠令消盡分温

經作婦人
熱利下重
產後下利

三服

白頭翁湯治下利下利虛極則恐血妄行故用
阿膠止血甘草甘緩邪

附方

千金三物黃芩湯治婦人在草蓐自發露得風四肢

苦煩熱頭痛者與小柴胡湯頭不痛但煩者此湯主

之

蓐茵蓐之蓐吳昆曰產中之名也產婦肝血虛發
露得風邪在厥陰故當與小柴胡湯然熱多者三
物湯主之三物皆苦寒益陰

千金四卷小柴胡湯治
婦人在蓐比凡蓋
苦煩熱皆自發露
如表裏不痛但煩
與三物黃芩湯
與三物黃芩湯

正珍云附方二稅千金
石川仲景

黃芩 一兩 苦參 二兩 乾地黄 四兩

石三味以水八升煮取二升溫服一升多吐下

千金內補當歸建中湯治婦人產後虛羸不足腹中

刺痛不止吸吸少氣或苦以腹中急摩痛引腰不能

食飲產後一月月得服四五劑為善令人強壯宜

當歸 四兩 桂枝 二兩 芍藥 六兩

生薑 三兩 甘草 二兩 大棗 十二

右六味以水一斗煮取三升分溫三服一日令盡

若大虛加飴糖六兩湯成內之於火上煖令飴消

若去血過多崩傷內斂不止加地黃六兩阿膠二

史記刺客傳

飴糖之作法

本草綱目卷之二十一

三

兩合八味湯成內阿膠若無當歸以芍藥代之若無生姜以乾姜代之

金匱要略註解卷之二十一 終

黃世英

四兩

金匱要略註解卷之二十二

婦人雜病脉證并治第二十二

論一首 脉證合十四條 方十六首

取婦人中風七八日續來寒熱發作有時經水適斷此為熱入血室其血必結故使如癰狀發作有時小柴胡湯主之方見嘔吐中

產婦血虛風邪侵厥陰熱入血室厥陰與少陽為表裏故為寒熱

取婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語如見鬼狀者此為熱入血室治之無犯胃氣及上二焦必

自愈

熱侵肝故曰無犯胃氣及上二焦血者身之神也
 熱邪亂血故如見鬼狀○成氏曰傷寒發熱者寒
 已成熱也經水適來則血室虛空邪熱乘虛入於
 血室若晝日讖語為邪客於府與陽爭也此晝日
 明了暮則讖語如見鬼狀是邪不入腑入於血室
 與陰爭也陽盛讖語則宜下此熱入血室不可與
 下藥犯其胃氣熱入血室血結寒熱者與小柴胡
 湯散邪發汗此雖熱入血室而不可與發汗藥犯
 其上焦熱入血室胸脇滿如結胸狀者可刺期門

此雖熱入血室而無滿結不可刺期門犯其中焦
 必自愈者以經行則熱隨血去血下也巳則邪熱
 悉除而愈矣所以發汗為犯上焦者發汗則動衛
 氣衛氣出上焦故也刺期門為犯中焦者刺期門
 則動中氣營氣出中焦故也○王宇泰曰無犯胃
 氣謂下之犯上二焦謂發汗也王說是也

取

婦人中風發熱惡寒經水適來得七八日熱除脈遲
 身涼和胸脇滿如結胸狀讖語者此為熱入血室也

當刺期門隨其實而取之

巳日無犯胃氣縱令其實無以毒藥取之故刺期

會任云此條即如所借寒... 傷結凝堅在上之... 以痛用子... 出余以半... 之即愈也... 五色皆... 又難登... 加刺期門... 漸降而咽中亦愈... 即日男子... 信不... 又曰... 失血... 加刺期門... 漸降而咽中亦愈... 即日男子... 信不... 又曰... 失血... 加刺期門... 漸降而咽中亦愈... 即日男子... 信不... 又曰... 失血...

門泄其實。○許學士曰：婦人平居水當養于水，血當養於肝。方未受孕，則下行以爲月水；既妊，則中畜以養胎。及已產，則上壅以爲乳。皆此血也。今邪氣畜血，併歸肝經，聚于臆中，結於乳下，故手觸之則痛。非湯劑可及，故當刺期門。陽明病下血，識語者，此爲熱入血室，但頭汗出，當刺期門，隨其實而瀉之，濺然汗出者愈。陽明病未解而入傷血室也，濺然汗出，貌婦人咽中如有炙燔，半夏厚朴湯主之。手太陰脈經咽故藥皆太陰之劑也。

必與云此疑痰結氣阻... 寒咽... 咽中... 不下吐不出者... 加刺期門... 漸降而咽中亦愈... 即日男子... 信不... 又曰... 失血...

正珍按即局方四逆湯... 之病人惡阻不宜服之... 即四逆湯加生姜

取半夏厚朴湯方

千金作胸滿，心下堅咽中怏怏，能使血如有炙燔吐之不出吞之不下。

半夏 一升
厚朴 三兩
茯苓 二兩
生薑 五兩
乾蘇葉 二兩

而炙者用之利氣于血和不後上浮之

右五味以水七升煮取四升分溫四服日三夜一服

命注云此條即如所借... 或有更... 考之... 欠...

婦人臟躁喜悲傷欲哭象如神靈所作數欠伸甘麥大棗湯主之

此心脾虛神不安甘草甘緩神躁小麥素問云心之穀也思邈曰養心氣故除煩收心氣大棗以補脾

脾小麥大棗

甘州小麥大棗湯方

甘州 二兩 小麥 一升

大棗 十枚

右三味以水六升煮取三升溫分三服亦補脾氣
婦人吐涎沫醫反下之心下即痞當先治其吐涎沫
小青龍湯主之涎沫止乃治痞瀉心湯主之
此亦以傷寒法可考之

小青龍湯方

見肺癰中

瀉心湯方

見驚悸中

婦人之病因虛積冷結氣為諸經水斷絕至有歷年
血寒積結胸膈寒傷經絡凝堅在上嘔吐涎唾久成

命注云此條即如所增
婦人吐涎沫醫反下之心下即痞當先治其吐涎沫
小青龍湯主之涎沫止乃治痞瀉心湯主之

在者中者肝脾受之
約有三端曰虛曰冷曰結
約有三端曰虛曰冷曰結
約有三端曰虛曰冷曰結

肺癰形骸損分在中盤結繞膈寒疝或兩脇疼痛與
臟相連或結熱中痛在關元脈數無瘡肌若魚鱗時
着男子非止女身在下末多經候不勻冷陰掣痛必
腹惡寒或引腰脊下根氣衝氣衝急痛膝脛疼煩奄
忽眩冒狀如厥癲或有憂慘悲傷多噴此皆帶下非
有鬼神久則羸瘦脈虛多寒三十六病千變萬端審
脈陰陽虛實緊弦行其鍼藥治危得安其雖同病脈
各異源予當辨記勿謂不然
此言瘀血在上在中在下也冷陰之陰言陰戶腰
脊下根環跳際是也非言男子也三十六病見前

命注云此條即如所增
婦人吐涎沫醫反下之心下即痞當先治其吐涎沫
小青龍湯主之涎沫止乃治痞瀉心湯主之

命注云此條即如所增
婦人吐涎沫醫反下之心下即痞當先治其吐涎沫
小青龍湯主之涎沫止乃治痞瀉心湯主之

金鑑云下利當作下血。○
○心與去言即於血
者血在脈中氣在脈外
不入於脈而反浮於外
好按滯當作帶別者作
者○
倫注云此証言歷年血
寒積結腸口而云者

問曰婦人年五十所病下痢數十日不止暮即發熱
小腹裏急腹滿手掌煩熱唇口乾燥何也師曰此病
屬滯下何以故曾經半產瘀血在少腹不去何以知
之其證唇口乾燥故知之當以溫經湯主之

下利以唇口乾燥不可必為滯下意當自必有所
見然非疫痢至數十日之久唇口乾燥是即非瘀
血何

溫經湯方

此方以非仲景原方
然唐以前之方

- 吳茱萸 二兩
- 當歸 二兩
- 芍藥 二兩
- 人參 二兩
- 桂枝 二兩
- 阿膠 二兩
- 生姜 二兩

- 牡丹皮 二兩
- 甘草 二兩
- 半夏 半升
- 麥門冬 一升

右十二味以水一斗煮取三升分溫三服○亦主
婦人少腹寒久不受胎兼取崩中去血或月水來
過多及至期不來

當歸芍藥川芎四物湯也能治血吳茱萸下肝

邪桂枝牡丹皮破瘀血生薑半夏治痰開胃醒
脾人參阿膠甘肅甘補元氣久利必津液竭麥
門冬能生津液故非專治久痢無不流崩中去

血月水來過多及至期不來

帶下經水不利少腹滿痛經一月再見者土瓜根散

金鑑云再惡不字
經水不利之文不利

金鑑云再惡不字
經水不利之文不利

合用癩腫者主之

主之心典云婦人經水滯滯而血滿則下血盡後生如月盈則虧月暗後胎之惟
○折云經水不利滯滯不通言其候不便利即起一月而後之也
土瓜根散方陰癩腫

土瓜根 芍藥 桂枝 麝蟲各二三

右四味杵為散酒服方寸匕日二服

土瓜根本草云治瘀血月閉麝蟲亦破瘀血兼
芍藥桂枝去瘀血則此方主此證可知蓋此證
因瘀血而然也

好按神方不相統
○到相此亦未詳

寸口脈弦而大弦則為臧大則為乳臧則為寒乳則
為虛虛寒相搏此名曰革婦人則半產漏下旋覆花

湯主之心典云本云已見虛勞篇中此云男子亡血失精白而益之曰補後花湯主之蓋亦婦人主之

折云三出

此註見前第六卷血痺虛勞病脉条

旋覆花湯方

旋覆花三兩 葱十四莖 新絳少許

右三味以水三升煮取一升頓服之

已言虛寒相搏半產漏下而其藥但治寒何曰
風寒傷人其猛烈疾速傷經絡則中風塞傷風
寒是也傷包絡則半產漏下是也故但治其風
寒則其證自愈

婦人陷經漏下黑不解膠姜湯主之心典云陷經下血不止之謂黑因寒而色

是前妊娠心典云陷經下血不止之謂黑因寒而色 膠姜湯方諸本

折云血得氣而能行
折云血得氣而能行
折云血得氣而能行

按敦敦之敦敦少物而脹滿之狀如敦年危厄也之得又云生者即產也之脈經皆產得生之產為羊產也如牛馬為命佳云生疑經字之敦徒官切詩經有敦瓜苦傳於專之正美云野瓜蠶為蔓之瓜瓜野瓜專言瓜於專之專之然也瓜腹之小腹腸脹垂下之

目黑代云此亦有欬文心與云經水不利下者經脈閉塞而不下此前後下而不利者有別矣故下氣和利而此有攻逐之然必審其脈結實而用之不然則絕經用多有血枯脈絕者矣吳景養任於恐不互而之強責之

黑言血色也正珍云本中目赤而方引此作敦狀者李杲謂室和按周礼注以盛血敦以盛食蓋百蓋之少腹滿如敦者言少腹有形高起如敦之狀與心

婦人少腹滿如敦狀小便微難而不渴心或不在血室又云知能化血即產也心與云生於心於心水與血俱結在血室也大便黃甘遂湯主之心與云生於心於心水與血俱結在血室也

敦敦也謂脹滿也脈經註云生後字疑恐有缺

文謀字矣王珍云如敦狀者美本中引此文作如敦狀者之敦取

大黃甘遂湯方右三味以水三升煮取一升頓服之其血當下

水與血俱結在血室故大黃甘遂下之然一味醋毒破好血故阿膠以固本

婦人經水不利下抵當湯主之

水蛭 三十箇 熬
大黃 三兩 酒浸
蟅蟲 三十枚 熬
桃仁 二十箇 去皮尖

右四味為末以水五升煮取三升去滓溫服一升

成氏曰苦走血鹹勝血蟅蟲水蛭之鹹苦以除畜血甘緩結苦泄熱桃仁大黃之苦以下結熱

人之所有氣與血也氣為陽氣留而不行者則易散以陽病易治故也血為陰血畜而不行者

則難散以陰病難治故也血畜于下非大毒駛

石丸主之
 婦人經水閉不利
 臍堅癥瘕瘵也
 故礬石杏仁去痰也
 取
 礬石凡方
 礬石 三分
 杏仁 一分
 右二味末之煉蜜和凡棗核大內臍中劇者再內
 婦人六十二種風及腹中血氣刺痛紅藍花酒主之
 六十二種風其數未詳

劑則不能抵當

婦人經水閉不利
 臍堅癥瘕瘵也
 故礬石杏仁去痰也

石丸主之
 婦人經水閉不利
 臍堅癥瘕瘵也
 故礬石杏仁去痰也

臍堅癥瘕瘵也
 故礬石杏仁去痰也

礬石凡方
 礬石 三分
 杏仁 一分

右二味末之煉蜜和凡棗核大內臍中劇者再內

婦人六十二種風及腹中血氣刺痛紅藍花酒主之

六十二種風其數未詳

紅藍花酒方

紅藍花

右一味以酒一大升煎減半頓服一半未止再服

紅花能破瘀血生新血酒以通經絡

婦人腹中諸疾痛當歸芍藥散主之

胞不安也故當歸芍藥散主之

當歸芍藥散方

婦人腹中痛小建中湯主之

婦人腹中痛寒傷血故小建中湯主之

小建中湯方

見前虛勞中

玄由血之度

劉輝曰此後人之鏡

蛇床子仁

右一味末之以白粉少許和令相得如棗大綿裹

內之自然溫命注云坐得久陰中如生痔信坐草之坐也

坐倒通細末之義也蛇床子本草云治婦人陰

中腫痛

少陰脈滑而數者陰中即生瘡陰中蝕瘡爛者狼牙

湯洗之

外科百效云如因婦人子宮有敗精帶濁或月水

未淨與之交合後又未洗男子腎虛邪穢滯氣遂

令陰莖連累凡腫痛小便如淋名陰蝕瘡然婦人

亦有之故曰陰中蝕瘡中字可見

狼牙湯方

狼牙 三兩

右一味以水四升煮取半升以綿纏筋如繭浸湯

瀝陰中凡四遍

狼牙木艸云治疥癬惡瘍瘡痔去白蟲甄權云

洗惡瘡

取胃氣下泄陰吹而正喧此穀氣之實也膏髮煎道之

吹鼓吹之吹鳴也

膏髮煎方

見黃疽中

命注云此吹中出聲如大便先氣之狀連綿不絕或如鼓吹之吹鳴也

三珍云此狐惑病之
其陰二字當作婦人
要云此陰中之瘡也
熱之加脈滑而數

全備云高自髮前非以
行之名當作長脈詞
命注云下泄者氣從陰門
而出出在日陰吹者氣
出而不能止也書無膏
折云世行膏髮煎者
之而世行不復見之

疳疔世走馬疔
之類也
至平云小兒胃中有疳熱則
出牙而牙齦腫爛也按張
仲景有口齩命一卷今未
之見豈復從簡脫於此耶
而人方以不思有少兒
方也

小兒疳蟲蝕齒方 疑非仲景方

雄黃 國 葶藶 國本中細目

右二味末之取臘且猪脂鎔以槐枝綿裹頭四五
枚點藥烙之

金匱要略註解卷之二十二終

金匱要略註解卷之二十三

雜療方第二十三 李于云以下雜療皆忌瑣碎紊亂今類
以小字刻用卷燻

論一首 證一條 方二十三首

退五臟虛熱四時加減柴胡飲子方

冬三 柴胡 八分 白朮 八分 陳皮 五分

大腹楨即 四枚并 皮子用 生姜 五分 桔梗 七分

春三 枳實 國所 減 白朮 共六味

夏三 生姜 三分 枳實 五分 甘艸 三分共

秋三 陳皮 三分 共 六味

右各咬咀分為三貼一貼以水三升煮取一升分

此篇以下四頁不取
此篇以下後人之所
而多足取者

至平云二味即氣行長
之劑不の長服宜審之

溫三服如人行四五里進一服如四體壅澀甘草
少許每貼分作三小貼每小貼以水一升煮取七
合溫服再合滓為一服重者都成四服疑非仲
柴胡飲子柴胡白朮陳皮檳榔生姜桔梗六味
也春二月加枳實去白朮六味也夏三月加生
姜枳實甘草依本方數多甘州枳實二味故八
味也秋三月倍陳皮本方數依然故六味也然
此方誠宜去五臟熱而四時之減增其理未詳
故疑非仲景方
長服訶梨勒丸方疑非仲景方

訶梨勒

煨 新加 二兩 陳皮

厚朴

各二兩

右三味末之煉蜜丸如梧子大酒飲服二十丸加
至二十丸

但言長服不言何證恐去脾痺固太陽之用矣

三物備急丸方

見千金司空裴秀為散用亦可先利
成汁乃傾口中令從齒間得入至良驗

大黃

乾姜

巴豆

一兩 去皮心
熬外研如脂

右藥各須精新先搗大黃乾姜為末研巴豆內之
合治一十梓用散蜜和丸亦佳命注
莫令歇取主心腹諸卒暴白病若中惡客忤心腹

脹滿卒痛如錐刺氣急口禁停尸卒死者以緩水

若酒服大豆許三四丸或不下捧頭起灌令下咽

千金外臺引之題仲景
三物備急丸恐仲景
千金下蜜為丸貯蜜
器中莫令歇氣
千金二十九作張仲景
三物備急丸目空裴
秀為散用治心腹諸
卒暴百病方

暖 列注命

正珍曰中惡候卒然心
 眩刺痛胸亂欲死為
 鬼神之氣所中之客
 忤候心腹絞痛脹滿
 絕不獲識人智邪客
 之氣卒犯忤人精神
 也並見病源候論卷
 卷
 又曰停尸即道尸也
 人身內尸虫也病原
 云道尸者言其停道
 在人肌肉血脉之間若
 卒有犯觸即發動
 亦令人心腹脹滿刺
 痛氣息喘急傍攻
 而腸上衝心胸痞後
 復危停道不消故謂
 之道尸也

命注云熱玩此方可悟
 病收攬余邪調和阻
 又云思慮凡病服利
 陽物愈者此為忤服
 補陽益氣神陽物還
 後成更重宜之利可
 氣定散之利可
 以心相理會

以下肘心三張仲景
 諸要方卜云

須臾當差如未差更與三九當腹中鳴即吐下便
 差若口噤亦須折齒灌之

吳昆曰脾胃以飲食而養亦以飲食而傷故飲
 食自倍填塞至陰上焦不行下腕不通則令人
 腹痛欲死經曰外降息則氣立孤危是也以平
 藥與之性緩無益於治故用太黃巴豆奪門之
 將軍以主之佐以辛利之乾姜則其性益速而
 効益捷矣○從是以下諸方未詳其義略述其
 字義耳

治傷寒令愈不復紫石寒食散方 見千金翼
聖云服此令人飲食宜寒唯酒宜熱飲不大熱年下必不宜及傷寒下不四七女用

紫石英 白石英 赤石脂 鍾乳確

栝蒌根 防風 桔梗 文蛤

鬼臼各十分 命注折 太一餘糧十分 燒 乾姜

附子炮去皮 桂枝去皮各四分

右十三味杵為散酒服方寸匕

醫按巢元方病源候論卷之六服寒食散之法
 雖甚詳後世用之者稀矣故予亦且措之

救卒死方 千金外臺引肘後方

薤搗汁灌鼻中 通神安魂魄及能辟惡除邪而救卒死

又方

雄雞冠割取血管吹內鼻中

猪脂如雞子大苦酒一升煮沸灌喉中雞肝及

血塗面上以灰圍四旁立起大豆二七粒以雞

子白并酒和盡以吞之

救卒死而壯熱者方

至平云解陽相利而卒死而壯熱故伯曰血之氣者走於上初為大厥之利是氣者谷不收清氣之氣

礬石半斤以水一斗半煮消以漬脚令沒踝

救卒死而目閉者方

騎牛臨面搗薤汁灌耳中吹皂莢末鼻中立効

騎牛臨面如千金方治卒死方云牽牛臨鼻

上二百息牛舐必瘥又治厥死方云慎燈火

至平云按葛洪時方治卒死
至平云按葛洪時方治卒死
至平云按葛洪時方治卒死

周禮醫師職曰五毒
鄭玄曰丹砂雄黃
石丹礬石石慈錫

至平云卒死而四肢不收者
至平云卒死而四肢不收者
至平云卒死而四肢不收者

救卒死而張口反折者方

灸手足兩爪後十四壯了飲以五毒諸膏散

豆

五毒諸膏散未詳

救卒死而四肢不收失便者方

馬屎一升水三斗煮取一斗以洗之又取牛洞

也稀糞一外溫酒灌口中灸心下一寸臍上三寸

臍下四寸各一百壯差

折各壯下
又一方

救小兒卒死而吐利不知是何病方
狗屎一丸絞取汁以灌之無濕者水煮乾者取

外臺河仲景
命脈云即前寸口脈沈大而滑卒厥者一俟之

尸蹙脈動而無氣氣閉不通故靜而死也治方
葛蒲屑內鼻兩孔中吹之令人以桂屑着舌下

又方

剔取左角髮方寸燒末酒和灌令入喉立起
素問繆刺論云邪客於手足少陰太陰足陽
明之絡此五絡皆會於耳中上絡左角五絡

命脈云既死不想吐利
卒死而吐利又各地病可如
性熱善消物者乃已消之
性寒者用狗屎中骨末以
腸胃有用狗屎中骨末以
以治腹中積者不神
驗而皆之破死者不神

俱竭令人身脈皆動而形無知也其狀若尸
或曰尸厥鬢其左角之髮方一寸燔治飲以
美酒一杯不能飲者灌之立已張介賓註曰
五絡俱竭陰陽離散也身脈皆動筋惕肉瞤
也上下離竭厥逆氣亂昏憤無知故名尸厥
鬢剃同左角之髮五絡之血餘也燔治燒製
為末也飲以美酒助藥力行血氣也補以其
類故可使尸厥立已

救卒死客忤死還魂湯主之
千金方云主卒忤鬼擊
覺或已無脈口噤拗不開去齒下湯湯下口一小下
分病人髮左右捉掄肩引之藥下復增取一升復更

立

麻黃 三兩去節 一方四兩 杏仁 七十箇 去皮尖 甘草 一兩炙

千金用桂 心二兩

右二味以水八升煮取三升去滓分令咽之通治

諸感忤

又方 客忤上回

葦根 一把

烏梅 二十枚 吳茱萸 半升 炒

右三味以水一斗煮之以病人櫛內中三沸櫛浮

者生沈者死煮取三升去滓分飲之

救自縊死且至暮雖已冷必可治暮至且小難也恐

外臺引肘後方

外臺引病源

此當言陰氣成散也然實時夜短於晝又執猶應可

治又云心下若微温者一息以上猶可治之方

徐徐抱解不得截繩上卡安被卧之一人以脚

踏其兩肩手以挽其髮常弦弦勿縱之一人以

手按據胸上數動之一人摩將臂脛屈伸之若

已僵但漸漸強屈之并按其腹如此一炊頃氣

從口出呼吸眼開而猶引按莫置亦勿苦勞之

須更可山桂湯及粥清含與之令濡喉漸漸能

嚙及稍止若向令兩人以管吹其兩耳深好此

法最善無不活也

僵當作疆

及當是乃字

草外臺作草

須一本作不字是

宋音釋云莫兮切深入也

凡中暍死不可使得冷得冷便死療之方

屈草帶繞喝人臍使三四人溺其中令温亦可

用熱泥和屈草亦可扣瓦椀底按及車釘以着

喝人取令溺須得流去此謂道路窮卒無湯當

令溺其中欲使多人溺取令温若湯便可與之

不可泥及車釘恐此物冷喝既在夏月得熱泥

土煖車釘亦可用也

喻昌曰喝者中暑之稱左傳陰喝人於椹下

其名久矣後世以動而得之為中熱靜而得

之為中暑然則道途中喝之人可謂靜而得

之耶動靜二字只可分外感內傷動而得之

為外感天日之暑熱靜而得之因避天日之

暑熱而反受陰濕風露瓜果生冷所傷則有

之矣時令小寒大寒而人受之者為傷寒時

令小暑大暑而人受之者即為傷暑勞苦之

人凌寒觸暑故多病寒暑安養之人非有飲

食房勞為之招寒引暑則寒暑無繇入也所

以膏梁藜藿東南西北治不同也愚謂此說

破千古之疑紛紛論不足用○屈草本艸云

金匱要略卷之二十一 雜論 暑濕 二十一

味苦微寒無毒主胸脇下痛邪氣腸間寒熱
陰痺久服輕身益氣耐老生漢中川澤五月
采

外臺引小呂方
救溺死方

取竈中灰兩石餘以埋人從頭至足水出七孔
即活

右療自縊溺鴟之法並出自張仲景為之其意殊

絕殆非常情所及本冊所能關實救人之大術矣

傷寒家數有鴟病非此遇熱之鴟

外臺有亦非二字
賜下直解有詳之二
字
目黑云非恐行

治馬墜及一切筋骨損方 見肘後方

大黃 一兩切浸湯成下

亂髮 如雞子大 燒灰用

敗蒲 一握 會經云即蒲席

甘州 如中指 節灸剉

緋帛 如手大 燒灰

久用炊單布 一尺 燒灰

桃仁 四十九枚 去皮尖喫 煎命客

右七味以童子小便量多小煎湯成內酒一大盞
次下大黃去滓分溫二服先剉敗蒲席半領煎湯
浴衣被蓋覆斯須通利數行痛楚立差利及浴水
赤勿怪即瘀血也 血行血之末能下脈中瘀血敗蒲取倍承逐
肌中瘀血也

金匱要略註解卷之二十三 大尾

●コノスミシテカケルハ從
才ナル天野景好カ本
ヘカキ入レオキタルヲカ
リテラツシタルナリ
平田篤胤
文化四年九月廿二日
●コノスミシテカケルハ
篤胤カキ入

元祿丁丑孟夏吉日

姉小路通堀川東江入町

書林 中川茂兵衛板

金匱要略註解後序

上古之醫者以割皮浣胃導筵扶

膜能知病之肯綮矣後世之業醫

者按脈處方次之案板針灸而

不知察于四肢百骸病之所在攻

之試用古方而後知疾病之深淺

也故亦誤則謬治然別不研究者

書而復何為哉夫肉體難經固不
言也伊尹制湯液方劑未知其傳
而漢張機著金匱要略一以藥石
治病實為群才之祖矣蓋永嘉之
喪亂存於灰燼之餘若醫卜少耳
也然晉唐之間數百年未聞有知
此書者迨宋王洙獲之于蠹簡中

或爛碎或闕略魯魚虎不_{其六}无
或高保衡林億等又從而正諸
雖然醇疵渾淆群疑未_{トケ}渙_{トケ}讀若難
季家君潛心于此少若殆六十年
每有_{ツ子ニ}約_ニ于心_ニ刻_{トツテ}操_{フテ}觚_ヲ記_ス之日_ニ積_ラ月_ニ
累_テ為_{ツクル}之_ヲ注_ス解_ス鳴_ク乎_ニ我_レ家_ノ之_ノ敵_ト帚_ヲ莖_ヲ
之_ノ久_シ矣_ニ第_ニ慮_テ立_ス之_ヲ不_レ朽_ス屬_ス若_ク得_ル

鑿之梓以度其得庶年厥切慎予
誕寓也欵

元祿丙子春洛滙名古屋玄等

謹跋

福堅

此書為... 福堅... 謹跋... 元祿...

正德國式自... 治...

不和...

有...

臨... 國... 正...

132X
59
5