

解剖圖

坤

11X
28
2

次目

- | | | | |
|------|-------------|------|----------|
| 第四十四 | 身斷首痕 | 第六十五 | 腸位置 舉肛筋 |
| 第四十五 | 剥腹皮見脂肪及血絡 | 第六十六 | 乳康 腸間膜連屬 |
| 第四十六 | 以顯微鏡見表皮及腺毛髮 | 第六十七 | 全上 |
| 第四十七 | 胸中諸器 縱膈膜 | 第六十八 | 脾全形 |
| 第四十八 | 肺葡萄狀 | 第六十九 | 腎膀胱連屬 |
| 第四十九 | 使肺吹脹 | 第七十 | 腎膀胱罩丸連屬 |
| 第五十 | 肺全形 氣管五軟骨 | 第七十一 | 膀胱裏面及精囊 |
| 第五十一 | 剖肺見內質 | 第七十二 | 腎內質 |
| 第五十二 | 心及動靜血脉 | 第七十三 | 罩丸 |
| 第五十三 | 腹筋腹膜 | 第七十四 | 腎之水脉 |
| 第五十四 | 開胸腹見諸藏本位 | 第七十五 | 婦人陰器子宮 |
| 第五十五 | 腸網及膈 | 第七十六 | 腰骨全形前面 |
| 第五十六 | 腸網全形 | 第七十七 | 腰骨側面 |
| 第五十七 | 肝全形前面 膈韌帶 | 第七十八 | 子宮全形 |
| 第五十八 | 肝裏面 | 第七十九 | 全上側面 |
| 第五十九 | 肝內質 | 第八十 | 子宮卵巢 |
| 第六十 | 膈 | 第八十一 | 妊娠二月胎 |
| 第六十一 | 門脉 | 第八十二 | 全上三月胎 |
| 第六十二 | 全上 | 第八十三 | 胞衣膈帶連屬 |
| 第六十三 | 胃全形 脾 即大橫里尔 | | |
| 第六十四 | 腸全形 腸間膜 | | |

第四十四 身斷首痕

イ 脊椎

ロ 脊髓

⑨ 左右三十對神經

ホ 外行頸動脈

ハ 外行頸靜脈

ト 胃管

⑩ 內行頸動脈 ⑪ 內行頸靜脈

キ 氣管

リ 半斷甲状軟骨

五軟骨詳見下

手 氣管
 又 頸項諸筋
 半 斷 甲 狀 軟 骨
 五 軟 骨 詳 見 于
 第 五 十

胸



大椎

第四十五 剥腹皮见脂肪

及血络诸筋

一 表皮
 薄而居于第一有密皮于凡大易破也皆是也

第四十五 剥腹皮見脂肪及血絡諸筋

一 表皮 薄而居于第一有密紋汗孔火傷發泡者是也

口 次皮 厚而居于第二神經血絡循有腺分泌汗

八 脂肪 其色黃矣薄膜裹之

二 腹筋被膜者見于第

二十五第五十三

亦 血絡支



第四十六

以顯微鏡見表皮及腺


毛髮

一 表皮 有密紋汗孔不及神經於此


口 腺 即橫里尔形如乳頭狀毛髮生

八 血絡支末


二 毛 生於腺有根及枝其質如絲



第四十七



二 毛 生於腺有根
及拔其雙如
絲瓜



第四十七

胸中諸器

イ 胸骨 ①切軟骨處

ロ 縱膈膜 ②強膜也附
胸骨与脊


椎而分肺包心内有水
使心縮張易即心囊

ハ 心 ③剖心囊見心


ニ 肺 縮狀

第四十八 肺葡萄狀

細膜囊疊積而如葡萄着于
肺管之支末



開肺管
見枝孔



第四十九

使肺張

吸則張呼則縮
右肺有二裂
左肺有一裂



開肺管
見枝孔

第五十 肺全形

イ 右肺有二裂

ロ 左肺有一裂

ハ 氣管 岐而入

兩肺其實者以膜
累接軟骨成輪狀
者蓋痰者出於此

二 心連兩肺間

甲 五軟骨 在喉




頭接肺管處

一 甲狀軟骨 二 環狀軟骨

三 會厭軟骨 飲食

下則伏基氣管

四 氣管



第五十一 剖肺見內質 細膜囊疊積而成葡萄狀有孔氣管血脈之支

① 肺內質 ① 氣管細支 ③ 動靜血脈支 共無數小孔

② 肺動血脈

④ 肺靜血脈

⑤ 剖氣管見裏面 裏面有粘痰



第五十二 心及動靜血脈

乾 動血脈 從心之左方起支別則蔓延一身緝于靜血脈之支末

兌 靜血脈 從心之右方起受血於動脈之細支而送入心之右方也

① 動脈連心處 ② 靜脈連心處 ③ 腎 ④ 橫膈膜 ⑤ 心 ⑥ 入迎脈

第五十二 心及動靜血脈

乾 動血脈

從心之左方起支別則蔓延一身諸手
靜血脈之支末

兌 靜血脈

從心之右方起受血於動脈之細支而送入
心之右方也


離 開脈管見障膜 管中有膜瓣節血之出入而使其不忘行也

震 心脈管位置

- 甲 動脈孔 乙 靜脈孔 丙 肺動脈孔 丁 肺靜脈孔


巽 心全形前面

大如圖上圓下尖如未開蓮倒懸挂兩肺之間斜垂至于左乳下虛里之動者
心尾之縮張也 一 動血脈 二 靜血脈 三 肺動脈 四 肺靜脈 五 符脈
六 右耳 七 左耳




坎 縱剖心

- 一 中隔 二 左室 三 右室 四 三尖瓣
- 五 靜脈孔 六 心尾 七 動脈
- 八 九 靜脈 十 肺動脈
- 十一 肺靜脈




震

離





坎



艮

坤 四折心見

耳中及脉管膜

一 開左耳見內空 兩室多

筋條如心室

受血於靜脈

外量使細心之血無過不及

二 三天瓣 在靜脈取終之處心縮則塞靜

脉

三 半月瓣 在動脈所起之處使所出之血

不及流


四 折心尾見內室



坤

艮 橫剖心見室中

一 左室 狹而長 受血於肺靜脈輸
二 右室 廣而短 受血於靜脈輸肺動脈



四

第五十三 剥腹筋切腹膜見腸

胸腹諸筋見于第五十三

一 直筋 剥右方

第五十三 剥腹筋切腹膜見腸 胸腹諸筋見于第五十三


イ 直筋 剥右方

ロ 斜下筋

ハ 斜上筋

二 腹膜 血絡支循

ホ 腸 黄者腸網



第五十四

開胸腹見諸藏本位

開胸腹見諸藏本位

イ 胸骨 截軟骨者

ロ 右肺

ハ 左肺 共見于第四八四九五十五十一

二 縱隔膜 見于四十七

ホ 心 見于第五十二

ヘ 横隔膜 横膈者肉膜也属于

肋骨分胸与腹

ト 肝 通于臍 詳見于第五十七

夕 胃 見于第六十三


リ 腸網 見于第五十六

又 腸 見于第六十四

ル 腸間膜 見于第六十四

ヲ 脾 見于第六十三第

六十八



第五十五 腸網及臍位置

イ 腸網 起於胃下垂于小腹

ロ 臍 ①通肝与膀胱


ハ 胃

ニ 肝

ホ 腸

ヘ 腹膜

ト 罩丸



第五十六 腸網全圖

イ 胃 見于第六十三

ロ 肝 見于第五十七第五十八第五十九

形如囊而二襲膜也脂多生焉上者接脾胃及十二指腸
縮腸大機里尔下者寬大而圍臍部是主溫腸胃消食也
①血絡 如糸布蔓 ②脂肪 其色黃矣



第五十六

腸網全圖


形如囊而二襲膜也脂多生焉上者接脾胃及十二指腸
縮腸大橫里尔下者寬大而圍臍部是主溫腸胃消食也

イ 胃 見于第六十三

① 血絡 如糸布蔓 ② 脂肪 其色黃矣

ロ 肝 見于第五十七第五十八第五十九

ハ 腸 透見



肝全形前面

肝者諸藏中最大而其色紫赤在腹部之右橫膈膜之下季肋之處也

① 堆壘度

② 臍靱帶 與臍連小兒者名之臍血脈

③ 胆 見于第六十



第五十八 肝裏面

① 靜血脈 受血於門脈 泌別胆汁

② 門脈 見于第六十一第六十二

③ 胆管

④ 膽 共見于第六十

⑤ 臍 帶



第五十九

剖肝見內質

血絡之支末大小布蔓為大小數孔

第五十九 剖肝見內質 血絡之支末大小布蔓為大小數孔



第六十 剖胆見胆液 胆者與肝連受胆液於

肝貯于胆而使十二指腸主消化飲食也

イ胆管

口胆液 味苦其色黃矣



第六十 剖胆見胆液 胆者與肝連受胆液於



肝貯于胆而使十二指腸主消化飲食也

イ胆管

ロ胆液 味苦其色黃矣

ハ肝管 納胆液於胆

ニ總管 接十二指腸



第六十一 門脈 受血於胃腸腸間膜胆
脾網膜而合為一幹入于肝

イ胃 ①門脈所起之細支

ロ門脈入于肝處

ハ肝裏面

ニ十二指腸



第六十一 門脈 受血於胃腸腸間膜胆



脾網膜而合為一幹入于肝

イ 胃 ①門脈所起之細支

ロ 門脈入于肝處

ハ 肝裏面

ニ 十二指腸



第六十二 再示門脈


イ 肝

ハ 腸間膜



第六十二 再示門脉

- イ 肝
- ハ 門 幹
- 二 腸
- ホ 脾
- 一 腸間膜
- ト 肋骨
- 子 脾



第六十三 胃全形 横居于横膈下腹之上際全形

楕圓而其狀如囊

- イ 上口 以系繫之
- ロ 動靜血脉細支
- ハ 剖胃見裏面 滑澤也
- 二 食物有于内
- ホ 脾 大棧里尔
- 一 脾 見于第 六十八
- ト 胆 見于第 六十
- 子 總管
- リ 下口



第六十四 腸全形 腸承胃所輸飲食以
 胆脾二液調熟化醱以造乳糜輸之乳
 糜糟粕則導太為屎

イ 接胃処 以糸結之

ロ 十二指腸

二 廻腸

ハ 盲腸


今 直腸

ハ 空腸

ホ 虫様腸

ト 結腸

リ 腸間膜 厚而複全徑稍圓中
 夾当臍上連總諸腸
 膜中通乳糜脉



子

ト

入

ホ

二

又門脉細支


ル乳糜脉起処

ヲ剖厚腸与瀉腸會処
①有障膜使尿無逆行




第六十五 腸胃位置

- イ 胃
- ロ 十二指腸
- ハ 空腸



- ニ 迴腸
- ホ 盲腸
- ヘ 盲腸
- ト 結腸
- フ 直腸
- リ 挙肛筋
- 又 括肛筋



リ 挙肛筋 使肛挙此筋衰弱則患脱肛

又 括肛筋 使肛括約痔疾脱肛皆係此二筋

第六十六 乳糜 乳糜者水穀

之精液而為血之原白色如乳汁

イ 乳糜脈 微細白脈徧起於

小腸吸收乳糜會同于腸間膜中之腺

ロ 乳糜囊 乳糜脈湊合

為一囊會聚乳糜輸之乳糜管

ハ 乳糜管 囊之上端漸長

為管上行連于左鎖骨下靜脈者

二 腸

ホ 動脈幹

ヘ 靜脈幹


ト 腸間膜

チ 脊椎




第六十七 再示乳糜

- イ 静血脉
- 口 心
- ハ 乳糜管
- 二 乳糜囊
- ホ 腸間膜
- ヘ 腸
- ト 水脉



Spleen



第六十八 脾全状 脾在胃之左側受血於動血脉而分泌焉稀水

則輸之諸器稠血則輸之門脈

- イ 動血脉
- 口 静血脉

ハ 剖脾見内質

二 脉管納蠅使
易見




第六十八 脾全狀 脾在胃之左側受血於動血脈而分泌焉稀水
則輸之諸器稠血則輸之門脈

イ 動血脈

ロ 靜血脈

ハ 剖脾見内質

ニ 脉管納膵使
易見




第六十九 除諸器見心及動血脈靜血脈腎膀胱連屬

第六十九 除諸器見心及動血脈靜血脈腎膀胱連屬

- イ 心
- ロ 動血脈
- ハ 靜血脈
- ニ 右腎
- ホ 左腎
- ヘ 腎腺 又小腎
- ト 輸尿管
- チ 精動脈
- リ 精靜脈 二脈合而被膜下
- 又 直腸
- ル 膀胱

二脈合而被膜下
畢丸



第七十 腎膀胱睪丸陰莖連屬

イ 腎 腎有左右受血於動血脈滲泌
尿輸之輸尿管

⊕ 右腎
⊙ 左腎

ロ 動血脈幹 ① 精動脈

ハ 靜血脈幹 ② 精靜脈

二 膀胱 ③ 開上面見通輸尿管於內
④ 輸尿管孔

ホ 精囊

ヘ 睪丸

ト 攝護 ⑤ 射精管

チ 尿道 ⑥ 陰莖

リ 舉莖筋

又 輸精管

ル 小腎

ヲ 輸尿管 ⑦ 受尿於腎輸
膀胱

乾 橫斷陰莖見諸管

① 前脈 ② 動脈
③ 尿道 ④ 莖皮

カ 斷循足動靜血脈



第七十一 膀胱裏面及精囊

① 精囊 蓄精之囊在膀胱下之背側情感則射精於尿道

口 膀胱裏面

ハ 輸精管

二 輸尿管

ホ 攝護

ヘ 舉莖筋

ト 動脈支




第七十二 縦剖腎見内質

乾 輸尿管

坤 横断腎

① 腎動脈
② 腎静脈
③ 輸尿管





第七十二 縱剖腎見內質

乾 輸尿管


坤 橫斷腎

- ① 腎動脈
- ② 腎靜脈
- ③ 輸尿管



第七十三 剖睪丸見內質



睪丸二個俱受血於動脈
分泌之以造精輸之輸精
管



第七十四 腎水脈 無數水脈從乳糜起引乳糜中之水輸腎使乳糜稠厚

- ① 静脉
- ② 腎
- ③ 乳糜囊
- ④ 腸間膜中之腺

palsyn




Smellie. *Bolsman*




第七十五 婦人陰器全形


- イ 子宮
- ロ 子宮靱帯
- ハ 膀胱
- ニ 卵巢
- ホ 喇叭管
- ヘ 前縁
- ト 直腸
- チ 尿道
- 又 陰門
- ル 精動靜脈



palfyn



Bohemian




乙

丙

第七十六 腰骨全形
前面

- イ 脊椎
- ロ 八膠骨
- ハ 腕骨
- 甲 腸骨
- 乙 跨骨
- 丙 横骨
- 丁 鋤骨
- 二 尾藏



第七十七 縱断脊椎八膠見側面

- イ 脊椎及八膠内質
- ロ 脊髓通処
- ハ 尾藏

- ロ 腕骨
- 甲 腸骨
- 乙 跨骨
- 丙 横骨



第七十七 縱斷脊椎八髒見側面

口 腕骨
 甲 腸骨 乙 跨骨
 丙 橫骨

イ 脊椎及八髒内質
 一 脊髓通処
 二 尾鼠

第七十八

子宮全形前面

一 第切横骨

イ 子宮 三 子宮口

口 子宮靱帶


ハ 陰室 三 陰門割前膜開之者

ホ 卵巢

ハ 喇叭管

ト 剪絲

チ 直腸



第七十九 縱斷子宮見側面

イ 子宮 縦断者

口 子宮靱帶


ハ 陰室

二 卵巢




第七十九 縱斷子宮見側面

- イ 子宮 縱斷者
- ロ 子宮靱帶
- ハ 陰室
- ニ 卵巢
- ホ 剪絲
- ヘ 直腸
- ト 膀胱
- チ 橫骨



第八十 開子宮見胎

- イ 子宮内面
- ロ 子宮口
- ハ 喇叭管孔 見通内
- ニ 初月之胎
- ホ 卵巢
- ヘ 喇叭管
- ト 剪絲
- チ 動靜血脈
- リ 剖卵巢見卵 巢中有



許多小囊如豆大而精液滿焉謂之卵男精含神射宮由管入巢若卵卵得其神而漸大則由管通出舍于宮以為胚胎

ハ喇叭管

ト剪絲 子動靜血脈

リ剖卵巢見卵 巢中有


許多小囊如豆大而精液滿焉謂之卵男精含神射宮由管入巢若卵卵得其神而漸大則由管通出舍于宮以為胚胎

以顯微鏡
見男精

第八十一

第二月之胎

- イ子宮
- ロ子宮口
- ハ陰室
- ニ喇叭管
- ホ靱帶



第八十二


第三月之胎

胎居者背面而倒首其頂當橫骨上際而居焉其胞衣則蓋于胎之尻上

第八十二

第三月之胎

胎居者背面而倒首其頂當橫骨上隆而居焉
其胞衣則蓋于胎之尻上



第八十三 胞衣臍帶連屬

子在子宮也受其養於臍先受其母之

血於胞衣其血傳臍帶漸送之於肝從肝傳心從心而周流一身
者與大人無異也其血周流一身而後從臍帶復歸胞衣與其
母血相和如環無端也

第八十三 胞衣臍帶連屬

子在子宮也受其養於臍先受其母之

血於胞衣其血傳臍帶漸送之於肝從肝傳心從心而周流一身者與大人無異也其血周流一身而後從臍帶復歸胞衣與其母血相和如環無端也


① 胞衣 血絡錯綜而如織

② 臍帶 出入母血之管

③ 膀胱鞞帶

④ 通肝脉

⑤ 肝 比大人則大也



開腹膜見子宮之位置

甲 胃

乙 腸網 垂于子宮之上

丙 子宮

丁 腸

戊 腹膜 裏面

己 橫骨 被筋者

庚 陰門

辛 子宮韌帶

壬 卵巢



縱開子宮見全胎被薄膜者

甲 剖開子宮裏面

乙 胎被薄膜者 背面倒首而胞衣則蓋於胎之前面

縱開子宮見全胎被薄膜者

甲 剖開子宮裏面

乙 胎被薄膜者 背面倒首而胞衣則蓋於胎之前面

丙 子宮口 縱剖者

丁 陰腔 截斷橫骨而見腔內

戊 子宮韌帶 在左右

己 腸 見于左右

庚 而剝之腹膜裏面

辛 橫骨 截斷左右



胎全形被薄膜者

甲 胞衣外面 附著于子宮而受血之處也


乙 血脉膜緊膜 此膜薄而胎透見焉

丙 臍帶 透見者



開薄膜見胞衣連續

胎之前面如面而
膜內有水是為便
產也胞衣其形圓
而廣血絡弥蔓而
如蓮葉又別不圓
者是異於常者乎



文政壬午二月解剖

原猴其胎如月滿者

而子宮胞衣諸臟之

連續與人無異矣予

細寫其形狀以附於

卷端 張素堂主人



余嘗目為彙解剖法圖阮及部十部未嘗
 不嘆服其精巧緻密也唯恨未見彩頁諸器
 存否否形俾人親而驗實物之想者蓋有之
 獨於英梓碧國錄版彪忙及白牒乙二士之解剖圖
 譜中見之桂家之社南寧一士已視之手按貝圖
 且補以他部剖諸圖又自製新圖屬徵諸各屍
 每改淫其本之積年之久亦剖存其圖未及把而
 展拜之則瞞然如躬親在每剖均其丹青妙寫
 好之志蔚然滿幅之謂奇矣桂家奕世教育英
 才寧一蓋其選之實之欽仰哉余近所重訂之
 彙解新書上已成人若冬想其圖而讀之則
 彼造物之奇巧自能之天樣唯而可觀默而
 考也乃寧一之此等裨益豈道豈淺鮮也哉
 及頁請一者不敢拒之記其所喜以贈文政己卯十一

月廿七西洋新元日
 磐石老人大概實跋



Indien docter zonder ontliedkunde
 te weten de Lieke behandelde, men
 ik het dat aller gevaarlijkst is.
 En dat gelijk is aan de blind, die
 te blinde paard 's nachts gaat,
 hier door moeten de heelen genees
 musters ten eersten alle de heelen
 onder lichaams naauwkeurig
 kennen.

Den 21^{ste} November
 No 2 jaar van beoefening
 Altheld: en heeltkunde
 te Wakuhara.

杉田玄卿 跋

De geroemde Heelmeester,
 En ontleeve Johan palffyn zegt.
 Dat niet zo moeylijk is als een
 Lieke te Geneesen; Waar van men
 (de oorzaak niet kent); Maar nog
 is 't moeyliker de oorzaak te weten,
 Sonder kennis der ontlieding enz.
 Die onvergetukende komt ouer door,
 Een met waarlijk hart na.

te Jesso
 No 1819 of
 1^{ste} ninge beoefening
 by 2^{de} jaar
 Geschreeven
 door
 Altheld: en heeltkunde
 Mr. Gen. den
 Mr. doct. dan
 Tiyama.

宇田川玄真 跋

老松道人 宇田玄真 書



南小栴寧一解剖存真圖卷末吳興梅街君
問余題言速展觀之則其所畫描人身內外諸部
三腔十絡繁然備具為其大小曲直幽密隱顯色彩之
濃淡殆逼真物矣寧一曾舉西洋解剖圖若干
部從良善者校讎繕寫親自臨解屍塲照燈塗抹
其不然者亡慮數十度嗚呼可謂勤也蓋聞西洋解剖
科者有以精臟象者有^得以皮膜者有以筋骨者而精通一
身諸器者或鮮焉以此而就西哲諸子所設新圖摘精
捨粗且徵之實毫不虛飾及其詳明嚴密者迥出洋圖之
右也後生燭此而讀新譯解剖諸說則無復旁剖
散之煩而洞視身體諸部於秋天看列宿一般寧一
叔月池先生高足弟子而今於部下成一家、箱及

陳善言以應之文
甲午年平月大觀
茂損識



夫天下之事有見法則不數年而成功者有見法則雖百世
不來也且御其不然必經刻之學又尤者也蓋刻之學者
醫道之所宗治術之所原不可不先講究焉故黃帝內經
曰八風之士皮肉在此外之皮重切循而得之其死可經刻而視
之則其學為然但見法不傳載在古經者文字訛誤故其事未明
晰而後人推擬附會於其間亦不足也王莽之世翟義黨王孫慶
捕獲莽使大醫方分与巧居在剗刺之重度五臟室室之乃泗
川刑賦於市初李虎以是醫并画之法親決照據有方典於
國之徵諸古經者達者就其謂巧居在剗刺諸古經其書在明
者於書也
皇朝寶曆乃山公東洋始法剗屍於

官於獄中錄之以著藏者一言實錄其之理也也就其執達先入鋼
心以金則其後何從率諸古經而止而謂福執持痺傷之古書云
一人能擊案主蒙開明其理者可據嘆哉豈所謂不傳其法則雖百世
不來者非耶滬以諸篇初田先生始為西洋剗刺面議与故月池桂公
相謀數微之其屍復之而況其之可見者有一毫針孔者遂欲
其書名曰剗屍新書及後歷數十年夫人有言述見其子為以爲難
於是世始有可實測之說而為子古之惑矣豈所謂得其法而數年
而成者不從哉而恨於未有圖譜之精巧者耳而少神術於其母
者豈何月池公親受剗刺之學乃就西洋剗刺諸國華精四
華又試之其屍數十次覃精積思以成剗刺存真圖可謂最
能得其法者矣而後以剗刺而後推視海內外者其居於於
市林哉公合錄梅樹君既為序且卷其以余之久從醫者先
生而學也又為書其後余厚天之愛能保夫不可解也所書而
堂間先生以之為云而林丹竟之妙用心之厚則諸先生
盡之矣後月池贊焉

政印仲冬望後

中澤修之木刻奇後



寅江馬車里書

