



R E M E

MECH

storia fr

strium,

rum, qu

T E

tertio aut qua

tica; interdum

na proferens,

concidentia, q

runtur, radice

quod vere serit

stet; sursum e

matur, ut The

agricolis grati

sam matura sa

uenit triticu in

bus & complu

natalibus locis

specie, & prop

Seri triticum la

co & sicco qua

fert, melius coa

rat, ac post tert

candidius triti

triticum siue re

R E M-

REMBERTI DODONÆI
MECHLINIENSIS MEDICI HI-
storia frumentorum, leguminum, palu-
strium, & aquatiliū herbarum, ac eo-
rum, quæ eò pertinent.

DE TRITICO. CAP. I.

TRITICVM FOLIO EXIT SECA-
lis minori, in herba, quod autumnō satum, per
hyemem est, inde emollito cælo culmis assurgit
plurimis, geniculatis, hordei altioribus, quorū
tertio aut quarto geniculo spica gignitur, ut plurimum mu-
tica; interdum tamen aristis nonnullis breuibus cincta; gra-
na proferens, colore flaua, è glumis ac folliculis suis facile
concidenda, quæ & exiguo aut nullo negotio in area exte-
runtur, radicibus firmatur multis ac tenuibus. Trimestre
quod vere seritur, paucis radicibus paucisq; culmis confi-
stit; sursum enim continuo nititur & celeriter confir-
matur, ut Theophrastus scribit; eius vsus, Columella ait,
agricolis gratissimus: ubi enim propter aquas aliamuē cau-
sam matura satio est omissa, præsidium ab hoc petitur. Pro-
uenit triticū in omnibus ferè culti orbis regionibus, à qui-
bus & complura eius notantur genera, cognomina ab ipsis
natalibus locis sortita, quæ & colore, & magnitudine, &
specie, & proprietate inter se differunt; testis Theophrastus.
Seri triticum leto pinguiq; solo postulat, eoq; magis apri-
co & sicco quàm riguo. Nam in sicco, ut Columella re-
fert, melius coalescit; in humido verò & vliginoso degene-
rat, ac post tertiam sationem in siliginem, hoc est leuius &
candidius triticum, conuertitur; quæ rursus in præstantius
triticum siue robum, biennio transit, si in conueniens solum